外科集成

廿

和書門
類 二〇七六一 號
函 六〇 架 四
冊 五〇

内閣文庫
和書
類 二〇七六一 號
冊 五〇 架 一
函 九五 二

内閣文庫
番號 和 20761
冊數 50 (20)
函號 195 230

国立公文書館
National Archives of Japan

外科集成卷之二十目録

諸痔瘡第二十

諸痔瘡辨論
走馬牙痔證治論
青腿牙痔證治論
鑽牙痔證治論
口痔證治論
内痔證治論

舌疳證治論
喉疳證治論
鼻疳證治論
耳疳證治論
月蝕疳證治論
無辜疳證治論
鏇指疳證治論
冷疳證治論
血疳證治論
風疳證治論
妬精疳證治論
袖手疳證治論
陰疳證治論

外科集成卷之二十

官醫瘍科

栗嶋道樞正弘編輯

諸痔瘡第二十

諸痔瘡辨論

夫痔瘡有數種痔血痔風痔牙痔下痔之類血痔者乃熱中虛怯邪熱相侵外乘分肉之間發於肌膚之上初如紫茄破時血出淋漓身行處及瘡氣血損傷皮肉虛弱久不愈或成痔瘻風痔者乃足陽明胃經受風邪在兼山之側初生如疥癬破時黃水

浸淫如瘡風疹相搏毒氣聚攻流注遍体或生小兒耳邊黃水瘡亦謂之疳瘡才疳者習由幼年好食甘餅餌膏粱辛熱之物以致陽明胃經蘊積邪毒上牙齒之間或牙根之內發成腫痛或孤腐敗血來侵潰爛牙槽臭穢難近以致牙齒脫落日久不愈緣由成大患下疳者乃男子玉莖生瘡日久不愈或成便毒或損爛陽物甚不可輕易多致不救凡上諸症治法不同辨證賜教門●走馬牙疳者迅速之稱大抵也故有鼻疳唇疳舌疳喉疳紫疳諸疳之分●血疳者風熱注於皮間紫疳者赤暈行於肌肉作瘡肺經鼻下生瘡遍體生瘡乃虫蝕肌膚如疥瘡之狀●冷疳兒脾疳者腹大青筋時氣風熱皆有不得息瘡之狀●

疳無辜疳虫氣流散肌肉作瘡肺經鼻下生瘡遍體生瘡乃虫蝕肌膚用雷丸丹參丸月蟾丸化蟲丸猪肚黃連丸王蟾散洗疳瘡藥宝鑒●小兒鼻唇齦疳受在心肝脾胃因食炙甘甜煿熱毒所傷為瘡流滯反處結成惡毒或有白風或有赤風此小兒之疾眉疳鼻唇牙齦先服牛黃清心丸次服敗毒流氣飲治之全書●疳瘡多因久利脾胃虛弱腸胃之間蘊熱侵蝕五藏使人心煩懊憹其上蝕者則口鼻齒齦生瘡其下蝕者則肛門傷爛習難治或因久利或因藏熱嗜眠或好食甘美之食而令虫動致生此病原

走馬牙疳證治論

走馬疳言患迅速不可遲延故也其患多在齒間以致齒根作爛腐腹黑腐作臭甚而成者其患牙根作爛腐腹黑腐作臭甚而成者又有雜病熱甚而成者牙齦脫落根柯黑枯不數日間以致穿腮破唇誠爲不治初起宜用蘆薈二消消飲外用入中白散或冰硼散二藥搽之取去黑腐內見紅肉血流者爲吉如取時頃肉不脫腐爛漸開漸不退者即難止變證不治正○走馬牙疳小兒之病俱不治也小兒多養肥甘腸胃難化積而不散其火上炎且小兒又是純陽原多火多必須水解小兒食既不化何生水乎既不生則胃火益熾齒牙又胃之部位也故火結而成疳矣牙已

生痛而兒又索食所喜者必水菓居多本欲得水菓以解渴也誰知胃已有熱又加水濕則濕熱相合而病病者言其勢如走馬更重矣走馬牙疳之急也火重則急火輕則緩若不早治則火爍津液而成齒脫者矣治之者大約內服清胃之藥外用白綠丹應落不同故緩不能救馬急牙以針挑去蟲血用

乃齒蝕之急也走馬牙疳者口臭齒脫者其牙齦則齒又重故倉卒有緩急之分●口臭者名為走馬牙疳之輕者齒脫者名為走馬牙疳之重者●口臭齒脫生白點者共未傳之立僉中白一錢煆銅綠三分有口內一分並用

京墨磨薄荷汁以母油髮裹手指蘸墨遍口擦之勿得食乳令兒睡一時醒後與乳再為擦之即愈入門●走馬牙疳多由癖疾積火熏毒而成牙齦腐臭穢難聞若消疳飲膏粱厚味外感熱毒漸漸開腐爛內見紅肉流鮮血者用手法取去腐爛不盡及腐爛深重者宜用勒馬聽徽絲塞之再用藥擦之不能如致牙齒搖者腐穿腮齒者俱由溺白散擦之若散堅毒硬湯外熱毒漸漸輕者宜服清胃虛者兼服人參茯苓粥若疹痘飲膏粱積滯時頑肉難脫堅硬腐爛難收者以致穿道毒行中者宜服

但此蟲惟癖積攻牙成痛者好後易犯田積火時々上攻唯在調理飲食得宜加山藥栗子鵝鴨蟹鮭辣等物俱當禁忌若稍有疎忽必致復發眞之金鑒●牙痛之病其候膽齦虛腫牙齒動搖侵蝕齒根腐臭脫落下攻齦焮損爛膿血俱出者是也蓋手足陽明之經氣虛風邪熱毒在胃蘊損日久上重胷間攻發口齒故成斯疾通用沈香散獨活湯茨實散牛膝散丹麻散猪齒散鶴虱散防風散升麻細辛散甘松散穿牙散蔾蘆丸拘杞湯牛膝散青黛散鹽綠散聖濟●腎痛又名急痛言五加惟腎爲最急也多因痘後餘毒上蒸致齒齦則口臭氣甚則齒根潰出血臭氣甚則齒根潰爛齒黑脫落顆有穴者名曰走馬痛言陽明熱氣上奔如馬然下蝕腸胃則下痢肛爛其證腦熱肌削手足如冰爪黑面黧甚者天柱骨倒宜腎氣丸加使君子川練肉入門●齦痛猪乳加不調甘味入脾而生虫上蒸齒齦用冰片散內量加珠子銅青枯礬全書●走馬痛加蒂木去皮燒存性人灰白梅灰與少熟毒所致宜服清胃散黃連消毒飲或刺出惡血則愈●走馬痛並痘毒牙痛者溺白散或用白芷五錢馬牙硝一錢銅青五分麝香一字爲末乾敷口角及擦齒上妙入門●小兒走馬牙疳床一齊腐爛即死此方神効婦人尿桶白垢火煅一錢入銅綠三

分射香一分半研之立愈丹溪●牙疳用藥涎從外流爲吉內收涎毒入臟爲凶正宗●走馬牙疳者小兒食肥甘腎受虛熱口作臭氣次第齒黑名曰崩砂漸至齦爛名曰潰槽又或血出名曰宣露重則齒落名曰腐根用蘭香子末輕粉各一錢蜜陀僧醋淬研末半兩和勻每以少許點齒及齦上立效內服甘露飲本綱●又方雄黃豆大七粒每粒以淮麥去核包之鍼線串定燈上燒化爲末每以少許揉之去涎以愈爲度同上●小兒牙疳雄黃一錢銅綠二錢爲末貼之日上●走馬牙疳北棗二枚去核入鴨嘴蓉紙包煨赤性火毒研末傅之同上●又方砒石銅綠等分爲末擦紙上貼之其效如神又砒霜半兩調如糊盛內盛待乾刮用粟米大絲裹安齒縫來日取出有蟲自死久患者不過三日即愈同上●走馬牙疳口臭延蝕者一不治黑腐不脫者二不治牙落無血者三不治穿腮破唇者四不治用藥不效者五不治正宗●走馬疳者熱毒上攻虛藏所受腎藏主骨齒爲骨餘上奔而潰勢如走馬故名之東垣●走馬牙疳或因胎毒或因疫疹後發毒攻蝕齒齦腐爛成疳殺人最速鼻梁上發紅點者不治色如乾醬一日腐一分二日腐一寸故名走馬以喻其速也者齒者落盡而死小兒走馬疳大人牙槽風俱防留落大全●凡看走馬疳無分先

幼但上面左邊門牙爲牙中之主此牙一落則餘牙盡落此牙不落餘牙雖落俱還可治同上●崩砍痛乃風自舌下牙齦上腫赤口內作痛如湯淋牙齦潮爛亦防齒落爲患同上●急痛者腎痛也一名骨痛乃腎藏久受傷損所致甚至飲水好鹹小便如乳牙焦牙黑滑枯者死同上●走馬痛者因病後脾胃氣血傷損而火上炎或痘疹餘毒上攻其患甚速急用銅碌散大蕪荑湯輕則牙齦腐爛唇腫重則乖齦蝕露頰顴透爛若吻腮腫重則乖齦蝕露頰顴透爛若飲食不入喘促痰甚此聯胃虛而肺氣既敗也頰赤唇焦而肉脫不知痛者此胃氣虛甚也並不治●走馬牙痛因膽胃積受熱毒太重初起牙

肉先腫日久腐爛成爲急症齒落肉黑者不治脉浮洪者生沉細者死治法用重劑救之拔盡虛脉大有力尚可細藥石難投故臨症須詳脉治之初起未爛者即針膿處出血擦金不換已爛者不必行針擦藥照上用川渾碁根連煎犀角生地各一錢白蘇皮甘州象貝母天花粉各一錢生石膏一兩河車一兩入大鍋內煎服三碗連服三劑如脉數復結加生大黃五錢生石膏一兩或者有救遲則不治●牙痛宜露膿血臭氣者胡桐淚一兩枸杞根一斤每用五錢煎水熱漱又胡桐淚蕪荑等分研末擦聖惠●牙齒風痛膿血有虫攪攪燒研入射香少許貼之風上●用

牙痛出血大鯽魚一尾去腸留鱗入當歸末泥固燒存性入煆過鹽和勻
日用空心食之又方生地黄一斤鹽二
合末自擣和團以麵包煨令烟勁去皮貼之空心食
麵入射香一分研勻日夜貼之空心食
●牙齒痛黑殺羊脂葶苧子等分
入盃中燒烟張口熏之牙痛出血作臭用蜘蛛一枚銅綠半
錢射香少許并匀搽之無蛛用殼指節
●走馬牙痛透骨穿腦生南星一箇當心剜空入雄黄一塊麵裹燒候雄
黄作汁以盞子合定出火毒去麵爲末入麝香少許拂瘡數日甚效本綱
●風牙痛零陵香稷葉煎水含漱之雜
同上
●牙痛陰痛取鍋底蓋黑垢等分爲末
腔胫黄皮灰蚕繭灰枯凡等

米泔洗後頻傅之同上
●走馬牙痛
傅之若加砒少許更妙同上
五倍子青黛枯礬黄蘗燒焦爲末油和
少許黄柏等分爲末又方
黑猫頭燒灰酒服方寸匕同上
用鯉魚一枚同上
●又方
用一兩紙包燒存性入枯白礬
方寸匕同上
●又方
研末入麝香少許貼之同上
●又方
用婦人尿調中白垢火煅一錢有神效
三分射香一分研生地香末分
●又方
取下人瓷瓶內鹽泥固濟煆紅內
白礬末搽之同上
●又方
用雞鴨黄皮不落水者
為末搽之同上
●又方
以小便黄丹盆等分研末
搽之同上
●又方
用銅綠方

五倍子五錢研末搽立愈●又方用雞胞黃皮燈上燒存性入枯丹末等分射香少許先以米泔漱過火煅搽每研末一錢為末先以炒焦燒一研兩末入射香少許少許臭爛●又方孩兒茶硼砂泔淨搽之為末米泔漱淨搽之為末入鹽塡滿合定燒出火毒研末入上●又方孩兒茶等分為末搽之如同上●又方雄黃貝母等分為末搽之如同上●又方銅青滑石杏仁等分為末泔漱淨搽之為末入上●又方楊花燒存性為末入上●又方橡斗殼上傳之同上●又方枯矾凡銅青名一錢為末先以米泔漱過搽之同上參之

青腿牙疳證治論

青腿牙疳自古方書罕間聊載其名傳雖正詳聊發明陶起麟頗得其要上必發青為陰陽水炎熾下為陰寒閉鬱以至因陽上下為不交各自為寒熱各有之凝結而生此證也相近內地人初居國內地人不免坐臥腫脹腿青腫硬色似茄黑肉躰外少五穀不食午穿等肉其熱與濕合蒸淫於下發腿青腫故寒濕之人本不耐邊外雖亦有邊外得此證者竟十多惟八九人不發上發青為陰陽之凝聚為熱為毒初國居邊外邊外居內地間亦甚多其病形如雲片黑斑點點如蚤咬痛難也又濕邊外少五穀硬於寒冬不免腫脹青腫所以步履艱難

胃毒火上熏致牡牙痛牙齦腐腫出血若穿腮破唇腐爛色黑即爲危候

邊外相傳僅有令服馬乳之法麟初到軍營診視青腿牙痛之證亦僅知以馬乳閱歷既久因悟馬腦之力較馬乳爲敗倍速令患者服之是夜即能發出大汗而諸病減矣蓋腦爲諸陽之首其性溫暖且能流通故耳

兼服活絡流氣飲加珠二如張宜其血氣通其經絡使毒不得凝結外用法令惡血流出以殺毒勢亨以牛肉片貼敷以拔出積毒不敢耳而愈黑血出則陰氣外泄陽氣即隨陰而下降兩相交濟上下自安也由是習爲成法其中活者頗多因不敢自私著之於書以公於世盍鑒●青

腿牙痛用三稜鍼形如錐挨者向腿之青黑處勿論究道量黑之大小針一分深或十針二十針俱可務令黑血流出外以牛肉割片貼劉眼並黑處次日再看如黑處微退仍針仍貼如無牛肉當頂刺破用鑷拔法餘●青腿牙痛用煮馬肉湯洗又用羊肝割片貼黑處又用芥菜子搗麵燒酒調敷黑腫處自拔●青腿牙痛形氣衰敗飲食不思者不治牙齒猖落紫黑流血腐潰穢臭者不治腿大腫腐爛或細而乾枯者不治　同上

鑽牙疳證治論

鑽牙疳由肝胃二經積熱所致乃牙根肉內鑽出肯尖如刺疼痛異常小兒多有之法用鍼就患處刺開好肉連牙齊根取出若血出不止者以濕紙換貼二次即止內服蠱蒼消疳飲外以冰硼散搽之戒厚味其牙復生如舊金鑑

口瘡證治論

口生瘡潰及破延流重者每出血甚而唇吻腮頰俱爛其涎乃胃中有熱又食生冷水菓重添濕熱相乘因其生瘡而至爛內生細蟲以蝕皮蝕肉也失胃中淫熱何上發于口蓋口乃脾之竅而脾乃胃之妻也況脾胃為表裏脾之竅即胃之竅也而胃之經絡又左右而繞唇其熱乃火也火性上炎濕借火而上沸故口上應之也治法內服瀉胃之熱導脾之濕外用攪拭散搽之可計日而愈矣●口竅瘡是溼熱在于胃口之上乃脾之竅宜內除其胃中濕熱若不早治恐蝕其口唇腮頰等處外以搽藥用鐵欖核一兩兒茶五錢水片二分共為細

末搽之即愈不須上三次神效無比
●口糜由陽旺陰虛膀胱溲水淤滯
脾經濕與熱瘀鬱久則化為熱氣
熏蒸胃口以致滿口糜爛甚於口瘡
色紅作痛甚則連及咽喉不能飲食
初起宜服道赤湯連翹甘桔湯
者宜服通經湯甘桔湯
夜重者服少陰厚朴湯
膽散外俱以薑蜜散搽之有效
●兒童口瘡鉛丹霜銅爛綠無臭血腥不狗大人小
兒日用掃之日本細末每二錢白丸豆許貫
等分為末每用蜜調入蓮蕊
等分為末每用蜜調入蓮蕊
●口瘡
口上皰瘡
●瘡蝕口
小兒五倍子牛糜香少許同瘡入
日瘡白燥存性研末搽之
丸髮性研末搽之
五倍子肉質過同研搽之同上
皰唇頰穿者綿裹人尿貼之必有蟲
出同上●小兒口瘡
蜜炙焦為末等分入冰片少許以青
黛減淨粉之累効同上
●瘡
口糜爛與小兒日瘡同治大金
滿口瘡宜用絲綿覆洗忌用布同上
口瘡甘草燒研搽甚效同上●又●又方
口瘡方縮砂仁殼煅研搽之立效同上
雞胞皮燒存性敷之節或母食膏粱口
瘡因乳哺失乳瘡或乳母七情鬱火所致其症
熱齒龈如生瘡狀若發熱作渴飲冷額舌
間赤色左寸脈洪數者皿為心經熱先
用導赤散清心火次用地黃丸滋腎先
水若寒熱作渴左頰青赤左關脈弦

洪者屬肺經先用柴胡梔子散清肝火次用六味地黄丸生肌血若兩脉洪大便酸臭右關脉洪數按之則緩者屬脾經用四味肥兒丸治脾火以五味異功散補脾氣若發熱咳嗽右脉洪數按之濇者屬肺經先用清肺飲治肺火用五味異功散補脾色赤右寸脉洪數按之濇者屬肺經先用清肺飲治肺火兩頰黧色左尺脉數者屬腎經不足先用六味地黄丸以壓腎水次用補中益氣湯以生脾氣立齊

内疳證治論

内疳發生于口上膊初發如蓮花根帶小而下垂乃大沪法以鈎刀決其根燒鉄烙以止其血次以雄黄輕粉粉霜白芷白蘞爲末付之以槐枝作枕支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡瘢定合口自復次且出膿生肌散付之入門

舌痈證治論

舌痈由心脾毒火所致其證最惡初如豆次如菌頭大帶紅爛無皮朝輕暮重急用北庭丹熏之自然消縮而愈若失於調治以致漸腫突如泛蓮或有狀如雞冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時津臭涎再因怒氣上衝忽然崩裂血出不止久延及項頷腫如結核堅硬礬痛皮色如常頂軟一熟色嫩木紅破後時津臭水腐如爛棉其證雖硬癰痛仍前不退此為綿潰甚至發舌本屬心舌邊屬脾因心緒煩擾則生火思慮傷脾則氣鬱化甚而成斯疾其證外勢頗類喉風但喉風咽喉腫脹常腫湯水不能下嚥此證咽喉不腫可以下嚥湯水胃

中亦思飲食因舌不能轉動送送硬食故每食不能充足致令胃中空虛而怯證悉發日漸衰敗初起宜服導赤湯加黃連麗者服清涼甘露飲吞歸脾湯假漕者服歸芍異功湯領下腫核初起宜用錦地羅蘸醋磨濃敷之潰後宜水澄膏貼之自古法雖多然此證百無一生縱施藥餌不過苟延歲月而已金鑒

喉痺證治論

喉痺一名陰虛喉痺初覺咽如毛刺帶刺喉中又如硬物隘於咽下嘔吐酸水嗽出甜涎淡紅微腫痛日久其色紫暗不鮮如火炎頗似凍榴手色由腎液久耗虛火炎上消爍肺金熏燎咽喉腫痛日增破爛腐衣蛀皮聲音嘶啞痰喘急多爛臭腐蝕延其咽喉增劇發飲食胃氣由此漸衰而虛火益盛頻燥者宜服知蘗地黃湯若吐酸嗽延者宜服甘露飲加川芎連翹蘇膏面唇俱白不寒懶食者宜歸脾湯加炒川芎連翹吹鼻雪散腐吹八寶珍珠散其症投方憑病或有十全二否則難救金鑒

喉乃性命之關不可輕忽若不早治一二日間次

生係之輕則緩重則急治宜內服泰
膈解毒之劑外以氷片一分兒茶五
分百艸霜一錢共末每次吹五厘于
喉內神効非他方之比若用吹藥
藤痧之瘡即發蛾之症也有陰有陽
陰及皮陰之君火陽乃少陽之相火
也二症最急若不早治一二日間死
生係之輕緩而重急也陰火症用八
味地黃湯神効陽火症內服解火之
劑外用吹藥亦効應如響總不可緩
治之也真虛●凡喉間作痛潰爛久
而不愈此必為主證佐以別藥●東垣
生咽喉之下肺管之上看之不過橋
梅藥不到飲食妨礙胃也此湯以草蘇湯
梅猪毒犯肺胃也大全

鼻痛證治論

鼻內生瘡痒時難忍欲嚏而不能欲忍而不得嚏謂濕塗
聲音閉塞此鼻痛也夫鼻之竅乃肺之竅也肺病而氣難宣則鼻乃生瘡
矣故鼻痛雖是鼻之病也夫肺病宜肺內生瘡乃不生于肺中而生于鼻
之內看以熱而衆濕也熱乃火也火在肺而不致竅生瘡矣于鼻而水不能上外鼻之竅
乃水也水能制火故火在肺而不致竅生瘡矣于鼻而水不能上外鼻之竅
細小然不能散火也故成痛而不成瘡而痒之毒亦不易化後自
難矣雖不成瘡而痒之毒亦不易化後自
去其混熟則水下行而火上散然自
以外藥吹之則氣消矣臭
●鼻內肺之竅凡鼻孔有痛即肺
中有濕熱治宜除肺中濕熱外以探
藥若不早治恐蝕其鼻內關竅令人

言語不明即用兒茶五錢雄黃一錢
輕粉一錢冰片一分共末吹入孔內
邪臭加鍋底五分拗開●鼻痔即
肺痔原因傷寒傷風升後勞復更加
乳食不調以致肺氣受傷外症鼻下
兩傍瘙痒不痛或鼻流臭涕內生瘜
肉或汁所流處隨即成形名痔匱不
時咳嗽氣逆寒熱唾紅泄瀉各痔隨
鼻咬甲與瘙症太同宜先服清肺湯
黃芩當歸麥門冬連翹防風赤茯苓
桔梗生地紫蘇甘州斛胡各五分桑
白皮一錢水煎服次服化蜜丸蕪荑
蝦蟆灰各等分爲末猪膽汁浸川黃
蠣丹皮青黛川芎白芷胡黃連川黃
連各等分雄黃
麻子大每五丸食後臨臥杏仁浸煎
湯小筆蘸先候

加藥各進數服再用青黛當歸赤小
豆瓜蒂地榆黃連蘆薈各等分雄黃
灰許爲末入鼻歛瘡入門●鼻匱瘡
多生小兒鼻下兩旁色紫班爛由風
熱客於肺經膿汁淫流而不痛皆
服澤瀉散外搽青蛤散即愈金●
五藏皆有蟲者得風則化肺開竅於
鼻肺經既虛風熱乘之鼻氣壅塞不
得宣通則痔蟲因得侵蝕瘡生鼻間
遲滯●鼻痔瘡浸蝕鼻柱者烏香散
貼之卅烏頭燒灰麝香研等分右二
味同研細以灰許貼瘡上瓦上●用銀
蟲蝕入口鼻唇頰作瘡穿透者用
屑十兩水三升煎取一升一日三四
度洗瘡根仍於銅器中煎用洞上●
痔蟲蝕鼻生瘡及鼻下赤爛者如聖

散貼之胡粉半兩麝香研一字甜瓜蒂七枚研石三味再研匀用蟾酥少許水浸一宿次日取蟾水先和胡粉大同和丸如菉豆大每用二丸水化傳瘡上鼻下赤爛者塗赤爛處小兒每用一丸同上●痔蟲鼻生瘡及鼻渕潰者黃金散貼之銅青白丹丹砂研等分右二味同研為散每用少許傅瘡上小兒亦可用同上●又方杏仁燒壓取油傅之千金●鼻痔赤爛蘭香葉燒灰二錢銅青五分輕粉二字為末日傅二次本綱●鼻痔有蟲黃蘗二兩冷水浸一宿絞汁淋服●聖惠●鼻下兩傍瘡溼爛是名鼻疳俗呼鼻蜜瘡不甚痛竹所流處即成爛瘡火全●鼻下一道赤者名曰鼻以黃連末敷之同上

耳病證治論

耳內腫出膿因膿色不一而名亦各殊如出黑色臭膿者名耳病出清膿者名震耳出白膿者名停耳俱由胃主之氣實火盛者以竜膽瀉肝湯服柴胡清肝湯服而成定若不兒胎熱或洗浴不必探藥卽治之早則頂下結腫任其毒盡自發至月外不瘥者用紅綿散搽之枯白凡三錢乾臙脂二錢麝香二分共爲末確收先揉綿毬絞盡耳內壓膿隨用綿毬蘸藥送入耳底內陰乾吹用丈用雞胞皮焙或文蛤膽末吹之又用陳年舊茄蒂搽汁滴於自愈 ◎耳病偏日枯凡入猪膽汁內者則久永

耳內又用杏仁炒黑爲末綿裹塞於耳內日三四易又用人牙燬存性去火毒爲末用灰許吹耳內洞上●痔出膿用天鵝油調輕烏末入龍腦少許和傅立效無則以雁油代之●耳痔出汁雞子黃炒油塗之甚妙●耳上●耳痔出膿用抱出雞卵殼炒黃爲末油調灌之瘥即止同上●新耳瘡久不瘥耳乃取斷此亦月食之類但不隨月生長爲異耳瘡亦是風濕搏血氣所生以其斷耳因以爲名也痔原

月蝕痔證治論

月蝕痔乃足陽明胃經少陽膽經濕熱內蝕耳下痔瘡能蝕者名黃丹一錢煅赤枯凡一錢真粉一錢以冰片半分共末或唾調搽甚効又五烟膠末搽之●月蝕痔者多生于耳邊或耳之下也此瘡小兒生俱多然足陽明胃經無濕熱與足少陽膽經無鬱氣則不生此痔也然此乃少瘡耳不必內治而蝕不止者必宜內治爲在內治之法瀉胃與小腸之濕熱而外用末藥調搽斷不久延也設或瘡蝕不大是濕熱不減何必用內治之法哉●月食自發側侵食乃至筋骨月初則瘡盛月生瘡兩耳及臭面間並下部諸孔竅側侵食乃至筋骨月初則瘡盛月

木則瘡衰以其隨月生死因名之爲月食瘡也又小兒耳下生瘡亦名月食世云小兒見月乃手指指之則分病此瘡也其生諸孔竅有虫久不瘥則變成瘻也●旋耳瘡在於耳後縫間延及耳招上下如刀裂之狀色紅時津黃水由膽腑湿熱所致此瘡月盈則瘡盛月虧則瘡衰隨月盈虧是以又名月蝕瘡也宜察粉敷拭之輕粉研隔紙微炒柴山甲鉛粉黃丹各三錢水飛過共研極細香油調敷即可成功●間生瘡世謂之月食瘡又瘡生於小兒耳皰互湿搏於血氣所生也宜察其時發所有膿汁此是風寒食滯滅傳之良手金●又方望夜取鬼屎納蝦蟇腹中同燒末傅之甚妙●又方虎頭骨二兩搗碎豬脂一斤熬膏塗之亦効●月蝕瘡燒螵蛸末傅之同上●月蝕瘡造耳根用烏雄鷄膽且三塗之同上●小兒月蝕生於耳後黃連末傅之同上

無辜疳證治論

無辜病候小兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致羸者謂之無辜言天上有鳥名無辜晝狀夜遊洗浣小兒衣席露之經宿此鳥即飛從上過而取此衣與小兒小兒著並席與小兒臥便令兒著此病矣●無辜疳因兒开罹晒涼悩被雌鳥糞及羽毛所落于上有虫入于皮毛間致令小兒腦後項邊有核如彈丸在內推之則動軟而不疼久則虫化入于臟腑令兒羸瘦壯熱腹脹血頭青閉後肢體生瘡治宜肖毒膏●無辜疳瘡乃鳥糞或羽毛從天下降于人身感而生疳瘡也蓋各鳥所食多是蛇蝎蚣之類其糞最毒而羽毛亦未嘗不毒犯小

兒不知其故或逢落或見蟲墮羽可珍手攜口嚼其毒因之而入于臟腑久則發丙于皮膚乃生瘡疥痒矣或生于腦後或生于項邊結核如彈丸推之則動軟而不疼治法亦須消毒為主小兒得此尤宜早治矣○無辜痛腦項邊有核轉動軟而不疼甲有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散遍蝕藏府以致肢躰瘦便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高初起可用針破膏藥貼之或因浣兒衣時夜露蒼蠅下為雖鳥落羽所汚兒着此衣虫入皮膚故也其衣用火烘之則無此恙宜用癩蝦蟆一箇打殺置桶中以尿浸之却取棄蛆一杓入內任蛆食一日夜取出以布袋緊束

流水中浸一宿瓦上焙乾入麝香一字為末飯丸麻子大每三十丸米飲下一服虛煩退再服渴止三服瀉住入門

鏇指疳證治論

疳發生于手足最不易治以十二經井穴多起于手足也井穴既有十二經之分則疳生于肺生于次衝宜治心經生于隱白宜治脾生于少澤生于少陽宜治膽生于厲兌宜治胃生于至陰宜治膀胱生于足指四肢生于十二經之井邊而治法斷不可單治井穴蓋疳之生也本于腑藏之虛熱也濕熱蓄積諸物長養正盛之時也不見萬物之俱廣乎故治法必須治脾之濕熱爲主治脾而胃亦不

足也井穴既有十二經之分則疳生于手足最不易治于次商宜治肺生于次衝宜治心經于大敦宜治肝生于隱白宜治脾生于涌泉宜治腎矣生于中衝宜治心包絡生于商陽宜治大腸生于少澤宜治小腸生于關衝宜治三焦矣然而手足者四肢也四肢屬脾之部位故疳雖生于十

可置之也脾肯表裏治則同治耳或見痔生于井穴灰分各井而佐之何經之藥尤治之神也●鍼指痔因脾中有溼熱治法宜大消溼熱於脾胃外以見茶五錢雄黃一錢花腦三分共末洗搽之效

冷痔證治論

夫冷痔者藏腑虛寒理毒惡腹中熱氣熏於肺孔肺主皮毛故發於肌膚損傷榮衛乃有血痔紫痔風痔冷痔等之名冷痔者腎水長流不得乾息若不早治日久深入骨髓損傷元氣命必難保治法以消風解毒活血除溼之劑為主

血痂證治論

失血痂者臟腑虛弱邪氣相侵其氣衰少風毒閉塞腠理發于肌膚初如紫斑破時血流出遍身行處成瘡損傷皮肉痒痛難存治法先服當歸連翹散並服清肌滲濕湯並搽十神散治法同紫斑全書

●血痂形如紫斑痛痒時作瘡多熱因加消風散金鑒

風痺証治論

風痺者經連脾胃谷足陽明經寒溼相搏風毒交接客于谷道之間注于承山之側初生舞痂破痛黃水浸淫成瘡攻于遍身或麻木而破裂治法同血風瘡宜用木香流氣飲五積散其中加減之法難以指明宜推類消息之全書●風痺由風溼客於谷道而成形如風癬作痒破流黃水浸淫徹爛遂宜如聖膏搽之金鑒●風痺生於臀腿谷名坐板瘡形如疥癬破流黃水先痒後疼宜香白散等藥敷之令膏水出盡即結痂而愈大成●坐板瘡一名風痺生於臀腿之間形如黍豆色紅作痒甚則焮痛延及谷道勢如火燎由暑令坐日晒久受或坐陰溼之地以

致暑溼熱毒蒸滯肌肉而成初宜芫花川椒黃柏煮湯淋洗即消或毒盛痒痛仍不止者宜用油釭清布三指寬一條香油調雄黃末一錢糜於布上捲之燃着吹滅焰頭向瘡烘之其痒痛即止裹灰金鬆●坐板瘡乃脾經濕熱濕毒鬱久以致生于臀部最痛最痒況至陰之所血亦罕來藥加皮至治宜內踈脾經溼熱外宜火拈油布觸之更妙皆玄●坐板瘡生于兩臀之上臀乃脾經之所屬也脾屬至陰而臀又至陰之地脾經血少則易生熱矣血少而熱又加溼氣少之則溼熱而停鬱火不宣臀乃生瘡矣此瘡最難而兼痛治宜健脾以主氣使氣旺則血易生氣血漸生則

溼自下行從膀胱而分散不盡既利而熱又何存焉毒又何在乎外用藥治之奏効更速倘氣血不甚虛者不須內治惟外治可也●坐板瘡內服加味五香散外敷溼熱而治散松黃散貝母●治坐板瘡以砭針刺出血消也●又方用油核桃搗膏紙捲一錢胡椒七分拈凡一丸入言一分點著滴油于上●又方花椒炒為末拍油調搽同上

妬精痂證治論

妬痂乃生于玉莖外膜痂而精亦妬痂袖手痂之類此人生最多遺妬症有二種一妬不潔之精必有毒氣太潔之精必有炎氣故玉莖不交敗精之陰戶斷不生痂陰戶蓄精尚未流出一旦重接鮮不生瘡矣此等之痂其症向輕外用丐根湯洗之再用皆經散搽抹則愈矣不必又用敗毒膏劑而內治之也●

妬者乃腐妬之症也因交合不潔之婦或交而不洗畜其敗精于玉莖妬而爲瘡故名之內宜清濕熟外用地骨皮泔水洗再以眞金散即室女晉經抹布燒灰搽之立効者矣●外精瘡治即痛甚出

清膿作臼孔蝕之大痛婦人有生於玉門內正似疳蝕瘡但不痛爲異難傳之不過三度千金●殆精麝香等分爲末田螺二個和殼燒存性入輕粉同研傅之效不獨紙數日即愈也彌久者良同上●殆精塗以唾粘貼青

袖手疳證治論

袖手疳者生龜頭之頸上皮包于內而外不顯也凡龜與生疳瘡多是淫毒所感因嫖妓而得也然而因嫖而生者不止生于龜頭而外及皮裏龜之頸合止生于龜頭之乃止于皮肉之內也非淫瘡實熱瘡也內用瀉火祛毒之藥數劑然後以外藥水浸之自然收功矣●袖口疳是龜頭及頸上有套腫脹內而外則反暴不見其瘡如袖口之包手故名之似龜頭之袖是難治之何也蓋藥不能達至瘡上宜用洗藥加冰片入卵殼內套在龜頭上浸之內服清肝涼熱藥妙者也

陰痒證治論

婦女陰戶有瘡名陰痒是肝經湿熱所生久而有蟲作痒腥臊臭有因男子交媾遇之此非肝經湿熱乃感瘡毒之氣當自察其來歷治之方妙外以搽藥洗●陰痒者生瘡于陰戶之內也時痛時痒往々有不可忍之狀其氣腥臊作臭無物可以解脫倘愈交接則愈痛矣最可憐之症也此瘡多因于慾火之動而又有湿感之火炎水流兩相牽制蟲而閉結乃化而生瘡久則生蟲也此蟲雖生于陰戶然實化于肝腎或思男子而不可得火以成之也總無或交男子而感其精毒以長之也總無湿不生瘡也當細察其由來治之後仍以外流同施鮮不

即瘙矣●陰中蝕爛煮狼牙湯
洗之用狼牙三兩以水肆升煮取半
升以綿纏筯如藕浸湯瀝陰中日三
遍浮絮●陰中極痒及蝕蠶瘡用大
蒜搗碎煎湯洗之後以杏仁不拘多
少燒烟盡研丞絲綿包納陰戶全津
●又方取雞肝或牛肝猪肝煮熟乘
熱納陰戶其蟲入肝內胴上●又方
水銀輕粉雄黃和棗肉研細無星入
陰戶又以鯽魚膽蔡之同上細末
孩兒茶雞內金各一錢輕粉五分冰
片三分爲細末乾掺立效●陰爛
中生蟲蠱如上●陰
氣又鬱氣血凝滯而生乃淫熱甚而
湯稱芯湯古硫黃艾香養胃心
熏之鯉丸用雄黃生蜜調
外用雄黃銳散細

陰中入門●陰中疰細虫注不自忍
九以蛇床子煎湯洗淨拭乾後用鶴
虱皮門靴爲末入指縫四分之一射
谷收許敷之立効●器外生
疣瘡內生細蟲作癢不可忍者此蟲
食入臟府即死爭人多發焦與勞
瘵相似有此症之婦人長羞都不肯
說因循日久面黃肌瘦發熱咳
嗽生痰往往不治者多矣如有此症
急與通遙散吞蘆薈丸早晚二服
用銀杏散綿裹塞入陰中殺蟲止痒
半月漸愈正宗●婦人久居寡室滿
火妄血鬱令而又妄那火久注多致
陰中作痒生蟲此蟲食入內臟陰中
腐爛以刺疼痛臭水淋漓口乾發熱
形削不食有此症者非藥能愈於歸

於死又名失合症也同上●一婦年
居十餘載陰器作痒生蟲令忍不說
後陰器發癢已食肉驟入形消瘦發
熱作渴脉洪浮數劳請醫治詢問痒
痛日久陰器小水不禁內臟下
壞不可用藥彼苦求治予曰痒者蟲
也痛者損也先用鮑魚數枚以香料
搽多魚熟以絲綿薄裹納入陰中夾
之良久取出紅蟲長者一寸短者五
六分細如絲線約有二十餘條置溫
水中搖擺片時方死彼家懽悅以爲
可治予曰非也再取勇有生化無窮
之狀養血清肝藥終至不痊而死同
●陰內下痛因月後便行房致成
濕毒流陰道遂生痛證與男子妨
精瘡略同黃丹枯白礬篇著蔓太咎

一硫黃虫床子荊芥各五錢虫蛇
一條燒灰石膏末別以荊芥蛇床子
煎湯溫洗拭乾以清油調藥末搽之
得効●陰搶如蟲咬痒痛者生擣桃
葉綿裹納之日三四易本編●陰戶
濕痒出水又痛者憂思過甚歸脾湯
加柴胡山梔牡丹芍藥生甘州潰爛
者逍遙散入門

外科集成卷之二十

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan