

證治準繩

九十五

拾函

四科胎前門

逐月養胎法

胎動不安 胎上逼心

妊娠經來 漏胎下血

胎漏黃汁下或如豆汁

跌撲傷胎 毒藥傷胎

心痛 心腹痛 腹痛

小腹痛 腰腹背痛

內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (95)
函號	301 60



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM Kodak



逐月養胎法

北齊名醫徐之才云：妊娠一月，名始胚，飲食精熟，酸美受御，宜食大麥，毋食腥辛，是謂纒正。妊娠一月，

足厥陰脉，養不可針，灸其經。如大敦行間太衝中封

足厥陰內屬于肝，肝主筋及血。二月之時，血行否澀

不為力事，寢必安靜，無令恐畏。

妊娠一月，陰陽新合，為胎寒多，為痛熱多，卒驚舉重

腰痛，腹滿，胞急，卒有所下，當預安之，宜服

烏雌雞湯

烏雌雞壹隻治茯苓

阿膠各貳兩

吳茱萸

壹升

麥門冬

伍合

人參

芍藥

白朮

各叁兩

甘草

生薑

各壹兩

右以水壹斗貳升煮雞取汁陸升去雞下藥煎取叁升內酒叁升并膠烱盡取叁升放温每服壹升日三

補胎湯

若曾傷一月胎者當預服此

細辛

壹兩

防風

貳兩

乾地黄

白朮

各叁兩

生薑

肆兩

吳茱萸

大麥

各伍合

烏梅

壹升

右八味以水柒升煮取貳升半分三服先食

服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根

貳兩若有所思去大麥加栝子人叁合一方有人

參壹兩

妊娠二月名始膏無食辛燥居必靜處男子勿勞白

節皆痛是為胎始結 妊娠二月足少陽脉養不可

針灸其經 如膽竅丘墟付陽絕骨 足少陽內屬於膽

膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴

中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所

胎前
下午寒乍執宜服

艾葉湯

艾葉

丹參

當歸

麻黃

人參

阿膠

甘州

生薑

大棗

右九味咬咀以酒參升水壹斗煮減半去滓內膠煎取叁升分三服一方用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取血內參升酒中相和次以水壹斗貳升先煮取汁去雞內藥煎取叁升內血酒并膠煎取叁升分温三服

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此

黃連

人參

吳茱萸

生薑

生地黃

阿膠

右五味咬咀以酢漿柒升煮取叁升分四服日三夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅壹升加烏梅者不用漿直用水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也 妊娠三月手心主脉養不可針灸其經如中衝勞宮大陵內關間使

胎前 養胎 卷十四

門曲譯等，手心主內屬於心，無悲哀思慮驚動，
沉是也。妊娠三月為定形，有寒大便青，有熱小便難，不赤即
黃，卒驚恐憂愁，嗔怒喜頓，什動於經脈，腹滿繞臍苦
痛，或腰背卒有所下，宜服
雄雞湯

雄雞壹隻治如食法 黃芩 白朮

生薑各壹兩 麥門冬伍合 芍藥

大棗拾貳枚擘 甘艸 人參

茯苓 阿膠各貳兩

右為咬咀，以水壹斗，參升者雞減半，出雞內藥煮

取半，內清酒參升，并膠煎取參升，分叁服，一日令
盡。當溫卧，一方用當歸等各貳兩，不用黃芩生薑。
衣神湯 曾傷三月胎者，當預服此方。

茯苓 丹參 龍骨各壹兩

阿膠 當歸 甘艸

人參各貳兩 大棗貳拾壹枚擘 赤小豆貳拾拾粒

右九味，咬咀以酢漿壹斗，煮取參升，分四服，先食
服七日，後服一劑。腰痛者，加桑寄生貳兩。深師有雄白貳
兩麻子壹升 丹一婦人但有孕，至三箇月左右必墮，
其脈左手大而無力，重取則澹，知其血少也。以其

山前逐月養胎 文斗四

妙年只補中氣使血自榮時初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末壹錢與數十貼得保全而生因思之墮于內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠為安胎妙藥也 婦人經候三月驗法川芎生末濃煎湯空心下壹匙腹中微動者是有胎

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡 妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經如關衝陽池內關三陽天并曲垣等穴是也 手少

陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀濟下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服

菊花湯

菊花

雞子大壹枚

麥門冬

壹升

大棗

拾貳枚

人參

壹兩半

甘州

當歸

各貳兩

麻黃

阿膠

各叁兩

半夏

等兩

台

生薑 伍兩

右十味咬咀以水捌升煮減半內清酒叁升并阿膠煎取叁升分叁服温卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雞壹隻煮汁煎藥調中湯若曾傷四月胎者當預服此

白芍藥

生薑 各肆兩

厚朴

生李根白皮

枳實

白朮

柴胡 各叁兩

續斷

芎藭

甘草 各壹兩

當歸 壹兩半

烏梅 壹升

右十二味咬咀以水壹斗煮取叁升分肆服日三

夜一八日後復服一劑

妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴洗不深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經如隱白大都皆成無大饑無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦陰交漏谷陰陵泉等穴是也足太陰內輸于脾五月之時兒四肢便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下宜服

阿膠湯

阿膠 肆兩

人參 壹兩

生薑 伍兩

當歸

芍藥

甘草

黃芩

旋復花 貳合

吳茱萸 合

麥門冬 壹升

右十味咬咀以水玖升煮藥減半內清酒參升并膠微火煎取參升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雌雞壹隻割取咽血內酒中以水煮雞汁煎藥減半內酒并膠煎取參升半分服

安中湯

曾傷五月胎者當預服此

黃芩 壹兩

當歸

芍藥

乾地黄

人參 各貳兩

甘草

芍藥 各參兩

生薑 陸兩

麥門冬 壹升

五味子

大麻人 各伍合

大棗 伍枚

右十二味咬咀以水柒升清酒伍升煮取參升半分四服日三夜一七日復服一劑

安胎當歸湯

若妊娠五月舉動驚愕胎不安小腹

痛引腰脇小便下血

當歸

阿膠 炒

川芎

人參

各壹兩

大棗

拾貳枚

艾葉

壹把

右以酒水各叁升煮至叁升內膠令烊分三服

方有甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處
出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷲鳥猛獸之肉
是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂不好娠六月
足陽明肌養不可針灸其經如膈允豐隆陰市上足
陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調
五味食甘美無太飽
妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身

腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服

麥門冬湯

麥門冬

壹升

人參

甘草

黃芩

各貳兩

乾地黄

叁兩

阿膠

肆兩

生薑

陸兩

大棗

拾伍枚

右八味以水柒升煮減半內清酒貳升并膠煎取

叁升分叁服中間進糜粥一方用烏雌雞壹隻煮

汁煎藥

柴胡湯

若曾傷六月胎者當預服此方

柴胡

肆兩

茯苓

壹兩

白朮

各月經前

五十二

芍藥

紫藏

甘州

麥門冬

芎藭

各貳兩

生薑

陸兩

乾地黃

伍兩

大棗

叁拾枚

右咬咀以水壹斗煮取叁升分四服日三夜一中
間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑

一方有黃芩貳兩

旋復花湯

集驗療妊娠六七月胎不安常處亦治

旋復花

壹兩

厚朴

製

白朮

枳殼

黃芩

炒

茯苓

各叁兩

半夏

炒一方無

芍藥

生薑

各貳兩

右以水壹斗煮取貳升半分五服先食服日三夜

二忌羊肉餛醋桃李雀肉

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖腹無使定止

動作屈伸以運血氣居處心燥飲食避寒常食稻稊

以密膜理是謂養骨而堅齒 妊娠七月手太陰肌

養不可針灸其經如少商魚際列缺尺澤太陰內屬

於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭

無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉

若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強蔥白湯

主之

蔥白長叁肆寸 拾肆莖半夏

麥門冬各壹升

旋復花貳合黃芩壹兩

人參壹兩半

甘草壹兩當歸

黃芪各叁兩

阿膠肆兩生薑捌兩

右十一味，以水貳升，煮減半，內清酒叁升，及膠煎取肆升，每服壹升，日三夜一，溫卧，當汗出，若不出者，加麻黃貳兩，煮服如前法。若秋後勿強責汗，一方以黃雌雞壹隻，割喉取血，內酒中煮雞，取汗以前藥。

杏人湯 若曾傷七月胎者，當預服此。

杏人

甘草各貳兩

紫苑壹兩

鍾乳

乾薑各叁兩

麥門冬

吳茱萸

粳米伍合

五味子叁合

右九味，以水捌升，煮取叁升半，分肆服，日三夜一，中間進食。七日服一劑。一方用白雞壹隻，煮汁煎藥。

妊娠八月始受土精，以成膚革，和心靜息，無使氣極。是謂密腠理而光澤顏色。妊娠八月，手陽明脉養不可針灸，其經如商湯二間合谷上下廉三手陽明合前通月卷胎前。

內屬於大腸九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起
妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眩眩芍藥湯主之

芍藥

生薑 陸兩

厚朴 貳兩

甘草

當歸

白朮

人參 各叁兩

薤白 切壹升

右八味㕮咀以水伍升清酒肆升合煮取叁升分

一叁服日再夜一方用烏雌雞煮汁以前藥

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此

葵子 貳升

甘草

厚朴 各貳兩

白朮

柴胡 各叁兩

芍藥 肆兩

生薑 陸兩

大棗 貳拾枚

右八味㕮咀以水玖升煮取叁升分三服日三服

十日一劑方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

丹溪縮胎丸 八九箇月用之

黃芩 夏壹兩秋柒錢

白朮 貳兩

陳皮 叁兩去白

茯苓 柒錢

右為末粥九桐子大

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備

飲醴食甘經帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經如湧泉然谷

廣伏溜等足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒

脉續縷皆成無處濕冷無著炙衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛

不可轉側短氣宜服

半夏湯

半夏

麥門冬

吳茱萸

當歸

阿膠 各參兩

乾薑 壹兩

大棗 拾貳枚

右七味咬咀以水玖升煮取參升去滓內白蜜捌

合微火上温服四服痢即止一方用烏雌雞壹隻

煮汁煎藥

豬腎湯 若曾傷九月胎者當預服此

豬腎 壹具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黃

芎藭 各參

白朮 肆兩

附子 中者壹枚

大豆 叁合

麥門冬 壹升

右吹咽以水壹斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取叁升半分四服日三夜一十日更三劑

丹溪縮胎丸 九箇月用之

黃芩 壹兩宜熟藥不並

滑石 朱錢半臨月十日前一便多時加此一味

白朮 言二兩

右為末粥丸如桐子大每服叁拾粒空心熱湯下

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故

使關節人神皆備但俟時而生

妊娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五

月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月

穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥入

月即服

滑胎枳殼散 瘦胎易生湖陽公主每產累日不下

南山道士進此方

商州枳殼 壹兩 粉草 壹兩

右為細末百沸湯點貳錢服空心日三服凡懷孕

七八个月已上服之令兒易生初生胎小微黑百

日已後漸漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑

陽降氣為眾方之冠此方分兩出必用方以此為

正 一方枳殼陸兩甘草壹兩 故枳殼減甘性

合月逐月養胎

寒故也未產前一月日可三服忌登高厠一方有糯米半升淘洗控乾同炒為末米飲或白湯調下壹貳錢 溫隱居加當歸木香各等分

張氏方 治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中諸疾下氣寬膈

枳殼 伍兩

甘草 壹兩半

香附子

叁兩炒去毛

為末薑煎湯點亦可如丈夫婦人冷氣攻刺勝肋疼痛者用葱白三寸同煎服 婦人脾寒血氣成塊作痛熱酒調服 大小便不通白牽末煎湯調服 選奇方香附子枳殼各貳兩甘草半兩

補丸 治妊婦衝任脉虛補血安胎

熟地黃 貳兩

當歸 微炒壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大溫酒下參肆拾丸許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰素問云陰搏陽別謂之有子蓋關前為陽關後為陰尺中之脉按之搏手不絕者妊身也婦人平居陽氣微盛無害及其妊子則方閉經隧以養胎若陽氣盛搏之則經脉安行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡群隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽

四物湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不致強陰不致弱陰陽調停有益胎氣此前人未嘗論及也

易產滑胎方 其藥性滑利小便

以車前子為末酒調服方寸七不能飲者水調

詩云采采芣苢能令婦人樂有子矣 陸機注云

治婦人產難故也

神寢丸 瘦胎滑利易產臨入月服之極有神効

知蘄州施少卿方蘄州徐太丞傳

通明乳香 別研半兩

枳殼 壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大空心溫酒吞下參拾丸懷孕九月已後方可服 崔氏方名寤生丸乳香只貳錢半酒糊丸

榆白皮散 治妊娠滑胎易生

榆白皮 甘草 各貳兩 葵子 壹兩

右為粗末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓溫服一方無榆皮名葵子散

主孕九个月將產消息

豬肚 壹具 如法用葱五味煮熟食如不盡

胎前 逐月養胎 卷之十四

更食以盡為度不得與別人食無効

保氣飲 安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜

偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散見胎產大

神寢丸枳殼散並見此三方入月內大宜常服

香附子肆兩 山藥貳兩 縮砂仁壹兩

粉草壹兩貳錢半 益智仁 紫蘇葉各半兩

木香肆錢

右為細末以白湯點服貳錢

無憂散 治妊婦身居富貴口厭肥甘憂喜不常食

物不節既飽便卧致令胞胎肥厚根蒂堅牢行動

動之本合作

難因致臨產難生入月可服無憂散則易生矣

當歸 川芎 白芍藥

枳殼 乳香各叁錢 木香

甘草 血餘即髮灰以續緒心

右為末每服貳錢水煎日進兩服

丹溪云世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴

養之家若貧賤辛苦者未有也古方書止有瘦胎

飲一論而其方為湖陽公主作也實非極至之言何

者見其有用此方者其難自若予表妹若干難產後

遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形惟勤於針指

胎前逐月養胎

女科

構思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養
之人其氣必實耗其氣使平和故易產今形肥知其
氣虛又坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎因母氣不
能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣令其有孕
至五六個月來告遂下大全方紫蘇飲加補氣藥與
數十貼因得男而其快後遂以此方隨母形色性稟
參時令加減與之無不應者因名其方曰達生散
縮胎飲即達生散

大腹皮 叁錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉 各伍分

白芍

白朮

歸身尾 各壹錢

甘草 貳錢

黃楊樹腦 柒個

或加枳殼

縮砂

青蔥 伍葉

右作一貼吞下益母丸臨月得貳拾服易生產後

無病按丹溪云難產死胎此血氣滯病也蓋此

方補中行滯春加川芎氣虛倍參朮氣實

倍香附陳皮血虛加當歸地黃形實倍紫蘇

性急加黃連熱急加黃芩濕痰加滑石半

夏食積加山查食後易饑加黃楊腦腹痛

加木香官桂黃芩冬不用芩

黑神丸 一名催牛丸一名益母丸

用益母草研末粥丸治婦人

胎前產後月養胎

於藏藏氣不宣通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脉
不通經絡不澁則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如
此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水
消除使欲食也既得食力體強氣壯力足養胎母便
健矣 大全妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如
故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食
氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水恍
忽不能支持巢氏謂之惡阻但證有輕重耳輕者不
服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓
湯茯苓丸專治阻病然此一藥比來少有服者以半

夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此不可不謹也
張仲景傷寒論有用黃龍湯者小柴胡湯中去半夏
是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散局方
則人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊士明則有
醒脾飲皆不用半夏用之多効 李茂翁云若左脉
弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈經云
無陰則嘔是也 薛前證若中脘停痰用二陳湯加
枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用
異功散若胃氣不足用人參橘皮湯無氣惱加枳殼
胸脇痞悶再加蘇梗胸痛再加柴胡若飲食少思用
治河惡阻

六君子加紫蘇枳殼頭暈體倦用六君子湯若脾胃
虛弱嘔吐不食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾胃化
痰滯之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食
少思胎不安必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白
朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予嘗用之驗
矣 痰逆不食證因食停滯用半夏茯苓湯加枳殼
兼氣惱更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓湯加白朮
因風寒外傷用參蘇飲飲食腹脹用香砂六君子湯
寒熱嘔吐人參養胃湯 一妊婦嘔吐惡食體倦嗜
酢此胃氣虛而惡阻也用人參橘皮湯一劑漸愈又

用六君子加紫蘇二劑而安 一妊娠吞酸惡心時欲
作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君子加枳殼香附
治之而愈 一妊婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食
余以為飲食停滯兼肝木傷脾土用六君子湯以健
脾胃加蒼朮厚朴以消飲食吳茱萸所製黃連以清
肝火諸證悉愈又以六君子加砂仁調理而脾土乃安
一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺
而尅脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安 一妊
婦嘔吐酸水胸滿不食此脾土虛而肝木所侮用六
君子加芍藥而愈 一妊婦胸腹膨脹吐痰不食此

胎前惡阻

女科十四

卷三

脾胃虛而飲食為痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因恚怒腸脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈汪石山治一婦形質瘦小面色近紫產後年餘經水不通首夏忽病嘔吐手指麻痺不能伸展聲音啞小歲不出聲醫皆視為風病危之汪診脉皆細微近滑曰此妊娠惡阻病也眾謂經水不通安有妊娠汪曰天下之事有常有變此乃事之變也脉雖細微似近于滑又尺按不絕乃妊娠也遂以四君子加二陳治之諸證俱減尚畏粥湯惟食乾糕香燥之物而有生

意 給事游讓溪夫人病新愈月餘經事不行嘔噦眩暈飲食艱進醫以為二陽之病發心脾女子不月法在不治江瓘診之尺脉雖小按之滑而不絕此妊而惡阻非凶候也六君加砂仁數服而安後產一女金匱婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之婁全善曰絕之者謂絕止醫治候其自安也予嘗治一二婦阻病吐愈治愈逆因思仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也

台前 惡阻

六十四

萬全方云凡妊娠惡食者以所惡食任意食之必愈
仲景云妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之
乾薑人參半夏丸

乾薑

人參 各壹兩

半夏 湯洗去滑貳兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服拾
丸日三服

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡
聞食氣好食酸鹹多卧少起百節煩疼羸瘦有痰
胎孕不安

半夏 洗壹兩貳錢半

赤茯苓

熟地黄 各柒錢半

橘紅

旋復花 千金方無旋復有細辛紫蘇

人參

芍藥

川芎

桔梗

甘草 各半兩

右咬咀每服伍錢薑柒片水煎空心服兼服茯苓
丸 若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知
母柒錢半 若腹冷下痢去地黃加炒桂心半兩
若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃柒錢半
去地黃加黃芩貳錢伍分

茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半

夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

半夏

橘皮

白朮

葛根

甘草

枳殼 各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸米飲下

日三服一方加麥門冬 肘後加五味子

療妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓

前胡

白朮

紫蘇葉 各壹兩

半夏

麥門冬

人參

大腹皮

各半兩

右為粗末每服四錢水壹盞薑五片煎至柒分去

滓溫服一方無腹皮人參有大腹子檳榔

療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲水心神虛煩四肢少

力

枇杷葉

半夏

麥門冬

人參

甘草

訶子肉

藿香 各壹兩

赤茯苓

枳殼

陳皮 各柒錢半

右咬咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒

分去滓溫服一方無訶子及棗

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮

生薑

茯苓

半夏

各肆兩

右細切以水陸升煮取貳升半去滓分三服不差
頻服忌羊肉鰾鮓等物

旋復半夏湯

治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

臥少起

旋復花

去枝

川芎

細辛

去土

人參

甘草

炙各

當歸

去蘆

半夏

湯泡

赤茯苓

去皮

乾生薑

陳皮

去白各壹錢五分

右作一服水貳鍾薑五片煎至壹鍾不拘時服

旋復花湯

治妊娠六七月胎不安嘔吐

旋復花

伍分

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓

各壹錢五分

半夏

芍藥

生薑

各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食前服

右諸方並用半夏蓋取其辛以散結氣瀉逆氣故

嘔惡自止非專為痰設也婁全善曰大論半

夏動胎而不用仲景方乃用之予治妊娠阻病累

丁香
散

用半夏末治惡阻吐清水甚者害十餘日水漿不入也經云有故無殞是也

白朮散 治惡阻吐清水甚者害十餘日水漿不入

白朮 壹兩 人參 半兩 丁香 貳錢

甘草 壹錢

右為細末每服貳錢水壹盞薑伍片煎至柒分温服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及

心腹刺痛

人參 丁香 藿香葉 各貳錢半

右為散每服叁錢水壹盞煎柒分去滓温服無時

又方

人參 丁香 柿蒂 各貳兩

甘州 良薑 各半兩

右為細末每服貳錢熱湯點下無時

醒脾飲子 治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中

無味或作寒熱此出王氏博濟方

草豆蔻 以濕紙裹夾火中煨 厚朴 薑製各壹兩

乾薑 壹兩 甘州 壹兩貳錢半

右為細末每服貳大錢水壹大盞棗貳枚生薑叁

片煎至捌分去滓呷服病輕者只一兩服便能食

胎前 惡阻

女科 四

五八

舊有橘紅貳兩治寒熱瘧痢不食後人去橘皮以
乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲
有奇効產科醫官齊士明依舊用乾薑去橘皮亦
名醒脾飲子治阻病極神驗
右諸方與前茯苓丸並用丁香乾薑惟中寒麻遲
者宜之

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水

人參 橘皮 白朮

麥門冬 去心各壹兩 甘草 叁錢 厚朴 製

白茯苓 各伍錢

爲粗末每肆錢加淡竹茹彈子大薑叁片水同煎
治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根 柒分 橘紅 肆分 生薑 陸分

檳榔 貳分 枇杷葉 叁分

右切水貳盞煎柒分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬 各叁兩 前胡 貳兩

橘皮 壹兩 蘆根 壹握 如體熱四肢煩熱者加地骨皮壹握

右切細以水壹大升煮半升去香分兩服食前

右諸方內用門冬竹茹蘆根者氣涼而性和有熱

無寒者通用之平劑也

治妊娠惡食古今錄驗方

人參兩

厚朴

生薑

枳殼

甘草各兩

水陸升煮取參升分三服

諸藥無効者用此藥理血歸原則愈

人參

甘草

川芎

當歸

芍藥

丁香各半兩

白茯苓

白朮

陳皮各壹兩

桔梗炒

枳殼去瓢炒各壹兩半夏湯洗柒次切

右咬咀每服參錢生薑伍片棗壹枚水同煎

安胎飲 治懷胎三月四月至九个月日嘔吐痰水

心中憤悶頭重目眩惡聞食氣或胎動不安腰腹

疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

甘草

茯苓

當歸

熟地黃

川芎

白朮

黃芪

白芍藥

半夏湯泡柒次切炒

阿膠切粉炒

地榆各等分

右咬咀每服參錢生薑肆片水煎溫服無時候

一方無半夏地榆有人參桑寄生 一方無芪朮

半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓
小地黃丸 治妊娠惡心嘔吐清水腹疼不食

人參 去蘆

乾薑 炮各等分

右為細末以生地黃汁和為丸如桐子大每服五

分七合前次下

右方並理血之劑李茂翁所謂左脉弱而嘔服諸藥不正者服理血歸原藥則愈即此類是也

氣 保生湯

治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食

臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切

勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香

生薑煎服 溫隱居方

人參

甘州 各貳錢半

白朮

香附子

烏藥

橘紅 各半兩

右咬咀每服叁大錢水壹盞半薑伍片煎至柒分去滓溫服無時或作末子調服

白朮散 治妊娠胎氣不和飲食少進

白朮 炒

紫蘇 各壹錢

人參 貳錢

青皮 去白

訶子肉

川芎 各捌分

甘艸 炙半錢

右作一服水或鍾薑叁片煎至壹鍾不拘時服
二香散 治妊娘胎動不安氣不升降飲食不美嘔
吐酸水起坐覺重

香附子 壹兩 藿香葉

甘艸 各叁錢

右為細末每服貳錢不拘時沸湯調下

補遺子嘗治妊婦惡阻嘔吐不食頭暈不敢行步以
苦柚皮濃煎湯飲數盞而愈吐甚者加薑汁
又方 縮砂仁末每貳錢薑湯調下或米飲調
右方並理氣之劑氣虛者首二方為宜氣不順者

者第三方為宜

有肝火

要一婦人孕二月吐痰水并飲食每日寅卯時作作
時覺少腹有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭
眩卧不起牀四肢疼微渴此肝火挾衝脉之火衝
上也一日甚一日輕脉和右寸洪大百藥不効將
二月子男病偶用沉香磨水化抱龍丸一服膈寬
氣不上衝二三服吐止眩減食進而安 又應氏
婦嘈雜吐食脉壅心下滿塞氣攻背兩肘皆痛要
人不住手以熱物摩慰得吐稍疎脉洪大處此方

黃連 壹錢

黃芩 貳錢半

白朮

月前 女科四

半夏 各貳錢

甘艸 炙

縮砂 各伍分

陳皮

當歸

山梔

枳殼 炒

香附

人參

蒼朮 各壹錢

茯苓 壹錢

生薑 柒片

服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛

用摩髮遂與抱龍丸化服其疾如失

丹一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不

可禁持以人參白朮川芎陳皮茯苓等藥服五七日

愈覺沉重召予脉之兩手弦左為甚而且弱予曰此

是惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎

氣參朮之補大非所宜教以時用茯苓湯下抑青丸

二十四粒五貼自覺稍安診其脉略有數狀自言口

乾苦稍食粥則口酸予意其為膈間滯氣未盡行教

全以川芎陳皮山梔伏苓生薑煎湯下抑青丸十五

粒十餘貼餘證皆平但食及常時之半食後覺口酸

不食覺易飽予謂肝熱味平則以白湯下抑青丸二

十粒二十日而安予又脉之見其兩手脉雖和平而

左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂

用始初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一

月胎自墮却得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是

胎前惡阻

卷之四

七

常服固胎

怒傷肝脾者四七湯加芎藭怒動肝火者加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之

地黃

川芎

黃芩各五分

歸身尾

人參

白芍藥

陳皮各壹錢

白朮壹錢半

甘草叁錢

黃蘗少許

桑上羊食藤圓者米葉糯米拾肆粒

右咬咀水煎服

金匱婦人妊娠宜常服當歸散主之

當歸散方

當歸

黃芩

芍藥

芎藭各肆兩

白朮半斤

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服

即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮散方

白朮

芎藭各壹兩

蜀椒米錢半去汗

牡蠣半兩

右四味杵為散酒服壹錢七日三服夜一服但苦

痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩痛吐不能飲

胎前胎動不安

女科十四

三五

或動
或痛
之若安

食加細辛壹兩半夏大者貳拾枚服之後更以醋
漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁
飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置
集驗方療妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛
已有所見方

艾葉

阿膠

當歸

川芎各叁兩

甘艸壹兩

右細切以水捌升煮取叁升去滓內膠令烊分三
服日三各千金文仲備急同

四物湯加熟艾阿膠茯苓治一切胎動不安

步胎當歸湯 治妊娠五月舉動驚愕胎動不安下

在小腹痛引腰脇小便疼下血見前逐月養胎

阿膠散 治妊娠或因頓仆胎動不安腰痛腹滿或

有所下或胎上搶心

熟地黃貳兩

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠

黃芪各壹兩

一方有川芎

右咬咀每服半兩薑叁片棗壹枚水同煎

又方 治妊娠胎動不安心神虛煩腹內痛

阿膠杵碎炒

人參

川芎已上各壹兩

胎動不安

白茯苓

麥門冬 去心

柴胡 去苗已上

甘草 炙

當歸 剉炒

黃芩 各半兩

右件為末每服肆錢以水壹中盞生薑半分棗叁

枚同煎陸分去滓熱服

立効散 治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎

當歸 各等分

右為麤末秤叁錢水煎食前溫服

產寶治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶

當歸

桑寄生 各壹兩 川芎 半 柴錢

鼓 剉合

阿膠 伍錢

蔥 拾肆莖

右以水貳升煮取捌合下膠烱溫分貳服空心服

一方無鼓用銀器煎集驗無寄生鼓有續斷柴錢

半銀多少先煎後入藥

養生必用治胎動方 救急療胎動去血腰痛

阿膠

川芎

當歸

青竹茹 各貳錢

右以水拾盞內銀壹斤煮至伍錢去銀入上件藥

三味煮至貳錢半去滓入膠再煎膠烱分溫三服

空心自早至暮盡未効再作

寄生湯 治胎氣常不安及五箇月已後胎不安

胎前胎動不安

女科

三三

桑寄生

洗到

秦艽

阿膠

各半兩

糯米粉

半兩

右以新汲水參升先下寄生秦艽貳味煮至貳升去滓次入阿膠糯米再煮約壹升止分三服空心食前日午服之忌酒醋三五日妊婦胎氣至五月已後常不安者服之必效頃見妊婦好飲酒食鹹酸五辛胎必動不可不知

黃耆湯

治胎動不安腹痛下黃汁

糯米

壹合

黃耆

川芎

各壹兩

右細剉水貳大盞煎至壹盞參分溫服

順氣飲子

產前服之安胎

紫蘇葉

木香

人參

草豆蔻

茯苓

甘草

大腹子

壹兩如氣弱者不用

右咬咀每服參錢水壹盞葶根參寸糯米少許煎至米分去滓溫服

安胎寄生湯仲療血流下方

桑寄生

白朮

各壹兩貳錢半

茯苓

壹兩

甘草

貳兩半

右切以水伍升煮取貳升半分三服若人壯者可

合前

加芍藥貳兩足水貳升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑壹兩即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等

秦芫湯指治胎動不安

秦芫 阿膠炒 艾葉

右等分爲麤末每服伍錢水貳盞糯米百粒煎至壹盞去滓溫服

小品止痛湯 療妊娠重下痛引腰背安胎

當歸 阿膠炙 乾地黃 黃連 芍藥各壹兩 雞子壹枚

秫米壹升

右柒味以水柒升攪雞子令相得煮秫米令如蟹且沸去滓內諸藥煮取參升分四服忌蕪荑經心錄同

黃芩湯 治婦人胎孕不安

黃芩 白朮各半 當歸貳錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

釣藤湯 治妊娠八九月胎動不安心腹疼痛面目青冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮宜急治之

胎前胎動不安

釣藤鈎

當歸

茯神

人參 各壹兩

苦梗 壹兩半

桑寄生 半兩

右為粗末每服伍大錢水貳盞煎至壹盞去滓溫服無時候忌豬肉菘菜若煩熱加石膏貳兩半臨產月加桂心壹兩

剛繁療婦人懷妊胎動不安葱豉安胎方

香豉 壹升熬

蔥白 壹升

阿膠 貳兩炙

先以水參升煮葱豉取壹升去滓入膠再煎令烱服一日一夜可服三四劑經心錄同

始妊娠胎動不安護胎法

鯉魚 貳斤

粳米 壹升

葱 壹握

豉

薑

右作臠食之每月一度

安胎織單散

白藥子 壹兩

白芷 半兩

右為細末每服貳錢前紫蘇湯調下或胎熱心煩

悶入砂糖少許煎

銀苧酒 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方

苧根 貳兩剉

銀 伍兩

清酒 壹瓊

右以水貳大瓊煎至壹大瓊去滓分溫二服

胎前胎動不安

女科

七

治胎動不安

用好銀煮取水著葱油作羹食之佳

又方 川芎壹兩 葱白壹升 右以米柒升煮取貳升

半分温三服

療妊娠後不轉動方

阿膠炙壹兩 桑寄生半兩

右為末以酒壹升煮五沸下生雞卵壹枚酒中分

温貳服空心食前小品方無寄生有艾葉只用水煎

肘後治胎動不安取芋根如足大指者壹尺以咀以

水伍升煮取貳升去滓服一方有生薑伍片丹溪云芋根大能補陰而行

血滯

縮砂散 治胎動不安墮在須臾者神效方見毒物傷胎

又方 川芎貳兩 葱白伍兩 水叁碗煮貳碗半分三服

治妊娠因失所動困絕方取竹瀝飲壹升立愈

鯉魚臛方 治妊娠胎動不安心腹刺痛

鯉魚壹斤修事 阿膠壹兩并碎 糯米貳合

右伴以米貳升入魚膠米煮令熟入葱白生薑橘

皮鹽少許更煮伍米沸食前喫如有所傷且喫五

七日効

治妊娠胎動煩悶不安甚方

治前胎動不安

八十一

胎前 胎前不安 胎前不安其法

十日按

支鹽少清更煮田米粥食前更收其法且與正
古并以此須長人魚鮑米煮冷無人慈白生薑

鯧魚鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚

鯧魚鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚 鯧魚

自致因夫也因夫也 因夫也 因夫也 因夫也 因夫也 因夫也 因夫也 因夫也 因夫也 因夫也

小芒小芒 小芒 小芒 小芒 小芒 小芒 小芒 小芒 小芒 小芒

欲卻連不安欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安 欲卻連不安

胎上逼心 即子懸

薛胎上逼心之證若氣逆胎上用紫蘇飲飲食不甘

兼以四君子若內熱晡熱兼以逍遙散若胃火所致

用四君黃芩枳殼柴梔若脾鬱所致用歸脾湯加柴

梔枳殼一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪

乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈但體

倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳殼調和肝氣

乃瘥一妊婦胎上逼胸滿噎氣飲食少思此脾氣

鬱滯用紫蘇飲頓安又用四君子加枳殼柴胡山梔

而瘥程文彬治孕婦七個月胸膈飽悶氣喘忽吐

胎前胎上逼心 六十四

出一物如小腸寸許舉家驚疑其胎爛程至診得寸口脉洪滑知其氣盛血少胎氣湊上中焦畜有濕熱濕生痰知所吐之物乃痰結聚病名子懸以紫蘇飲加芩連貝母十劑獲痊

本事方紫蘇飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下方

無名七寶散

紫蘇莖葉 壹兩

大腹皮

人參

川芎

陳皮

白芍藥 各半兩

當歸 柒錢半

甘草 貳錢半

一右細剉分作三服每服用水壹盞半生薑蒜片葱

一白柒寸煎至柒分去渣空心服

曾有一婦累日產不下服遍催生藥不驗予曰此

必坐草太早心懷一點懼氣結而不行然非不順

也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上焦閉

閉則氣還還則下焦脹氣乃不行矣得此藥二服

便產及婦人六七月子懸者予用此數數有驗不

一平服胎便近下 陳良甫治一婦有孕七個月遠

歸忽然胎上衝心而痛坐卧不安兩醫治之無效

遂說胎已死矣用草麻子研爛加麝香調貼臍中

以下之命在垂危召陳診視兩尺脉絕他脉平和
陳問二醫作何證治之答曰死胎也陳曰何以知
之曰兩尺脉沉絕以此知之陳曰此說出何經二
醫無答陳曰此子懸也若是胎死却有辨處而赤
舌青子死母活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱
青母子俱死今面不赤口不青其子未死是胎上
逼心宜以紫蘇飲子治之至十服而胎近下矣
當歸湯 治妊娠胎動盪心悶絕煩躁口乾橫生倒
產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保
安散一方無甘草有川芎厚朴產寶方有川芎

當歸

阿膠炒

甘草各壹兩

人參各壹兩半

連根葱白壹握

右細剉水貳升煎四味至升半去滓下葱并煎減
參合温服一劑分為二三服

大聖散 治妊娠忪悸睡夢多驚心腹脹滿連臍急

痛胎上逼見驚悸

治胎上逼心煩悶方又治妊娠六七月以後胎動困

篤用葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死即安已死
即出未效再服婁全善云此方神妙脉浮滑者宜之本草云葱白通陽氣安胎

秘錄治胎動上逼心痛取艾葉如雞子大以頭醋四

治胎上逼心

女科四

八十四

升煎取二升分温服又治胎上逼心熱痛下血神
麩半斤搗碎和熟水絞取汁三鍾無時温服止
治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮 伍兩

黃芩 貳兩

芍藥 肆兩

右水陸升煮取貳升半分作三服緣胎有采致痛

兼易產

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方 取琴弦急帶
乏立愈

膠艾湯 見血崩

保生丸 大法

妊娠經來 漏胎下血

脈經婦人經月下但為微少師脈之反言有軀其後
審然其脈何類何以別之師曰寸口脈陰陽俱平榮
衛調和按之滑浮之則輕陽明少陰各如經法身反
灑淅不欲食飲頭痛心亂嘔噦欲吐呼則微數吸則
不驚陽多氣溢陰滑氣盛滑則多實六經養成所以
月見陰見陽精汁凝胞散散者損墮設復陽盛雙妊
二胎今陽不足故令激經也滑脈主血有餘今 大
抵妊娠經來不多而飲食精神如故六脈和緩滑大
無病者血盛有餘也兒大能飲自不來矣

胎前經來 漏胎 八十五

月信
大全夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此
由衝任脉虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝
任之脉爲經絡之海起於胞内手太陽小腸脉也手
少陰心脉也是二經爲表裏上爲乳汁下爲月水有
娠之人經水所以斷者壅之養胎蓄之以爲乳汁也
衝任氣虛則胞内泄不能制其經血故月水時下亦
名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節
飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子藏爲
風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也 曾有
以娠婦月信不絕而胎不損問產科熊宗古荅曰婦

人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信當矣而胎不
動若據晚進觀之便以爲漏胎若作漏胎治之則胎
必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之言
誠有旨也巢氏云婦人經閉不利別無所苦者是謂
有子以其經血蓄之以養胎擁之爲乳汁也有子之
後畜以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有妊而
月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風
則經血喜動以其風勝則可也既榮經爲風所勝則
所來者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必服
保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃所謂實實

虛虛也其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專
以一藥治風經信可止或不服藥胎亦無恙然而有
胎本不固而因房室不節先漏而後墮者須作漏胎
治之此又不可不審也 丹胎漏因氣虛因血虛因
血熱 薛前證若因風熱用防風黃芩丸若因血熱
用加味道遙散若因血虛用二黃散若因血去太多
用八珍湯未應補中益氣湯若因肝火用柴胡山梔
散若因脾火用加味歸脾湯若因事下血作痛用八
珍湯加阿膠熟艾若因脾胃虛弱用補中益氣湯加
五味子若因脾胃虛陷用前湯倍用升麻柴胡若嘔

熱內熱宜道遙散 妊娠卒然下血若因怒氣用小
柴胡湯若因風熱用一味防風丸若因血熱用一味
子芩丸若因脾氣虛弱用六君子湯若因中氣下陷
用補中益氣若氣血盛而下血者乃因兒小飲少也
不必服藥 一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食
少體倦此脾氣虛而不能攝血余用補中益氣湯而
愈後因怒而寒熱其血仍下此肝火旺而血沸騰用
加味道遙散血止用補中益氣湯而安 一妊婦下
血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而肝火所侮用四
君子加柴胡山梔血止困怒復作用六君子加柴胡山

合行 卷之八 八十七

梔升麻而安 一妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭
痛脇脹腹疼作嘔少食余謂寒熱頭痛乃肝火上衝
脇脹腹痛乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小便
下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓
白朮而愈 一妊娠六月體倦食少勞役下血用六
君加當歸熟地黃柴胡升麻而愈 江應宿治王祠
部安人孕三月腰腹通痛漏下不止氣湧脹悶速江
診視六脉弦數平昔脉極沉細此必怒動肝火挾相
火而生內熱喜脉不滑未至離經猶可保也以條苓
白朮枳殼香附茯苓阿膠白芍當歸陳皮煎調鹿角

補虛

煨酒淬細末一錢更進抑青丸一服痛已數劑平復
仲景云婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕
者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻芎歸膠
艾湯主之方見血崩
大全方治妊娠三四月腹痛時時下血

續斷 貫雨

艾葉

當歸

乾地黄 各陸兩

竹茹

阿膠

雞蘇 各三兩

水壹升煎取陸合空心再服

廣濟安胎胎漏血腹痛

拾前 姓張經云一婦人

八

當歸

川芎

阿膠炙

人參

大棗

右切以水參升酒肆升煮貳升半分三服五日一

劑頻服三四劑無妨

濟生如聖湯 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮

當歸

熟地黃

白芍藥

阿膠

川芎

續斷

甘草

一方有乾薑竹茹

右吹咀每服肆錢水壹盞芎根少許薑伍片煎溫

服濟生有續斷無乾薑竹茹

桑寄生散

治胎漏經血妄行淋瀝不絕

桑寄生

當歸

川芎

川續斷

阿膠

香附子

扶神

白朮

人參

甘草

右作一服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

鄭氏人參散

治漏胎敗血湊心日漸胎乾子母危

困

人參

黃芪

阿膠

竹茹

木香

炙甘草

台行 婦經經來 卷之四

八十七

附子炮各半錢 川芎 陳皮

芎根各錢半 生薑叁錢

右咬咀每肆錢糯米三七粒水煎熱服忌生冷雞

鴨魚麵

梅師治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安

死即下即催生佛手散方見胎產大法川芎當歸

妊娠無故卒下血不止取阿膠參兩炙搗末酒壹升

半煎令消一服愈

羅氏立聖散 治妊娠下血不止

鷄肝叁個用酒壹升煮熟共食之大効

二黃散 治胎漏

生地黃 熟地黃等分 水叁盞煎半乾去滓服

治胎漏下血 阿膠貳兩 搗末生地黃半斤 搗取汁以清

酒參升絞汁分叁服

治胎漏下血不止胎乾即死宜急治之

生地黃汁壹升陳酒伍合

右同煎叁伍沸溫叁服以止為度

地黃湯 治經血妄行及鼻衄不止

生地黃酒搗取汁 薄荷叁錢 甘草壹錢

右二味為末新汲水合地黃汁調食後服

台... 九...

續易簡治漏血

用野苧根家種亦可金銀各壹兩為一劑酒水平煎耗半温服若閃擲胎動欲漏砂仁皮炒令熟透為末錢酒或鹽湯下

保命枳殼湯 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼

黃芩各半

白朮壹兩

右為麤末每服米錢水壹盞煎米分食前服

子芩丸 治肝經有熱妄行下血細條黃芩炒為末

每服壹錢以秤錘燒赤燂酒熟調服若脾胃虛不

宜用

防風丸 治肝經有風以致血得風而流散不歸經

用防風為末每服壹錢白湯調服

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血用

條芩炒焦防風等分為末酒糊丸桐子大每服叁

伍拾丸食遠或食前米飲或温酒送下

仲景云婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不

止胎動在臍上者為癥痼害 妊娠六月動者前三

月經水利時胎下血者後斷三月不血也所以血不

止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸方

治前經經

九七

用字

桂枝

茯苓

牡丹

去心

桃仁去皮尖熟

共藥各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服壹丸不知加至叁丸

治胎下血不止取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服

本草云桃奴破血又治伏梁積氣

榆白皮散治妊孕胎漏去血恐其難產常宜服之

榆白皮

葵根

瞿麥

各貳錢

大麻仁去殼

木通各壹錢

牛膝

去蘆酒浸貳錢半

右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

胎漏黃汁下或如豆汁

薛前證肝脾濕熱用升陽除濕湯崩血肝脾風熱用加

味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢

氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用

防風黃芩丸風入腸胃用胃風湯一妊婦因怒胸

膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食

愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面

色黃中隱白余曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補

中益氣湯升補胃氣夕以六君子培補脾氣而愈

大全方治妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹

胎前諸病黃汁

女科四

七三

痛

粳米伍合

黃芪陸兩

右以水柒升煎取貳升分為四服

銀芎酒

見前胎動不安

又方用生艾汁貳瓊阿膠白蜜各壹兩煎至柒分溫服

如無生艾煎乾艾濃汁亦可一方加竹茹一

方用酒不用蜜

脉經云婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也胎漏徐徐下水今暴下而多故知墮胎也

跌撲傷胎毒藥傷胎

大妊娠驚胎者乃懷妊將滿胎神已具墜仆傷胎甚至下血不醒若欲驗其子母安否當參第四論治之

薛愚按前證若因怒跌仆或手足抽搐用釣藤湯

前若因氣滯用紫蘇飲胎上若因脾胃氣虛用六君

子加蘇梗若鬱結傷脾用歸脾湯若鬱怒傷肝脾用

四七湯氣滯加芎歸若去血過多用佛手散如不應

膠艾湯氣血虛八珍湯加膠艾

催生神妙佛手散治婦人妊娠五七月因事築磕

着胎或子死腹中惡露下疼痛不止口噤欲絕用

傷者 跌撲 養新 豕汚

胎前傷胎

女科四

九十三

此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立使
逐下本出徐文仲神驗胎動方云治血上衝心腹
滿悶者如湯沃雪又治產前產後體熱敗血腹痛
又名芎藭湯

當歸 陸兩

川芎 肆兩〇張

右為粗末每服參錢水壹大盞煎令泣泣欲乾投
酒壹大盞止煎壹沸去滓溫服口噤灌之如人行
五里再服不過三五服便生一方云此藥治傷胎
去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏
暈欲倒者以水煎服或先以漏血腹內疼痛加芎

藥官桂減半隨手効餘詳胎產大法

治妊娠忽因倒地或擊重作勞從損腹中疼痛腫重
及子死腹中不出三服立下

川芎 壹兩

右為細末以熱酒調服方寸匕日三四服

按川芎上竄散氣有服之暴亡者若診其脉舉之
一有按之無者忌服

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黃

益母草 各壹兩

當歸

黃芪 各半兩

右艾咀每服肆錢水壹盞薑肆片煎至陸分去滓

無時候

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失跌胎動不

安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短

氣下血不止方

乾地黄

當歸

艾葉

阿膠

川芎

右以水柴升煮取貳升半分作三服腹痛甚加杜

仲五加皮

各參兩

一方無地黄有甘草

一方無

地黄却用生薑自然汁壹匙地黄汁半合馬通半

合煎成藥去滓入此再煎三沸溫服 一方有人

參白茯苓水煎

丹婦人因閃挫傷胎肚疼血崩

歸尾

陳皮

白木

人參

茯苓

白芍藥

川芎

各參錢

甘草

炙伍分

右咬咀分四貼水參盞煎取壹盞下縮砂末壹錢

伍分炒黑五靈脂壹錢

竹茹酒 治妊娠誤有失墜損血胎損疼痛

青竹茹

貳合

好酒

壹升

右煮三五沸分作三服即安

秦芫湯 療妊娠或因僵仆胎動不安臍腹疔痛見

胎動不安

治妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍煎治崩血

又煎治子胃又名子痢

縮砂多不以和皮炒令黑色一方用仁熨斗內略

炒為細末熱酒調下貳錢不飲酒者以米飲調下

皆可覺腹中熱則胎已安矣此方神效予常用之

有驗

補遺安胎散 治卒然腰痛下血不已

熟地黄

艾葉

白芍藥

川芎

黃芪

阿膠炒

當歸

甘草

地榆各等分

右咬咀每肆錢薑伍片棗壹枚煎溫服

薛若因毒藥用甘草黑豆淡竹葉若因頓仆用阿膠

散末應煎送知母丸若因頓仆下血腹痛用佛手散

末應用八珍送知母丸血出過多用八珍湯斤許益

母草四兩水煎徐徐與服若胎死以朴硝或平胃散

下之

捷徑方 治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急

毒藥傷者解毒和中

口不能言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外證
與中風相似但其脈浮而軟十死一生醫多不識
若作中風治之必死無疑用白扁豆貳兩生去皮
為末新汲水調下即効

阿膠散 治妊婦不問月數深淺或因頓仆或因毒

藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短

氣乏力 方見前胎動不安

妊婦誤服諸藥毒致胎動不安治之方

甘草 黑豆 淡竹葉 等分 濃煎汁飲之

奪命丸 治婦人小產下血至多子死腹中其人憎

寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心則悶

絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服艸

藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死

服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此方

的係異人傳授至妙 此自仲景黃芩桂枝丸但用

丹皮茯苓桂枝桃仁赤芍藥等分是也丹溪亦稱妙

痛胎動不食面色青黃肝脉弦緊脾脉弦長此肝木
乘土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈
火龍散 治妊娠心氣疼

川棟子

茴香炒各
參錢

艾葉末鹽炒壹
錢半

右作一服水貳鍾煎至壹鍾不利時服

產寶治妊娠卒心痛氣欲絕方

川芎

當歸

茯苓

厚朴製各壹分

右水陸升煎取貳升分二服

白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者出古今
錄驗

白朮參兩

赤芍藥貳兩

黃芩壹兩半

右切以水陸升煮取貳升半分參服半日令盡微

下水令易生忌桃李雀肉等

千金療妊娠心痛

青竹茹壹升

羊脂捌兩

白蜜參兩

右三味合煎每服棗核大參枚食前頓服日三服

又方 青竹茹壹升酒貳升煮取壹升半去滓分温

頓服

又方 破雞子壹枚酒調服之

又方 大麻子叁升研水捌升煮取伍升分五服

胎前 心驚

女科 四

九

又方 橘皮 參兩 豆豉 伍兩 為細末煉蜜為丸如桐

子大溫水下貳柒丸無時候 四方並出外臺祕要

補遺沉香降氣湯 茯苓補心湯 四七湯 紫蘇

飲皆可用

雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡

清心口壹升 參兩 茯苓 參兩

千金煮菘菜心煎

正木令息坐息牀李蜜肉著

古以以木對代煮瓊瀆長半合參瓊半日令盡燼

白木 參兩 赤芒藥 參兩 黃芩 壹兩半

心腹痛

天夫妊娠心腹痛者或由宿有冷痰或新觸風寒皆

由臆虛而致發動也邪正相擊而并於氣隨氣上下

上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也

妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者其痛

衝擊胞絡必致動胎甚則傷墮也又云妊娠心腹疼

痛多是風寒溫冷痰飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷

不已則致胎動也 薛前證若風寒痰飲用金沸草

散 雜病 胎氣鬱結加香附川芎若飲食停滯用六君

加紫蘇枳殼若怒動肝火前藥更加柴胡山梔若鬱

胎前 心腹痛

女科四

一

結傷脾用歸脾湯健忘加枳殼山梔一妊婦心腹

作痛吐痰惡心胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而

為痰用六君子加柴胡枳殼諸證漸退飲食漸進又

用四君子加枳殼山梔桔梗而安後因怒兩脇氣脹

中脫作痛惡寒嘔吐用六君加柴胡升麻木香一劑

而愈

當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產

後血暈目虛氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生

癰癢消痰養腎明目益津

白芍藥半斤 當歸 茯苓

白朮各肆兩 澤瀉 川芎各貳兩

右為細末每服貳錢食前温酒調服元和紀用

經名為六氣經緯丸云能祛風補勞養真陽退邪

熱緩中安和神志潤澤容色散寒邪温瘴時氣安

期先生賜李少君久餌之藥後仲景增減為婦人

懷妊腹痛方本方用芍藥肆兩澤瀉茯苓川芎各

壹兩當歸白朮各貳兩亦可以蜜丸服出三因方

阿膠散 治妊娠胎動腹中疔痛不思飲食

甘草貳錢半 白茯苓 白朮

川芎 阿膠各柒錢半 當歸炒

陳皮 各壹兩

右咬咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒分服

療妊娠患腹痛并胎動不安

蔥白 切壹升 人參 厚朴

阿膠 川芎 各貳兩 當歸 叁兩

右咬咀以水柒升煎取叁升分三服 一方有甘

草無厚朴川芎

療妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀等歸湯

川芎 人參 茯苓

吳茱萸 苦梗 當歸 各叁

厚朴 製 芍藥 各貳兩

右咬咀以水玖升煎取叁升分三服氣下即安

草豆蔻散 治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和

全不入食

草果仁 想是草 陳橘皮 乾地黄

白朮 各壹兩 川芎 柒錢半 當歸 炒

桂心 乾薑 木香 各半兩

右為細末每服肆錢水壹盞棗貳枚煎陸分熱服

古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白壹升

當歸切肆兩

右以水伍升煮取貳升作三服亦將小便服將去
一炊頃去

千金療妊娠腹中痛方 生地黄貳斤取汁酒壹升

合煎減半頓服愈

治妊娠胎動欲落腹中痛不可忍

上等銀壹斤

茅根貳斤去黑皮

以水玖升煮銀取

伍升入清酒壹升同煎茅根取叁升分三服立安

治妊娠四五月忽心腹絞痛

大紅棗拾肆枚

燒存性為末童子小便調下

治妊娠心腹痛不可忍方

鹽壹斤燒令赤以兩指取一撮酒調服

香茂散 治妊娠五个月已後常胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食

失節之所致也 蔡元度寵人有子夫人怒欲逐

之遂病醫官王師復處此方三服而愈

廣中莪茂壹兩

丁香半兩

粉草貳錢半

右為細末空心鹽湯點服壹大錢覺胸中如物按

下之狀愈

補遺手拈散

四七湯加歸芍

四磨湯

小烏沉

湯 安胎飲除地榆 已上諸方皆可選用

白熟地末空心鹽湯煎服壹大匙

黃中藥效壹兩 下香 佛草 有幾半

大補丸 補血也 蔡小製諸人自下失人效

香芬類 試效正今日口發常與間深陳識

試效心製能小口也

試效心製能小口也

試效心製能小口也

試效心製能小口也

腹痛

仲婦人畏胎腹中諸疾痛當歸芍藥散主之

潔地黃當歸湯 治婦人有孕胎痛

當歸 壹兩 熟地黃 貳兩

右為末作一服水參升煎至壹升半去滓頓服

仲婦人腹中痛小建中湯主之

雲芎歸湯 治妊娠先患冷氣忽心腹痛如刀刺

丹孫院君因近喪冒惡氣傷胎肚痛手不可近發熱

口中不思食須安胎散滯氣

台前 女 百四

青皮

黃芩

芍藥

歸尾

川芎

木香

甘草

分二貼水參益先煮苧根兩大片至貳盞去苧根入前藥同煎至壹盞熱服

診

治妊娠腹痛用生地黃參斤搗取汁酒壹升合煎減半頓服愈

脈師曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則男如肘頸參差起者女也冷在何處冷者為死溫者為生

小腹痛

大姪娠小腹痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也 薛前證若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安胎飲加升麻白木不應兼補中益氣湯 一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸證頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

胎前小腹痛

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

川芎 各捌分

阿膠 炙

人參

艾葉 各肆分

天棗 貳拾分

茯苓 拾分

右細切以水肆升煮取貳升溫分三服

補遺 治妊婦小腹痛胎動不安

川芎為細末酒調下

又方 川芎 當歸 各等 水煎溫服

天麻 小豆 黃芩 芍藥 各等 水煎溫服

小豆 黃芩 芍藥

腰腹及背痛

大腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰

痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛

不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則

胎墮也 薛前證若外邪所傷用獨活寄生湯 雜病

勞傷元氣用八珍杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥

加白朮補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝

火所動用小柴胡湯 傷寒少 加白朮枳殼山梔肝脾

鬱結用歸脾湯 雜病 加柴胡枳殼 一妊婦頸項強

直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔萃羌活湯 雜

胎前 腰腹背痛 女科 四

痛一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固
本而痊石山治婦懷妊八月嘗病腰痛不能轉
側大便燥結醫用人參等補劑痛益加用硝黃通利
之藥燥結雖行而痛如故汪診之脈稱洪近駛曰血
熱血滯也宜用四物加木香乳沒黃蘗火麻仁煎服
四五貼痛稍減燥結潤復加發熱面赤或時惡寒仍
用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除
又背心覺寒腰痛復作汪曰血已利矣可於前方加
人參壹錢服之而安江篁南治一婦妊娠二個月
因閃挫傷胎腰痛小腹疼下血內有熱用當歸白木

黃芩上熟地川芎防風砂仁中艾葉上香附下用水
煎服血止小腹不痛去砂仁又用雞子黃叁個以酒
攪化煮熟食之即痊

陽不

通氣散

治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效

破故紙不以少瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉壹个空
心溫酒下叁錢

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或連帶痛先服此散

杜仲葶兩

五加皮

阿膠炙

防風

金毛狗脊

川芎

白芍藥

細辛

草薺各壹兩

治行腰痛背痛

六十四

百七

男前 女科四 百

杏仁搗碎去尖皮炒一方有白茯苓無白芍

右咬咀以水九升煮取貳升去滓下膠作三服

五加皮丸 治證同前服前散後

續斷炒 杜仲各貳兩半 芎藭

獨活各叁兩 五加皮 狗脊

草薺 芍藥 訶子肉各肆兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大空心酒下肆拾丸

日三

療觸動胎以致腰痛背痛

杜仲 五加皮 當歸

芍藥 芎藭 草薺各等分

右細剉以水柒升煮取壹升半分溫三服

丹仁六嫂有胎腰痛

白朮肆錢 陳皮叁錢 黃蘗炒貳錢半

人參 條芩 川芎

地黃 當歸尾各半兩 甘草炙壹錢

右分四貼水酒煎服

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸叁兩 阿膠 甘草各貳兩

葱白壹升

合前 腹脹背痛 女科四 百八

胎前 婦科四

右細剉以水柴升者取參升去滓分温三服

大地黃丸 治產前後腰腹疼一切血疼兼治血氣

虛四肢不舉骨髓熱疼

熟地黃 烏梅肉 當歸 各壹兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸空心白湯

嚼下

表 紫酒 治妊娠腰痛如折

大黑豆 貳合 炒令香熟以酒壹大盞煮取柒分去

豆空心頓服

汗血 本治胎動腰痛搶心或下血取蔥白不拘多少濃煮

汁飲之

汗血 療妊娠腰背痛反覆不得

鹿角 長六寸燒令赤酒中淬取所淬酒飲之

左鹿角為末酒服亦可

止血 卒腰痛不安或腰痛胎轉搶心下血不止用菖蒲汁

酒壹升服之

妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不

正艾葉壹把如鷄子大以酒肆升煮取貳升分為

貳服良

小品苧根湯 療損動胎腰腹痛去血胎動向下方

胎前 腰腹背痛

女科四

百九

			漢書門
		二九	
		二七	
		一	
一〇九	二		
冊架函號類			

庫文閣内			
			漢書
		二九	
		二七	
		一	
一〇九	二		
冊架函號類			