

孫真人千金方卷之八十六

隱四

孫真人備急千金要方卷之八十六 隱四

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

平脉方

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

扁鵲曰夫相死脉之氣如羣鳥之聚一馬之

馭系水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏

筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可

知也

脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死 屋漏者其來既

絕而止時時復起而不相連屬也雀又經言 啄者脉來其數而疾絕上復頻來也

得病七八日脉如屋漏雀啄者死脉彈人手如黍米也

脉來如彈石去如解索者死彈石者辟辟急也解索者動數

而隨散亂無復次緒也脉困病人脉如蝦之游如魚之

翔者死蝦游者蕻蕻而起尋復退沒不知所

也魚翔者似魚不行而但拌尾動頭身搖而久住者是也脉如懸薄卷索

隱四

者死脉如轉豆者死脉如偃刀者死脉涌涌

不去者死脉忽去忽來暫止復來者死脉中

侈者死脉分絕者死上下分散也脉有表無裏者

死經名曰結去即死何謂結脉在指下如麻

子動搖屬腎名曰結去死近也

脉五來不復增減者死經名曰代何謂代脉
五來一止也脉七來是人一息半時不復增
減亦名曰代正死不疑經言病或有死或有
不治自愈或有連年月而不已其死生存亡
可切脉而知之耶然可具知也設病者若閉
目不欲見人者脉當得肝脉弦急而長而反
得肺脉浮短而濇者死病若開目而渴心下
牢者脉當得緊實而數反得沈滑而微者死
病若吐血復斂衄者脉當得沈細而反得浮
大牢者死病若謔言妄語身當有熱脉當洪

大而反得手足四逆脉反沈細微者死病若
大腹而泄脉當微細而澀反得緊大而滑者
死此之謂也經言形脉與病相反者死柰何
然病若頭痛目痛脉反短濇者死病若腹痛
脉反浮大而長者死病若腹滿而喘脉反滑

隱四

二

利而沈者死病若四肢厥逆脉反浮大而短

者死病若耳聾脉反浮大而濇者死

千金翼云脉大

者生沈遲病若目眩脉反大而緩者死左

細者難治

有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛
上有病而下痛此為逆逆者死不可治脉來

沈之絕濡浮之不止推手者半月死一作脉

來微細而絕者人病當死人病脉不病者生

脉病人不病者死人病尸厥呼之不應脉絕

者死脉當大反小者死肥人脉細小如絲欲

絕者死羸人得躁脉者死人身澀而脉來往

滑者死人身滑而脉來往澀者死人身小而

脉來往大者死人身大而脉來往小者死人

身短而脉來往長者死人身長而脉來往短

者死尺脉上應寸口大遲者半日死脉經云尺脉不

應寸時如診五臟六腑十二經脉皆有相反馳半日死

有一反逆即為死候也

診百病死生要訣第十五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者吉反之者凶

卷四

三

診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死傷寒已得汗脉沈小者生浮大者死

濕病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治

溫病時行大熱其脉細小者死

脉經時行作穰穰

溫病下利腹中痛甚者死不治溫病汗不出不至足者死厥逆汗出脈堅彊急者生虛緩者死

熱病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脈直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而吐脈來細彊十二日死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脈來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死

熱病七八日脈不軟喘一作不散一作數者當瘖瘖後三日若汗不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥
脉代舌焦枯黑者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者
難瘥熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治
熱病脉躁盛而不得汗者此陽之極也十死

不治熱病已得汗脉常躁盛陰氣之極也亦

死

太素作
陽極

熱病已得汗常大熱不去者亦死

大專熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得

刺治也熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿
刺不汗出必下利診人被風不仁痿躄其脉

虛者生

巢源云虛數者生

堅急疾者死診癩病虛則

可治實則死癩疾脉實堅者生脉沈細小者

死癩疾脉搏大滑者久久自已其脉沈小急

實不可治小堅急亦不可療診頭痛目痛久

視無所見者死

久視一作卒視

診人心腹積聚其脉

隱四

四

堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沈者死

其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死

腹脹滿便血脉大時絕極下血脉小疾者死

心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者

死腸澀便血身熱則死寒則生腸澀下白沫

脉沈則生浮則死腸澼下膿血脉懸絕則死
滑大則生腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者
生懸澇者死以藏期之腸澼下膿血脉沈小
流連者生數疾且大有熱者死腸澼筋攣其
脉小細安靜者生浮大緊者死洞洩食不化
下膿血脉微小者生緊急者死洩注脉緩時
小結者生浮大數者死蠹蝕陰疰其脉虛小
者生緊急者死欬嗽脉沈緊者死浮直者生
浮軟者生小沈伏匿者死欬嗽羸瘦脉形堅
大者死欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下

脫形熱不去者死欬而嘔腹脹且洩其脉弦
急欲絕者死吐血衄血脉滑小弱者生實大
者死汗出若衄其脉小滑者生大躁者死唾
血脉緊彊者死滑者生吐血而欬上氣其脉
數有熱不得卧者死傷寒家欬而上氣其脉

脈四

五

數散者死謂其人形損故也上氣脉數者死
謂其形損故也上氣喘息低昂其脉滑手足
溫者生脉澀四肢寒者死上氣面浮腫肩息
其脉大不可治加利必死

一作甚

上氣注液其

脉虛寧寧伏匿者生堅彊者死寒氣上攻脉

實而順滑者生實而逆澀則死太素云寒氣暴上脉滿實

何如曰實而滑則生實而逆則死其形盡滿

何如曰舉垂盡滿者脉急大堅尺滿而不應

如是者順則生逆則死何謂順則生逆則死

曰所謂順者手足温也所謂逆者手足寒也

消渴其脉數大者生細小浮短者死痲痺脉

實大病久可治脉懸小堅急病久不可治消

渴脉沈小者生實堅大者死水病脉洪大者

可治微細者不可治水病脹閉其脉浮大軟

者生沈細虛小者死水病腹大如鼓脉實者

生虛者死卒中惡吐血數升脉沈數細者死

浮大疾快者生卒中惡腹大四肢滿脉大而

緩者生緊而浮者死緊細而微者亦生病瘡
腰脊彊急瘕瘕者皆不可治寒熱瘕瘕其脉
代絕者死金瘡血出大多其脉虛細者生數
實大者死金瘡出血脉沈小者生浮大者死
斫瘡出血一二石脉來大二十日死斫刺俱

有病多少血出不自止斷者脉止脉來大者
七日死從高頰仆内有血腹脹滿其脉堅彊
者生小弱者死人為百藥所中傷脉微細者
死洪大而速者生脉經速人病甚而脉不調
者難瘥人病甚而脉洪易瘥人陰陽俱結者

見其上齒如熟小豆其脉躁者死

結一
作竭

人內

外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥
逆體不得安靜者死脉實滿手足寒頭熱春
秋生冬夏死老人脉微陽羸陰彊者生脉焮
大加息者死陰弱陽彊脉至而代奇月而死

隱四

六

尺脉濇而堅為血實氣虛也其發病腹痛逆
滿氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久成
結痃得病以冬時黍稷赤而死

尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者
是穀氣不足病得節輒動棗葉生而死此病

秋時得之

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至
關關至尺三部之位處處動搖各異不同其
人病仲夏得之此脉桃花落而死一作葉
右手寸口脉偏沈伏乍小乍大朝來浮大暮

夜沈伏浮大即太過上出魚際沈伏即下不
至關中往來無常時時復來者榆葉枯落而

死

葉一作筴

右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動
一止乍動乍踈不與息數相應其人雖食穀

猶不愈藝草生而死

左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆
如循直木如循張弓弦絀絀然如兩人共引
一索至立春而死脉經作至

診三部脉虛實訣死生第十六

隱四

七

凡三部脉大都欲等只如小人細人婦人脉

小軟小兒四五歲者脉呼吸八至細數吉千金

翼云人大而脉細人細而脉大人樂而脉實
人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯
而脉細人羸而脉大此皆為逆逆則難治反
此為順順則易治凡婦人脉常欲濡弱於夫
夫小兒四五歲者脉
自訣疾呼吸八至也

三部脉或至或不至冷氣在胃中故令脉不通三部脉虛其人長病得之死虛而瀦長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癩病亦死三部脉實而長長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癩病可治三部脉彊非稱其人病便死三部脉羸非其人得之死三部脉粗長病得之死卒病得之生三部脉細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生三部脉微而伏長病得之死三部脉軟長病得

之不治自愈治之死卒病得之生三部脉浮
而結長病得之死浮而滑長病亦死三部脉
浮而數長病風得之生卒病得之死三部脉
芤長病得之生三部脉弦而數長病得之生
卒病得之死三部脉革長病得之生卒病得
之生三部脉堅而數如銀釵股蠱毒病必死
數而軟蠱毒病得之生三部脉澀澀如羹上
肥長病得之死卒病得之生三部脉連連如
蜘蛛絲長病得之死卒病得之生三部脉如
霹靂長病得之死三部脉如角弓長病得之

死三部脉累累如貫珠長病得之死三部脉
如水淹然流長病不治自愈治之反死三部
脉如屋漏長病十四日死脉經云十日死三部脉如
雀啄長病七日死三部脉如釜中湯沸朝得
暮死夜半得日中死日中得夜半死

隱四

三部脉急切腹間病又婉轉腹痛針上下瘥

孫真人備急千金要方卷之八十六



