

醫方類聚卷之二百六十

小兒門 二十二

驚癇 六

省翁活幼口議 二

治嬰孩小兒因吐而傳慢驚風候宜服觀音

全蝎散 治音 州東 對玉 刀 派 養 機 照 嬰 慈 衛

黃耆 分 一 人 參 分 壹 木 香 錢 壹 炙 草 石 蓮 肉 炒

匾豆 炒 白 茯苓 各 錢 壹 白 芷 對 半 全 蝎 煎 防

風 羌 活 各 錢 一 天 麻 錢 二 煎 口 口 个 口 口 小



右為末每服半錢壹錢棗□□个□□小
 盞煎至半與服不拘時候慢脾尤宜服之
承類鈴方同
 議曰觀音散東漢王氏所著調理嬰孩清
 神固氣補虛益脉開胃止吐醇乎醇善之
 善者耶所緣用藥截風者何正於危急之
 際却作兩餌投之先與生其胃氣次服截
 風定痛如此療理不惟迂曲致緩又且未
 能藥入脾胃之間悟其至理兩劑一行或

加白元子未以半和之乃盡其妙

犀角散治嬰孩小兒因吐瀉神困力乏欲傳

作慢驚風候藥香蓋最精新為打對流以

犀角鎊壹白朮上錢水甘草半錢陳皮舊者

如法白

右為末每服壹錢水小中盞金銀薄荷同

煎三五沸通其無時刺以龍眼眼單煎

議曰此方治小兒因此瀉神困力乏欲發

慢脾風候正謂救急不可令緩若已傳受

即風即熱即痰即驚交相致作口散不定
上竄搐搦悉由脾虛之所致也脾經既虛
次第胃虛其藥白朮陳皮預理脾胃犀角
退熱去風熱既不作痰無發生醒脾壯胃
風何得有漸見甦省兼與醒脾散及既濟
丹相間服言向取愈為良其方全不用逐
風化痰之藥者蓋是證候欲作慢驚所以
未宜先投緊藥故用此方謂之和劑一正
其脾氣得無傳變不勞療理簡徑微妙稽

首智者作之施功利益而已

治嬰孩小兒吐瀉不止痰作驚風脾困昏沉

默默不食醒脾散方

木香炮膏錢 全蝎炒半錢 天麻炒壹錢 人葎壹分 白

茯苓壹錢 白朮炒壹錢 甘草炙錢 白姜壹錢 白附子炮壹錢

右為末每服半錢大者加服水少許棗子

同煎至五七沸通口無時服

議曰此良方最為勝善小兒吐瀉脾虛作

議曰此良方最為勝善小兒吐瀉脾虛作

疾驚風神困氣弱沉沉默默皆脾經虛乏
已盛風痰併聚故亦不醒宜多與服仍加
既濟丹及觀音全蝎散俱良其疾復有引
掣搖弱無與驚風元散及腦麝寒涼等藥
其證愈惡其候愈盛不惟驚風未退且痰
熱助之令兒疾作傳變傳即慢脾變即陰
逆慢脾猶載方藥尚可理之陰逆之候何
可醫治陰逆者陰謂陽氣欲絕逆謂受證
不順不順欲絕但增吁嗟使人無所措手

醒脾良方豈可隱匿

真所謂活人飲子

神保既濟丹治嬰孩小兒吐瀉或已作風候
服之功效

硫黃煨 酸消煨 陳橘皮白 青橘皮並去 五

靈脂川者良 半夏麴炙炒

以上等分梳消二味和研令勻壹處用

精磁器鎔汁傾出候冷細研旋入諸藥和

小勻

右爲末秫米粉水煮糊爲元如○大每二

歲兒服三十元大者加之並溫飯飲下空
心食前此方均分陰陽二氣多服有益
議曰陰陽二氣不均冷熱相制驚風已作
搐搦已定或陽虧陰盛或陰虧陽盛或驚
風未散吐瀉不止或嘔逆或發喘或脚手
漸冷或眼目欲合或服涼藥太多或虛煩
不定或沉沉默默不省或恍恍惚惚生驚
但胃氣未脫速與服之若是危急不待作
元子只以末溫飯飲調與服以愈爲度若

脚手冰冷者服之立溫未止者服之立止
雖慢驚慢脾風候並宜與服仍加薄荷湯
使尤良智者明理必加欽重愚者蒙昧必
懷猶豫此方至良少有知用請敬而行之
治嬰孩小兒吐瀉脾胃虛弱發作慢驚風候
搐搦不已醫工截風不止取痰不下散熱不
退卽驚不去其證欲傳慢脾風候宜服定命
飲于

半夏棘羊眼天麻分甘草炙白茯苓白

木 老生姜

各二錢

右件壹處用水壹盞於磁器內煮令水乾將半夏天麻白朮茯苓切焙爲細末每服半錢或壹錢生姜棗子湯調與服無時

議曰此方建脾化痰去風散熱功效如神醫工少有知用初學之士只知有腦麝香竄者方用之俗夫便言好藥殊不知腦麝乃醫家出不得已用之其物通利關竅開閉寒踈湊理利骨節其藥屬陰能化於陽

只有急驚宜用慢驚慢脾傷寒等患悉宜禁止其或疳痢藥用之虛者亦禁惟有瘰疰癩癧宜用定命飲子屢經效驗野老處定此方其効造化深智高明往往欽誦痰癩連併尿息虛怯不敢頓下者宜與靈芝元若手足差冷兼進回陽行醫用藥至於此等證候乃主治活傷之權也

治嬰孩小兒慢脾風候痰涎潮盛不化完與白麩圓良方

自製牛膽五味者分一白殭蠶去絲炒錢子地竜

五靈脂川者全蠍炒半夏末各壹錢用生薑汁浸

右件為末水煮半夏末糊圓如麻子大每服三十元煎金銀薄荷湯下

議曰脾家有風乃虛所致驚搐所出生也痰涎足故作也陰癩不暴其實駭醬若也意急投之衝烈愈見害重誠為不可所以禁却腦麝通利關竅之藥悉無利益治法所宜者今選用妙方頓以活人白殭蠶圓

一味去痰尤能截風既已傳入慢脾則風

痰混致驚熱交臨醫工看候藥用當權來

敢決之可否候未脫去陽者直宜與服之

若陽虧陰盛至危至急候變非常精神色

脉駭於人情者當服下項良方

附硫圓治嬰孩小兒慢脾風候附硫圓散方

四肢冷厥服之附木一兩甘草

命黑附子生用蟬梢生用熟硫黃末壹錢

右件為細末生薑自然汁和圓如紫豆大

每壹歲二十圓米飲下類方同

治慢脾痰盛四肢逆冷黑附湯方黃末

黑附子炮取末二錢重白木錢一南星錢一甘草壹

錢半夏青錢湯洗七次

右以咀每服二錢水小小蒸生姜三小片

棗壹介煎至半去滓通口以匙挑與服所

覺手足煖其候漸省藥即止之宜與

辰砂膏治嬰孩小兒慢驚風傳慢脾風候有

冷痰在鬲潮作不散此痰虛久不可頓下其

兒搗緩昏困至重者宜服此方

大黑附子壹个八九錢重者去皮臍頂上

在孔中用附末天南星炮半兩蝎梢三羌活

各壹朱砂飛過

右為末以朱砂和勻煉蜜為圓雞頭子大

兩服壹圓至兩圓煎金銀薄荷湯入酒三

五滴點化與服

議曰此三方皆用黑附子直不可執謂性

熱兒在幼小礙與服之其兒患脾風脚手

冷者有微有暴審其輕重輕即用湯成即以圓重即以膏服之皆效須候手足煖陽氣回即爲之快矣既已溫煖更以醒脾正胃藥兼服除是慢驚傳入慢脾候方可與服之硫黃其功甚速又且逐風化痰醒脾正胃溫煖臟腑補益腸胃奪命回陽省活危困至良至驗切不可倉皇妄投圓散或介大過不及之時則致咎于後萬宜孚受不至誣誕故也

治嬰孩小兒慢驚風及慢脾候神精昏困高上有虛痰不能得化不可服巴豆輕粉恐動臟腑只將神仙所留妙方與服其痰須臾自下良久神情已定眼目微開漸與溫平藥調理胃氣兼須理驚風藥與服勿更攻擊其方妙一攻開元通寶銅錢名七寶妙砂丹錢樣其錢背上下有兩月子只有壹个月子者不用錢色淡黑頗小諸錢將錢頓鐵匙頭於灰火內燒霎時四維上下

各出黃白珠子遍舂都是將出候冷傾放
茶盞中入朱砂末少許只作一服煎金銀
薄荷湯送下多收此錢準備緩急或先燒
成珠子收拾亦得此方墜下小兒虛痰別
無它作證候者用之乃保十全功效無可
疑訝



此是
錢樣
議曰調治嬰孩小兒慢脾風候無過前作

藥對證尅效須審慢脾已傳未傳之理其
兒眼開未合尚在慢驚脚手不冷之時未
可便與回陽且與七寶妙砂丹一二服眼
合沉困陰證極盛者方可與服回陽凡服
回陽解脾湯劑手足漸煖仍與觀音全蠲
散及醒脾散兼服凡慢脾風候最爲惡證
只可前方調治雖曰緊急不得併雜用之
泛泛不惟無益枉勞其功虛延其候閑養
其疾此疾傳陰陰重病盛如燈無油只見

次第蛻去若不助陽生胃只知截風去驚
兒疾轉見增重且兒陰證未至十分與藥
加其寒涼攻得陰重陽虧難以救療若也
失其陽氣隨陰而化所謂制之在始無在
於未醫慢脾風證候如其所述用藥由可
救活若鄙夫意見不同難以省活噓哉

治小兒食癩先用真珠天麻圓推下次服定

癩妙藥

治小兒風癩先用化風丹去其風熱次服定

癩妙藥化風丹

法製黃牛膽錢貳羌活錢各壹獨活錢各壹天麻

防風 甘草 荆芥穗 人參 川芎

右為末煉蜜為圓如皂子大每服壹圓薄

苛湯化開服

議曰風之為病其狀多端皆由腠理疎弱

榮衛虛怯經絡不順關竅閉塞其氣壅

鬱勃音拂其脈凝注征役有同天地晦冥日

月暈蝕颺暴發與精神俱潰者一身四體

皆不我有是謂風癩之至也所謂化風化其所受之風不待久傳迅變凡該五臟蘊熱三焦作壅速與流利熱即風生壅即風長關竅不通其風何能自散若言化之即順助之其榮衛經絡順得流行若也便與截風定搐為已成癩其風不散若更攻擊即衝任百脉雖不發作畢竟隱伏久而再發無能去根此方得名化風不復加進矣
比金丹方

人參 白茯苓 遠志去心 山藥 辰砂

天麻各一分 石菖蒲 川芎 甘草各一分 天

南星炮二錢生薑汁製麝一字

右為細末煉蜜為元皂子大每服一粒煎

金銀薄荷湯化下

議曰風行於四時和順於內外長養萬物能生能敗法令至周惟風之德夫人一身亦同天地順則和逆則害所發之風由其虛而作應其熱而生有其痰與熱而發其

驚關竅不通氣脉流注遂有傳變於身為
害常用逐之何向童稚幼雛嫩嬌危脆百
病揔歸于風豈可取次踈息凡治風有法
度不可極力施功若停待即須更而更倉
皇即拙謬而失深意審詳隨其逆順以療
之襲逐在後預追不及所載在前釋化不
盡者正謂庸工醫之陋也善治驚癇者化
其痰和其氣鎮心神安魂魄通閉竅順經
絡使其榮衛常順流行調其臟腑長和充

實邪自何生風從何入雖有些小自然而
散此癇由驚為疾豈可見留常令血脉充
肌膚壯頭目清精神備飲食節睡卧穩寒
暑知時臟腑常固其經絡自和榮衛自順
此金之名決定不壞斯乃順調善攝而已

治定癇良方奪魂散

白僵蠶去絲炒令蛇舍石燒紅用米醋淬

白附子炮各生銀匙生金赤類鈴方半黃

如無以膽製烏梢蛇頭青酒炙白茯苓

天麻各二錢天南星秤末壹分生薑半匙末

二錢重姜汁赤脚蜈蚣壹條酒浸犀角二錢

腦子半兩麝香半兩合下

右為末蒸棗肉為元如○大每服十元至

十五完二末朱熹金銀薄荷湯下朱砂為

衣○鈴方又云壹方加代赭石乙分醋淬

如欲利痰加巴霜煮

議曰癩之為疾又是壹種證候若言驚風

所傳古人有謂食風驚三癩若言不干驚

風所傳古云驚風三發便為癩且癩為疾

痰熱壅盛傳入經絡寒于心肺是致關竅

不通故作癩疾發作有如驚風天弔或因

驚而生痰多或因熱而作風盛大小便不

利上下氣不通心神悶亂若死而復生生

而復死沉沉默默無由甦省忽尔氣透關

竅漸得開通魂魄稍得安定向後心被觸

腦氣不宣利發作如前是知癩之為疾乃

由虛痰冷涎頑結子胥臆驚風併聚于關

由虛痰冷涎頑結子胥臆驚風併聚于關

尋常無精神心志不寧即存恍惚療理不專藥服不投必自致害何足恠者耶奪魂散方經效秘傳修合如法活人神驗豈非至寶之謂也

小兒驚熱風痰

議曰此名四證已述前篇兼載八候續之今復舉驚熱或併風痰未發陰陽二痛之前醫者即先與化痰禦風退熱利驚如此逐病推究不惟繁難乃無法所治是故艱

於療理若已尙病於證何憑凡此四證相隨不可攻其一也利其驚則風縱退其熱則痰壅久尋茲理未究盡善忽一日省悟錢氏方宜風散正為此等兒孩病設有痰即壅有熱即閉有風即隘有驚即悶昏昏沉沉輕藥不能散重劑恐傷害但與服疎風散較之宜風壹服之間風痰驚熱悉皆消去神情慶悅四體和安觀其此藥似有狼虎用之即和順推痰利驚散風解熱只

與壹服不移其時可見功效嘗見醫工調治此等證候多是疑貳進退怯懼若過其時延其日則候傳變驚自驚作風自風生痰自痰壅熱自熱聚或急或慢八候相從反覆傳變迎互發越之時不可得而進此藥然踈風所療四證相待如賊方會極力膏衝盡使散敗不致作害及其聚而自散者流入諸經或絡或經或脉故作搐搦引掣等候矣

治嬰孩小兒驚熱風痰四證結聚於胃臆之間令兒昏困沉重關竅不通諸脉氣閉所以默默欲食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐利宜與服之立見甦省大省踈風散方

錦紋大黃緊實者參錢重雞心檳榔貳錢重舊陳橘

皮去白貳錢朴消壹錢黑牽牛壹分半熟

右五味爲末每二歲兒服半錢七三歲壹錢七先用生蜜調就次煎薄荷湯點與服

不拘時候

議曰風痰在上即吐在下即瀉謂隔上壹下也

眼之開決定安樂未可便投他藥恐相致

悞常人只知用腦子麝香參苓木附香附子

無擔負之藥似此四證如何和順調理

小牛黃圓治小兒膈熱痰涎稠盛心神不寧

睡不安穩煩躁怔忡四體作熱宜與服之但

覺驚風痰熱常服功效

乾葛截炒取兩甘草炙乙分黃芩去心與浮皮乙分防

風半兩山梔子半兩去麝字

右為細末入麝和勻如昆子大煉蜜為圓

常服薄荷湯化下

永類鈐方

初有痰熱未有驚風先且解表

和劑香蘇散解肌加乾葛 參蘇飲除木香

人參加川芎生薑棗子煎

惺惺散除風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓 細辛淨桔梗 瓜婁根 人參

甘草炙 白朮 川芎 各等分

右為末每服乙錢水半錢姜壹片薄荷三葉同煎湯氏細辛減半

急驚輕下法

牛黃清心元治四証八候去風痰散驚熱

南星七 半夏 白附 川烏 各乙兩 川鬱

金半兩 五味作粗末用臘月黃牛膽兩三枚取汁和藥入膽中札懸當風處一月乾取出入漆馬牙硝朱砂雄黃朋砂各乙錢膠射少許如膽藥乙兩硝砂四味各乙錢

右稀麵糊元麻子大金銀薄荷湯下壹歲十元二歲倍之

鄭氏比金元急驚壯執喘粗痰嗽大小便不利

輕粉 滑石 各錢半 南星 乙錢半 青黛 乙字半

右為末稀糊元小豆大乙歲二元薄荷湯

翻下急驚頭熱足冷口噤面青痰痰加乙

元桃皮湯下名桃符踈流蘊積涎熱瘡豆

餘毒宜服又去青黛加蝎梢半錢名小青

元同治

太白散急驚搐搦涎盛

粉霜二錢 輕粉二錢 白牽牛乙炒各錢

右為末每服乙字薄荷湯調吐痰效

防風元治驚風痰熱神昏驚悸

天麻 防風 人參 川芎各乙兩 全蝎

甘草 僵蠶 朱砂 雄黃 牛膽南星

各乙分

右為末蜜元雞頭大每壹元薄荷湯下

保嬰方全蝎散治急慢驚風發搐服之神效

急慢二証加減方法在內制法更佳

全蝎二十四介 新薄荷葉包以竹夾住於

炙亦兩 僵蠶半兩 炒去絲青南星乙兩 取末

兩切片新薄荷葉二兩同搗和粗作大黃

餅曬乾如急驚不用南星加大黃

乙兩煨若慢驚不白附子 錢三 防風去蘆

天麻 甘草 朱砂 飛川芎各半兩

右為末壹歲兒服乙字二歲兒服半服薄
荷湯調下量大小歲數加減身熱發搐煎

後火府散調慢驚吐瀉後發搐生薑湯調
急驚搐煎火府散加大黃湯調

火府散面赤咬牙發熱唇口乾燥小便赤澀
皆切虛實邪熱並治

生地黃 木通 各乙 黃芩 淨 甘草 各

右咬咀二錢服水煎溫服無時

湯氏金星元治急驚引熱擦壅大便不通

薺金末 雄黃 各乙 膩粉 半 巴豆 七介

右為末醋糊元黍米大膏歲二元薄荷湯

急驚重下法

鄭氏驅風膏肝風筋脉拘急面紅目青眼卜
驚搐及胎風

辰砂 蝎尾 當歸 龍膽草 川芎

山梔仁 大黃 羌活 防風 甘草 各

分 右為義末 玉機微 入射香乙字煉沙糖元雞頭

大三歲三丸 微義 薄荷竹葉蜜湯化下

睡安散急慢驚風潮搐不得安睡

辰砂 乳香 血竭 麝 人參 酸

棗仁 炮南星 炒白芷 各半 全蝎 二十枚 蜈蚣

乙條酥炙黃 酒浸壹宿

右為末壹歲一字薄荷汁好酒煎沸調下

得睡效

蛇頭元急慢驚風涎搐搦來去不問陰陽二候

蛇頭 乙介 走足蜈蚣 三條 朱砂 三錢 鉛白霜

輕粉 各二錢 腦射 各乙錢 鐵液粉 百草霜 各半

兩 蛇含石 乙兩 醋淬

右為末米糊元雞頭大三歲半元薄荷湯

磨下一方慢驚加附子半兩去皮尖血蝎

乙分一方加全蝎乙分

利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚

醒脾散大醒脾散王氏惺惺散三方見慢驚

門皆和胃助氣可通用

人慢驚方傳證治

鄭氏清脾飲治方傳慢驚尚有陽証或吐瀉

辨別香

多因不惺欲生風候

人參 白附 南星 炮半夏 制全蝎 殭

蠶 白朮 川芎 羌活 甘草 各等分

右為飲子三歲乙錢水半瓊姜三片冬瓜

仁三七粒煎無時

小續命湯吐瀉後因虛生風癱瘓神昏涎盛

不利一切慢驚虛風

麻黃 去節泡 防風 乙分 芍藥 生附子

人參 川芎 白朮 防已 各乙 黃芩 乙分

桂枝 甘草 各半兩

右粗末三歲乙錢水半盞姜棗煎空心加

射蝎尤妙有汗去麻黃

神寶丹先吐後瀉或先瀉後吐或只吐不瀉

或吐瀉俱作變成慢驚

附子 用米泔及姜汁和浸三日 羌活 朱

砂 蝎尾 各半兩 射香 乳香 各乙 南星 二

各半兩去皮臍剉片酸漿水姜汁同煮
軟去姜焙乾半兩若牛膽制者尤佳

右為末蜜元鷄頭大三歲半元薄荷湯化

下小可驚瀉便青腹疼與少許立效如小兒只吐不瀉發驚以紫元重瀉五七行後與此藥並食前或以真珠元下之亦得醒脾散治吐瀉脾困不食痰作驚風

人參 白茯苓 白附炮 天麻焙 甘草炙

石菖蒲細節者 木香 石連肉 石朮各乙錢

全蝎焙半錢

右爲末每三字姜棗煎服有熱去木香或加南星半夏陳皮陳米

次醒脾散同治

南星 白茯苓 陳皮淨各乙分 全蝎焙 甘草

炙白附炮 蓮肉 人參 木香各半分 陳倉

米二百粒

右湯使同上驅風醒脾二方通用亦可釀乳小兒胃虛不消乳食尤須節約

烏蝎四君子湯四君湯加生川烏焙過全蝎爲末各少許每服半錢姜棗煎服如再服卽去川烏湯氏蝎烏湯生川烏去皮臍乙

兩全蝎十介去毒分作三服姜七片煎溫服

蘇合香元乙倍八味青州白元子二倍夾和每服半錢姜湯調下

八味青州白元子痰多加金液丹瀉多加或等分驅風回陽二藥合研每半錢陳米飲下壹方加五靈脂淨青皮神寶既濟丹可通用方見前

湯氏奪命散急慢驚利痰之聖藥其功在真

礞石驗真者以器盛少水吐痰水而上以少藥糝之痰隨藥而下慢風慢脾風用南木香煎湯調下礞石煇消古文錢等雖能利痰然其性非胃家所宜須以木香佐之星香更佳

驚風內弔

全嬰乳香元治驚風內弔腹痛驚啼方見直指小見方

桃符元治証同煎

銀朱錢乳香錢大蒜壹子

右先研乳香令細後入銀朱研却入大蒜
研爲元薄荷湯下

經驗良方

小兒諸驚風癇搐搦等疾

治小兒卒驚癇用蛇黃以水磨服之

延壽睡驚丹治小兒急慢驚邪風熱痰壅咽
膈不利癇癩潮發手足搐搦口眼相引背項
強直精神昏憤睡中啼哭此藥大能安神鎮
心定驚控痰每用一圓濃煎薄荷湯磨下五

歲以下兒分二服三歲以下兒分四服

蛇含石

南廣者良每四兩用穀樹葉下貼
上蓋却用煮七日取出將沙窩煨

令赤濃煎甘草湯淨須二次煨二次淬
手可搥碎爲度如手搥不碎再煨再淬南

星一兩

白附子

壹兩沸湯泡洗五十次切
片以生姜自然汁淹壹宿

慢火炒令焦黃色
休燒焦黑不可用生朱砂一錢火飛麝香

一字別
研旋入

右爲細末五月五日糯米糊爲丸如許○

大前二方亡宋吉州東廳通判衙常合此

二藥施人甚驗

芎藭散治小兒腦髓風顛顛開解皮肉筋脉
急脹骨縫青筋起而少血色或腹中氣響時
大便青白沫或嘔吐痰涎欲成慢驚風搐足
脛冷者或大人氣上衝育頭面腫痒亦宜服
之

川芎

葦撥

各壹兩

蝎梢

壹錢

細辛

去蘆苗半兩淨

夏

湯泡去皮臍

二錢半

夏

生薑自然汁製壹宿

右研爲細末每用壹字沸湯調熱服量大小加減

油珠膏補脾腎潤心肺治氣逆嘔吐風痰作

搗

石亭脂

卽生硫黃選如蠟色者

消石

各半兩

附子

炮去皮臍

半夏

湯泡去皮臍

南星

湯泡去皮臍

各壹錢半

右爲末每服一錢以清薑水半盞滴清油

壹點如錢大抄藥在油珠上須更墜下却

去其薑水止服油珠藥再服清薑水三五

口前空心下候一時方與乳如痰涎壅塞

眼睛斜視速宜服之此二方救兒無數

木通散能瀉肝風降心火最利驚熱

山梔二錢 大黃濕紙煨 羌活 木通 赤茯苓

甘草各壹錢

右為末每服壹字紫蘇煎湯調下

治小兒驚疾皆因積風熱成痰涎驚藥多用

生硃蝎附性烈力大嬰兒腸胃脆弱多不

能堪往往致害近得一方右用遠志去心

煎湯隨時飲之

順經散治小兒十餘歲因驚之後心氣不行

藥

小便淋瀝日及三四十次漸覺黃瘦宜服此

韭子湯浸去皮焙乾壹兩 琥珀別研 益智去皮炒 金毛

狗脊去毛 白茯苓去皮 石燕子大煨醋淬研 石

葦去毛壹錢

右為細末每服壹錢煎韭湯調下日二服

千金湯主小兒暴驚啼絕死或有人從外來

邪氣逐令兒得病眾醫不治右用蜀漆二

分左顧牡蠣壹分為末以漿水壹升煮取

四合一服一合

白丁香圓治小兒卒中風口噤不下物右用
家雀屎末水元如麻子大用溫酒服或爲
末塗乳頭令服如無雀屎用鷄下白屎亦
良

治小兒口噤乳不下右用白棘燒末水服壹
錢匕或塗乳上

治小兒口噤右用麝香少許入大黑豆末中
和乳飲之

治小兒冷證腹痛夜啼用大蒜壹顆慢火煨
熟細切焙乾乳香半錢別研極細丸如芥
子大每七元乳空時乳頭以乳汁化下

治小兒熱證心躁夜啼用芝麻清油燈花三
兩顆研細用燈心數莖煎湯調塗口中以
乳汁送下

治小兒客忤夜啼以竈中黃土蚯蚓糞各等
分研白水和塗兒頭上及五心良
當歸散凡小兒夜啼者臍寒腹痛面青手冷

不吮乳者是也宜用後方又有熱痛亦啼不止夜發面赤唇焦小便黃赤與局方三黃丸人參湯下

當歸 白芍藥 人參 各二錢半 甘草 錢半 桔

梗 陳橘皮 各一錢

右爲細末水煎半盞時時與服

治小兒吐乳不止久必作熱遂成脾風此證最惡蓋急驚屬陽證慢驚屬陰證慢驚當投溫藥急驚當投涼藥不可一既投藥如

吐乳不止用靈砂壹粒青州白圓子三粒一處研末米飲調下量兒之大小與之吐

久虛甚者對川靈砂和白圓子屢親試

白圓子方 又方吐乳用蓮心二十一个香

附子三个吳茱萸七个丁香七个壹處新

瓦上炒黃香研細末以乳汁調傅乳頭上

令兒吮食屢用效

醫林方

麝香青餅子治小兒急慢驚風

青黛水飛天麻兩半全蝎錢四白附子錢四麝香錢半

右為細末水和如桐子大捏作餅子每服壹餅子薄荷湯化下

銀白丹治小兒壹切驚風山妙選方中

天南星半兩壹半白殭蠶兩半全蝎壹分白附

子壹分牛黃半分麝香半分粉霜半分朱砂半分大棗

二三枚蒸

右件為細末與粬泥同和成丸如黍米每

服五丸至十丸薄荷湯下此藥不可多服

二服者恐小兒後却生瘡腫

治小兒癩病

天南星炮烈出火毒去黑不計多少

右為末每服半錢生薑汁薄荷汁蜜酒任

調下

施圓端效方

雞脛丸治小兒驚疳黃瘦咬牙噴唾肌熱盜

汗食積肚大脚細長大不能行常服少病兒

肥大名鄭姑姑方

天門冬 麥門冬各去心 秦艽 雄黃 雌

黃瓜 蔓根 黃芩 柴胡葶 枯白礬

防風 桂 茯苓 桑白皮各一兩 雄雞脛

雌雞脛各壹對炙

右為細末水糊為丸如麻子大每服二十

丸米飲粥飯下不拘時候日進二服

吳氏集驗方

通關散治嬰孩小兒驚風前退只啞不言天

南星為細末嬰兒半字小兒一字三五歲

半錢八九歲壹錢以猪膽汁調下令孩兒

咽入口中○玉機微義右以南星大者炮

為末三歲壹錢猪膽汁調下嚥入喉中便

能言

三烏圓治小兒夾驚吐瀉如用退驚藥則瀉

愈甚如用補瀉藥則熱愈發宜用此

草烏一生壹炮壹燒

右為末醋麩糊圓如粟米大每服五十元

倒流水下

南星膏治小兒夜卧不寧心神驚悸病後脾虛驚撮常服定志祛風

天南星 一兩 騰月以 人參 半兩 防風 半兩

茯神 三錢 去 辰砂 別研 乳香 去砂石 全蝎 去

微 炒 殭蠶 去絲 酸棗仁 去殼 秤炒

右為細末煉蜜圓如鷄頭子大用金銀箔

為衣每粒燈心棗湯下如欲久留以粽子

角圓以薄荷燈心湯磨下

山居四要

小兒驚風用胡荽糞燒存性椀覆出火毒生

蜜調灌少許 衛生易 簡方同

急慢驚風百治不效者蛇脫皮壹分牛黃壹

錢研水壹盞先煎蛇皮至五分去滓調牛

黃頓服五歲以上倍服

新効方

黑龍丸治急慢驚風

天竺黃 青黛 各半 蜈蚣炭 金匱鉤玄 蘆

蒼各二錢半白殭蠶錢半辰砂錢三南星臘月牛膏膽汁製
礞石煅各一兩

右八味末之甘草膏為丸芡實大每服壹
二丸薑蜜薄荷湯化下慢驚用人參白朮
湯下○金匱釣玄右為細末甘草煎膏丸
如雞頭大每服大者二丸小者壹丸急驚
薄荷煎湯磨化下慢驚白朮桔梗湯下

奪命丹治小兒急驚大人癩病

川鬱金八錢濕紙裏煨生辰砂錢二巴豆二拾四粒去心膜油

令麝香錢

右四味末之麪糊為丸如芡實大用前辰
砂更加金薄為衣三丸燈心湯化下若作
尋常驚藥錠子減巴豆壹半加蛇含石

急救仙方

小兒慢驚昏沉時或搐掣烏藥磨冰暖熱與

急服補生易簡方同

小兒急慢驚風震靈丹二十來復丹十白員
子拾三味研勻糯米糊丸芡豆大大者五

丸小者三丸

慢驚用北棗陳皮煎湯吞下衛生易簡方同

急驚用生薑自然汁百沸湯下衛生易簡方同

祕傳外科方

急慢驚風用冷坑中糞青水壹呷與之服卽

愈衛生易簡方同

徐氏胎產方

增添

保嬰桃紅散亦可用水煮面糊爲丸如竜眼

大臨用各依湯使磨化服如川吞服則丸如
菘豆大每服十五丸

川烏 白附子各五錢 大南星 陳半下

各二錢

右剉碎以新汲井花水拌濕瓦器中浸之

春五夏三秋七冬十日曬夜露一日一換

新水日足晒干爲末以好大粒朱砂五錢

重別研爲細末和如桃紅色爲度治急

驚風蒲荷燈心金銀環同煎湯下重則灸

百會 慢驚用全蝎鈞藤同煎湯下重灸
百會 嘔瀉姜葱煎湯下或老米飲加酸
醋一呷下 腹痛淡姜湯下 咳嗽桑白
皮煎湯下 胎驚夜啼及覺腹中有虫用
苦棟根皮煎湯露壹宿下傷風咳嗽薑葱
煎湯下 瘧亦姜葱湯下後用姜湯調末
干服尤佳

保命丹治小兒急慢驚風痰涎壅盛牙關緊
急角弓反張睡中驚跳哭泣叫噉偏搐斜目

面青臉赤兩眼直視手足搐搦天吊客忤搐
頭止竄壹切風痰並皆治之

大个無汕天南星二兩煨全蝎去尾毒淨用

黃為度白僵蠶二兩姜汁浸炒茯神去皮木遠志

去滑用淨肉一兩甘朋砂淨六錢蟬退去頭

草青節同煮過去草四條酒煮射香一大

兩淨壹白凡一兩龍天即蜈蚣也射香一大

粒朱粒五錢另猪牙皂角二兩打碎

右先將南星煨以皂角汁淬十數次餘皂
汁留煮米糊以前藥俱為末丸如龍眼大

以朱射為衣陰乾每用壹丸以薄荷燈草
金銀環子同煎湯浸磨化臨時於火上頓
溫與服

保童丹治小兒急慢驚風痰涎咳嗽喘滿不

進乳食虫疳積熱膨脹等證

陳枳殼五對大者去瓢用巴豆七粒去殼入內以綿拾字縛定好醋反覆者

軟去巴切片焙千餘醋留煮糊三稜 莪朮各五錢煨命箔拾

朱砂三錢易研

右為末以前醋煮面糊為丸茶豆大朱砂

為末及周歲一丸周歲已上三丸三歲

已下五丸已上七丸用薄荷燈草金銀環

同煎湯下不能吞磨化與服

玉機微義

治驚之劑宜與風癇門兼看

錢氏涼驚丸方見小兒藥證直訣

按此治風熱之劑也

局方天麻防風丸方見和劑局方

按此治風癇通關竅藥也

三因方治陽癰驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊方見三因方

按此治風熱痰之劑透關通經絡藥也

全嬰方睡紅散治小兒急慢驚風手足搐搦

目瞪神昏

牛黃 鵬砂 腦子 真珠 水銀砂子各半

青黛 蝎尾 京墨燒 南星 半夏同上

昔製 蛇含石淬各壹錢 金銀箔各拾片 麝香壹字 烏

蛇尾并項下七寸並酒浸壹宿取出去皮骨炙壹錢

右為末三歲壹字薄荷湯下

按此治風熱痰通關透肌骨之劑也非

風邪下陷者不可輕用

東垣朱砂安神丸方見諸熱

按此寧心清神涼血之劑也

謝氏奪命丹治急驚不省人事眼定不動牙

關不開唇白并黑者

南星 半夏各四錢為末並以生薑汁和作餅子晒乾 真珠新

者二 巴豆去油淨 朱砂四錢 金箔 銀箔各拾錢

片輕粉 麝各半

右丸味各為末和勻飛羅麪打糊為丸如黍米大每壹歲兒一丸燈心湯下

此金丸治小兒風熱丹毒急慢啞驚前奪命丹中減去金銀箔加真鬱金末一錢丸如上法

利驚丸

前比命丸中去鬱金加腦子半錢白頭蚯蚓壹條用刀截斷首尾兩頭齊跳者用之

去土秤二錢丸服如上法

按三方導痰藥也白餅子加減法

按已上諸方治陽癇之藥不問急慢但係陽證諸熱者皆隨表裏輕重擇用之

錢氏溫驚丸

天南星為未入蠟月牛膽中朱砂壹錢天竺

黃壹兩坯子胭脂片腦各壹錢

不用牛膽汁和丸雞頭大每一丸小者半丸沙糖水化下

羌活膏

方見衛
生寶鑑

三因方治陰癩慢驚

方見
本方

經驗方保生錠子治急慢驚風

蛇舍石

四兩火煨醋淬拾
數次研為極細末

南星

一兩先
細切再炒

白附子

去皮
壹兩

朱砂

三錢另
研極細

麝香

錢

右為細末用糯米粉煮作餅擀和前藥令

勻作錠子臨用薄荷湯濃磨汁服三口

全嬰方麝香餅治小兒急慢驚風進退不定

荏苒經日乍靜乍動嘔吐痰涎潮搐甚者宜

此

麝香

蝎尾

去毒
二條酒
浸酥炙

南星

煨
川烏

炮 白花蛇

酒浸一夕去骨皮
焙已上各半兩

乳香

鉄粉

朱砂

牛黃

各壹
錢

右為末酒煮糊丸如鷄頭大拈作餅子三

歲兒一餅用薄荷湯下

按此厥陰例藥也非風在關竅肯緊者不

可用義見中風門通關透骨例

全蝎散治小兒急慢驚風潮作不定心肺中

風

蛇頭一介蜈蚣一條草烏壹介去皮尖麻

黃去節朱砂壹錢腦麝各壹錢

右為末壹歲壹字薄荷湯下

奪命散治小兒急慢驚風諸藥無效者壹服見效

白附子 黑附子炮南星炮天麻 防風

半夏炮麻黃去節朱砂 蝎新薄荷葉裏姜汁蘸炙三兩次

各壹錢

右入麝半錢為末三歲半錢薄荷薑汁更入酒些小煎湯共調下

按此二方太陽例藥也

釣藤飲子方見小兒藥證直訣

按此升陽越脾氣藥也

寧心膏治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多

哭驚厲

人參 白朮 白茯苓 茯神 山藥

羌活 甘草各壹錢朱砂二錢腦麝各壹錢

右為末煉蜜丸如雞頭大二歲一九薄苛
湯化下

按此養氣踈風清神之藥也

寶鑑天麻散治小兒急慢驚風其効如神

半夏七錢天麻二錢甘草炙白茯苓 白朮

各三錢

右水一盞入磁器內煮水乾將生薑三錢
同煮候乾為末每服一錢半薑棗湯調下
按此溫脾養胃之劑非止於踈風勝痰藥

也大抵小兒血氣未充體虛者多或因病
後致者宜與此調理而不為峻劑下陷轉
成壞證者此三方則庶幾矣

謹按已上諸方治陰癰不問急慢驚但係
陰證宜隨表裏輕重選用則半陰半陽慢
脾之法例在其中矣

經驗方嚏驚開關散方見直指

全嬰方探生散治小兒急慢驚風諸藥無効
者吹鼻定死生

沒藥 雄黃 各壹錢 乳香 半錢 麝香 一分

右為末少許吹鼻如眼泪鼻涕俱出者可

治按此二方捷速藥也

吐風散治小兒急中風口噤不開不省人事

全蝎 壹斤 瓜蒂 拾斤 赤小豆 三十粒

右為末一歲一字温米飲調下末吐再服

碧雲散治小兒急風卒中涎潮氣粗不省人

事

石礪 四錢 輕粉 壹錢

右為末每子薄荷湯下酒少許同調下

良久先吐後利

一方以銅青為末醋糊丸如雞頭大每壹

丸薄荷湯磨下須臾吐涎似膠以手拽出

神効

天霜散治小兒急中卒風并急驚口噤搦搐

涎盛昏塞不語宜陳以宜發以然此散中

辰砂 粉霜 輕粉 南星 炮各半兩 蝎尾

白附子 藿香葉 各壹錢

右為末壹歲半字薄苛湯調下茶亦得未吐再服

按已上三方宜劑也宜選用然此方吐中兼汗下也

錢氏利驚丸 方見得効方

按此下濕熱痰之劑也

全嬰驅風膏 方見承類鈔方

按此下風熱之劑也

珍珠丸治小兒急慢驚風癸搐涎潮壯熱及

痰嗽壅塞

白附子 滑石 巴豆 十五个去油 輕粉 南

星 各壹錢

右為末糊丸如小豆次三歲三丸葱白湯

下

按此下食痰導滯之劑也白餅子加減法

通關散 方見吳氏集驗方

運化玄樞

五月五日取猪齒燒灰治小兒驚癇米飲調

服并治蛇咬

壽域神方

治急慢驚風以朱砂輕粉各一椀斗殭蠶全
蝎各七箇二味微炒燥取出待冷同砂粉
研爲細末却以乳母汁調抹兒口內立効
治胎痛驚風用全蝎頭尾全者以生薄荷葉
裹之以線扎定火上灸燥爲末入麝香朱
砂少許麥門冬湯下
衛生易簡方

急慢驚風

治小兒急慢驚風用牛黃一錢水研細先以
蛇退一分水一盞煎半盞濾去滓調牛黃
服五歲已上倍服

又方用青礞石磨水灌服

治小兒驚風用白殭蠶蝎稍等分天雄尖附
子尖共壹錢炮爲末每服壹字或半錢以
生姜溫水調灌之
又方用苦丁香藜蘆等分爲末每服半錢溫

酒調下

治小兒急驚壯熱上壅痰涎大便不通用鬱
金雄黃各壹分膩粉半錢爲末醋糊丸如
黍米大壹歲二丸薄荷湯臘茶清下
又方用大黃朴硝各二錢爲末每服壹字溫
茶清或冷水調下

治小兒慢驚風用白殭蠶全蝎各三枚微炒
爲末每服壹字煎麻黃湯調下
又方用輕粉朱砂不拘多少爲末七月初五

日取青蒿研汁丸如粟米大壹歲已下服
一九二三歲服二三丸乳汁送下亦治急

驚風

治驚風痰嗽時作潮熱用南星二兩天竺黃
半兩雄黃辰砂各壹分分別研麝香壹錢別
研爲末煉蜜丸如芡實大甘草薄荷湯化
下壹丸
又方用南星半夏各半斤米泔水浸南星壹
二日半夏五七日以透爲度洗淨曬乾切

作片生姜自然汁浸壹日夜洗出曬乾濃
皂角水浸壹日夜洗出曬乾明礬水浸壹
日夜洗出曬乾朴硝水浸壹日夜洗出曬
乾爲末每末三兩入朱砂壹兩麝香半錢
滴水研化如鷄頭肉大驚風金銀煎湯化
下有熱薄荷煎湯化下咳嗽人參或下味
子煎湯化下冬月加川烏夏月加礪砂尤
妙

治小兒驚邪用燕窠屎煎湯浴洗良

治小兒熱驚客忤用驢乳與飲

治小兒壯熱驚癇用李葉煎湯浴洗

治小兒驚癇疳痢用虎膽研水服之

治小兒胎風手足搐搦用蚕休爲末卽紫河

車又名命線重樓每服半錢冷水調下

治小兒驚癇寒熱用羚羊角燒灰爲末酒調

或乳汁服

治小兒急慢驚風用朱砂一豆粒大殭蠶全
蝎各一枚爲末乳汁調塗兩太陽穴并五

心舌上

治小兒牙關不開用南星煨熟紙裏不要透氣剪雞頭大一竅透氣於鼻孔中牙關立開

治小兒并大人噤口風用不蛀皂角炙去皮子蘿蔔或子共研爲末米醋調以雞翎蘸塗牙齦上卽差

天吊

治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名爲天吊

用金牛兒卽蟬殼以漿水同煎壹日曝乾爲末每用壹字冷水調下

又方用雄黃別研甘草炙荆芥穗炒白礬煨臘茶等分爲末每服半錢至一錢人參湯或薄荷湯調下仍量大小加減服

風癩

治小兒癩熱煩悶發渴用屋遊卽屋上青苔煮汁服之效

治小兒風癩熱癩用細辛大黃炮防風各三

分甘草炙犀角屑各半分水半蒸煎服
治小兒諸癩用白朮蜜浸厚朴以甘草水煮
焙乾各一分附子去皮臍犀角鎊末各壹
錢全蝎七箇每箇以薄荷葉裹定却將麻
黃湯泡軟纏縛慢火炙黃爲末取竹瀝爲
膏丸如黑豆大每服壹丸金銀薄荷湯化
下隨兒大小加減

治小兒胃寒虫上諸證危惡與癩相似用乾
漆燒煙盡白蕪荑等分爲末米飲調下壹

字至壹錢

治小兒發熱驚癩毛焦疳痢羸瘦用青黛末
蜜水調方寸匕服

治癩疾愈後復作用黃耆蜜塗炙釣藤鈎子
細辛甘草炙各半兩蛇退皮二寸酒炙蟬
殼四箇洗去土牛黃壹字別研爲末棗肉
丸如麻子大人參湯下壹歲十圓仍量大
小加減

金匱鈎玄

驚有二証一者熱痰上急驚當瀉之或用涌

法壹者脾虛乃為慢驚當養脾 多死者

急者降火下痰養血慢或用朱砂安神丸

更於血藥中求之

神聖牛黃奪命散治小兒急慢驚風

檳榔兩半木香三錢大黃二兩麩裏白牽牛壹兩

半半炒黑牽牛一兩半半

右咬咀壹半炒令黃色壹半生用同為細

末入輕粉少許每服二錢用蜜漿水調下

不拘時候微利為度量虛實用

備預百要方

小兒胎寒多患晝夜啼因此成癩方當歸末

如豆大以乳和灌口令咽之日夜三五

小兒卒驚啼狀如物刺方栢子搗服

小驚癩食治

食醫心鑑

治小兒心下逆氣驚癩寒熱喘息咽痛石膏

粥方

石膏四細米壹

右以水三升煮石膏取壹升汁去滓下米

合煮粥食之備預百要方同

治小兒驚癇發動無時母猪乳汁方右母猪

小乳汁三合以絲纏浸乳汁令小兒吮之唯

多佳矣其脈數口合則之曰三五

驚癇鍼灸皆身熱出也

千金方

小兒新生無疾慎不可進針灸之如逆針灸

則忍痛動其五脉因喜成癇河洛關中土地

多寒兒喜病瘕其生兒三日多逆灸以防之

人灸頰以防噤有噤者舌下脉急牙車筋急

其土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤也吳

蜀地濕無此疾也古方既傳之今人不詳南

北之珠便按方而用之是以多害於小兒也

所以田舍小便任其自然白得無有天橫也

小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解慎不可

針灸爪之動其百脉仍因驚成癇也惟陰癇

喉癭可針灸爪之凡灸癭當先下兒使虛乃
承虛多之未下有實而灸者氣逼前後不通
殺人癭發平日者在足少陽晨朝發者在足
厥陰日中發者在足太陽黃昏發者在足太
陰人定發者在足陽明夜半發者在足少陰
右癭發時病所在視其發早晚灸其所也
夫癭有五藏之癭六畜之癭或在四肢或在
腹內當審其候隨病所在灸之雖少必瘥
若失其要則爲害也

肝癭之爲病面青目反視手足搯灸足少陽
厥陰各三壯

心癭之爲病面赤心下有熱短氣息微數灸
心下第二肋端宛宛中此爲巨闕也又灸
手心主及少陰各三壯

脾癭之爲病面黃腹大喜痢灸胃管三壯俠
胃管傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癭之爲病面目白口沫出灸肺輪三壯又
灸手陽明太陰各二壯

腎痛之爲病而黑正直視不搖如尸狀灸心
下二寸二分三壯又灸肘中動脈各三壯
又灸足太陽少陰各二壯
膈痛之爲病目反四肢不舉灸風府又灸頂
上鼻人中下脣承漿皆隨年壯

腸痛之爲病不動搖灸兩承山又灸足心兩
手勞宮又灸兩耳後完骨各隨年壯又灸
臍中五十壯

右玉臍痛證候

小兒暴癩灸兩乳頭女兒灸乳下二分
治小兒暴癩者身軀正直如死人及腹中雷
鳴灸太倉及臍中上下兩傍各壹寸凡六
處又灸當腹度取背以繩繞頸下至臍中
竭便轉繩向背須脊下行盡繩頭灸兩傍
各壹寸五壯
若面白啼聲色不變灸足陽明太陰
若目反上視眸子動當灸顙中取之法橫度
口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去

鼻度半都合口爲度從額上髮際上行度
之灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手
動者是此最要處也次灸當額上入髮二
分許直望鼻爲正次灸其兩邊當目瞳子
直上入髮際二分許次灸頂上廻毛中次
灸客主人穴在眉後際動脈是次灸兩耳
門當耳開口則骨解開動張陷是也次灸
兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也壹法
大人當耳上橫三指小兒各自取其指出

次灸兩耳後完骨上青脈亦可以針刺令
血出次灸玉枕項後高骨是也次灸兩風
池在項後兩轆動脈外髮際陷中是也次
灸風府當項中央髮際亦可與風池三處
高下相等次灸頭兩角兩角當廻毛兩邊
起骨是也
右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三
十日可灸五壯五十日可灸七壯病重者
具灸之輕者惟灸顙中風池玉枕也艾

使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷故無益也

若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取之當瞳子是次灸臏中次灸胃堂次灸臍中次灸薛息薛息在兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨闕大人去鳩尾下壹寸小兒去臍作六分分之去鳩尾下壹寸是也并灸兩邊次灸胃管

次灸金門金門在穀道前囊之後當中央是也從陰囊下度至大孔前中分之

右腹部十一處胃堂巨闕胃管十日兒可灸三壯一月已上可五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯
若脊強反張灸大椎并灸諸藏輸及督脊上當中從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也
右背部十二處十日兒可灸三壯壹月已

上可灸五壯

若手足掣癱驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次灸心主次灸合谷次灸三間次灸少陽

右手部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少陽也壯數如上

又灸伏兔次灸三里次灸腓腸次灸鹿溪次灸陽明次灸少陽次灸然谷右足部十四處皆要可灸壯數如上

手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之

若風病大動手足掣癱者盡灸手足十指

端又灸本節後

直指小兒方

慢驚慢脾危惡證候藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太衝脈即灸百會穴其穴當直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在額頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正者非所捏艾柱約如小棗許但

三五壯而止灸後仍與醒脾之劑米煎
得效方

治急慢驚風危極不可救者先當兩乳頭上

男左女右灸三壯次灸髮際眉心顙會三

壯手足大指當甲角以物縛兩手作壹處

以艾騎縫灸男近左邊女近右邊半甲半

肉之間灸三壯先脚後手亦可治陰陽諸

癩病艾炷如麥子大

衛生寶鑑

初生小兒臍風撮了灸然谷穴三壯鍼入三
分不宜見血立效

小兒癩癩瘰癧脊強互相引灸長強穴叁十
壯

施圓端效方

治月內嬰兒胎風驚風慢風潮搐涎堵目直
口噤乳食不下壹切驚風背治

一項中央百會穴一二七壯 鼻下人中

穴三壯 壹顙周四角各三壯 鼻上天

小兒風熱夜啼

風熱夜啼冷

聖惠方

治小兒驚啼諸方

釣藤散 龍齒散 牛黃散 犀角丸

赤芍藥散 牛黃丸 雄黃丸 虎睛丸

千金湯 伏龍肝丸 麝香散 蝟皮散

栢子仁散 雷丸浴湯

治小兒夜啼諸方

人參散 芍藥散 犀角散 羚羊角散

釣藤散 五味子散 石膏散 乳頭散

牛黃丸 牡丹丸

治小兒軀啼諸方

牡蠣散 牛黃丸

治小兒胎寒諸方

當歸散 雀糞丸 調中丸

和劑局方

釣藤膏 紫蘇子散

王嶽產書

兒子初生將護法

小兒夜啼以術及符療之

小兒藥證直訣

常歸散 花火膏 白玉散

三因方

夜啼四證

蒜丸 燈花散 黃土散

人是齊醫方

燈花膏

瑣碎錄

直指小兒方

夜啼證治

釣藤散

保童秘要

夜啼諸方

得效方

夜啼

效身書

五

導赤散 六神散 安神圓

澹軒方

夜啼

肘後方

常歸散 五味湯

澹察方

童齒散

拔粹方

夜啼

五味子散

聖濟總錄

小兒驚啼

牛黃丸 蛇黃散 虎睛丸 清神散

青金丸 鷄腦丸 雀屎丸 升麻湯

黃芩散 代赭丸 真珠丸 龍齒丸

桃紅丸

小兒夜啼

芍藥散 桂心湯 芎藭散 伏龍肝丸

效驗方

立效散 蓮心散 黃耆丸 代赭丸

疏丹丸 半夏丸

王氏集驗方

小兒門 二十三

啼

醫方大成

胎驚夜啼

乳頭散

永類鈴方

鈎藤膏 乳附元 乳沉膏 紅輪散

蟬花散 朱砂五苓散 洗心散 蘇合

香元 五味子散 養臟湯 萬金散

經驗良方

鈎藤膏 魏香散

醫林方

新效方

壽域神方

衛生易簡方

夜啼

夫小兒夜啼不止者常用燈花壹枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花壹枚服罷此藥於淨室中卧壹兩日則止也

拗哭不止

夫小兒拗哭不止或一二日或三四日乃邪祟之氣湊于心則拗哭不止也有藏經一法以絲絹帶縛手足訖用三姓婦人淨掃驢槽卧小兒於其中不令傍人知而覩之俟移時

則拗矣自止也

十形三療

小兒悲哭不止

壹小兒悲哭弥日不休兩手脉絃而緊戴人曰心火甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心爍則痛甚故爍甚悲益先令浴以温湯清形以爲汗也肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服涼隔散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉隔中之

邪熱 永類 鈐方 夜啼 證治

鄭氏分兒啼痛有十驚啼夜啼軀啼盤腸氣
吊啼驚風內吊啼胎寒胃冷啼胎熱伏心啼
心腹刺痛啼邪干心痛啼乳食作痛啼然各
有陰陽冷熱之不同惟夜啼乃陰盛於夜爲
臟冷之證陰極發躁寒盛作疼啼而不哭是
痛故直聲來往而無淚哭而不啼是驚故連

聲不絕而多淚演山則云啼而不哭爲煩哭
而不啼是燥陰陽之分又在此其證腹冷而
痛面青白大便瀉青白頭低身曲眼閉肚緊
夜半後發

又有邪熱在心爲熱所乘炎上而焦哭口中
熱面紅舌白腹熱小便赤啼時有汗在掌夜
前啼先當清導小腑重則胸突頭反喜燈又
宜疎利又有客忤中惡兒目有所見而口
不能言而驚哭日夜哭上燈前後甚者其兩

手虎口皆無脉紋而變五色又有口瘡重
舌口到乳上即啼身額微熱急以燈照非口
瘡即舌腫所致王氏云小兒夜啼非有鬼祟
因胎熱伏心燥悶驚啼水鏡論云天蒼蒼地
王王小兒夜啼踈客寔心舍即客堂踈者轉
瀉也

千金方

小兒夜啼

龍角圓治小兒五驚夜啼方

崔氏名五驚丸

龍角

六銖

牡蠣

壹作川

大黃

各九銖

黃芩

半兩

蟬

二枚

牛黃

如小豆五枚

右六味末蜜丸如麻子葶裏兒服二丸隨
兒大小增減○聖惠方治小兒驚啼及吐
熱心煩眠卧不安睡中或時搐搦龍角
黃芩半兩川大黃半兩蒸三度牡丹一分蚱蟬二枚
去足頭牛黃壹錢右件藥搗羅為末入牛
黃研勻鍊蜜和丸如菉豆大每服煎金銀
湯研五丸服量兒大小增減服之聖濟總

錄治小兒驚啼五驚龍角鎊黃芩去黑大

黃微炒各半兩牡丹皮壹分蚱蟬一枚炙去頭牛黃如小

豆大五枚研入右六味搗羅為末鍊蜜為丸如麻

子大每服二粒用米飲下日夜共五服更

隨兒大小加減一方去牛黃

芎藭散治小兒夜啼至明即安寐方聖惠方聖濟總錄不得

安寐利未效

芎藭白木防已各半兩

右三味治下篩以乳和與兒服之量多少

又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗

二十日兒未能服散者以乳汁和服如麻

子一丸肘後方同兒大能服散者以意斟酌與

之○聖惠方右件藥搗細羅為散一月及

百日兒每服一字以乳汁調服半年至壹

歲兒每服半錢粥飲調下日三四服聖濟德錄

半年至壹歲兒每服半錢七米飲調亦得

日五服不計時量兒大小加減服之又以

斗錢乳汁調塗手心并臍中亦以摩兒頂上及脊至驗

一物前胡圓治少小夜啼方前胡隨多少搗

末以蜜和丸如大豆服一九日三稍加至

五六丸以差為度王氏集驗方同○聖惠方治小

兒腹痛夜啼前胡二兩去蘆頭右檉羅為末鍊

蜜和丸如棗豆大每服以溫水研下三丸

量兒大小加減服之肘後方前胡檉羅蜜

丸如小豆日服壹丸熟水下至五六丸

易簡方五七丸以差為度聖濟總錄治小兒夜啼

前胡丸方前胡去蘆頭二分右壹味搗羅為末

鍊蜜丸如麻子大一月及百日兒每服三

丸用乳汁下半年至一歲兒每服五九日

三夜一

又方以姪娠時食飲偏有所思者物以此哺

兒則愈聖濟總錄同

又方伏龍肝各壹把交道中土

右二味治下篩水和少許飲之聖濟總錄備預百要

方○聖惠方治小兒腹痛夜啼神巧萬全方此下云

至夜輒劇狀似鬼祟交道中土伏龍肝各半右件藥

同研令細每服以溫水調半錢服之

又方取馬骨燒灰傅乳土飲兒啼即止肘後方同

○聖惠方馬骨燒灰右擣細羅為散不計時候以乳汁調下壹字

治小兒夜啼不已醫所不治者方取狼屎中

骨燒灰為末服如黍米粒大三枚即定○

聖惠方狼糞中骨燒灰右細研為散壹月

及百日兒每服一字用乳汁調服半年至

壹歲兒每服半錢日夜四五服量兒大小

以意加減服之

治小兒驚啼方取雞屎白熬末以乳服之佳

又方酒服亂髮灰

又方車轄脂如小豆許內口中備預百及臍要方同

中王氏集驗方同

又方臘月縛猪繩燒灰服之

又燒蝟皮三寸灰著乳頭飲之

千金湯治小兒暴驚啼絕死或有人從外來

邪氣所逐令兒得疾眾醫不治方

蜀椒千金翼方蜀漆左顧牡蠣各陸銖碎

右二味以酢漿水壹升煮取五合每服壹合

當歸圓治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青

涎下方壹名黑丸

當歸 狼毒各九銖 吳茱萸壹作杏人 蜀椒各半兩

細辛 乾薑 附子各十銖 巴豆十枚 豉七合

右九味搗七種下篩秤藥末令足研巴豆

如膏稍稍內末搗令相得蜜和乘杯盛蒸

五升米飯下出搗壹千杵壹月兒服如黍

米壹丸日壹夜二不知稍加以知為度亦

治水癰

海上仙方

小兒夜哭最堪憐徹夜無眠苦逼煎甲午末

兒臍上貼清清悄悄自安然

小兒夜啼哭燈花二四枚燈心湯化下一夜

免悲哀

食醫心鑑

治小兒夜啼法聖惠方治小兒腹痛夜啼

右人定後閉氣書臍下作田字

聖濟總錄
肘後方同

○壽域神方於兒臍下用朱筆書田字豈

簡即差衛生易簡方同瑣碎錄濃磨墨就小兒臍

小孔上大書田字二四外微心處亦一

小兒藥證

小兒風熱夜啼

但小兒自乳哺至旬年中外有疾咸俱氣脉
和即四服敷定乖即五藏虧常或擁毒所食
或冷不成致使熱徐方盛冷逼下元心躁脾

肝胃口滯悶旋招風歷復值熱增晝可調伏
夜多驚叫並是擁煩上鬲客熱轉極雖欲辨
實多為悞理此狀真風熱夜啼也是小兒本
病非以諸家載述今證藥源用方救治

風熱夜啼吟

蛇黃犀角定神魂各壹分甘草牛黃要伴君各半

分茯苓且得為真使半人參却待入咸秦

壹分朱砂豈問丁香毋各半為覓防風及細

辛分各半 蚱蟬結得乾蝎至各半 由茱萸話

不須論壹分

右件已上壹十三味擣為散以淡竹葉壹合調壹錢散徐徐下之再服

聖惠方

治小兒驚啼諸方

夫小兒驚啼者由風熱邪氣乘於心則心藏生熱精神不定睡臥不安故驚而啼也
治小兒驚啼壯熱心煩不得穩睡宜服釣藤散方

釣藤壹分 龍膽壹分 犀角屑壹分 茯神壹分 黃

芩壹分 甘草壹分 微赤剉

右件藥擣細羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五分去滓量兒大小發減頻服之

神巧萬全方同

治小兒驚啼煩熱眠不安龍齒散方

龍齒半兩 麥門冬半兩 赤芍藥壹分 川升麻壹分

一川大黃壹分 碎微炒 甘草壹分 微赤剉

右件藥擣羅為散每服一錢以水壹小

盞煎至五分去滓量兒大小分減頻服之

治小兒風熱驚啼牛黃散方

牛黃

一分細研

犀角屑

一分

人參

一分去蘆頭

防風

一分去蘆頭

細辛

一分

蚱蟬

一分去頭微炙

朱砂

一分細研

甘草

一分微赤剉

右件藥搗細羅為散入研了藥匙研令勻

壹二歲兒每服一字用竹瀝調服至四歲

兒每服半錢不計時候服

治小兒驚啼不止犀角丸方

代黃

犀角屑

半兩

羌活

一分

胡黃連

一分

龍齒

一分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每

服煎金銀湯研破三丸服之日三四服量

兒大小以意加減

治小兒初生及壹年內兒多驚啼不依或不

得眠時時肚脹有似鬼神所為赤芍藥散

方

赤芍藥

壹分

桂心

壹分

白朮

一分

甘草

一分炙川

大黃

壹分剉碎微炒

右件藥搗細羅為散每服壹錢以水膏小
盞煎至五分量兒大小加減溫服

治小兒驚啼煩悶壯熱少得睡牛黃丸方

牛黃半分牡蠣壹分燒壹分川大黃壹分判壹分黃芩壹分龍角壹分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大滿
月兒以乳汁研破服二丸壹歲兒以薄荷
湯下五丸餘以意加減服之

治小兒驚啼發啼即熱朝于惕惕大便或青

或黃赤白雄黃丸方

雄黃兩牛黃兩牡蠣兩真珠末兩

巴豆三枚去皮心研出油

右件藥都研為末鍊蜜和丸如黍米粒大
小兒一月或五十日未發時飲服三丸毋
抱臥炊一斗米填兒當寐身體輕汗出即
解一服不解可再服若小兒傷乳不安腹
中有痰乳當微下如鰲鷄子鳥屎鼻涕勿
恠便住服藥

治小兒驚啼熱實顏色萎瘁腹中堅積不可
乳哺兼去風癩虎睛丸方

虎睛人壹枚犀角屑兩子芩半兩○聖濟

川大黃三分判碎微炒○梔子人三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一

二歲兒用乳汁研破三丸服之三四歲兒

每服五丸溫水研破服之不勒時節微利

為度總錄此下云若利頻隔日壹服如兒

有虛熱更入知母半兩量見大小加減服之

治小兒驚啼氣欲絕者或有人從外來入戶

邪隨人來或令兒見鬼其病眾醫不損宜服

千金湯方

蜀漆兩牡蠣壹分燒

右件藥搗羅為散每服壹錢以醋漿水

壹小盞煎至五分去滓溫服如口噤不能

服令人舍吐與兒喫以差為度量兒大小

加減服之○聖濟總錄治小兒因客忤驚

啼蜀漆炒令烟左顧牡蠣燒過右二味

擣篩壹二歲兒每壹錢匕以漿水半盞煎至三分去滓分温二服空心日午各壹兼治小兒著噤更隨兒大小以意加減

治小兒驚啼及夜啼不止伏龍肝丸方

伏龍肝壹分朱砂壹分麝香半分

右同細研蜜和丸如菉豆大候啼卽以温水調一丸與服必效量兒大小以意加減服之

治小兒驚啼發歇不定方右取鷄屎白炒黃

爲末以乳汁調服一字○肘後方燒鷄屎

白白米飲下備預百要方小兒夜啼鷄屎

白米飲下

治小兒驚啼肘後方有發歇二字不止面青腹脹是中

客忤麝香散方

麝香真好者

右細研如粉每服以清水調下壹字聖濟總錄

同備預百要方作壹錢日三服更量兒大小加減服

之衛生易簡方同

治小兒驚啼蛭皮散方

蛭皮燒灰

右細研如粉壹二歲兒每服壹字用乳汁調服三四歲兒每服半錢不勒時候服之
○肘後方治小兒卒驚啼狀如物刺燒蛭皮三寸為末乳頭飲兒飲服亦得

又方亂髮青兩燒灰

右細研如粉每服以溫水調下一字肘後方燒亂髮酒調服之備預百要方與肘後方同

又方車脂壹分

右水研少許內口中及傅臍中○備預百
大要方車缸脂豆大許內口中
治小兒驚啼狀如物刺栢子人散方

栢子人壹兩

右件藥搗細羅為散壹二歲兒每服壹字用粥飲調服三四歲兒每服半錢壹日三四服更量兒大小加減服之
治小兒寒熱驚啼不安雷丸浴湯方

雷丸三分牡蠣三分黃芩三分細辛三分蛇床子兩
右件藥以水壹斗煎取七升去滓分爲兩
度看冷煖用先令浴兒頭勿令水入耳目
次浴背膊後浴腰已下浴訖避風以粉撲
之

治小兒夜啼諸方

夫小兒夜啼者由藏冷故也夜陰氣盛與冷
相傳則冷動冷動與藏氣相并或煩或痛故
令小兒夜啼也然亦有犯觸禁忌亦令兒夜

啼則可以法術斷之

治小兒夜啼不可禁止人參散方

人參半分去蘆頭半分茯神半分甘草半分川大黃半分

剉碎微炒蛇黃半分牛黃半分犀角半分白芥子半分

微炒

右件藥搗細羅爲散每服用水煎柳枝桃
枝湯調下半錢頻服效量兒大小加減服
之

治小兒夜多啼不止胃滿氣脹膈中氣逆吐

嘔腹痛芍藥散方

赤芍藥兩半桂心兩半芍藥兩半黃芩兩半薯蕷兩半

右件藥搗細羅為散一月及百日兒每服

一字粥飲調下半年至一歲兒服半錢連

夜三五服隨兒大小以意加減服之效

治小兒夜啼及驚熱犀角散方

犀角屑壹分鈞藤壹分川升麻壹分人參三分去

黃芩壹分甘草壹分微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓量兒大小分減服之

治小兒夜啼及多驚熱羚羊角散方

羚羊角屑壹分黃芩壹分犀角屑一分甘草壹分

赤茯苓一分麥門冬半兩去

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小

盞煎至五分去滓量兒大小分減服之

治小兒夜啼及驚掣鈞藤散方

鈞藤壹分龍膽壹分去

犀角屑壹分茯苓一分黃

右件藥搗籠羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服

治小兒夜啼及多腹痛至夜輒劇狀似鬼祟

五味子散方

五味子半兩當歸半兩剉微炒赤芍藥半兩白朮半兩

甘草一分桂心一分聖濟總錄去麝皮

右件藥搗籠羅為散每服壹錢用水壹小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫溫服

之○總錄右六味籠搗篩壹月及百日兒

每壹錢七用水半盞煎至三分去滓分溫

二服兒大以意增之連夜三五服

治小兒夜啼壯熱驚懼石膏散方

石膏兩人參兩龍骨兩

右件藥搗細羅為散每服一錢用水一小

盞煎至五分去滓量兒大小分減溫溫服

之

治小兒夜啼不止腹中痛宜以乳頭散方

黃耆壹分 甘草一分炙 當歸壹分判 赤芍

藥壹分 木香壹分

右件藥搗細羅為散每服取少許著乳頭

上因兒喫乳服

治小兒夜啼多驚煩熱牛黃丸方

牛黃壹分 朱砂壹分 盧會壹分 麝香壹分

白殭蠶半兩 龍齒一分 當歸壹分

赤芍藥一分 鈞藤一分 蝸牛壹分 代赭一分

蠟一分 燒一分

右件藥搗羅為末研入研了藥令勻鍊蜜

和丸如麻子大壹月及百日兒每服用薄

荷湯下三丸半年至壹歲兒每服五丸連

夜三服量兒大小加減服之

治小兒腹痛夜啼牡丹丸方

牡丹一分 代赭半兩 赤芍藥半兩 麝香壹分

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

麻子大每服以蜜湯研下三丸連夜四五

服

又方瘡蟲半分赤芍藥一分芎藭一分

右件藥搗羅為末每服以溫湯調下半錢

量兒大小加減服之

又方虎睛人一對

右細研如粉每服壹字用竹瀝調下口三

服三服

又方右以牛黃如小豆大乳汁化破服之後

方衛生易簡方同

又方右取樹孔中草著尺止立止合

又方右以敗甕帶懸於戶上差方聖濟總錄

又方右取犬頸下毛以絳囊盛繫兒兩手臂聖濟總錄

又方右取無臂字上立止神效萬全方同

又方右以車輞盜安毋臥牀下勿令毋知聖濟

又方右取荒廢井中敗草懸戶上良聖濟總錄

又方右取牛糞灰安毋臥牀下勿令毋知聖濟

又方右取牛糞灰安毋臥牀下勿令毋知聖濟

又方右取牛糞灰安毋臥牀下勿令毋知聖濟

又方右取牛糞灰安毋臥牀下勿令毋知聖濟

又方右取牛糞灰安毋臥牀下勿令毋知聖濟

席下勿令母知子母傷吉 藥性下大安

治小兒夜啼符法三道

神巧萬全方 瑣碎錄同

厲印

此符左右手中貼之

甲

此符膺中貼之

水鬼

貼房門上

治小兒軀啼諸方

夫小兒在胎之時其母將養傷於風冷邪氣及於胞中傷兒藏腑故兒生之後邪猶在兒腹內邪動與正氣相搏則腹痛故兒軀張蹙氣而啼也

治小兒軀啼或吐瀉腹脹胃滿牡蠣散方

牡蠣

壹分燒為粉

伏龍肝

一分細研

甘草

壹分炙蒼

天木

壹分剉炒熟

麝香

半分細研

右件藥於木臼內搗細羅為散每服半錢

研陳米泔澄清煎竹茹湯調服量兒大小

增減服之

神巧萬全方同

治小兒軀啼不止牛黃丸方

牛黃

壹分細研

代赭

三分

牡丹

三分麝香

壹錢細研

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

菜豆大每服以溫水下兩丸

治小兒軀啼驚癩腹滿不乳食大便青白色

方

馬齒白礬

燒半日

右細研以棗肉和丸如菜豆大每服以溫

水下壹丸

又方 經驗良方治小兒軀啼面色青右以新

馬糞壹塊絞取汁與服之

又方燒猪糞以沸湯淋取汁看冷暖浴兒并

與少許服之

又方右取臘月縛猪繩燒灰細研以溫水服

半錢

又方右取栢子人末溫水調半錢 肘後方 服

之

治小兒胎寒諸方

夫小兒在胎時其母將養取冷過度冷氣入胞傷兒腸胃故兒生之後冷氣猶在腸胃之間其狀兒腸胃冷不能消乳哺或腹脹或時

穀痢令兒顏色青白巢氏病源作素肥時啼者是胎寒也

治小兒胎寒聚唾弄舌軀啼反張怒驚當歸散方

當歸半兩到黃耆半兩到細辛半兩黃芩半兩龍

骨半兩桂心半兩赤芍藥半兩

右件藥搗細羅為散每服以乳汁調下壹字日三服更看兒大小以意加減服之妙

治小兒胎寒軀啼温中止痛雀糞丸方

雄雀糞壹分牛黃半兩赤芍藥半兩芍藥半兩當

歸壹兩到微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大百粒日兒每服以乳汁下壹粒日三服量兒大小以意加減服之

治小兒胎寒虛脹滿不嗜食大便青夾白膿及欲發痲官服調中丸方

當歸半兩到川椒壹分去目及閉附子壹枚

去皮狼毒半分巴豆二十枚去皮杏仁二十

枚湯浸去皮細辛豉四合炒

尖炒微黃右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵以

器盛之未滿百日兒以溫水下壹丸如麻

子大一二歲兒服二丸量兒大小以意加

減服之以利為度

治小兒五十日以來胎寒腹痛微熱而驚聚

唾弄舌軀啼上視此癩之候宜服此方

猪腎一具薄切當歸一兩剉

右只當歸一味去脂膜當歸微炒和以清酒一

升煮至七合去滓每服取如杏人大令兒

嚙之日三服夜壹服量兒大小以意加減

又方衣中白魚二七

右以薄熟絹苞裹於兒腹上迴轉摩之以

差為度

和劑局方未

釣藤膏治小兒胎寒胃冷腹肚疔痛夜間啼

哭嘔吐乳食大便瀉青狀若驚搐時有冷汗

木鼈子

二十箇 去油研

木香

沒藥

別乳香

各別研

錢薑黃

二錢

右為細末煉蜜和成膏每服三錢兒壹圓

如鷄頭實大煎釣藤湯化下更量大小加

減不拘時候

一本無

紫蘇子散小兒啼氣未定與乳飲之與氣相

逆氣不得下

紫蘇子

微炒

人參

去苗

訶梨動皮

去皮

黃蘿蔔子

微炒

木香

各半

青皮

去白

甘草

微炙

兩

右為細散每服壹錢以水壹盞入生薑錢

少許同煎至五分去滓溫服不計時候量

兒大小加減

玉嶽產書

兒子初生將護法

夫兒子才生急以絛裹指拭口中及舌上如

青泥者此謂之玉衝若不急拭去之兒壹發

啼即惡物入腹成百病也又生落不作聲者

冷水壹氣灌之須臾卽啼又法葱細細鞭之卽啼又兒生當急舉之舉之遲晚則寒中腹內如雷鳴仍先洗之然後斷臍斷臍不得以刀子割看坐者隔物咬斷兼以溫氣呵之然後纏結所留臍當令長至兒足短則中寒腹內不調常如下痢若先斷臍然後浴者則臍中有水發腹痛其臍斷訖餘臍帶中多有蟲宜撥去之不爾當入腹成病又法斷臍當令長六寸太長則傷膚太短傷臟兒生後若不

急斷臍遂令暖氣微寒氣生令兒風入臍又兒生宜以父故衣裳裹之女用母故衣裳裹之皆不得用新帛又云一周之內兒衣裳皆須用故繇帛爲上又不得太厚及熱也凡兒生下不得便與乳且宜以濃甘草汁甘草以炮過以繇筋搵令兒吮之仍體候其飢飽去其心胃中惡物退血糞令盡方與其乳喫或晝日或壹夜則方與乳專體兒生後每日數度抱兒就明無風其飢飽處看兒上腭及齒斷上如有白點子急以針

桃却及有黃筋亦火急以針撥斷仍以胡粉
 紙燭子煖去之或點猪乳三兩徧則差此名
 撮口七日內大須在意若覺吮妳不穩及啼
 聲不通暢即是也如牙關急而赤不多啼口
 角吐沫此名爲著噤速以竹瀝壹合分爲四
 服與喫凡初生小兒頻以軟帛纏指搵新汲
 水洗拭其口仍看口中穩否牙關寬否兒多
 啼聲小吮妳不穩則有痰也
 小兒夜啼以術及符療之

屍

書小兒心山吉

甲

小兒夜啼書臍中

田

書小兒臍中同上

右術以鐵銼候入夜密於兒睡處牀下覆
 之無令人知則愈矣

兒藥證直訣

當歸散凡小兒夜啼者臟寒而腹痛也面青
 手冷不吮乳是也宜此方

當歸

去蘆頭切焙研

白芍藥

人參

各壹分

甘草

分壹作二分

桔梗

陳楠皮

各壹錢不去白

右為細末水煎半盞時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人參湯下

花火膏治夜啼

燈花壹顆壽域神方衛生身簡方燈心燒灰

右以下塗乳上令兒吮乳聖濟總錄同

白玉散

白土壹分寒水石兩半

右末之用米醋或新水調塗

三因方

夜啼四證

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹暖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳不得口到乳上即啼身頭皆微熱急取燈照口若無瘡舌必腫也客忤者見生人氣忤犯而

啼也

蒜丸治冷證腹痛夜啼

得效方此下云面青手冷

大蒜

一顆慢火煨香熟取出細切乳香

別研

右研勻丸如芥子大每服七粒乳空時乳

頭以乳汁送下

燈花散治熱證心躁夜啼

燈花

三兩顆○經驗良方芝麻清油燈火衛生易簡方二枚或四枚

右研細用燈心煎湯調塗口中以乳汁送

下日三服

醫方大成集成南北經驗方袖珍方壽域神方同

治客忤夜啼法用本家廚下火柴頭壹个吹

滅者以朱書云吾是天上五雷公將來作

神將能收夜啼鬼壹縛永不放急急如律

令柴頭以火烧焦頭爲止書了勿令兒知

並床下倚床前脚裏男左女右

黃土散治小兒卒客忤

經驗良方客忤夜啼

黃土散治小兒卒客忤

各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良得效

效驗

方

是齊醫方... 治小兒夜啼錢文子傳錢氏小兒方有之謂
之燈花膏但只用一味此方加下二味

燈花七箇鵬砂一朱砂少

右搗研令極細以蜜調成膏俟兒睡時以

少許抹口唇上立驗

寶錄錄以朱書云清景天土正雷公都來

辟小兒夜啼法火柴頭壽域神方火柴頭削

一而用朱砂寫撥火杖撥火杖差來作神

將捉着夜啼鬼神方打殺莫要放急急如

律令衛生易簡方同神方
此下云放於床下

又法火柴頭削寫平天皇皇地皇皇小兒夜

啼書籠床屢驗一作客堂蓋書穴名也

又法以枝壹條銅下挑火火些了書桃枝上

曰我身本是桃花杖被人捉作為神將聞

說人問夜啼鬼捉把將來永莫放即以此

桃枝挂房門小兒當夜不啼

又法用竈下撥火柴捧夜間撐房門勿令兒

并姊母及房內人知自然不哭
直指小兒方門小兒驚風不語

夜啼證治
夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發燥寒盛作疼所以夜啼而不歇也
釣藤散主之

釣藤 伏神 川芎 當歸 鼠尾

香 各壹錢 炙半

右末每服壹錢薑棗略煎服其或心熱而

煩夜必有臉紅舌白小便赤澁之證釣藤散去當歸木香加朱砂末一錢研和每服壹錢木通煎湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者醋炭熏服蘇合香圓急以方術驅之又方證心燒灰存性塗傅乳上與之保童秘要

內夜啼諸方

夜啼方

升麻 人蔘 各一分 吊藤 犀角 各半 黃芩

三

右以水四大合煎取壹合半去滓百日已
內兒一日將半合分三度與服之

得効方

夜啼

導赤散治心燥啼面赤小便赤口中熱腹
上亦熱或有汗仰身而啼至曉方息加黃
芩煎未效通心飲加麥門冬車前子燈心
薄荷煎或用燈心燒灰塗乳上與兒飲亦

効

方並見
諸熱

六神散治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦
冷曲腰而啼或大便泄瀉青白糞及不吮乳

人參

山藥

白朮

各半

甘草

白茯苓

白扁豆

炒各
壹兩

右為末每服壹錢薑三片棗壹枚煎壹方

用當歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗

陳皮各壹錢為散每服二錢水煎時時與

服

安神圓治外客忤犯夜啼金銀湯化開服方見
驚觸犯禁忌夜啼方服蘇合香圓以醋炭重
及用

方術驅之口到乳上便啼身額必微熱急
看口內或瘡或重舌依前口瘡重舌類治
之其啼自止

澹軒方而謂知大野...

夜啼與...

燈花塗乳餒嬰兒夜後啼悲自可治更取井

邊數葉草置之薦下莫遲遲拾得燈花十

个佳鵬砂壹字少朱砂同為細末調生蜜

兒睡之時唇上搽

肘後方

好夜啼者取犬頸下毛貯絳囊中繫兒兩手

立止小品蜜丸前胡服如大豆一丸日三

佳

小兒汗出舌上白愛驚者衣厚過熱也鼻上

青及下痢青乳不消喜啼者衣薄過冷也

小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癩
宜急與當歸散當歸末之取小豆大以乳
汁與咽之口夜三四度王氏集驗方即差
澹寮方備預
百要方同

若不差常歸半兩小朮卵壹具並切之以酒
膏升二合同煮取八合服半合至一合隨
兒大小日三啼四神驗
隱居効方小兒夜啼驚不安此腹痛故也至
夜輒劇狀如鬼禍五味湯五味子當歸木

各四分甘草炙桂心各二分五物切以水
二升煮取壹升分為三服大良

子母秘錄治小兒夜啼胡粉服冰調三豆大
日三服

澹寮方

音齒散治小兒拗哭南北經驗方醫方不佳

音齒 蟬殼去翅足 釣藤有鈎 茯苓去人

參各等分

右為末每服壹大錢水一大盞煎六分去

滓溫服本事方○大成右為末每服壹錢

水半蒸煎服醫方集成南北經驗方袖珍方與大成同

拔粹方

夜啼

治法宜五味子散亦宜用燈花七枚研細乳
汁送下立已

五味子散治小兒夜啼及腸痛至夜輒劇狀

似鬼祟

五味子 當歸 赤芍藥 白朮 各半 茯苓

神 陳皮 桂心 甘草 炙各二錢半

右為末每服 神巧萬全方此下云壹錢量 用水壹小盞煎至五分

兒大小加減水煎

聖濟總錄

小兒驚啼

心藏神神安則藏和故小兒晝得精神安而
夜得穩眠若心氣不和邪熱乘之則精神不
得安定故暴驚而啼叫也

治小兒驚啼牛黃丸方

牛黃 丹砂 黃盧會 麝香 各研如粉 白殭蠶

龍齒 霜歸 焙切 芍藥 釣藤 蝸牛 燒炒令黃

色代赭 牡蠣 燒過各壹分

右壹十二味除前牛黃等四味研外餘並

擣羅為細末更同四味研勻鍊蜜和凡如

麻子大一月及百日兒每服三九半年至

壹歲兒每服五九並薄荷湯下日夜三四

服量兒大小加減

治小兒風熱驚啼蛇黃散方

蛇黃 講碎 犀角 鎊 人參 白茯苓 去黑皮 防

風 去 細辛 去苗土 蚱蟬 去翅足 乾蠹 醋拌炒 丹

砂 研 母丁香 山茱萸 微炒 甘草 牛黃 研

分壹

右壹十三味擣羅為散更研令細壹二歲

兒每服壹字匕用竹漉調服三四歲兒每

服半錢七日三服不拘時候

治小兒驚熱多啼不喫乳虎睛丸方

虎睛 細研二枚 犀角 屑壹 黃芩 去黑心 梔子人

大黃

剉碎微炒
各半兩

右五味除虎睛外搗羅為末再同研勻鍊蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日三四服量兒大小加減

治小兒驚熱啼叫睡臥不安清神散方

牛黃

研

天竺黃

研

鈎白霜

研

鬱金

研

麥門

冬

去心

甘草

炙各一分

人參

半兩

右七味搗研為細散每服半錢匕人參湯放冷調下乳食後服

治小兒體熱忽發吐逆夜多驚啼或泄或秘

變成慢驚或為疳疾定搐搦瘳疳蟲墜涎痰

安心神青金丸方

竜腦

研

麝香

研各壹分

墨

壹錢

使君子

煨兩枚

膩

粉

壹分

白麵

三分

青黛

二錢

金銀薄

各少許

右八味搗研為末滴井華水和丸如雞頭大每服薄荷湯化半丸

治小兒夜多驚啼欲成癩候雞腦丸方

雄雞腦

壹分

丹砂

研細半兩

牛黃

研細壹分

當歸

切焙壹分

右四味將當歸搗末以雞腦丹砂等拌和
 搗勻為丸百日兒服如黍米大壹丸日再
 服更看兒大小以意增減並用薄荷湯下
 治小兒癩候胎寒舌下聚唾夜啼不止雀屎
 丸方

雄雀屎

微炒

麝香

細研

牛黃

細研各壹分

右三味搗研令勻鍊蜜和丸如黍米大一
 月兒一丸百日兒二丸並用乳汁下日再
 更看兒大小以意加減

治小兒驚啼乳不消化升麻湯方

升麻

芍藥

甘草

炙

大黃

剉炒各半兩

右四味麤搗篩一二歲兒每服二錢匕水
 半盞煎至三分去滓溫服乳食後日三服
 量兒大小加減

治小兒心熱驚啼黃芩散方

黃芩

去心

人參

各壹分

右二味搗羅為散每服壹字匕竹葉湯調
 下不拘時候服

治小兒驚啼手足搐搦代赭丸方

代赭生用半兩鐵粉研丹砂研白附子各壹錢麝

香研龍腦研各壹字

右六味搗研細勻鍊蜜和丸如櫻桃大量大小加減薄荷湯化下

治小兒驚啼及夜啼不止真珠丸方

真珠末 伏竜肝 丹砂各壹分麝香壹錢

右四味同研如粉鍊蜜和丸如菉豆大候啼卽溫水下一丸量大小以意加減

治小兒夜啼竜齒丸方

竜齒 白殭蠶 當歸切芍藥 蝸牛

釣藤各半兩代赭研牡蠣煨各兩麝香研牛黃

研各一分

右十味搗研勻細鍊蜜和丸如菉豆大二歲兒三丸并華水化下量兒大小以意加減

治小兒驚啼眠睡不穩桃紅丸方

丹砂 麝香各半錢白附子半枚白殭蠶壹枚乾

蠍頭犀全膩粉七研金薄銀薄各二片研

右八味搗研為末水浸炊餅心和凡菜豆

大每服一九金銀薄荷湯化下看兒大小

臨時加減

小兒夜啼

經謂合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也夜為陰盛之時凡病在陰者至夜則邪氣亦甚嬰兒氣弱府藏有寒每至昏夜陰寒與正氣相擊則神情不得安靜腹中切痛故令啼呼於

夜名曰夜啼又有觸犯禁忌亦令兒夜啼者當以符術治之

治小兒夜啼腹痛芍藥散方

芍藥 芍藥 蟻蟲各壹分

右三味搗羅為散一月及百日兒每服壹

字七用乳汁調服半年至壹歲兒每服半

錢七連夜四服量兒大小加減服之

治小兒夜啼腹痛狀如鬼祟桂心湯方

桂去麤皮五味子半當歸切焙壹分枳殼去瓢

類聚方書

半廿草分

右五味麤搗篩一月及百日兒每壹錢匕

用水半盞煎至三分去滓分溫二服半年

至壹歲兒准前煎作壹服不計時候

治小兒夜啼至明即安寐芎藭散方

芎藭 防已 各半 人參 壹分

右三味搗羅為散二十日兒未能服者以

乳汁和之如麻子大壹丸以乳汁下兒大

能服散者每服壹字匕米飲調下壹日三

兩服

治小兒夜啼伏龍肝丸方

伏龍肝 壹分 丹砂 壹錢 麝香 壹字

右三味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服

五丸量兒大小加減俟夜深煎桃符湯下

治小兒夜啼立效散方

乳香 錢一 燈花 七枚

右二味同研為散每服半字塗妳母乳頭

上令服

類聚方書

百七

治小兒夜啼蓮心散方

石蓮心兩半人耳塞半錢乳香一分人參兩半燈

花壹分丹砂別研

右六味搗研為散每服半字匕薄荷湯調

下不拘時候

治小兒夜啼不止腹中疴痛黃耆丸方

黃耆 甘草炙當歸切芍藥 附子炮裂

皮乾薑各壹分

右六味搗羅為末用乳汁和丸如雞丸更

入少許麵糊丸如黍米大一月及百日兒

每服三丸用乳汁下半年至壹歲兒每服

五丸壹日三五服量兒大小加減服之

治小兒夜啼雞鳴即止代赭丸方

代赭醋淬七牡丹皮 芍藥 麝香別研

右四味搗研為末鍊蜜丸如麻子大壹月

及百日兒每服三丸用薄荷湯下半年至

壹歲兒每服五丸連夜三四服

治小兒夜啼硫丹丸方

硫黃壹分 鈆丹炒過

右二味同研如粉以小合子內盛不固濟

大火煨令煙盡候冷以竹筒中盛紙單子

封口埋在地下七日取出更研細用飯丸

如黍米大壹月及百日兒每服兩丸川冷

水下半年至壹歲兒每服五丸連夜三四服

治小兒腹中卒痛啼呼悶絕半夏丸方

半夏生薑汁洗去

滑暴乾壹分

右壹味搗羅為末用酒麴糊丸如黍米大

一月及百日兒每服三丸川薄荷湯下半

年至一歲兒每服五丸壹日三五服

治小兒夜啼豬屎浴方右取豬屎燒灰以沸

湯淋汁浴兒并與少許服之

又方右取死人朽棺木燒明照之即止

又方右以日未出時及日午時仰臥於臍上

橫紋中屏氣未書作血字其夜即斷聲

又方右取明鑑掛於床脚上差備預百

要方同

治小兒夜啼不止方

劉寄奴

兩半

甘草

壹指節許

地龍

炒分

右三味咬咀以水二盞煎至一盞去滓時

時與服

王氏集驗方

小兒夜啼天蒼蒼地王王小兒夜啼蘇客堂

客堂者心經也治以七寶洗心散之類是

也

醫方類聚卷之二百六中