

大德重校聖濟總錄卷第一百五十九



逆產門

逆產

產難

子死腹中

息胞



逆產

論曰逆產者蓋因妊婦初覺腹痛產時未至驚動傷早  
兒迴轉未竟便用力產之即令逆也又或安產之處及  
坐臥須順四時方面并避五行禁忌若觸犯者多致災  
禍

治難產或經數日或生不以理橫逆艱難百方千計終  
不平安者急服此藥在兒身上立生若妊娠入月便服  
臨產則身不覺兒出酥膏方

真牛酥壹斤

秋葵子壹斤

白蜜半斤

大豆黃卷貳兩

滑石搗末貳兩

蘧麥壹兩

右六味先將藥四味爲末次取酥於慢火中煎化後  
下蜜攪勻將藥投入調和得所以瓷合盛每服一匙  
溫酒調下加至二匙

治橫產及倒生胎斃腹中及衣不出母欲絕半夏散方

半夏

爲末用生薑汁製  
作餅暴乾半兩

白飲兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下產難一服  
橫產一服倒生三服胎斃衣不出四服此方加瞿麥  
一兩煎服尤佳

治逆產不正小麥飲方

小麥

各煉  
淨炒

右二味等分羅搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分  
去滓溫服

治婦人橫產倒生死胎在腹脹爛不出催生柞木藥飲  
方

柞木葉

壹把圍參寸長  
寸并細枝子剉

甘草

壹莖長壹握  
如小柞指拍

破

右二味用水三升半慢火同煎至一升半去滓用瓷  
瓶盛紙封瓶口於產婦房內慢火煨先服一小盞少  
頃心頭快更服一小盞不問服數三四盞內惡物下  
尋常催生甚驗

治橫生倒產子死腹中胎衣不下烏金散方

當歸酒浸切焙

沒藥別研

生乾地黄焙

蒲黃生用

芍藥炒

紅藍花炒各壹兩

鯉魚鱗臘月者佳

桂去麤皮各貳兩

血餘小兒胎髮真者貳枚

右九味將血餘鯉魚鱗二味用銷銀鍋子先以炭火燒為灰沒藥別研餘藥搗羅為末和勻每服二錢匕溫酒調下不拘時

治難產經三四日或橫倒不出垂死滑胎煎方

瞿麥取穗壹兩

酥伍兩

滑石

葵子各貳兩

黑豆皮壹合

白蜜肆兩

牛膠去苗壹兩

右七味除酥蜜外搗羅為末將酥蜜鍊熟入諸藥末及牛乳汁五兩煎成煎以瓷器盛每服半匙溫酒或湯化下不拘時

治橫產倒生安胎酸漿飲方

五葉酸漿草不拘多少

右一味取自然汁半盞酒半盞染煙脂末半錢匕和勻溫飲之未効再服

治逆產法

大蒜柒顆去皮

生薑半兩

葱白去青各拾拍碎

右三味置在一盆子中以百沸湯五碗乘熱投於盆中速扶產婦於盆上坐候冷易之凡三易則胎正

又法

右取竈底心黃土細研五合以生薑汁煎令熱調如麩糊塗產母臍中以熟帛繫之頻換

又法

右取鹽和胡粉醋調塗兒兩足下卽順

又法

右取蒲黃用水調塗兒足心底

又法

右取丹砂末半錢匕蜜調塗兒足底又以丹砂筆書兒兩足底左作千字右作里字卽順

又法

右取三家鹽熬令黃研末以津唾調塗兒足底次取三家飯置產婦手中

又法

右以父名書兒足底卽順

又法

右取車釭中膏書兒足底作出字

又法

右以鍼刺兒先出足底兒足痛驚還即順手出如刺足法

又法

右以中指取釜底墨煤交書兒足下即順

治逆產及子死腹中艾葉湯方

生艾兩

右一味以清酒一升煮取七合旋服之則順或不飲

酒用水煮之

又方

大麻人淨搗研爛半兩

右一味以水二盞同煎至一盞去滓溫服

又方

右取牛齒涎絞以溫酒和服之

又方

右燒錢七枚令赤投一盞酒中去錢飲之

又方

葵花焙乾葵子亦得參兩

右一味搗羅為散每服二錢匕溫酒調服

又方

右取車輞上土以三指撮溫酒調服

又方

右取竈屋上黑塵以溫酒服二錢匕

又方

右取彈子二枚擣羅為散以溫酒調服二錢匕

又方

右取甌帶燒灰研散溫酒調服二錢匕

又方

右取蛇蛻皮燒灰研末溫酒調服一錢匕面東向服

一方取蛇皮灰豬脂丸如梧桐子大每服五丸面東

吞之

又方

右取晚蠶子紙一幅燒灰研末米飲調服

又方

右取夫十指甲燒灰研末以酒溫調服

又方

右取梁上塵三指撮以煖酒調服之

又方

右取菟絲子搗為末溫酒調服二錢匕

又方

右取車前子搗為末溫酒調服二錢匕

又方

當歸切焙  
壹兩

右一味搗羅爲末每服二錢匕溫酒調服

又方

大豆五合

右一味以苦酒二升煮減半分溫服之

產難

論曰臨產或難蓋爲和氣動亂心氣不寧所致也古人有預備方法臨月服滑胎散并日行一二千步貴使血氣下順至產無留難之慮欲產先須看產圖及催生湯

藥無致喧雜驚忙又須產間溫暖或遇嚴寒之日四圍燒火及備熱湯爇諸異香常令香火湯氣及身惟諳事人看候產婦纔覺腹痛速與食飲令飽無或困乏飢以雌雞煮粥湯以蠟蜜煎湯調以新汲冷水少飲或空痛經日而胎未動者宜安心熟忍以薦蓆鋪地就上安產免爲地氣所侵又就上行三五百匝或困於行暫且扶立須臾又行如血水俱下痛陣及腰此欲產之兆也諸餘法度宜次序行之

治難產不下經日車前子散方

車前子

微炒  
半兩

榆白皮刮淨剉滑石半兩



當歸切焙

瞿麥穗兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕用酒調下溫湯亦得

如血水未下用大黃二錢煎湯一盞分作三服調前

藥下

治產難催生如意膏方

蓖麻子

參朶粒去  
破研如膏

丹砂

半錢  
研細

右二味一處和研勻用油單一片方圓如蓋口大將

藥攤之當臍下少腹間貼之外以帶帛繫令固候產

罷并胞衣下畢速去之稍緩卽脫人氣血此藥覺腹

痛便宜用之

治難產經日未生牛酥煎方

真牛酥兩

秋葵子壹

白蜜兩

滑石

瞿麥穗

大豆黃卷各壹

右六味先以清酒一升研細葵子內酥蜜中微火令

銷後卽下諸藥慢火煎常如魚眼沸約強半如膏成

則將瓷器中以綿濾之用溫酒調初服半匙漸加至

一匙

治難產車前子煎方

車前子

壹升以布裹於水中熟接漉出日曝乾  
又以新布裹熟揀之令光滑不用持

生地黃汁壹

白蜜壹

好酥伍

右以鍼刺兒先出足底兒足痛驚還即順手出如刺足法

又法

右以中指取釜底墨煤交書兒足下即順

治逆產及子死腹中艾葉湯方

三生艾兩伍 煮於中

右一味以清酒一升煮取七合旋服之則順或不飲

又酒用水煮之

又方麻人爛半兩

右一味以水二盞同煎至一盞去滓溫服

又方

右取牛齡涎絞以溫酒和服之

又方

右燒錢七枚令赤投一盞酒中去錢飲之

又方

右取車輞上土以三指撮溫酒調服

又方

右取車輞上土以三指撮溫酒調服

又方

右取車輞上土以三指撮溫酒調服

又方

總錄一 百五十九

又方

右取竈屋上黑塵以溫酒服二錢匕

又方

右取彈子二枚擣羅爲散以溫酒調服二錢匕

又方

右取甌帶燒灰研散溫酒調服三錢匕

又方

右取蛇蛻皮燒灰研末溫酒調服一錢匕面東向服

一方取蛇皮灰豬脂丸如梧桐子大每服五丸面東

吞之

又方

右取晚蠶子紙一幅燒灰研末米飲調服

又方

右取夫十指甲燒灰研末以酒溫調服

又方

右取梁上塵三指撮以煖酒調服之

又方

右取菟絲子搗爲末溫酒調服二錢匕

又方

右取車前子搗爲末溫酒調服二錢匕

又方

當歸切焙壹兩

右一味搗羅爲末每服二錢匕溫酒調服

又方

大豆五合

右一味以苦酒二升煮減半分溫服之

產難

論曰臨產或難蓋爲和氣動亂心氣不寧所致也古人有預備方法臨月服滑胎散并日行一二千步貴使血氣下順至產無留難之慮欲產先須看產圖及催生湯

藥無致喧雜驚忙又須產間溫暖或遇嚴寒之日四圍燒火及備熱湯熬諸異香常令香火湯氣及身惟諳事人看候產婦纔覺腹痛速與食飲令飽無或困乏飢以雌雞煮粥渴以蠟蜜煎湯悶以新汲冷水少飲或空痛經日而胎未動者宜安心熟忍以薦蓆鋪地就上安產免爲地氣所侵又就上行三五百匝或困於行暫且扶立須臾又行如血水俱下痛陣及腰此欲產之兆也諸餘法度宜次序行之

治難產不下經日車前子散方

車前子

微炒半兩

榆白皮刮淨剉滑石半兩

當歸切焙

瞿麥穗壹兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕用酒調下溫湯亦得如血水未下用大黃二錢煎湯一盞分作三服調前

藥下

治產難催生如意膏方

蓖麻子

參朶粒去殼研如膏

丹砂

半錢研細

右二味一處和研勻用油單一片方圓如蓋口大將藥攤之當臍下少腹間貼之外以帶帛繫令固候產罷并胞衣下畢速去之稍緩卽脫人氣血此藥覺腹痛便宜用之

治難產經日未生牛酥煎方

真牛酥兩

秋葵子壹合

白蜜貳兩

木土豆

滑石

瞿麥穗

大豆黃卷各壹兩

右六味先以清酒一升研細葵子內酥蜜中微火令銷後卽下諸藥慢火煎常如魚眼沸約強半如膏成則將瓷器中以綿濾之用溫酒調初服半匙漸加至一匙

治難產車前子煎方

中車前子

壹升以布裹於水中熟接漉出日晞乾又以新布裹熟揀之令光滑不用搗

生地黃汁壹斤

白蜜壹斤

好酥伍斤

右四味相和微火煎常令如魚眼沸起卽瀉於瓷器  
中每服半匙以沸湯調通口服之

治難產數日不下蛇蛻皮丸方

蛇蛻皮

壹條  
燒灰

臘月兔腦髓

壹車脂  
暴乾

右三味除兔髓外搗羅爲末以兔髓揆和爲丸如梧  
桐子大每服二十九溫酒下

治難產滑胎貝母散方

貝母

壹兩半  
去心秤

槐子

十月上巳日採  
之能壹兩半

右二味搗羅爲散每服三錢匕以熱水調服未生更  
服

治難產產乳論云三十後嫁者謂之晚嫁也少嫁則筋  
骨軟懦易產也晚嫁則筋骨堅強所以難產入月宜常

服苧麻根飲方

乾苧麻根

新者刮削  
淨到研

陳橘皮

湯浸去  
白焙

甘草

生乾地黃

烏梅

去核  
取肉

人參

各壹  
兩

右六味麤搗篩每服二錢匕以水一盞生薑二片同  
煎至七分去滓溫服日夜各一

治腹痛雖甚二三日不產蒲黃散方

蒲黃

壹合  
研

槐子

殺炒  
兩

右二味搗研為細散每服二錢匕以溫酒調服須臾

即生

治難產如覺痛甚服此散即覺平安馬齒莧散方

馬齒莧

常莧各暴乾參兩  
重午日採

右二味搗羅為散每服二錢匕新汲水調服宜頻服

之

治難產燒弓絃散方

弓絃

伍寸  
剉碎

箭箬

伍寸  
剉碎

右二味同燒作灰研為細散作一服以溫酒調下其子即出未効再燒服

治數日不產胎上衝心欲死牛酥飲方

牛酥

兩

冬葵子

淨淘

合滑石  
分

水一盞煎

右三味以三味搗羅為末和牛酥置生絹袋內盛之用酒一升煎至七合去藥袋子令溫每服半盞一二服如未下更服之

治難產生地黃飲方

生地黃汁

壹

生薑汁

貳分

右二味同煎至一盞分四服每以湯或酒和服胎則生也

治難產催生考藥散方

赤芍藥兩

溫豚頭

壹極煉揮淨剉碎

芎藭

當歸切

茯神去木

甘草微

陳橘皮湯浸去白焙各貳兩

亂髮灰分

右八味搗羅為散臨臥時溫酒調下二錢匕頻服之

立生

治難產蟹爪飲方

蟹爪剉壹合

甘草微炙半兩

阿膠炙合煉壹兩

右三味咬咀如麻豆每服三錢匕以東流水一盞煎至七分去滓溫服如未產更一一服

治難產澤瀉湯方

澤瀉壹兩

瞿麥去根剉碎貳兩半

榆白皮剉淨剉貳兩

甘草炙各赤壹兩半

桂去麤皮

木通剉碎

牛膝酒浸半日切焙壹兩

右七味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半入生薑三片同煎至一盞去滓溫服一服未產更服

治難產腹痛胎不轉動甘草湯方

甘草微炙半兩

榆白皮剉淨剉壹兩桂心壹兩

葵子壹合滑石分

右五味搗篩為麤末每服四錢匕以水一中盞煎至



六分去滓溫服

治難產催生抵聖散方

紅藍花

六月六日取

蜀葵花

五月五日採

桃花

三月三日採

凌霄花

七月七日採

大麥

七月十五日各壹分

右五味依時採取搗羅為細散每服三錢匕以熱酒

調下立產

又方

蛇蛻皮

壹條全者麻端午日置於沙羅中用紙壹張

右一味蛇皮用水浸於日煎之候乾收此紙有難產

者剪三小片子如蛇形新汲水吞之立產或每片紙

子內拌牛糞中豆與吞亦神効此男左女右手內把

出藥也

又方

蓮麥

兩

桂心

貳錢

蟹瓜

兩

牛膝

酒浸半日切焙

木

一盞半煎至八分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服如未產更服

治難產疑胎斃腹中試驗當歸湯方

當歸

切焙貳兩

芍藥

兩

右二味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎至六分去

洋溫服如胎活則便安如胎斃卽下又一法苦酒調下亦驗

治產難數日不出或子死腹中母氣欲絕桂心湯方

桂去麤皮壹兩半 瞿麥取穗 木通剉碎

牛膝酒浸半日切焙 榆白皮剉淨剉碎 各貳兩

右五味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分

去滓溫服如未生更服又一方單煮瞿麥服之亦出

治婦人血氣不調心腹疼痛或月閉不通每有妊娠多

難產易生湯方

蒼朮淨洗去皮 桔梗兩 枳殼去麤皮

麻黃去根節 附子炮裂去皮臍 陳橘皮湯去白焙

芍藥 白芷 芎藭

當歸切焙 甘草剉 桂去麤皮

半夏湯洗柒次 赤茯苓去黑皮各壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙 乾薑炮各貳兩

右一十六味除桂枳殼三味別爲麤末外一十四味

同爲麤末慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼末令勻

每服三錢匕水一盞半醋一合入生薑三片煎至一

中盡去滓稍熱服不拘時候

治婦人難產及橫逆生神聖散方

乾豬胎

鯉魚皮

女人亂髮壹兩各

瓶子內

錯墨

伏龍肝細研各

燒令焦

當歸切

桂去毒

芍藥

白殭覆

白芷

白附子炮

芎藭各壹

右一十三味搗羅為散再研細每服三錢匕熱酒調

下臨產腹痛時便子母俱無恙產後每日空心一服

治月內諸血疾

治滑胎易產車前子散方

車前子

滑石各壹

阿膠炙燥壹兩半去白散

右三味搗羅為散每服二錢匕蜜湯調下不拘時服

治難產及已產胞衣不下或墮胎後血不下覆麥湯方

覆麥穗

消石

黃連去須

滑石

甘草炙各壹兩

王不留行

延胡索

當歸切

大黃剉炒各壹兩壹分

生乾地黃焙

連皮大腹剉

鬼箭羽

射干

威靈仙土

雷丸

檳榔剉

京三稜剉

郁李人炒各壹兩半

吳茱萸湯洗焙炒半兩牽牛子兩貳

右二十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五

片同煎至八分去滓溫服不拘時

又方

真珠研手

伏龍肝壹兩

右二味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下

治婦人臨產胞傷風冷腹痛頻併不能分免催生湯方

王不留行

京三稜煨

牽牛子炒

百合

當歸焙切

威靈仙各壹兩半

雷丸

大黃炒

天雄炮裂去皮

桂去蟲皮

甘草炙各參分

大腹貳兩

右一十二味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓溫服

治妊娠難產方

水銀壹分

膩粉壹分

兔腦拾分者

右三味研以兔腦和為丸如梧桐子大不計時候以

溫水下五丸

治產難多時不下垂困宜服此七聖煎方

蓮麥

滑石各壹兩

牛乳壹升

黑豆黃

酥參味各貳兩

冬葵子壹合

白蜜貳合

右四味搗篩為細末以乳酥蜜調藥令勻慢火熬成

稀膏每服一匙熱酒調下

治難產勝妙寸金散方

敗筆頭

奇效  
燒灰

右一味細研爲散取生藕汁一盞調下立產若產母虛弱者恐藕汁冷動氣卽於銀器內重湯溫過與服

大妙

治難產方

右取蓮花葉一片書作人子字吞之立產

治婦人諸般惡產滑胎散方

槐子

炒

麥蘖

炒

當歸

切

滑石

右四味等分搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治難產催生二聖丹方

丹砂

乳香

各壹兩

右二味同研如粉用倒流水和丸如雞頭實大棗火焙乾產婦腹痛時用秤錐一枚洗淨濃研丹砂筆於秤錐周回書金木水火土五字以炭火燒令通赤取出投於酒內將酒下藥一丸立產如是取死胎用水銀一皂子大蒸白一莖研如泥及當歸末一錢匕同

以熱酒半盞作一服下藥一丸并酒飲盡不飲酒用  
酒少許和醋湯下

治產難氣欲絕及橫生者黑神散方

鐵墨研壹兩

白芷爲末貳兩

右二味研令極細每服三錢匕童子小便酒醋共六  
盞調下未產再服

催產桂膏貼足方

桂去麤皮爲末

雄黃末壹錢匕

右二味以蓖麻子三七枚去皮爛研入二味同研如  
膏紙上攤於兩足心貼之纔產訖急去藥

催產聖散子方

黃蜀葵子貳柒枚

赤小豆柒枚生用

右二味同研細以童子小便三分調頓服立下

催產蠶退散方

蠶退紙壹大張燒作灰研

右一味以酸漿草爛搗絞取自然汁三分許酒三分  
許同微煖調下

治難產酸漿酒方

酸漿按自然汁

右一味每服半盞煖酒半盞調之頓服立出

治難產橫生倒長困頓不省人事聖功散方

蜀葵子陳者不拘多少

右一味搗羅爲散每服三錢匕溫酒調下如口噤幹

開灌之

治二三日不產雞子酒方

雞子壹枚去清

右一味以苦酒半盞投雞子於酒中飲之立產

催產馬齒莧酒方

右以馬齒莧搗絞取自然汁三分入酒二分微煖服

之立產

治產難腹痛不可忍以致疲頓胎不能下催生丹方

右取十二月兔腦髓一枚人乳香一分母丁香一錢

麝香少許研令細勻丸如菉豆大溫水下一丸生男

則左手握下女則右手握下

催產石燕酒方

右取石燕子以童子小便三分摩取自然汁微煖下

又赤小豆七粒立產

治難產方上藥竇突...

右吞大豆三枚至七枚立產

治難產方

右吞槐子三枚立產

又方

右取梁上塵竈突煤各等分以三指撮溫酒調服

又方

右取春杵頭上糠爲末溫水調服方寸匕

又方

於臨月帶水馬子一枚具下

治難產痛悶方合附白朮芍藥豆大醋水可一匙坐服

亦知母鎔兩

一婦人厚香一合母丁香一錢

能右一味搗羅爲末鍊蜜和丸如櫻桃大每服六丸溫

水嚼下痛未止再服

治難產并胞衣不出方

合大麻根抄面糊噴

右一味以水一升煎取三合頓服之立下

又方

以兩手各把石燻一枚立產

又方

取兔皮并毛燒灰酒和兩錢匕服

又方

右取牛糞中大豆一粒分開一片書父入字一片書



子出字吞之 大豆一升 合開一斗 黃父入字一斗 昔

又方

右燒龜甲屑服方寸匕

又方

以羚羊角不拘多少燒灰立止

天右一味研細以酒三合和方寸匕頓服

又方一和以水一斗煎取三合調服之立不

令人含醋喚面悶卽解

管子死腹中不出

論曰胞衣未出急於胎之未降子死腹中危於胞之未

下蓋胞胎未下子與母氣通其呼吸若子死腹中胞藏

氣寒胎血凝聚沍於死子氣不升降所以難下觀古之

方論多以行血順氣之藥及消石水銀礪砂之類且胎

死則軀形至冷血凝氣聚復以至寒之藥不惟無益而

害母命者有矣然古人用藥不能無意但後學不分爾

子死理有二端用藥寒溫各從其宜有妊娠胎漏血盡

子死者有墜墮攔撲內傷子死者有緣久病胎萎子死

者若此之類遂令坐人提挈妊婦使身體平正仍以裊

褥自腰抵定令仰坐開足向地如欲產勢便進附子湯

三服方見後卽以衣裹溫瓦數片三二人不住手自臍腹

腰脇左右周回熨之使胞藏溫煖疑血流動蓋附子湯  
內能破寒墮胎服之少頃覺腹內痛陣連作惡血漸動  
良久必產此用溫藥之意也有妊娠因傷寒熱病溫瘧  
之類胎受邪熱毒氣內外攻逼因致死胎不卽下留於  
胞藏古人慮胎受毒氣必致脹大所以用消石水銀礞  
砂之藥者蓋消石水銀礞砂之性不惟使胎不脹又能  
使胎化爛副以行血順氣之藥胎無不下此用寒藥之  
意也臨產更令坐人以手體候胎有橫有逆有脹有爛  
以意治之庶免留難凡生產之理胎活則所生在子日  
月已周臍繫不養所以自下猶之果實既熟不俟剪伐

帶囊自分子死腹中所生在母日月未足臍繫尚固猶  
之果實未熟枝未雖枯不折不離所以在母行之有法  
用之有度斯無虞矣凡審死胎當宜熟辨有妊婦緣病  
胎隱伏不動難認存亡者宜先令坐人以煖手就臍下  
款款按至胎處覺冷應手是胎已死稍溫卽非更看妊  
婦外證面青舌冷舌下脉青黑者皆子死之候也  
治子死腹中產宮氣寒胎血凝死子難下破寒墮胎  
附子湯方

附子端正緊實大者壹枚生  
去皮臍切作壹拾片

右一味不得搗碎都用水二盞生薑五片同煎取一

盞去滓不用將藥汁瀉清分溫二服如經時不下更

服後桂心湯

治胎死腹中桂心湯方

桂去鹽皮不  
得見火

烏頭大者炮去皮  
臍各青兩

右二味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服須臾連三服

治妊娠因天行熱病忝損胞胎致子死腹中不出速服

此救生散方

桂去鹽皮半兩不  
見火燒為末

水銀壹分

右二味相和研勻分三服每服用溫酒七分調下連

進須臾未下卽服後方粉霜散

治子死腹中或漸脹滿粉霜散方

粉霜

消石各半

蛇蛻灰

右三味各研細和勻每服二錢匕溫酒調下醋湯亦

得漸漸連併三兩服如更未下卽服丹砂散

治妊娠因傷寒熱病瘧疾邪毒攻胎致令子死不出丹

砂散方

丹砂壹兩

右一味研令極細每服一錢匕煎水酒各三分稍熱

調下連三二服未下再服

治妊娠子死腹中未久急服此瞿麥湯方

瞿麥用繩子  
貳兩

右一味搗為麤末每服五錢匕水一盞半煎七分去滓溫服連三二服未下再服

治妊娠因漏血傷胎子死未久地黃酒方

生地黃貳斤淨  
洗切

右一味搗取自然汁每服用七分盞酒三分盞同煎纔沸稍熱便服連三二服未下再服

治子死腹中氣血凝結致子難下牛膝湯方

牛膝去苗酒  
浸切焙

朴消別研各  
參分

生乾地黃焙壹  
兩半

桂去麤皮

芎藭

大黃剉碎  
微炒

蒲黃各半  
兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服連三五服未下再服

治子死腹中三二日不出母氣欲絕絕瞿麥湯方

瞿麥去梗壹  
兩半

牛膝去苗  
切焙

榆白皮各壹兩  
細切

桂去麤皮

木通剉各  
參分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎七分去滓溫服連三五服未下再服

治子死腹中滑氣血破胞胎或死子已久壞爛母欲悶

絕者牛膝湯方

牛膝去苗切

生地黄汁

當歸切

桂去麤皮

芍藥

蒲黃各半

瞿麥去根

滑石別研各

右八味除地黄汁外橋為麤末每服五錢匕水一盞

半煎至一盞去滓再煎入地黄汁三分盞打轉煎沸

稍熱服三兩服內惡血下即子出也或胎已損亦下

更令坐人以手子細探之勿致腐肉瘀在腹內如得

出畢更一二服逐穢惡餘血免生他病

治妊娠五六月子死腹中不出地黄湯方

生乾地黄切焙

牛膝去苗

芎藭

桂去麤皮

朴消別研各

當歸切

蒲黃別研各

右七味麤搗篩每服三錢匕水酒各半盞同煎七分

去滓稍熱服連三五服

治子死腹中氣血凝滯不下豬脂酒方

豬肝膏兩

白蜜半

酒壹盞

右三味相和同煎沸熟分作三服未下再依前法製

服一

治子死腹中滑胞胎順氣血葵子湯方

葵子炒

阿膠炒 壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服連三二服未下再服

治子死腹中氣血凝冷難下薑汁酒方

生薑汁

陸分 薑 作參服

雞子黃

參枚 作參服

右二味先用酒三分薑醋二分盞同煎沸入薑汁二分盞又煎令沸傾出用雞子黃一枚乘熱打轉稍熱服之須臾未下盡此三服

治妊娠顛撲內損致子死腹中速服滑氣血甘草湯方

甘草炙

桂去麤皮 各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服連三五服未下再服

治子死腹中血氣不滑當歸湯方

當歸切

芍藥 切 焙 各壹兩

右二味搗爲麤末每服五錢匕以酒醋水共一盞半煎七分去滓溫服連三二服須臾未下再服

治子死腹中未下甘草湯方

甘草剉

壹兩 桂去麤皮 半兩

香豉 炒 貳兩

右三味搗爲麤末每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓用雞子一枚取清打轉入藥內再同煎七分稍

熱服須臾未下再作服

治子死腹中不下芎藭湯方

芎藭

當歸各壹兩  
生切

瞿麥去根  
參分

右三味搗為麤末每服三錢匕水一盞醋少許同煎

七分去滓連三服必下未下再服

治子死腹中溫氣滑血黑豆湯方以酒醱水共一盞半

黑豆搗碎  
半升

生薑細切  
兩合

右二味以童子小便三椀同煎取二椀去滓每服一

盞溫服連三三盞未下再服

治產難或子死腹中不下龜甲湯方取龜甲半斤

龜甲炙  
炙於瓦

當歸切炒各  
半兩

亂髮壹兩  
雞子大  
取產多者婦

右三味洗細研髮灰次入當歸末以水一大盞半煎

取八分然後下龜甲末煎五七沸分為三服服後如

人行四五里更服

治妊娠子死腹中不出水銀丸方

水銀半兩

硫黃壹分  
與水銀  
結為砂子

白礬灰半兩

硃砂半兩

右四味搗研令細煮棗肉和丸如棗豆大每服煎榆

白皮酒下五丸如覺似腹內痛者即便子下

總錄一百五十九 二十一

又方

水銀壹分以少量 朱砂壹分

雄黃壹分

右三味同研令細煮棗肉和丸如菽豆大不計時候

以槐子湯下五丸

又方

真榆皮切壹斤

赤熟珠壹兩

右二味以苦酒五升煮取一升頓服之

治妊娠子死腹內不下方

皂莢子黃兩

米醋貳升多

右二味用五升瓶盛文火煨熟用紙蓋瓶口將向婦

人面前去紙取氣薰少時即下

又方

右取利斧頭燒令通赤置於酒中待微溫令飲之其

子便下

又方

蘇枋木壹斤細

水銀壹兩

右二味以水五大盞煎蘇木至一大盞每服取二分

下水銀一分如人行三五里再服死胎當化為水下

下後三日須食暖物若食冷物即惡血不盡



治子死腹中不下方

朴消

研細

右一味爲末每服二錢溫童子小便調下

治胎死不出方

赤小豆一升

右一味醋煮令熟分二服死兒立出

又方

芎藭

兩

右一味搗羅爲末米飲調服一錢匕

治倒產子死腹中方

當歸

切

右一味搗羅爲末酒調服方寸匕立出

又方

艾葉

肆兩  
微炒

右一味以清酒二升煮取一升去滓分溫三服水煮

亦得

又方

右取醲醋一升格口灌之

又方

榆白皮

剉貳  
兩

右一味以水三盞煎取一盞半頓服之

治子死腹中不出者

右取牛尿塗母腹上立出

治妊娠六七月子死腹中不出方

黑豆合參

右一味以醋一大升煎取六合去滓空腹分溫三服

如人行六七里再服

治妊娠子死腹中不出方

雄鼠糞參柴 枚炒

右一味以水二升煎取一升半去滓下米作粥食即

出主

人參

常

治子死腹中悶絕方宜

水銀貳兩

右一味幹開口灌下口不開即自鼻中灌下立出也

又方

取竈中黃土三指撮和苦酒服之立出

息胞

論曰凡產子母已分而胞衣未下謂之息胞蓋由欲產

之時用力太過產罷復被風寒冷氣所侵血氣凝滯乏

力運用以致持久不惟有妨兒臍兼亦致害母命即須

提挈產婦使形體平正息氣少時可以運動及以壯氣益血湯散助之俾氣血滑利其胞可下矣兼初生產婦未能諳練見胞衣未下恐妨兒體輒便剪臍或誤牽斷或執握不固其胞直上掩心使不盡天年者多矣昔人剪臍之法必欲慣熟坐人先備金銀銅鐵秤錘之類用軟熟衣帶一條就一頭縮定仍留一頭繞下臍即將臍帶與衣帶相聯結定以緊牢爲度所費胞不上掩心也產後胞衣不下或被風寒所侵血氣凝澁或氣力疲乏不能運用胞衣停息宜服壯氣益血湯方

生乾地黃

煨

人參

切

當歸

切焙各

兩

代赭

別研半兩

木香

壹

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片棗一枚擘破同煎七分去滓不拘時溫服以胞下爲度治產胞衣不出瞿麥湯方

瞿麥穗

貳兩

牛膝

去苗酒浸切焙

桂

去麤皮

木通

剉碎各兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服不拘時未下再服

治胞衣半出半不出或子死腹中著脊不下數日不產血氣上衝牛膝湯方

續錄一頁五十九

牛膝去苗酒 浸切焙 葵子炒

榆白皮剉各

生地黃汁參 浸切焙

右四味除地黃汁外麤搗篩每服三錢匕水一大盞入地黃汁一合同煎至七分去滓溫服不拘時

治胞衣不出槐子湯方

槐子如無子用枝 剉壹兩

牛膝去苗酒浸切 焙壹兩半

木通剉

榆白皮剉

瞿麥穗各貳

麻子人貳

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時服以下為度

治胞衣不出爛胞滑石湯方

滑石壹兩

牛膝去苗酒浸切 焙壹兩半

當歸切

甘草各壹兩 葵子炒貳

瞿麥穗壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時服以下為度

治產五六日胎衣不出地黃湯方

生地黃切

牛膝去苗酒 浸切焙

桂去

芎藭切

大黃剉炒各 壹兩

蒲黃炒參 分

朴消壹兩

總錄一頁五十九

三十二

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分去滓不拘時服以下為度

治胞衣不出令胞爛桂心湯方

桂去鹽皮參去鹽皮牛膝去酒浸滑石

當歸切焙各一分瞿麥穗兩壹葵子炒貳分

甘草炙半兩右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

同煎至七分去滓不拘時溫服以下為度

治胞衣半出半不出或子死腹中著脊不下數日不產

血氣上衝牛膝飲方

牛膝去苗酒洗切焙葵子各壹分榆白皮剉

瞿麥穗兩貳

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黃一分拍破同煎至七分去滓溫服不拘時以下為度

治產後胞衣不下當歸湯方

當歸切焙芍藥到桂去鹽皮

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治胎死腹中若子已出胞衣不下腰背痛蒲黃散方

蒲黃炒甘草炙桂去鹽皮

陳橘皮

湯浸去白

牛膝

去苗酒浸切焙

右五味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時以

下爲度

治產困乏腹痛目有所見兒及衣俱不下蒺藜子散方

蒺藜子

少去角

貝母

去心各

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下未下再服

以下爲度熱水調亦得

治胞衣不下氣血衝心迷悶欲死松葉散方

松葉

炙

墨研

紫葛

各半

右三味搗研爲散每服二錢匕溫水調下不拘時

治胞衣不出芎藭散方

芎藭

當歸

切焙各

榆白皮

剉

右三味搗羅爲散每服三錢匕用生地黄汁溫調下

未下再服以下爲度

治胎衣不出及惡血不行乾漆散方

乾漆

碎炒

令煙

下當歸

切焙

右二味搗羅爲散每服二錢匕用荆芥酒調下時一

服以下爲度

治惡血不下盛於衣中方

白鹿角

鈔

不計

煎

一

升

酒

未

可再服

右一味搗羅爲散每服一錢匕溫酒下未下再服  
治產難胞衣不下心腹痛香墨丸方

香墨

麝香

各壹錢  
同研細

右二味以臘月兔腦丸如梧桐子大每服三丸以溫  
酒下不拘時以下爲度

治胞衣不出葱油方

未葱白各麻油各

右三味先研葱白汁少許入油相和服之未下再

服

當歸

半兩

白

各

治產難胞衣不出臍橫及死腹中悶絕者半夏散方

半夏

湯洗去骨  
編生薑汁製

白

各

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下胞衣不下

一服橫生二服倒生三服子死四服一方用代赭

麥各一兩添入亦佳

治胞衣不出伏龍肝散方

伏龍肝

蒲黃炒研各  
壹兩

右二味搗研爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時以

下爲度

治胞衣不出令胞爛牛膝散方

牛膝去苗  
膏兩

以水三盞煎至一盞半去滓分三服

右一味細剉以水三盞煎至一盞半去滓分作三服  
治惡血不下盛於衣中方

右取竈突中煤爲末每服三錢匕以水或溫酒調服  
之

又方

右取蓖麻子二七枚去殼研塗脚心衣纒下速去之

又方

右取蔥葉細切用三指撮以熱酒沃之去蔥服立下

又方

右取敗簾箕舌燒作灰細研每服三錢匕酒服之

治胞衣不下法

右以炊箆當戶前燒之

又法

右用小豆溫水或酒吞下如生男者一七枚生女二

七枚

又法

右取夫單衣蓋井口立出

又法

以苦酒服眞珠末一錢匕亦出

又法



右取皂莢末吹鼻中令嚏即下

又法

右以棗肉丸水銀一皂子大酒服立下

治胞衣不出麥豆湯方

小麥

各壹合

右二味以水五盞煮取二盞去豆麥分溫二服

又方

牛膝去苗

葵子各壹兩

右二味剉令勻每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓溫服

治胞衣不出令胞爛丹砂散方

丹砂研半兩

右一味每服一錢匕溫酒調下未下再服

又方

葵子

阿膠炒令燥

牛膝酒浸切焙

當歸切焙各參分

右四味搗羅為散每服五錢匕溫酒調下

大德重校聖濟總錄卷第一百五十九

大德重校聖濟總錄卷第一百六十

產後門

產後血運

產後語言妄亂

產後惡露不下

產後統論

論曰凡產婦胞胎既辨無問是男是女或有欲男得女  
欲女得男者知之則不足致生佗病其惡血下少者卽  
與滑血湯惡血下多者卽與和氣湯劑未得飲酒恐引  
惡血流散四肢而發昏冒也又不欲便睡當候氣血調  
定須臾立膝仰臥高枕牀頭厚鋪衲褥密塞四壁無引  
隙風時用醞醋一器就帳內用炭火淬之以壓血運又  
時令人以燂手從心上捍至臍下以逐敗血三日內只  
食白粥間服滑血和氣之劑三日後時飲少醇酒并食  
輒飯旬日以後漸可滋味或以醋煮雞卵爲能破血然

食之日久奪人顏色一月之內慎不可出房縱步及女  
工之勞百日之內慎無犯房室及諸飲食忌慎之類又  
戒喜怒憂恚悲愁恐致疾患凡產婦一月之內寢臥常  
須覆衣被縱值暑月亦不得露身體尤避風冷濕蔭之  
氣若沐浴又須出三月外縱復不能依此亦須六十日  
後方可沐浴楊氏曰凡言滿月者謂滿三月非三十日  
也

### 產後血運

論曰產後血下或多或少皆致運悶者血隨氣行血多  
者氣虛血少者氣逆故也其候目旋轉精神昏憤甚者

沉黙不知人治法虛弱者宜調氣而益血氣逆者宜調  
氣而下血則思過半矣

治產後惡血下少氣逆頭目旋運眼花心悶頭重不舉  
當歸湯方

當歸

洗切  
微炒

芎藭

桃人去皮  
雙入炒

大黃

畧炮

桂去  
麩

芍藥

牡丹皮  
各半  
兩

右七味麩搗篩分作三劑每劑用水五盞生薑五片

棗五枚擘同煎取三盞去滓時服一盞放溫服

治產後惡血下多氣虛頭目旋運沉沉黙不省人事

調氣益血陳橘皮湯方

陳橘皮去白炒

人參

甘草炙

酸石榴皮洗

熟乾地黄各半

右七味麤搗篩分作三劑每劑用水五盞生薑五片

棗五枚擘同煎至取三盞去滓時服一盞稍熱服

治產後敗血不盡衝心迷悶旋運不語當歸湯方

當歸切炒

芍藥

桂去麤皮

生乾地黄微炒各

牛膝去苗焙

獨活去蘆頭

劉寄奴各半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑五片煎

至七分去滓溫服不拘時候

治產後敗血不下上衝心運腹痛璿瑁散方

璿瑁銚分

蒲黃

琥珀別研

好墨

牡丹去心各半兩

赤龍鱗燒灰即鯉魚皮也

芎藭

延胡索

當歸微炙各分

右九味搗羅爲散每服二錢匕用煖生薑酒調下淡

醋湯亦得不拘時服

治產後血運悶絕唇口青色不省覺者宜先用生雞子

清一枚打勻灌入口卽定却服荷葉湯方

荷葉帶葉

藕枋木剉碎

牛膝去苗

芍藥

延胡索各半

右五味麤搗篩每服三錢匕水酒共一盞煎至六分

去滓溫服如運甚不省拗開口灌之

治產後血運悶絕丹參湯方

丹參去蘆

芍藥

甘草炙令赤

蜜壹

生薑汁合

生地黃汁壹

右六味除地黃蜜生薑汁外麤搗篩每五錢匕以水

一盞煎至六分去滓入地黃汁一合蜜一匙頭生薑

汁半合更煎令沸溫分三服

治產後惡血結聚血氣衝心運悶垂死敗醬湯方

敗醬

羌活去蘆

當歸微炙

芍藥

芎藭

瞿麥用糖子

枳殼去瓢

桂去麤皮

桃人湯浸去皮尖

拾枚

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

下馬牙消末半錢匕更煎數沸溫服空心相次再服

刺三二行惡血下為効

治產後血上衝心運悶腹脇疔痛不可忍惡血不下或

成塊者可服活血冬瓜子湯方

冬瓜子微炒別研桃人湯浸去皮尖髮炒

牡丹去心

芒消半

大黃剉碎炒令

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服早晨日晚各一如口噤物口灌之必効

治產後血運延胡索湯方

延胡索

芎藭各壹兩

牛膝去苗

當歸切焙

人參各壹兩半

生乾地黄兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入白蜜一匕頭更煎令沸溫服相次再服

治產後血運無間冷熱悉主之琥珀煎方

琥珀壹兩別研末

生地黄汁壹

生薑汁壹

右三味先取地黃生薑汁二味相和緩火煎去一半

別下無灰酒一盞又煎候如稀錫方取琥珀末入煎

中熱攪置於瓷器中每空心取半匙溫酒調服

治產後血運心煩悶亂恍惚如見鬼神生益母草飲方

生益母草汁半盞如無瓜根汁代

生地黄汁半

生藕汁半

雞子白參

童子小便半

右五味先將汁四味相和煎令沸次下雞子白攪勻

分作三服

治產後血下少運悶嘔逆紅藍花湯方

紅藍花 蘇枋木 各半 兩對

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓

溫服相次再服

治產後血運煩悶地黃飲方

生地黃汁 童子小便

右二味各半盞相和煎七分溫服相次更煎服之

治產後惡血上掩心如見神鬼欲死生薑飲方

生薑汁 生地黃汁

右二味各取汁半盞相和一處煎取七分後下酒少

許相和溫服之

治產後血運迷悶不省人事脣口冷面青醋雞子方

醃醋 生雞子

右二味先以醋半盞煎數沸打破雞子一枚投於醋

中熟攪令勻頓服之立効

治產後血運心悶不識人言語錯亂少氣芍藥湯方

芍藥 甘草 炙令赤 各壹兩

丹參 兩半

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一分切碎

同煎至七分去滓下白蜜少許再煎令沸溫服相次

更服



治產後血運欲絕當歸飲方

當歸微炙  
壹兩

鬼箭羽貳  
兩

右二味麤搗篩每服三錢匕酒一盞煎至六分去滓

溫服相次再服

治產後血運不識人延胡索散方

延胡索

劉寄奴

當歸微炙各  
壹兩

右三味搗羅爲散以溫酒調三錢匕服之須臾更服

治產後血運絕不識人芍藥散方

芍藥半兩  
搗末

亂髮壹分  
燒灰

右二味相和研令勻每服二錢匕以熱酒調溫服之

須臾再服

治產後血運氣乘虛上衝心悶絕紅藍花湯方

紅藍花

生乾地黄焙各兩訶梨勒皮煨黃色  
伍枚

右三味麤搗篩每服二錢匕以水酒共一盞煎至七

分去滓溫服如人行三二里再服

治產後血運煩悶益母草湯方

益母草統者  
壹兩

藕節統者

人參各半  
兩

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服

治產後血塊攻築頭目昏運桂心散方

桂去塵

薑黃各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕以炒生薑酒調下不

拘時服

治血運心中煩悶兼腹痛羚羊角散方

羚羊角燒

枳實去蠹炒黃  
色各壹兩

芍藥壹兩  
半

右三味搗羅爲散煎酒令溫調一錢匕空心日晚各

一服童子小便及湯調下亦得

治產後血運天麻湯方

天麻

訶梨勒炮過  
用皮

木香各壹  
兩

芸薹子

半兩  
微炒

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服相次再服

治產後血運及腹痛沒藥酒方

沒藥半兩

右一味用酒三盞將沒藥磨盡每服一盞煎沸溫服

治產後血運心腹鞭乍寒乍熱續斷湯方

續斷參  
兩

右一味麤搗篩每服二錢匕以水一盞煎至七分去

滓溫服

治產後血運心悶氣絕地黃飲方

生地黃肥嫩者半斤

右一味搗取自然汁每服半盞煎令沸服之未効再服

治產後血運不識人狂言亂語蓮葉飲方

蓮葉參簡炙能揉碎

甘草炙貳兩剉生蜜匙如麻豆大

生地黃汁參合

蒲黃貳兩湯成下

右五味以前二味用水五盞煎取兩盞去滓下蜜并地黃汁再煎三五沸入蒲黃攪勻分溫五服

又方

右以童子小便磨黃狗膽灌之最妙

治婦人產後血運九竅血出欲死者芸薑散方

芸薑子

當歸剉焙各壹兩 芍藥

桂去麩皮各半兩

右四味擣羅爲細散每服三錢匕以酒并童子小便各半盞調灌下立差

治產後血運煩悶不識人狂亂紅雪湯方

紅雪參分

赤馬通塊

童子小便伍合

生地黃汁壹合

右四味以小便地黃汁浸馬通絞取汁下紅雪煎令

消分溫二服

治產後下血過多氣虛血運衝心悶亂不知人事地黃

散方

生乾地黃切

白芷

延胡索

白膠炙

赤芍藥

桂去皮麝

白朮

劉寄奴

龜甲炙

丹參

當歸切焙各壹兩

荷葉貳片

右一十二味搗羅為散每服三錢七溫酒調下不拘

時服

治產後敗血衝心運悶及腹痛麝香散方

麝香研半兩

丹砂研壹兩

烏鴉毛臘月者燒灰研半兩

墨研半兩

蘇枋木剉壹兩半

豬胞子燒為灰伍枚

鯉魚鱗燒灰肆兩

油頭髮燒灰貳兩

右八味除前四味外搗羅為散和勻每服二錢匕煖

酒調下

治產後血運悶亂恍惚不語方

生益母草汁壹合地黃汁貳合

童子小便壹合

紅藍花

紫葛細剉各半兩

右五味同煎五七沸去滓溫分服

又方

童子小便伍 地黄汁貳 當歸切焙搗未半兩

赤馬通柒

右四味用小便地黄汁浸馬通絞去滓調下當歸末

分三服

治產後血運腹悶氣喘急欲死蘇枋飲方

蘇枋木末貳兩 荷葉炙壹枚 芍藥壹兩半

桂去蠶皮壹兩 龜甲去裙襖醋炙壹兩半

右五味剉如麻豆大以水五盞藕汁一合同煎取二

盞去滓入紅雪一兩分溫二服粥食前如人行三五

里再服

治產後百病血運劉寄奴湯方

劉寄奴 甘草

右二味等分剉如麻豆大每服五錢匕先以水二盞

入藥煎至一盞再入酒一盞再煎至一盞去滓溫服

治產後血運心煩悶紅藍花湯方

紅藍花貳兩 紫葛壹兩 芍藥壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓再入生地黃汁半合更煎六七沸溫服不拘時

治產後血運惡血不行腹脹滿迷悶方

赤馬通伍 童子小便 酒各伍合

右三味和攪馬通調絞取汁熬煖分溫服之  
治產後惡血不下血暈不識人紅藍花散方

紅藍花

荷葉蒂等分

右二味搗羅為散每服二錢匕用生藕汁調下

治產後血運悶及惡血不下牛膝散方

牛膝

去苗酒浸切焙

當歸切焙

芍藥各二兩

劉寄奴青兩半

芍藥

桂去麤皮

蒲黃

紅藍花各壹兩

琥珀研

生薑

切炒乾各半兩

右一十味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下或以水

一盞煎七分溫服亦得

治產後血運眼花黑暗不見物黑神散方

赤龍鱗炒

亂髮燒灰

烏賊魚骨燒灰各參分

桂去麤皮

乾薑炮

延胡索

牡丹皮

芍藥

訶梨勒皮

芍藥各半兩

當歸切焙

生乾地黄各壹兩

水蛭炒壹分

右一十三味搗羅為散每服二錢匕炒生薑酒調下

或炒生薑黑豆小便調亦得

治產後血運血塊及傷折內損血瘀大黃散方

羊脛炭燒赤酒淨拾伍兩

大黃童子小便浸柴日逐日易

日定濕紙裹煨熟切焙

巴豆去殼漿水煮熟色焙各貳兩半

半兩錢

燒赤醋淬為粉新水淘遇取細者參兩壹分

右四味搗研為散研令勻每服半錢匕當歸一分童

子小便煎濃稍溫調下產後血運當逐血下口噤者

幹開灌下候識人更一服累經生產有血積堅癖血

塊及敗血風勞寒熱諸疾當下如爛肝片永無他疾

墜擊內損當歸酒下一字

治產後血氣運悶或身體腫滿發狂瀉痢寒熱等疾惟

瀉而喘者難差黑桂散方

合宜黑豆

炒熟去皮壹兩

肉桂

去粗皮

當歸

酒浸切焙

甚各芍藥

各壹兩 乾薑

紙上炒 生乾地黄

甘草

紙上炒

蒲黃

紙上炒

右八味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三服

治產後血運方

右以童子小便濃磨好墨量多少溫服

又方

右預浸紅藍花汁一升煎十數沸頻服之

又方

取極醱醋和所產血一裹大服之并喫面





溫服不拘時

治產後血虛狂語臥起不安妄有所見人參丸方

人參

茯神去木各壹兩

枳殼去瓤麩炒壹兩半

羚羊角燒

苜蓿各壹兩

檳榔剉參枝

桃人湯去皮尖雙人炒參拾枚

遠志去心

桂去麩

木香

白芷各半兩

訶梨勒皮壹兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸煎人參湯下空心日午夜臥

治產後心虛言語謬誤恍惚不安麥門冬湯方

麥門冬去心焙

白茯苓去黑皮壹兩半赤芍藥

當歸焙切

人參

甘草炙剉各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後心氣不足血邪狂言眠臥不安茯苓湯方

白茯苓去黑皮壹兩半甘草炙剉兩

遠志去心半兩

白薇

龍齒研各壹兩

熟乾地黄焙壹兩半

人參

防風去叉各壹兩

獨活去蘆頭半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後血虛心氣不足言語謬妄眠臥不安羊腎湯方

羊腎豐對去脂細切以水參升煎至貳升澄清 遠志半兩

芍藥剉壹兩 防風又去

白茯苓去黑皮 人參 獨活去蘆頭

甘草炙剉各半兩 熟乾地黄焙壹兩

右一十味除腎外麤搗篩每服三錢匕用腎汁一盞

煎至七分去滓溫服不拘時

治產後血虛或因驚恐神志不寧言語錯謬妄有所見

遠志丸方

遠志去心 甘草炙 白茯苓去黑皮

桂去麤皮 山芋 麥門冬去心

人參 當歸切 白木

澤瀉 獨活去蘆頭 阿膠炙令燥

葛蒲各壹兩半 乾薑炮壹兩 熟乾地黄焙貳兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸煎人參湯下空心日午夜臥服

治產後血氣不調言語謬亂當歸湯方

當歸切 人參 芍藥

酸棗人去皮 黃芩去黑心 白鮮皮

甘草炙剉各壹兩

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後血虛亂語心志不寧茯神湯方

茯神去木

人參

芍藥剉各壹兩半

甘草炙

當歸切

桂去麤皮各壹兩

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

治產後血邪語言妄亂麝香散方

麝香別研

烏鴉燒

虎糞燒灰各半兩

右三味搗羅爲散研勻每服二錢匕溫酒調下

治產後心虛風邪所搏語言妄亂遠志湯方

遠志心

赤芍藥

黃芩去黑心

白茯苓去黑皮

人參

防風去

獨活去頭

甘草炙各壹兩

熟乾地黄焙

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

產後惡露不下

論曰產後惡露不下者以藏府宿挾虛冷或臨產受寒氣使經絡凝澁氣道不利故惡血凝積而不下也日久爲結癥痼瘕之疾令人心腹脹滿疼痛寒熱之證生焉

治產後惡露不下人參湯方

人參半兩

大黃剉炒壹兩

當歸切焙壹兩

甘草炙壹兩

芍藥壹兩

牡丹皮去心壹兩

吳茱萸微炒過半兩

石七味蠱擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服日四五服

治產後惡露不快臍腹連腰疼痛煩躁汗出四物湯方

當歸切焙

芍藥

熟乾地黄焙

芍藥各半兩

右四味擣爲麤末每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服

治產後來往寒熱惡露不下此胡湯方

此胡去苗壹兩

桃人湯浸去皮尖雙人炒令黃色或搗散

當歸切焙半兩

黃耆剉半兩芍藥半兩

吳茱萸微炒壹兩

赤芍藥壹兩

石六味蠱擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至六分去滓溫服

治產後惡露不下或下不盡腹痛不除小腹急痛澤蘭

湯方

澤蘭葉壹兩

甘草炙壹兩

當歸切焙壹兩

芍藥貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

二枚擘生地黃一分切同煎至七分去滓溫服早晨

日晚各一服

治產後腹中滿痛血露不盡黃芩湯方

黃芩去黑心

芍藥

赤茯苓去黑皮

大黃剉炒

熟乾地黄各兩

厚朴去麤皮生薑汁炙

乾薑剉炒

桂去麤皮各兩

蠶蟲去翅足微炒

甘草炙

桃人湯浸去皮尖雙入炒令黃色各半兩

枳實去炒

朮各壹兩半

芒消壹兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水酒共一盞煎至

七分去滓溫服

治產後臍腹疼餘血未盡不進食地黃湯方

芍藥

甘草各壹兩

丹參壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入地黃汁一合蜜半合生薑汁一合更煎數沸空腹

溫服

治產後惡血所下不盡心腹痠痛芎藭湯方

芎藭壹兩

大黃剉炒

芍藥壹兩

黃芩去黑心

桂去麤皮

甘草炙剉

當歸切焙

熟乾地黃焙壹

桃人湯浸去皮尖雙人

微炒令黃色半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空腹溫服

治產後惡露不下攻刺心腹疼痛乾漆丸方

乾漆搗碎炒

五靈脂

沒藥研

牡丹皮去心

陳麴炒各半兩

菴藷子

延胡索

桂去麤皮

當歸切焙各壹兩

右九味搗研爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大不計時

候煎生薑醋湯下二十九溫酒亦可

治產後惡血不盡腹內堅痛不可忍當歸湯方

當歸切焙壹兩半

芍藥壹兩

桂去麤皮壹兩

桃人湯浸去皮尖雙人

炒黃肆拾玖枚

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後惡露不下腹痛臍下堅鞭沒藥丸方

沒藥研

當歸切焙

劉寄奴

延胡索

桃人湯浸去皮尖雙人

炒令黃色叁分

乾漆搗碎炒

麒麟竭

大黃壹兩

桂去麤皮

烏藥切

赤芍藥各半兩

右一十一味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二  
十九溫酒下不拘時候

治產後腹中惡血不除苦身強痛牡丹飲方

牡丹皮兩

大黃剉炒

桂去蘆皮

桃人湯浸去皮尖炒

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空腹溫服

治產後惡露不下氣攻心腹煩悶刺痛琥珀湯方

琥珀

薑黃

牛膝酒浸

虎杖

牡丹皮各半

當歸切焙

生乾地黄焙

桂去蘆皮

桃人湯浸去皮尖

分參

大黃剉炒

羸羸去刺足炒

芫消兩

右一十二味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎取七分

去滓溫服

治產後三日外惡露不多下心煩悶麥門冬飲方

生麥門冬汁合生藕汁合

生薑汁合

生地黃汁合益母草汁合

白蜜半

右六味相和煎沸放溫每服半盞如覺性寒即入清

酒三合溫煖服之

治產後惡露不下腹內疝痛牡丹皮湯方

牡丹皮去心

桂去麤皮

牛膝酒浸切磨

桃人去皮尖雙

生乾地黃焙

蓬莪茂剉

檳榔剉

當歸切焙各

全薑切

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至七分去滓稍熱服不計時候

治產後惡露不盡除諸痛補不足黃耆湯方煎取十分

黃耆剉半

熟乾地黃剉壹 芍藥半

桂去麤皮

人參參

防風去叉

當歸切焙

白茯苓去黑皮

細辛去苗

芍藥

甘草炙各

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓溫服不拘時候

治產後惡露不盡當歸湯方

當歸切焙

桂去麤皮

荷葉帶

右三味麤搗篩每服三錢匕水半盞酒一盞入生薑

三片同煎至七分去滓溫服早晨日晚各一服

治產後惡露不下結塊衝心運悶垂死敗醬飲方

敗醬

羌活去頭

枳殼去瓢

桂去麤皮

當歸切

芍藥



芎藭

瞿麥穗各壹兩 馬牙消半兩

桃人

湯浸去皮尖雙人麩炒黃色貳拾伍枚

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服

治產後惡露未盡氣血攻心腹痛痛心胸有熱豉飲方

豉炒兩

羊肉壹斤去脂水捌盞煮取肉汁伍盞澄清

當歸切焙半兩

桂去蘊皮半兩

黃芩去黑心參分

麥門冬去心微炒參分

莎草根炒半兩

生乾地黃兩半

右八味除肉外麤搗篩每服三錢匕生薑三片葱白

一莖切肉汁一盞半同煎至七分去滓溫服

治產後月內惡露不下當歸飲方

當歸切焙

牛膝酒浸切焙

蘇枋木剉

桂去蘊皮

牡丹皮剉

芍藥

芎藭

艾葉炒

生乾地黃剉

延胡索

桃人湯浸去皮尖雙人麩炒黃各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕生薑一棗大拍破

水半盞酒半盞同煎至七分去滓溫服不拘時

治產後惡血不盡攻心之力腹痛脹滿頭痛蒲黃飲方

蒲黃微炒壹兩半

芒消研參分

芎藭兩半

桂去蘊皮半兩

鬼箭兩半

生乾地黃兩

桃人湯浸去皮尖雙人  
麩炒黃色貳拾枚

右七味麩搗篩每服三錢匕入棗二枚擘水一盞同

煎至七分去滓溫服

治產後惡露不下或下未盡有熱藕汁飲方

藕汁半盞

生地黃汁盞

生薑分

酒盞

右四味先煎地黃汁令沸次下藕汁生薑汁與酒更

煎三五沸放溫時時飲之

治產後有熱惡露未盡補虛調氣生地黃飲方

生地黃汁半大盞

桂半兩

黃耆剉參

麥門冬去心微炒參分

當歸切焙半兩

甘草炙半兩

右六味除地黃外麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至

六分去滓入地黃汁一合更煎數沸溫服

治產後惡露未盡有冷氣腹痛兼補虛羸羊肉湯方

羊肉壹斤

去脂切碎水剉盡煮取肉汁肆伍盞澄令清

桂去麩皮參分

當歸切焙參分

吳茱萸微炒參分

黃耆剉半兩

芍藥半兩

右六味除肉外麩搗篩每服三錢匕肉汁一盞生薑

三片同煎至七分去滓溫服

治產後惡露未盡血氣疔痛四肢蒸熱蜀椒飲方

蜀椒去目及閉口者炒出汗壹分

羊肉壹斤去脂切碎水參升煮

取肉汁壹升當歸半兩切焙

桂去麤皮半兩

生乾地黄兩壹微炒

右六味除肉外麤搗篩每服三錢匕生薑三片葱白

一莖切取肉汁一盞半煎至七分去滓溫服

治產後大腸秘惡露不下補虛羊肉飲方

羊肉壹升去脂切碎水參升煮肉汁壹升半壹分白茯苓去黑皮參分

黃耆到參分當歸切焙半兩桂去麤皮半兩

麥門冬去心微炒參分甘草多半兩大黃到參半兩

右八味除肉外麤搗篩每服三錢匕以肉汁一盞半

煎至七分去滓溫服

治產後餘血不盡逆搶心胸手足逆冷脣乾腹脹短氣

甘草湯方

甘草炙

芍藥

桂去麤皮

大黃炒

阿膠炙燥別搗末各壹兩

右五味除阿膠外麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎

至七分去滓下阿膠末一錢溫服空心日晚各一服

下惡物即差

治產後半月餘惡血不盡腹痛寒熱嘔吐不能食芍藥

湯方

赤芍藥分

白茅根兩

瞿麥穗分

桃人湯浸去皮炒  
雙入柴枚炒

知母兩  
焙半

桂去麤皮  
兩

朴消

當歸剉焙各  
壹分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓再入生地黄汁半合復煎至一盞溫服日三

治產後惡露不盡七八日腹痛兩脇妨滿兼兒枕痛劉

寄奴湯方

劉寄奴兩  
貳

桔梗炒  
兩

當歸剉焙  
兩

生薑切焙  
兩

桂去麤皮  
兩

陳橘皮湯去白  
兩

芍藥兩

赤茯苓去黑皮  
兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓入延胡索末半錢匕攪勻溫服日三

治產後三四日惡露下嘔吐不食身體壯熱芍藥湯方

芍藥兩

知母焙  
兩

當歸剉焙  
壹兩

紅藍花兩

荷葉蒂炙  
枚

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至八分去滓再入蒲黃一錢匕生地黄汁半合煎

六七沸去滓空腹溫服相次再服之

治產後惡露不盡臍腹疔痛澤蘭湯方

澤蘭壹  
兩

當歸切焙  
兩

生地黄切焙  
兩

甘草炙剉

芍藥兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞入棗三枚擘破煎至一盞去滓溫服

治產後惡露不盡臍腹疔痛壯熱增寒咽乾煩渴劉寄

奴湯方

劉寄奴

知母

焙各壹兩

當歸

切

鬼箭羽

各貳兩

桃人

去皮尖雙人炒壹兩半

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心食前

治產後三日或七日內敗血不散痛黃當歸散方

蒲黃

當歸

切

芍藥

澤蘭葉

延胡索

白蕪荑

炒

桂去麤皮

右七味搗羅為細散每服二錢匕四日外熱酒調下四日內用童子小便調下