陳氏小兒病源方論
千金寶要
嚴氏明理論

江蘇古籍出版社

陳氏小兒病源方論

江蘇古籍出版社



宛委別藏

（清）阮元 輯

江蘇古籍出版社出版
江蘇廣陵古籍刻印社整理
江蘇省新華書店發行
上海市印刷七廠印刷
開本：七八七×一〇九二毫米 三十二開
印張：一八九七·七五 插頁：四八〇
一九八八年二月第一版
一九八八年二月第一次印刷
ISBN 7-80519-073-9/Z·13
定價：（全120册） 2650 圓

陳氏小兒病源方論四卷提要

金陳文中撰文中字文秀宿州符離人官太常明大
小方脈于小兒瘡疹尤造其妙金亡歸宋處漣水十
五年詳鄭全序案醫科全書一十有三小兒為一門
尤難是編分養子真訣小兒變蒸候又形狀別其證
部形畨畜皆先論後方鄭全云是書畨其形狀別其
候跡其方治論釐為一卷今作四卷疑後人所分故
中有稱陳氏云者考諸家目錄所載宋代小兒方症
各書今多不傳此本依宋刻影寫亦僅存之祕笈也

嘗聞范文正公之言曰不為宰相當為良醫夫以宰相之尊豈醫者之卑所事同日語及而思之宰相之道濟天下醫者以術濟人一人其位望雖不同其存心於濟人一也余見世之所謂醫者以病試藥以藥試人比皆是閒有一劑而愈者出于幸也孰能收萬全之効乎淳祐庚戌来遊漣水所見鬒者惟陳公明文秀一人而已陳公明

大小方脉於小兒瘡疹尤造其妙連水自
守將蕭宣使以下與夫時官富民之家多
以疾篤為憂群醫環視縮手無措而公獨
優悠和緩隨證施治皆收奇功至於閭閻
細民以急告者公不以其家之窘窶匍匐
往救所賴以全活者不可枚舉公又慮目
之所不見力之所不及者必罹天枉之禍
於是面其形狀別其證候跡其方論釐為

一卷名曰小兒病源方論板而行之其意欲使天下後世俱受其惠吁陳公之心其文正公之符離人也金亡歸之心乎公姓陳名文中字文秀宿之連人無小大識與不識皆称之為宿州陳令君維楊鹽道盛行有子業儒呼臚喝六之報其在是乎余得其書味之不釋手嘉其用心古而擇術精故叙而見於卷末時

宋處連水
十五年

寶祐四年丙辰連水戶曹公鄭公全子英序

陳氏小兒病源方論目録

○卷之一

養子真訣
小兒胎禀
養子調攝
哺兒乳法
養子十法
冰黄散
小兒變蒸候

胎禀怯弱
論下胎毒
辨兒虚實
病宜早醫
赤流丹毒
葛根白朮散

辨兒冷熱

卷之二
形證門
手紋三關圖
辨三關手紋訣
面部形圖
辨面色主病訣
肝臟形屬圖
心臟形屬圖
脾臟形屬圖
肺臟形屬圖
變蒸形證
神仙黑散子
桂苓散
變蒸期候
辨兒形色歌附在後
肝臟受驚積冷熱論
心臟受驚積冷熱論
脾臟受驚積冷熱論
肺臟受驚積冷熱論

卷之三
驚風門
論驚搐病源
辨不救證
辨風搐源因
辨臟腑驚證
論急驚風證
論慢驚風證
論慢脾風證
芎蝎散
油珠膏
腎臟形屬圖
腎臟受驚積冷熱論
服藥次序
辨風搐源因
驚癇忤三證不同
論急驚病源
論慢驚病源
方藥

○卷之四
驚風引證
慢驚風證
急驚風證
泄瀉用藥
痘瘡引證
論寒痰作搐
論風痰搐搦
吹牙実戦
補脾益真湯
二聖元
塌氣元
疎萬元
醉紅散
前朴散
長生元
遠志煎
牛黄元
不驚元

陳氏小兒病源方論目録畢

瘡痘痒塌
裏虛不長
誤食生冷
瘡不起發
宣解之過
表虛不長
瘡不成痂
身温煩渴
痘證驚搐
瘡爛膿淫

陳氏小兒病源方論卷一

太醫院醫官陳文中述

養子真訣

○小兒胎禀

豪貴之家居於奥室懷孕婦人飢則辛酸鹹辣無所不食飽則恣意坐卧不勞力不運動所以腹中之日胎受軟弱兒生之後洗浴襁包藏於幃帳之内不見風日譬如陰地中草木少有堅實者也

○胎禀怯弱

小兒因胎稟怯弱外肥裏虛面皖白色腹中虛響嘔吐
乳妳或便青糞或頭大顱開若失治者後必爲慢驚
風而難愈也宜預服長生圓

○ 養子調攝

養子若要無病在乎攝養調和

喫熱喫軟則不病

喫冷喫硬則生病

忍三分寒喫七分飽頻揉肚少洗澡

婦人乳汁者血也其血屬陰味甘而性冷飲乳小兒因
用湯水攝斂唇口致令冷氣入腹傷動脾胃遂成大
患也

○論下胎毒

古方言小兒始生落草之時便服朱砂輕粉白蜜黃連水欲下胎毒蓋今之人比古者起居攝養大段不同之後必生患或吐瀉或吐糞青或吐涎沫乃能傷脾敗陽其朱砂輕粉之藥若與服喘急或腹脹或腹中氣響或驚悸大抵痰涎咳嗽或樹木而有根本則枝葉茂盛若人之所生猶風寒免使中年之後服脾胃藥灸冊田三里穴也凡下胎毒只宜用淡豆豉煎濃汁與兒飲三五口其毒自下又能助養脾元消化乳食

○哺兒乳法

小兒百日以内胷痞内或嘔吐乳妳或痢青色用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚去蒂陳皮一錢於磁器内同煎一二十沸却去丁香陳皮稍熱與兒服之

○辨兒虛實

小兒面紅如桃花色大糞黃稠小便清澈手足和暖乃表裏俱實其子易養也不宜服藥切不可攻擊辰口亦不可服鎮心涼藥恐傷動脾胃嘔妳糞青而生驚斈之患

小兒面紅色乃爲童顏外實也

小兒大糞黃稠内實也

已上三證並不宜服藥

小兒吐乳食者胃冷也
小兒乳食不消化者脾虛也
小兒大便酸臭氣者飽傷也
已上三證宜多服長生元
小兒面皖白色者氣血衰少也
小兒大囊青色胃與大腸虛冷也
小兒嘔妳者胃中寒也
已上三證並宜服長生元(木香當歸入木香散)內依前
小兒熱證
兩腮紅
大便秘
小便黃
渴不止

辨兒冷熱

(加木香散)內
(加丁香厚朴入木香散)內
(入加丁香陳皮木香散)內
(木香散)內依前

上氣急
小兒冷證
面㿠白
眼珠青
病宜早醫
昔韓伯休有病不服藥
病而死於擇醫
經云談方說藥易明脉識證難
古語云貧無達士將金贈病有閑人說藥方
病不早治　治不對證　迷邪謗正　順同惡異
病淹日久　困乃求醫　縱得良醫　活者幾希

脉息急　足脛熱　上不可
服紀熱藥
面㿠白　嘔乳妳　上不可
脉微沉　足脛冷　服紀冷藥

孫真人云能醫十男子莫治一婦人能治十婦人莫療一小兒醫工有十三科最莫難於小兒也

養子十法

一要背暖

經云其背脊骨第三節下去骨兩傍各一寸半是肺腧二穴也若背被風寒傷於肺腧經使人毫毛從耳直皮膚閉而爲病其證或欬或嗽或喘或嘔或喊或吐逆及胷滿增寒壯熱皆肺經受寒而得之故宜常令温暖

二要肚暖

俗曰肚無熱肚肚者是胃也爲水穀之海若冷則物

其證輕則口乾舌燥顯紅面赤重則啼叫驚惕不寧故心
(六)者勿令忽見非常之物小兒忽見非常之物或見未識之人或雞鳴犬吠或見牛馬等獸或嬉戲驚觸或聞大聲因而作搐者緣心氣乘虛而精神中散故也常用補心温氣藥治之如用鎮心法水銀牛黃朱砂金銀腦子等藥則成慢驚風搐如腹脹足冷者難治也
(七)者脾胃要温
經云脾爲黃婆胃爲金翁主養五臟六腑若脾胃全固則津液通行氣血流轉使表裏沖和一身康健蓋

脾胃屬土而惡濕冷飲乳小兒多因變蒸上焦壅腫而頭熱或上氣身熱父母不曉妄作傷風傷食或以帛以解藥出汗或以食藥宣利或以涼藥鎮心或以湯水擾繳唇口致令冷氣入兒腹內傷兒脾胃搏於大腸故令瀉青白久而不已者即吐吐而不已者即作搐搐又言熱即生風風轉用涼藥治之因此敗傷真氣而不救者多矣經云脾土虛弱肝木盛冷故筋攣而作搐宜用補脾溫胃下氣藥治之若藥性既溫胃下氣藥治之若藥性既溫不可不知也

八者兒啼未定勿便飲乳

嘔妳羣書色緣兒在胎之時其母取冷過度冷氣入於胎胞之中兒生之後因悲啼未定便與乳食妳與冷氣蘊搞於腹內久而不散傷兒脾胃輕則嘔吐腹肚鳴氣逆涎潮以致難愈急宜服妳羣書長生丸)者勿服輕粉朱砂

輕粉	味辛	性冷	下痰損心氣
朱砂	味甘	性寒	下涎損神氣

二味相合雖下痰涎其性寒冷損心損神亦不可獨用也

若兒胎受壯實服之軟弱也

若兒胎受怯弱服之易傷也
新生嬰兒下胎毒墜痰涎多致損害皆是輕
之所誤也
十一者宜少洗浴
小兒一週之內皮毛肌肉筋骨髓腦五臟六腑榮衛
氣血皆未堅固譬如草木芽芽之狀未經寒暑嬌嫩
軟弱今嬰孩稱爲芽兒故也一週之內切不可頻頻
洗浴恐濕熱之氣欝蒸不散身生赤遊毋毒俗謂之
赤流斤如胭脂塗染皆腫而壯熱若毒入腹者則
腹脹硬氣以致殺兒此因洗浴而得也若肌肉寬緩
膝理開泄包裹失宜復爲風邪所乘而身生白流皆

腫而壯熱也或增寒壯熱鼻塞腦悶或上氣痰喘咳
欬吐逆種種之疾皆因洗浴脫着而得也爲兒父母
宜鑑之哉
治赤流丹毒
可用一小笵刀子疏去流頭赤暈惡血毒汁次以氷
黄散塗之
氷黄散
土硝一兩　大黄細末一錢
二味相合新汲水調攪勻用雞羽蘸藥時塗掃勿
令乾
葛根白朮散治一切赤白丹腫毒

白朮一錢　茯苓
木香　乾葛
枳殼去瓤炒　甘草炙各錢半
二錢半　赤芍藥

右爲散每服三錢水一盞煎七分去滓温服量兒大
小加減

小兒變蒸候

小兒有十變五蒸者乃生精神意智也五臟五腑以應
十干其心包絡與三焦合而成六臟六腑以應十二
經絡也

小兒變蒸者俗謂之牙生骨長譬如蚕之有眠龍之脫

骨虎之轉爪皆同此類變生而長也

○傷寒變蒸形證

變

生五臟
主其裏

始得之上唇有白珠泡子身熱微欲驚悸或嘔噦至七日變訖

變兼蒸



生五腑
主其表

始得之上唇微腫有如臥蚕身體壯熱額熱或作涼作熱唇口鼻乾嘔逆氣嘔逆時欲驚夜多啼哭至十三日變又蒸訖

三大蒸

主其表裏

唇口乾燥咳嗽悶亂嘔吐氣腹痛及身体骨節皆痛或目上視時驚悸

○ 變蒸期候

小兒始生三至三十二日爲一變(一變)生癸

長腎藏氣屬足少陰經

六十四日(二變一蒸)生壬

長膀胱腑氣足太陽經

九十六日(三變)生丁

長心藏氣足少陰經

一百二十八日(四變二蒸)生丙

長小腸腑氣足太陽經

一百六十日(五變)生乙

長肝藏氣足厥陰經

一百九十二日(六變三蒸)生甲
長膲膽腑氣足少陽經
二百二十四日(七變)生辛
二百肺臟氣足太陰經
長大腸腑氣足陽明經
二百五十六日(八變四蒸)生庚
長脾臟氣足太陰經
二百八十九日(九變)生己
長胃腑氣足陽明經
三百二十日(十變五蒸)生戊
心包絡為臟屬手厥陰經
長三焦為腑屬手少陽經

右一臟一腑俱無形狀故不變不蒸也

前十變五臟蒸既訖後又有三大蒸

六十四日為一大蒸計三百八十四日

又六十四日為二大蒸計四百四十八日

又六十四日為三大蒸計五百一十二日

至五百七十六日變蒸既畢

所以變者生五臟也變而節節始榮生精神長情性有

兒乃成人也其血脉方充骨節

異於前

當變蒸之時看兒子唇口如上唇微腫有小

珠泡子者是變蒸證切不得艾火着灸即宜少與乳

食亦不可妄投藥餌若不依此必致殺兒文中屢見有此故書以告

(神仙黑散子)治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其證若上唇中心有白點子者為宜服此

麻黄去節　大黄　杏仁一和錢波各

右焼存性為末每服一字水半盞煎服抱兒於温暖處連進有微汗身涼即痊

(惺苓散)治小兒變蒸發熱或咳嗽疾涎鼻塞聲重

茯苓　白朮　人參去蘆　甘草　桔梗　細辛去苗

川芎各等分

右為細末每服三錢水一盞煎七分去滓稍熱不
飢不飽時服

陳氏小兒病源方論卷一

陳氏小兒病源方論卷二

太醫院 陳文中 著述

峯熊宗立 類正

形證門

手紋三關之圖



○辨三關手紋訣

夫小兒三歲以前血氣未定呼吸至數太過難以準候若有疾必須看其虎口紋脉辨驗形色可察其病之的要食指初節為氣關中節為風關末節為命關古人云初得氣關病易治傳入風命深

氣關易治　風關病　命關黑死

有此通度三關脉候是極驚之候必死餘並可醫

男看左手　女看右手

青是肝驚　黑是人驚

赤是心驚　黃是脾驚

辨三關病源之訣未易言之詳見吳洪方及於氾元鼎

虎口脉紋掌訣鄭氏幼幼新書此則持其大畧矣

面部形圖



面青眼青肝之病面赤心之病面白肺之病面黑腎之病面黃脾之病面青主肝實白主肝虛赤主熱青主風入肺赤先欲別其五藏所主次看雷氣受盈虧昭氣虛實明其形候審定生死然後施治是爲良醫也

陳氏云青主肝實白主肝虛赤主熱青主風入肺赤主氣熱一云紅赤而慘主傷寒

○辨面色主病訣曰

兒子天中青多因菓子癥若也天中見看來乳積成

龍角青筋起皆緣四足驚或然虎角黑子急療莫沉吟

水撲是其形赤色印堂上兒驚必是人紅赤眉毛下

眉間赤黑子急療莫沉吟紅赤眉毛下青而黯色是驚風

分明死不生又歌曰若是傷寒色赤紅

吐而亂白兼黃白青而黯色是驚風

面色黃時疳積攻

論曰候起髮際其色淺白若王丞相印即變風渾身

肝臟受驚論

肝屬東方木



五臟受驚積冷熱形證圖

詩曰——

肝驚驚起髮際
肝積積在食倉
肝冷面青白
肝熱淫正宜當

發熱夜間多啼宜下驚風藥若退即可調治若其
不退下至東岳即有死候耳前穴黑金克於木若是
外候鼻乾燥眼睛吊上肝主筋筋縮則睛無光即是
腎絶瞳子不轉即是肝絶爪甲黑也

○肝臟受積論

論曰候起食倉其色微黃下侵睛黑睛黃
赤早晚發熱則愛睡乃死候啼哭無淚是也

○肝臟受冷論

論曰面青淡白眼中淚出齒齦淡白口中清水大便酸
氣日中多睡夜間煎逼是也

○肝臟受熱論

論曰候起(正眉)薄有赤氣即衝(丞相)心裏於肝兩眼亦赤多有眼胞小者吐妳大者吐食有痰生風早晚發熱多啼少睡

。心屬南方火。

詩曰
心驚在印堂
心積額角黃
心冷太陽位
心熱面頰裝

○心臟受驚論

論曰候起(印堂)眉心赤則生風若至(鼻柱)即有死候皮無血黑水克於日亥子難過外候多焦渴喫乳不收舌出口外是也

○心臟受積論

論曰候起(額角太陽穴)虛兩眼白赤小便如泔面合地卧即吐熱氣此惡候也

○心臟受冷論

論曰候起(太陽)黑筋脉子來侵(印堂)面色淡赤目即無光要轉妳食口吐清水日多煩渴

○心臟受熱論

論曰候起面頰更臉赤色多驚少睡髮乾煩燥口氣衝人牙齦惡臭睡卧開口多有煩躁外候則吐虫也

○脾屬中央土○



詩曰
脾驚髮正髮際
脾積唇應黃
脾冷眉中岳
脾熱穴太陽

候起髮際其色微青即傳於肝若至眉心其色漸赤即
傳於心若至鼻柱其色必白若分兩耳黑氣連之即
生驚風如此不退周時必死 其候唇口無津液此是脾絕四肢逆冷
此胃主四肢脾絕五日後寅卯時死外候則瀉黑血也

○ 脾臟受驚論

脾臟受積論

論曰口唇黃色兩眼沉腫早晚面浮太陽穴調外候頭
疼腰脹大便食不消化類傷冷則瀉白膏若
臟熱則赤若冷熱不調則赤白痢

○ 脾臟受冷論

論曰候起眉心(中岳)其色淡白來侵鼻柱(元珠)外候襲

白食不消化泄瀉無時下應唇白乃嘔逆面色黃赤

○脾藏受熱論

論曰候起太陽穴白薄皮起如竹膜口唇乾燥兼有口氣外候小便赤大便秘夜間顛叫

○肺屬西方金



詩曰

肺藏髮髮眉赤

肺積髮髮除當

肺寒入中見

肺熱面顯傍

○肺臟受驚論

論曰候起髮鬢其色微赤傳於(司空)則生驚風喘無力多啼叫若至(鼻梁)即主死候作鵝聲喉中響哭無淚鼻乾黑燥是也

○肺臟受積論

論曰候起(眉心)腹脹惡心若至(鼻梁)除其色微赤下至(司空)則生驚風喘不迴只三日午未時死

○肺臟傷寒論

論曰候起人(中)下至(承漿)下頤(春)即青夏即赤秋即白冬即黑外候鼻淨流兩眼赤(兩頰)赤喘氣喉響其惡候則面黑咬人鼻黑身熱氣喘不定是也

○水方北屬腎○

詩曰

腎驚肺耳前穴

腎積勞眼泡相

腎冷(宜)額色紫

腎熱(宜)赤食倉

論曰候起(面頰)其色青白到(衝承漿)若外候鼻中出血

夜間多啼有煩躁甚則為疳也

○肺臟受熱論

○肝腎臟受驚論

論曰候起耳前穴其色微黃下侵潮口若外候臺中咬牙乃侵地閣則生惡候面黑惡叫汗出如膠粘其耳前穴黑也

○肝腎臟受積論

論曰候起兩眼深沉其色微黑眼睛微赤外候停耳兼龍顏門生瘡愈而又發是也

○肝腎臟受冷論

論曰候起額上色紫而微青下侵中岳蒲面青白多唲頑涎亦多睡少精光也

○肝腎臟受熱論

論曰候起(食倉)其色微赤下到(準頭)而還日久延爛外候耳重聽多眼脂小便赤是也

○辨兒形色歌

紫色紅傷寒　青驚白色痃
黑時因中惡　黃郎困脾方

陳氏小兒痘源方論卷三

驚風門

小兒驚風二證方書未嘗分析詳細蓋驚而風自風當分別而治療之世俗通言熱極生風見作搐不察形氣虛實便暑燥濕之證極亦能生風見砂腦麝之劑以致不救者多矣深可憫念用牛黃朱秘授小兒驚風二證源由乃論集成一卷今將祖父濟人之意文中謹述錢梓以廣其傳庶使小兒不致夭枉亦不失祖父

○論驚搐源因

蓄氣而成癇

小兒多因驚怖而風冷之氣蓄於咽喉間搏於心肺

傳入肝膽其氣上不能升下不能降使津液不得流行故疾涎壅閉而作搐矣○如腹中氣壅

腫脇則難愈

治法先去痰涎次固元氣盛則津液行血氣流轉

自然不搐

○服藥次序

先服芎蝎散用手法斡去寒痰冷涎

次服油珠膏潤心肺補脾腎

後服（益真湯）溫壯元氣
助服（前朴散）寬上實下

○辨不救證

驚叫發搐汗出足冷
搐而不休休而再搐
痰湧胷膈喉口開目直

○論風搐源因

一小兒慌悞服涼藥鎮心宣導或用帛薦湯水緻展尽
口因此傷動脾胃或泄瀉或腹脹或腹痛中氣響
二小兒面少血色常無喜容不看上而視下
三小兒顏顱高急頭縫青筋時便青糞
四小兒肌體肥壯糞如青涕或如凍汁

五小兒時時眠音札動也目聾耳便青白沫有時乾已上五證忽時嘔吐者必成陰癇俗謂之慢驚風醫患之家不究病之源因不分陰陽表裏又不察色脉虛實妄謂熱即生風便餌牛黃朱砂腦麝鎮心等藥因此敗傷真氣搐而不救者多矣蓋真氣搐者元陽也其藥性温則固養元陽冷則敗傷真氣故宜用温中下氣藥治之

○論臟腑臟腑驚證

肝驚　眼赤糞青

心驚　面臉紅赤

脾驚　五心熱乾嘔

膽驚　面青下白

小腸驚夜啼至曉

胃驚　腹脹不食

肺驚氣喘喫水

腎驚○發搐口中似有痰聲

驚即發搐即搐搦

○論急驚風證

塞牙閉眼無事忽發壯熱手足搐搦眼目戴上涎潮壅

急驚屬陽屬腑當治以凉

○論急驚病源

小兒素熱或因食生冷油膩再實有痰致肝有風熱而

癇○大腸驚喉中疾作聲

三焦睡中驚哭

竹則掣痙

小兒平常無事

○論慢驚風證

小兒面青白身無熱口中氣冷多啼不寐目睛上視項背強直牙關緊急嘔涎潮或以温慢驚屬陰屬臟當治以温慢驚風證

○論慢驚病源

小兒吐瀉惡心口乾吐妳舌出紅眼閉搖頭髮直心悶氣麤兩脇動口生白瘡

○論慢脾風證

夫小兒臟腑嬌嫩皮骨軟弱血氣未平精神未定言語未正經絡如絲脉息如毫不可妄投藥餌亦不可湯繳口舌無病者在手攝養如法調護正氣自有疾者先

看外證詳明虛實而為治矣

(一)小兒頭雖熱眼珠青白而足冷

(二)小兒頭雖熱或腹脹而足冷

(三)小兒頭雖熱或瀉而足冷

(四)小兒頭雖熱或嘔而足冷

(五)小兒頭雖熱或渴而足冷

已上五證忽然吐而作搐者名曰(慢脾風)速與

(補脾益真湯)一服每服三錢更加全蝎一枚

如因驚而搐者宜與

(前朴散)一服每服三錢更加附子前胡各半錢

小兒亦有下虛上實裏寒外熱之證

方藥

(芎蝎散)治小兒腦髓風顱開解皮肉筋脉急脹縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色嘔吐痰涎欲成慢驚風搐足脛冷者或大人氣上衝肯滴頭面腫痒

川芎　蝎稍一錢毒　細辛去苗　半夏各一兩

右為細末熱湯調稍熱空心服一周兒每服抄一小次酒浸焙乾各二錢湯浸七宿

銅錢量兒大小加減

若痰滿肯喉中眼珠斜視速與服

天南星 醋浸七次焙 右爲細末每服一錢七薑湯
如錢大抄藥在油珠上須臾墜下却去其薑與兒服
隨後更用冷清薑半盞滴麻油一點
用温清齋三五口壁下肚飢時服訖候一時
減藥
補脾益真湯 治小兒胎禀虛因嘔吐乳妳
患便青色而成慢驚風氣逆涎潮眼珠直視四肢抽
搐或因持抱驚嚇而作或因悞
制或因變蒸客忤而作
服鎮心寒涼藥而作
木香 當歸
黄耆 人參
訶子肉

陳皮　厚朴姜製　甘草炙

肉豆蔻煨面裹　草果

白朮　茯苓

附子炮等分各

右㕮咀每服三錢水盞半姜二片棗一枚煎六分去

滓肚飢稍熱服服訖心腹揉動以助藥力候一時久

嘔乳食　官桂

渴者去附子丁香肉豆蔻加半夏湯泡七次姜汁製

瀉者加丁香訶子肉

嘔吐者加丁香半夏陳皮

腹痛者加厚朴良姜

腹脹者加厚朴丁香前胡枳殼
咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果
痰喘加前胡枳殼赤茯苓去附子丁香
足冷加附子丁香厚朴
氣逆不下加前胡枳殼去當歸附子肉豆蔻
惡風自汗加官桂黃耆
已上加減與正方同等分
此藥性温不燥亦治大人洞疾湯飲盛穀
以致臟腑虛弱噯食減少精神無力日久
淹滯之患
前朴散治心腹結氣或嘔噦泄瀉腹脹時痛或發寒悸

並宜服

前胡　白朮　人參去蘆

陳皮　良姜炒　藿香

甘草炙　厚朴姜製各等分

右㕮咀每三錢水一大盞煎至七分去滓稍熱肚飢時服

二聖元治小兒腹脹足冷面冷或腹中氣響而足冷或頭温足冷水瀉而足冷或嘔青足冷或脉沉微而足冷

石亭脂如蠟塊一兩　黑附子炮去皮半兩

右爲末飯丸如黃米大周歲兒每服十丸空心乳汁

送下候一筒時久得嗽乳暫兒大小增減元救秘傳

累驗

長生元寬上實下補脾治痰止瀉

檳榔 枳實 炙 各一兩 木香半兩

砂仁 半夏 姜製 丁香

肉豆蔻 二十枚 去毒尖

右爲末飯元如黍米大一周兒服五十元空心乳汁下粥湯亦可服訖半時久得吃乳食日二服

塌氣元治小兒脾虛腹脹或痢瀉黃瘦

青皮 一兩 蓽撥 胡椒 略炒 各二錢半

木香 蝎五枚

右爲末醋糊元如黄米大一周兒服十五元乳汁下
粥湯亦得空腹日二服
小加減
遠志煎治小兒身體壯熱驚悸心神不寧
遠志去苗骨甘草炙 無薬各三錢 羚羊角屑
右爲末醋糊元黍米大一周兒每服一百元乳汁或
米飲下服訖候一時久得喫乳食量兒大
重加減元数
疎滌元治諸驚亦治痃出聖惠方(急驚)最効
乾蠍一枚 青黛

木香　檳榔　鷹砂

續隨子去油殼紙裹搥碎一錢把右爲末煉蜜丸如豌豆大一周兒每服十五丸二三十丸空心清米飲送下服訖一時久得喫乳食

牛黄元（治小兒心經積熱兩腮紅如臙脂手足常熱唇口乾燥亦治急驚）

牛黄一錢　天竺黄二錢　麝金箔三十片　真蚱蝉三十枚去翅足爲末和均煉蜜丸大一周兒每服三十丸薄荷湯下量兒加減

醉紅散（治小兒急慢驚風潮搐涎盛口眼偏斜精神昏悶）

天南星一枚大者酒浸一宿裹炮熟焙乾浸濕
白殭蚕炒去絲嘴去毒各七枚
朱砂別研
龍骨
蝉退
白並
大黄煨四錢
蚯蚓一兩
麝香三錢
紫苑
防風
百合
全蝎一條酒炙
天仙子一字
杏仁
龍膽草
牛黄別研
升麻三錢
蜜三兩

右件藥先以牛黄麝香朱砂各研為末除酥蜜外十五味搥為麄末用水一升入銀鍋内煎至三合以新

綿濾去滓却入鍋内入牛黄麝香朱砂末及酥蜜等
以柳篦不住手攪慢火煮如稠餳方止入瓷合内盛
密盖收之
周歲兒每服一雞頭實大沸湯化下日二三服量
兒大小加減
不驚元治小兒因驚氣而吐逆作搐痰凝壅塞手足掣
瘛眼睛斜視
枳殼去穰麸炒淡豆豉
右為末每服一字病甚者服半錢不拘時候服日三
服急驚薄荷自然汁調下慢驚者荆芥湯入酒三
五點調下

凡小兒急慢驚風若睛珠上視或上氣喘急足脛
若冷者難愈腹中急脹眼睛上視不回者必難治
也

陳氏小兒病源方論卷四

驚風引證

○論寒痰作搐

太師賈平章寶祐戊午兩淮閫子宣幾三歲頭熱目赤痰鼾不已一醫言風熱盛痰涎作搐又一醫言熱即生風冷即生氣文中曰因脾肺虛而風冷寒痰所作又一醫言熱即生風冷即生風文中曰不然三冬盛寒冷則生風九夏炎炎熱則生氣蓋風者百病之長也若寒得風而謂之風寒若熱得風而謂之風之風熱燥若濕得之而謂之風燥若燥得風而謂之風濕

濕此非獨熱而生風也如暗風破傷風臍風慢驚風急驚風及風癇驚癇食癇等證而皆作搐非但熱而生風也
生風也
宣機病始因頭熱目赤便以涼藥餌之致令寒氣客於喉廱之間與津液相搏又生痰劻證其喉廱中寒痰令氣塞不通故頭熱目赤無由得愈治法當斡去寒痰令氣得通其病可得而愈遂投芎蝎散一服用手法斡去寒痰冷涎四五口次以油珠膏一服而愈遂投芎蝎
論風痰搐搦
尚書洪端明守寶祐戊午淮東運使子始生未及三箇月腹脹滿定

肚冷頗悶門高急上氣涎潮四肢搐搦同坐衆官皆言
死證洪公曰我在前死了七八箇兒子皆是這般證
候此兒足見難醫枉廢生受亦不召醫視之或者言
告丈中因往視而謂之曰小官人此證候不得尚
可救治運使曰此兒必死不得母勞用計衆官皆嘉陳君
高明既有救療之心運使從說乃用油珠膏一服次
用長生元一服便下黃稠粘涎約半盞內有白妳塊
如小豆大十餘塊是風痰結聚乳妳一併便下後用
前胡厚朴散加附子兩片二服而愈

淮西戴運使小娘子始生周歲腹中氣響痰涎壅閉手
足抽掣欲與苦蠍散斡取痰涎運使曰兒子小難以

依此施治文中曰前制茶劉菊坡小兒始生二五箇月
因作搐乃服茗蝎散(幹去痰涎次服油珠膏)即愈菊
坡贈一跋於卷末今運使小娘子因驚赫蓄冷氣於
喉靨間傳入肝膽其氣上不能升下不能降使血氣
不能流轉故痰涎壅閉而作搐也若不依此施治必
不起遂以茗蝎散(一服用手法幹去喉靨中寒痰約
半盞次用油珠膏(二服後補脾益真湯(三服再前胡
厚朴散長生元(各二服而愈

安撫葉大監(寶祐戊午淮東制參)子始生八箇月搐不休乃驚食
二癇證也因驚怖未定心氣不足便餌乳妳使冷氣
與乳妳併搐於腹內故腹中氣響上下衰衰其氣上

則吐下則瀉今搏於脾胃則脾土虛弱肝木盛冷故筋掣而作搐用油珠膏一服其搐止又瀉如泔水用補脾益真湯二服次日又搐腹中氣響上膲若蝎散一服用手法將匙於喉中探出痰涎數口即止只腹中氣響攻上不納乳一服後服長生元二下二聖元一服後服長生元愈安撫贈楊州安通判子始生未滿月頭温足冷腹中氣響涎潮搐搦名曰胎風因乳母飲冷過度冷氣搏於胎胞之中兒生之後又因帛藨冷水纔展唇口致令冷氣入

○慢驚風證

児腹中故頭足冷腹中鬱
油珠膏
黄文中曰小児純陽熱即生風何敢服附子硫
經寒暑臓腑嬌嫩骨脉軟弱當温養正氣氣盛則寒
痰消腹中不響其搐自止用（油珠膏）八服後補脾益
真湯而愈

○治急驚風證

両淮巡議蕭宣使生子一歳年三箇月忽然發熱両腮紅
如臙脂足脛熱大便堅秘小便赤少忽然而搐名曰
急驚風諸醫治之未効召文中以遠志煎（連進三服
而愈

痘疹引證

夫小兒患痘瘡文中所用之藥無不應手取効今略舉數家以爲引證

○泄瀉用藥

溼水知軍諭宣使孫女三歲痘瘡始出泄瀉元一服瀉止

予用木香散送下甚安痘瘡不紅咬牙喘渴宣使謂熱毒在裏痘瘡不靈欲與清涼飲

予曰若與清涼飲則耗其氣必致喘渴而死宜木香散（如丁香四十枚官桂一錢二服又異攻散）

服至十日其瘡蒼蠟色咬牙喘渴皆止

至十三日瘡痂不落痒難忍足指冷咬牙喘

子用異攻散加丁香半錢官桂一錢連二服至十

七日愈

○咬牙寒戰

漣水軍都總轄李路分孫七歲痘瘡七日痒塌寒戰咬

牙飲水始召予視之

路分畏藥熱不肯服

子曰其瘡痒塌寒戰咬牙飲水是脾胃肌肉虛也

如與水飲則轉渴不已而死矣當用(木香散異攻

散急救表裏三日各一服至十五日愈

○治疳瘡痘痒瘍

連水機密官周統制孫三歲痘瘡八日發熱腹脹足指冷咬牙飲水其瘡痒瘍者肌肉搔之血出成凹坑

子曰疹痘發熱腹脹足指冷者脾胃虛也咬牙飲水者津液衰也若熱去即死矣經云陰虛則發熱宜木香散加丁香三十枚治官桂一錢服之可如何更加丁香官桂

統制曰丁香攻裏官桂發表其表裏俱實則不致痒瘍喘渴而死木香散連二服又異攻裏發表其表裏俱實則不致痒

子曰身熱渴渴者表實裏虛也木香散連三服渴
渴皆止其瘡光澤肥紅而愈

○一童瘡不成痂

楊州王容議女九歲痘瘡十四日不成痂膿水出不乾
咬牙飲水

子曰氣血衰則咬牙內虛則煩渴宜木香散加丁
香二十枚官桂半錢日夜三服至十七日瘡痂落

淮東制參喬宗丞子十三歲痘瘡十一日悞食生冷
發熱痒渴悞食柑子因

子曰柑子味酸收飲津液故發熱痒渴用人參麥門冬散三服愈

○身温頻渴

淮東制參毛監丞五子皆出痘瘡三子不服而愈一登仕十三歲身温頻頻要水喫其瘡細碎子曰是肌肉虛津液少也木香散加丁香二十枚官桂半錢日夜三服瘡出根紅快透至十一日加官桂一錢連二服至又一直閣十歲痘瘡出口乾渴不止木香散每服二錢重水一盞淡煎時時服首尾四香散每服二錢重水一盞淡煎時時服首尾四

十七日愈

不落又木香散加木香半錢官桂一錢連二服至

服而愈不起發

○瘡毒宣機二子皆出宣瘡大者七歲楊州通判王宅

兩次其瘡細碎不光澤不起發

予用木香散加丁香三十枚官桂半錢連二服瀉

止瘡出快透

至十三日其瘡不結靨不成痂秕塌膿水粘衣身痒

不得眠

予曰宣始出時瀉今乃痒塌不靨是內虛也木香

散加木香官桂各半錢連二服仍以敗草散核其

○瘡證驚搐

王宣機小直閣二歲發熱驚搐足冷瘡瘡欲出不出用異攻散三服共加丁香四十五枚附子一錢第二日木香散加丁香附子木香桂各半錢連二服其搐止足暖瘡出而愈

○宣從解之過

淮東趙制幹子十五歲身壯熱哽氣醫謂傷食感應元一服瀉二行仍壯熱哽氣又一醫言傷寒小柴胡湯加枳殼其身不壯熱口乾足冷

予曰始初身壯熱哽氣便是瘡瘡之證口乾足冷者感應元瀉得裏虛也身不熱者柴胡解得表虛

也若加山
香官桂各半錢二日進五服第三日瘡出第七日
成膿泡子微渴人參白朮散一服又(朮香散)加丁
十三日(朮香散)一服
○瘡瞼爛膿淫加落而不救矣以(朮香散)加丁
淮東帥機趙通判女七歲瘡十三日秋塌破爛膿水
出粘衣坐卧不得
予用(朮香散)三服又用敗草散(朮香散)摻攤席上及乾貼
即乾愈

陳氏小兒病源方論卷四