

陳爽秋編

性病預防及自療法

上海經緯書局發行



導言

社會愈文明，淫邪的勢力也愈大。時至今日，社會號稱文明了，但是一般憂心社會的，目視一般青年男女，因邪淫所受道德上，身體上的傷害和摧殘，都認為性慾問題，為今日社會問題中的急需解決的。於是有以保持男女的真操為主義，大聲疾呼，和社會相周旋的；又有以人種改良學相提倡，旨在使子孫的身體，道德，雙方健康，奔走呼號，作拯救社會的精神運動者。然縉者以為，欲作有效的運動，以打倒萬惡邪淫的勢力，須由兩方面着手：

1. 作大規模的宣傳運動，嚴定男女社交的規程，揭破邪淫在經濟上，社會上，以及政治上所致的損失，暴露邪淫黑幕的底蘊，然後予以改進的方法和步驟，引導社會上道德的途徑。
2. 由青年本身着手，予青年以充分的德育訓練，俾有所遵循，再益以相當的性教育，免入邪淫陷阱。同時在教育上，應加入性教育一科，使一般青年男女，在幼小的時候，即了解性慾在生物學上，與社會方面的正確意義和作用，使對性慾問題，都存着坦白公開的態度。從來社會中的多數人士，對於性問題每加諱言，

家庭中往往絕不提及，學校內更無暇及此，以致青年男女於需要性智識的時候，而無從得之，於是墮傷也，冶游也，花柳病的傳染也，都由於性智識的缺乏，不幸而發生了。遂致造成今日社會的邪淫。

現在我見到青年男女患性病的衆多，以及花柳病蔓延得這麼快，那麼可怕；如果再將這件事的態度，牢記着古訓守着祕密，不作公開的探討，正常的指導，任使一般青年人的瞎摸，未來的中國人種，真是不堪收拾。

推究到性病蔓延的責任問題，政府衛生機關當然不能辭其責；醫師的責任次之，而應負責任的最大者，厥為社會公家。因為娼妓的檢查與取締，為政府之責，治療為醫師之責，這都是屬於他動消極方面的補救辦法，至於積極的講求攝生和防病的常識，從根本上消滅性病傳播的機會和猖獗的原因，這就是公家自身的重大責任。

性慾是人身最珍貴的寶藏，是人類的本能，因此也是人生幸福的一部份，道是決難否認的。可惜濫用和墮陷者，終罹疾病與傷狂。最不幸的，是它還會傳染和遺傳，不僅破壞了個人的健康，並且破壞了社會與民族的健康。

這部書雖只有四萬字，可是關於性病的普通常識，總算是提綱挈領的舉括地講了一些，自認較任何性籍為詳盡。足夠普通人對於本病得到一個明確的認識。編者很希望這本小冊子能夠替國家增加幸福家庭的數目。所以本書的目的，不但是使保存種族，且須增加生殖力，減少青年男女的一切性疾患，並且指示避免不幸的方法，健康者不致盲人瞎馬的胡亂嘗試，既病者可以知道攝生及治療上正當的方針。

總之，性慾為蒼天賦予最大的寶庫，較其它任何器官為重要，無論青年成年，都應知如何保護而善用之，所以人人應具有性慾的常識，人人應具有性病的醫學知識。

性病預防及治療法目次

第一編 性的生理……………一

第一章 男子性系統的解剖及機能……………一

- (1)陰莖 (2)尿道 (3)攝護腺 (4)睪丸和副睪丸 (5)輸精管
- (6)哥啤爾氏腺 (7)陰阜和陰毛 (8)陰囊 (9)精囊 (10)精液

第二章 女子性系統的解剖及機能……………七

- 甲。屬於外生殖器的 (1)陰脣 (2)陰核 (3)陰阜 (4)尿道 (5)膻 (6)處女膜 (7)骨盆 (8)乳房
- 乙。屬於內生殖器的 (1)子宮 (2)卵巢 (3)卵子 (4)喇叭管

第三章 兩性的特徵……………一六

第二編 性的官能病和機械病……………一七

第一章 男子生殖器的發育不全……………一八

- (1) 包莖 (2) 陰莖短小 (3) 精蟲缺乏 (4) 睪丸缺乏 (5) 潛伏睪丸

第二章 女子生殖器的發育不全……………二三

- (1) 陰道狹小 (2) 陰道閉鎖 (3) 處女膜過厚 (4) 中隔陰道 (5) 陰道癭症 (6) 膜狀陰道 (7) 子宮發育不全

第三章 性器神經衰弱的諸疾患和療法……………二七

- (1) 陰萎 (2) 早洩——甲, 神經衰弱性早洩 乙, 精囊炎性早洩 (3) 遺精 (4) 夢精 (5) 精液漏 (6) 護腺漏 甲, 神經衰弱性護腺漏 乙, 炎症性(細菌性)攝護腺漏

第四章	性器神經衰弱的預防和攝生	四〇
第五章	月經的病理和治療	四一
	(1)月經不調 (2)痛經 (3)月經過多或過少 (4)月經困難(5)月經變色	
第六章	月經期的攝生	四八
	(1)月經來潮時的精神攝生 (2)月經來潮時運動的注意 (3)月經來潮時的清潔 (4)通經藥的注意	
第三編	性慾本能和不妊症的治療	五一
第一章	性的衝動	五二
第二章	性慾與自淫	五三
第三章	自淫所致的諸症狀	五七

第四章 自淫的預防和療法……………五七

第五章 不妊的原因及治療……………六一

乙.甲. 男子的不妊症 (1)射精不能症 (2)無精蟲症
 女子的不妊症 (1)子宮前屈 (2)子宮後屈 (3)發生酸液

(4)白帶 甲,生理的白帶 乙,病理的白帶

第四編 花柳病……………七二

第一章 總說……………七二

第二章 淋病……………七四

第三章 男子淋病……………七六

乙.甲. 急性淋病 (1)急性前部尿道炎 (2)急性後部尿道炎
 慢性淋病 (1)慢性前部尿道炎 (2)慢性後部尿道炎

丙.

男子淋病的合併症(續發症) (1)尿道狹小 (2)攝護腺

炎(3)包皮灸 (4)精囊炎 (5)副睪丸炎 (6)精系炎

第四章 男子淋病的治療……………八三

第五章 男子淋病的攝衛……………八六

第六章 女子淋病……………八七

(1)尿道淋 (2)陰門淋 (3)陰道淋 (4)子宮淋 (5)子宮附屬
機關的淋病

第七章 女子淋病的治療……………九〇

(1)陰門淋 療法 (2)尿道淋的療法 (3)陰道淋的療法 (4)子
宮淋的療法

第八章 淋病的預防法……………九二

第九章 梅毒.....九三

甲 梅毒的傳染 A, 後天性梅毒的傳染 (1) 直接傳染 (2) 間接傳染

B, 先天性梅毒的傳染 (1) 母體胎盤傳染 (2) 精蟲傳染 (3)

卵子傳染 (4) 混合傳染

乙. 梅毒的經過和症狀 (1) 第一期梅毒的症狀 (2) 第二期梅毒的

症狀 (3) 第三期梅毒的症狀

第十章 梅毒的治療.....一〇〇

第十一章 梅毒的攝生和預防.....一〇一

第十二章 軟性下疳.....一〇三

第十三章 軟性下疳的療法.....一〇四

第十四章 軟性下疳的預防法.....一〇五

性病預防及治療法

第一編 性的生理

第一章 男子性系統的解剖及機能

欲求了解男子的性系統，非先知其解剖學，與生理學不為功，尤其是要了解性病的關係和花柳病的病理，又非懂得兩性的生殖器的構造和機能，本書的標的，即在述明兩性的性慾上應有的智識，予以指導，附以說明，解決平日性慾上應時而起的疾患以及種種的問題。

男子的生殖器，可分內外的兩部，現於體外的，是在身體的重心以陰囊之間的陰莖和陰囊。陰莖中通尿道，陰囊是收容睪丸與副睪丸的一個囊狀的囊。睪丸是被收容於囊內部的一對腺狀體，而司理生成精子的職務，副睪丸是與睪丸同在陰囊之中的一對小腺體，與睪丸結合而從它的末尾現出輸精管，以



上可以稱為外生殖器。

在內生殖器裏有輸精管，精囊射精管，攝護腺，高爾氏腺等；輸精管是由與睪丸結合着的副睪丸之間生出的一對之管，而司理輸送精液的職務。精囊是蓄積依這個輸精管而送出的精液的一對之囊，射精管是司理把精囊的精液射出于尿道之職務的一對之管，攝護腺是必泌一種之液的一對腺狀體，而這個分泌幫助精子的活動，高培爾氏是一對之腺，而從它分泌出的液，是司理潤滑尿道的職務的。

(1) 陰莖 陰莖的地位，在恥骨的下面，陰囊的前面，是圓三角形的一枝肉柱，它是交接器中的主要物，它的質地，是海綿體造成的。全體分作三部：一是龜頭部，在陰莖的末梢，好如圓椎的樣子，它的圓徑比陰莖略大，是陰莖的主體，向後四周高起，好似在陰莖上加上一頂帽子，所以稱做龜頭冠，又稱龜頭錘；這一部分略帶綠色，稱做龜頭綠。尿道在龜頭的末梢，是最富於神經與血管的一個器官。第二是頸部，緊接龜頭冠下面，包皮上面，繞着龜頭冠，成一溝狀，稱做龜頭頸。頸內有無數的小腺，分泌出一種白色的物質，有特別的臭氣。第三是幹部，這

一部分從頸部直到陰莖根，外面有包皮裹着，直到頸部為止，那頸部外面的皮和頸部不相粘連，寬鬆可以翻轉，露出頸部來的，稱做包皮。包皮在後面的，使直連着龜頭的尖端，龜頭尖端的中央部分，另有韌帶緊繫住包皮，不能翻轉的，稱做包皮繫帶。那龜頭是蜂窩體造成的，陰莖是海綿體造成的，在骨盤的前面，會陰的下面，稱做陰莖脚。

(2) 尿道 尿道從龜頭尖端的外尿道口起，至後方骨盤內的膀胱止，全長十至十六公分，約常陰莖的二倍長。其前方約三分之二，稱做前尿道；後方約三分之一，稱做後尿道。前尿道與後尿道的中間，有外尿道括約肌，這個括約肌除了小便和射精的時候以外，常是收縮閉鎖的。這肌的大部分，是橫紋肌，隨本人的意思，能伸縮自在。我們的小便，不致隨時的泄出，全靠這括約肌的閉鎖。後尿道和膀胱接合之處，還有內括約肌，作用阻止異物或細菌從後尿道浸入膀胱，及膀胱中所積的小便的隨時流出。

(3) 攝護腺 攝護腺在後尿道的後方，近內括約肌處，形如栗子，後尿道在其中間穿過，其基底和膀胱之下相接觸，所以攝護腺遇發生炎症，而腫大的時

候，常刺戟膀胱的頸部，時欲小便，症狀和膀胱炎相同，這腺的本質，是五六十個複葡萄狀腺的集團與肺臟的組織相似。各腺的排泄管，次第集合，併成數個較大的排泄管，開口於後尿道，常泄出一種分泌液，以保護尿道，使不乾燥，常常的潤滑。

(4) 睪丸和副睪丸 睪丸是在陰囊的內底的一對白色的腺體器官，它的職務就是生出精子，這個職務就做蕃殖器來說，實在可以說最重大的機能，它的形體是卵形而稍平，從白膜小葉及細精管而成，外面被覆白色厚韌的纖維膜，小葉中有造精細胞，精虫由此產生。副睪丸在睪丸的後方，為長形扁圓的管腔，可分上頭、中體及下尾三部分。上頭與睪丸內的細精管相連，從二十個內外之輸出管所成，至下方睪丸的下緣，即變為尾部，穿通睪丸白膜，與輸精管相接，其作用除供精虫的通路以外，射精之時，從其組織的收縮，更增強精虫之射出力。

(5) 輸精管 輸精管是在睪丸小葉中的膜管，而有直管與曲管的兩種。在那個管壁裏，是具有精液細胞及支柱細胞的。從睪丸小葉的尖端穿入睪丸中，隔的主要的東西，是將要移於直管的曲管，而在完成產生精子的職責中，實在

是做的微妙的工作。將要穿入嚙模兒氏體而成爲無壁，相互吹合的地方，稱做睪丸精網。做這個睪丸精網的支管，而把睪丸後綫的上端之部突出，遂形成副睪丸的，稱做輸精管。

(6) 哥啤兒氏腺 在尿道三角韌帶的兩葉中間，樣子和小豆一般，略帶紅黃色，是葡萄狀體的一種，係結締組織和平滑纖維纏繞成功的。它的機能，能夠分泌一種液體，這種液體，就是哥啤兒氏液。形狀性質和攝護腺液相同，男子交媾排洩精液的時候，這攝護腺液，和哥啤兒氏液，同在一起攝洩出來，精子得了這兩種液汁的補助，在精液裏運動，格外活潑。哥啤兒氏腺液平時分泌少許，潤溼尿道，免得排泄的時候，尿道因乾燥而受刺戟；在性慾衝動的時候，這種液汁，分泌漸多，有時因外界性的感覺，尿道口不知不覺的排出一種粘液來，這便是哥啤兒氏腺液。

(7) 陰阜和陰毛 小阜在肚骨的下面，恥骨的外皮，肌肉高起，脂肪來原。陰毛便叢生在上而延生下去，漸漸稀薄，直延到陰囊，而性交時雙方的恥骨磨擦着，因有這來原的陰阜，便不致擦傷皮膚。那陰毛互相磨擦着，也能夠增加性

交上的愉快，所以在生殖器上，也是必要的。

(8) 陰囊 是一種保護睪丸的袋子，所有副睪丸、輸精管都在這袋子裏面。這袋子分做內外兩層，內層是膜造成的，外層是皮造成的，那皮色黑褐，有許多縐紋，有彈性，依着空氣的冷熱的變化，和意思的感動而自由漲縮；對着陰莖中縫，有一道筋層把陰囊攔腰束住，分做左右兩個，這一條筋層，有提舉睪丸的能力，稱做提舉筋。陰囊在平時大都寬鬆，向下垂着，待到了性交的時候，這提舉筋便向上提起，四壁的筋力也異常收縮，幾和核桃相似，睪丸緊貼小骨盤，使射精愈覺有力。倘精囊收縮力不强，射精力也便不强，那種精液不能直射到女子生殖器的深處，也便不能成胎。所以強壯的男子，陰囊一定是緊縮多縐紋的；衰弱的男子，陰囊一定是寬鬆少縐紋的。

(9) 精囊 精囊呈長圓形，長約五公分，直徑約二公分，在攝護腺的上方，膀胱的後面，左右有一對，內有射精管和後尿道相通。內藏從副睪丸輸來的精液，倘逢快感之時，從四周肌肉的收縮，將精液從射精管射出，稱做射精，但其內部有數個瓣狀中隔，區分為數部，故一次射精並不將其中所藏的精液完全射出。

(10) 精液 精液是真珠樣白色或微黃色半透明的稀薄膠狀的液體，其中含有精囊上皮細胞，脂肪滴，顆粒如精虫。其主要成分是蛋白質。射精的時候，精液與攝護腺分泌液相混，變成強鹼性，使精虫活潑，保護其生活。精虫有卵圓形或球形或洋梨狀的頭部，一端有伸出的氈毛，其狀與蝌蚪相似，頭部的中心有核一個，生活之時，在精液內活潑運動，倘射出後，失其生活，即變成一種蛋白質。

第二章 女子性系統的解剖及機能

女子的性系統也是與男性的性系統一樣的，分別為外生殖器 and 內生殖器兩部分。外生殖器是陰阜，陰核，陰及巴爾特林氏腺等；內生殖器是子宮，喇叭管，卵巢等。

外生殖器的各部分：顯明的就是陰阜，它是外生殖器的最上部，而稍隆起，生有陰毛的部分，這個隆起是比男子顯著的。在陰阜下方的是大陰唇，是一雙厚的皺襞，外面生有疎毛。在大陰唇的內側的一雙薄的皺襞，名叫小陰唇，當中開着的孔是陰口；在陰口的上部的左右小陰唇之間有被呼為前庭的部分。

前庭的上部有一個小突起，是非常地知覺銳敏的，叫做陰核。又在小陰唇之間的裂孔，被呼為陰道；前方在小陰唇之間開着後方接連着子宮。間是個管狀而供性交之用，並且是胎兒的產道，在陰口上部的一對之腺，稱做巴特爾林氏腺。在內生殖器裏面，則有子宮，喇叭管，卵巢及副卵巢的諸區。分子宮是個囊狀體而司理卵子的發育的部分，喇叭管膜是從子宮到卵巢的一對之管，而司理送卵子於子宮的，卵巢是在喇叭管的外端的一對之腺體，而司理製造卵子的。

甲 屬於外生殖器的

(1) 陰唇 大陰唇和小陰唇，總名稱做陰唇。大陰唇是厚的皺襞，上起恥骨，下達會陰，上下連合着，中間缺裂着。在它的上部結合着的部分稱做前連合，在下部給合着的部分，稱做後連合。又在後連合裏面有一種皺襞而在聯繫着它的橫方的，稱做陰唇繫帶，陰唇繫帶與陰道之間的小凹處，稱做船狀窩。又大陰唇的外面，是與皮膚同色而生着疏毛，內面是紅色為粘膜所蓋，常常在濕潤着的。

這個濕潤，乃是從許多的腺分泌出來的液；這個液是酸性而有一種臭氣的。小陰唇是裏外都是爲粘膜蓋着的瓣膜狀的皺襞，好像大陰唇那樣地非常的富於腺，並且常在濕潤着，它的顏色是赤紅的，但隨成長而成了暗紫色。小陰唇的上方，是在大陰唇的前連合的中間，而包裹陰核；從此左右兩分而構成小陰唇腳。下方是在大陰唇的後連合而與陰唇繫帶在相連接着的。

(2) 陰核 陰核在尿道的正中上部，大小陰唇上部含合的地方，被陰核包皮遮掩着，裏面高起，好似一粒小豆，和男性的龜頭一樣，是海綿體造成的。在性慾發動的時候，一般的也能勃起，也有快美的感覺。它這一部分，血管和神經也是很豐富的；一經摩擦，血液便流集在一點小骨上，感覺快美，補助慾興。

(3) 陰阜 陰阜是生陰毛的地方，位於生殖器的最上部，皮肉裏面，脂肪質十分充足，高起好似一個小阜，所以稱做陰阜。那卷曲細軟的陰毛，和男子性交的時候，陰毛互相摩擦，又有厚軟的皮肉襯着，不但可以免去兩性恥骨的觸傷，還可以補助兩性的快感。

(4) 尿道 尿道間於陰核與臍口的中間，爲尿的道路。女子中有誤解爲尿

經過膾的實是大誤，膾與尿管在沒關係的。

(5) 膾 膾為連絡子宮與體外的道路，從外生殖器的陰門達於子宮口。前方的下部是在左右陰唇之間，形體雖好像扁平的囊，可是它的周壁非常地富於伸縮性而伸脹的時候便成圓筒了。而接於它的上部的子宮的地方寬廣，中央稍為彎曲，長約三寸至四寸。膾的職務是兼着性交與生殖之兩方面的重大的器官而無關於排尿的，只是在月經時，排出從子宮流出的經血，在分娩時又成了胎兒的產道。這個膾是持有一面地為粘膜所蓋，縱走於前壁後壁的隆起的，這名叫膾柱，在前壁的稱做前膾柱，在後壁的稱做後膾柱。前膾柱是在前壁之下，顯着地隆起，而隨着上行成了扁平狀。這個下端的隆起，稱做膾櫛。又在膾的兩側有橫皺襞，稱做膾皺。膾皺與膾柱，總名稱做皺柱。膾的前端位於陰脣中間的膾口，是更以陰唇繫帶，膾括約筋，處女膜等在區別着的。陰唇繫帶是在膾口的下部，小陰唇左右相合的地方。這個後方是會陰而接連着肛門，遇着難產的時候，往往是會破裂的。很有產之經驗的女性的陰唇繫帶是短小的，比較地很少破裂，但是初產的女性是容易破裂的。膾括約筋，乃是收束膾口的周

圍，而在性交之際，括約陰莖以增加壓力的，形狀是輪狀，質地是一種之筋。

(6) 處女膜 在處女，膣的外口，有一種叫做處女膜的黏膜，裹着處女膜的形狀，並不一定堅硬的程度，也有種種的不同，有非常之薄，容易破裂的，也有非常堅韌，雖經交接後並不破裂的。大多數的情形，是上方有一小孔，通過膣的分泌液及子宮的出血等；少數的例外，有全然把膣口閉塞不留一點小孔的。有這樣之膣的少女，第一次月經來潮時，出血不能流出體外，堆積膣內，這時必須由醫生用手術把它破碎才好。其反對，也有處女膜全缺的，也有交接而不破裂的，所以普通以處女膜的有無，(處女膜通常都因第一次的性交而破裂) 為是否處女的證據，不能說是真確。就是在先天的沒有處女膜的女性，也有後天的受種種的障害，而致處女膜破裂的女子。

(7) 骨盆 骨盆為包圍生殖器的骨腔，女性的妊娠生產，悉在這個骨盆腔之內，所以骨盆的構造，與生產有密切的關係。

骨盆由薦骨，尾骶骨及髖骨三部所構成。全部的形狀，薦骨與尾骶骨在脊柱的下端，薦骨上接腰椎，下接骶骨；尾骶骨的下端則懸垂着，可向前後稍稍的

移動。髖骨很大，有左右兩側，它的後方接於薦骨的兩側，前方互相接合，成一圓形的腔，稱做骨盆腔。腔的後壁，是薦骨和骶骨，前壁與兩側壁則是髖骨；它的前壁中央左右兩髖骨互相接合的地方，稱做恥骨縫合，縫合間又有軟骨，稍可移動。骨盆的兩側外面的前下方，有圓形的大凹窩，大腸骨上端的球頭，就在這當中，以支持骨盆的。骨盆腔形像漏斗，上大下小，後壁和兩側壁都很高，前壁側面很低，分大骨盆和小骨盆兩種。骨盆的上下，容積較廣，惟後面和左右兩側有骨，前面祇被柔軟的腹壁的是大骨盆。骨盆的下半，四周有骨，容積較小的，是小骨盆。骨盆腔內不但藏有生殖器，生殖器的前面又有膀胱和尿道，後面有直腸。膀胱為薄膜的囊，上通腎臟，下接尿道，容積由腎臟排泄而來的尿積多後，由尿道排之於體外。空虛時形狀很扁，積尿既多，則變為卵圓形，向後方排壓子宮。

(8) 乳房 乳房是繁殖的補助器官，並非是直接生殖器，在男子不過是無用器官的乳房，在女子卻發達而任重要的職務。既止乳汁以司嬰兒的營養，同時又有使女性外形增添美觀的魔力。哺乳的時候，嬰兒所含的突出部，稱為乳頭；乳頭的周圍暗色的部分稱做乳頭輪。

乙. 屬於內生殖器的

(1) 子宮 子宮是使卵子成長發達成爲胎兒的器官，形狀如梨，全由筋肉質所構成，周圍是厚壁，妊娠時能十分的膨脹發達。其較廣的一部分，稱做子宮體，下方狹小的一部分，稱做子宮頸。成熟的女子，子宮長約二吋，廣約二吋，厚約一時，重量約自一盎司至一盎司半。在妊娠狀態時，非常的膨脹。子宮的狀態，幾乎成爲一個三角形，上方的兩角，通着喇叭管，位置於子宮頸中央的小孔，即所謂子宮口。子宮居於膀胱與直腸間骨盤的中央，因韞帶支着，這韞帶大概很是脆弱，所以遇着劇烈的肉體勞動和別的障礙，每有伸張太過的事。那時子宮便脫落而下降於腔內，或位置前轉。其它子宮居于前方或屈於後方時，都是不妊症的原因，這就是子宮的位置改了常態，男子的精子難于達到子宮口的緣故。子宮內的黏膜，具有特殊的機能，對於月經有重大的關係。

(2) 卵巢 卵巢是像男性的睪丸的作用那樣地製造卵子的，是生殖器官中的一重要的東西。位置在骨盤的內側而像一對的腺腺外面爲非常凸出之

多的囊狀體，而接連於子宮底面着喇叭管的外端，被寬韌帶的皺襞在包着。卵巢生卵子的生性的生涯之時期，是從春機發動期到月經閉止期。卵巢的內端是依卵巢韌帶而連於子宮的後部，外端是依卵線而接連着喇叭管的那個狀態，是卻似兩端之紐而結着子宮與喇叭管那樣的。

(3) 卵子 卵子是定期地發育的東西，而在每個月經的三週間前，卵巢內的古拉佛氏腺細胞，一般都是微小的，經過一週間之後，其中的一個稍稍長大而突出於卵巢的表面，及至成長而到月經期，成小粒狀，遂破裂而從那個破裂中生出卵子。卵子又名古拉佛氏腺細胞，在妙齡期以前，古拉佛氏腺細胞，已經包含着未成熟的卵子，但事實上幾乎是不活動的狀態，直到月經開始的時候，遂開始卵巢內的大活動，每月一次正則的循環着。古拉佛氏腺細胞成熟破裂而排卵子，同時起月經作用。這兩種作用，常相密接，却沒有因果關係。月經是每月混合子宮內面的精液和血液而排出的現象，從妙齡到終經期間的女性，通常總是每隔二十八日，古拉佛氏腺細胞破裂，從卵巢排出卵子。其破裂之前，即成熟的時，膨脹而突出於卵巢的表面，一面充血，但有一點，即突出在卵巢表面的部分，

呈蒼色而稀薄，破裂時一定從這一點起頭。

(4) 喇叭管 喇叭管又稱輸卵管，它的任務，是把卵巢中已經成熟的卵子，搬運到子宮裏而去，所以稱做輸卵管。它的形狀，乃和喇叭相似，排列在子宮和左右兩傍。從子宮兩傍後面的上端，沿以圓韌帶橫斜着趨向到卵巢裏。它的管腔，和子宮的內腔直接通連着。管內各部，又可分為三段，一是腹腔部，便是輸卵管的起點地方，它緊接着卵巢管裏面的粘膜，向外翻出成漏斗的樣子。這四無依靠的粘膜，摺成無數皺紋樣子和剪成的紙綵一般，沿邊成鋸齒一般的形狀，所以又稱剪綵口；那許多剪綵，內中有一枝較大的緊接着卵巢，稱做卵巢剪綵。管的裏面有粒膜蓋着，管的外面有漿液膜包着；它的本體，也是筋質組織成功的，和子宮的體質相同。二是韌帶的，是入於兩廣韌帶的部分，長和腹腔部相等，管腔在這個部，已漸漸的收小，皺紋也漸低漸少。三是子宮部，這一部橫貫着子宮的筋層而穿通之。管腔愈狹，祇可以通得毛髮，組織這管腔的筋，有內外兩層，外層是縱線纖維，內層是圓輪纖維；在最裏面的粘膜，便是氈毛上及和男性的輸精管，沒有什麼差別。講到輸卵管的職務，它是專一接受從卵巢排擠出來的

卵子，在性交的時候，靠着和剪線同起了顫動的作用，把卵子輸送到子宮裏面去，好似男性的輸精管輸送精液一般；那男性的精子，和女性的卵子便在這個地方相會合的。

第三章 兩性的特徵

生殖器固然是表示兩性的差別，一見就可以分別為男女，然此外尚有很多的徵，都可區別性的差異。雖然在性方面沒有重大的意義，卻是男女兩性互相注目的焦點；如鬚是男性的特徵，像這樣的很多；體內千億以上的各細胞，都可說是映其所屬於性的。

第一便是骨骼，女子的骨骼，大抵比男子纖小，把體重同量的男女的骨骼加以比較，男子對女子是十分八之比，但是女子的椎骨比男子為大。因為腰椎骨高，而中間軟骨厚的緣故；女性的脊柱比男子長，筋肉小而圓，全體的四肢帶圓形，富曲線，與男子的有稜角的相反。皮膚纖弱，優美柔軟。頭髮長而且美，惟它的部分毛很稀薄，音聲快活而輕快，乳房又發達而高聳，以遂其重要的目的，呼

吸也有特徵：男性為胸的低部，而女性則為上部；頭腦小，其回旋單純，其它如女性因有種種分泌液而有特有的體臭，肌肉又較男子為劣，感覺也是女性纖細，惟觸覺是女性一等的銳敏。

男女兩性的區別，除了上面的肉體特徵約略簡述以外，更表示顯著的精神的特徵與感情特徵，此是題外，恕不細述，惟尚有一是應該注意的，就是男女兩性優劣比較，的議論有幾點屬於男性較優，有幾點屬於女性較優。自然的創造兩性本是很平均的，但其性永久不能同一，所以實在沒有優劣可分。

第二編 性的官能病和機械病

在未詳細討論性的病理，以及生殖器的疾病以前，須先知生殖器疾病的
大半，要以花柳為其最大的病原。換言之，即因濫用生殖器或不潔的性交得來，
而互相傳染的。然也有若干的生長於生殖器的疾病，而皆全不在病人的第一，
須知生殖器為人身器官中之一，能因多種原因而發炎，生長瘤子，以及種種意

外的損傷，當人身感受重大疾病時，生殖系統，也同受波及，至所受帶累的輕，重常視全身病症的大小為轉移。第二，即因胎教、遺傳等關係，生殖器又常有胎生畸形，與後天性的發育不全。此外又有所謂非花柳性的人工病者，病原既非因花柳，也非因遺傳，乃完全由患者自為之病。患者常因缺乏性學常識，往往因病徵類似花柳，而也自以為起源於花柳，因而羞情交集，由失望或進而自殺的，這是很可憐的。

第一章 男子生殖器的發育不全

(1) 包莖 男子在十四五歲以前，生殖器未發育的時候，其陰莖末端的龜頭，為包皮所包沒。不過中間有一孔，供小便的排出，到了青春期，陰莖急速發育而增大，龜頭增大得更甚，這時候包皮大概已經向下退落，使龜頭部露出。倘到了這時候，包皮不向下退落，仍將龜頭包沒着，就稱做包莖了，這是發育不全的一種。此外還有一種人，雖非包莖，但包皮生得過長，常將龜頭遮沒，不使露出，這叫做包皮過長，是一種畸形症。

包皮的害處很多：1. 容易得着性疾，——所以患包莖的人，龜頭面和包皮的中間，容易留存污物，不易清潔，如梅毒，淋病，軟性下疳等的花柳病，比較常人容易傳染，並且使醫生不易用藥和施引手術，治愈當然比常人困難，就是症狀也比常人凶險些。即使尚在黃貞時期的人，因包莖關係，可從不潔的浴湯留存於包皮裏面，以致傳染花柳病或發包皮炎，龜頭炎等症。2. 蓄積污垢易發惡臭——在小兒時代，尿道中雖沒有特殊的分泌物，可是一到了青春以後，生殖器的新陳代謝機能更有變化，尿道中常有種種分泌物。在包莖的人，水分不易蒸發，便不易拭淨，所以龜頭和包莖的中間，常積留多量的白色污穢的污垢。這種污垢，日久腐化分解，就要發生惡臭，蓄積過多，也能誘發龜頭炎或包皮炎。3. 排尿困難——包莖程度很深的人，包皮的開口很小，竟遮沒尿道口，排尿非常困難，要很長的時間，並且尿繞向上下左右分散，大腿和衣服常致污穢。4. 有生成結石的危險——患包莖的人，包皮莖的人，包皮內容易蓄積污垢，前面已經說明了，從這種污垢的腐敗分解，常生成砂粒大，或頭小小指大的種種結石，其長大的可環繞龜頭冠溝半周，或竟至一周，而成半月形或輪狀的。

結石，這稱做韃石，可以從外面觸覺出來。有結石的人陰莖勃起的時候常覺得疼痛，往往不能性交，其最大的壓迫龜頭面，使之潰爛，非常地危險。5. 有發生後嵌頓的危險——患包莖的人，倘勉強將其包皮退到龜頭後面，因其開口小，將嵌頓在龜頭冠溝的地方，不能再使之復舊，因之血行發生了障礙，龜頭全體即漸漸的鬱血而腫大，再要使之復舊當然是非常困難，龜頭就生壞疽，這就稱做包皮的後嵌頓。這種現象，在未達青春期的的小兒有時也有見到，包皮口生下疳而腫脹的時候，或生包皮及而腫脹的時候，更容易發生後嵌頓。6. 阻礙龜頭的發育——普通人到了青春期的時候，龜頭的發育，非常的快，患包莖的人，因常常給包皮所壓迫，以致發育不能充分，龜頭比普通細小，往往呈圓錐形，不但阻礙龜頭全體的發育，就是龜頭表面的皮膚和皮下組織，也不能充分的發育。龜頭露出或和褲子相觸的時候，常感覺不快的搔痒，多非包皮被覆不可。

7. 容易引起手淫等的不良習慣——患包莖的人，因分泌物的莖發不充分，龜頭而常常濕潤，以致時覺搔痒，容易引起手淫等不良習慣。

要解除包莖的痛苦於全身症時，施列原因療法，淋疾，下疳等的高度炎症

存在時，宜先施以消毒法和冷罨法，使其炎症或浮腫稍退，乃用一般包莖的手術療法。包莖的手術，易而無包，其法有單切開或背而切開和輪狀切開，瓣狀切開數種。手術前可用局部麻醉，如用單切開，即以有滲消息子於陰莖背側深深的插入包皮內，乃用刀或剪沿其溝切開包皮的兩葉，切開後各各縫合其兩側即可。若包皮過長時，則於其兩側切去三角形的瓣而縫合之，如行輪狀切開，則先將包皮強引牽出於前方，而以鑷子固定於龜頭之前，乃將鑷子前方的包皮全部切去，這時包皮內葉的餘部殘留的，則更牽引於前方，而行輪狀切開，縫合其創緣，手術就稱完了。

(2) 陰莖短小 東方人的陰莖，普通約長十公分，龜頭的周圍約九公分，但各人的長短大小不同，不能因自己的陰莖比他入小，就自以為發育不全，向醫師求治，這是重大的錯誤。因為陰莖，只要能夠性交，其作用可說已經完全，大小固可以不同的，倘誤信短小陰莖治療器，陰莖發育機等誇大的廣告而妄試之，不但不能達到目的，而且有害匪淺。真正發育不全的短小陰莖，只有小指狀的大小，而年齡已過了青春期，那末，當然是要治療的，可是現在還沒有發明治療

的方法。

(3) 精虫缺乏 睪丸的大小和常人相等，位置也不差，外觀上和常人一些沒有異樣，但是精液中缺乏精虫，這種現象可以稱做精虫缺乏症其原因大概因為睪丸內缺乏了造精細胞，或雖有造精細胞，而其機能不完全的緣故。患着這種症狀的人，就不能生育。所以兩性的不妊症，也當檢查男性有沒有患着這種病症，決不能專怪女性方面的。可是男性一千人中，患着這種病症的，差不多祇有一人半，對於這種病的治療，到現在也沒有發明出。

(4) 睪丸缺乏 雖有陰莖，而其中沒有睪丸的人，稱做睪丸缺乏症。或祇缺一個，或是兩個全缺，或雖有睪丸，而其形很小，很難產生精液的，也可當作睪丸缺乏症。兩個全缺，或兩個都極小的人，不但不可能生育，並且陰莖不舉，不能性交。有這種病症的人，副睪丸和輸精管也往往沒有。這種病症，並非是簡單的發育不全，乃是極顯著的畸形症。這種男子決不能認為完全的男性，當在男女間的半陰陽性。就是他的聲音舉動，也常在男女兩性的中間，本症雖有用睪丸移植的手術，或是注射睪丸製劑，使其性格變做純粹的男性，但恐是一時的，不能永

久有效，至於不能生育的病，是永久不能治愈的。

(5) 潛伏舉丸 胎生期中，在腹腔內腰椎兩側的舉丸，應當次第下降，遂達到陰囊的內面，但因發育異常的結果，雖到產出後，舉丸仍不降入陰囊，停留在中途腹腔內的，這就是潛伏舉丸。本症有兩個舉丸都停留在腹腔內的，也有一個降入陰囊，只留一個在腹腔內的。潛伏在腹腔內的舉丸，倘若發育不全，其中的造精細胞有健全的機能，也能夠產出精子而生育，和平常人沒有不同。但是這樣發育異常的人，其全身的發育，也往往不能充分。若造精細胞的機能大多數不能健全，即成精虫缺乏症，而不能生育。

第二章 女子生殖器的發育不全

(1) 陰道狹小 女子陰道腔是天生成的非常狹小，只能容手指插入，絕對不能性交的，稱做陰道狹小。有這種畸形的女子，她的子宮輸卵管和卵巢等，也往往發育不全的，以致月經不順，或竟沒有月經。這種女子，雖施用了手術，將其陰道擴大，使其能夠性交，但是內部生殖器的發育不全，沒有法子可以醫治的。

所以雖能性交，仍沒有生育的希望。倘內部生殖器都是健全的，則施用手術，將其陰道擴大以後，就能生育，也可和普通女子一樣了。

(2) 陰道閉鎖 女性完全沒有陰道的，稱做陰道閉鎖，不過閉鎖有僅限於局外子宮口的，或有陰道的一部分膜樣閉鎖的，或又有全部陰道管的閉鎖的，由於這種閉鎖部位的不同，乃有處女膜閉鎖、陰道閉鎖、子宮閉鎖和喇叭管閉鎖等的區別。它的原因有先天性後天性二種，而觀察其發生閉鎖的動機，則又可大別為下列的三種：(一) 缺損性閉鎖——即因成形萎縮而閉鎖的，概屬於先天性，常在生殖管的廣大部波及之。(二) 癒着性閉鎖——也多為先天性，通常為膜樣閉鎖或類似膜樣的小部分的閉鎖。(三) 癥痕性閉鎖——即因結締組織痕形成的閉鎖，都屬於後天性，閉鎖之度，廣狹不同的。

本症的療法，惟有施用手術的一途，即將閉鎖切開，使血液流出，以防閉鎖的再發。手術時所最應注意的，為消毒的嚴密，血液的流出，須可及的緩徐，其血液務使完全流出，以防其腐敗，惟因閉鎖部位和程度的不同，所以手術也各有異。

(3) 處女膜過厚 處女膜通常極薄，到了青春以後，不但性交會得破裂，就是有種種的機會，也都容易自己的破裂。倘天然極厚，達半公分以上，則妨礙性交了，不得不將這過厚的處女膜，請醫師用手術除去。祇要別個的性器官毫無異常的狀態，除去後，也能和常人的生育。

(4) 中隔陰道 陰道中有薄膜縱隔或橫隔為二部分或三部分，穩做中隔陰道。在輕症並沒有什麼障礙，重症的則陰道腔為之狹小，以致不能性交，最甚的，其子宮中也有中隔，若內部的性器沒有異常的，則也可施用手術以後，一樣地會生育。倘伴有內部性器的異常症，雖施用手術後，也不能生育，祇可性交罷了。

(5) 陰道痙症 陰道腔有時因為某種原因，突然起攣縮性收縮，這稱做陰道痙症。須經過數小時後，始慢慢的緩解而復原。這種症狀完全是神經關係，在發育上並沒有什麼異常的狀態，所以只要治愈其神經症狀以後，就能完全消失，並且性的生活也和常人一樣，但在未治愈以前，因恐發生危險，不宜性交。

(6) 膜狀陰道 陰道的大小，雖和常人一般，但其深部缺少圍繞子宮陰道。

段的穹隆部，而呈簡單的圓筒形的，稱做膜狀陰道。雖和性交沒有妨礙，但因不能留蓄精液，難達受胎的目的。這種症狀也可用巧妙的造穹隆的手術，使變為常人的一樣，只要其它性器沒有異常，仍能獲到生育的希望。

(7) 子宮發育不全 子宮發育不全的女子，往往更伴有雙角子宮，單角子宮，中隔子宮，一側喇叭管缺乏症，兩側喇叭管缺乏症，一側或兩側卵巢缺乏症等種種畸形。這種發育不全的子宮，非常短小，和十歲以下的小兒子宮一樣。乳房的發育，也因之而不完全，月經的初期期很遲，至十八九歲始見月經，或十四五歲的時候初潮以後，就數年沒有月經；雖到二十歲以後，其月經還常常不調，或數月見一次，或一年見一次，月經雖也很稀少，但其日期則須經過一星期以上，或一二月就完，月經痛更是必有的。這樣的子宮，常發輕度的內膜炎。此外全身發育，也不健全，常感覺寒冷種種的不快，但是這種女子，不能就斷定其不能生育，到了二十四五歲，自己慢慢發育完全，和常人無異的也有，並且本症可用適當的注射和其它補助療法，完全醫愈，所以不用悲觀。倘到全身發育完成期以後，纔請醫師治療，則很難見效。又治療這病，需要相當的時日，本人和病家

要有忍耐性，到月經復為常態以後，方可停止治療；不然，功虧一篑，是很可惜的。

第三章 性器神經衰弱的諸疾患和療法

現代是神經衰弱的時代，而生殖器神經衰弱，差不多可以說是包括着生殖器機能障害的全部；因為神經是管理全身的知覺和運動的器官，以腦做中樞，全身都有其分枝散布；性器神經不過其分枝中的一部，所以不但性器神經衰弱的時候，性器的動作受着影響，就是中樞神經衰弱的時候，性器也往往受着影響。如遺精和陰萎，冷感症等疾患，都是在這裏頭包含着的事情。這種疾患是在生殖器官發生障害，而因為從神經系統生出的昂奮性，是病很容易疲勞的，所以生殖器官的神經是常好刺激，並且容易衰弱的。這種症狀，是與腦脊髓神經衰弱同時，各種感覺都受障害，就是身心上發生述不盡的不快和不安。現在詳細的摘述於下：

(1) 陰陰 所謂性交動作實包括 (一) 情慾發動，(二) 勃起，(三) 射

精，(四)快感，等四種舉動的。倘其中的一種舉動微弱或不能的時候，就不能得到完美的性交，這就稱做陰萎。所以陰萎是俗稱腎虛的生殖器障礙，是一種範圍極廣的特別症候。這種症候，算是把性交的使命已經完全失掉，因而不能生育；兩性間得不到合歡之樂，因而釀成不和，增加懊惱。因此之故，陰萎可以說是家庭的攪亂者，為各種性疾的最利害者。後天的病陰萎之原因有種種，有依生殖器的疾患及反常的，有依勃起中樞興奮性之缺乏的，有依反射之精神的障害的。

依生殖器的疾患及反常的陰萎，隨它的症候可以分作十數種。重的是器質的陰萎，是依生殖器的反常，畸形或病的變化而起的，這是指那以陰莖缺損發育不全，高度的彎曲，陰莖的破裂，包莖原因的陰萎而說的；而也有不是因歇兒尼亞，陰囊腫脹，象皮病，陰囊水腫等直接的陰莖疾患，是因陰莖附近的反常而發生的。但是這種陰萎，依它的疾患的程度，不能說絕對地失去了生殖作用。還有以睪丸反常為原因的陰萎，這是因睪丸缺損，萎縮，損傷等事，精液的分泌停止的緣故；但是如腫瘍，微毒，結核等病，不過侵犯睪丸之一的，影響並不見

大。

依勃起中樞興奮感缺乏的！這是由於勃起神經之障害而發生的，多半是性慾減退，也有完全消滅的，這是因為攝護腺部或尿道腺部的慢性淋疾和微毒結核，腎臟病，溢血病，脊髓炎，肥胖病等疾患性的興奮完全受了妨礙，失去了性慾中樞的刺戟而發生的陰萎。而酒烟，阿片砒毒，嗎啡等的小毒，也是原因，尤其是因手淫和性交過度，勃起和射精的中樞，失了興奮而發生了陰萎，這就是癱瘓性陰萎。

(陰萎的療法) 陰萎的療法，首先注意其原因，如因鄰接臟器和陰莖的異常狀態而起的器械性陰萎，殆用外科療法，例如陰囊水腫，高度包莖，和海綿體的殘廢，以形成癩痕，而致血液不能流通，或陰莖的彎曲等，都須行相當的手術。如係全身性疾患而起的，例如糖尿病，腎臟炎，肥胖症，中毒症，脊髓液和神經中樞的器質性疾患等的原因存在時，則一方施行神經衰弱的療法，同時施行各原因疾患的特有療法，但原病的治愈時，陰萎未必有良好的結果，或暫時而反為增惡者有之。在精神性陰萎時，最要的對於患者的勸諭安慰，并曉以生

理衛生之道，神經性陰萎時，則用神經衰弱的一般療法，和攝生法局所療法，等。不過局所療法如腐蝕藥的注入，刺激性器械的插入，和尿道冷濕器的應用等，往往能使陰萎症增惡，所以非在尿道後部疾患之不得已時，不可濫用，且技術未精的醫師，也要屢遭不良的結果。

陰萎的療法，分為精神療法，局所療法，電氣療法，水治法，催淫劑療法，酸素吸入法，等數種，而局所療法中，又可分為捏揉法，緊縛療法，摩擦療法，尿道消息子療法，尿道冷却器療法，攝護腺腐蝕法，攝護腺按摩法等七種。

至於催淫劑有豆斑貓 *Cataplasmata*，燐麝香，樟腦，臭剝劑，番木鱉劑等，都是對症用藥，茲再列述于下：

A. 元菁丁幾，有刺激腎臟的作用於 *Yohimbin* 特異性（胸內苦悶）之患者用之，用量每次三至八滴，每日作三次服用。

B. 硫酸 *Stychnin* 本劑 0.1 與次亞燐酸 1:100 混和，一日三次，每次十滴，和水服用，漸次增量至每回二十五滴。

G. 阿脫羅賓，於抑制神經著明亢進時，和生殖器血管擴張，海綿體支絨

筋肉的收縮弛緩用的，有招致陰莖充血的作。

D. 鹽酸育亨賓，能使下腹部的充血作用於性慾中樞，尤以勃起中樞，而致勃起。不過，這個作用迅即消失，普通用 1% 的溶液，初每天一次， $1 \cdot 0 \cdot 0$ 皮下注射，漸次增量，至後每次 $2 \cdot 0 \cdot 0$ 至 $3 \cdot 0 \cdot 0$ ，朝夕注射各一次，內服用 $0 \cdot 0 \cdot 0$ 五的錠劑，一日三次，每次一個，每個每回增加一個，至一次三個為止。

E. Hepatoxin 和 Fetudofoxin，使用三四次至十數次，往往有奏效的，於精神性陰萎的勃起抑制神經過敏時用的。

F. Testogran，本劑主要成分，為生殖腺，睪腺，甲狀腺，副腎，大腦垂體等的賀爾蒙 (Hormon)。用法，錠劑每日二至三次，每次一個，食後服用，必要時每次增為二個，服至百錠時，休息十四日，尚未全愈的，則更照前反覆的使用。第二第三次，二三月間，約服八十至一百二十錠為度。若用注射溶液時，可在肌肉內每日，或隔日注射一次，或單獨施行，或與內服並用，不過對於木療法不要失之過度。

G. Bala，本劑的主要成分，為硅酸，沃度，食鹽，鎂等，呈弱阿爾加里性反應，為青色透明的液體，新發明的注射藥。其治療作用，除生殖器疾患外，它如肺炎，

結核，肋膜炎，感冒，等效用很廣，對於生殖器病，則於精阜部，有消炎作用，使其腫脹萎縮，驅逐蛋白質產物和神經毒，促進新陳代謝，增加阿爾加里性，內分泌腺機能亢進，和呈其它一般強壯作用，本劑須行靜脈注射，注射液不可漏出血管外，否則疼痛很劇。

(2) 早洩 早洩就是一交就洩的意思，甚至臨交便洩精，這種現象大概都以為是神經衰弱的症狀，不過也有精囊炎性的關係而早洩的，現在分別的說明于下：

甲、前神經衰弱性早洩 這種症狀，大抵都因衰弱的神經，其刺戟興奮，傳達等作用，不能平均，或過敏，或遲鈍，所以腦神經衰弱的人，有失眠，多夢等症狀，那末，性器神經衰弱的人，患着早洩症，當然是自然的趨勞。

乙、精囊炎性早洩 這種早洩，和神經衰弱全然沒有關係，因為精囊發生炎症，而引起早洩的。精囊發生急性症的時候，精囊中的神經，也往往受着很大的障礙，作用變為極鈍，給以強烈的刺戟，就引起有痛的射精。這疼痛或竟長時間的繼續，但慢性精囊炎的時候，不過其黏膜面充血而過敏，陰部倘起勃起性充

血，精囊神經立時興奮而起早洩。慢性精囊炎的原因，大半為慢性淋病，但因它種桿狀細菌從尿道侵入精囊而起的也不少。這種桿狀菌的毒性比較弱點，經過尿道的時候，往往不發生尿道炎，即使發生了也很輕微的。有時病人自己還沒覺着，而桿狀菌已經潛入精囊，發生極輕微的精囊炎了。這時候的病人，往往自覺不到尿道炎或精囊炎的症狀，已發覺有早洩的現象。

(早洩症的療法) 腦性脊髓性的早洩，除神經衰弱的一般療法外，其他如原發性疾患及中毒等而起的，施行原因療法，末梢性早洩症的療法，以腐蝕藥腐蝕患部的方法，最為有效。不過手術很難，平流電氣，效驗很佳，其法以「消極」結合於約五十平方釐大的扁平導子，而將這導子接觸于膀胱的側部，以「積極」結合於 *Rectal Electrode* 狀導子（長約一釐有金屬尖端），而以此插入尿道內，達於精阜，輕輕搖動，約繼續一至二 *Miliampere* 的電流，每回一秒時，通流五至六回，此法每六日至八日施行五六回，大抵奏效。該法施行之始，雖稍覺灼熱，惟不過五分鐘即止，二三時間後排尿，也稍有灼熱之感，數回反覆行之，感覺即次第減少。不快的續發症，也可少見。在此治療中，禁用酒類，注意便道，尤應注

意的，施行此法，時有陰萎之虞，頗稱缺憾。

(又法) 治療神經衰弱的早泄症，以滋補身體，行適宜的運動，節制房事為最要。冷水浴和沿脊柱灌注冷水，也很有效。請醫生用司配爾明 Spermin 的藥水注射，效力最佳。

(3) 遺精 遺精是在睡眠中不知不覺地發生的不愉快的精液排泄。它的時期是有間隔性的，有一週二回的，有二週一回的，有四週一回的，這個回數的遠近，是與體質或生活狀態等大有關係的；有一週間以上的間隔，而到第二天，身心上若是沒有別的什麼影響，這或者也可以說是生理的，不是病呢。所以病的遺精是指遺精的回數非常頻繁，而發生疲勞，頭痛，耳鳴，心悸亢進，四肢倦怠，或震顫，背部疼痛，精神膜朮，憂鬱等症狀說的。因為遺精的回數是跟着病勞的，所以在利害的一週間有好幾回在夜裏遺精，尤其利害的，不單只夜間，就是日間勃起，或入廁時，或是運動走路時，因為何等的動搖，或是衣服和被褥的摩擦及壓迫，或是拿重東西的時候，精液也會流出來的。這種症狀，在精神的方面，若是受了什麼刺戟，即在悲哀，驚愕等精神的感動時，也會忽然而遺精，差不多可

以說不停歇的；這是極度的重症，疲勞達於極點。

遺精的原因很多，尤以手淫的妄行和性交的過度而致神經衰弱的為最，有神經性素因的，神經系統的刺激性衰弱，很有易罹生殖器性神經衰弱症的傾向，其他交接中絕，交接限制，也很易引起生殖器性神經衰弱，這種患者，其神經系統的反應用，不絕的在亢奮中，勃起及射精的中樞，感動性相持，如有僅微的刺激，行射精成了。所以日間如有上述的觀看猥褻的書畫戲劇及聽取卑鄙的言詞歌曲等，則夜間必有遺精的發生。次為脊髓疾患和中毒，並慢性後部尿道淋等，或直接或刺激於中樞，或生殖器反射的作用，也有遺精的。至於急性淋，攝護腺炎，精囊炎，後尿道部刺激性藥液的注入時，及包莖，龜頭炎，包皮，膀胱結石，膀胱炎，肛門皸裂，等末梢神經的刺激，更由此刺激而刺激中樞，尤於神經衰弱之時，乃營共同作用而起遺精，又如糖尿病病的初期，癩痢，及劇烈的感動時，也往往見有遺精的。

(遺精的療法) 患遺精病的，以除去原因為第一要務。宜戒絕烟酒和葱蒜海味等一切興奮性的食物，晚膳不宜過飽，晚膳後不要飲茶，因為過飽與飲

茶，睡後陰莖容易勃起，易致遺精的。睡時的被褥不可過暖，下身尤然，過暖則陰莖易致勃起而遺精。每日用冷水洗浴或每晨以冷水洗滌陰部，則能強固閉鎖精液的肌肉，有預防遺精的效力。因患白濁等生殖器病而遺精的，須先請醫師治愈原因的生殖器病，方可治愈遺精。房事過度，手淫等，也為遺精的原因。當服下方的藥粉，有預防的效力。 *Mio. bromcamphor* (臭化樟腦) 0.3. *Yacchar* (糖) 1.0. 上分三包，一日量，飯後服一包，至於已患有神經衰弱，精神不寧而致遺精的，宜服下方的藥水： *Kali bromat* (臭鉀) 2.0. *Syrup Auranti* (橙皮糖漿) 10.0. *Aq. Com.* (熱水) 90.0. 上為一日量，分三次服，飯後服下。

(4) 夢精 夢精也是神經衰弱的一種症狀，夢精的時候，性器的神經，因為受着輕微的刺激而興奮，以致陰莖勃起，或實際不勃起的錯覺，這興奮更傳達到大腦神經，催起性交的夢想，上下相俟，終引起射精動作和感覺快感。患夢精的人，除了性器神經衰弱以外，常合併腦神經衰弱的症狀，所以夢精的下一天，全身必定覺得非常的疲勞。

(夢精的療法) 仍是依照遺精的辦法，就是不可怠忽了攝生；而在覺着是病的以前，必須要抑制不快的感覺，保持清淨的心緒，切不可陷于病的感情裏；因為那個精神的懊惱和煩悶，都往往成了致病的原因的緣故。醫治的藥如注射『愛斯法』、『百利多命』等強壯藥，很有特效。又如中藥的大補陰丸和知柏地黃丸，也有效力。

(5) 精液漏 這種症候，每在口中清醒的時候，常從外尿道口漏出精液，在步行或運動的時候，漏出更多。患有這種症候的人，他的小便，因混有精液，常常濁濁，也可分為神經性精液漏和炎症性精液漏兩種。前者因神經衰弱的結果，交感神經和迷走神經的興奮性減退，於是精囊的括約肌弛緩，不時漏出少量的精液。大小便的時候，漏精更多。這種理由和下面所述的攝護腺相同。後者的炎症性精液漏，原因是精囊發生炎症而起，也和炎症性攝護腺漏的情形相同，下面當有詳述。

(精液漏的治療法) 精液漏療法，與夢精略同，因腰椎的射精中樞過敏性而起的，其療法當以一般神經衰弱的療法和夢精的一般療法為主體。其因

攝護腺和精囊的肌肉緩弛症而起的，則應以一般療法與局所療法共同施行爲要；第一須避免性慾的興奮，禁絕身體的過勞，局所療法，於慢性後尿道炎及攝護腺疾患時，必須行之，電氣療法奏效的也不少，用感傳電氣，則於後尿道或尿道內，及會陰部，恥骨縫合部，通入電氣，其法即將導尿管導子插入後尿道部，其他的平板導子，置於會陰部，如用平流電氣，則置極於會陰部，恥骨縫合部，可通強度的電氣時時交換，其他一般攝生法，與夢精同。

(6) 攝護腺漏 年青的男子，平時每從外尿道口漏出稀薄微白色的黏液，這就稱做攝護腺漏。在小便後或大便時，漏出更多，患病者，或還併有腦神經衰弱之症狀，所以精神非常萎靡。這個病症，許多人都以爲是神經衰弱而起，其實像早洩症一樣的，也可分爲神經衰弱性攝護腺漏，和炎症性或細菌性攝護腺漏兩種。

甲、神經衰弱攝護腺漏 攝護腺不是分泌情意興奮性液的器官，這種分泌液，在性交的時候，能補助射精動作，但攝護腺的分泌和排出動作是不隨意的，在健康的人，竟自己不覺得有這腺性交的時候，攝護腺液的排出，由於腺體壁

中不隨意肌的動作，管理這動作的，是交感神經，所以全身或局部患神經衰弱的時候，管理排出攝護腺液的神經，也是異狀的興奮狀態，隨時將腺液排出，即成了攝護腺漏。

乙，炎症性（細菌性）攝護腺漏 這個原因，不在性器神經的衰弱，因為有細菌從尿道侵入攝護腺，以致發生攝護腺炎，更從這炎症引起的攝護腺漏稱做炎症性或細菌性攝護腺漏，患有慢性淋症的人，往往合併患着這病。也有並不患淋病，因為有桿狀細菌從外尿道口，經過尿道，侵入攝護腺，以致發生攝護腺炎而引起這病的很多。這種桿狀細菌的毒性很弱，其經過尿道時候所發生的尿道炎，和侵入攝護腺後所發生的攝護腺，都很微弱，病人自己並不覺得，直到引起本病以後，纔發覺有病，求醫療治。但是淋毒性攝護腺炎，則炎症很劇烈，攝護腺往往腫大，向後方的直腸前壁突起，大便的時候，倘是硬糞，壓迫腫大的攝護腺，覺得一瞬間漏出多量。有時直腸受腫大的攝護腺的壓迫，不時想大便，及到廁所，則又無便可排，且便意仍不去，意有致疑發生內痔核的，炎症性攝護腺漏所漏出的黏液中，常混有膿球菌體等，倘用顯微鏡檢查漏出的黏液，就可以

和神經衰弱性攝護腺瀰相區別。

患攝護腺瀰的人，往往併有包莖或早洩的病症，單獨患攝護腺的很少，所以要治療這病，必須同時醫治其併發的各症，否則難見效果。

第四章 性器神經衰弱的預防和攝生

生殖器性神經衰弱的預防，第一須注意其素因，因本症的患者，往往因先天性神經質的遺傳，或兩親酩酊後的受胎，或妊娠中母體的中毒所致，所以為父母的，應該避除酒類嗎啡等，以免損傷其神經系而遺害於子孫。妊娠中的女性，更須力避這種物質，且含鉛性白粉，也不可塗，以免影響胎兒。至於強度的神經病者，脊髓病患者，生殖器性神經衰弱者，及嗜酒如命的，都宜禁止結婚。如不幸而生上述素因的小兒，則其養育須充分注意，凡一切喜怒哀樂的刺戟，和聲雜沓的場所，可及的遠避，年歲稍長，抵抗漸增，則可用上述的冷水摩擦，水浴法，運動，體操等，以鍛鍊其身體，而改造其素因。已達春情發動期，則更應加倍注意一切攝生法和性教育的施行，尤為必要。

至於神經衰弱的攝生法，即對於神經系予以充分的休養，力圖營養的增進，脫離日常的職務和枯燥無味的生活，每日施行適當的運動體操，及以浴療法電氣療法，為日常的功課。其他事項，摒除殆盡，餘如便通和消化的注意，攝取無刺激性的食物，禁用酒類，煙草，這就是神經衰弱一般攝生法的大約。總之神經衰弱的攝生，一方宜使之鼓舞，而一方又須注意其安靜。

至於神經衰弱的治療和攝生的詳細方法，可參閱拙著的『神經衰弱的預防及自療法』，因為以上所述的各症，都和神經衰弱有連帶關係的，所以應該共同的治療，或作單獨的治療。

第五章 月經的病理和治療

(1) 月經不調 月經的官能，有時會不發達的，或者也會發達之後，而又停止的。『第一期月經不調』係指月經並不發生而言，其原因很多，有的因為生殖器官在構造上有什麼缺陷，或者因神經的機械裝置有殘缺，這是很明顯的。如果關於月經官能的器官，有所不具，或極殘缺，月經便也沒有了，但是這等器

官完全缺乏的都非當之少，即在極端的例中，這等器官的殘迹，總是存在的，大概是常見的例。第一期的月經不調，常見於女子不發達的女孩，如乳部不發達，陰部和液下無毛或很少，陰門的各部分形狀和十歲或十二歲的小女孩相似，內部器官也一樣的不發育，子宮很小，薄而扁平，如一黏液膜，沒有發生官能的動機，這等例是少有方法可以醫治的。

(療法) 除去原因，為第一要務，如由於子宮和卵巢的高度發育不全，而致機能不得充分的，和生殖器閉鎖症或尿瘻等的原因而起的，則施用手術，以除去原因，往往易於治療。其他注意攝生，整理便通，改良生活。子宮充血促進法，坐浴足浴等的水治法，熱性鹽洗滌法，子宮腔部亂刺法，子宮內消息子插入法，電氣療法，空氣療法等，都可應用。致於藥物療法，可服蘆薈鐵丸，每日服六丸，作三次分服，每服後隔二小時服二丸，須忌茶，否則即失效力，此外更須多運動，及滋補身體。

(2) 痛經 許多的青年女子都要患痛經，照例月經起初總是不痛的，經過一個時期後，因為內部的充血，充血的原因，則因受寒或便秘，在經期中遂慢慢

的頑強的變爲不快，隨後乃帶起背痛及重滯等感覺，這種狀況，即使不加治療，也常會減輕的，且在二十五到三十歲以上的女子，即使尙不結婚，有這樣苦痛的，都很少見。

又有一種痛經的原因，——無論如何總隨伴着的——便是因子宮的變位。子宮的變位，以傾向後方爲最多，一種是後轉，一種爲後屈，有幾個人的子宮後屈，似乎係從小樣的大概是生來如此，這是子宮先天的不完全，無法可以治療的。有許多子宮變位，是因連續的子宮充血，使子宮頭頂過重，前方因膀胱的膨脹，遂壓迫子宮後屈，或因便秘，這也能迫壓子宮成這樣結果的。有些子宮變位以後，是急性的，例如因偶然的事故，如從高處跳下，或乘馬跌下和跳舞，溜冰時跌倒。凡因這類原因而起的，初次覺痛時，即行醫治，是能全愈的。并且應該知道這些不是常例，只是或有的原因罷了。有些醫師十分確信，子宮沒有易位，也會生痛經的，但是無論痛經是否由於子宮易位，或由於充血，或由於精神上的原因，事實終於存在，如病人麻醉後，將子宮易正，再放入子宮支持者，數月內維持其位置，病差不多都會好的。除非神經質是很頑固的，還有許多疾病爲痛經

的原因，例如神經痛及疝風都是對於這些，只要治療主病，痛經消愈的希望，大概都可能的。

又有一種痛經患者並不見多，患時却十分痛苦，大概的原因，是子宮口而的子宮狹小的口頭出來。出來的時候，伴起極大的苦痛，極像早期臨產的療法當發作的時候，常要伴起惡心，嘔吐，及倦乏，稱這為病重，不過誇的但疼痛是因內膜從子宮口出來而起的，大概三四小時後痛便停止。但病者痛後覺得很疲乏，并且使她見健康中有這一種可怕的状态，心中十分懊惱。就事實說，這雖苦痛，危險却是沒有的。

(治療) 病人宜靜臥，且以浸濕溫水的布，裹包其下腹部，冷後換去。或請專門醫師治療。至於藥物治療，可服方列的藥水，有止痛的效果。Rij. D. Ryde
 stis Fluid (流動希特拉可膏) 3.0, Syrup Auranti (橙皮糖漿) 10.0, Aq
 Com (熱水) 50.0, 上藥為一日量，分三次服，飯後服下。

(3) 月經過多或過少 有些月經是有的，並不完全停止，只是不見，應注意的原因及治療方法和前相同。在別一方面，有的月經會得多，或者時期頹促，或

者分量過多，這兩種異常的現象，常引人起極大的憂慮，能去一詢醫師，自然很好的。但是必須知道一個人的經期，未有準則之前，有時常會得過多的，等到官能實在固定之後，分泌的量，大抵才有正規。如果月經接續有過頻或過多的情形，便應當一問醫師，因為只有醫師能夠說明這種徵象是因體制上有什麼改變，或者是純屬於官能的。但是必須知道，醫師如不查驗其內部分尚未完全發育，查驗的時候有痛苦，又因調驗時的手術上，也足使女性的嫌惡，使她神經很受衝擊，和精神上的不快的。可是檢查很快的，只消數分鐘便可完了，所以可用全身麻醉，隨後這並不像拔去一粒牙齒一般的有苦痛，因為不會留着牙床上的創穴，以後後來發痛。

(治療) 月經過多的——應注意原因治療，同時併施行對症療法。局所止血法的最簡單者，為熱性鹽洗滌，四十至五十度的熱湯，二至五立脫兒，洗滌陰道部則子宮收縮可達止血的目的。至冷性陰道洗滌，患者常不能堪，唯持續的冷坐浴，往往奏效。子宮按摩法，也很費用。至於藥物治療，可服下列諸方(一)
Sistolmerisin (西斯多滿新) 每服二三片，日服二三，很有良效。因為這藥為

那巢賀爾蒙製劑，內含濾泡黃體，和那巢內部一切賀爾蒙有效成分，所以有補益那巢賀爾蒙的不足，增進新陳代謝的機能。(1) *Acidum Funicum* (蘇酸) 二克和甘草粉，黃連粉適量，為丸藥四十粒，日服三次，每服六粒，都有功效。

月經過少的——宜服 *Pili Toriet Alvs* (蔗薈鐵丸) 日服六粒，分三次，每服前一小時服二粒，服此丸藥期內，禁止飲茶，否則失其效力。又服 *Enure Poi Tablet* (當歸精) 每服四片，日服三次，有調經補血之力。又服 *Delin* (溫敦) 每服二粒，日服三次，能補益那巢機能，治月經不至等。

(4) 月經困難 女子於月經來潮時，其局所及一般的症狀，激烈增惡，遠越於生理範圍，以致妨礙日常作業，而不得不就醫者，謂之月經困難。不過生理和病理的境界，漸次移行，殊難確斷。月經困難的局所性原因，如那巢炎，那巢腫瘍，那巢內分泌機能的障礙，喇叭管炎，子宮前屈或後屈，子宮筋腫，子宮外膜炎，子宮內膜炎和子宮發育不全等，或為機械性，或為充血性，都是月經困難的重大原因。局所的疼痛，或為發作性，或為連續性。發作性者，因子宮收縮，而起陣痛樣疼痛，由薦骨放散於下腹大腿，喇叭管的收縮，也能一陣痛樣疼痛，但其部位

多偏於病側，至連續性疼痛，乃由於子宮或其附屬器的炎症而起，疼痛在下腹部，且常限局於炎症部位。月經困難的疼痛，有與月經同時而起的，或起於月經二三日之前，至月經開始的同時而呈輕快的，或也有於月經中持續者，惟也稀有於月經開始後二三日方來的，其疼痛往往激烈異常，甚至有痙攣性發作的，稱做痙攣性月經困難。疼痛發作的時候，屢有惡心、嘔吐、四肢厥冷、失神等症，神經一般興奮，頭痛，偏頭痛，神經痛等，常見存在，這種神經症狀，尤以女教員、音樂家等的高等社會女性為多。

(治療) 首先注意原因療法，如有炎症的，行消炎法，狹窄的，擴張之，子宮位置異常的，矯正之，習慣性便秘的，整理之。至於藥物療法，可服下方的藥，有止痛之效：

(一) 黃蓉酒 〇·五克，纈草酒一〇克，橙皮粉漿四〇克，冷開水一〇〇〇克，共同混和，日服三次，上方第二日之量，治月經困難有效。(二) 流動希特粒司膏三克 *Eracl Hydrastis fluid*，橙皮粉漿十克 *Syrup Aurant*，用冷沸水一杯化和，為一日之量，分三次飯後服。(三) 佛里爾珠 *Valyl* 每日二三

進餐時用開水吞下，每服二三粒。

(5) 月經髮色 女子的月經，有時血色不紅，而發淡紅白色的，這是體虛血液不足的緣故，且有白帶夾雜其間的，只要治以西斯多滿新，或是注射溫敦，並內服蘆薈鈣丸，都能通經補血，增強卵巢的分泌力。

有時女子的月經，血色發黑，或是血塊，這是子宮或卵巢出了病症，或子宮內生有外症，除內服或注射阿葛滿新和西斯多滿新，以增強其子宮卵巢的機能外，如臍內和子宮生有外症的，應該再用下方的藥水，用陰戶器洗滌子宮，每日洗二三次，方藥列下：(一) 用一百培的來沙而 *Hydro* 藥水，洗滌臍內和子宮。(二) 用五十倍過養化輕液 *Polydol* 洗滌陰道和子宮，功能消除局部的外症的毒，患者照法治療，無有不告痊的。

第六章 月經時的攝生

月經時的攝生，關係性疾的預防和治療，很是重大，決難忽視的。兩句話可以說盡的，就是清潔和休息。這話在常識上便可斷定不錯的，而關於休息，更沒

有多言的必要，因為無論何人，都知道身體不快時是必須休息的。在月經困難的時候，如不休息，症狀便更加險惡，流血的量益多，所以更有不得不休息之勢。然關於清潔却又不同，從古時代因襲下來關於月經的迷信的傳說，至今還有許多人相信。女子都怕月經中的入浴洗滌，然而女子如果有洗滌的必要，月經中便也應該洗滌的。女子最可惡的白帶下，往往加重於月經中，許多女子的月經，每每有特臭的。如果隔了四五日不入浴洗滌，血液的幾分已經腐敗，便發特別可憎的惡臭，略為近一點，即可聞到，但是她們如果曉得健康也便是善，至少月經中應該勤於洗滌的。

(1) 月經來潮時的精神攝生 女子於月經來潮期間，其精神最易變常沉靜憂鬱的女子，在此時轉變為發揚爽利；在發揚爽利的女子，則轉變為沉靜憂鬱了。并且思慮簡單，容易為犯法的勾當，所以女子在此時期，對於精神上的攝生，很關緊要。精神攝生以安靜為主（休息）如體操，乘車，騎馬，跳舞等動作，以及長時間的觀劇，睡眠不足，精神過勞等，都應力避。當月經來潮時，精神大都衰弱，通常能耐三小時的勞心事業的，到了這期，祇能作一小時後就覺疲勞，并且

理想力，判斷力也比較薄弱。所以對於憂鬱困苦的事業，以及難于解決勞心勞慮的問題，都應避忌。小說等書，容易引起精神的哀怒，尤應禁閱。否則，必致精神衰憊，腦力減弱，而永無回復之望了。

(2) 月經來潮時運動的注意 女子月經來潮時的運動，絕對應該廢止，固非所宜；然過度的運動，對於身心方面，實有絕大的影響，總以不致身體過勞，精神疲怠為度。況且月經來潮時，子宮黏膜已受損傷，若行劇烈運動，則子宮黏膜的損傷愈甚，而子宮的出血量，也遂之而增多，所以運動過勞，在所切忌。至於身體素來強健，月經時無何苦悶的女子，稍為運動或作柔軀體操，那是無妨的。凡患子宮病的女子，務宜絕對安靜，否則其病必致加重，或再發，或治愈期間，因之延長。此外如月經時的性交，尤應戒忌，不然，為害滋多，且有危險。

(3) 月經來潮時的清潔 月經來潮時，對於身體和局部的清潔，很關緊要。如股間外陰部等處，可用溫水日洗二三次，至於冷水沐浴全身，則宜切忌。就是以灌注器洗滌陰道也非所宜，最好以月經帶保護之。月經帶有用紗布製成，或棉花製成的，且有以木屑包布製成爲小枕狀的，也有以精製棉或紗布栓塞，而

使其吸收血液的，質地雖有優劣的分別，不外乎清潔為主，污染時，必須更換。我國鄉間的女子，大概都以草紙穢布填塞陰道，使其吸收血液的。這種陋習，很不妥當。因用粗硬不潔的草紙穢布，非但使陰道容易引起炎症，而且血液是細菌最上的培養基，細菌一旦侵入，即行腐敗，子宮黏膜，遂發生重篤危險的疾病。所以使用月經帶，必須選擇柔軟清潔，富有吸收性的為最佳。至於襯褲等件，尤宜清潔；一俟月經終止後，便須沐浴。

(4) 通經藥的注意 女子的月經初潮，差不多都在相當的年齡，即行發見的。凡在這期內而月經不潮的，在上面已經說過，多由于全身疾患或子宮病等。在此時期，應當速就醫師診治，不可自行妄投藥物。因為通經藥種類繁多，必須擇其適合於己身的疾患而用之，始見大效。否則，濫投藥物，每有發生極大的危險。

第三編

性慾本能和不妊症的治療

第一章 性的衝動

生殖器官原不是爲享樂而設的。但是生殖器的機能裏，是附帶着快感的。因此把性慾弄成單純的享樂了。甚至還有主張性慾是完全享樂的，這是極端的議論。這個享樂的是否問題，姑且不提。惟有贊美造化之妙了。在這個自然的可贊美的妙味裏，男女兩性所組成的一對時，那爲好的生命之伸張，好的生活發達之計，是必須要營造好的性生活之方式的。這所謂性的衝動並了。

性的衝動是有生物最強的動力，生存競爭也從這個上得生氣，兩物相適合以傳種，也從這個衝動上生的；自然界一切的一切，並從最低的動物到最高的人類爲止，其所具的性慾不能都是先天的。女子的愛慕男子，男子的戀愛女子，其慾望都是生來就有，誰也不能缺少的本能。所以這並不是可恥的事，也並不是罪惡的事。從種種的方式考察起來，實在是自然賦予正當的自然的健全的慾望，一方面又爲種族的保存和繁殖所必需。如果沒有這本能，人類早就滅亡了。

人類在春情發動期以前，未解所謂性慾，也未解所謂戀愛，及至春情發動期，毋庸父母的教導指示，而自能漸漸的意念了解，這也是天然的妙機，孔子所謂「飲食男女，人之大欲。」飲食既自生而知，男女之道，因為需用較遲，所以知覺也較遲了。在發身的時候，男女既生出兩種衝動，一種是要撫到撫愛的心思，願意和異性的碰到，說話或寫信撫愛的衝動，在女孩子比男孩子強得多。第二種衝動，是想要把肉體內積起來的成熟的性的細胞放出，使得這種積聚所致的神經壓力放舒一點，這種衝動在男性比女性強的多。

兩性的關係，是非常複雜的，而且在這複雜的裏面，性的疾患，也增加起來，機能所給與的好的享樂和自然所給與的生殖行為，這裏頭往往生出不能使本能充足和安定的事情，因為求機能的安全的生活而不能得到的滿足，是要生出種種的葛藤哩。

第二章 性慾與自淫

無論男性或女性，當聲音變化的時候，可說已入於思春期的特徵，在這個

聲音變化的時候，生殖器在許多的時候，差不多成了急於成熟的狀態，而那個性慾是猛烈地感覺着的。超過這個思春期的一線的青少年少女的人生觀，算是完全一變而向新的方面注目起來了，這個事情的原動力，就是性慾的發生。因此，這時期的青年男女，把異性作為刺激的中心，而與異性的交涉，興味是非常地深的，其結果，或入於戀愛，或入於自淫的兩途。

我們再來研究男女兩性的發身經過，隨後再述於自淫的一途，因為這也有連帶的關係。當男孩子成熟的時候，如聲音的變粗，臉上身上的鬚毛生長最緊要的一種性的液體的分泌，平常稱為遺精。這後者的徵狀，是每個常態的男孩子到發身時候必有的，但是沒有一定的時間性，完全與女性的月經不同，有時一月兩回的，不像月經一來幾天，這種分泌不過幾秒鐘，同時也沒有痛的感覺。這種遺精，完全是常態，一點沒有病的表徵，不過是成熟的性細胞積多了漫出來的表徵，自然作用已經照身體所需的精液用了，排多餘的排出來就是了。女孩子在發身的歲數，除上述月經外，又發現性的衝動，這發現的徵狀，是睡時子宮口上會流出一種膜質物，這種作用，用在幾年的不常有，到後來來性的衝動

更強的時候，會有的，在少寡或少年已嫁而處境不能順從前已順的天性的最多；但是本人很少有覺得出這種分泌作用，所以沒有這同樣作用在男孩子的那麼危險。

自淫是思春期的兩性容易感染人的惡癖，而思春的男性，感染這種惡癖，尤其容易，差不多可以說，所有的男性，大都知道自淫的耽於自淫的少男，不單是消耗肉體，貧血成暗蒼色的不快的顏色，而且到了結婚期，不能更起正則的性慾，結婚以後，也不能依了對方的正則的接觸而受一點的快樂，他們就此走到變態性慾的方面去了。成了慣習的自淫，通常是記憶力減退，潑刺的青年，的生氣，因之變成憂鬱，而使其入於悲觀的境地。又身體的苦痛，也有如女性那樣地肚子痛，頭痛，常常是疑惑自己的康健，妄想種種的疾患，而非常地懊惱的。在性格的方面，是對於事物沒有根氣，沒有耐心，若是勉強去做，立刻就感到疲勞和厭倦。又因為勇氣喪失，所以就是心想戒除那個惡癖，也不可能。現於懊惱與自淫，身體的反常和精神的反常，又反常和懊惱和自淫，便打成一層而難以分解了。具體地說，夢精，滑精，早洩等不快的現象，生殖器的發育不全，和生殖

器神經衰弱症等，這都是自淫者所必受的自然之責罰。這種事情，很能影響於未來的兩性生活。照此以說，自淫不僅把青年的快活期變成憂鬱期，是會使那人的發生溼生田破綻的；它實在可恐怖的性慾的魔道，是最可排斥的人生的惡癖。

很簡明地說一句，因為沒有正常的性交，去滿足性慾，用着種種不自然的方法，如男子以手握陰莖或將陰莖插入兩腿中間而摩擦；女子用手指或他種物體插入陰道而摩擦，使發起快感，終至射精的，叫做自淫，或稱自瀆，或稱手淫，或叫自己躑躅。

女子自淫，其行為之目的及發生的原因，雖與男子相同，至其害患，尤有過之無不及者。因女子之耽於自淫，不特能使全身衰弱，消耗肉體，貧血枯黃，容顏變老，以及陰道炎，白帶下，生殖障礙，精神憂鬱等等可怕的症候，且至結婚期不能更起正常的性慾，結婚後，也不能和丈夫行正常的交接，即勉強交接，也不覺絲毫愉快，蓋其性慾，已成為變態的性慾，所以在事實上，凡有自淫惡癖的女子，往往憎惡正常的交接。

第三章 自淫所致的諸症狀

年幼體弱，陷于過度的手淫的，每致生下列的各症狀：(一) 全身衰弱貧血，顏色蒼白，感覺過敏等。(二) 生殖器機能障礙，陰萎，遺精，早瀉，陰莖的短小及彎曲，並翠丸的發育變化，而致生殖作用根本消滅。(三) 頭痛，眩暈，失眠，健忘，神思恍惚，精神憂鬱。(四) 脊髓諸疾患，肺病，精神病，發狂，癡癲，妄想症，腦出血。(五) 消化器病(胃病)，神經性食慾不振，胃弛緩。(六) 听力及視力的衰弱。(七) 發育未全者，則全身的發育阻害，及全身的變形異常。(八) 膀胱炎，攝護腺炎，精囊炎，辜丸炎等。(九) 疲倦無力，操作不能，心存畏怖，舉動錯亂，腰部酸痛。(十) 心臟肥大，機能衰弱。

第四章 自淫的預防和療法

要矯正自淫癖的惡習，最根本的預防法，先須從嬰兒時為週到的監視。在我們所知道的範圍內，很有許多愚蠢的婢僕，不良的乳母，從小把這種惡習教

引那兒童的。也有教師故意或偶然教導他們的，所以這一點應該先加注意。

多數學者以防止手淫的害必須適當的懂教育，但教育未必有壓抑病的誘惑之力，尤以青年担任教育者如不適當，及其方法不合理時，反挑撥兒童的好奇心，易有促進其自淫之弊的結果。性教育因為達相當年齡之子女必不可缺者，常用如何方法，不可不研究之。近時雜誌與通俗衛生書籍盛載性問題論文，此等除迎合讀者的好奇心，推廣銷路為其目的外，決非誘導子女之理想的良法明甚。由醫界的立場觀之，減少易於自淫的兒童的過敏性最為重要，因此適當其食物，運動，睡眠狀態和防精神的過勞為必。小兒科醫師尤多接近病的兒童的機會，務要留意此點，防遏將來神經衰弱的發生。

春期發動期，大多數覺有自淫行為，其中陷于不可救的殆為先天性素質的。心身健康的能速離此惡習，其一旦陷于強度的弊害者，為之陳說其害，期望其以意志之力戰勝劣念，雖屬必要，然誇張其害則實錯誤。萬一遭遇患者時，務須使減少湧起色情觀念的機位為要。減少內外性的刺激，實為至高至上之法。充分運動與勞動時，性的興奮著明減退，肌肉運動盛，則性的慾望殆常消失。如

學生，店員或公司職員等室內生活時間多者，當獎勵其利用餘暇散步戶外或肌肉運動，最為有效。健康者過度精神工作之後常性慾減退，但有自淫常習的，則反見反對的結果。可見精神過勞與遺精，精漏發生聯帶關係。此外通大便，戒刺戟物的攝取，身體有衰弱徵候的，良其榮養以固體力的恢復，是必須注意的。

手淫的惡習牢不可破的，可利用催眠狀態與以暗示最為有效。風氏謂自淫療法中最確適而奏效快的，莫過於催眠術。此外方法僅可用以補助之。此外推獎催眠療法的頗多，風氏由此方法，二十例中治愈十三例，六例經快。陷於脅迫的手淫者，意志薄弱，而覺醒時之示教無永續的效果前，催眠術為惟一的方法。同時規正睡眠，選擇食物，整理通便等，成人與兒童有同樣的必要。催眠術外，精神療法之轉換觀念於他方不可不研究。有應用使養成自然而愛藝術的趣味，與以肉感以外的慰安於神經系統的方法。在此意味，愛讀高級書報也為一轉換觀念的手段。閑散與孤獨為助成惡習慣的原因，「小人閒居為不善」其斯之謂乎。

在實際上，自春期發動期以達結婚，不絕的轉換觀念是不可能的。不論誰

何均遭逢性問題，文化進則男子的結婚年齡遲，是當然的結果。其間如何減少性的興奮，是一個大問題。結婚不能後，則禁慾，自淫，買娼，避孕的私通等四種問題出現，這亦是必然的結果。一二年的禁慾尚不可能，則連續數年的禁慾更是難能。自淫於衛生上有害，買娼婦有傳染的危險，私通在道德的見地上絕對不可獎勵，於是性問題安全辦亦無開放之處。此狀態為現代的性的窮境，實際上醫師遭逢的時候很不少。手淫與遺精大部分由結婚而全治，然不能結婚者為多，然則當如何解決此難問題。編者不幸不能詳述其法。然不外詳為說明禁斷乃至其他方法之利害得失，而取捨則委諸個人。在生物學上的要求與社會狀態不一致的今日，尚無此外的方法。也有純粹戀愛時，為脫離手淫惡習的動機。

除普通療法及精神療法外，其餘療法殆無可記的價值。因手淫無特殊的藥物，如用除去誘導手淫的局部過敏性或用減退快感的藥物反為有害，將誘致後來正常性交時快感減退性交不能的結果。臭素劑 Vaidol 等對於普通過敏性有效，可用至如嗎啡，砒素等反有害處。用緩下劑以整理通便為必要，如能注意飲食以代藥劑更佳。其次有以器械豫防手淫的方法，其着眼處在防操

觸陰部的機會。如以小鐵網或盾狀被覆物被覆陰部，上有鎖具，在排尿時父母預爲之開啓，排尿後再閉鎖。惟此等機械的裝置反脅迫子女的精神生活，並非防遏手過的適當方法，故不足取。又有於就眠時縛其手足或用厚手套的，然亦無好結果。

更有施行手術以防止手淫的，其法牽包皮於前方，在相反的二點自內側用粗線通過，放置一定時日，於其部形成癢痕，待皮膚肥厚而拔去其線，更穿兩孔而通過銀線。由此方法當然不能手淫，因可絕對防止勃起，且夢精，遺精等也可治愈。今日此種手術已不多見，惟在古時盛行，據云有大效果。在女子則用切除陰核的方法，婦女醫勃朗氏謂盛行自淫的婦女一般營養衰弱，已起精神症狀的非施此手術不可。陸倫達氏謂陰核切除時同時須切除小陰唇，費勃林氏謂陰核與前庭的燒灼法最爲有效。此外有用插入消息子於尿道內而不能行手淫的方法，燒灼鼻粘膜以避由於嗅覺來的誘惑之法。

第五章 不妊的原因及治療

不妊的原因有先天的和後天的。先天的，是絕對地不妊，後天的，許多都是一時的不妊。又這個不妊的理由，可以分成三大別：其一是女性方面的缺陷，即做妊娠的重大要素的卵子之形不能，其二是男女兩性都應負責的精子與卵子結合的障害，其三是女性的妊卵保育不能。但是不妊的原因，是由機能而區別，所以若是講到那個機能受了障害或是得着疾患的原因，那不妊的責任當然是男女同担的。依據這個理由而養成不妊的原因，是生殖器障害，機能不能等等。而有絕對的不妊和一時的不妊的兩個類別：絕對的不妊，是卵巢全部缺損，卵巢腫瘍，卵巢摘出，先天的卵巢萎縮，卵巢變質等類；一時地不妊，是卵巢發育不全，卵巢水腫，無月經，振性卵巢炎，肥胖病，貧血，腺病，酒精中毒，嗎啡中毒等類。

精子與卵子因為種種的理由而不能結合，自然是不會妊娠的，絕對的不可能的，是神經中樞的疾患，辜丸萎縮，無精子，輸精管萎縮，老人性萎縮等神經障害，生殖器障害之類；一時地不可能的，屬於男性方面的原因，是尿道狹窄，陰莖畸形，精子減少，淋症及微毒，神經性萎縮等疾患，屬於女性方面的原因是子

宮腫瘍，子宮位置萎縮，膈閉鎖，外陰部畸形和疾患，處女膜異常，頸管狹窄等類。這個絕對的原因，是子宮發育不全，子宮粘膜炎等；一時的原因，是慢性子宮內膜炎，子宮腫瘍，子宮周圍炎，骨膜炎，子宮位置反常等。

以上所說的，都是兩性不妊的原因，當在下節擇要的加以詳述。

甲． 男子的不妊症

(1) 射精不能症 這因男子的射精管或尿道有障礙，以致射精時的精液，不能通過而達於女子的膻內。本病的原因，有先天性和後天性的分別：屬於先天性的，其射精管呈扁狀或陰莖下裂症，或陰莖的下側有溝，射精時致精液不能射入膻內，洩漏於外方；或男子因患淋病後以淋病失治的結果，而成尿道狹窄的性的，其最多的原因，為男子因患淋病後以淋病失治的結果，而成尿道狹窄的很多，因尿道狹窄之故，易使性交時射出的精液不能流出於外，或因淋病後攝護腺膨脹，輸精管受其壓迫，以致精液不能流出於外，或射精管固通，而因攝護腺的變化，使精液射出的方向錯誤，以致精液不向尿道口流出，而流至於後方的膀

脏。所以在性交時，有精液不流出，而性交後，由尿中排出的。倘精囊患疾病，如精囊結石壓迫射精管，即其症的一例。又如包莖的人，也為致此病不妊的原因，且包頭易患白濁症，又有因精神衰弱而發此病的，稱做精碎性射精不能症，患此症的人，雖能性交，然不洩精液，大都為色慾過度，精液消耗過甚的緣故，所以有這現象。

(治療法) 如係包莖的，可用手術割除之；尿道狹窄的，須用電療擴大之；生殖器的畸形體，設法矯正之。對於貧血病或患神經病的人，須用補血安神療法，如鐵礮劑的內服，磷砒士的年之注射，都有功效。並佐以電氣療法，更有特效。總以治其致病之原，強壯其體質，為最緊要。

(2) 無精虫症 所謂無精虫症者，在性交後所射出的液體稀薄如水，液體中無精虫的存在。考其致病的原因，大概為睪丸之病，而停止產生精虫的能力，或睪丸無病，而副睪丸有病變，如男子患淋病後而發生的最多。如患淋病性副睪丸炎，經治愈後，每遺留睪丸組織的硬結，有此硬結，則睪丸無產生精虫的能力。男子身體雖強壯，兩性雖能性交，而精液中並無精虫，則其妻子當然不能受

孕生育的。世俗之人，每以兩性間的不能育兒，多以為咎在女性，其實不然；因為男子無精虫，即為不妊症中的主要原因，其病在於男子，而不在女子。又因房事過度，縱淫之人，濫耗精液的，以致舉丸吸取血液製造精虫的機能頹廢，不但致陽萎症，且多釀成無精症，既傷身體，促短壽命，又有乏嗣的禍患。

(治療) 這種無精症的防治，殊鮮良藥。惟有摒除一切的慾念，靜養調理，如常注射丸製劑的賜保命，使體質強盛，或有恢復的希望。所以青年人對於色慾一端，最宜注意，減少性生活，節慾養身，就是強身長壽的要道，幸勿以血氣方盛，荒淫無度，貪戀肉體片刻之歡，致損體質，而戕害終身的幸福。

乙. 女子的不妊症

(1) 子宮前屈 子宮前屈的原因，是因子宮的位置，生理的因腹壓或是膀胱之充滿或空虛等而移動的；在小骨盤內坐骨經腺的中央，原是子宮正當的位置，現在都向前方傾倒着而遂不能妊；隨着這個子宮前屈症而發生的，除前述的不妊症外，就是月經困難和種種神經性的病症。子宮前屈，所以成了不

娠的原因者，是因爲前屈而子宮頸管狹小，而子宮非常地偏向前方，精子進入子宮腔甚爲不便的緣故。

(治療) 除應用服藥劑外，並用開宮口器以擴張子宮口，一方並用託宮環將子宮頸伸直，同時並增進全身營養，節制性交，避去刺激性食品，則子宮可回復正常位置，方可易於妊娠。

(2) 子宮後屈 子宮後屈是與前屈相反的，向後方荐骨窩而屈着的，原因是腹壓在子宮後方作用着的時候，是保持着子宮正當的位置的，而因這個作用，反常腹壓加於子宮前面時，子宮便向後屈了。也有因子宮的韌帶弛緩而發生的，這是韌帶的弛緩長腹壁之作用的緣故；影響於這個韌帶及膀胱的腹壁作用的原因，在處女則是自淫，或是常習便秘，或是膀胱充滿等；在有生產經驗的女性，則是產褥時或子宮復原作用的障害等。子宮後屈的症狀，是直腸受壓迫，因之許多都患便秘或痔疾，膀胱因受子宮頸部壓迫而感着很大的刺激；荐骨痛，腰痛，下腹部覺着充滿，胸悶，想吐，心悸亢進，不眠，還有頭痛，卵巢痛的；在月經前或月經期，這些症狀更其利害。因子宮後屈症更有發生月經過多症的，也

有月經困難的，還有下白帶的。

(治療) 治療的方法，第一須用手術整復子宮，將宮體回復正當位置，再用託宮環以固子宮體，或用圓韌帶短縮手術，腹壁或臍道固定術。而一方更用內服藥劑，以營養其身體，如是，則子宮位置，即可矯正，苟無其他疾病，即不難一索而得了。

(3) 發生酸液 男女性交時，婦女生殖器中各腺不分泌液質，固不易受胎，甚或發生壓瘻變，倘使分泌太多，則酸液過甚，也能夠把精子淹死，因之不能妊娠，為着精子一遇酸性，即減少其活動能力，所以酸性分泌液太多者，必立時死滅，無從妊娠了。

(治療) 應於性交前一小時，用適宜之藥，以中和分泌液之酸性，使精子經過膈道時，不致遇有酸性而致死滅。這種藥劑，可以不必求請醫師，自行配合，也無不可。其最有效的一為磷酸鈉液，用以洗滌，就是將磷酸鈉溶解於水中，計水占百分之九十五，磷酸鈉占百分之五。一為磷酸鈉甘油栓，用以塞入膈中，即以磷酸鈉二·五克，甘油約六〇克，互想溶和以後，漬以栓塞，塞入膈中如是。

則腔液經此中和後，卽失其固有的酸性，精子可安然經過，而推入於輸卵管中，與卵子相會而妊娠。爲其起因於子宮頸破裂後，致宮口常分泌一種澀酸液者，則須行宮口縫合術。

(4) 白帶 白帶是從陰排出的白色污物，使近代女性非常苦惱的一種東西。患者至少百人中有二十五人，而我國則有十女九帶的俗語，因爲我國女性對於生殖器的衛生素不講究，所以患的人更多。然一患白帶，卽妨礙妊娠的成立，因白帶含有酸性，精子遇之卽死，所以患白帶的女子，幾乎十分之八不能妊娠的。白帶分有生理的和病理的兩種，尤以屬於病理的白帶，則有害身體的健康，障礙于生育，必須醫治的。

甲 生理的白帶

凡婦女的陰戶和子宮頸管等部，自然的有一種分泌液，無論強弱的人，都有分泌，不過有覺得與不覺得。如其分泌增加，卽現白帶的現象，較多者亦屬無妨，如有過分增多，且覺腔內發熱，尿意頻數的，卽爲病理的現象。其生理的不必

醫治，病理的，非加醫治不可；而其增多的時期，大概在月經的前後，姪娠期間，性交過度之後，每有發生這種現象。今將其生理與病理的區分，大概如下述的狀態。在生理的白帶是為無色透明的液體，與蛋白質相似，並無臭氣。倘者，白帶如稀薄牛乳而略帶顏色的，便是病態。從顏色上鑑別診斷，也為重要的一點。又如病理的白帶，其分泌液的分量，自必分外過多，顏色或似牛乳黃樣色，或呈褐色，有時混有血液在內，很有臭氣；不過病理的白帶，大部患者有與淋病相關，幸勿混為一談，視為普通的白帶。因為淋病自有病的原因。在生理的白帶，本無關重要，不須內服藥劑，只須注重清潔衛生。每日用熱水與石炭酸衛生藥皂洗淨陰戶，或用化淡的明礬水將陰戶內洗清淨，便能全愈。且明礬有制止分泌液的功效，又能除臭氣，使陰戶乾燥。或用棉花於二十倍的明礬水中浸濕，塞入陰戶內，每五六時調換一次行之數日，白帶即可乾淨。

乙、病理的白帶

病理的白帶，係女子生殖器內粘膜發炎，一名陰腫，又稱膿炎，多發生於少

婦。初起時腔內發生奇癢，繼則流出粘液很多，色呈黃褐，且尿意頻數，陰戶外緣因受分泌液浸濕，變為紅腫，以手指插入腔內而發疼痛，性交困難。若病勢增進，則粘液的分泌愈多，患部發浸蝕之感，粘液固着陰毛，因其分解而放出可惡的臭氣，排尿觸及腔口，則發劇甚灼熱的感覺，這樣的持續至十餘日，則病症逐漸漸減退，或因性交過早，必變為慢性膿炎。其症無自覺病狀，惟洩出似膿樣的液質，有時減少，有時增加，每在月經前後加劇，傳染力也盛，身體因以漸次衰弱，貧慾不振，大便祕結，若經久不治，則有發生覆膈膜炎，在腔內腫大，似有物而覆于表面的，甚至腔內狹窄，性交時雖不覺疼痛，然毫無快感，遂致受胎困難。

查本症發生的原因，大概可分兩種，一由於子宮疾病和子宮附屬器，如喇叭管卵巢等的炎症而來，乃是局部異常，致使腔內分泌多是粘液，而成白帶。二由於貧血或是全身衰弱體質異常，而發生之白帶，惟因全身異常而發生的白帶，如有腺病質的女子，帶下分量極多，這是屬於先天性的個別素質。如女子發現病理的白帶，而非屬於生理時，必須急求治療，勿以白帶認為女性的通病，而忽於醫治，這種心理，最是大誤。

(治療和預防) 預防白帶的方法，在月經來潮時，必須注意身體下腹的

溫暖，與經期時的有無疼痛。日常陰部宜保守清潔，每晚用熱水洗滌，房事宜有節制，毋不潔，毋過度，勿與患淋病的男子性交，這樣決無白帶的發生。如女子患有病理的白帶症，治療的方法，每日整理大便，不使秘結，忌食酸冷辛辣酒類的食物，多食滋養品，陰部注意清潔衛生，再用下方治療，能使分泌液制止，消毒退炎，而白帶便可除淨。方用百分之二的明礬水，或二百分之一的過錳酸鉀水，或百分之三的硼酸水，洗滌陰戶的內外，最好用女用的水節，將藥水打入腔內，更妙。每日洗滌二三次，使腔內清潔，在洗滌陰戶之後，再用百分之八的普泰哥爾蛋白質 8% Protagol 溶液，用藥棉花做成小圓球，浸透上述的蛋白銀液，塞入陰戶內，塞時須進，使內粘膜都能受着藥力。在棉花藥球上繫一線，拖出陰戶外面，以便拉出，每日換藥三四次，極有效力，或用單寧酸 *Acidum Tannicum* 2 0 gr, 柯柯油脂 *Oleum Cocca* 2 0 gr, 共為調和，做坐藥六個，每日早晚用一個，塞入腔內。至於治白帶的內服藥，用含糖炭酸鐵 *Ferrum Carbonicum Saccha- ratum* 1 0 gr, 大黃末 *Radii Ra* 1 0 gr, 磷酸鈉 *Natrium Phosphoricum* 5 gr,

上藥研粉，混和之後，分爲四十五包，日服三次，每服一包，這藥有調補氣血，服之有增進體力，健身的功效。至於中藥內服醫治白帶，以利尿理濕，疎氣清熱治之。茲將中藥方附列於後，以便患者照服。方用當歸二錢，白芍錢半，黃柏錢半，炒澤瀉三錢，粉丹皮錢半，廣鬱金錢半，生地黃三錢，連皮苓四錢，豬苓三錢，桑寄生三錢，車前子三錢，淡竹葉三錢，每日煎服，也有良效。

第四編 花柳病

第一章 總說

花柳病是因爲從花街柳巷等賣淫地方不潔的性交傳染而來的病，所以有這名稱，然也有以接吻，手巾等爲媒介而傳染的。

花柳病有三種：卽淋病（白濁）、梅毒（微毒）和軟性下疳。其中淋病蔓延最廣，梅毒最可怕，軟性下疳比較輕微些。淋病的傳染，大概都因直接的接觸，梅毒則除直接的接觸外，更能經過種種的物體而傳染。有許多的微毒，並非在

交接中傳染，卻由接吻，手巾，牙籤，剃刀等傳染而來的。從前做醫師的，也常常會傳染病人的徵，因為檢查病毒用指插入腔內的緣故。

在數年前，除了墮落者外，幾乎所有的女子，都不曉得有所謂花柳病的存在。關於花柳病的一切問題，都絕口不說，視為可恥；在人前固不必說，就是在新聞雜誌，講演，舞台等，也以爲不能說及，或描摹及的。現在呢，卻在公開的席上，狂呼起來了，完全一變沈默的態度了。凡是男女兩性，都受到花柳病危險的警告，人人都憂慮着，怎樣可以使兩性免於花柳病的危險。其中更有充滿着謬誤的，誇張的言詞，徒然惹起一般人的恐怖心。關於花柳病的蔓延，損害於女子的危險，或者是女性的危害男子，作過甚其詞的報告，更屬非常之多。

實則，要根本的預防花柳病，須禁絕娼妓，但事實上難以做到。其次公共衛生機關定期檢查娼妓，有無花柳病。（現在我國的通商大埠已見實行）倘有花柳病，在未治愈以前，暫時停止其妓業。各國雖都有這規則，可是效力很少，因為娼妓天天接客，天天可以傳染花柳病；而公共衛生機關的檢查，必須隔一星期或二星期舉行一次，再有用膠皮套（如意袋）或藥物的個人預防法，但效

力也很微小的所以潔身自好的人要免花柳病的害都是自己自動的禁絕宿娼了。

第二章 淋病

淋濁的病，在平常人看來，因為其不發現到身體外部來，以為花柳病裏頭是最輕的；其實，是花柳病裏頭最難醫好，并且最受累的。軟性下疳發生後，倘能夠及早醫治，并且嚴守衛生方法，大約一個月可以醫好，這已經說過的了。梅毒的症狀雖然凶險，在以前確是花柳病裏頭最可怖的。自從六〇六發明以來，如醫治得法，可以限日醫好。淋病則目下還沒有特效的藥發明，并且其病部：男子在尿道裏面，女子甚至在子宮裏面，藥物很難作用，雖有洗滌的法子，都不過一時的，要其全愈很為難了。倘若發過後經病六星期，還不會醫好，就變成慢性，一切苦痛，雖比初起時稍為減輕，但治愈更難，差不多終身無治愈的希望了。

淋病不但很不容易醫好，并且還有橫痃，辜丸腫，關節腫痛，膀胱炎，心臟內膜炎等種種重大的疾病陸續發生出來，所以是一種很可怕的病症。淋病在三

種花柳病裏頭是最多的。凡妓女不問上中下三等，差不多無一不有。不但妓女，凡不守閨範的婦女，同曾經宿娼的男子，也差不多十中九有。不過彼等到了慢性期之後，自以為已經全愈罷了。實則其尿道或子宮裏面，淋病微生物還未曾滅盡，仍舊能夠傳染於人的。淋病完全醫好之後，仍舊能夠從他人傳染的，並且生過淋病而醫好的人，比未生過淋病的人，更加容易傳染。第二次發生淋病時候的症狀，雖比第一次稍輕，然而比第一次更難醫好，大概是不能完全醫好的了。

淋病大概從交合而傳染，雖然也有因公用便壺或公用浴布而傳染，究竟很少。女子則因洗滌陰部的時候，所用的水或拭布不清潔而傳染的很多。故男子旅行時，不宜公用的便壺。若不能用，則龜頭切不可觸着便壺口。一家中有女子發生淋病的時候，健康的女子，不可和他在同器中洗滌陰道，即拭布也須各人自備。

淋病的症狀與醫法等，男女不同。下文一一的分別說來：

第三章 男子淋病

甲. 急性淋病

在不潔的交媾之後，經過幾天總發現了淋病。這須視淋菌的毒力，或侵入尿道內病菌的數目，和個人的抵抗力等關係而定，很不一致。急性尿道炎通常在三三日後，排尿時感覺尿道內有刺樣的疼痛，尿道口發赤腫脹，尿道口唇互相粘着，稍為壓迫它，就有粘液或膿汁的流出，膿內含有多數的淋菌。以後尿道發生炎症——因淋菌而起內病的變化——尿道粘膜發赤腫脹，灼熱，疼痛，膿汁更多，疼痛劇烈，在放尿的時候更甚，恰如熱水由尿道流出，或尿道內有如錐刺樣的感覺，夜間因陰莖易於勃起，更增加病人的痛苦，有時在膿中混有少許的血液。

在這個時期，龜頭或包皮有發現腫脹而成包莖的，有時還發生橫痃。這種劇烈的現象經過八天到十天以後，各種症候漸漸減輕，膿量減少，疼痛減輕，發

赤腫脹也漸漸消失，如此時怠於治療，就會變成慢性，難有治愈的希望了。

(1) 急性前部尿道炎 男子的尿道口一附着淋菌，經過四十八小時後，那部分覺着輕度的疼癢，次日小便時，便感覺着熱而洩出黏液來；在第二天小便時，又變成了疼痛，尿道口發赤，腫脹而流膿，約到第七天，小便更覺可痛，好像被注沸水那樣的苦痛。從感染到發病的潛伏期，是從第二天到第七天，遲的，有延至一月以後的。症狀也是由感染的人的年齡和體質而有差異的。年輕的人比老人劇烈，並且多是急性的，可是治愈速度快；強壯的人比虛弱的人，在大體上是強烈的，而治愈也是快速的。現出劇烈的症狀，是在七天以後，尿道的腫脹加甚，因之尿管縮細，而遂像點滴一般了。尤其是放尿時的疼痛，是非常利害而灼熱的。局部的腫脹利害起來時，一至於包皮，也要生出浮腫來，而陰莖的尖端是要醜惡地膨大的，並且是會發生淋巴管炎，使淋巴腺腫脹而生出橫痃。另外還有輕度的全身發熱，身體倦怠，食慾不振，並且為淋菌的毒素而會現出神經衰弱

的症狀。發病後二三週間，這些症狀漸漸地激增而達於極度了。從此以後，症狀勢將消散，疼痛和排膿等，也漸漸地減少，再過三四週間，尿之濁濁也失去而轉

成透明，只是尿中還殘留着淋系。

(2) 急性後部尿道炎 急性後部尿道炎，乃由前部病變，經尿道外括約筋而波及後部的尿道的黏膜疾患。本症或因淋菌附着的器械及藥液洗滌的輸入後部，或以飲酒，遺精，性交，劇烈的誘發，其發生不緩，有毫無外觀的症狀者，也有以特有的症狀而起者。依其症狀的輕重，也有急性，亞急性和過急性的分別，當本症發生時，不論膿液分泌的減退與否，而尿液卻增其稠濁，後尿道炎的多數，概不尿意頻數的症候，每次放尿，不及五分鐘之久，且放尿終了時，肛門部有放散性劇烈的灼熱疼痛，是不僅於後部尿道為然，而膀胱頸部的侵及時尤甚。這種狀態，稱做膀胱尿道炎，於過急性的，往往放出血尿，惟此乃因攝護腺部的外括約筋攣縮之際所受壓迫有以致之，又因炎症的波及精阜而刺激的緣故，屢見有遺精的。

乙. 慢性淋病

在急性期中，倘不守衛生規則，或醫治不適當，到第六至第八星期的時候，

漸漸變成慢性淋病。急性淋病，已過了三四個月，而尿道仍然瀰濁，淋系仍然存在，或是朝起時，尿道口有黏液膠着一壓迫尿道，有些少的黏液流出來。但在患者本身，是沒有什麼痛苦的。又有僅在尿中看出淋系的，在這裏面，也有急性淋病後淋菌已經全滅，可是尿道黏膜的炎症還在殘留着的，叫做淋疾後單純尿道炎。病的病症在混同着的，實際上那個區別是頂頂困難的。淋系的形狀有種種有長的，有短的，有液樣或膿樣的，就大體上說，是沒有自覺狀的，但往往有尿道裏的疼痛，瘙癢，灼熱痛，和壓迫感的，又有尿道的狹窄感的，也有排尿之際，尿腺兩分的。

(1) 慢性前部尿道炎 患者不感疼痛，在排尿時或排尿以後，尿道覺有搔痒之感，在飲酒及飲炭酸水之後為尤甚。早晨或長久沒有排尿之後，就有濃汁漏出，壓迫尿道，有黃色的粘液，尿尿在玻璃管內，可見有如絲或塵的渣質。

(2) 慢性後部尿道炎 尿意頻數，肛門或會陰部有重感，射精時覺着疼痛。後尿道炎患者的攝護腺大多患有炎症，並且往往伴有遺精或陰萎症的。

丙. 男子淋病的合併症（續發症）

上述諸症，都是淋菌發生於尿道內，致成疾病。但與尿道相隣的，外如包皮，內如睪丸，副睪丸，尿道球腺，攝護腺，精系，精囊等，莫不密接尿道。若淋菌由尿道向周圍蔓延時，則必更將發生種種的合併症。這種合併症，常起於淋症發生之後，所以又稱續發症。至於續發症的發生時，患者更痛苦不堪言狀了。如上所言，與尿道隣接的部分既多，所以所生的合併症亦多了，茲擇其重要而最多的述之於下：

（1）尿道狹小 我們的尿道裏面皺襞很多。小便的時候，皺襞開張，尿道擴大起來。生了淋病之後，粘膜紅腫或更腐爛起來。若變成慢性，長久不醫好，則皺襞慢慢合着，不能再張開，以致尿道慢慢狹小起來。小便的時候，尿線很細。一回小便，要費許久的時候。若尿道慢慢狹小起來，竟致閉合，則因不能排出小便，成了尿毒症，那麼就有生命之憂了。故起初狹小的時候，宜即請醫師醫治。醫師每日用銅管插入尿道，使皺皮不再合着，即已經合着的，也可慢慢使它仍就張

開，故雖已經狹小的尿道，也能慢慢使它擴大，不過要費長久的時日醫治的。

(2) 攝護腺炎 攝護腺是圍繞後部尿道的一個腺，位於膀胱之前，大如一粟，腺內有多數排洩管，無論急性或慢性尿道炎，都能使攝護腺發生炎症。在急性攝護腺炎的時候，腺腫脹，可由肛門內觸覺，肛門內常有不快的感覺或疼痛，大小便都沒有節制，時時想解，或者小便不能解出，也有發熱的。上述症狀若更加劇烈，即成攝護腺化膿，結果向尿道或直腸，或會陰部破潰流出膿汁。

慢性的攝護腺炎，有的是急性的後遺症，但大多續發於慢性後部尿道炎，此時少有自覺症狀，不過肛門或會陰等部，覺有重感，有時亦現疼痛，尿意頻數，又在射精時感覺疼痛，尿溷濁。

(3) 包皮炎 包皮炎以包莖的發生淋疾者，最易犯之，初發時稍覺瘙癢，壓迫之感，繼即疼痛，冠狀溝部膨大，包皮前緣，見有痂皮的附着，翻轉包皮，則有稀薄惡臭的多量膿汁湧出，龜頭表皮剝脫，發赤出血，而疼痛，症狀劇甚時，全包皮浮腫狀腫脹，致不能翻轉，病狀更進，則內葉壞疽，包皮穿孔，幸或形成肉芽，發生癩痕而治愈，或炎症持續，包皮與龜頭永久接觸，而至全部癒着。

(4) 精囊炎 精囊是從睪丸輸精管而入尿道間的一個囊，它的作用是靠來儲留從睪丸內產生的精虫的。位於膀胱的後方，由精囊發出的射精管通過攝護腺而入後部尿道，所以在後部尿道發炎時，容易引起精囊炎，同時發生副睪丸炎或攝護腺炎。急性精囊炎的時候，大多發現疼痛發熱和尿意頻數，也有完全不現這種症狀的。此時尿中混有精液，膿或血，想得詳細的診斷，非求醫師不可，也有發生膿瘍而向直腸破潰的。

(5) 副睪丸炎 男子患淋病後，其淋毒沿輸精管侵患副睪丸，發生副睪丸炎，即俗稱淋病的偏墜，不識的往往誤為小腸氣。患者睪丸腫脹，並覺疼痛，怕冷發熱，行動不便，起立時好似有極重的物垂下。故患者只宜就床安睡，若治療得法，睪丸不至化膿。然後愈後每留硬結，障礙精液流出路徑，以致妨礙生育，而成男性不妊症。這為臨證上常見的情形。設治不得法，睪丸化膿，必須開割，危險殊甚。查睪丸發起的原因，大多因為淋病時不守攝生之法，如飲酒劇動，行路或房事而起。此外因醫者無經驗，濫用刺激劇烈的藥液，注射尿道和無電氣治療的經驗，都能使淋菌上行，波及攝護腺，精囊而致副睪丸發炎。所以同一治療淋病

有速愈的，有變為慢性的，有釀成續發症的，要在醫者的經驗和學識為標準的。

(6) 精系炎 精系是通副睪丸和精囊等的細管。害淋病的人續發副睪丸炎的時候，徵生物往往從副睪丸入精系，更續發精系炎，所以精系炎大概同副睪丸炎同時並發的。單發副睪丸炎，不發精系炎是有的，單發精系炎，不發副睪丸炎是沒有的。並且副睪丸炎若發在左側，精系炎亦必發在左側。副睪丸炎若發在右側，精系炎也必發在右側。精系炎的症狀：精系腫得像手指那樣大，隆起在小腹的上面，脹痛得非常利害。以致發病一側的大腿不能伸直，並且不能坐起。

第四章 男子淋病的治療

男性既患了淋病，單是靠醫藥，難以見效的，必須有規則的攝生外，那末，藥力可以奏效了。第一是不可隨便自療，自療是容易生出惡結果的，一切要請有信用的醫師而聽其指示，最為安全。男子淋病的醫法，分內服藥醫法，尿道洗滌醫法，菌液注射三種。

內服藥腎法，為醫治男子淋病最妥當最有效的一法。若能嚴守衛生，即可用尿道洗滌同菌液注射，單靠內服藥腎法，也能醫好急性淋病的。其所用藥物的作用，第一使小便的份量增多，因為小便的時候，尿道裏面的微生物，也可被尿洗出，小便的效驗，是同洗滌尿道一樣的。第二藥物中的一種物質，混在小便裏頭放出的時候，能夠殺滅水道裏面的微生物。醫治淋病的內服藥很多，然大半都有刺戟胃腸、腎臟，或膀胱等作用。若服用一藥過於長久，就能發生胃病、腎臟病，或膀胱病。并且醫治淋病的效力，也慢慢的減少下來，所以醫師用藥，須時時變換的。並且加上保護胃腎臟或膀胱的藥物，使不致受重大的刺戟，方纔有益無害。市上販賣的淋病藥，雖是很多，然大概為圖利起見，沒有貴重的藥。

洗滌療法，就是用器械將藥液注入尿道，以殺滅尿道中的淋病細菌，但藥水不可過濃，否則尿道黏膜受傷，反而有害，應當用濃淡適度的無痛藥水，每次使留存尿道內二三十分鐘的時候，方能有效。所以醫師洗滌的時候，倘疼痛劇烈，宜再稀釋藥液。既變成了後尿道淋藥液，須注入後尿道部方能有效。現在前尿道淋，往往不用洗滌法，因為藥液的濃度不當，或手術失宜，反容易誘發難治

的尿道淋。不過既發後尿道淋或續發攝護腺炎，精囊炎等的時候，則非用洗滌療法，難以見效的。

注射療法能直接殺滅淋菌的微生物，效力最為確實。但是施術不得其法，或所用的注射藥水過濃，能誘發後尿道淋，或使急性淋變成慢性，致難治愈。所以此法終以求教醫師為宜，且須擇熟練的醫師，方無後患。如因不得已的苦衷，必須自行注射，則可購備下方的藥水，並向藥房中購男子尿道注入器一具，但祇可暫時，決不可圖省醫費，而久自注射，或貽後患於不自知。且下方的藥水，因係自用，藥性很淡，收效也較為緩。

Protargol 2.0, Argyrolin 1.0, Glycerin 5.0, Aqueous 10.0

上列藥方係尿道注射用的。至於注射的方法，先放尿，次以開水洗滌注射器，吸入藥水於注射器的玻璃筒中，筒中向上，將藥水稍稍壓出，使筒中並無氣泡，乃舉起陽物，以筒中稍壓入尿道口，再輕壓注射器的柄，則藥水漸漸流入尿道中了。一俟筒中藥水都流入了尿道後，取去注射器，急以兩指壓閉尿道口，使藥水暫留尿道中，二三分鐘後，除去手指，使水流出，若能每日注射二三次，則收效更速。

淋病的療法很多，此外還有電氣療法，溫熱療法等多種，但效力都不確實。總之，淋病是最難根治的症狀，病人必須有耐久性，且須嚴守攝生規則，以及選擇適當的醫生，纔有治愈的希望，否則徒費金錢與精神，決不能澈底療愈的。

第五章 男子淋病的攝衛

男子患着淋病的時候，上面已經說過，單靠醫藥是差不多不會愈的，另外應該講究攝生法。這種攝生法，第一重要的是安靜，凡騎馬，腳踏車，快走，旅行，體操，足球等運動，都須嚴禁，即長時間的直立，趁車看戲，賭博等，也須免避。酒類，咖啡，可可，濃茶等刺激物，都不能喫。食物宜淡薄，淨素最好。葷菜中的蝦蟹，牡蠣，鱗魚等有腥味，不易消化的東西，都宜禁食，蔬菜中的芥，葱，茄子，蕃椒，胡椒，薑蒜等辛辣的東西，也須避去。烟類也須戒絕。大便秘使通順，未全愈以前，絕對禁止性交。這不但能使自己加重症狀，誘起種種續發症，且傳染給無辜的妻子，罪惡也不小。此外如誨淫的小說，圖畫等，都不可看，因其能發動春情，加重症狀的緣故。夜間又須獨睡，被褥不可太厚，也不可仰臥，陰部須常常洗滌，接觸陰部的手，也

須每次洗滌

第六章 女子淋病

女子的陰部和男子不同，有兩個門徑，在下面的大的叫做陰道，是交合和生產的門戶，內通子宮。在上面的叫做尿道，是小便的門戶，內通膀胱。淋病大概從交合而傳染，上面已經說過的了。故女子的淋病從陰道傳入的，比從尿道傳入的為多。女子淋病病於尿道，膀胱，啤爾氏腺，陰前庭，陰子宮，喇叭管，卵巢，或其附近的組織內。所以女子的淋病是比較重的疾患，就是治愈以後，也有起月經困難，不妊等障礙的，故須於初期時充分治療，不要因對醫師怕開口，而諱疾忌醫。

(一) 尿道淋 女子的尿道較男子短而廣，所以症狀也較輕微，其它則與男子相同。感染病毒經過二三日或四五日的潛伏期以後，尿道有膿汁漏出，尿道口發赤腫脹。初起時，病人祇覺有熱感或痒感，漸次就覺疼痛，在排尿時最甚，但較男子為輕微，即因其尿道短而廣，少有狹窄的關係，變成慢性後，即無膿汁漏

出。

(2) **陰門淋** 女子陰道口的近傍叫做陰門。假如淋病從洗滌陰部等事而傳染，微生物未進入陰道的裏面，不過寄居陰門，則發生陰門淋。年幼女子的陰門最容易傳染淋病。從年齡慢慢長大起來慢慢不容易傳染了。故年幼的女子切不可同生淋病的女子，在一只器具裏面洗澡，並且拭布亦不可公用。

陰門淋的症狀：陰門部忽然紅腫，並且疼痛，紅腫和疼痛逐日加重。最重的症，陰門部的上皮脫落，不能同他物接觸，紅腫延及大腿的內面，以致寸步難行。但若及早醫治，並且時時洗滌陰門部，不使微生物進入尿道或陰道，是很容易醫好的。陰門淋往往和軟性下疳或陰部的溼疹很相像，尋常人不容易區別的。這個時候，宜快請醫師用顯微鏡檢查膿水，看其中有沒有淋病微生物，以定是否係陰門淋。決不可忽略，因淋病的微生物進入尿道或陰道以後，就不容易醫好了。

(3) **陰道淋** 陰道淋或由於交接，或由於陰戶洗滌而傳染，或由陰唇炎和尿道炎等的續發而來，其症狀初僅於陰部有牽引灼熱之感，流出黏液，其後變

爲膿汁，運動及便通之際，大腿和腹部有放散性疼痛稍有發熱，身體倦怠，同時除尿道及陰唇炎之外，陰道口腫脹疼痛，非特性交不能，卽手指也不能插入陰道內，黏膜發赤腫脹，皺裂突隆，上皮剝脫糜爛，見有點狀隆起的膿胞，子宮黏膜亦然。這種狀態，於三星期後，漸次輕減，若能醫治適當，嚴守攝生，則大約四週左右可以治愈。

(4) 子宮淋 子宮淋由淋菌侵入子宮的頸管或子宮腔而起，大多與尿道淋併發，從子宮內滲出分泌物。子宮頸部的淋病，自覺症狀比較輕微，祇有腰部感覺重感。如起急性內膜炎，則發惡寒戰慄，下部和腰部的疼痛，並且時要解大小便，又有現嘔吐的。子宮內膜炎有完全治愈的，但也有變成慢性的，常因飲酒房事或月經，症狀又復增惡，而呈急性。

(5) 子宮周圍機關的淋病 子宮附屬機關的淋病，就是子宮的兩側，左右各有卵巢一個，是產生卵子的機關。卵巢和子宮的中間，有輸卵管相通。女子害子宮腔淋的時候，微生物往往更進入輸卵管，發生輸卵管炎，或從輸卵管更進入卵巢，發生卵巢炎。女子有了這等疾病以後，大概不能再生育了。

淋病波及輸卵管後，病人忽然發熱，小腹部非常疼痛。這疼痛或先發在一側，幾日後再發他側，或者兩側同時疼痛。一側痛得比他側利害。勞動或交合之後，或經期的前後疼痛更加利害，流出的膿水更加多。這等症狀在微生物進入後的第二星期最利害；第三星期以後，慢慢減輕下來。發熱在第二星期之末，早已退盡了。但勞動或交合之後，往往復發，要想斷根是很難的。卵巢炎大概單發一側，兩側同時發生的很少。它的症狀：病人忽然全身發熱，小腹的一側非常疼痛，更往往有子宮出血，所以月經必定加多。還有因卵巢裏頭的膿水，不容易排出，往往生成膿瘍，以致卵巢腫大，隆起腹壁的上而。到第三期以後各種症狀慢慢減輕，亦退盡，但要完全醫好，是很不容易的。

第七章 女子淋病的治療

女子淋病，除尿道淋外，專恃外治，內服藥是毫無效力的。因內服藥的效力，雖能及於尿道，而不能及於生殖器等部分。不過患淋病者，如身體衰弱，更難治愈，故滋補品間接稍有效力。外治女子淋病的方法，從其發生的部位互有不

同，茲分述于下：

(1) 陰門淋的療法 輕症祇須以熱水洗滌陰部，拭乾後，撒以藥粉，每日洗滌撒藥三四次，洗滌撒藥愈勤，則治愈愈速，重症則大腿內側的皮膚，也為波及，病人須靜臥，不可行動，更以棉花浸濕下列的藥水，包裹大腿的紅腫部。
 1% 鉛糖水 500.0

(2) 尿道淋的療法 與男子淋病相同，治淋的內服藥也有效，可參照男子淋病的療法。

(3) 陰道淋的療法 病如祇限於陰道（即陰道淋）可先以明礬水洗滌陰道，次以棉花團浸濕下列的藥水，塞入陰道中，每日須洗滌換藥四五次。
 1% Leityol Glycerin 30.0 (10% 伊天哇爾甘油 30.0) 如炎症波及陰道中排泄淫水的腺管，而化膿時，宜速請醫師開刀，若歷久不愈，而成了慢性時，須請醫師將這腺管切除，方可痊癒。

(4) 子宮淋的療法 病若傳入子宮時，其症狀初頗劇烈，病人須靜臥，不可行動，以冷濕布裹於下腹部，使稍減疼痛，俟症狀稍退後，乃購置橡皮灌腸器一

具，及下列的藥水，每日洗滌子宮數次。輕症即漸見效力，重症則須救治於醫師，以它種療法，手續複雜，不能自行的。1% Lysol for 1000.0 (1% 里曹兒水一〇〇〇・〇) 這個洗滌法，如在冬天，先將藥水稍濕，盛入腳盆中，以洗滌器無嘴的一端，納入藥水中，將他端的牛角嘴，插入陰道，然後將橡皮球，捏放不已，此時藥水即可灌入子宮。

上述各種的療法，係擇最簡便而病人能自行的，輕症或可因是治愈，稍重之症，恐既無效且淋病一症，外觀雖不甚凶險，而後患很多，故無論輕症重症，若無不得已的苦衷，都以及早求治於醫師為宜。

至於攝生法可參照男子淋病的攝生一項。

第八章 淋病的預防法

淋病雖較梅毒為輕，然患者易於傳染，醫者難於根治，所以對於預防淋病的方法，很屬重要。且淋病一經傳染，非用澈底根治的療法，往往變成慢性淋病，俗稱多年的老白濁。每因遷延致淋毒內侵，變症百出，以致殘害終身。所以不得

不設法預防之。在尋常的花柳病書上，雖有種種預防淋病的法子。譬如或者用如意袋或者交合完畢後馬上就小便，或者交合之後用藥水滴入尿道裏面。但是這種法子都是靠不住的，能完全預防的法子是沒有的。如意袋破了之後，一些功力都沒有。交合後馬上就小便，法子雖很簡單，功力亦不是十分靠得住的。交合後滴入藥水的法子，功力雖比上兩種法子為好，但尋常人頗難實行，若不得其法，亦是無功效的。所以要預防淋病，除非不宿娼妓，若以為有法子可以預防，有恃無恐，就肆意妄行起來，那是自投火坑呢。

至於女子的預防淋病，方法又很簡單。祇要一見丈夫患了淋病之後，未曾完全醫好以前，切不可和一同床，性交更不必說了。若疑心丈夫有淋病，不能斷其確實是不是，也以不同床為好。若萬不得已，性交之後，宜即刻用百倍「里索爾」水溶液洗滌陰部和陰道裏面，或者可以預防。洗滌陰道的方法，上面已經說過的了。

第九章 梅毒

梅毒為一種慢性觸接性的劇烈傳染病。主由兩性的不潔之交接而傳播的，且由生殖得遺傳於子孫，其病毒能誘起種種可惡的全身症狀，是一種固猛烈之惡疾。梅毒的病原菌，乃於一九〇五年蕭定氏所發明為一種難於著色而具有鞭毛樣突起之「螺旋菌」，形體很小，呈螺旋狀，其運動或為蛇形狀，或為波狀，若割取梅毒硬性下疳的膿漿，載於玻璃片上，用墨汁染色，製成新鮮的標本，以鏡檢之，則可見白色螺旋狀細條，波動曲折於黑地之間，這種檢查於早期梅毒的診斷很有價值，但不及瓦氏驗血反應的確實。

甲 梅毒的傳染

(A) 後天性梅毒的傳染

(1) 直接傳染 梅毒的傳染，當然以男女交媾為最易而最多，良以生殖器的皮膚，最為柔嫩，稍受刺激，即易損傷，創口雖小，傳染有餘，因為我們若與患有梅毒者交接後，肉眼觀察，毫無損傷，而此善於鑽營之惡毒，已侵入其寶貴的軀

體，以作其發祥的殖民地了。此外爲接吻，授乳，握手和醫生產婆看護的施行手術等處，莫不有傳染的可能。

(?) 間接傳染 這是由於梅毒患者所使用或接觸的一切物品，如衣服，被褥，手巾，面盆，茶壺，茶杯，食具，便器，樂器，玩具，剃刀，煙管及醫用器械等的傳染於健康者之謂。

(B) 先天性梅毒的傳染

(1) 母體胎盤傳染 梅毒的遺傳，經許多醫學家的考驗，大半由於母體，即患有梅毒的妊婦，其梅毒螺旋菌，由血行中進入胎盤組織，更由此而經臍帶血管，以侵入胎兒，至其遺傳的程度，受毒的輕重，則視母體梅毒的情形及胎兒感染的時期而異，母體的梅毒愈盛，則胎兒的受毒也愈重，其感染的時期則於妊娠三月之內者，概難免於流產；若在三月以後，七月以前的，雖可稍免生機，但亦殆歸於早產和夭亡；至於七月之後者，則其影響的大小，絕無一定。

(2) 精虫傳染 即患梅毒男子的精虫，與健康女子的卵子所成的胎兒，於

事實上可能遺傳梅毒，惟其遺傳的學說尚無確定。

(3) 卵子傳染 即患有梅毒的母體，其梅毒螺旋體侵及其卵巢中的卵子，使之感染梅毒，一旦受精，則成遺傳梅毒的胎兒，其胎多數流產。

(4) 混合遺傳 為男女兩性間合併的傳染，換言之，即梅毒性精虫和梅毒的性卵子，所造成的雙料梅毒性的胎兒。故其症狀特重，未有不成死胎而致流產的。

乙 梅毒的經過和症狀

(1) 第一期梅毒的症狀 傳染梅毒以後，到發病的時期，即潛伏期的長短，很不一定，最少二星期，多則幾個月，普通三四星期，經過潛伏期之後，先在傳染梅毒的部位，譬如從性交傳染的，先在陰部，從接吻傳染的，先在口唇，發生蠶豆大淡紅色的硬塊，這叫做硬下疳。硬塊中央的表皮，往往脫落，漏出少量的黏液。黏液乾燥以後，結成薄痂皮，倘拭去這痂皮，顯出鮮紅色，有光澤的腐爛面，或淡紅色的肉芽面。倘醫治不當，或病人怠於清潔，則表皮脫落而漸漸變成潰瘍。

發現硬性下疳，一二星期之後，在得病部位的附近，續發淋巴腺腫，這些腺腫，各個獨立，並不合併。從性交傳染的，先發生在腹股溝處，這也是橫痃的一種，因其毫不覺痛，叫做無痛性橫痃。這種橫痃，決不化膿，但倘和軟性下疳或淋病同時染傳的時候，也往往化膿，從口腔傳染的，先發生在頸的兩側，從手指傳染的，先發生在臂的內側，這種腺腫，從得病部位起，漸漸發生到遠處，往往全身發生幾十個之多。以上的第一期症狀發現以後，表面上病勢的進行，暫時停止。實則梅毒細菌既從血管傳布全身，即使將第一期症狀完全醫好，隔了一二個月或幾年之後，再發現第二期症狀。

(2) 第二期梅毒的症狀 第二期梅毒的症狀，來勢很凶。全身先發熱，熱度的高低，從各人體質的強弱而不同。這時更併發頭痛，腰痠，關節痛，骨痛，全身怠倦，飲食不進等全身症狀。這樣三四天之後，熱度漸退，全身即發現各種疹子。但頭痛，關節痛，骨痛等第二期中，仍常常發作，頭痛在夜中睡眠的時候更加劇。梅毒的疹子，形狀很多，或為薔薇色的斑紋，這叫做薔薇疹，或為褐赤色稍高起的丘疹，或為濃泡，時現時退，往往繼續數年。其色初發時稍淡，以後漸漸深濃。發在

下股的，往往因鬱血，略帶青色，大概排列成環狀或弧線狀，在左右相對的部位，往往同時發生同樣的疹子。更從舊症的周圍逐漸發生新疹，於是愈延愈多。發生的部位，以前額、頸項、眼鼻、口耳的周圍、肛門周圍、關節的屈面、四肢的內側、胸部的中央、手掌、足趾及陰部等處為最多。倘醫治得法，漸漸脫皮或結成痂皮而愈。醫治不當，或不注意清潔，則變成潰瘍。梅毒疹結成的痂皮，普通是黃褐色，中心部最高，且最乾燥，周圍漸漸低降，形狀像圓丘。梅毒症變成的潰瘍，膿汁極少，且很稀薄。梅毒的病原就在這疹子和膿汁裏面，和梅毒病人接近的人，須要十分注意的。這種梅毒疹，大概不痛也不痒，可是生在陰部的潰瘍，和手指間的疹子，略微覺得痛痒。第二期中，發生疹子之後，頭髮漸漸脫落，眉毛、睫毛、鬚髯等也有脫落的，這因為皮膚的營養漸漸衰敗的緣故。第二期的症狀，雖大抵在全身的皮膚，但這時候的病原菌，早已侵入身體內部的骨骼和關節，所以多併發骨痛、關節痛等症。

(3) 第三期梅毒的症狀 梅毒之三期，在梅毒病程中，佔最長的時期，且為害於患者的本體也最劇，如不受治療，其拖延常至數十年，或患者終身而不癒。

三期中，因梅毒已長驅深入於內部各種器官，如血管、心臟、脊髓、腦等，故外部所顯的損害很少，患者雖自覺獲顯然的痊癒，有年，然梅毒忽於此時大施破壞，常致患者受永久的殘廢，或終身不治的病症。梅毒常散佈於人身的大小各部，在上面已經述過的了，故常見有生命關係的重要器官，因梅毒瘤的生長，終於破裂而不可收拾，蓋古今中外，莫不好生而惡死，惟患第三期梅毒而得的殘疾，癩瘡，與瘋狂者，則視死為最歡迎的療劑，於此可見三期梅毒為害之深了。下列二病，已證明為梅毒三期之後患，一待發覺，即不可收拾，故人類因之而死的，每年常以千萬計。

A. 進行性癱瘓——為慢而進行，逐漸加重的癲狂病，常延至數年或數十年，以致患者受盡身體精神上的折磨和痛苦，終至死亡而止。

B. 運動性失常——為脊髓因梅毒而起的一種慢而進行的腐壞病，以致內脊髓經過，司感覺運動的神經，逐漸死亡，患者自然喪失感覺與運動能力，祇有困臥牀褥，不克自拔。

梅毒三期的各變症，或任何梅毒性變症，都是潛然而來，終予患者以不可

思議的損害，因初發時並不患者，以任何疼痛與不適，殆患者感覺苦痛時則爲患已不可救藥，所以曾患硬性下疳者，除受適當的治療痊癒外，都有晚年發現梅毒變症的可能。

第十章 梅毒的治療

近百年來，醫藥的進步，日新月異，新藥的發明，也層出不窮，對療治梅毒，仍沿用百年前所用的汞（即水銀）療法，因汞有殺滅梅毒螺旋體的特效，故療梅毒仍用之，所不同的，服用方法和昔日稍有出入耳。今日所用的，爲汞或汞的化合物，其方法也有數種；如內服者，有藥粉、藥丸，或混合劑，藉皮膚吸收的，有藥膏、搽皮法，皮內注射，皮下注射等；又有肌肉注射、靜脈注射、靜脈注射等法。至於何種汞化合物，用何種方法爲最有效，則在乎醫師，因各個人的病情而決定之。治療效果的大小，不在藥物的選擇及施用方法，要在治療的有系統而且徹底，又在病人的有堅毅的持久力。

現在最通行治療梅毒的六〇六和九一四，就是砒製劑，對於各期的梅毒，

都有特別的效力，實是梅毒病人的救星。大概用其藥液注射靜脈之內，但也有注射肌肉內的。自從六〇六和九一四發明以來，梅毒的治愈，實比淋病容易。但梅毒是很頑固的疾病，潛伏在身體內，數年不發生症狀，突然復發的很多。所以梅毒的全愈與否，決不可以症狀的有無為標準，應當請醫師驗血，經幾回的驗血，血中都沒有細菌的存在，方才可以斷定已經全愈。

第十一章 梅毒的攝生和預防

凡患梅毒的人，最宜注重衛生。既患此病，必須及早就醫治療，以免毒質蔓延全身，而遺後患。患毒的人，對於起居飲食，尤宜格外注意，勤於沐浴，洗淨皮膚，使毛孔易於排泄，並須留意大小便，使之通暢，不令腸胃的積滯。更宜選取富於滋養分的食物，因為患病者每為病毒的侵擾，耗損血液，因之精神萎靡，或竟患貧血之症。能早起多吸新鮮空氣，能補益肺氣，病症在重篤的時候，宜清靜安臥。對於烟酒辛辣的食物，切忌吸食，不可過勞而多用精神。所有病人的衣服被褥，宜不時洗換清潔，如有瘡疹潰瘍的膿汁，留意用消毒藥水洗清，不可隨意坐兒。

權，致累健全者。觸着傳染。飲食所用的杯碟碗筷，也須分開，以免害人。治療期內，應遵醫師的囑咐，安心療治，不要暫見表面愈好，以為斷，遂致中途輟治。要知除毒不淨，必致後來再發，養癰成患，貽害無窮。女性之有胎孕者，更應趕緊療治，全愈，以免遺傳胎兒。若梅毒未經完全治愈，斷根的，男女都忌結婚，即夫婦之間，任何一方有患染此毒，務須分床而臥，並宜清心寡慾，切忌房事，以免傳染對方，幸勿為一時之興，忘却本身的傷精竭神，而貽害對方無窮之害，如能如是留意，則愈後每多佳良。

梅毒的病，菌在健全的皮膚和粘膜上面，是不能夠竄入組織內而成疾病的；必定要有一皮剝離，病菌才能夠由細微的損傷部竄入進去。在性交時因為摩擦的關係，表皮容易損傷，這種損傷是我們眼睛不能看見的。所以要預防梅毒，第一就是不要把表皮剝離。如何才能預防皮膚剝脫呢？即在交媾之前，生殖器用凡士林等油劑塗擦，便不容易受傷，或用甘汞軟膏，升汞軟膏，巴士德預防藥等，功效更確實可靠。上述的辦法拿來預防軟性下疳也是適用的。

有人主張在性交之前，注射洒爾佛散（即六〇六），能夠預防梅毒，這是

所用分量的多少，很感困難，因為用少量，恐怕力量不足，使用大量，又要發生危險，所以這種方法，終不適用。酒醉之後，不可乘興性交，因醉後交媾，射精比較遲緩，摩擦時間較長，容易發生表皮剝脫，而感染梅毒。

其他的預防法與淋病相同，可參看前章。

第十二章 軟性下疳

軟性下疳的傳染也是由不潔的性交而傳染的，但因為不是像真正的梅毒和淋毒那樣的慢性病，所以對於普通的家庭差不多是不會侵入的，不過也有例外。

軟性下疳傳染後，大概是發生于男女的陰部，像梅毒那樣地發生于陰部外的，是稀少的；就是在陰部之中，男子是以包皮內板被侵犯的居多數，這是因為那個部分受傷最容易的緣故。其次傳染最多的地方是在冠狀溝帶部和包皮，再次是在陰部和尿道等處。

在於女性多數是發生于陰口，其次是子宮腔部，膈壁，大陰唇後連合，小陰

唇，舟狀窩，尿道等處，又特別的女性，也有會發生在陰部以外，如肛門和大腿等處的。

它的症狀：大約傳染後，經二三天，潛伏期，在局部，即男子的龜頭，或包皮，女子的大陰唇或陰道內，先發生小膿泡，後則漸漸潰爛，瘡面凹陷不平，有黃色污穢的膜蓋覆，和四周的皮膚，有顯明的界限，覺得疼痛，膿水很多，並無硬塊，潰爛面逐日增大，大概不止一處，所以和梅毒的硬性下疳，容易分別。

軟性下疳發生數日之後，在腹股溝的內側，發生一個或左右兩個硬塊，這就所謂橫痃，橫痃疼痛很劇，漸漸增大，很容易化膿，這時往往全身發熱，所以和梅毒的無痛橫痃，也容易區別。

軟性下疳的症狀，一時雖很凶險，但病毒的蔓延，至此而止，倘醫治得法，治愈也很快，所以軟性下疳在花柳病中，為最輕的一種。

第十三章 軟性下疳的療法

患軟性下疳的人，應該趕快請醫師治療。若是發生的部位易行截除手術，

便請醫師把它截除，可望很快的全愈。但是事實上發病的部位，往往不能施行截除的，所以這個辦法雖是很合理的，但實際上很少有人採用。

在治療上，初期多採用燒灼、搔抓、腐蝕諸法。除這局部療法之外，近代的臨床家還常常採用注射瓦苦辛的療法。據專家的報告：用銳匙搔抓的療法，通常祇要八九天就可以治愈。在這種治療的病例中，沒有一個是續發橫痃的。用熱湯或熱氣的方法治療的成績也好，祇是須要特別的器械設備，一般醫師不常採用。現在還是用腐蝕療法和瓦苦辛注射療法的為最多。

總之，在既經發生本病之後，就應儘快請醫師治療，不可擱置，以免遷延時日，或甚至發生橫痃等併發症。最要緊的是在沒有請醫師治療之前，不可隨便自己作主，亂用藥方，譬如軟性下疳中有一種疽性的，就是由於病人忽於治療，或者弄了不清潔的東西到瘡面去，以致助長炎症，使患者腫脹，誘起血液循環的障礙，於是那一部分因為血行不靈的結果，就變成壞疽，不易治愈了。


第十四章 軟性下疳的預防法

軟性下疳的預防，第一不要和有毒的女性接觸；苟有所犯，當在不潔的性接觸後，當時即用石炭酸藥皂和熱水，洗滌陰部，再撒布以甘黍粉（即加路米）於陰部，使之消毒。經洗過三四回，和消毒二三次之後，雖生殖器部分傳染着毒菌，因即時隨用藥水消毒殺菌，不致蔓延成患，或用千分之二的身派水洗滌陰部消毒後，再塗以立弗奴而油藥膏，也能預防的功效。不過女子和有毒的男子接觸後，其洗滌陰部，必須用女用洗滌陰道器，吸取藥水，打入陰戶內，方可收消毒的功效。如僅在陰戶外面洗滌，即毒菌入臍內，也無功效可說了。（完）

#41

752942

752942



編者：陳爽秋

發行者：經緯書局

上海：海寧路九四二弄六七號

成都：祠堂街 重慶：臨江順城街

發行人：王元規

實價：

經售處：國內各大書局

民國三十六年五月港出版

——版權所有——