

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十二

傷寒門

傷寒發黃

夫傷寒發黃者蓋濕熱相交民當病瘴者黃也單陽而無陰者也傷寒至於發黃為疾之甚也濕也熱也甚者則發黃內熱已盛甚復被火者亦發黃也邪風被火熱

明周王朱楠撰



兩陽相熏灼其身必發黃陽明病被火額上汗出而小便不利者必發黃是由內有熱而被火致發黃者也陽明病無汗小便不利心下懊憹者必發黃是由陽明熱盛致發黃者傷寒發汗已身目為黃所以然者寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之是由寒濕致發黃也濕亦令黃也熱亦令黃也其能辨之乎二者非止根本來有異而色澤亦自不同濕家之黃也必身黃似熏黃雖黃而色暗不明也至於熱盛之黃也必身

黃如橘子色甚者勃勃出染著衣正黃如蘗是其正黃色也由是觀之濕之與熱豈不異矣大抵黃家屬太陰太陰者脾之經也脾者上黃土色也脾經為濕熱蒸之則色見於外必發身黃經曰傷寒脉浮緩手足自溫者是為繫在太陰太陰當發身黃者是矣熱須內盛若已自汗出小便利者則不能發黃必也頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴飲水漿此為瘀熱在裏身必發黃黃家為熱盛而治法亦自有殊傷寒八九日身如橘子

色小便不利少腹滿者茵陳蒿湯主之此欲泄滌其熱也傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之此欲解散其熱也傷寒發熱在裏必發麻黃連翹赤小豆湯主之此欲解散其熱也此數者泄滌解散乃為之不同亦皆析火徹熱之劑也一或身黃脉沉結少腹硬而小便自利其人如狂者又為畜血在下焦使之黃也必須抵當湯下之而愈黃家既是病之已極是以有不治之者多矣非止寸口近掌無脉鼻氣出冷為不治之疾又若形體如烟熏直視搖頭者是為心絕環口黧黑柔汗發黃是為脾絕皆不治之証醫者更詳視之又云黃家至日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之當膀胱急小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹臃脹而滿如欲作水狀大便必黑時溇泄此女勞疸非水也腹滿者難治傷寒發黃之狀身體盡變或如熏黃或如橘色是也凡陽明中風大陽中濕皆令人發黃蓋由得病無汗小便不利寒濕不散則熱結脾胃腠理閉寒發熱之氣與

便不利寒濕不散則熱結脾胃腠理閉寒發熱之氣與

宿穀相搏而鬱蒸不能消散故大小便結澁不通令人  
身體面目皆變黃色其病腹滿一身盡疼發熱若其人  
小腹滿急眼睛澁疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急者是  
也但得小便快利即漸愈仍不用大便多多即令人心  
脹又有急黃者身體黃甚卒然而發心滿氣喘命在須  
臾故名急黃有初得病便黃者或初不知是黃死後方  
變黃者此病亦由脾胃瘀熱本天行時氣所作也宜細  
辨之但發熱心戰者乃是急黃之候歌曰小便自利大

便黑血症無疑定發狂若是小便全不利黃名瘧病瘧  
名黃若血症宜抵當湯輕者桃仁承氣湯與犀角地黃  
湯黃瘧茵陳湯茵陳五苓湯又歌曰太陽發熱渾身痛  
身目俱黃是濕家腹滿脉弦心脇痛陽明經裏中風邪  
仲景云傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏  
不解故也只當以濕中求之發熱一身盡痛而身目俱  
黃者太陽中濕也腹滿鼻乾心脇痛潮熱身黃者陽明  
中風也欲發黃者急用芥蒂末一字許搐鼻中治在頭

疼濕家條下大抵發黃與濕家不利小便非其治也腹滿脉浮弦咳嗽潮熱小便難心脇疼短氣鼻中乾不得汗嗜卧此陽明中風也大小柴胡加茯苓湯噦者湯中加茯苓也見小便雜條下病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不消化故發黃汗者南方暑濕近夏瘴熱蓋瘴者黃也古人以黃為瘴濕熱相搏民多病瘴甚為附腫然後發黃與瘀血外症及脉俱相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之

發黃之人脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血症即如狂大便自利為瘀血要之發黃人身體發熱頭面汗出身無汗齊頸而止渴引水漿小便不利如此必發黃茵陳蒿湯五分加茵陳散主之茵陳蒿湯十分五分苓散五分三散伴勻每服二錢溫水調下日三服病人服湯得小便利如臍子汁赤一宿復減則黃從小便中出也古人云治濕不利小便非其治也大抵發黃者瘀熱在裏由小便不利而致也梔子蘘皮湯麻黃連翹赤

小豆湯可選而用之又方傷寒欲發黃者急用苳蒂末口含水搗一字許入鼻中出黃水甚驗即用茵陳蒿湯調五苓散服之最良又問白虎症亦熱發渴引飲水小便不利何以不發黃答曰白虎與發黃症相近遍身汗出此為熱越白虎症也頭以下都無汗黃症也又問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒中求之又問病人脉弦浮大

而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時咳嗽者何也少陰中風也小柴胡湯主之

方

麻黃醇酒湯 出金匱方 治傷寒熱出表發黃瘧

用麻黃三兩以醇酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

麻黃連翹赤小豆湯 出千金方 治傷寒發熱在裏身體必發

黃

麻黃

連翹

一方用連翹  
係根味苦寒

甘草

各二兩

生薑

三兩大棗

二十枚

杏仁

三十枚

赤小豆

一升

生梓白皮

切二升

右㕮咀以潦水一斗先煮麻黃去沫次用諸藥煎取三升分溫三服半日服之

茵陳湯

出千金方

治傷寒七日八日內實痰熱結身黃如橘

小便不利腹微脹滿宜下之

茵陳

六兩

大黃

三兩

梔子

四十枚

右㕮咀以水一斗二升先煮茵陳取五升去滓次內梔子大黃煎取三升分服一升日三小便當利如皂莢汁狀色正赤當腹減黃悉隨小便去也范注用療穀疸小品方用石膏一觔

大黃黃蘗湯

治發黃腹滿小便不利而赤自汗出此

為表和裏實當下之

大黃

三兩

黃蘗

芒硝

梔子

十五枚

右㕮咀以水六升煮取二升去滓內芒硝復煎取一

升先食頓飲之

枳實大黃湯 治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸

心中懊懣而不甚熱或乾嘔

枳實五枚 大黃三兩 豆豉半升 梔子七枚

右以咀以水六升煮取三升分三服心中熱疼懊懣

皆主之

治傷寒後二十日渾身眼如金色者

右用黃蘆一兩剉碎水一升煎取三合空心服三五

服安

麻黃連翹湯 出金匱方 治傷寒痰熱在裏身必發黃

麻黃去根節湯煎 連翹二兩 杏仁皮尖去雙 棗十二枚

生薑二兩 甘草一兩 生梓白皮切一升

右以咀如麻豆大每服五錢用潦水二盞煎取一盞

去滓溫服不拘時

消濕散 治傷寒痰熱在內濕氣鬱而不散重發肌肉

小便不利身體發黃利水道



牽牛子

炒半觔只取末二兩

赤茯苓

去黑皮

木香

陳橘皮

湯浸

去白焙各五錢

右為散每服二錢煎葱白湯調下不計時候

秦光湯 治傷寒心胃堅硬脚手心熱即變為黃

秦光

去苗土

紫草

去苗土

白蘚皮

黃芩

去黑心

梔子仁

大黃

剉炒各一兩

右麤擣篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓溫

服日三夜一

三黃散 治傷寒發黃服藥瘥後未全除餘熱發動

大黃

剉炒

黃芩

去黑心

黃連

去鬚

梔子仁

苦參

各一兩

右擣羅為細散每服用米飲調下二錢日三服

龍膽湯 治傷寒發黃煩熱皮肉皆黃小便赤不利

龍膽

枳殼

去穰麩炒

苳胡

去苗

梔子仁

知母

切焙

地骨

皮木通

芍藥

甘草

羚羊角

鎊

麥門冬

去心

焙升麻

各五錢

右麤擣篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓不

拘時温服

黃芩湯 治傷寒發黃或先服利藥未差者以內消湯以折熱氣

黃芩 去黑心

茵陳蒿

升麻 各一兩

梔子仁

此胡

去苗

龍膽 各五錢

犀角

鎊一兩

右麤搗羅每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓入

生地黄汁一合攪令勻不拘時温服

茵陳蒿大黃湯

濟生按

治傷寒發黃面目悉黃小便赤

宜服

茵陳蒿

梔子仁

此胡

去苗 藥皮

蜜炙各五錢

黃芩

去黑

心 升麻

大黃

剉炒各一兩

龍膽

五錢

右麤搗篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓早

晚食後温服

茅根湯 治傷寒發黃通身如金色者

茅根

洗剉

梔子仁

茵陳蒿

地骨皮

甘草

炙各三兩

右麤搗篩每服五錢用水一盞半生薑三片豉三七

粒同煎至一盞去滓早晚食後溫服

此胡枳殼湯 治傷寒發黃壯熱骨節煩疼兩脇下氣

脹急硬痛不能忍

此胡去枳殼去棧去黃芩去梔子仁 茵陳蒿

龍膽 大黃炒甘草炙

右麓擣篩每服五錢用水一盞半煎至一盞去滓早

晚食後溫服

茵陳黃芩湯出楊子建獲命方 治傷寒熱毒熾盛熏灸三焦攻

擊皮膚通身發黃

茵陳蒿 黃芩去梔子仁 升麻 秦朮去牡

丹皮 荆芥穗 麻黃去細辛去石膏碎知

母焙黃連去大黃炒

右麓擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後臨

卧溫服

葶藶丸 治傷寒時氣發黃

甜葶藶隔紙炒 大黃炒 人參一

右擣羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫水下二十九以利為度

急黃丸 治傷寒熱毒所加卒然心中滿氣喘急發熱心戰

大黃 五錢 朴硝 一分  
生到 別研

右用二大盞漬大黃一宿次日煎至一盞去滓下朴硝攪令勻不計時候溫分三服利快差

梔子仁湯 治傷寒急黃

梔子仁 芩胡 去苗 朴硝 別研 茵陳蒿 各五錢

右除朴硝外各細剉用水三大盞去滓下朴硝攪令勻不計時候分溫三服取利為度

治病人腹滿舌痿黃煩不得眠

茵陳 二兩 白朮 一兩 甘草 一兩

右臼中杵為散沸湯和服方寸匕小便不利加茯苓二兩

治傷寒時氣黃疸病煩熱

以湯淋東壁土硝取汁頓服之

治傷寒三五日忽有黃則宜服此

取生烏麻油一盞水半盞鷄子白二枚熟攪令相勻

服之令盡

茵陳五苓散

出金匱方

治傷寒溫濕熱病感冒後發為黃疸

小便黑赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服藥

不對症因感濕熱病以致身發黃子嘗用茵陳五苓

散治之甚効

用生料五苓散一兩加入茵陳五錢車前子一錢木

通一錢五分此胡一錢五分酒後得症加乾葛二錢

作呔咀并前藥和勻分作二服每服水一碗燈草五

十莖同煎八分去滓食前服滓再煎連進數服小便

清利為愈

梔子蘗皮湯

治傷寒身熱發黃者

方見本門辨陽明脉症類

麻黃連翹赤小豆湯

出按粹方

少陽陽明身熱不去小便自

利而煩者身必發黃宜梔子蘗皮湯

麻黃 連翹 各一兩 赤小豆

右剉如麻豆大每服一兩水三盞煎至八分去滓溫服

梔子蘘皮湯 出按 辨方 治燥熱發黃

大黃 蘘皮 各三兩 梔子 十五箇

右剉如麻豆大每服一兩水二盞煎服發黃大便自利不止者加黃連黃蘘皮各三兩生減大黃用之多効

治傷寒發汗有留熱身面皆黃多熱暮年不愈醫作食黃治之病不去問之食不減尋與此藥五日減三分之一十日減三分之二二十日病悉去其方用 澹寮方

山茵陳 山梔子 各三錢 秦艽 升麻 各四錢

右咬咀以三錢為一服煎去滓食後服 本草行義

茵陳附子乾薑湯 出衛生寶鑑 治因涼藥過劑變為陰症身

目俱黃四肢皮膚甚冷心下痞硬眼澁不欲開大便

自利倦臥

附子炮去皮 乾薑炮 茵陳蒿一錢 白茯苓去皮

澤瀉分五 枳實麩炒去 半夏湯泡七分 陳皮去白 白朮

四分 草豆蔻麩炒熟去 皮用仁一錢

右判如麻豆大都作一服水一盞半生薑五片煎至一盞去滓溫服不拘時候

茵陳 梔子 黃連 三物湯出活人書 大便自利而黃

茵陳三錢 梔子各二錢 黃連各二錢

右以水二盞煎至八分去滓服

治傷寒時氣黃疸病煩熱

右用土硝湯淋取汁頓服之莊子云蛙蜩轉丸是也  
藏在土中掘地得之正負如人捻作彌久者良

治傷寒鼻塞黃疸

用苦瓠煎取汁滴鼻中出黃水其塞遂通

治傷寒五種黃

用翹搖生搗絞汁服一升日二服即差

又方

用亂髮燒灰水服一寸匕日三服

治伏熱結目黃不下食大小便澁

用苦耽苗子煮汁服或生搗絞汁服

傷寒百合論

夫傷寒百合病者謂百脉一宗悉知其病也其狀意欲食復不能食常默默欲得卧復不能卧欲出行復不能行飲食有時美亦有時不美如有寒復如無寒如有熱復如無熱口苦小便赤黃得藥則吐利者是也此皆由

傷寒及虛勞大病後臟腑俱虛榮衛耗弱不能平復變成斯疾也然以百脉一宗悉致其病又無復經絡故其病症變異而治之者亦宜各隨其症 百合病者皆因傷寒病後其狀惡寒而嘔病在上焦也二十二日當愈其狀腹滿大便堅三四日一大便時復小溲者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其証以醫治之百合之為病令人意欲食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如



有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲卧復不得  
眠至口苦小便赤澁欲行復不能行諸藥不能治治之  
即劇吐利如有神靈所為也百合病身形如和其脉微  
數其候每溺時即頭覺痛者六十日乃愈百合病候之  
溺時頭不覺痛漸漸然寒者四十日愈百合病候之溺  
時覺快然但覺頭強者二十日愈百合病症其人或未  
病而預見其候者或已病四五日而出或病一月二十  
日後見其候者治之易誤也依症治之 百合病見在

於陰而攻其陽則陰不得解也復發其為逆也見在於  
陽而攻其陰則陽不能解也後下之其病不愈要略云  
見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法解之見陽攻  
陰復發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此  
亦為逆其病難治歌曰坐不能坐行不能行寒又無寒  
熱又無熱飲食美時不美特百合少人知妙訣宜百合  
知母湯百合地黃湯百合洗方又歌曰百合昏如祟物  
厭或時喜或時慊似寒不冷熱無熱欲不難行卧不恬

百合者百脉之宗舉皆受病無所謂經絡傳次也皆因傷寒虛勞大病之後臟腑不平變而成此其狀似寒無寒似熱無熱意中欲食復不能食默默欲卧復不得卧強欲出行復不能行崇朝口苦小便赤黃藥入即吐利也病源所在症狀一同其脉微數每尿則頭痛者六七日愈若尿不頭痛但淅淅如寒者四十日愈若尿則快然而但眩者二十日愈百合知母湯百合地黄湯滑石代赭湯鷄子湯百合洗方選用之

方

百合滑石代赭湯 出千金方 治百合傷寒已經下後

百合 七枚 擘破 滑石 一斤 碎 代赭 如彈子九 大一枚 碎

右先以水洗百合漬一宿白沫出去其水更以新汲水二盞煎取一盞去滓別用新汲水二盞煮滑石代赭取一盞去滓後合和重煎取一盞半分温再服

百合鷄子湯 出千金方 治百合傷寒病吐之後者

百合 七枚 擘 鷄子黃 一枚

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以新汲水二盞煎取一盞去滓內鷄子黃攪勻分溫再服聖惠用鷄子白不計時候頓服之

百合知母湯

出千金方

治百合傷寒已經汗後病人欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲行復不能行有寒如無寒有熱如無熱飲食或美不美如強健人而卧不能行口苦小便赤藥入口即吐利此因虛勞大病之後不平復變成此疾名百合候主之發汗後者服

百合

七枚

知母

右先將百合擘碎用新汲水二盞浸一宿當有白沫出去却沫水了却用新汲水二盞煮百合取汁一盞去滓盛於淨器中又將知母亦用新汲水二盞煮取一盞去滓後將百合知母汁相和同煎取一盞半不計時候分溫作二服

百合滑石散

出千金方

下堅急

治百合傷寒病變發熱并小便澀臍

百合一兩滑石三兩

右搗羅為散更入乳鉢研如粉每服空心米飲調下二錢日二服當微利即住服

百合地黄湯出千金方治百合傷寒病已經吐下發汗病形

如初者

百合七枚生地黄汁一盞

右先以水洗百合漬一宿白沫出去其水更以新汲水二盞煮取一盞去滓內地黃汁再煎取一盞半分

溫再服中病勿更服大便當如漆

百合半夏湯一方熟地黃治百合傷寒病不差不思食欲成

勞日漸羸瘦

百合二兩人參 赤茯苓去黑皮聖惠用白茯苓半夏湯洗七遍炒令

乾黃連去鬚剉微炒知母各一兩生乾地黄焙一兩五錢聖惠用熟乾

地黃

右麤搗篩每服五錢五分入生薑一分拍碎同煎至八分去滓食後溫服日二

百合柴胡湯

出聖惠方

治百合傷寒病久不差不思食欲成

勞

百合

二兩

柴胡

去苗

知母

焙

黃連

去鬚

剉

秦艽

去苗

栝

萹

各一兩

甘草

五錢

炙赤

右麤擣篩每服五錢水一盞半生薑半分拍碎煎至

七分去滓食前溫服日二

百合紫菀湯

治百合傷寒病似勞形狀如瘡

百合

去苗

紫菀

去苗

白茯苓

去黑皮

杏仁

湯浸

去皮尖

雙仁炒令黃

甘草

炙令微黃

柴胡

去苗

右等分麤擣篩每服五錢水一盞半生薑半分拍碎

煎七分去滓空心溫服日晚再服

厚朴散 治百合傷寒補陰養陽

厚朴

去粗皮薑汁炙

令赤黑色一兩

桃仁

去皮尖雙仁炒

黃別研一兩

杏仁

去皮

別研一兩

桑根

去皮

夫雙仁令黃

別研一兩

紫石英

別研

白蘚皮

五加皮

桑根

去皮

別研一兩

桑根

白皮

剉各五錢

右擣研為散更入乳鉢一處研如粉每服食前用葱

白糯米煎湯調下二錢日二

百合前胡湯 治傷寒差後已經二七日熱不解將變

成百合病身體沉重無力昏如醉狀

生百合

三枚 擘洗

前胡

去蘆 頭

麻黃

去節各一兩五錢

葛根

剉二兩

麥門冬

去心 五錢

石膏

碎 三兩

右以咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎取七分去

滓溫服後如食頃再服

百合散

出聖惠方

治傷寒百合病身微熱惡寒煩喘

百合

二兩

紫菀

根一兩

去土

杏仁

一兩

湯浸去皮尖

雙仁麩炒微黃

前胡

去蘆 頭

麥門冬

各一兩

去心

甘草

三分

炙 微赤剉

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫分服

赤茯苓散 治傷寒頭不痛但覺頭眩漸漸惡寒是百

合症

赤茯苓

麥門冬

各三分 去心

百合

知母

柴胡

各一

兩去 苗

甘草

五錢 炙 微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

子芩散 出聖惠方 治傷寒頭不痛多眩悶寒熱往來小便不利

利百合症

子芩 三分 赤茯苓 甘草 炙微赤剉 芎藭 各五錢 百合 一兩 知

母

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散 出聖惠方 治傷寒百合病下利不止心中忪忪堅而

煩嘔宜服

半夏 湯浸七遍去滑 黃芩 黃連 去鬚微炒 甘草 炙微赤剉 人參 各

兩去蘆頭 百合 二兩 乾薑 炮製剉五錢

右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

柴胡散 出聖惠方 治傷寒百合病羸瘦不食少力宜服

柴胡 去苗 白茯苓 陳橘皮 湯浸去白穰焙 知母 桔梗 去蘆

頭黃薯 各一兩 百合 二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

紫菀飲子 出聖惠方 治傷寒百合病陰陽相搏日久漸瘦不

思飲食虛熱咳嗽宜服

紫菀 去根 杏仁 各一兩湯浸去皮 黃連 五錢去積 前胡

去蘆頭 半夏 各三分湯洗 瓜瓞 一枚 人參 一兩去蘆頭 知母

三分 甘草 五錢炙

右細剉和勻每服五錢以水一大盞煎至五分去滓

不計時候温服

半夏散 出聖惠方 治傷寒百合病久不差大小便澀腹滿微

喘時復痰逆不下食宜服

半夏 一兩湯洗七遍去滑 人參 五錢去蘆頭 木香 三分 枳實 麩炒 川

大黃 一兩剉碎微炒 杏仁 湯浸去皮尖雙 桑根白皮 各三分剉

百合 一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五



分去滓不計時候溫服

菰蘆牡蠣散 出千金方 治傷寒百合病渴不止

牡蠣 燒為粉 菰蘆根 各二兩

右為細散每服二錢以粥飲調下不計時候服

治傷寒百合病壯熱頭痛昏昏不寐如有祟方 出聖惠方

百合 石膏 各二兩 知母 木香 各一兩

右為散每服三錢以水一大盞煎至六分去滓不計

時候溫服

百合散 治傷寒百合病一月不解變如渴疾宜服

百合 菰蘆根 各一兩 牡蠣 燒為粉 梔子仁 麥門冬

各三分 去心焙 甘草 五錢 炙 微赤 剉

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分竹葉二

十七片煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒百合病腹中滿痛宜服此方 出千金方

用百合一兩炒令黃色為細散每服不計時候以粥

飲調下二錢一方用百合根

百合洗方

出千金方

治百合病一月不解變成渴者

用百合以水一斗漬一宿以水洗身已食煮餅勿以鹽豉一方用百合根外臺秘要云如渴不差可用菰蘆根并牡蠣等分為散飲服方寸匕日三服

傷寒狐惑論

夫狐惑之病或初得狀似傷寒或因傷寒而變然皆蟲症也蟲食其喉為惑使人聲啞蟲食其下部為狐使人咽乾其候皆默默欲眠不得卧起居不安惡飲食面目

乍赤乍白乍黑是也此由傷寒病內熱飲食少腸胃空虛而蟲為之不安故隨所食上下部而病名狐惑也病人默默欲眠目不能閉起居不安其聲啞或咽乾此名狐惑傷寒也狐惑與濕蠱皆蟲症初得狀如傷寒或因傷寒變成其疾其候默默欲眠目不能閉起居不安蟲蝕其喉為惑其聲啞蟲蝕下部為狐其咽乾狐惑之病并惡飲食面目乍赤乍白黑是其症也大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及

下部為蠱病其候齒無色舌上盡白甚者唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數其上唇上唇有瘡蟲蝕其臟也下唇有瘡蟲蝕肛也殺人甚急多因下利而得治蠱桃仁湯黃連犀角湯雄黃丸散主之 傷寒不發汗變為狐惑之病其氣如傷寒默欲眠目不得閉起卧不安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡飲食不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者則聲啞也一作啞毒食

下部者則乾咽也此由溫毒氣所為食於上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食於肛外者熏之并用雄黃三片稍置瓦瓶中炭灰火燒向肛熏之并服湯也歌曰狐惑傷寒聲啞啞唇口生瘡誠可怕上唇食臟下食肛醫師治療應無價又論云上唇生瘡蟲食其臟或云喉曰惑下唇有瘡蟲食肛或云陰曰狐通用多眠四症先看脉若是風溫情嘿嘿太陽外症欲解時更有少陰與狐惑脉浮自汗風溫也萎蕤湯脉細者太陽外已

解也小柴胡湯但浮無汗者麻黃湯沉細者少陰四逆湯歌曰蛔厥烏梅及理中臟寒惡冷吐長蟲咽乾聲啞名狐惑濕蠱唇瘡限數終又論云虻厥症屬厥陰病家有寒妄發其汗或汗後身熱又復汗之以致胃中虛冷故長蟲逆上飢不欲食食即吐蟲其乍靜乍煩者蟲或上而下也蟲聞食臭必出所以食必吐蟲也張氏有言厥陰為病消渴氣上衝心飢不欲食食則吐蛔吐蛔既出之於胃令腹有消渴之症何哉蓋熱在上焦致使

下焦虛寒無熱耳設或大便硬結是亦蘊毒使然又不  
可指為燥糞但用生料理中湯加大黃入蜜以利之白  
朮乾薑所以輔大黃也治法先服理中丸次用烏梅丸  
若誤下之利不止則用四逆湯又法理中丸加茯苓枳  
殼烏梅渴者加桔萎根狐惑與溫蠱皆蟲症也狀如傷  
寒下利變壞成之蓋腹中有熱入食無多腸胃空虛故  
三蟲求食而食人之五臟也其候四肢沉重並惡飲食  
默默欲眠目不能閉舌白齒晦面目間赤白黑色變易

不常蟲食下部為狐下唇有瘡其咽乾蟲食其臟為惑  
上唇有瘡其聲啞溫蠶條例是雖調理有方此越人所  
以望而驚也治蠶桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散備用  
而已金液丹方狀治濕蠶蓋硫黃能殺腹中諸蟲無湯  
者與之

方

黃芩湯 治傷寒不發汗後變成狐惑脉數無熱微煩  
目赤但欲眠睡咽乾不能食

黃芩

去黑心

射干

各一兩

黃連

去鬚炒二分

甘草

炙

前胡

去蘆

青竹茹

知母

焙各五錢

右麤擣篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓食  
後溫服

犀角湯 治傷寒發汗後變成狐惑毒氣發盛惡聞飲  
食咽中乾痛胃脇滿悶

犀角

鎊三分

黃連

去鬚炒

芍藥

木通

剉

木香

枳實

射干

去穢炒

人參

半夏

湯浸七遍炒乾各五錢

右麤擣節每服五錢水一盞半生薑一枚棗大擘碎煎至八分去滓食前溫服

桃仁湯 治傷寒狐惑默默欲眠目不瞑惡飲食面目乍赤乍白乍黑齒無色舌上白聲啞咽乾此因大病後腸胃空虛三焦蟲求食食人五臟食其喉則為惑其聲啞食下部則為狐咽乾當看上唇有瘡蟲食其臟下唇有瘡蟲食其肛

桃仁 去皮尖 雙仁炒 槐子 艾 各一兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半棗子三枚擘破煎至八分去滓溫服一方用生薑三片同煎

治傷寒狐惑毒蝕下部痛痒不止宜用薰洗方

枳殼 二兩 苦參 三兩 槐白皮 二兩

右細剉用水一斗煎取七升去滓薰洗下部

又方

槐白皮 柳白皮 桑白皮 桃白皮 各一兩

右細剉用水二斗煎取一斗去滓薰洗下部

治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如蠶痛痒不止方

以雄黃五錢用瓶子一箇口稍大者內入灰上如裝  
香火雄黃燒之候烟出以瓶口當病處薰之

半夏湯 治傷寒發汗不解變成狐惑寒熱無常心中

躁悶不欲飲食

半夏

湯洗七遍炒乾

木通

剉

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒

附子

炮製去

桂

去粗皮

葛根

枳殼

去穰麩炒

黃芩

去黑心各五錢

羚羊角

一

升麻

一分五釐

麻黃

三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑一棗大擘

碎煎至八分去滓溫服

雄黃導氣散 治傷寒狐惑下部蠶瘡

雄黃

研

青箱子

苦參

黃連

各五錢

桃仁

去皮尖雙仁炒

研一分

右搗研為散以生艾搗汁和棗子大綿裹導下部篇  
蓄汁和更佳冬月無艾只用散綿裹亦得

雄黃丸 治傷寒狐惑微煩默默欲卧毒氣上攻咽乾

聲啞下蝕濕重或便膿血

雄黃研 當歸剉炒各三分 蘆薈研 射香研各一分 檳榔剉五錢

右搗研為末煮麵糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食前溫粥飲下日三

柴胡散 治傷寒孤感神思昏悶大便難肌膚熱

柴胡去苗 大黃剉炒各八錢 赤芍藥 檳榔剉 枳實剉炒去穢

各一兩 半夏五錢薑汁浸透焙

右為散每服二錢濃煎苦楝根湯調下米飲亦得

地榆湯 治傷寒不發汗變成孤感毒氣上攻喉咽疼

痛下利不止

地榆 黃連去鬚 木香各五錢 白木一分五釐 甘草炙 阿膠

炙燥各一分

右麤搗篩每服五錢水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓食前溫服

療膈湯 治傷寒孤感病在上焦

甘草五錢 苦參一兩

生用



右細剉用漿水一盞半煎至八分去滓五更初服良久即吐

茯神散

出聖惠方

治傷寒狐惑病脉數者不可灸或因火為

邪即加煩熱故血妄行於脉中火氣內盛即心神煩

悶乾嘔

茯神

一兩

三分湯浸七遍去滑

黃芩

人參

去蘆頭

麥門冬

去心焙

黃連

去鬚各一兩

甘草

炙微赤剉

知母

各三分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

青竹茹五釐煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒發汗不出毒氣在臟或毒氣攻於咽喉為狐惑

症令人乾嘔心煩惡聞食氣不得睡卧

出千金方

黃連

去鬚

黃草

各二兩

右細剉以醋漿水二大盞漬之一宿煮取一大盞去滓分為三服不計時候溫服

黃連散 治傷寒毒氣未散欲變入狐惑目赤面色班

班如錦紋

黃連去鬚 木通到各五錢 犀角屑 川升麻各三分 黃芩

大青 茯苓 甘草炙微赤到 百合三分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分竹葉二十七片煎至五分去滓不計時候溫服

前胡散出聖惠方 治傷寒不經發汗變成狐惑六七日不解

寒熱來去胸脇滿痛默默欲睡卧不得不欲飲食心

煩嘔逆

前胡十兩去蘆頭 半夏一兩湯浸七遍去滑 黃芩三分 人參一兩去蘆頭

甘草三分炙微赤到 當歸一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服一方無當歸

又方出聖惠方

人參去蘆頭一兩 陳橘皮湯浸去白穰焙各一兩 枳殼麩炒微黃去穰 赤

芍藥 當歸到微炒 半夏湯浸七遍去滑水 前胡去蘆頭各三分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

赤芍藥散

出聖 惠方

治傷寒不經發汗後成孤惑默默欲睡

起則不安咽中乾心腹滿身體痛内外似有熱煩嘔

不止

赤芍藥

一兩 枳殼

三分 麩炒微黃

半夏

五錢 湯洗七遍去滑

黃芩

五錢 前

胡

一兩 去蘆頭

甘草

五錢 炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至五分去滓不計時候溫服

又方

出聖 惠方

薰草

黃連

去鬚 各一兩

黃芩

三分

石膏

二兩

葛根

剉

柴胡

各一兩 去苗

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗二枚

煎至五分去滓不計時候溫服

羚羊角散

出聖 惠方

治傷寒不經發汗十日已上變成孤惑

腹脹面赤惡聞食氣

羚羊角屑

五錢

木通

剉

桑根白皮

大腹皮

剉

柴胡

去苗 各五錢

石膏

一兩

川朴硝

五錢

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散

出聖惠方

治傷寒不經發汗後成狐惑下痢腹中幅

堅乾嘔腸鳴

半夏

一兩湯洗七遍去滑

黃芩

人參

去盧頭

乾薑

炮製

黃連

去鬚微炒各三分

甘草

五錢炙微赤剉

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

知母散

出聖惠方

治傷寒狐惑病咽喉乾痛唇口破裂或吐

膿血者

知母

一兩

石膏

二兩

甘草

炙微赤剉

黃芩

各三分

又方

出聖惠方

茅根

一兩

子芩

三分

羚羊角屑

五錢

石膏

一兩

甘草

五錢炙微赤

微赤

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二十七片煎至五分去滓溫服不計時候

木通散

出聖惠方

治傷寒服冷藥過多寒氣在臟手足厥冷

瓜甲稍青踟躕之間變成狐惑

木通

剉一兩

吳茱萸

五錢湯浸七遍焙乾微炒

桂心

一兩

細辛

五錢

草

三分炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入棗二枚葱白二莖

煎至五分去滓不計時候溫溫頻服

又方

出聖惠方

附子

炮製去皮臍

白朮

各三分

桂心

五錢

吳茱萸

湯浸七遍焙炒五錢

細辛

一分

木通

三分剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

又方

出聖惠方

乾薑

炮製剉

甘草

炙微赤剉

附子

炮製去皮臍各五錢

細辛

桂心

白朮

各三分

右為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白二

莖生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒發汗不利不解心中躁悶復發壯熱大腸不通

咽中乾痛變成狐惑方 出聖惠方

皂莢 三挺去黑皮塗酥炙黃焦去子 川大黃 剉碎微炒五錢 檳榔 木香

各一分

右為散每服不計時候以溫生薑湯調下二錢

鼈甲散 出聖惠方 治傷寒不解變成狐惑默默欲睡則不安

咽喉乾痛口内生瘡聞食氣時時下利

鼈甲 二分塗醋炙令黃去裙襴 川升麻 五錢 葳蕤 黃連 去鬚 當歸

剉微炒 赤芍藥 桂心 犀角屑 貝齒 茯神

秦朮 去苗 甘草 炙微赤剉 柴胡 去苗 麻黃 去根節 人參 去蘆

頭各五錢

右為散每服不計時候以粥飲調下二錢

赤小豆當歸散 出金匱方 治傷寒狐惑病脉數汗出微煩默

默但欲卧三四日眼赤如鳩者得之七八日其面皆

黃黑能食者膿已成也治之

赤小豆 三兩炒熟 當歸 一兩五錢剉微炒

右為散每服不計時候以溫水調下二錢漿水服亦可

治傷寒不經發汗變成狐惑毒氣下蝕肛門痒痛至甚

或下膿血

出聖惠方

檳榔末 杏仁 朱砂

右研令勻用黑錫和丸如棗核大先用椿根槐白皮各二兩以水一斗煎十餘沸去滓薰洗然後將藥內肛門中一日一易之

傷寒身體疼痛

論

夫太陽少陰厥陰皆有身痛當以外症與脉別之太陽症表未解脉浮緊法當身體痛宜麻黃湯以汗之脉浮緊當身體疼痛宜以汗解假令尺脉遲者不可發汗何以知其然榮氣不出血少故也尺脉遲者先以小建中湯以養之脉浮者麻黃湯主之太陽中濕一身盡痛發熱身黃小便不利病人中濕因而傷風風濕相搏一身痛腫是名風濕當於風濕中求之麻黃加朮湯主之若

脉沉自利而身體痛者陰症也急當救裏宜四逆湯附子湯真武湯之類以溫之大抵大便利而身體疼者當救裏大便如常而體痛者急當救表此不可不知也或身重背強腹中絞痛咽喉不利身如被杖者當作陰毒治之又問發汗後身疼痛脉沉而遲當用何藥仲景有桂枝芍藥生薑人參新加湯蓋為此症也小建中湯兼治汗後身疼脉沉而遲者若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者少與桂枝湯即愈金匱要略云瘡家雖身體痛不

可發汗汗出作瘡又問身痒者何也脉浮而遲遲為無陽不能作汗其身必痒太陽病七八日脉微而惡寒以陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也小柴胡湯主之若重反發汗則氣虛必兩耳聾無聞可芍藥甘草附子湯素有熱人可黃耆建中湯面赤有熱者未欲解也以其不能得小汗出身必當痒宜桂枝麻黃各半湯歌曰脇疼多屬少陽家燥糞陽明並小柴裏水痞堅須十棗陰脇引痛臟中乖脇肋痛滿者邪氣在半表半裏之間



也邪方傳裏永留為實氣鬱不行法當和解若夫裏水痛堅非下之不可也少陽病脇痛耳聾寒熱乾嘔或脇下堅滿並用小柴湯和解之陽明病不解傳入少陽脇下堅滿乾嘔小柴胡湯又陽明燥糞不大便脇下堅滿舌上胎滑小柴胡湯太陽病咳嗽乾嘔微利心下痞硬引脇下痛身涼汗出或時頭疼此為表解裏有水十棗湯下之病者脇下素有痞積在於臍傍引小腹入陰筋俱作痛此為臟結不治身疼浮緊太陽臨自利肝并腎

帶沉中濕毒因與風濕其餘霍亂本條尋局方大柴胡症云邪結在裏大便秘澁心腹痛鞭者可服若身體疼痛是表症未解不可與之然則身體疼痛不脈沉不自利太陽之表證明矣其或自利脈沉此則陰症之身痛藏家之裏病云身病大抵多是表症太陽身痛脈浮緊無汗麻黃湯以汗之或只脈遲者血不足也先用小建中湯以養之俟其尺脈浮即用麻黃湯病七八日脈細惡寒為陰陽俱虛吐汗下並不可至在其人素無熱可

芍藥甘草附子湯素有熱可黃耆建中湯厥陰少陽身痛其脉沉必自利四逆湯真武湯附子湯中濕一身盡痛不可汗下但利小便有本條陰毒身痛如被杖腹中絞痛脉沉而疾有本條風濕一身痛重但微汗不可大發汗有本條發汗後身痛脉沉遲者桂枝加芍藥人參湯汗後身痛為寒邪在表脉沉遲為在裏用芍藥人參人參安和真氣或用黃耆建中湯又汗後霍亂身痛不休少與桂枝湯

方

解肌湯 治傷寒往來寒熱一有時肢節煩疼者

恒山 二兩 柴胡 四兩 知母 甘草 青蒿子 桃枝 各一

桂 兩 生薑 二兩 烏梅 十二枚 葱白 薤白 各三寸 柳枝

一握 鼈甲 醋炙去裙襴二兩

右以水一斗二升煮取六升去滓再煮取三升溫服一升寒熱前後各一服亦治久瘧不用葱薤亦良

防風湯 治少陽病筋牽急而疼痛發作有時此為痺

也

防風 甘草各一兩 天南星 生薑二兩

右以水四升煮取二升去滓溫服七合日三服

六物解肌湯 治傷寒發熱身痛

葛根四兩 茯苓三兩 麻黃 牡蠣 生薑各二兩 甘草一兩

右以水八升煮取三升分三服再服得汗通即

止古今錄驗無生薑甘草忌酢物

參苓散 解傷寒治百節疼一切虛勞氣疾並宜服之

人參二兩 茯苓一兩 白朮二十兩 桔梗十兩 橘紅六兩 香白

芷三兩 芍藥一兩 當歸二兩 川芎一兩 半夏一兩 厚

朴二兩 官桂二兩 枳殼四兩 枳實四兩 黃同桂椿為

末 乾薑春夏一兩 五錢 麻黃去根節 春夏二兩 秋冬三兩

右件一處焙乾除官桂枳殼別研外諸藥同搗粗末

分作六分於大鐵鍋內以文武火炒令微赤黃為度

不可令焦須是勻取出以淨紙襯安板牀上候冷勿

令侵塵土入前枳殼官桂川芎和勻杵為細末每服

一錢水一盞生薑三片葱二寸煎七分通口服不拘時候

陰旦湯 治傷寒肢節疼痛內寒外熱心下虛煩

芍藥

甘草

各二兩

乾薑

黃芩

各三兩

桂心

四兩

大棗

十五枚

右咬咀以水一斗煮取五升去滓溫服一升日三服夜再服令小汗出差

黃耆建中湯 治傷寒身痛尺脉遲及汗後身痛脉弱

黃耆

桂

各一錢五分

白芍藥

三錢 甘草

一錢

右以水二盞薑五片棗二枚煎至八分去滓入稠飴一大匙再煎盡溫服舊有微瀉或嘔者不用飴

人參順氣散 治丈人婦人風虛氣弱榮衛不和肢節

疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急手足冷麻半身

不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澁或脾胃不和心

腹刺痛胃膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎

前產後並宜服之

乾薑

人參

各一兩

川芎

去蘆頭

甘草

炙

白朮

去蘆

苦梗

去蘆厚朴

去粗皮蘆汁製

陳皮

洗去白

白芷

麻黃

去節各四兩

乾

葛

去蘆

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚薄荷五七葉同煎八分不拘時候如傷寒感風冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎

壞傷寒

論

夫傷寒壞病者為三陰三陽俱受病訖毒氣未散留於

臟腑令致病候多變故曰壞傷寒也本太陽病不解轉

入少陽脇下牢滿乾嘔不能食往來寒熱其脉沉緊宜

小柴湯寸口脉洪大數而滑洪大榮氣盛滑數衛氣實

榮盛則鬱拂可與出汗衛實則大便牢難三焦閉塞津

液不通榮衛相搏心煩發熱兩目如火鼻乾面赤舌燥

齒黃大渴故過經而成壞病也傷寒太陽病三日已

發汗若吐若下若汗症仍不解者多變為壞病又太陽

病轉入少陽已吐下發汗少陽症罷此為壞病知犯何

逆以法治之此皆由傷寒病在諸經絡發汗吐下而病症不除又感異氣氣有寒暑燥濕風不同病變隨故謂之壞病又有傷寒過經再受熱邪留蓄臟腑病候多變者及傷寒解後虛羸少氣餘症未除者皆謂之壞病也

方

麥門冬散 出聖惠方 治傷寒壞病身體沉重無力昏昏如醉

頭痛煩悶

麥門冬 三分去心 百合 三分 麻黃 三分去根節 葛根 五錢 柴胡

一兩 桔梗 五錢去蘆頭 木通 三分 甘草 五錢炙 羚羊角

五錢 石膏 二兩 赤茯苓 一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

升麻散 出聖惠方 治壞傷寒經數日未解潮熱作時煩躁面

赤

川升麻 三分 鼈甲 三分塗醋炙 前胡 五錢去蘆頭 烏梅肉

五錢 枳殼 三分麩炒 犀角屑 三分 黃芩 三分 甘草 五錢炙

葛根 三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入生地黃汁一合更煎一兩沸不計時候分為二服

又方 出聖惠方

梔子仁 三分 川升麻 三分 黃芩 一分 石膏 一分 乾薑 五錢

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓入生地黃汁一合更煎一兩沸不計時候分為二服

前胡散 出聖惠方 治傷寒後已經十餘日潮熱不退身體沉

重昏昏如醉恐成壞病

前胡 一兩去蘆頭 百合 一分 麻黃 三分去根節 葛根 一分 麥門

冬 五錢 石膏 一分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

又方 出聖惠方

柴胡 一分 防風 三分去蘆頭 黃芩 一分 葛根 一分 甘草 五錢

炙微 赤剉 前胡 一兩去蘆頭

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

鼈甲散 治壞傷寒經十日已來未解熱在胃膈煩悶不止

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襴

柴胡

去苗

川升麻

已上各一兩

烏梅肉

一兩

聖濟作五錢

枳殼

麩炒微黃

犀角屑

黃芩

已上各一兩

甘草

五錢

炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓入生地

黃汁半合更煎一兩沸不計時候分溫二服聖濟方  
水一盞半煎至八分去滓下地黃汁二合攪勻食後  
溫服名鼈甲湯

犀角散

出聖惠方

治壞傷寒日數多後煩熱不退頰赤口乾

犀角屑

一兩

柴胡

三分

吳藍

三分

大青

一兩

川升麻

一兩

梅肉

三分

黃芩

三分

甘草

五錢

炙微赤剉

右為末每服五錢水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候溫服



麥奴丸 出聖 惠方 治壞傷寒熱在胸中口不能語

麥奴 五錢 竈下黄土 五錢 竈突中墨 五錢 梁上塵 五錢 麻黃

一兩去根節 川大黃 五錢剉碎微炒 黃芩 五錢 川朴硝 一兩

右為末鍊蜜和丸如彈子大每服以新汲水研下一丸良久令極飲水不欲水但強飲之須臾必寒寒已當有汗出便愈

宣毒麝香丸 出聖 惠方 治壞傷寒心下結硬腹滿氣急大便

不利體變如桃枝色熱結在內者

麝香 一分 猪苓 一分去黑皮 川芒硝 一兩 柴胡 五錢去蘆 芫花

一分醋研 川大黃 一兩剉微炒 梔子仁 五錢

右為末入麝香同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服溫水下二十九丸良久必利未利再服

知母麻黃湯 出永類 鈐方 治傷寒壞病差後或十數或半月

二十日終不惺惺精神昏語言錯又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多端治藥勿効或朝夕潮熱煩赤或似瘧皆由發汗不盡餘毒在心包絡間所致

知母 炒一兩

麻黃

去根節煎

甘草 炙

芍藥 黃芩

去黑心 各五錢

桂

去粗皮五錢 盛暑中可減半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至五分去滓  
溫服半日內可相次三服溫服取汗再服若心煩不  
眠欲飲水者當稍與之令胃中和即愈未汗須再服  
升麻湯 治傷寒壞病經數日未差諸藥不能除

升麻

鼈甲

醋炙去 裙襴

枳殼

去穰 麩炒

犀角

鎊

葛根

黃

芩

去黑心

甘草

炙

前胡

去蘆頭

烏頭

炮製去皮 臍各五錢

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓  
下地黃汁二合攪勻食後溫服

麝香丸

治傷寒壞病冷熱相搏心下結胃滿氣急大

便不利體變黃青黑如桃枝色四肢逆冷熱結在內

者不可服湯飲

麝香

研

猪苓

去黑皮

朴硝

研

芫花

炒

芫花

醋炒各一分

大

黃

剉

商陸

甘遂

焙各五錢

右搗研為末鍊蜜和搗三五百杵丸如棗豆大每服

十九食前温湯下良久必利未利再服

黑奴丸 治傷寒壞病頭與骨肉俱痛狂言妄語醫所

不療者

麻黃

去根節

黃芩

去黑心

甘草

炙

竈突黑

苦硝

豉

一合炒

右搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服

一九新汲水研下不拘時候

大効丸 治傷寒壞病

烏頭

附子

二味去皮臍為末用醋一升煎盡好酒一升再煎成膏後入諸藥

烏

蛇

酒浸去皮骨炙

細辛

去苗葉

厚朴

去粗皮薑汁炙

人參

赤茯苓

去黑皮

桂

去粗皮

乾蝎

炒

木香

研

草豆蔻

去皮

礪

砂 胡桐液

檳榔

剉

膩粉

不灰木

各一分

右一十七味將十五味搗研為末入二味膏子內和

搗丸如梧桐子大每服十九如陽盛研牛黃膩粉水

下如陰盛發厥心胃結痞煎柳枝湯下

麥門冬湯 治傷寒壞病經久不差潮熱不退身體沉

重昏憤煩悶

麥門冬

去心 焙

赤茯苓

去黑皮 各一兩

鼈甲

去裙襴 醋炙一兩

甘草

炙剉 五錢

右粗擣篩每服三錢七分水一盞烏梅一箇小麥五

十粒同煎至七分去滓溫服不計時候

前胡湯 治傷寒壞病潮熱頰赤口乾煩躁神思昏塞

經久不瘥

前胡

去蘆頭 二兩

柴胡

去苗 常山

人參

葛根

剉各一兩

甘

草

炙剉 三分

右粗擣篩每服三錢水一大盞烏梅一箇椎碎生薑

三片煎至七分去滓溫服不拘時候

治傷寒八九日不瘥名為敗傷寒諸藥不能消者方名

鼈甲散

鼈甲

炙

蜀升麻

前胡

烏梅

枳實

炙

犀角屑

黃芩

各一兩

甘草

炙一兩

生地黃

八合 切碎

右切以水八升煮取三升分五服頻頻服若不解更

服若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升  
煮取三升分三服忌蕪荑

治壞症傷寒病十餘日之後過經已下已汗而未愈者  
盧州郭醫名羽云渠義父李助教大名善方脉膏合  
以治四五人皆安其方得於天台一僧用藥甚異或  
謂其効在兜取殊不可曉

紅娘子

二七箇去頭  
翅足細研

大棗

兩枚剝  
取肉

右同研勻爛丸入理中丸大每服一丸以白水煎服

先頭目次遍身覺微微有汗然後服小建中湯加黃

耆病瘕即止郭醫但能記此說未嘗敢用不可不錄

以俟名醫開之

回生散治傷寒失下或成壞症謔言妄語發黃發斑

大便不通小便如血內有燥糞畜血舌縮神昏不能

服大湯劑但服此藥一呷燥便下過澀然汗出而愈

甘遂

生用

未秤

郁李仁

去皮

檳榔

生用

大黃

生用

戟

六味各  
等分

右件為細末每服一錢入輕粉一分以蜜水少許用  
柳枝調勻服之更量虛實加減不拘時候



普濟方卷一百四十二

總校官候補知府 臣 葉佩蓀  
校對官助教 臣 李 巖  
謄錄監生 臣 謝家楨