

寅 9

82

新編分類藥物學講義 卷之二

太倉景芸芳編述

第六類 補氣助陽系

黃耆 附黃耆莖

產地 出杭州綿上者佳。

形色 生于山地。莖臥地。成蔓狀。多羽狀複葉。有毛。夏曰

開淡黃花。如蝶形。結實莢如赤小豆。根肥大。莖

叶皆可入藥。

性味 甘微溫。

選用 健脾用蜜炙。補腎入山崩帶鹽水炒。生用治癰

疽。護衛氣用炭皮。亦治水腫。

本經又云能治五癩

癩疾

主治

本經主癩疽久敗排膿止痛治大風補虛

五三核

功用

生用固表托毒灸用補中益氣溫三焦托裏排膿

壯一 生一粒大而脬痛

北一 多水葡萄白狀

腸一 大便時有血水

脈一 生於臍腸便時

刺脫

用量

二錢至五錢

血一 勞醉則黃嫩赤

處方

配生熟地黃柏黃芩黃連當歸酸棗仁治陰虛盜汗之正法配桂枝白芍防風炙甘草治表虛自汗配

而痛

癩疾

初起水泡作痒成瘡破流脂水或

出血久則成片延及遍身好浴熱

湯因氣血虛弱不能流汗皮膚骨

所致若作風濕瘡治必難奏效

用黃芩補氣是則

血亦足

禁忌

本品極滯胸悶者忌之有表邪者勿用

按著名方劑有當歸補血湯玉屏風散黃芪健中湯

經脈無閉塞之虞皮膚無乾
枯之患佐以他藥自能全愈

便讀云得防風補而不津行而
不泄其功莫大矣同當歸則和營

連衛

補氣中益氣湯

益氣陳升以 參桂

黃耆補血湯

黃耆

補中益氣湯皆以黃耆為君也。其效已証諸實驗。
張錫純研究黃耆鮮曰黃耆性溫味微甘能補氣。
善治胸中大氣本經謂其主大風者以其與發表
藥同用則能祛外風與羌活藥同用更能熄
內風也。謂治癰疽久敗者以其補益之力能生肌
肉其膿自排出也。表虛自汗亦可用以固表氣之
虛。小便不利而腫脹者與利水同用使衛氣和而
水濕去矣。婦人氣虛下陷而崩帶者於四物湯中
重加以固之。蓋血脫益氣故當歸補血重湯用之也。
黃耆補氣之力最優推為補藥之長。名之曰耆。

也。

日本東原言益氏之論黃耆

(甲) 主治

主治肌表之水。故能治黃汗。盜汗。皮水。又旁治身
体重或不仁也。

(乙) 改徵

(一) 耆与桂枝苦酒湯。証曰。身腫發熱。汗出口渴。又
曰。汗沾衣色正黃。如黃芩為汁。此方即當歸

(二) 防已黃耆湯。証曰。身重汗出惡風。下。防本州

(三) 防已茯苓湯。証曰。肢腫水氣在皮膚中。下。防桂美州

(四) 黃耆桂枝五物湯。証曰。身重不仁。耆与桂美州

(五) 桂枝加黃耆湯。証曰。身常重暮盜汗出。又曰從。耆与桂美

耆与桂美

腰以上必汗出。下無汗。腰寬弛痛。必有物在皮膚

中狀。

攷

(丙)互攷

右歷觀諸方。黃耆主治肌表之水。故能治黃汗。皮水。又能治身體腫。或不仁。亦皆肌表之水也。

黃芪桂枝苦酒湯。桂枝加黃芪湯。同治黃汗。而耆

耆桂枝苦酒湯。汗沾衣。是汗甚多也。桂枝加黃

耆湯。証腰以上必汗出。下無汗。是甚少也。汗牙之

多少。即用黃芪多少。則其功用的。然可知矣。

防己黃芪湯。防己茯苓湯。同治皮膚水腫。而黃耆

有多少。防己黃耆証曰。身重汗出。防己茯苓湯曰

証曰。水氣在皮中。此隨水氣多少而黃芪亦有少
 少。則黃芪治肌之^表水明矣。黃芪桂枝五物湯証曰。
 身重不仁。仲景之治不仁。雖隨其所在。處方不同。
 而歷觀其^用皆治水也。然則不仁是水病也。故少
 腹不仁。小便不利者。用八味丸^有以^加利小便。則不仁
 自除。此不仁亦固于水也。
 止渴消腫治筋挛瘰癧瘰癧疾。

附黃耆

白朮

又名山薑 附野於朮

產地

山朮類。產浙江於潛者佳。名於朮。

衛氣不固玄府空

疏自汗淋漓佐以參

芪功能固表

又濕熱症濕熱而益

則汗出熱不退自來功

能吸收脾濕加入辛劑

苦燥藥中俾濕解熱

除汗自止矣

形態

莖葉高二三尺。叶有毛。对生。花有紫碧紅數色根

細如指大者如拳。色微褐。肉白

性味

甘温而苦。

選用

肥大者優。條細者力薄。

主治

本經主風寒濕痺。死肌。瘡。疔。止汗除熱。消食。

功用

有吸收脾濕之功。有消痰利水之能。製熟則能和

中益氣。止渴生津。且為安胎之要藥。痰飲多吐白

沫者。此品不可一缺也。

用量

二錢至五錢。

處方

得參苓。大補中氣。得枳橘。健運飲食。得桔。反

痰飲能化得澤澤車前等利水獨長

禁忌 腎虛者勿用

附野於朮 功後勝惟侷昂近世罕見

素向長刺篇曰病大風

骨節重鬚眉之落即

屬風也

按本經主風寒濕痺死肌痲疽者正以風寒濕三氣合而成痺者拘攣而痛也痲者風寒乘虛客于肝脾腎所致也疽者脾胃虛而濕熱乘滯也以上諸証莫不由風寒濕而成白朮有此三者之功故能祛其所致之疾也止汗除熱消食者濕甚則自汗濕邪多則發也濕去則脾胃燥則食自消汗自止熱自除矣又主大風在身風眩頭痛消痰

腸風

時便血色鮮而清多附於糞
症由腸胃濕熱榮積

痔漏

即肛門生瘡若分五痔見本草卷五
病尿盛者多

脫肛

肛門似有物墜出症正虛者
居多如久瀉後往有之

水逐皮膚間風水結腫除心下結滿及霍亂吐下

不止仲景有五苓散桂枝白朮猪苓茯苓澤瀉湯

治水濕內停脾不散津口渴溺難此藉桂枝通陽

之力使濕化津行之意也蓋白朮為脾胃之君藥

脾旺則清氣升精微上濁氣化而糟粕輸矣保命

集用白朮枳殼麩炒等分為末飯丸梧子大每日

服一粒功能束胎並可易產普濟方治腸風痔漏

脫肛積年不瘡者用土炒白朮末乾地黄少許飯

上蒸熟搗和為丸以梧子大每日服數粒頗效集

簡方治骨痛用炒白朮山藥為末成丸參湯送下

生者清火解毒
炙者和中補脾
外稍治莖中痛
外第治癰疽疔毒

甘柞

產地

山柞類，產川陝等省。

形態

多年生柞，叶為奇數，如披針形而尖，互生，初及開
淡紅色，冠如蝶形，簇聚成種，根梢均可療疾。

性味

甘平

選用

大而結實者良。

炮製

生用 蜜炙

六效筒便方治濕熱暑濕用白木車前子炒為末
白湯送下二三錢六頗效白木之功用至廣六難
尽述以上數方以供一試

自來 附甘柞節 甘柞梢

五以 本經主五藏六腑寒並邪氣堅筋骨長肌肉倍氣

力愈瘡腫解表久服輕身延年

功用

生用淨火清並解毒灸用溫補元氣入于峻利則

緩正氣入于和利功能補益入于汗利力能解肌

入于涼利用以浮火入于潤利使之養血故凡補

中解毒和胃及外科等無不用之如和生小兒用

甘草鈎藤煎湯與飲功能清並解毒

用量

幾分至兩許

處方

甘草相沿為百藥之長無論何種藥品如寒並溫

涼汗吐下和均可與之配伍

禁忌

中滿者忌之。嘔家酒家勿用。

按鄒澍曰。傷寒論金匱要畧兩書中凡方二百數十。

用甘甘者至百二十方。非甘甘之主病方。乃諸方

必合甘甘始能。曲当病情也。凡药之散者。外而不

内。麻黄桂枝青龙柴胡葛根等湯。攻者下而不上。

調胃承氣。枳仁承氣。大黃甘甘等湯。温者燥而不

濡。四逆。桑葉。蔓等湯。清者列而不和。白兔竹葉石

羔等湯。若無甘甘調劑其間。遂其往而不返。以為

行險僥倖之計。不異于破斧沉舟。可勝而不可勝。

詎誠之道耶。

麻黃湯——桂麻杏枳

桂枝湯——桂芍甘姜枣

小青龍——姜桂麻芍甘細交五味

小柴胡——夏參枳芍姜枣

葛根湯——即桂枝湯加葛麻黃

調胃承氣——硝黃枳

桃仁承氣——大黃硝枳仁桂

大黃甘草——大黃甘草

四逆湯——枳姜附

理中湯——枳參朮姜

白虎湯——石膏肥知母枳粳米

竹葉石膏——竹葉半夏石膏人參甘草

粳米麥冬

炙甘草湯即瀉脈湯

炙甘草 人參 生薑 桂枝 生地

蛤粉炒阿膠 麥冬 麻仁 大棗

緩而時止為結之而有力者為積聚
無力者為正氣衰弱

誤

又甘草之用生用炙確有不同。乃兩書百二十方

傷寒論用生甘草者不及十分之一。金匱要畧用

炙甘草者不及十分之一。甚有同一方在傷寒

論用炙。在金匱要畧則用生者。是知古書傳訛者

多矣。以本經別錄主治大率除邪氣治金瘡解毒

皆宜生用。緩中止渴補虛宜採用消息意會之可

矣。炙甘草之任莫重于復脈湯。其用在通經脈利

血氣可無論矣。而金匱要畧附千金翼方治虛勞

不足汗出則閉脈結悸行動如常。非所謂煩滿短

氣乎。又附外台方治肺痿吐涎沫多。心中溫。液

數而時止為促。主邪氣內陷。代者止有常數不能自還。久則腹動。主元虧。中焦病。或女子懷孕。

者。非所謂傷藏咳嗽乎。按脈之動而止。不能自還。因而復動者有三。曰代。曰結。曰促。解之者曰脈數而止。謂之促。緩而止。謂之結。有定時。謂之代。乃矣。甘牀湯。但治結。而不治代。促。其意何居。曰。此非甘牀不治代。促。乃非治代。促之湯也。如論中桂枝去芍藥湯。証胸滿。葛根黃芩黃連湯。証下利。皆不忌甘牀。即可知其旨不在甘牀矣。外科精要治一切癰疽毒發及丹發火毒。民間治療。毛虫螫。啣馬肉中毒。諸藥中毒。皆以甘牀。多量。濃煎。與服。按中毒療治。不外吐下二法。甘牀之所以能奏解毒之

○舌腫又名重舌心脾之熱上攻也

可用清熱飲治之黃蓮生地

木通生升連芥蓮子

○懸壺上齧腫起如牙尖盛水狀

此症見於初生兒者居多因胎

毒上攻需以長針刺破五以独

味外湯与飲

○撮口者口撮如囊兒吮乳不得

舌強唇青面色黃赤乃心脾

之熱与胎毒相并是謂危

候

效者。殆以其且有通下之作用歟。

甘竹在西藥中為和緩藥。為矯味藥。為賦性藥。無

单独用之者。中國則不然。傷寒論治脈結代用吳

甘竹湯。名甘竹。以之為君也。此用甘竹為君藥

也。金匱錄之治舌腫塞口。傷寒類要之治傷寒

心悸。脈結。金鑑之治懸壺。直指方之治痘瘡煩渴。

金匱玉函之治小兒撮口。皆以一味甘竹為妙用。

此單用而成單方者也。然單用者究竟少。而用為

佐藥者多。人以見甘竹之用於佐藥。而不知甘竹

亦堪作君藥也。近世對於甘竹之平論。約有二論。說。

一視甘竹為無足輕重。其用僅等於西之調和藥。
徐雲岫即主張此說。二視甘竹為百藥之長。能大
補脾胃。解諸藥之毒。今以臨証經驗所得以斷之。
必用甘竹為調和藥者。必限于刺激劑。亦醉劑。改
下劑。其用量以一錢為限。倘他為甘竹有補益之
功能。必當重分量。決非凡分錢許所能盡其長者。
近世恆以治茎中痛。所謂氣行於下。記以猪苓澤
瀉水通淋。解通丸。毒。淋濁。火。相。

甘竹梢

用量

甘竹節

近世常用之。瘰癧症。疔毒。紅腫。痲痛。配貝母皂角。

補命火滑腸

肉蓯蓉

用量

刺等可以軟堅

八分至錢許

又名肉松容 黑司令

產地

生于山野地

形態

莖為肉質長尺餘作短柱狀葉細如鱗莖根皆黃褐
色花亦同色夏日發生于莖之上部

性味

甘溫而鹹少帶微酸性柔和

選用

酒浸一宿至明以櫟刷去沙土浮甲劈破中去心
白膜一重切片焙用酥炙用有松子鱗甲者者良

主治

本經主五勞七傷補中治莖中寒熱養五藏強陰

七傷

大飽傷脾大怒則氣

逆傷肝 強力舉至

物傷骨 形寒飲冷

傷肝 憂鬱思慮

傷心 風雨寒暑傷

形恐懼不節傷志

益精。

功用

走入肝腎兼走大腸功能滋腎潤燥益精壯陽但無峻補之力有却滑腸之能故凡老人大便燥結者宜之。

用量

三錢至五錢

處方

茯苓与生熟地天麦门冬当归杞子鎖陽杜仲紫何車苁可以大補真元配黃芪治腎氣虛同五味治水泛成痰单用白酒煎服治老人便閉。

禁忌

因有滑腸之能故雖肝腎不足而脾虛便溏者勿宜服若胃弱者投之必致嘔吐泄瀉。

按自来謂肉蓯蓉乃馬精落地所生。此說未知確否。

故今之治精虛者。以其同氣和求之義也。凡五勞

七傷久而不愈。未有不傷其陰者。蓯蓉補五藏之

精。足則陰足矣。莖中者。陰之道路。虛則寒熱而

痛。精足則痛已矣。生于五藏而藏之于腎。精足則

男子。婦人癥瘕皆由于血寒。精足則氣充。氣充則

乘行。葉天士說。能治癥瘕者。謂其鹹以軟堅。滑以

去滯。溫以散結也。朱丹溪曰。肉蓯蓉罕得。近所用

者。大多金連根。用鹽製。假充之。或以性蓯蓉代之。

用者宜審之。蘇恭曰。唐本草曰。今人所用。多性蓯

卷也力稍劣。

鎖陽

產地

產于甘肅輜根錄曰鎖陽生韃靼田地為野馬蛟龍遺精入地久之發起如笋。

形態

上豐下細鱗甲滿生與蓂蓉形似而較短畧帶浮屈。

性味

甘溫微鹹。

選用

去皮厚切晒乾宜酥炙用。

主治

時珍補陽益精潤燥潤筋治痿弱。

功用

與蓂蓉用壯陽力較勝。

痿者兩脚痿軟無力

不能行走此病多見

於濕熱症候或一切火

病之以治宜責之脾

腎故性云脾熱則

焦崇為痿覺腎不

足者兩脚無力

丹溪治脚痿用虎潛丸

黃柏龜板知母熟地

牛膝芍藥鎖陽虎骨

當歸陳皮干葛

再加羊肉為丸

用量 一錢至三錢。

葯情 与茯苓同。

禁忌 洩溲及陽強而精不固者忌之。大便不燥者結六

忌之。

按鎖^陽与茯苓一類二種。皆謂^野与蛟龍遺精而生其

說然否。固難下斷。其味甘鹹性温。潤燥養筋。故九

陽氣虛而精血衰敗。大便燥結者始可用之。此說物

專入腎經。為大補元氣之品。功效百倍茯苓。然其

性雖温。其体仍潤。未可云為命門火衰必用之葯。

故書有云大便不燥結者勿用。盖知性^其属潤也。

以約有相需者同類而不可離也為佐者吾之佐使也要者奪者吾之能也思者受彼之制也反者人所不相合也

十八反歌在卷第一類

產地 形態

有云可補陽者亦不過言其陰補而陽壯之意豈其性等桂附而為燥烈之品哉故謂之陰則可謂之補火正未能然耳

又名神竹 土精

產於吉林省者為最佳

高尺許三極五葉為掌狀複葉小葉披針形或

長卵形而共有鉅齒花小色白子如腰子式秋時

紅如血根長八九寸多肉畧如人形附根生者為

芦橫生于芦頭上者為條其細者為鬚九人參根

芦條均可入藥

唐容川本州問答

向日本州十八反十七忌

十九畏宜格守乎答

性之反者水火冰炭

之不容故不可同用

然仲景有甘遂甘州

同用者取其相爭

而收功也使人熾勞

不致健以不用者

是至於相須相畏更不可論相忌

亦難之拘如服麻黃細辛忌油膩

白蜜地黃忌葱白此皆大不宜者

在所當忌又不可不知而十八反中

反在之

性味

甘溫微苦

選用

其色中黃帶白大而肥潤者佳

主治

補氣一本經補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪

氣用心益智明目

功用

正氣不足則心神不寧津液無源舌燥口渴脾氣

不運腹脹堅積衛氣虛弱腠理不固易感表邪人

參為大補元氣之要藥功能回微陽于垂危理一

切虛症其功至矣

用量

三五分至數錢

處方

配養陰藥則大補營衛配補氣藥治太虛將脫配

藥物學 =

本草綱目

禁忌

疏表药治虚人感邪。配攻裡药治虚人肉实。
人参功能在诸药之上。如气虚肺有火热及肺氣
不利者忌之。有表者尔当禁之。

参 條

生津補氣其力甚厚。止可薄以調理常病。性橫行。
凡指臂無力者可用。

参 蘆

形較参條細。力亦薄。味苦。性降。久病滑精崩中下
血。用之反劇者有之。宜於嘔逆咳嗽失血。

太子参

功主湧泄吐虛人眼疾。留飲用代瓜蒂。

高麗参

大補元氣。形細如参。而堅實。其功不下大参。

性微温。味甘。主補肺陰。益五藏之精。生津液。

西洋參

苦甘涼。味厚氣虛。補肺降火。生津液。除煩。虛虛。而有火者宜之。

東洋參

來自日本性溫

党參

甘平。補中益氣。和脾胃。除煩渴。中氣微虛。用以調補。頗為平妥。皮色黃。而有橫紋。類乎防風。

按參為中藥最著明。強壯。能恢復身體及神經之

疲勞。且有健胃之效。其所有之成分。在化驗上。雖

未能顯出。于臨床上。則實例甚多。古人關於人參

治驗之案。殆不勝枚舉。以大虛之人。用獨參湯。陽

微欲絕。用參附湯。此皆人參之功。

藥功考二

或曰。西醫曾化驗此品。謂無特長之成分。且左病
 症危急之時。投以大量。亦未悉效。此言謬矣。今
 一以証之。即半夏一味。為止嘔之特效藥。外人亦
 已承認之。而據化學所得。不外含有少量澱粉而已。
 澱粉果能止嘔乎。何以直接用澱粉止嘔。而不克
 奏效。是半夏之中必含有他種止嘔之物質。而未
 經檢出。亦與人參之有效成分。尚未化得相同也。
 吾人當此化驗中。葍芽之時。萬不可執不完全
 之報告。而徑信致失。吾歷古相驗之效葍也。惟人
 參價值極昂。因其利厚。作偽者甚多。觀古董即可

全據佛慈做之試驗
 曾苦自深而口其二用
 人參湯浸米飼之前
 肥胖殊甚且能養
 長其萎瘦而示
 不久即死此非人參
 之力而何

附子散陰寒
烏頭去風寒

附子

想而知。况參商之狡詐百出。防不勝防矣。

川烏頭。天雄。

產地 四川

形態

毒竹類。莖高二三尺。葉互生。掌狀。分列如艾。有光澤。秋曰用。紫碧色。花其狀如帽。實細小而黑。其根

附生於正根之旁。八月成熟。圓小如子。

味辛性熱。

性味 選用

古方以一兩一枚者為力全。近時專取大者為勝。性熱有毒。頂細正圓者為上。頂粗有節多巖乳者次之。傷缺偏縲者為下。有兩歧者名烏喙。此稟氣

積聚癥瘕錄卷第一

主治

不正。專主大風頑痺。附子生用則散陰寒。熟用則助真元。生用去皮脐。熟用甘草童便製。容易腐爛。若欲久藏。用一味甘草濃煎汁煮。汁尽為度。以中其毒。用生菜服汁。及黃連解之。近時烏附多產陝西。其質粗。其皮厚。其色白。其肉鬆。其味易行。易過。非若川烏之色黑。皮薄。肉理緊細。性味平而不烈。久而愈辣。能峻補命門真火也。

（本經）主風寒咳嗽。邪氣寒痿。攣拘。手足痛不能步。

行破癥堅積聚血瘕金瘡。

補命門逐寒濕。

近世應用

命門即腎也

用 量

八分至二三錢

處 方

配表药則散寒配補药則温補

禁 忌

陰虛内熱者勿用

按附子甘辛大熱有毒烏頭即其母也諸家本性但云

云春採者為烏頭故舉世誤認烏頭為附子之小

者往以側子代用誤人多矣烏頭猶芋婆附子

如芋子從旁相附而生其倍大附子而形長獨顆

無附者名天雄時珍曰王氏究原方云附子性重

帶入脾腎助元陽逐寒濕其性剛猛為慄悍之將

同表药則發散同補為則補温川烏頭性狂疏味与附子

驚風有急慢之別。急驚之因或
目觸異物或耳聞異聲神散氣亂
而生有因心肝火盛外為風所搏而
成或痰盛熱極內動肝風其甚也暴
壯熱煩急面唇均赤而痰壅生惡候
牙關緊急二便不行脈洪數在尿
於實治宜安神定驚清熱豁痰
慢驚多象稟賦虛弱或患病而
過服峻利之劑或久瀉及受
受時緩搖擻時作時止面色
淡黃或古有青白相兼昏睡眼
合或露睛脈來遲緩大便色青
治宜培元為全

相同。但附子長於治寒。故本經治風寒欬逆。當是
陰寒呃逆之誤。觀其主治諸症。皆陰寒之邪乘虛
客犯所致。其治金瘡者。是傷久氣血虛寒。不能收
斂。非血出不止之金瘡也。別錄又主腰膝風寒。脚
氣痿弱。心腹冷痛等病。皆取其溫經散寒之力。並
可於補藥中。烏頭則不能燥散之性較附過之故。
治風以之為嚮導。主中風惡風半風不遂。風寒濕
痺。肩背痛不能俛仰。及陰疽不潰。或潰久瘡寒不
斂者。並可少加以通血脉。惟在用之得宜。小兒慢
驚。搗涎壅厥逆。生川烏全蝎加生姜煎服後效。

頗

赤丸

烏頭 花冬 半夏
細辛 治寒氣厥逆

據云藥之相反者。以烏頭半夏為最。而金匱赤丸
 及普濟方俱二味同用。非妙達至義。難以語此。天
 雄性味。與烏頭相同。而力尤大。性皆下行。若上焦
 陽虛者。當用參芪。不當用此也。且烏頭之興。皆是
 向下。其脈乃向上。生苗。宗稟元素。皆謾認興為上。
 惟震亨以為下部之佐者。得附子氣味俱厚。
 稟雄壯之質。有斬關奪將之能。引補藥行十二經。
 以追復散失之元陽。引補血藥入血分。以培養不
 足之真陰。引發散藥開腠理。以驅逐在表之風寒。
 引溫煖藥達下焦。以祛除在裡之冷濕。白朮為佐。以

為除寒濕之聖藥。然須並用生者。方得開通經絡。
若氣虛熱甚。宜少用。然附子與參芪之力。肥人。
濕亦宜少用。烏附。行經附子。得干姜。炙甘草。名曰
回陽主少陰經寒。証得桂枝。甘草。姜。炙。名桂枝附
子湯。治風濕相搏。身體疼痛。不能轉側。得白。木。甘
枳。朮。姜。名木附湯。治風虛頭重。眩極。得麻。黃。細。辛。
名麻黃附子細辛湯。治少陰病。發熱。脈沉。得大
芩。連。名附子瀉心湯。治心下痞。而惡寒。汗出。得大
黃。細。辛。名大黃附子湯。治脇下偏痛。發熱。脈弦緊。
得參。朮。芩。名附子湯。治少陰病。得之背惡寒。得

茯苓白朮芍藥生薑名真武湯。白芍陰病腹痛小便
利得乾姜葱白名白通湯。治少陰病利下脈微。
若厥逆無脈乾嘔而煩面赤加葱白以通陽氣。此
皆得配合之神妙。能起死回生於反掌間。生熟各
隨本方。馮全德驗所得。生附配干姜補中有發。熟附配
麻黃發中有補。宜生宜熟不出此中妙用也。至於
崔氏八味丸。用為少陰嚮導。後世認為補葯誤矣。
東垣治陰盛格陽。面赤目赤煩渴引飲脈來七八
至。按但之即散者。用干姜附子湯重加人參服之。
得汗而愈。時珍云。陰虛在下。陽虛在上。治之以寒。

則陰氣愈盛。治之以熱則拒而不納。熱藥冷服。則假使
下咽之後。冷性既消。熱性更發。病氣隨愈。此並圖藥
寒用之法也。附子性沉着。溫脾逐寒。烏頭升發溫
脾去風。若寒疾則用附子。風疾即用烏頭。二藥俱
走而不守。故墮胎為百藥長。坐妊娠脈弦發熱。胎
脹惡寒。小腹如扇。金匱附子湯以安其胎。此治法之
變也。若傷寒發熱頭痛皆除。並傳三陰而見厥逆
脈沉。此厥深。並深之候。症必先發熱。頭痛七八日
或十餘日後。而見厥冷。脈沉。此為陽厥。大便必不
通。而閉。若並伏厥逆。與陰虛內熱。火鬱於內而惡

白扁豆

產地

處處均有。

形態

二月下種。蔓生附木而上。叶大瓦狀。如小蛾。有赤白。結實如莢。每莢有二三子。其子入药用。

性味

甘平微温。

寒也。誤服則禍變百出矣。附子乃退陰回陽必用之药。近世疑而不用。直待陰極陽竭。則用已遲矣。且喪陰頭痛足冷。上並下寒。陰邪內盛。陽氣外衰。急須人參以益其原。佐以附子温經散寒。捨此不用。將何救之。

選用 取粗圓色白者。連皮炒用。亦有獨用其皮以清暑邪。

功用 健脾和胃。降濁升清。消暑除濕。止渴止瀉。亦可解

酒毒。河豚毒。

用量 三錢至五錢。衣用一錢。

處方 配白朮、山藥、炙甘草、補脾和中。配建蓮肉、陳木瓜、

佩蘭、叶春砂、壳麩、脾開胃。配藿香、青蒿、佩葉、利水

藥等。治暑邪內蘊。

禁忌 能壅氣不宜多食。傷寒邪熾者勿用。

按扁豆味甘性平。能胃健脾。胃得治則清濁可分。

吐利可愈。凡夏月所生之物。能解暑者居多。故又

補骨脂 俗名破故紙 字音相同之故也

可以用清暑。花性相同。赤者入血分。而宣痰。白者入氣分。而行氣。凡花皆散。其用清暑散邪。以治反月泄痢等症。千金方用扁豆香薷煮服。治霍吐利。此用扁豆和脾香薷散表也。

產地 產於南方。

形態

茅竹類。莖高三四尺。叶似胡麻。夏秋間開淡黃紫花。結實圓扁。色黑。味辛。腥而有香氣。入藥用。

性味 味辛苦性溫。

藥物考二

本草綱目卷之九

選用 晒乾或鹽水炒。

功用 溫腎納氣。

用量 一錢至三錢。

處方 與溫補藥配伍。九斷續膏、參桂仲泉、夕利、聖苓等。

禁忌 陰虛有熱勿用。

按補骨脂一名破故紙。辛熱入腎。助火益腎陽。凡命門真

火不足以及五更泄瀉、遺精、滑泄等症皆可用此。又能治

喘。此其腎臟虛寒。真氣上逆也。張石頑曰。本品屬火。收

斂神明。能使心胞之火與命門之火相通。又胡桃屬木。

潤燥。養血屬陰。惡燥。故油以潤之。佐以補骨則更妙。

亦有與和營藥配伍

青城丸益精助陽壯脚力

補骨脂 杜仲 胡桃肉

鹿茸

藥物學二

故局方青城丸用之。孫思邈云補腎不若補脾。許
 學士言補脾不若補腎。氣虛弱則陽氣衰。若不
 能薰蒸脾胃。令人痞滿。少食。譬如釜底無火。雖終
 日不熟。陽衰則飲食亦不能濟。生二神丸治脾腎
 虛寒泄瀉。用補骨脂補腎。肉豆蔻補脾。加吳茱萸
 以平其肝。加木香以順氣也。若精濡溺與瀉痛者。
 去木香易五味。腰膝疼痛。腎冷精流者。用之屢驗。
 九陰虛有火。夢泄溺。血大便閉結者。勿施。以其辛
 熱香燥也。

二

督脈

產地

生山林中

四肢細長。多有四趾。中央二趾大而蹄。左右兩

鹿茸補陽

形態

趾小而懸於後。雄者頭上有叉狀角一對。年一增一枝。

麋茸補陰

雌者則否。毛褐色。有白星斑點。尾短。

膠能補血
霜能壯陽

性味

甘溫。

選用

初生嫩角。活取者良。

主治

(本經)主漏下。惡血。寒熱。驚癇。益氣強志。

近世

補督脈。益精氣。

用量

五分至二錢。

處方

古方有班龍丸。治諸虛病。用鹿合鹿角膠。陽起石。

肉蓯蓉、酸枣仁、柏子仁、黄芪、当归、附子、地黄、用酒和丸。鹿角酒以鹿角合山者置酒中七日後。開瓶飲之能治陽虛。

禁

忌

表實勿用。

按鹿茸乃初生之嫩角。長不過一二寸。色紫而嫩。取茸時連腦骨切下。然後斃鹿。取其全生氣而血不散也。大補腎臟精血。助元陽。通督脈。血肉之品。用補虛羸。似較他藥為勝。八味丸中加鹿茸五味子各十補丸為峻補命之專藥。其毛蒼黧而襍白色者為麋茸。其毛黃澤而無襍毛者為鹿茸。

截寸斷洗淨用烈火煮三日夜其角自酥而羔
生者查再煎則成鹿角膠也煎至角酥軟尚未
出膠取之為鹿角霜性味功用與鹿角相近但少
壯衰者不同然總不外乎血肉之品能溫補督脈補
益精血也精血不足而可用滋補則用膠若僅陽
虛而不受滋膩者則用霜麋茸及麋之茸與
鹿茸同類性味主治亦彷彿但鹿居山麋居
澤鹿屬陽麋陰屬鹿角至夏至逢陰而解麋
角至冬至逢陽而解一補陽一補陰雖皆
血液之屬性靈之品畧有區別耳

人胞 又名紫河車

形態

包於胎兒体外。粘貼於子宮之頂。上半頗厚。由無數小血管所構成。產科名曰胎盤。下為胎膜。脐帶連於于胎盤。胎兒由此攝取養料。而排泄廢物。故胎兒之有胞衣。猶成人之有肺胃。在腹中。日漸長大。全賴於此。

性味

甘鹹微温。

選用

入銀器而不變色者良。梳去血絲。漂淨血水。隔水炙火煆爛。如糜。後去滓。代蜜糊丸。補腎益氣血。虛癆服之最宜。

近世
藥學
二

用量 用一具。

處方 配氣血並補藥製成丸散服之最宜。

禁忌 形穢不潔之物非用必時希遠之。

河車大造丸

紫河車 黃柏 龜板 人參
杜仲 牛膝 麥冬 茯苓

按紫河車即胞胎。稟受精血結成。為胎之餘氣。得母

體之血氣居多。故能峻補營血。用以治骨蒸羸瘦。

喘嗽。虛勞之疾。是補之以味也。故有河車大造丸

之說。為世所推重。方中用生地黃。柏天冬。麥冬。龜

板。一派滋膩之品。終嫌太膩。呆胃。雖有一味人參。

恐反助羣陰之勢。服之。每致嘔泄。以河車丸用人

胞一具。山藥二兩。人參一兩。茯苓五錢。為丸。近世

蛤蚧

改用鮮者尤為得力。即虛人服之可無犯胃氣。

產地

生廣東山谷或大樹間及城牆處。

形態

身長六七寸。蜀中產不過五寸。首如蝦蟆。背綠色。有白点或鮮紅斑紋。其鱗如粟粒。雄者為蛤。皮粗。

口大身小尾^長雌者為蚧。皮細。口小身大尾小。

性味

鹹平。

選用

其功在尾。單取尾用。或研末吞。或独味煎飲。

功用

補肺納腎。定喘。為癆損虛脫之要药。

用量

一对。

處方

配蛤海阿膠參木麥冬石斛等可治久嗽虛咳
血氣急之危症亦有獨用蛤蚧尾一對能使虛損

危急時延壽數日

禁忌

此外感而喘嗽非其所宜

按蛤蚧雌雄相隨鳴聲互應雄者為蛤雌者蚧捕一

獲二至死不離其功在尾其性極靈見人往捕每

多自嚙斷其尾而葯力在尾不全者即無效也

張石頑曰人欲得首尾全者以兩股長長柄鉄义

一刺中腦一刺中尾若此則不致嚙斷矣然後破

腹以竹張開晒乾取用補肺納氣功同人參益氣

扶羸功同羊肉。一物二備。氣虛喘乏。確有神效。第
世但知附桂為補火之最。更不知附桂因何相需。
必用。詎知火衰氣寒而厥。則必用附子。火衰血寒。
則必用肉桂。火衰心氣偏墜。則必用葫蘆芭。火衰
氣逆不歸。則必用沉香。火衰風濕瘡癬。則必用蛇
床子。火衰截寒生虫。則必用川椒。火衰氣逆呃生。
則必用丁香。火衰精遺不攝。則必用益智。至於陽
不能通督脈。須用鹿茸以補之。水火不交。則用遠
志以通之。氣虛喘嗽。須用蛤蚧。禦之皆當隨症酌
與。不可概也。

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in vertical columns and is too light to transcribe accurately.

腦肭脐 即海狗腎

產地 海中

形態 体幹長頭圓眼大上唇堅剛有疏鬚四肢短後肢

向後方体紫褐色牡者長六七尺牝者長其半數

性味 味鹹性熱

選用 外腎入葯

功用 補腎助陽

用量 一錢半至三錢

處方 与大補氣血葯配伍

禁忌 陰虛之体勿用有表邪者忌之

按此物性升屬陽入腎經。又名海狗腎。為專助元陽

之品。今滋補葯中多用之。所謂精不足者。補之以

味也。此物晝伏水底。夜出捕食魚類之屬。頗易獲得。

故價甚昂貴。因之不易得真。昔又云。破癥瘕。治冷

氣。此亦陽氣壯則陰邪除。寒疝癥瘕等疾可愈。而

今之醫者。用作補品者。有之。用以除疾者。罕見。然

昔人用以治疾者。亦補真即所以祛邪之意也。

羊肉

產地

處均有。

形態

家畜類種類頗多。如山羊。胡羊。大尾羊等。孕

四月而生其目無神其性屬火。

性味

甘溫。

選用

肉入藥。

功用

補虛溫氣血。

用量

湯藥消用。入丸大約數量。

處方

與大補氣血藥配伍。

禁忌

胃氣厚者服之有碍消化。

按羊肉性味甘。入脾肺二經。為助陽補氣之品。昔有人參補氣羊肉補形之說。虎潛丸用以治脚痿。亦此義也。便讀云羊血能解一切竹毒。且可治產。

後血癢。羊肝古方有用以治目疾。此亦不適以肝入肝。何為引導。其實無甚功。

附凡中羊肉毒。羊肉毒者。可以甘竹煎湯飲解之。

胡桃

產地 河南陝西等省

形態 高二三丈。生複葉。夏初開花。淡黃色。秋結實。如青

核。熟後爛去皮肉取核用。

性味 甘溫。

選用 去壳。

功用 補腎潤血脉。

碎

用量

三錢至五錢。

處方

與補氣養血藥同用。

禁忌

陰虛火旺者勿用。

按胡桃屬火性溫為固補之品恒與補骨脂同用其

皮味瀟入補劑宜去皮入斂瀟藥宜留皮用然動

風痰不宜多食究之此物與銅錢同食即成碎粉

凡誤食銅物者多食自化胡桃搗爛取油滴耳中

能食耳疔。

骨碎補一名毛薑又名猴薑

產地

生石間。

藥物學二

形 態

莖細長，延繞於石上，或幹木密生，黑褐鱗色。春生復葉，夏日生多數子囊，有包衣壳，根扁長，畧似姜。

性 味

味善性温。

選 用

根入药，去毛细片。

功 用

補命門火，納腎氣。

處 方

与行氣補血药配伍。

禁 忌

火旺者勿用。

按本品苦能堅腎，温能血破，為傷科之要药。又高年

腎虧骨痛腰痠者，恒与補益同用。

此大病後骨痠不能步行，亦有用之以補其虛，所

謂勞者溫之也。便讀云能除風氣。此不足信。蓋本品性降不宜於表。症觀其名。則知補骨治折碎無疑矣。

香白芷
川芎
白芷
羌活
獨活
秦艽
桑寄生
杜仲
續斷
骨膠
鹿膠
虎骨
狗骨
熊骨
豹骨
蛇骨
鱉板
龜板
鱉板
龜板
鱉板
龜板

方
二

三

中國醫藥學

第七類 浮下寒積

巴豆

產地

生巴郡川谷。

形態

高一二丈。叶如櫻桃而厚大。初生青色。後漸黃赤。至十二月。叶漸凋。二月後漸生。四月舊叶落尽。新叶齊。叶色微黃。结实作房。生青熟黃。類白荳蔻。斬、脱落。乃收之。

已豆與大黃皆攻下之品。但大黃性寒。病多熱者宜之。已豆性熱。藏寒者宜之。

性

味

辛熱。

選

用

去壳。

主治

本經主傷寒温瘧。破癥瘕。結聚堅積。當飲痰癖。大

腹^瀉通閉塞利水谷道。

攻痲積瀉寒^熱邪

八分至錢半。

本品有毒湯劑不常用。

虛人勿用。
及孕婦

近世用
處方
禁忌

白散

巴豆桔梗川貝

按張石頑曰。巴豆辛熱。能蕩五藏六府。不特破癥瘕

結聚之堅。并可治傷寒濕熱^積瘧之寒熱。以張仲景

治寒實結胸。用白散。深得本經之旨。世本作溫瘧

此謬也。其性峻利。有破血排膿攻疾逐水之力。宜

隨証輕重而施。生用則峻功。熟用則溫利。去油用

霜則推陳致新。隨証之緩急而施。正反之治。峻用則有戡亂劫病之功。少用亦有撫綏調中之妙。可以通腸。可以止瀉。此發千古之秘也。一老人久病。瀉泄。遍服調脾升提止瀉諸藥。則瀉反甚。脈沉而滑。此脾胃久傷。冷積凝滯所致。法當以熱下之。則寒去利止。自後每用治泄痢積聚諸病。多有不瀉而病痊者。妙在得得宜耳。苟用不當。則犯損陰戒矣。按巴豆、大黃同為攻下之劑。但大黃性寒。府病多熱者宜之。巴豆性熱。藏病多寒者宜之。其壳燒灰存性。能止瀉利。亦劫病之效也。孕婦忌之。以力

蕪麻子

產地

山野

形態

一年生竹。莖高六七尺。中空。如竹。叶甚大。掌状深

能墮胎也。元素曰：巴豆乃斬關奪門之將，不可輕用。世以治酒病腸氣，以其辛熱能通腸胃，發熱耳。力甚耳。身替結，血通，血液隨亡，陰虧傷元，結胸小兒，疝積用之不死亦危。奈何庸人畏大黃不畏巴豆。以其辛熱劑小耳。試以少許輕擦皮膚，須臾起泡，况下腸胃能無薰灼潰爛之患乎。即有急证不得已而用之，壓去其油，取霜少許入药可也。

竹節草二

二

竹節草

裂有長柄。秋間開。單性花。為圓椎花序。雌花在上。色淡紅。雄花在下。色淡黃。熟則裂開。子有黑斑。中有白仁。

性味甘辛平。

選用 鹽湯煮半日。去皮。取子研末用。

製油法。取子搗爛。以水煮之。取其沫。俟沫尽。脫後去水。以沫熬之。至点灯不炸。滴水不散為度。

外科 拔毒緩下藥

三錢至六錢

配 松香 杏仁 霜 銀珠 廣丹 掃盆 茶油 先將煎

近世 應用 處方

麻子打爛，緩。加入他药打勻成膏，治一切癰疽。

未潰，拔頭已潰，提膿。暑節尤驗。又蓖麻子油配少。

許存局油、鴉片酒和勻，治肚痛。劇痛者服之可。

止。又蓖麻油、鷄子黃搗勻，再加溫水，由肛門射入。

治大便乾燥，效药力速，則加肥皂水少許更妙。配。

当归、赤芍、黃芩、銀花、白頭翁、陳皮、木香、黃連，治腸。

垢積之赤白痢。

禁忌
本品滑腸，勿輕服。又忌食炒豆，犯之必瘕。

按張石頑曰：蓖麻屬陰，其性善於追膿取毒，拔邪。

出為外科要药，能出有形之滯物，故取胎產胞。

衣不出者不有人用之時珍曰。蓖麻甘辛有熱毒氣味頗

近巴豆有滑瀉之功而利故下水氣其性善走能開通諸竅

經絡治偏風失音口噤目斜頭風諸病不祇

能出有形之物也蓋鷓鴣油能引藥氣入內蓖麻

油能拔病氣出外胡諸等身骨多用之偏風手足不舉

同羊脂身山甲麝香煎膏日摩漸止研墮療癰疽疔

毒癰腫功能引毒外出一人病手臂結塊腫

痛用蓖麻仁搗膏貼之即愈一人病鬱氣而偏頭

痛用此同乳香食鹽搗敷太陽其痛立止物產

後此藥外用屢奏奇功

但亦宜內服。事近及。子民曰：菴麻子者，原產于

印度，有下泄之效。其成但需為菴麻子油，最也。有劇

用法：毒加百度之溫水，則全無毒也。漢晉用本品也。先

以鹽湯煮半日，而去皮。則此亦可減少無毒。經驗與

理論相符合。可謂奇效。而菴麻子之功用，亦不為

弱矣。賀氏療學載菴麻子油之生理作用云：此油

何以有淨效。今內是知惟油類本有淨效也。再油

類中，此利之油，若服大分，多有能潔利大便

者。但菴麻油所含，有辣性，能激動大小腸之蠕動。

故更增其淨效。若攝其皮，亦不利。大體同此也。

若
瀉方由皮吸收也。乳婦服此油則其力由乳排泄。

每
故致嬰兒腹瀉。有普曾經實驗而知。此油用後

之公亦無用。只大作遲時間。接使胆曠。出胆液

而已。亦有普士証明。此由小腸顯感較顯。

腸為速。又云。此油為和緩之瀉劑。只有硫酸鎂與

之相同。惟硫酸鎂顯效較速。空腹服硫酸鎂其瀉

效。經半至一小時即顯。此油必經四五點鐘方顯。

若食腐爛果品。或壞敗之肉。或他其不潔之物。至患

腸胃炎。其係小生類。仍宜服此油。若誤吞硬物。必

櫻核致腸胃受刺激。此油有潤腸及保護粘膜炎之

功較硫酸鎂更佳。小兒腸內存積枯物，當服此油，使之瀉出。今由斯感念。西醫腸室扶斯之腸出血，穿孔性腹膜炎，何中醫不多見。彼中醫對於傷寒有曲突徙薪之妙。病在太陽，治即愈。于太陽病在陽明，治即愈。于陽明，彼西醫治療傷寒，最初無特效藥，惟利用其待期療法。故

且謂傷寒病之成因，起于傷寒桿菌。並謂菌喜宿于腸。此或從病之結果上剖驗而得。當此症潛伏時期，桿菌或散于周身，決不在腸。何以言之。西籍載此症潛伏期時，有頭痛、四肢痠痛、惡寒、發熱、戰慄等証象。此乃正與太陽証相似。麻黃桂枝其效如響。惟麻黃桂枝被菌也。病之所

以愈。或者周身桿菌因汗而排泄於外。西晉于潛伏期見大便
之閉者。輒以蓖麻之油下之。于是虛餒其腸。周身桿菌趁此攻
襲于下。誤下之後。致成壞病。亦無良好治法。於是遷延時日。因
聚于腸胃之桿菌漸滋長。遂成腸出血。腹膜炎之局。準由此
以觀。西晉所曰腸室扶斯實。即中醫之玉陽傷寒也。西晉對於腸室
血。實有性腹膜炎而究其有本。其所以能爲本。其所以能爲本

預防之法。在汗下之時。宜先服此藥。使腸室扶斯實。即中醫之玉陽傷寒也。

下者。惟所用之藥。爲硝黃枳朴。其力猛悍。發也日暴。其壞為結
胸。西晉之下藥。爲蓖麻油。發作性遲慢。病久不治。其壞為結

中故同一誤下而結果不同

菝麻之油可治耳聾甚效千金方有其治予

嘗親試之以菝麻油滴耳中以棉塞之數日而驗

又痢症初起用菝麻子油推蕩腸中垢滯實善于

硝黃枳朴之峻下蓋痢症腸膜上非生炎即潰瘍

硝黃枳朴刺激腸膜過其有惹起腹痛之弊菝麻

子油有潤腸及保護腸膜之功能既排泄垢滯腸

膜又無所傷故佳吾于此因悟及古人治痢多藥

如香連丸木香檳榔丸枳實導滯丸等所謂丸以

用丸如

緩之者是。近人治痢，然川軍油當歸亦深得此旨。

也。又曰：... 麻子形... 故... 小

... 故... 麻子... 輕粉

... 麻子... 輕粉

... 麻子... 輕粉

... 麻子... 輕粉

... 麻子... 輕粉

... 麻子... 輕粉

... 麻子... 輕粉

油... 銅錫盛油置油煮一日令細

服之經驗方 喉痺塞牙閉緊急不通用此即破
以蓖麻子仁研爛紙卷作為燒煙熏吸即通或只
用油煙尤妙又小便不通以蓖麻子仁三粒研細
入葶中即通又此州又可治針刺入肉用蓖麻子一粒去壳
先以布襯傷處頻看若見刺出即拔之恐葯緊怒
出好肉也

第八類 淡滲利水

車前子

產地 處、均有。

淋濁

小便濇而不利者為

淋濁不清清者為

濁淋症有五

石勞血氣膏

形態

叶卵形。柄長。夏日開花淡紫色。結小黑子。入葯。

性味

甘鹹微寒。

選用

古方用全苗。今則用子。水淘出泥沙。

主治

(本經)利水道。濕痺。

近世

分利濕熱。通淋。

用量

二錢至三錢。

處方

配 藿蘇梗 砂仁 赤猪苓 通竹 治 濕熱 水瀉 配 生地

癰閉

癰者夜不利旬者夜不通

禁忌

丹皮性梢木通淮山葯猪苓治淋濁管通

陽氣下陷勿服

按張石頑曰。車前入足太陽少陰。能利小便而不氣

走与茯苓功同。本經治癰閉止痛通腎氣小便利

則濕去。濕去則痺除。別錄治淋瀝。專取清熱利竅

之功也。時珍用以導小腸。止暑濕瀉。取分清降

濁之力耳。

猪苓

產地

深山野地

形態

寓木類內。黃色。表皮深褐色。成塊如猪矢。

藥物學

猪苓丸

疏泄开窍肥人湿
热伤气遗精便
溺满痛及疾思

猪苓半夏

性味甘平。

選用 去粗皮宜切生用。

主治 (本经) 利水道久服轻身耐劳。

近世应用 利湿。

用量 二钱至三钱。

处方 常与车前子泽泻通草苕仁等湿去药配伍。

禁忌 无湿者勿用恐其伤津也。

按猪苓得枫根之餘氣结成状如猪屎故名去湿清
热利小便是其專功性虽甘平久服必損津液故
不入補剂而本经又云久服耐劳是指素多湿热

者言不可一律而推。素體陰虛者尤宜遠之。普濟方用猪苓丸治肥人濕痰內阻等症。此其與半反同用。使濕滲痰化。自無留戀之患。

通竹

產地

生山中。

一名通脫木 形態

灌木類。高尺餘。葉如掌狀。分裂其柄長。開小花。有毛。與粉。莖質不堅。中有白髓。名曰通竹。輕白如紙。厚薄並勻。

性味

甘淡性寒。

選用

以潔白者佳。

主治 利陰竅。治五淋。除水腫。癰閉。溼肺。

近世 淡滲利濕。

用量 數分至一錢。

處方 配茯苓車前子福澤瀉懷牛膝治癰閉配黃苓六一

一散光杏仁生米仁治濕熱洩赤配路通芫蔚

子紫丹參炒川芎全當歸治經來腹痛。

禁忌 妊娠勿服以其通竅也。

通州湯

通州 葵子 茅根 王不留行

蒲黃 枳殼 瞿麥 滑石

甘草

按通州一名通脫木高丈餘中心白入心肺輕虛而

白味淡氣寒引熱下降能利小便且能通氣性味

与灯心同功用相似能治心肺上焦之熱淡滲下

通州膏

塞鼻

通州附子細辛

行通利水道。其通利之性。又能旁乃陽明。而下乳
汁。故東垣云。通州能滲肺。利小便。治五淋。水腫。癰
閉。取氣寒而降。味淡而升。証治準繩。治諸淋。用通
州湯。治鼻生息肉。不聞香臭。用通州膏。一取其導
濕熱下行。一取其入肺通氣也。

薏苡仁

產地

產真定者最佳。

形態

春生苗。莖高三四尺。叶如黍。開紅白花。五六月結
實。青白色。形如珠子。而稍長。九十月採其實。

性味

甘淡微寒。

選用

每一兩以糯米一兩同炒熟去糯米

主治

(本經)筋掣拘急不可屈伸久風濕痺下氣久服輕身益氣(別錄)除筋骨中風氣不仁利腸胃消水腫令人能食時珍健脾益胃補肺清熱去風勝濕

近世

益肺脾利水

用量

三錢至五六錢

處方

恒与利水药同用

禁忌

津不足者少用

按

薏苡仁甘淡性寒入肺胃及脾能清脾胃濕祛肺熱及虛勞咳嗽肺痿肺癰皆宜用為下引故本經治

久風濕痺拘急不可屈伸之病。蓋治筋必取陽明，
治濕必扶土氣。經云：治痿獨取陽明。又曰：肺主
焦。發為痿。臂蓋肺者相傳之官，治節出焉。陽明濕
熱上蒸於肺，則肺熱叶焦，氣無所主而失其治節。
故痿躄其功專於利水濕去，則肺胃健而筋骨利。
痺愈則拘攣退而脚膝安矣。然痺濕須分寒熱。蓋
寒則筋急，熱則筋緩。大筋受熱弛張，縱小筋縮而
攣急不伸，故宜用此。若因寒筋急而痛者，不可用
也。又能健脾益胃，惟不以山藥之補清熱利濕是
所仁所長。故上則肺癆，中則腫滿黃疸，皆可治也。

土茯苓即仙遺糧

產地 蜀山

形態

蔓竹類。莖有細點。其叶頗類竹叶。而質厚滑。長五六寸。根狀如菝葜。連綴而生。大如鸡卵。其肉軟。可生啖。有赤白二種。

性味 甘淡而平

選用 白者佳

主治

時珍健脾胃。強筋骨。去風濕。利關節。止泄瀉。治拘
挛骨痛。惡瘡。疔腫。銀硃毒。

近世應用

為梅毒惡瘡之要藥。

用處方量

二錢至四錢

配大黃生甘州粉丹皮金銀花治梅毒之重者配
忍冬藤絡石藤川桂枝治毒入經絡凶節疼痛配
澤瀉赤茯苓牛膝車前子木通治毒蘊下焦而成
淋濁

禁忌

淡滲以傷陰為無濕毒而肝腎虧者勿用

按陶洪景注石部禹餘糧云南中平澤有一種藤生

如菝葜根作塊如薯蕷亦名禹餘糧言昔禹行山
乏食採此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說
即今土茯苓也故今尚有仙遺糧冷飯團之名亦

其遺意。藏器名州。禹糧生海畔。山谷根。瓊連。半生
土上。皮如茯苓。人取以當食。不飢。其味甘淡。性
平。入胃。與肝腎。清濕熱。利關節。止拘攣。除骨痛。主
楊梅瘡。鮮。輕粉。毒。時珍云。楊梅瘡起于嶺南。風土
炎熱。嵐瘴。薰蒸。挾濕穢。濕熱之邪。發為此瘡。今則
徧全國。類有數種。治之則一。症屬厥陰。陽明。少兼
少陰者。則見咽痛。兼太陽者。則見頭角痛。若用輕
粉。施治。則流弊無窮。使毒氣入經絡。筋骨。久則
肢體疼痛。手足拘攣。發為結毒。遂成癩疾。惟用土
茯苓。配清熱解毒等品。並以土茯苓代茶。服數十

劑亦能漸瘥。蓋此疾始由毒氣蘊於陽明而發。若用輕粉燥烈之性。久則水衰肝火益旺。脾胃受制。蓋脾為中土。而主肌肉。濕熱鬱蓄于肌腠。故發為瘡瘍。發為癰腫。甚則拘攣。肉經所謂濕氣害人皮肉筋骨也。是土茯苓能去脾濕。去則營衛從而筋脈柔。毒解則氣血和。拘攣瘡瘍愈矣。初病服之不效者。火盛而濕毒未薈。此藥長于去濕。不能去熱。病久則衰。熱氣耗而濕鬱者居多數也。故究其所以能治是病者。亦不過甘能解毒。淡可分消。又能益脾胃。使土旺濕除。肌肉自愈之意。非概一切治外

科也。又外科發揮云。服輕於傷脾胃氣血筋骨疼
痛。久而潰爛成癩。連年累月。至于終身。可用土茯
苓數兩。再加苓連。氣虛加四君子湯。血虛加四物
湯。水煎代茶。月餘即安。由此可知土茯苓為楊梅
瘡之要藥。惟須常服耳。

茯苓 附赤苓 茯神 茯苓皮

產地

以雲南產者為第一。四川者次之。雲南產者謂雲
茯苓。簡稱曰雲苓。自古推為上品。今浙江有植之
為業者。方劑上曰浙苓。無論雲產浙產均可簡稱
曰白茯苓。

形態

生松林中。成塊。大如拳。皮黑而皺。肉白微赤。或云松脂變成。或云假松氣而生。抱根而質鬆者。名茯神。日本丹波葯學博士謂係松樹之病理的變化而生。其厚層微菌。生樹根之木部。與皮部。而外皮部漸次脫離。木部則增生其週圍。遂變為與木部同一之物質。茯苓之赤色者。名赤苓。

性味

甘淡性平。

選用

採取後陰乾。切片連皮者曰連皮苓。

主治

本經胸脇逆氣。憂恚驚邪。恐心下結痛。寒熱煩滿。咳逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。

近世
應用

用
量

處
方

淡滲利竅通小便便凡水腫淋瀝均可用之以其專
主分消之職能導膀胱而利水也。

三錢至四五錢

本品應用頗廣與苡仁相埒傷寒方用之亦多茲

將普通之編入(一)配猪苓澤瀉滑石通牛車前

子等為利水利(二)配党參白朮甘草為補益劑

(三)配苡仁厚朴砂仁陳皮半夏為健脾劑(四)

配半夏枳殼蘇梗為化痰降氣劑

若滑精小便不禁非由水濕所致者忌之恐其走

洩正氣耳。

禁
忌

小便頻數而少宜茯苓琥珀湯
利之者宜著黃蓮肉
益智仁之屬以收之熱入心水道
溢而不利者宜五苓散加每
黃柏不過若小便澀滯補之益
甚 膀胱熱結宜赤茯苓黑
山梔生甘草滑石竹叶之屬

茯苓琥珀湯

茯苓 琥珀 白朮 甘草

澤瀉 滑石 猪苓 桂心

按黃宮绣曰茯苓色白入肺味甘入脾味淡滲濕故

書皆載上勝肺脾之濕下伐肝本之邪其功先升

後降凡氣逆煩滿心下結痛呃逆嘔吐口苦口乾

水腫淋瀝驚悸及小便澀或短服此皆能有效故

本經主胸脇逆氣以其降泄也夏應驚悸心下結

痛以其上心肺心下結痛用之以通心氣也寒熱

煩滿欬逆口焦口乾利小便用以導熱也並去則

津液流通即所以并燥也其性平和四君子湯用

之以佐參朮而參朮之濕入六味則使澤瀉以行

腎家之邪之餘也其功長於利水去濕書曰脾健

卷之三

茯苓桂枝白朮湯

茯苓 甘朮 甘草

茯苓 甘草湯

茯苓 桂朮 姜

茯苓 四逆湯

茯苓 桂朮 姜附

茯苓 桂枝 甘草 芍藥湯

茯苓 桂枝 芍藥

茯苓 飲

茯苓 人參 白朮 枳實 橘皮

者。即謂其有去水之功也。又曰。定魂。即水去而魂自安之意。水濕去則膀胱氣化復常。則小便自利。亦何患癃閉之不霍然耶。水去則濕消。濕消則安。有小便短赤之理乎。故去水則胸膈自安。寬而結痛煩滿不作。則津液自生。而口苦舌乾悉去。傷寒金匱方。茯苓桂枝白朮甘草湯。治傷寒。若吐若下。後心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動。經身為振。搖及心。下有痰飲。胸脇支滿。茯苓甘草湯。治傷寒。太陽症。汗出不渴。或厥而心下悸。或欬而遺溺。或小便不利。茯苓四逆湯。治傷寒太

奔豚

少腹起塊自下而上者也

茯神散

(治勞血風驚氣)

茯神 羚羊 防風 川獨活 人參

赤芍 天冬 郁李仁 地黃 枳壳

柴胡

石羔 甘州 桃仁

茯苓 兩 胃散

茯苓 甘草 枳壳

茯苓 厚朴 陽

茯苓 半夏 夏州

茯苓湯

茯苓 半夏 陳皮 枳實

附 茯神

甘州 桔梗

生薑

陽症厥而心下悸。汗下後煩躁者。茯苓桂枝甘州

大棗湯。治太陽症發汗後脐下悸。欲作奔豚者。外

台秘要方。茯苓飲。治胸有停痰。痰宿水。吐出後心

虛心滿。不能食。沈氏尊生書方。茯苓用胃飲散。治

胃氣鬱滯。飲食不進。証治準繩。茯苓厚朴湯。治傷

寒。風夾疾。嘔逆。及吐瀉後喉涎。牽響脾胃氣虛。飲

食減少。濟生。茯苓湯。治支飲。茯苓之功用。可言廣

矣。以茯苓為主。藥之劑。亦不勝枚舉。茲不多贅。恐

過詳。不易悉記也。

茯苓之抱根者。為茯神。味甘性平。近世多用作安

益心神之要藥。如驚悸健忘失眠神經衰弱每多
用之。用量亦不過三錢。

按黃宮璣曰。茯苓神功。與茯苓無異。但茯苓抱心以生。
故用以安心神最宜。

附赤苓 苓之赤色者名赤苓。相傳茯苓色白。入肺與膀

胱。赤苓入心與小腸。白者有微補。赤者深滋也。

附赤苓皮 茯苓之連皮者。治皮膚水腫。以皮行皮之義。

編者按。茯苓利水之效用。卓著。即不連皮用。亦未

必無效。

冬瓜

產地

處：均有。

形態

菜類。春暮生苗。引蔓。葉大莖葉皆有毛。夏開黃色花。結實大者徑尺長。二三尺。瓜皮堅厚。上浮白霜。子皮均入藥。

性味

甘微寒。

選用

晒乾用。

功用

子治癰腸去頑疾。皮治折傷損痛。

陰乾研末可作面脂。

用量

三錢至五錢。

禁忌

小品力薄。難勝重症。

按冬瓜能通大小腸利二便溼並治消渴。

子除痰止腸瘕其皮近世用於皮膚病亦以皮行皮之意。凡葺中所用瓜子皆冬瓜子也。

澤瀉湯

澤瀉白朮

澤瀉

五苓散

葶冬栝蒌白朮

澤瀉桂枝

產地

產地沼濕田。

形態

独莖而長。葉如葱姑。而夏日葉間抽花莖。開白色花三瓣。地下有球莖。

性味

甘鹹寒。

選用

大而堅者佳。切片用。產建州者良。

主治

(本經)主風寒濕痺乳難。

相火

对於火而言蓋

念与慾所發動之

先益少房肝

慾生房腎督

發之於胃寄

之於肝

六味地黃丸

熟地 山芋

山藥 丹皮

茯苓 澤瀉

功用

瀉腎利水

用量

二錢至三錢

處方

配車前滑石米仁等淡滲去濕配黃芩木通等瀉

相火

禁忌

虛而無火者忌之

按澤瀉甘淡寒鹹功能導下焦水濕垢濁且能瀉血

液中廢物故六味地黃湯中与丹皮並用金匱治

支飲冒眩用澤瀉湯以逐心下痰氣也治水蓄煩

渴水便不利用五苓散以泄邪熱也其功長於行

水本經主風寒濕痺言風寒濕邪痺着不去則為

藥物學

四六

中國醫學史

灯芯

產地 生水用

形態

莖圓而細長。高三四尺。夏日莖之上部。開黃褐色

細花。色綠中白。

性味 甘寒。

選用 去皮有芒。殊少。兼安心神。

腫脹為極。閉用此。疏利水道。則諸自除。蓋邪乘空。竅則為死。難澤。汚性。步利竅。利則邪退。自通。內無蒸鬱。而正氣能安。故補腎藥中。每相兼有之。此非澤深。有補性也。學者當注意。

功用 清心利水。

用量 五分至八分。

處方 与利水清热药配伍。

禁忌 小品不勝重症。

按灯芯輕虛甘淡清心肺煩熱導小腸濕熱燒灰能

治喉癰塗婦人乳上飼小兒夜啼和以輕粉麝香

治陰疳珠砂拌又能鎮心寧神如邪熱盛者又可

用青黛。