

069278

云南中医学院
藏书之章
图书馆

訂唐王燾先生外臺秘要方第三十三卷目錄

婦人上
十七門

求子法及方一十二首

久無子方五首

養胎法并禁忌一十三首

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

妊娠嘔吐及惡食方九首

妊娠胎動方九首

動胎腰腹痛方三首

頓仆胎動方四首

胎數傷及不長方三首

妊娠傷寒方四首

妊娠患瘡方二首

妊娠下痢方四首

妊娠心痛方八首

妊娠腹痛方三首

妊娠漏胞方五首

妊娠下血及尿血方七首

妊娠小便不通利方五首

妊娠子淋方五首

妊娠大小便不利方五首

尚論
八經堂
作九

妊娠子癩方二首

妊娠水氣方三首

損娠方六首

數墮胎方四首

妊娠得病欲去子方三首

落胎去胎方四首

產乳序論三首

年立成法一首

十二月立成法一首
并圖

推日遊法一首
并圖

體玄子爲產婦借地法一首

日曆法二首

安置產婦法二首

產難方二十四首

逆產方一十二首

橫產方四首

子死腹中欲令出方一十五首

胞衣不出方二十首

唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

求子法及方一十二首

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎姪生產
崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言
婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮溢百想
經心內傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝
中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五藏虛實交錯惡肉

內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合
陰陽或行步風來便利於懸厠之上風從下入便成十二
痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱
爲患者故與丈夫同也唯懷胎妊孕而挾病者避其毒藥
耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女
人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂
患染著堅牢情不自抑所以爲病根深療之難差故養生
之家特須教子女學此三卷婦人方令其精曉卽於倉卒
之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人
性命之長務若不通明於此則何以免其夭橫者哉故傳

母之徒亦不可不學當宜繕寫一本懷挾隨身以防不意也

又論曰人之性情皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德

外學秘要
合并本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相剋及與刑煞衝破并在子休廢死墓中生者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣禁忌法

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此特受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘂聾聵頑愚癡狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圍廁之側塚

墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人
降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞
競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母
性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國
滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日爲男仍遇男
宿在貴宿日又以夜半後生氣時瀉精者有子皆男必壽
而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日寫精者有子
皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十一日二十七

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十

二日二十八日

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五
日十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日
六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日
二十七日二十八日二十九日

七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日
二十六日二十七日二十九日

八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十
三日二十四日二十五日二十六日

九月三日六日十一日十六日十九日二十日二十一日
二十二日二十四日

十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十
日二十二日二十九日

十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日
十九日二十六日二十九日

十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日
二十四日二十七日

若春合甲寅乙卯 夏合丙午丁巳 秋合庚申辛酉

冬合壬子癸亥

與上件月宿日合者尤佳

出第二卷中

千金翼論曰夫求子者服藥須有次第不得不知其次第

開機釋
出第以

下十四

字疑當

大書

謂男服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸

無不得効矣不知此者得力鮮焉其七子散盪胞湯紫石

門冬丸

出第五卷中在次下千金并翼方中

廣濟療無子令子宮內灸丸方

麝香 二分

皂莢

十分塗酥炙
削去黑皮子

蜀椒

六分
汗

玄三味搗篩蜜丸酸棗人大以綿裹內產宮中留少許

線出覺憎寒不淨下多卽抽綿線出却丸藥一日一度

換之無問晝夜皆內無所忌

又方

蛇牀子

石鹽

細辛

乾薑

土瓜根 各四兩

右五味搗散取如棗核大以綿裹內子宮中以指進之

依前法中間病未可必不得近丈夫餘無所忌 莖出第三卷中

又療婦人百病斷絕緣產白薇丸方

白薇

細辛

厚朴 炙

椒 汗

桔梗

鼈甲 炙各五分

防風

大黃

附子 炮

石硫黃 各六分研 牡蒙 二分

人參

桑上寄生 各四分

半夏 洗

白殭蚕

續斷

秦艽

紫苑

杜仲

牛七

蜜蟲 去翅足蒸

水蛭 各二分

紫石英 研

朴消

桂心

鍾乳

當歸

各八分

右二十七味搗篩蜜丸空腹溫酒服如梧桐子十五丸

日二漸加至三十丸不吐不利忌生冷油膩傷生血物

人莧生葱生菜豬肉冷水粘食陳臭

出第二卷中

千金七子散療丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子

牡荊子

菟絲子

車前子

乾地黄

薯蕷

石斛

杜仲

鹿茸

炙

遠志

去心

新葶子

各八分

附子

炮

蛇牀子

芎藭

各六分

山茱萸

天雄

炮

黃耆

人參

茯苓

牛膝

各五分

小

三十三

六

桂心 十分

巴戟天 十二分

茯苓 七分

鍾乳 三分

右二十四味搗篩爲散酒服方寸匕日二服不知增至
二匕以知爲度忌生冷酢滑豬雞魚蒜油膩不能酒者
蜜和丸服亦佳行房法一依素女經女人月信斷一日
爲男二日爲女三日爲男四日爲女已外無子仍每日
午時前半夜後陽時爲男下精欲得去玉門入半寸不
爾過了子宮一方加覆盆子八分忌蕪荑生葱

經心錄并

異同

右朴消溫澀胞湯療婦人立身已來全不生及斷緒久不產

三十年者方

同德按
千金朴

消以下

五味各

三銖無

細辛厚

朴以下

九味各

二銖重

蟲水蛭

各十枚

附子六

銖水五

升

又按人
千金作

朴消

牡丹

當歸

大黃

桃人

去皮尖生
用合三兩

細辛

厚朴

桔梗

芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮

蜚蠊

水蛭

炙各六
十枚

附子

一兩
半炮

右十八味切以清酒五升水六升合煮取三升分四服
日三夜一每服相去三辰少時更服如常覆被取少汗
汗不出冬日著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁
本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月
水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱人困不

堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿
 一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡
 大好一日後仍著導藥翼方無桔梗甘草
並出第二卷中
 千金翼坐導藥方

皂莢

一兩炙去皮子

大黃

戎鹽

礬石

燒

當歸

各二兩

五味子

乾薑

各三兩

細辛

三兩

蜀椒

汗二兩

葶藶子

苦瓠

各三分千金作山茱萸

右十一味擣篩內輕絹袋子如中指許大長三寸盛之

令滿內子門中坐任意勿行走急小便時即出之仍易

新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若

尚德按
 千金翼
 大黃礬
 石蜀椒
 各半兩
 當歸一
 兩五味
 子乾薑
 細辛各
 二兩無
 戎鹽

尚德按
千金翼
紫蘆以
下除烏
頭儻十
一味各
二兩桑
寄生以
下八味
各半分

未見病出亦可至十日安之千金無葶藶一方又有石
霜三分廣濟同著藥後一日乃服紫石門冬丸其方如

左

紫石英

七日研之

天門冬

各三兩去心

紫葳

甘草

炙

桂心

牡荊子

千金作牡蒙

烏頭

炮

乾地黄

辛夷人

石斛

卷栢

禹餘糧

當歸

芎藭

各三兩

烏賊魚骨

牛膝

薯蕷

各六分

桑寄生

人參

牡丹皮

乾薑

厚朴

炙

續斷

食茱萸

細辛

各五分

柏子人

一兩

右二十六味搗篩蜜和酒服十九如梧桐子日三稍加
至三十九丸慎如藥法 經心錄同并出第五卷中

延年療婦人子藏偏僻冷結無子坐藥方

蛇牀子 三兩 芫花 三兩

右二味搗篩取棗大紗袋盛內產門中令沒指袋少長
便時須去任意臥著慎風冷 出第四卷中

久無子方五首

廣濟療久無子白薇丸方

白薇

牡蒙

藁本

各五分

當歸

乾地黃 各七 芫薺

人參

柏子人

石斛

桂心

附子炮

五味子

防風

吳茱萸

甘草炙

牛膝

桑寄生

各六分

薑黃

七分

禹餘糧

八分

秦椒

二分汗

右二十味搗篩蜜丸如梧桐子空腹酒下二十九丸加至

三十九日再服不利忌生葱生菜熱麩蕎麥猪肉葵菜

蕪荑菘菜海藻粘食陳臭物等

又療久無子斷緒少腹冷疼氣不調地黃湯方

乾地黃

牛膝

當歸

各八兩

芎藭

卷柏

防風

各六分

桂心

牽牛子末

各三分

右八味切以水六升煮取二升三合去滓分三服服別

和一分牽牛子未服如人行四五里更進一服以快利

止忌熱麪蕎麥炙肉生葱蕪蕘蒜粘食等物出第三卷中

千金療月水不利關塞絕產十八年服此藥二十八日有

子金城太守白薇丸方

白薇細辛各五分人參杜蘅

厚朴炙牡蒙半夏洗白殭蚕

秦艽當歸紫苑各三分牛膝

沙參乾薑各三分蜀椒汗附子炮

防風各六分古今錄驗不用杜蘅用牡蠣三分熬

台十七味末之蜜和丸先食服如梧桐子三丸不知稍

尚德按
關千金
作閉

又按千
金秦艽
牛膝沙
參乾薑
各半兩

增至四五丸此藥不可將服覺有身則止用大驗忌餽
猪羊肉冷水生葱生菜

崔氏延年同有桔梗并參各三

分出第二卷中

千金翼白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療之

方

白薇

車前子

各三分

當歸

芎藭

蛇牀子

各四分

紫石英

菴藟子

石膏

藁本

卷柏

各五分

澤蘭

太一禹餘糧

覆盆子

桃人

熬

白芷

麥門冬

去心

人參

各六分

桂心

蒲黃

各十分

細辛

細辛赤
石脂橘
皮各一
兩半

乾薑

乾地黄

椒汗各十
二分

茯苓

赤石脂

遠志去心

白龍骨各八
分

橘皮二分

右二十八味搗篩爲末蜜和酒服十五丸如梧桐子日
再增至四十丸以知爲度亦可至五十丸慎猪雞魚蒜
生冷酢滑生葱生菜蕪荑驢馬等肉覺有身則止藥秘
之勿妄傳也出第五卷中

經心錄茱萸丸療婦人陰寒十年無子方

吳茱萸

一升

蜀椒

一升去
目汗末

右二味蜜丸如彈子丸綿裹導子腸中日再易無所下

且開子轍令陰溫卽有子也

出第六卷中

養胎法并禁忌一十三首

千金論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠
三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德
大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書占
今箴誠居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心
神和性情節嗜慾庶事清靜生子皆良長壽忠孝仁義聰
慧無疾斯蓋文王胎教者也

尚德按
靜千金
作淨

又論曰兒在胎日月未滿陰陽未備府藏骨節皆未成足
故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

又妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

尚德按
歸千金
作贈

又姪娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

又姪娠食雀肉并豆醬令子滿面斑黯黑子

又姪娠食山羊肉令子多病

又姪娠食兔犬肉令子無音聲并缺脣

又姪娠食驢馬肉延月

又姪娠食樵并鴨子令子倒出心寒

又姪娠食騾肉難產

又姪娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞耻

又姪娠勿向非常之地大小便必半產殺人

又在辰勿食羊肝令子多厄

又妊娠勿食鼈令兒短項

又妊娠食冰漿絕產

並出第二卷中

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

千金妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂才正

又妊娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不爲力事寢必安靜無令恐懼

又妊娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞一隻

治如食法

茯苓

二兩

吳茱萸

一升

芍藥

白朮

各三兩

麥門冬

五合去心

人參

三兩

阿膠

二兩

甘草

一兩炙

生薑

一兩切

右十味切以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煮

取三升內酒三升并膠烱盡取三升去滓溫服一升日

三服

又若曾傷一月胎者當預服補胎湯方

細辛

一兩

防風

二兩

烏梅

一升

吳茱萸

五合

乾地黄

白朮

各一兩

大麥

五合

生薑

四兩

兩德按
千金乾
也黃白

多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加栝樓
二兩若有所思去大麥加柏子人三合忌生菜蕪荑桃
李雀肉等物一方人參一兩

又娠二月名始膏無食辛燥居必靜處男子勿勞百節
皆痛是謂胎始結

又娠二月少陽脉養不可鍼灸其經足少陽內屬於
心三月二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動

又娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱卽萎卒中
風寒有汗動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒
乍熱艾湯主之方

艾葉二
丹參二
阿膠各
三兩三
生薑六兩

丹參 三兩

當歸

人參

麻黃 去節

艾葉

阿膠

炙各二兩

甘草

炙一兩

大棗

十二枚擘

生薑

一兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎

取三升分溫三服忌海藻菘菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生地黃

五兩

生薑

三兩

右五味切以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每

街德按
富歸上
千金有
用字
尚德按
增千金
非胞

直用水耳忌猪肉冷水蕪蕪一方當歸半兩

又姪娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生
男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子
賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

又姪娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主內屬於
心無悲哀無思慮驚動

又姪娠三月爲定形有寒大便青有熱小便難不赤卽黃
卒驚恐憂愁嗔恚喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛腰背
痛卒有所下雄雞湯方

雄雞

一隻治
如食法 甘草

人參

茯苓

命德按 十金用 水一斗 三升減 半下有 出龜二 字一方 以下十 四字大 書當歸 半有用 字 尙德按 千金大

阿膠 各二兩

黃芩

白朮 各一兩

麥門冬 去心五合

芍藥 四兩

太棗 十二枚擘

生薑 一兩切

右十一味切以水一斗五升煮雞減半內藥煮取半內

清酒三升并膠再煎取三

一日盡之當溫臥

忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等 一方當歸芍藥二兩不用黃芩生薑

又若曾傷三月胎者當預服茯神湯方

茯神

丹參

龍骨 各一兩

阿膠

當歸

甘草 炙

人參 各二兩

赤小豆 二十粒

大棗 十二枚擘

腰痛者加桑寄生二兩忌海藻菘菜

深師有薤白二兩
麻子一升

又姙娠四月始受水精以成血脉宜食稻粳羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡

又姙娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

又姙娠四月爲離經有寒心下溫溫欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷心煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花

如雞子
大一枚

麥門冬

去心
一升

麻黃

三兩
去節

阿膠

三兩
炙

角德按
千金半
夏四兩

角德按
千金半
李根白
皮柴胡

甘草 二兩 炙

當歸 二兩

人參 一兩 半

生薑 五兩

半夏 二兩 洗

大棗 十二枚 擘

右十味以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日忌羊肉海藻菘菜餈等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥 四兩

甘草 炙

芫花

續斷 各一兩

生李根白皮柴胡

白朮 各三兩

烏梅 一升

當歸 一兩 半

生薑 四兩

厚朴 炙

枳實 各二兩 炙

日復服一劑一方半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉等物

又娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五藏

又娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

又娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛

尚德按
又方疑
當作又
名
又按千
金與菜
黃七合
旋覆花
二合無
以清酒
三升五
字及再
字

悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方

又方旋覆花湯

阿膠 四兩

人參 一兩

麥門冬

一升 生薑

六兩

吳茱萸

旋覆花

當歸

芍藥

甘草 炙

黃芩 各二兩

右十味切以清酒三升以水九升煮減半內清酒三升

并膠微火煎取三升半分四服日三服夜一先食再服

便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

茸草 炙

芍藥 各三兩

當歸

人參

大麻人

合五

生薑

六兩

大棗

三十五枚擘

黃芩

一兩

右十二味切以水七升清酒五升煮取三升半分四服
日三夜一七日復服一劑忌菘菜海藻燕荑

又妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊
於野數觀走犬馬食宜鷲鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋
以養其力以堅背脊

又妊娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明內屬於
胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大
飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫

驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥冬湯方

麥門冬去心 甘草炙 人參各一兩 乾地黄二兩

黃芩二兩 河膠四兩 生薑六兩 大棗十五枚

右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三

升分三服每服如人行三四里中間進糜粥忌海藻菘

菜蕪蕘

又若曾傷六月胎當預服柴胡湯方

柴胡四兩 芍藥一方作紫葳 白朮 甘草各二兩

麥門冬三兩 茯苓一兩 芎藭二兩 乾地黄五兩

生薑六兩 大棗三十枚

右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間
進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻

菘菜蕪荑桃李雀肉等

一方有黃
芩二兩

又妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作
屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻以
密腠理是謂養骨而堅齒

又妊娠七月手太陰脉養不可鍼灸其經手太陰內屬於
肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄
衣無洗浴無寒飲

又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若

傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方

葱白

長三四寸
十四枚

半夏

洗

麥門冬

去心各
一升

生薑

八兩

甘草

炙

當歸

黃耆

各三
兩

阿膠

四兩

人參

一兩
半

黃芩

兩

旋復花

一把

右十一味切以水八升煮減半內清酒三升并膠煎取

四升温服一升日三夜一温臥當汗出若不出者加麻

黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉錫海藻

菘菜等

又若曾傷七月胎者當預服杏人湯方

杏人

去双人

甘草

炙

鍾乳

研各
二兩

麥門冬

去心

乾薑

三兩

冬

共

各一升

五味子

三合

吳茱萸

各一兩

乾薑

二兩

五味子

粳米

各五合

紫苑 一兩

右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一中

間進食七日服一劑忌海藻菘菜

又妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是

謂密腠理光澤顏色

又妊娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明內屬於

大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒

失食無忍大起

又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動

不安當苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或

黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫芍藥湯方

芍藥 四分

人參

當歸

甘草 炙各二兩

白朮 一兩

厚朴 二兩 炙

薤白 切一升

生薑 四兩 切

右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再

夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等

又若曾傷八月胎者當預服葵子湯方

葶草 炙三兩

芍藥 二兩 方四兩

柴胡 三兩

葵子 一升

白朮 三兩

生薑 六兩

大棗 二十枚 擘

厚朴 二兩

右八味切以水九升煮取三升分三服日三十日服一

尚德按 千金花 疑當 眩作藥 四兩白 水三兩

尚德按 千金并 草二兩 葵子二

劑忌海藻菘菜桃李雀肉等

又妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲

醲食其緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力

又妊娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰內屬於

腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷無著灸

衣

又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉

側短氣半夏湯方

半夏洗

麥門冬去心各五合

乾薑一兩

當歸

吳茱萸

阿膠炙各三兩

大棗十二枚擘

商德按千金醲作醴多作致

尚德按

千金術

字下有

心字半

夏三兩

麥門冬

當歸吳

茱萸阿

右七味切以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火
上温分四服痢即止忌生血物飴等

又若曾傷九月胎者當預服猪腎湯方

猪腎 一具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黄

芍藥

各三兩

白朮 四兩

麥門冬

一升
去心

附子

中者一枚炮

大豆

三合

右十味切以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升
半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃
李雀肉酢物等

又妊娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使

關節人神皆備但俟時而生

集驗延年同此出第二卷中

小品療妊娠五月日舉動驚愕動胎不安下在小腹痛引

腰脇

公洛切腋下也

小便疼下血安胎當歸湯方

當歸

阿膠

炙

芩薊

人參

各一兩

大棗

十二枚擘

艾

一虎口

右六味切以酒水各三升合煮取三升去滓內膠令烱

分三服腹中當小便緩差也

古今錄驗救急同出第七卷中

妊娠嘔吐及惡食方九首

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食湯方

青竹筍

橘皮

各五兩

生薑

茯苓

各四兩

半夏

五兩
湯洗

右五味切以水六升煮取二升干分三服不差頻作忌

羊肉餵酢物等

千金經心錄同

又療妊娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮

竹筍

人參

白朮

各三兩

生薑

四兩

厚朴

各二兩

右六味切以水七升煮取二升半分三服不差重作忌

桃李雀內等

十金救急經心錄同出第十一卷中

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯方

甘草

柴胡

麻黃

各二兩
去節

大棗

十二枚

食茱萸 一升

右五味切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三療
食噫醋除熱下氣多所宜與上同但春秋冬夏去茱萸
加枸杞一斤六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加
甘草一兩九月去麻黃加乾薑一兩十月加芎藭二分
忌海藻菘菜

又療惡食人參湯方

人參 四兩

厚朴 炙

生薑

枳實 炙

甘草

炙各
二兩

右五味切以水六升煮取三升分三服忌海藻菘菜 並

崔氏半夏茯苓湯療妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞
食氣頭眩重四肢百節疼煩沈重多臥少起惡寒汗出疲
極黃瘦方

半夏

洗

生薑

各五兩

旋復花

一兩

橘皮

二兩

茯苓

二兩

細辛

芎藭

人參

桔梗

甘草

炙各二兩

芍藥

一兩

乾地黄

三兩

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌猪羊肉餒

菘菜海藻生菜蕪荳

千金云若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客

此當下
孫一字
蓋是前
條方後
所引
又按開
千金作

熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩若
冷下痢者除乾地黃用桂心二兩若食少胃中虛生熱
便悶塞小便赤少者加大黃三兩除地黃加黃芩一兩餘
依方服一劑得下後消息看氣力令熱更增損方調定
服一劑湯便急服茯苓丸今能食強健也

又茯苓丸療妊娠阻病患心卒煩頭眩重憎聞飲食氣
便嘔逆吐悶顛倒四肢垂重不言勝持服之即効要先服
半夏茯苓湯兩劑後可將服茯苓丸方

茯苓

人參

各一兩

桂心

熬

橘皮

白朮

甘草

炙

葛根

熬

訶藟

半夏 洗

枳實 多各 二系

右十味搗篩蜜和丸如棗子大飲服二十九漸至三

十九日三忌海藻菘菜羊肉錫桃李雀肉酢等 千金同

肘後只五味又云妊娠忌桂故熬
肘後不用乾薑半夏麩皮葛根

又療妊娠常苦煩悶此子煩也竹瀝湯方

竹瀝 三兩

防風

黃芩

麥門冬 去心 三兩

茯苓 四兩

右五味切以水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差

重作忌酢物

又方 時時服竹瀝隨多少 出第十卷中

尚德按
千金注
橘皮下
有白米

逐効療娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐方

青竹筴

麥門冬

去心各三兩

前胡

二兩

陳橘皮

一兩炙令黃焦香氣出佳

蘆根

一握取肥白嫩者

右五味切以水二大升煮取半大升去滓分再服食後

一服無麥門冬用小麥三合煮之勿令裂卽熟四肢煩

蒸者加地骨皮

醫人夏候極錄

娠娠胎動方九首

廣濟主安胎胎漏肚痛方

當歸

芩蘄

阿膠

炙

人參

各一兩

大棗

十二枚擘

右五味切以水三升酒四升合煮取二升半分三服五
日一劑類服三四劑無所忌

出第三卷中

小品療姙娠重下瘕引腰背安胎止痛湯方

當歸

阿膠

炙

乾地黄

黃連

芍藥

各一兩

雞子

一枚

秫米

一升

右七味切以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蟹目
沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪羹

經心錄同

又膠艾湯療損動母去血腹痛方

阿膠

二兩

艾葉

一兩

右二味以水五升煮取二升半分三服

出第七卷中經心錄同

集驗療妊娠胎動不安腹痛葱白湯方

葱白

升切一

阿膠

灸

當歸

續斷

芎藭

各三兩

銀

隨多少

右六味切以水一斗先煮銀取七升去銀內餘藥煎取

二升半內膠令烱分三服不差更作

千金同

又療妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見

方

艾葉

阿膠

灸

芎藭

當歸

各三兩

甘草

一兩

右五味切以水八升煮取三升去滓內膠令烱分三服

日三 千金文仲備急同

又療妊娠六七月胎不安常處旋復花湯方

旋復花

一兩

厚朴

炙

白朮

枳實

炙

黃芩

茯苓

各三兩

半夏

洗十遍

芍藥

生薑

各二兩

右九味切以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜

二忌羊肉錫醋桃李雀肉等

千金同出第十一卷中

刪繁療女人懷妊胎動不安葱豉安胎湯方

香豉

一升熬

葱白

切一升

阿膠

二兩炙

右三味切以水三升煮二物取一升去滓下阿膠更煎

膠烱服一日一夕可服三四劑出第七卷中經心錄同

文仲徐王効神驗胎動方

當歸 六分
芳藿 四分

右二味切以水四升酒三升半煮取三升分三服若胎

死即出比用神驗血上心腹滿者如湯沃雪救急經心錄同崔氏

用米醋二升煎二十沸服

又安胎寄生湯療流下方

桑上寄生 五分
白朮 五分
茯苓 四分
甘草 十分

右四味切以水五升煮取二升半分三服若人壯者可

加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加

乾薑四分卽安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等

崔氏小品經心

同出第七卷中

動胎腰腹痛方三首

廣濟療婦人妊娠動胎腰腹痛及血下方

當歸 三兩

葱白 切一升

芎藭 三兩

艾葉 二兩

鹿角膠 二兩

灸

苧根 三兩

右六味切以銀汁一斗煮取三升絞取滓內膠上火膠

烱分三服服別相去如人行六七里未好差停一日更

進一劑無所忌 出第三卷中

小品苧根湯療勞損動胎腹痛去血胎動向下方

苧根

乾地黃

各二兩

當歸

芍藥

阿膠

炙

甘草

炙各一兩

右六味切以水六升煮取二升去滓內膠烱分三服忌

海藻菘菜蕪荑

出第七卷中

救急療姙娠動胎去血腰腹痛方

芩藟

阿膠

炙

當歸

青竹筴

各三兩

右四味切以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥煎

取二升半分三服日再夜一不差更作一劑

集驗千金文仲古今

錄驗備急經心錄

同出第四卷中

頓仆胎動方四方

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方

當歸

芍藥

甘草

阿膠

芍藥

各二兩

艾葉

三兩

乾地黄

四兩

右七味切以水五升好酒三升合煮取三升去滓內膠

更上火令膠烊分三服日三不差更作忌海藻菘菜蕪

蕪

文仲同出第十一卷中

文仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方

搗黃連下篩酒服方寸七日二愈血乃止忌猪肉冷水

等物

又方

赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆中更熬令黃黑末和酒服一七日三服

又方

膠

三兩炙

當歸

二兩

甘草

二兩炙

右三味切以水五升煮取二升分再服忌菘菜海藻

並出

第七
卷中

胎數傷及不長方三首

廣濟療婦人懷妊數傷胎方

鯉魚

二斤

粳米

一升

尚德按
鼻字上
疑脫牛
字雖不
疑當作
無不

右二味如法作臛少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月
中頓三過作効安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年同
出第三卷中
集驗療婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者水漬沒內鹽如棗煮令熟取汁稍稍
飲之當胎所腹上當汗如鼻狀雖有所見胎雖不安
者十餘日輒一作此令胎長大甚平安出第十一卷
中

古今錄驗療妊娠養胎白朮散方

白朮

芎藭各四分

蜀椒三分
汗

牡蠣二分

右四味搗下篩酒服滿一錢七日三夜一但苦痛加芍
藥心下毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半

作後更
對復更
作後更
四守大
煩吐者
煩吐者

夏大錢二十枚服之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋
漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴大麥
粥服之病雖愈盡服之勿置忌桃李雀肉等

裴伏張仲景方出第

十一
卷中

姪娠傷寒方四首

廣濟療姪娠傷寒頭痛壯熱支節煩疼方

前胡

知母

各三兩

石膏

五兩

大青

黃芩

梔子

各一兩

葱白

切一升

右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分三服服

別相去如人行七八里再服不利忌熱麪羊肉

集驗文仲備急

救急同出
第二卷中

千金療姙娠傷寒方

葱白 十莖

生薑 二兩切

右二味以水三升煮取二升半頓服取汗

又方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸七取汗

竝出第二卷中

救急療婦人姙娠十月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血
方

升麻

梔子人 各四兩

大青

杏仁 去皮尖

高德按 千金取 一升半 高德按 千金治 死娠中 風寒熱 腹中絞 痛不可 耐矣

黃芩 各三分

葱白 切一升

右六味切以水六升煮取半分三服 出第四卷中

姪娠患瘡方二首

集驗療姪娠患瘡湯方

常山 二兩

甘草 一兩

黃芩 三兩

烏梅 十四枚

石膏 八兩

右五味切以水一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初

服六合次服四合後服二合凡三服忌海藻菘菜生葱

千金救急古

今錄驗同

千金姪娠患瘡方

常山

竹葉 各三兩

石膏 八兩

糯米 一百粒

尚德按
糯千金

尚德按
以字下
千金有
酒字

右四味切以水六升煮取二升半去滓分三服第一服

未發前一食久服之第二服取臨欲發餘一服用塗頭

額及脅前五心藥滓置頭邊當一日勿進水及進飲食

過發後乃進飲粥忌生葱菜

集驗文仲備急同出第二卷中

妊娠下痢方四首

一金療妊娠下痢方

白楊皮一斤以水一大升煮取二小升分三服

又妊娠及產已寒熱下痢方

黃連

一升

梔子

二十枚擘

黃蘗

一斤

右三味切以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜

令蠶嘔者加橘皮一把生薑二兩

真同並出第二卷中

文傳療姙娠下痢不止方

黃蘗

乾薑

赤石脂

各二兩

石榴皮

一具

右四味切以水八升煮取二升分三服

出第七卷中

古今錄驗療姙娠下痢方

酸石榴皮

黃芩

人參

各二兩

櫟皮

四兩

粳米

三合

右五味切以水七升煮取二升半分二服

千金經心錄同出第三十

四卷中

姙娠心痛方九首

千金療姙娠心痛方

青竹筍

一升

羊脂

八兩

白蜜

三兩

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日三服

又方

蜜一升和井底泥泥心下

又方

青竹皮一升酒二升煮三沸頓服之

又方

破雞子一枚和酒服之

又方

赤補封
千金水
五升煮
取三升
新德按
千金補
以三兩
作榆白
步五兩
●丸

麻子三升水八升煮取五升分三服

又方

橘皮 三兩
豉 二兩

右二味搗為丸如梧桐子服二七丸

又方

燒牛屎焦末水服方寸匕日三 竝出第二卷中

文仲葛氏療姙娠卒胎上迫心痛方

取弩弦急帶之立愈 出第七卷中

古今錄驗療姙娠卒得心痛欲死木湯方

白朮 六兩
黃芩 三兩
芍藥 四兩

右三味切以水六升煮取二升半分三服半日令盡
下水令易生忌桃李雀肉

出第三十四卷中

妊娠腹痛方三首

千金療妊娠腹中痛方

生地黄三斤搗絞取汁酒一升合煎減半頓服

又方

燒車釭脂末內酒中服又服一升蜜良

並出第二卷中

古今錄驗療妊娠腹痛或是冷痛或是胎動葱白當歸湯
方

葱白

一虎

當歸

三兩

右二味切以水酒共五升煮取二升分再服亦將小便服相去一炊頃

出第三十四卷中

妊娠漏胞方五首

小品療妊娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎視說要知如此小豆散療數傷胎將用之方

赤小豆五升濕地種之令生牙乾之

右一物下篩懷身數月日經水尚來以溫酒服方寸七

日三得効便停

千金救急經心錄同出第七卷中

集驗妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

雞子十四枚取黃以好酒二升煮使如飴一服之

又方

生地黃汁一升酒四合合煮三四沸頓服之不止頻

服

救急千金文仲備急古今錄驗經心錄同並出第十一卷中

崔氏療妊娠漏胞方

乾地黃

四兩

乾薑

二兩

右二味擣篩酒服方寸七日再服

集驗文仲經心錄同

又方

乾地黃擣末以三指撮酒服之不過三服甚良

千金同並

出第十

妊娠下血及尿血方五首

千金療妊娠卒下血方

葵子 一斗

右一味以酒五升煮取二升分三服差

又方

生艾葉 一升

右一味以酒五升煮取二升分三服冬用莖

又方

生地黃 切一升

右一味以酒四升煮取二升分三服亦療落身後血

又方

燒秤錘令赤內酒中沸定取出飲之

又方

葵根莖燒作灰以酒服方寸七日三

竝出第二卷中

文仲療姪娠下血方

取黍膏燒未服一七日三

出第七卷中千金云黍莖

古今錄驗療姪娠下血豆醬散方

豆醬二升漉去汁熬令燥未酒服方寸七日五六服

出第三十

四卷中

姪娠小便不通利方五首

千金療妊娠小便不通方

蕪菁子七合擣爲末水和方寸匕服日三

出第二卷中

千金翼療妊娠小便不利方

葵子 一升

榆白皮 一把

右二味以水五升煮五沸服一升日三服

千金同

又方

葵子

茯苓

各一兩

右二味爲散水服方寸匕日三小便利止

千金同並出第五卷中

古今錄驗療妊娠卒不得小便方

杏人

二十枚去皮尖熬令變色

尚德按
證類引
此方臍
字下有
下字
尚德按
湯字下
疑脫方

右一味搗服如大豆大七枚立得利

又療姪娠不得小便方

滑石水和泥臍二寸

並出第三十四卷中

姪娠子淋方五首

小品療姪娠患子淋宜下地膚大黃湯

地膚草

大黃

各三兩

知母

黃芩

茯苓

一作猪苓

芍藥

枳實

炙

升麻

通草

甘草

炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分三服得下後淋不好

差還飲地膚葵根汁忌海藻菘菜酢物

又方

猪苓 五兩

右一味擣篩以白湯三合和方寸匕爲一服漸至二匕

日三夜二盡不差宜轉下之服茸遂散

出第七卷中茸遂散在後大小

便不

利中

千金療姪娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服

經心錄同

又方

葵根一把水三升煮取二升分再服

出第二卷中

經心錄療姪娠患子淋小便數出少或熱痛酸疼及足腫

地膚飲方

地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服日三夜

一劑

文仲小品同
出第六卷中

姪娠大小便不利方五首

小品療姪娠子淋大小便竝不利氣急已服猪苓散不差
宜服甘遂散下之方

太山赤皮甘遂

二兩

右一味擣篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩
得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服

漸加可至半錢匕以微下爲度中間將猪苓散黃蘗寄

尚德按
今有方
二首

生湯在療子淋方中經心錄同出第七卷中子淋方中
唯有猪苓散無黃蘗寄生湯

古今錄驗療妊娠得病六七日以上身熱入藏大小便不

利安胎除熱葵子湯方

葵子 二升
滑石 四兩

右二味以水五升煮取一升盡服須臾當下便愈出第
二十

四卷
中

妊娠子癩方二首

小品療妊娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦仍不醒者
名為瘧病亦號子癩病亦號子冒葛根湯若有竹近可速
辦者當先作瀝汁後辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦

湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸瘥絕起死也非但
偏療妊娠產婦絕死者有效小兒忽癩瘥金瘡療之亦驗
作竹瀝法

取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片以
塶竝側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出以
器承之取服

又主瘥冒葛根湯療妊娠臨月因發風瘥忽悶憤不識人
吐逆眩倒小醒復發名爲子癩病方

貝母

葛根

丹皮

去心

木防已

防風

當歸

芎藭

桂肉

切熬

茯苓

澤瀉

甘草

炙各二兩

獨活

石膏

碎

人參

各三兩

右十四味切以水九升煮取三升分二服貝母令人易

產若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢

並出第七卷中

妊娠水氣方三首

集驗療婦人妊娠手脚皆水腫攣急方

赤豆

五升

商陸根

一斤切

一方加澤漆

一斤

右三味以水三斗煮取一斗常稍稍飲之盡更作

千金同出

第十一

卷中

千金療妊娠腹大胎間有水氣生魚湯方

商陸根
千金名

魚湯
白朮五
兩藥字
下有煎
字三服
作五服

生鱈魚

二斤

生薑

五兩

白朮

三兩

芍藥

當歸

各三兩

茯苓

四兩

右六味切以水一斗二升煮魚熟澄清取八升內藥取

三升分三服忌桃李雀肉酢物等

集驗同出第二卷中

崔氏療姪娘體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓

白朮

各四兩

旋復花

二兩

杏仁

去皮尖

黃芩

各三兩

右五味切以水七升煮取二升半分二服飲之忌桃李

雀肉酢物等

千金救急古今錄驗集驗同出第十卷中

損娠方六首

廣濟療婦人因損娠下血不止方

當歸

白龍骨

乾地黄

各八分

地榆

阿膠

芍藥

乾薑

各六分

熟艾

四分

牛角鯁

十分炙令黃

蒲黃

五分

右十味擣篩爲散空腹以飲服方寸匕日二服漸加至

二匕差止不吐利忌生冷油膩猪魚蒜蕪荳

出第三卷中

千金落娠胎墮下血不止方

丹參

十二兩

右一味切以酒五升煮取三升分三服

集驗文仲備急同出第二卷中

又方

地黃汁和代赭末服方寸匕

又方

桑螵蝥屎燒酒服方寸匕

並出第四卷中

救急療損娠方

取朱砂末一錢匕生雞子三顆打取白和朱砂頓服

胎若死卽出如未死卽安

出第五卷中

古今錄驗療婦人墮娠血不盡來去喜煩滿鹿角屑豉湯方

鹿角

一兩
屑熬

香豉

一升
半

右二味以水三升煮令三沸漉去滓然後內鹿角屑攪

令調頓服須臾血下

出第三十七卷中

數墮胎方四首

刪繁療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之源黃耆散方

黃耆

吳茱萸

乾薑

人參

甘草

炙

芎藭

白朮

當歸

乾地黄

各二兩

右九味搗散清酒服一七半日再服加至兩匕爲劑忌

海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等

經心錄同出第七卷中

千金療姙娠數墮胎方

妊娠三月灸膝下一寸七壯

又方

赤小豆末酒服方寸匕日二亦主妊娠數月月水尚

來者

竝出第三卷中

經心錄紫石門冬丸主風冷在子宮有子常落或始爲婦
便患心痛乃成心疾片水都未曾來服之肥悅令人有子方

遠志

去心

澤瀉

肉蓯蓉

桂心

各二兩

紫石英

天門冬

去心

五味子

三兩

禹餘糧

蜀椒

汗

烏頭

炮

卷柏

烏賊骨

寄生

石南

當歸

各一兩

杜仲

千金無
辛夷有
蒸莢

德按
引
此方云
和蜜一
升服之
千金同

甘草

石斛

柏子人

辛夷

人參 各二兩

雲母 一兩 燒

右二十二味末之以蜜丸酒服二十九如梧桐子稍加

至三十四十九日三忌海藻菘菜猪肉冷水生葱鯉魚

千金同出
第六卷中

妊娠得病欲去子方三首

小品療妊娠得病事須去胎方

通按麥芽神曲墮胎如神凡有孕者不可妄用

麥蘖一升末和煮二升服之即下神効

又方

七月七日法麴三升煮兩沸宿不食且頓服即下

竝出
第二

文仲療姙娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出

此與阮河

南療產難同 ○ 肘後千金
出第七卷中 經心錄同

落胎去胎方四首

廣濟療落胎方

栝樓

四兩

桂心

五兩

牛膝

三兩

瞿麥

二兩

右四味切以水七升煎取二升三合去滓分三服服別
如人行八九里進之無忌

又方

取牛膝六七莖綿纏搥頭令碎深內至子宮頭忌生

葱猪牛肉 竝出第三卷中

小品療羸人欲去胎方

甘草 炙

乾薑

人參

芍藥

生薑

桂心

蟹爪

黃芩

各一兩

右八味切以水七升煮取二升分三服忌海藻菘菜生

慈 出第七卷中

千金欲去胎方

大麴五升清酒一升煮三沸去滓令盡分五服當宿
勿食且再服其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳

禹德按
一升千

金作一

年

出第三

卷中

產乳序論三首

崔氏夫人生壽夭雖有定分中間枉橫豈能全免若調攝
會理或可致長生若將護乖方乃胎乳傷促且中人之性
識異弘遠言及產育情多鄙之都未知此道幽深博施處
廣僕褰帷之暇頗敦經史逮乎藥術彌復關懷今歷選群
方兼申短悆苟非切要詎能載錄晚述職孤城空莊四絕
尋醫訪道理闕多疑豈得坐而相守以俟其斃此書所記
故緣於此蓋擬備諸私室未敢貽厥將來必有以爲要亦

所不隱也余因披閱巒公調氣方中見巒公北平陽道慶

者其一妹二女竝皆產死有兒婦臨月情用憂慮入山尋
余請覓滑胎方余報言少來多遊山林未經料理此事然
當爲思量或應可解慶停一宿余輒憶想畜生之類緣何
不聞有產死者姪女偷生賤婢獨產亦未聞有產死者此
當由無人逼佐得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚
居女婦輩當由兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其
驚怖驚怖畜結生理不和和氣一亂痛切唯甚傍人見其
痛甚便謂至時或有約髻者或有力腹者或有冷水澀面
者努力強推兒便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致運
絕更非佗緣至且以此意語慶慶領受無所聞然猶苦見

作旦

又按慢
疑當作

又按產
疑當作

夕臺秘要

邀向家乃更與相隨停其家十餘日日晡時見報云兒婦
腹痛似是產候余便教屏除牀案遍一房地布草三四處
懸繩繫木作衡度高下令得蹲當腋得憑當衡下敷慢氈
恐兒落草悞傷之如此布置訖令產者入位語之坐臥任
意爲其說方法各有分理順之則全逆之則死安心氣勿
怖強此產亦解人語語訖閉戶戶外安牀余共慶坐不令
一人得入時時隔戶問之何似答言小痛可忍至一更令
爛煮自死牝雞取汁作糲米粥粥熟急手攪使渾渾適寒
溫勸令食三升許至五更將末便自產聞兒啼聲始聽人

人產者自若安穩不異云小小痛來便放體長吐氣痛卽

止蓋任分和氣之効也慶問何故須食雞肉汁粥答云牝
雞性滑而濡庶使氣滑故耳問何不與肉答云氣將下恐
肉不卒消爲妨問何故與粥答云若飢則氣上氣下則速
產理不欲令氣上故耳慶以此爲產術之妙所傳之處無
不安也故知巒公隱思妙符神理然則日遊反支之類復
何豫哉但以婦人怯弱臨產驚遽若不導以諸法多恐志
氣不安所以簡諸家方法備題如左其間取捨各任量裁
凡婦人產難必須先簡此書推所授月日知犯忌各須豫
慎不得犯之其次應須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經
管入月卽須使足若不豫備臨急用逮事必致闕唯舊經

事者始達此言豫備不虞古之善教也

又凡產者雖是穢惡然將痛之時及未產已產皆不得令

死喪污穢家人來視之必產難若已產者則傷子

又凡產法唯須熟恣不得逼迫要須兒痛欲出然後抱腰

傍人不得驚擾浪作形勢但此事轡公法中已經商畧無

用師巫妄述已能橫相牽挽失其本性今故重述特宜防

也

崔氏年立成圖法一首

女人年十三

行年十在庚申及支在正月七月禍害在南方

黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首

尚德按

崔氏二

字及圖

字疑並

柯

甲

又按例

亥當作

未西南

兌當作

西方兌

又按申

例當作

女人年十四 行年在巳亥反支在八月二月禍害在西南

赤衣師看產產婦著赤衣臥南首懸

尸在卯酉日閉肚在壬入壯在癸

女人年十五 行年在戌午反支在三月九月禍害在西北

黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首

懸尸在寅申日閉肚在癸入壯在壬

女人年十六 行年在丁巳反支在四月十月禍害在東北

青衣師看產產婦宜著青衣臥東首

懸尸在丑未日閉肚在申入壯在辛

女人年十七 行年在丙辰反支在五月十一月禍害在東

北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北

首懸尸在子午日閉肚在乙入壯在庚

女人年十八 行年在乙卯反支在六月十二月禍害在北

北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥西北

首懸尸在巳亥日閉肚在丙入壯在丁

女人年十九

行年在甲寅反支在正月七月禍害在東南巽絕命在南方南生氣在西方兌宜喚西方

白衣師看產產婦宜著白衣臥西首
懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十

行年在癸丑反支在二月八月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南

方青衣師看產產婦宜著青衣臥東南
首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年二十一

行年在壬子反支在三月九月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚

西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西
南首懸尸在寅申日閉肚在辛八壯在甲

女人年二十二

行年在辛亥反支在四月十月禍害在西方坤絕命在西方兌生氣在南方離宜喚

南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南
首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年二十三

行年在庚戌反支在五月十一月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜

喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北

字下例
當有在
字

女人年二十四
行年在巳酉反支在六月十二月禍害在
東北艮絕命在西北乾生氣東方震宜喚

東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東
首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年二十五
行年在戊申反支在正月七月禍害在東
方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚

東北黃衣師看產產婦著黃衣臥東北
首懸尸在辰戌日閉肚在乙八壯在庚

女人年二十六
行年在丁未反支在二月八月禍害在北
方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚

西北方白衣師看產產婦宜著白衣臥西
北首懸尸在卯酉日閉肚在丙八壯在丁

女人年二十七
行年在丙午反支在三月九月禍害在東
南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚

西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西
首懸尸在寅申日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十八
行年在乙巳反支在四月十月禍害在西
方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚

東南青衣師看產產婦宜著青衣臥東南
首懸尸在丑未日閉肚在庚八壯在乙

女人年二十九

行年在甲辰反支在五月十一月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜

喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首懸尸在子午日閉肚在辛八壯在甲

女人年三十

行年在癸卯反支在六月十二月禍害在西方坤絕命在西方兌生氣在南方离宜喚南

方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首懸尸在巳亥日閉肚在壬八壯在癸

女人年三十一

行年在壬寅反支在正月七月禍害在西方乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚

北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首懸尸在辰戌日閉肚在癸八壯在壬

女人年三十二

行年在辛丑反支在二月八月禍害在東方艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚

東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在卯酉日閉肚在甲八壯在辛

女人年三十三

行年在庚子反支在三月九月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚

東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東

北首懸尸在寅申日閉肚在乙八壯在庚

又按例
乙當作
巳壯閉
當作閉
壯

又按三
月例當
作二月

女人年三十四
行年在乙亥反支在四月十月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚

西北白衣師看產產婦宜著白衣臥西北
首懸尸在丑未日壯閉在丙八壯在丁

女人年三十五
行年在戊戌反支在五月十一月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜

喚西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西
首懸尸在子午日閉壯在丁八壯在丙

女人年三十六
行年在丁酉反支在六月十二月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜

喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣臥東
南首懸尸在巳亥日閉壯在庚八壯在乙

女人年三十七
行年在丙申反支在正月七月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚

西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西
南首懸尸在辰戌日閉壯在辛八壯在甲

女人年三十八
行年在乙未反支在三月八月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離宜喚

南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南
首懸尸在卯酉日閉壯在壬八壯在癸

小意必要
三十三卷

女人年三十九

行年在甲午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚

首懸尸在寅申日閉肚在癸八壯在壬

女人年四十

行年在癸巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方

青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在丑未日閉肚在甲八壯在辛

女人年四十一

行年在壬辰反支在五月十一月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜

喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在子午日閉肚在乙八壯在庚

女人年四十二

行年在辛卯反支在六月十二月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜

喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在巳亥日閉肚在丙八壯在丁

女人年四十三

行年在庚寅反支在正月七月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚

西北方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年四十四

行年在巳丑反支在二月八月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚

西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年四十五

行年在戊子反支在三月九月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚

東南方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在寅申日閉肚在申八壯在甲

女人年四十六

行年在丁亥反支在四月十月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚

西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年四十七

行年在丙戌反支在五月十一月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離宜

喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬

女人年四十八

行年在乙酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜

喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年四十九

行年在甲申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚

東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在辰戌日閉肚在乙八壯在庚

凡禍害絕命上產婦不可向之大小便又不得向產犯者凶產後血不止

凡生氣之上宜產婦向之坐令兒長壽母子俱吉

凡閉肚之上臨月及已產未滿月皆不得向其處大小便及棄不淨水犯者令人閉塞難產失顏色腹痛面痿黃令臍絞痛咽喉不利凶

凡八壯之地產婦廬帳門不得向之開又不得於其處產令閉塞難產大凶

宜後入
惟是

凡運鬼力士犯者令產婦運悶至欲產日宜解袋口卽易
產吉

凡反支月不得使血露汚地或令子死腹中或產不順皆
須先布灰草然後敷馬驢牛皮於其上產吉

凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉

凡行年本命相俱坐攀轡吉

凡此皆本全世皆

凡此皆本全世皆

凡此皆本全世皆

凡此皆本全世皆

聖吉

十二月立成法一首

並圖

正月三月五月七月九月十一月福德在丙壬

二月四月六月八月十月十二月福德在甲庚


夫人臨產必須避諸凶神逐月空福德之地若神在外於
舍內產若在內於舍外產令於 福德及空地爲產帳其
舍內福德處亦依帳法

通按
天侯一
作天猴
未詳孰
是

狂地虎
安產婦
帳吉

參未丁午丙巳

辰感池豐隆曩天狗



申天猴

庚

酉大夫

辛

戌月白虎

乙

卯軒轅大時

甲

寅雷公招攝

辰

巳

午

未

申

酉

戌

亥

子

丑

亥

壬地藏衣吉

子

丑

寅

卯

辰

巳

午

未

辰感池豐隆曩天狗

庚子年庚子月庚子日

庚子年庚子月庚子日

未 具時豐隆

二月空

酉

甲

庚 安產婦帳

酉 狂虎

辛

戌 大

亥 雷公月白虎

壬

北 子軒轅大時

癸

丑 咸池

巳 天猴天狗

南

在甲庚

東

巽

辰

乙

卯 招搖

甲

寅

卯

甲 一五安產帳

壬子年五月

未丁午丙巳
狗藏衣吉

辰

辰 卯 甲 寅

南

庚 辛 戌

三月空

在丙壬

西

軒轅大時

東 乙 卯 甲 寅

戌 辛 辰 卯 甲 寅

北

乾

亥大夫

壬安產婦帳

子月白虎狂虎

癸

丑 寅

寅 卯 甲 辰

狗天德母

庚酉辛戌

亥子德天

西

五月空

南

壬在丙

北

壬地安產婦帳
子在虎

未丁午
丙地藏衣

東

丑大夫

巽

甲卯軒轅大時

辰戌

辰戌地具時

寅雷公月

未招搖吳時

未

丁

午

丙

巳

天猴

辰

辰

乙

卯

自虎狂虎

甲天德地安產纘

寅大夫

卯

丑

咸地

癸

壬

子軒轅大時

亥

雷公

多

甲

庚

酉

辛

戌

乾

天狗

乾

天狗

乾


天狗

乾

天狗

乾

天狗



乾天狗

乾天狗

乾天狗

乾天狗

壬辰日

申招得雷公

庚

酉天交三軒轅大時

辛

戌成池三軒轅隆

乾

未招搖

酉

亥雷公

丁午

七月空

北

壬藏衣吉云安產婦帳
子軒轅大時云狂虎

丙安產婦帳云藏衣吉

在丙壬

癸

巳天候

東

丑豐隆兵時

癸

乙

甲

寅大夫云天霜

辰月自虎

卯月自虎云天美

辰豐隆兵時

巳雷公月白虎

軒轅大時

參未丁午丙

張衡思六十

申招攝震公

庚蔽衣吉

酉招攝三軒轅大時

辛

戌感迎三時

南

八月空

西

在甲庚

北

東

辰大夫

乙卯

甲寅

寅

卯

辰

辰大夫

丑豐隆吳時

癸子

壬

亥

天狗天候

氣

夕...利...

申天猴
庚
酉
辛
戌招搖



多
未
丁
午
丙
巳
地
安
狂
婦
虎
懷

辰咸也豐隆冥時
乙
卯軒轅大時
甲
寅雷公

亥
壬地藏衣吉
子天狗
癸
丑

巳豐興平

未景豐隆月白虎

丁午

丙巳

癸卯

庚

辛

壬

癸

甲

乙

丙

丁

戊


己

庚

辛

壬

癸



西

十月空

在甲庚

東

北

亥招搖雷公

壬

子軒轅大時

癸

丑咸池天狗

甲

寅

卯狂虎

辰

乙天德

甲地安產婦

地藏

天倉

子
未
丁
午

未
夫

丁
午

丙
在
虎

巳
地
安
祭
儀

無
大
德
藏
也

申
雷
公
白
虎

庚

酉
軒
轅
大
時

辛

戌
魁
星
壽
星
隆

西

南

土
月
空
在
丙
壬

東

北

乾

亥

壬
藏
衣
吉

子
招
搖


癸

丑

艮

辰
乙
卯
甲

寅
天
猴
天
狗




天時招搖咸池具時雷公豐隆軒轅月白虎大夫狂虎天
候天狗運鬼力士等十三神日別具注如圖產婦犯之大
因宜依月空處坐吉其兒衣亦依天德月空之處藏之吉
但臨產及未滿月皆不得在懸尸閉肚之上小便亦不得
繫浣衣不淨水慎之仍不得以雜物弊其上

推月遊法一首

尚德按
一首下
疑脫并
圖二小
字

日遊圖



常以癸巳日入內宮一十六日至巳酉日出癸巳甲午乙未丙申丁酉在紫微北宮

戊戌巳亥庚子辛丑壬寅在南宮

癸卯一日在天廟西宮

甲辰乙巳丙午丁未戊申在御女東宮

右日遊在內產婦宜在外別於月空處安帳產吉

巳酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅在外東北維

乙卯丙辰丁巳戊午巳未在外東方

庚申辛酉壬戌癸亥甲子乙丑在外東南維

丙寅丁卯戊辰巳巳庚午在外南方

辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子在外西南維

丁丑戊寅巳卯庚辰辛巳在外西方

壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥在外西北維

戊子巳丑庚寅辛卯壬辰在外北方

右日遊在外宜在內產吉凡日遊所在內外方不可向
之產凶

體玄子爲產婦借地法一首

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

辟方之中摠借四十餘步此中產婦安居無所妨礙無所

畏忌諸神擁護百鬼速去急急如律令

右借法及所投月卽寫一本貼著產婦所居正中北壁
上更不須避日遊反支及諸神等此類用有驗故錄耳

日曆法二首

甲子日

在內面向東北
西南二角吉

乙丑日

在內面向西南西
北東南三角吉

丙寅日

在內面向西南
西北二角吉

丁卯日

在內面向西南
西北二角吉

戊辰日

在內面向西南
西北二角吉

己巳日

在內面向西北
東北二角吉

庚午日

在內面向西北
東北二角吉

辛未日

在內面向西北東
南東北三角吉

壬申日

在內面向東南
東北二角吉

癸酉日

在內面向西北東
北東南三角吉

甲戌日

在內面向東南
西南二角吉

乙亥日

在內面向東北
西南二角吉

丙子日 在內面向西南
東北二角吉

丁丑日 在內面向西南西
北東南三角吉

戊寅日 在外面向西北
西南二角吉

巳卯日 在外面向東南西
南西北三角吉

庚辰日 在內面向東北
西北二角吉

辛巳日 在內面向西北西
南東北三角吉

壬午日 在內面向西南
東北二角吉

癸未日 在內面向東南
東北二角吉

甲申日 在內面向東南
西北二角吉

乙酉日 在內面向東南西
北東北三角吉

丙戌日 在內面向東北
西南二角吉

丁亥日 在內面向東北西
南東南三角吉

戊子日 在內面向西南
東北二角吉

己丑日 在內面向東南西
南西北三角吉

庚寅日 在內面向東南
西北二角吉

辛卯日 在內面向東南
西北二角吉

壬辰日 在內面向西南
東北二角吉

癸巳日 在外面向西南東
北西北三角吉

甲午日 在外面向西南
西北二角吉

乙未日 在外面向東南西
北東北三角吉

丙申日 在外面向西北 東北二角吉

丁酉日 在外面向西北 南東北三角吉

戊戌日 在外面向東北 西南二角吉

巳亥日 在外面向東北 南西南三角吉

庚子日 在外面向東南 東北二角吉

辛丑日 在外面向東南 北西南三角吉

壬寅日 在外面向東南 西南二角吉

癸卯日 在外面向東南 南西北三角吉

甲辰日 在外面向西南 西北二角吉

乙巳日 在外面向西北 南東北三角吉

丙午日 在外面向西南 北西北三角吉

丁未日 在外面向西北 南東北三角吉

戊申日 在外面向西北 東北二角吉

巳酉日 在外面向西 北東北三角吉

庚戌日 在外面向東北 東南二角吉

辛亥日 在內面向東南 西南二角吉

壬子日 在內面向東南 北西南三角吉

癸丑日 在內面向東南 西南二角吉

甲寅日 在內面向東南 西北二角吉

乙卯日 在內面向東南 南西北三角吉

丙辰日

在北東北三角吉

丁巳日

在北東北三角吉

戊午日

在北東北三角吉

巳未日

在南東北三角吉

庚申日

在南東北三角吉

辛酉日

在南東北三角吉

壬戌日

在內面向東南

癸亥日

在內面向西南

凡日曆十二辰並有神殺禁忌不可向產日別須簡看

凡甲乙日

生子勿著白衣宜著黑衣

丙丁日

生子勿著黑衣宜著青衣

臥無北首勿

壬癸日起

戊巳日

生子勿著青衣宜著赤衣

庚辛日

生子勿著赤衣宜著黃衣

臥無南首勿

丙丁日起

壬癸日

生子勿著黃衣宜著白衣

安置產婦法二首

凡欲產時先以朱砂點產婦項後宛宛中又點鼻孔間柱
兩傍宛宛中牛穿掘處卽向產處呪之曰此地空閑安居
產婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫相觸忤三呪
之訖卽燒火於產處四方以井華水四器亦置產處四方
各橫刀於水上其刀浮磨拭之又法捉一刀子先向產處
呪曰一尺刀子七寸刃拒以反支而治運如此三呪訖
刀子著產處地上然後坐產

已上並出第十上卷中

產難方二十四首

崔氏凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母

通按
舌青當
字舌赤

小童必要

三十三卷

七

血青爲

死血之
狀子安

得活

尚德按

面赤舌

赤千金

作面青

舌赤蓋

以面候

母以舌

候子也

尚德按

千金水

服亦得

面赤舌赤口中沫出者母死兒活母唇口青口兩邊沫出

者母子俱死 文仲同出第十上卷中

廣濟療難產三日不出者方

取死鼠頭燒作屑并花水服 千金崔氏救急同

又方

槐子十四枚蒲黃一合內酒中溫服須臾不生更服

之 千金集驗崔氏同

又方

吞生雞子黃三枚并少苦酒 崔氏集驗備悉文仲同

又方

吞皂莢子二枚亦効千金崔氏小品同並比類三

小品療產難歷日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆

升二

阿膠

兩二

右二味以水九升煮豆令熟取汁內膠令烊一服五合
不覺不過再卽產崔氏千金同

又方

取馬銜一枚覺痛卽令左手持之崔氏同

又方

取槐東引枝手把之崔氏同

又方

手捉鷓鴣頭甚驗

崔氏同並出第七卷中

集驗若日月未至而欲產者方

未知母蜜和兔屎大服一丸痛不止更一丸

千金崔氏小品

同

又方

取夫衣帶五寸燒作灰酒服立下

崔氏廣濟文仲同並出第七卷中

備急療難產方

取槐子吞三枚

崔氏同

又方

取鑿柄入孔裏者燒末酒服之立下

崔氏同

又方

弓弦三寸箭箠二寸各燒末酒服之

崔氏同

又方

取羚羊角屑燒末酒服之

千金崔氏同

又若母已死兒子不出方

但以水銀如彈丸格口內喉中捧起令下食頃又捧

令起子便落

崔氏同

又方

擣蒲根絞取汁一二升灌口中此亦治母生子死驗

崔氏同

尚德按
千金以
東流水
服方寸
匕

又療母子俱死者產難及胎不動轉者方

榆白皮

三兩

葵子

五合

甘草

炙

桂心

各一兩

右四味切以水四升煮取二升服一升須臾不產更服

升忌海藻菘菜生葱

崔氏小品同

又產難數日欲絕秘方

書奏作兩行字凡二十字文曰帝乙生子司命勿止

卽出其胞及其子無病其母封其中央以朱印之令

產婦持之

崔氏小品同

又產難六七日母困方

取好膠二兩清酒一升半微火烱膠內新雞卵一枚

監一寸

服卽

服卽

又產難何如

方

陳葵

撮酒服以噤者去齒下

藥卽愈立

驗

崔氏同

又療婦人產難方

書紙口坐爲蒲卧爲魚女屬母兒屬夫急

卽產婦吞之又書西道兩手各執一丸書三本

崔氏同並

出第一卷中

救急療產難方

取廁前用草二七枚燒作灰服之

千金崔氏同崔氏云口用籌

又方

取牛屎中大豆書一片作入字一片作出字還合吞之良

崔氏同並出第四卷中

千金療難產方

令夫唾婦口中二七過立下

集驗崔氏同出第十卷中

逆產方一十二首

小品療逆產方

鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上卽

愈

崔氏千金集驗同

又方

尚德按
隆爪千
金作爪

倚德按
千金云
深上塵
如彈丸
許二枚

鹽和粉塗兒兩足下卽順矣

千金崔氏同

一方

又彈丸二枚擣末三指撮温酒服

集驗千金崔氏同
並出第七卷中

集驗療逆產方

燒錢令赤內酒中飲之

崔氏同

又方

夫陰毛二七枚燒以猪膏和丸如大豆吞兒手卽持

丸出神驗

千金崔氏同

又方

朱書左足下作千字右足下作黑字

崔氏同

又方

生不出手足先見燒蛇脫皮末服刀圭亦云三指撮

面向東酒服卽順

崔氏千金同

又方

真丹刀圭塗兒腋下

崔氏同

又方

以手中指取釜底黑煤交畫兒足下順出

千金文仲
崔氏備急

同並出第十一卷中

刪繁療逆產難產數日不出者方

取桃人中破書一片作可字一片作出字還合吞之

尚德按
承疑當
竹缸十
金作時

又療逆產方

取車肚中膏畫腋下及掌心

崔氏文仲備急小品千金集驗同

又療逆產胞衣不出方

取竈屋上黑塵酒服之

千金崔氏同並出第七卷中

橫產方四首

小品療橫產及側或手足先出方

可詩麤鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉卽縮自

當題順 文仲備急千金崔氏集驗同

集驗療橫生方

取梁上塵三指撮酒服之

千金文仲崔氏同出第十卷

文仲療縱橫不可出

尚德按出字
下疑脫方字

用菟絲子末酒若米汁服方寸七卽出車前子亦好

服如上法 千金崔氏同

又方

服水銀如大豆一枚 備惡崔氏同

右以前橫產逆產二條條流雖別療法蓋同可以意量
逐善參用也

子死腹中欲令出方一十五首

集驗療子死腹中方

真珠二兩酒服盡立出

崔氏同

又方

取竈下黃土三指撮酒服之立出當著兒頭上

千金
崔氏

文仲同

又療胎死在腹方

取三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升

合煮令產婦面東向飲之立出

千金備急
崔氏同

又方

取麩麥一斤以水八升煮取二升分再服不出更服

文仲千金
崔氏同

又方

葵子一升阿膠五兩水五升煮取二升頓服出間日

又服

崔氏千金文仲備急同並出第十一卷中

崔氏療子胎在腹中恐死不下方

當歸

芎藭

各二兩

右二味以好醞醋二升煮藥二十沸頓服之若胎已死
卽下如胎未死卽便安穩也

又療子死腹中又妊兩兒一兒活一兒死令腹中死者出
生者安此方神驗萬不失一

蟹瓜

一升

甘草

二尺炙切

阿膠

三兩炙

右三味以東流水一斗先煮二味取三升去滓內膠令
烊頓服不能頓服分再服若人困校口下藥入卽汗煎
藥宜東向竈以茅葦薪煮之集驗廣濟千金備急文仲同
又療妊身熱病子死腹中又出之方

烏頭

一枚

右一味細擣水三升煮取大二升稍稍摩臍下至陰下
胎當立出

又方

以苦酒濃煮大豆一服一升死兒立下不能頓服再
服之亦得千金同

又療子胎在腹內已死方

甘草

炙一尺

蒲黃

合一

筒桂

四寸

香豉

二升

雞子

一枚

右五味切以水六升煮取一升頓服胎胞穢惡盡去大

良千金集驗同並出第十卷中

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不
產血氣上盪心母面無顏色氣欲絕方

猪膏

一升煎

白蜜

一升

淳酒

二升

右三味合煎取二升分再服不能隨所能服之

備急刪
繁千金

崔氏同

又子死腹中不出方

以牛屎塗母腹上立出 備急崔氏千金同

又方

榆皮

切一兩

珍珠

一兩

右二味以苦酒三升煮取一升頓服死兒立出

集驗千金備急

崔氏同並出第二卷中

救急療子死腹中方

服水銀三兩立出集驗

千金備急文仲小品同

又方

取夫尿二升煮令沸飲之集驗

千金崔氏同並出第四卷中

胞衣不出方二十首

廣濟療胞衣不出方

未竈突中土三指撮以水服之

集驗千金備急文仲同

又方

取夫單衣蓋井上立出

千金集驗救急崔氏小品同

又療胞衣不出方

取苦酒服赤米一兩

千金集驗崔氏同

又方

雞子一枚苦酒一合和飲之卽出

集驗千金崔氏同

又方

當戶燒黍穰卽出 崔氏同並出第二卷中

小品療胞衣不出方

取皂莢搗末著鼻孔中嚏卽出 崔氏同

又方

鹿角末三指撮酒服之 崔氏同

又方

兒衣不出吞此符吉 麤

延年療婦人傷娠及胎死腹中胞衣不出產後疾病及諸
困竭欲死方

刺取羊血及熱飲之不能者人含吐與之能多益善

若不能咽噉少鹽又水溲其面此方神驗崔氏文仲備急同

又胞衣不出方

以洗兒水服半椀卽出
崔氏同

又療胞衣不出腹中滿則殺人方

但多服猪膏又大豆一升苦酒一斗煮取三升分三

服崔氏同

又方

吞雞子黃兩三枚解髮刺喉中令得嘔卽出若因極
死者以水一升煮栝樓一枚三兩沸寫口中汁下卽

出

服出第十四卷中崔氏云水一升煮螻蛄帖一枚三沸

急療胞衣不出并見橫到死腹中母氣欲絕方

半夏二兩

白斂二兩

右二味等篩服方寸匕小難一服橫生二服到生三服

急文仲崔氏同

廣濟集驗小品備

又方

小豆小麥相和濃煮汁飲之立出

小品千金備急崔氏同

又療胞衣不出方

取欬筆當戶前燒之

廣濟集驗千金崔氏同出第四卷中

必効療胞衣不出令胞爛牛膝湯方

牛膝四兩

滑石八兩

當歸三兩

通草六兩

葵子

一升

覆麥

四兩

右六味切以水九升煮取三升分三服忌牛狗肉

廣濟集驗

千金崔氏同通草一方作莽草

又方

服蒲黃如棗大良

集驗千金崔氏同

又方

生男吞小豆七枚生女吞二七枚

千金崔氏並同

又方

生地黃汁一升苦酒三合煖服之不能頓服再服之

集驗千金崔氏同

又方

澤蘭葉

三兩

滑石

五兩

生麻油

二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓內滑石生

油頓服之

廣濟集驗千金崔氏同並出第四卷中

屍鬼

齒

難產鬼

已上三符主產難產婦吞之吉

扇

產難燒此符水和服之吉

扇

逆產橫產吞此符

右出崔氏產書

右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張 宅較勛

外臺秘要
大日本

醫官

平安山脇尚德玄飛甫

校刊

清水敬長源五甫 叅校

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十二卷終

