

盤珠集胎產症治

上

中國醫學大成第九集

婦科類

盤珠集胎產症治 上

上海大東書局印行

盤珠集胎產症治提要

清姚江嚴潔字西亭。又字青蓮。施雯字澹寧。又字文澍。洪煒字緝菴。又字霞城。之三人同纂一書。分上中下三卷。上卷列胎前三十四症。中卷列產後六十一症。下卷列補劑方六十三。散劑方三十一。攻劑方十六。清劑方三十三。熱劑方八。和劑方四十四。瀉劑方五。胎前備用良方三十五。產後備用良方十八。共列證九十有五。列方二百五十三。其分列證候皆胎前產後所常有。而採用之方亦因證施治所必驗。嚴施洪三氏生平治婦人經驗之法。盡在於斯矣。

盤珠集胎產症治目錄

卷上 胎前

子瘧	一
心腹痛	一
腰脇痛	一
下血	一
尿血	一
轉胞	一
胎氣上逼	一
臟燥	一
胎動	一
胎痛	一
孤漿	一
吐血	一
子癆	六
子瘡	七
子淋	八
子嗽	九

子瘧	一
心腹痛	一
腰脇痛	一
下血	一
尿血	一
轉胞	一
胎氣上逼	一
臟燥	一
胎動	一
胎痛	一
孤漿	一
吐血	一
子癆	二〇〇
子瘡	二〇〇
子淋	一九
子嗽	一八

胎產症治目錄

二

傷寒.....二一

痢疾.....二三

泄瀉.....二四

霍亂.....二五

傷食.....二六

鐘鳴.....二七

墮胎.....二八

胎不長.....二九

鬼胎.....二九

傷胎.....二九

腸覃石瘕.....二九

卷中 產後

難產
交骨不開 橫生腹中 產

胎死腹中

一

胎衣不下.....三

血暈

厥

惡露不下

惡露不絕

血崩不止

頭痛

心痛

腹痛

小腹痛

腰痛

腰痛

遍身痛

一四

一三

一二

一一

一〇

九

八

七

六

五

遍身皮赤兩腿肉青	一五
膨脹	一五
血塊	一五
傷食	一六
嘔吐	一七
霍亂	一八
呃逆	一九
喘急	一九
蟬聲	二一
浮腫	二一
發熱	二二
乍寒乍熱	二四
汗	二四
中風	二六

不語	二七
舌出不收	二八
驚悸	二八
發狂譫語	二九
發斑	二九
見鬼	三〇
煩渴	三〇
咳嗽	三〇
口鼻黑衄	三一
瘧疾	三二
瀉痢	三三
蓐勞	三五
大便不通	三五
小便不通	三六

胎產症治 目錄

便血	三七
遺糞	三八
小便不禁	三八
乳汁不行	三九
乳汁湧出	四〇
乳癰	四〇
乳懸	四一
玉門不閉	四一
產戶痛	四一
陰蝕	四一
陰中溼爛	四二
陰脫	四二
陰突	四三

補方六十三
散方三十一
攻方十六
濬方三十三
熱方八
和方四十四
瀉方五
胎前備用良方三十五
產後備用良方十八

盤珠集胎產症治

清 姚江 施 雯澹寧
鄭縣 嚴 濟西亭全纂
洪 煉緝菴

卷上 胎前

惡阻

惡心頭眩。惡食擇食是也。

懷娠兩月宜絕醫藥。妊娠一月足厥陰脈養之。二月足少陽脈養之。多致惡心頭眩。喜酸俗爲之病兒。非醫藥所治。治之則愈甚。待其自安可耳。

懷娠一月不須安胎。胎未成而嘔吐。母病也。若注意安胎。便用砂芩之類。則反傷脾胃。故但當治其母病。則嘔逆自止。惟方藥有與病相合。而於胎不相宜。

者當去之。

中氣不運。孕當兩三月。因中氣多滯。不能運化。不思穀味。聞食即惡心多阻。宜疏理脾胃。香砂六君子湯。和三加烏梅亦可。

稟受怯弱。氣血不足。轉致內鬱。鬱氣上衝於胃。則嘔逆。血虛而心失所養。則煩悶。宜調血散鬱為主。參橘飲。和一甚有虛弱之極。或作寒熱往來。倦怠不能自支。此肝腎不足也。須兼補足厥陰與足少陰經。

胃有痰飲。血壅不行。則飲隨氣上。停滯肝經。故喜酸物。惟金能尅木。宜以辛味勝之。砂仁薑香。自不可少。半夏雖損胎。不妨權用。但不宜多耳。半夏茯苓湯可酌用之。二和一

胃氣虛寒。宜溫補脾胃。以下其逆氣。六君子湯。一補

肝火衝胃。寅卯時覺少腹有氣上衝。此肝火挾衝脈之火上衝也。故心中煩憤。熱悶。嘔逆不止。宜竹茹麥冬湯。一寒

氣鬱傷肝。大怒後。肝氣挾胎氣上逆也。故胸滿眩暈而吐逆。宜疏肝。不宜補氣。抑青丸可治。散一

外傷風寒。嘔而頭暉。亦有兼風寒外襲者。宜於調氣之中。加紫蘇以散之。虛則可投參蘇二味。

上實下虛。惡阻若兼腰痛。謹防胎墮。宜六君合四物去川芎。加川斷杜仲以安之。切勿用升舉藥。愈升則上愈實而下愈虛。是促其墮矣。補一

嘔吐不受藥。津液燥涸。少陰虛火上浮。厥陰鬱火上達。少陽伏火上乘。是以嘔吐不能受藥也。速當救急以治其標。滋陰清燥湯。寒一

子煩

煩症有四。肺虛而火乘之心煩也。停痰積飲。惡聞食氣。胸中煩也。但熱而煩。虛煩也。氣鬱不舒。頻吐涎沫。胎動不安。子煩也。

心肺虛熱。陰既養胎。孤陽獨旺。心肺虛熱故煩。宜清心肺。

心驚膽怯。受胎後血氣壅鬱。熱氣上衝心肺。故煩悶不安。心膽俱怯。竹葉安

胎飲犀角散。腎火動。六味丸。和四寒三補二

停痰積飲。氣鬱不舒。以致嘔吐涎沫。劇則胎動。竹葉湯。寒麥冬飲。寒

津液枯燥。藏府氣虛。營衛不和。致陰陽偏勝。而熱入心脾也。知母丸。寒知母飲。寒七寒

脾腎氣虛而火鬱。逍遙散加黃芩砂仁。和

胎氣上逼。氣逆脹悶。清肝飲。散二

上焦氣鬱。鬱則爲火。而中氣不和。分氣飲。和六

暴渴不止。血欲凝而渴。非疾也。飲五味子汁自愈。

君火乘肺。盛夏君火大行。上乘肺金。以致煩躁胎動不安。宜清心火。

子懸

胎氣不和。上湊心腹。致脹滿痞悶。疼痛不安。

濁氣上衝而心腹痛。宜疎氣舒鬱紫蘇飲。散三

胎熱氣逆。孕在三月。君相二火養胎。致胎熱衝心而痛。紫蘇飲。散三若胎上攻心。不知人事。宜調中和氣飲。八寒

寒飲與氣相爭。腹有寒氣。小腹如扇。惡寒喜熱。子宮寒也。附子湯可權用之。

一熱然脈果遲細方無有誤。

子腫

氣壅成濕。濕氣上行。面目故腫。

子腫腫在頭面。子滿腫在遍體。子氣腫在下體。

脾胃氣虛。

土氣不和。不能制水。水氣不化。停積于中而溢于外則腫。

白朮散。

八十六君子湯。一補

感犯風寒。

紫蘇飲去白芍。加防風。三散

濕痰壅滯。

六君子湯。一補黑山梔一合。米飲下。

血少氣滯。

加味歸脾湯。三補

子滿

心胸脹滿。氣不舒展。或至遍身浮腫。喘急不安。

水血相搏。

土不尅水。水與血相搏。散于四肢。遂致遍身腫滿。少腹急而溲不利。

利鯉魚湯。澤瀉散。和七

濕熱腫于下部。補中益氣湯，加山梔茯苓。六補

傷食吐瀉。六君子湯，加砂仁、穀芽。一補

脾虛胃弱。四君子湯，加訶子、薑皮。四補

風邪外襲。紫蘇飲，去人參白芍，加藿香。二散

子氣

因素有風濕，妊娠三月後，兩脚面浮腫，行走艱難，喘悶似水氣狀，脚指縫黃水出。謂之子氣，切勿作水病治。至分娩自消。

中氣不得升發。當疏理鬱滯，天仙藤散。五散

下元虛弱而兼風邪。宜生血行氣，烏藥順氣湯，加減用之。六散

子瘡

舌爲心苗，肺主聲音。肺腎爲子母之臟，心肺腎三臟皆能致瘡。如妊娠九月而瘡，則以胞之絡脈繫腎。少陰之脈貫腎，上繫舌本，脈絡阻滯，故有言無聲。分娩後自

然聲出不必治。

心火冠肺。宜降少陰之火。

心腎不足。宜補少陰。

痰涎滯絡。宜清痰飲。

子癇

忽然昏冒。不知人事。甚則角弓反張。須臾自醒。良久復作。此由血虛而外邪襲之也。

血燥類中風。宜清熱養血。加味羚羊角散。寒九又忽然昏迷倒地者。乃血氣養胎母乏精力。以致眩仆。只宜飲食以補之。

水衰火旺。當瀉南補北。使肝火平和。六味加歸芍。二補

外感風寒。憎寒壯熱。頭疼煩悶。宜芎蘇散。七寒

伏熱在內。懷孕後多臥熱褥。及食熱物。或服峻補之劑。致令熱伏胎中。旋挾肝臟。風熱攻壅。入腦則頭暈昏迷。宜服天冬飲子。十寒

胃中濕痰。

有濕痰則血氣壅祕。癱瘓不能舉動。宜烏藥順氣湯。以發其汗。

六散

風火相煽。

鈎藤湯加黃芩梔子柴胡。痰湧加竹瀝。風盛加全蟲。氣血虛用八珍湯。加鈎藤梔子。煩熱多加釵斛。八散五若無力而抽搐。汗出如油。汗絕也不治。

胎氣傷於熱毒。

頭旋眼花。頸項暴腫成核。痛甚嘔吐。若加痰壅。危在頃刻。急投消風散。十二散

藥毒攻胎。上衝心腹。

口不能言。項直。自汗。身熱。與子癟相似。六脈浮數。十不

一生。速用生白扁豆一味。研末。汲井水灌之。

子淋

氣血養胎不及。宣通滲道。遂使膀胱鬱熱不化而爲淋。法當養血爲主。兼利小便。

肝經濕熱。

龍膽瀉肝湯。寒一

血虛生熱。

安榮散。八補二

血得熱而溢於脬。

勞傷經絡。熱生於內。熱盛血溢。故血隨溺中出也。宜養血

安胎。

四苓加阿膠二

腎虛不能制水。虛則熱客於膀胱。地膚子湯。又四物湯加知柏玄參麥冬北

五味。寫補七

脣腹脹痛。脾胃氣虛也。安胎飲加二陳湯。補九和八

肺氣虛而溲短。補中益氣湯。加山藥麥冬。補六

服滲濕之劑。而益加頻數。或濇而不利。四物湯加知母川柏懷牛膝茯苓甘

草。補七

腿足轉筋。左歸飲。加當歸菟絲子製附子。補十三

胎壓膀胱。六脈細弱。氣血俱虛。不能承載其胎也。補中益氣湯。升舉其胎。則小便自利。若利小便。胎墮而死。補六

子嗽

津血養胎。肺乏濡潤。兼之鬱火上炎。故嗽不止。法當潤肺爲主。

胃火衝肺。食生冷又食椒薑。致傷胎氣而咳嗽不止。五虎湯。和七

脾肺氣虛。傷於風寒。補中益氣湯。加桑皮杏仁桔梗。補六

肺虛不生水。水虛而火炎。宜清金滋水。又當以安胎爲要。

陰火犯肺。

天冬湯。_{二寒十}

風寒客肺。

寧肺飲。_{三十}

嗽血不止。

清肺飲。_{十七}

子瘡

其母素有肝火。遇孕則水養胎元。肝血愈燥。寒熱往來。是以不免似瘡。實非瘡也。或因氣血虛損。風寒乘之。風爲陽邪。化氣爲熱。寒爲陰邪。化氣爲寒。陰陽併挾。寒熱互見。宜大補氣血。輕表外邪。若寒熱不已。熏蒸其胎。胎必傷矣。

肝枯發火。

逍遙散。_{五和}

化源不足。

六味丸。_{二補}

氣虛寒熱。

六君子湯去半夏。加蠶香。

_{一補}

陰陽之氣不和。

宜和解。小柴胡湯。_{和十}

心腹痛

藏府既虛。外觸風寒。邪正相擊。而井於氣。隨氣上下。衝於心則心痛。攻於腹則腹痛。若至久不瘥。衝於胞胎則胎下。

腹痛惡寒。少腹如扇。子宮受寒而不能合。故開而若扇。宜附子湯。熱一

血脹腹痛。此子宮久虛也。不速治則胎墮。杜仲丸。補十

痛引兩脇。小便數。大便滑。宜安胎和氣飲。和十補一

微痛連腰。飲食無味。此胎氣不安也。宜安胎飲。九補一

痛不可忍。胎動欲落。若初病而身體強健者。可用紋銀數兩。先煎後加茅根

二觔。煮汁飲之。

氣脹刺痛。腸鳴嘔逆。火加清火之味。九

胞阻腹痛。血爲胞所阻。不能流行。血滯則氣亦滯。故腹中痛。宜四物加膠艾

甘草。挾風則爲濁痰。阿膠能去風而澄濁。艾能導血歸經。補七

脾胃氣虛。不能承載。安胎飲加升麻白朮。或補中益氣湯。補六九

忽然疼痛。此妊娠至五六月有之。大棗十四枚。炒炭。食鹽一錢。炒赤。共研酒

下。

頓仆胎動。腹痛下血。四物加膠艾。不應用八珍加膠艾。或再加知母亦可。若擔心短氣。腹滿作痛。四物加阿膠砂仁陳皮黃芩。補七

風邪痰飲。交結於心之支絡。宜四物合二陳加藿香紫蘇。或阿膠散加旋覆花。或當歸芍藥湯。擇而用之。補七和八補六

腹痛連脣。宜五加皮散。或五加皮丸。撒十散

皮膚疼痛。筋骨拘急。手足攣拳。此內食生冷。外受風寒。寒冷之氣。內外相搏。而胎不安也。宜安胎和氣飲。和十

筋骨疼痛。四肢不安。因怪夢多驚。或喧呼忪悸。以致胎氣不安。故兩脇腹脹。連脣急痛。坐臥不寧。氣促如喘。速投大聖散。補十

腹痛時作。小腹重墜。血虛氣陷也。用加味安胎飲。三補十

宿寒搏血。血凝氣滯。宜五靈脂蒲黃並炒炭醋調下。或用五君子湯。四補十

遍身痛。衝心欲死。不能飲食。宜白朮芍藥黃芩。

心下滿。氣急切痛。赤茯苓桑白皮前胡郁李仁蘇梗五加皮。

血虛而熱。生地二觔搗汁。和酒一升。煎半服。

胎氣自痛。

宜內補丸。補十

補五

胞絡虛而風寒搏之。少腹痛甚。紫蘇飲加生薑。如氣血兩虛。入珍湯可加減用之。散三

氣攻左右。小便不利。小柴胡湯加青皮梔子。和

因怒而小腹疼痛。水道重墜。肝火熾盛所致。龍膽瀉肝湯。後用四君加升柴。補四十一

小腹痛連腰脇。此驚惱所致也。甚則下血不止。宜阿膠當歸人參茯苓。加香附艾。並炒炭煎服。

腰脇痛

血氣蔭胎。不能養腎。腎虛而腰必痛。或勞力傷腎。致動胞繫。痛甚而胞繫必脫。又房事不節。胞繫傷而痛不止。遂至胎墮者多矣。宜安胎爲主。

腎氣虛弱。青娥丸加熟地。八珍湯加杜仲阿膠艾砂仁。補十六

氣血滯而不行。縮砂飲。紫蘇飲。加桔梗香附。散三十二

風邪所乘。此必腰痛如折。紫酒或四物湯。加桑寄生防風。補七十七

閃挫而痛。通氣散加安胎飲。補九十八

肝火熾盛。小柴胡湯加左金丸。寒十四和十四

天陰及久坐而痛。濕熱也。二妙散加杜仲米仁。和十四

腰重如帶冷物。寒濕也。通氣散加川斷杜仲。八補十

肝脾鬱結。歸脾湯加柴胡。加左金丸。寒十九補十九

下血

衝任二脈。上爲乳汁。下爲月水。受胎則月水應斷。衝任氣虛。不能固攝。血常溢下。名曰胞漏。莫作月水論。久而不止。則胎墮。非時而下。爲胎漏。依期而漏。號激經。尿血溺時方有。胞漏血常下而不停。

見紅腰痛。六味丸合四君子湯。去甘草。加杜仲川斷粘米。補四二

榮血有風。榮經爲風所勝。故經血動而下也。所下者本非養胎之血。若認作

胎漏。服保養胎元之藥。是實實矣。胎必墮下。宜服防風丸。散三
十

按月出。血點滴爲胎漏。此因氣血並虛也。宜服補中安胎飲。補二

因事而動。以至下血。二地加枳殼炭二三分。

頓仆動胎。下血不止。安胎飲加阿膠艾炒炭。如感寒頭痛。加蓮鬚。補九

胎氣內熱。迫血妄行。涼胎飲。寒五

中氣下陷。補中益氣湯。六

脾氣虛。不能攝血。歸脾飲。補九

肝脾鬱怒。加味歸脾湯。或小柴胡湯。補十三

肝脾風熱。加味道遙散。散十一

肝脾濕熱。升陽除濕湯。散四

風入腸胃。胃風湯。散五

胎急不安。下血不止。桑寄生散。和十

因驚而氣虛。虛則下陷而見血。安胎飲加人參。九補

血離其位。積於胞宮。爲脹爲痛。四物重加當歸。七補

下黃汁如膠。或如豆汁。此濕熱也。用升陽除濕湯。又用黃耆六兩。糯米五合。水五升。煎半分作兩服。散四十

癥氣相妨。亦爲漏下。行經之時。血虛而寒氣乘之。血遂凝結而成癥。其癥不結於子宮。仍能行經成孕。既孕見血。爲之漏下。是癥氣爲害也。宜下之。桂枝茯苓湯。然方中桃仁一味。恐妨胎。須酌用。若癥在腹中。於胎無害。俟分娩後治之。爲妥。散十六

尿 血

胎漏血自人門出。尿血血從尿門出。因心經有火。移于小腸。滲入膀胱。溺時而下。不溺則不下也。

形體勞而過食燔炙之物。加味逍遙散。補十二

赤帶漏下。如猪肝汁。側柏丸。寒十六

轉胞

胞卽膀胱。以胎漸長大。下逼於胞。胞爲胎逼而側。故名轉胞。有因胎陷而致轉胞者。有因氣不化水。水蓄胞中。胎又從而逼之而致轉胞者。其候煩悶。汗出。氣逆奔迫。水道不通。小腹急痛。宜速治之。急則令孕婦仰臥床上。豎其兩足。亦能稍瘥。轉胞與子淋相類。但淋則痛而不脹。轉胞則脹而不痛。卽因脹極而痛。溺孔却不痛也。若淋症則小便點滴。溺孔痛甚如割。

血氣虛弱。胎不能舉。

補中益氣湯加減用之。八珍湯加廣皮木香。亦治此症。

補六

脾肺氣虛。不能輸泄膀胱。異功散加豬苓澤瀉。

補十二

熱氣鬱結膀胱。以致津液不利。滋腎丸加丹皮澤瀉。

寒十

金爲火燶。脾土濕熱。致溲便不利。清金利水湯加山梔釵斛。

寒十

忍尿飽食。房勞氣逆。而水不能化。以致轉胞。宜治其氣。蘇香丸。

散十

胎氣上逼

胎動氣逆。上逼心肺。以致氣塞不轉。悶亂喘促。此調養失宜。氣血不和也。

子懸

是胎氣不和。此因氣血不調。以致胎不安也。

胎氣上逆。

紫蘇飲。

散三

當歸芍藥湯。

補十

肝火內熱。

加味道遙散。

散十一

胃火上逆。

四物湯去川芎。加山梔黃芩甘草。

補七

脾氣不舒。

加味歸脾飲。

補三

飲食無味。

六君子湯。

補一

脾胃虛寒。

五君子湯。

補四十

風邪勝喘不能臥。

參蘇飲。

和十

火動其胎。逆上作喘。

黃芩香附末用砂仁煎湯下。

腎氣不歸元。

上乘於肺而作喘。

生脈散。

都氣飲。

加阿膠。補二十四

胎氣上逼。

熱痛下血。以致煩悶困篤。

葱二十莖濃煎飲之。

胎死即下。未死即

安。

因氣血養胎。津液不能充潤而肺燥也。當補其母。

肺燥欲哭數欠伸。

甘草大棗湯。補十五八珍湯。補五淡竹茹湯。寒十

寒水攻心而悲淚。

五君子湯加砂仁。補四十

肺受風邪。頻致淚下。

四物寄生湯。和四十

胎動

胎動則腹痛。胎漏無腹痛。胎動宜行氣。胎漏宜清熱。若手足冷厥。脣口青黑。宜人

參甘草當歸阿膠蓮鬚葱白。

胎動作喘。宜降火。用黃芩香附末。清湯下。

腹痛下黃汁。黃耆川芎粘米煎服。

衝任風寒。以致胎動。當歸川芎紫蘇生薑煎服。

元氣不足。怠倦不能承載。宜服安胎調氣飲。如十六如微熱腰疼。連進兩服。

怒氣傷肝。鬱結不舒。觸動血脉。而胎不能安。宜安胎飲。加香附柴胡白芍。補九

有火。加梔子丹皮。

因母病而胎動。但治母病不必安胎。惟犯胎之藥不可入。其餘飲酒房勞觸忤仆傷。以致胎動。俱當安胎爲主。

胎動下血。葱白煎湯入阿膠艾炭。再煎服。又當歸川芎阿膠艾黃芩甘草。煎服。

胎動腹痛。面青冷汗。氣欲絕。此勞動傷胎。宜急治之。鈎藤湯。散入

胎不動不墜。腹冷如冰。血少不能榮養其胎也。宜補血湯。補二十七

胎痛

血少不能榮養其胎也。

血衰氣滯。宜抑陽助陰。四物湯加香附紫蘇。補七

小腹重墜。地黃當歸參朮陳皮。四君子湯。補八中益氣湯加歸地。六亦治胎脹。

孤瘞

懷孕六七月。暴下漿水斗餘。胎亦必從而墮。此元氣虛而血傷也。

胎動腹痛。忽下黃汁如膠。或如豆汁。補二

宜黃耆糯米湯十八

吐血

氣血壅養胎元。六淫七情。皆足以動其血氣。氣逆而火上乘之。故血溢於口。但火有虛焰實熱之分。治有清火補水之異。若以尋常治血之法。行血消血。動用四物。胎必墮矣。

火從胎氣上升。載血而出。生地麥冬白芍黃芩阿膠蒲黃炭香附炭。

肝經風熱。防風黃芩。

肝經怒火。小柴胡湯去半夏。加山梔生地。或投加味逍遙散。和十一補二十一

傷寒

全以清熱安胎爲主。然安胎而仍用參朮等味。則邪熱固閉。反致胎下。只要隨症用藥。勿犯胎氣。始爲合法。

惡寒頭痛。邪在表也。宜香蘇散。散八若煩渴則邪在半表半裏。黃龍湯。和十發熱躁渴。溲赤便閉。或下利赤水。邪在裏也。三黃解毒湯。寒二

熱極斑如錦紋。四物湯去川芎。加黃芩玄參知母大青葉。補七壯熱百節痛。宜柴胡葛根黃芩山梔知母大青。

熱結於胃胸口煩悶。宜涼膈滋陰丸。寒二汗下後熱不止。宜加味竹葉湯。寒二

病熱而嘔。不食而煩。宜蘆根清胃飲。寒二

下後脇熱利不止。黃芩湯。寒二

斑赤黑。小便如血。氣斷如絕。胎落而未落。宜用梔子黃芩生地青黛葛根升

麻杏仁葱白煎湯速服之。

心驚發熱。辰砂安神丸。補二

心氣虛不能主血。補心湯。補三

胃經火動。犀角地黃湯。寒二

肺受火犯。清肺飲。寒二

膏梁積熱。加味清胃散。十六

寒二

腎水虧而陰火動。加味六味丸。十五

吐衄口禁。項強類中風。加味安胎飲。三十

補五

口鼻出血。血熱衝傷胞絡也。治當涼胎爲主。衄血湯。十九

痢疾

後重不可降氣。便膿不得行血。惟順氣和血。佐以導滯消積之味。此治妊娠痢疾之要法也。

腹脹而痛。裏急後重。三黃解毒湯。加木香當歸。十二

血痢不止。熱乘大腸也。黃芩芍藥甘草。

腹重墜下。元氣虛也。胎動不安。內熱甚也。

痢下黃水。脾氣下陷也。補中益氣湯。六

黃而兼青。肝木克土也。宜平肝補土。補中益氣湯。加白芍青皮。六

黃而兼黑。水反侮土也。宜補脾腎七味丸。十一肉桂有礙於胎。可易肉果兔

絲子。然火盛者亦兼黑色。宜投寒涼之劑。

腸胃虛弱。風邪客之。

胃風湯。散五

赤白膿血不止。

黃連湯。寒八

赤白灰色泄痢痛欲死。

大寧散。一錢

腹痛胸滿。

當歸芍藥湯。補十

腸鳴後重。穀道疼痛。

蒙薑黃連丸。和六

胎氣不和。相火上炎。鬱而爲熱。亦致下利不止。

似痢而實非痢也。四物湯加黃芩白朮生地。

七

泄瀉

血壅胎元則脾陰虛。不能運化水穀。而爲泄瀉。又胎繫於腎。胎竊腎中之氣。則腎陽不克。上蒸脾土。亦致脾虛泄瀉。即或間有風寒暑濕之所感者。亦半屬於脾胃之虧。

大便虛急。此脾土燥大腸澀也。宜理脾胃與大腸。川連乾薑木香甘草。

嘔吐腹痛。手足逆冷。寒水侮土也。六君子湯。補一去半夏。加補骨脂益智仁煨鮮薑。

寒熱作嘔。肝木侮土也。異功散。加柴胡白芍生薑。有火。加沫逍遙散。補二十一

百節痠疼。因縱意口腹也。歸涼節命散。和十

臍下陰冷。理中湯異功散。加肉果木香。二十二

協熱作瀉。三黃熟艾湯。寒十三

伏暑不消。煩渴瀉水。四苓散。二十六

傷濕泄瀉。小便自利。胃苓湯。瀉四

脾腎虛弱。白朮散。和十

久瀉不已。安胎和氣飲。加減八珍湯。和二十一補

氣急筋攣骨節痛。平安散。紫蘇飲。和十九

霍亂

嘔吐傷氣。瀉利傷血。妊娠危症也。急治之。

心腹絞痛。吐痢並作。因五味積而爲痰。七情鬱而爲火。乍感寒熱。邪正交爭。陰陽相混。故致此病。香蘇散加藿香。散八回生散。散九

心躁腹痛。吐瀉並作。六和湯。和二

頭痛發熱。是風邪也。藿香正氣散。散十二

熱氣鬱結。胸中煩躁。蘆根竹茹葛根麥冬知母人參蔻。

四肢厥逆。脈息虛弱。人參白朮散。和十一

傷食

脾胃滯。則水穀不能化精氣以養胎。宜善爲消導。

腹痛而食不化。二陳湯。加砂仁。去半夏。如嘔吐。加藿香砂仁。氣滯。加木香。和八寒

吞酸嗳腐。二陳湯。去半夏。加佐金丸。十四和八寒

腹滿泄瀉。異功散。加砂仁木香穀芽。補十二

脾胃虛弱。白朮陳皮爲末。穀芽湯下。

鐘鳴

兒在胞中。口含臍帶上疮瘡。因妊娠舉臂攀高。脫於口而不能復含。故作聲。令妊婦曲腰就地。如拾物狀。使臍帶仍入兒口即止。或用鼠窟中土爲末。入麝香二釐。酒調下二錢。

墮胎

三五七月多墮胎。以三月屬心胞。五月屬脾。七月屬肺。皆藏脈。藏屬陰。陰氣易虧。故胎亦易墮。此人皆防之。而一月爲胚。形如珠露。胎元未固。又爲足厥陰肝脈養之。肝氣多鬱。肝火易動。或不自謹。胎即消而落矣。一切忿怒勞倦。皆宜慎之。若房事更在所忌。

衝任氣虛。宜養脾胃。千金保胎丸。十五六味丸。加杜仲川斷阿膠北五味。使腎氣壯而胎可固。十聖散。補三十四配。每月服六帖。

子宮爲風冷所乘。致營衛虧弱。入珍湯加桑寄生防風。五補

少陽火動。性急者多怒。面色黑而氣實。此相火太盛。不能生氣化胎。及食氣傷精。故致胎墮。四物湯加知母黃柏黃芩麥冬。七補陰虛內熱。黃芩阿膠生地麥冬白芍。

胎不長

胎元全賴血氣所養。而血氣又賴脾胃水穀之精化之也。以健脾扶胃爲主。入珍湯。加蓮肉。忌食鯉魚莧菜。五補

肝氣鬱怒而氣逆。則血不調。血不調則胎無以養而萎。逍遙散五和

氣血寒而陽不足。則胎不長。左歸飲加當歸砂仁乾薑。十三補

火邪盛而真陰損。致血熱而胎不長。加味道遙散加黃芩川連知母。十二補

鬼胎

腹脹連胸。面色或青或黃。脈濇而短。或不數月而腹大如鼓。形若抱甕。按之其冷如冰。總緣精神虛弱。妖魅乘虛而入之也。或本婦所願不遂。發爲白溼。流入子宮。

結而爲胎。均曰鬼胎。斬鬼丹。一攻雄黃丸。二攻

傷胎

驚恐跌仆。中寒中熱。毒藥毒食。皆致傷胎。胎之生死。脈未可憑。須細心體認。必實見其口舌色青。腹冷口穢。方可用下。

下血不止。胎上衝心。四肢厥冷。悶絕將死。服川芎當歸二味煎服亦穩。如腹中急痛。血從口出。亦用竹茹等味煎服。七寶丹亦可下胎。散二千金神造湯。攻十蟹爪一升。阿膠三兩。甘草一兩。

半產漏下。昏冒瞑目。因血亡而心與胞絡之火上乘也。惟養血清火。俾心氣清而不昏。肺氣清而不瞑。庶爲得法。切忌用風藥發汗。

經損而血不止。非氣虛則血熱。氣虛宜阿膠艾伏龍肝。血熱宜生地丹皮麥冬茯苓丹參當歸之類。

腸覃石瘕

肺主衛。衛爲氣。得熱則泄。得寒則泣。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫結。痕而內着。惡氣乃起。息肉乃生。漸而至大。如懷子狀。氣病而血未病。故月事不斷。應時而下。木香通氣散。散十二

寒氣客於子門。氣不通而月事不下。結硬如石。非大辛熱之劑不能消。見覲丸。

四攻

倘有孕。用香附子。醋炒桃仁。海粉。醋煮白朮。爲末。麵糊丸。服之頗穩。

盤珠集胎產症治

清 姚江 施 雯
嚴 濟 西亭全纂
洪 煉 緝菴
寧 濟 審寧

鄼縣 曹赤電炳章圈校

卷中 產後

難產

生產爲天地化育之道。本無所難。其有難產者。皆產家張皇自致之耳。能靜以待之。兒得轉身。自然產下。治法以順氣和血爲主。切勿肆用催生藥。

心懷恐懼而氣結不行。恐則氣下。懼則氣怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行。宜服紫蘇飲。散三

胞破漿水下而兒不下。速當補養氣血。如魚得水而自順矣。宜保產萬全湯。

和二再用濃煎葱湯洗其產戶。令上下之氣宣通。
胞中敗血壅滯。兒枕破。血裹兒身。致轉身不利。急服勝金散。攻五
暑月熱氣蒸人。有鬱冒冲暈之患。生化湯。和四加益元散。寒三
冬月寒氣逼人。經血凝聚而難下。宜生化湯。加肉桂乳香。和二
交骨不開。陰氣虛也。加味芎歸湯。補三開骨膏。和二十三

子趨穀道。焦鹽熨之。

橫生逆產。此因兒未轉身。母卽用力逼之。遂致橫逆也。或先露手。或先露足。
以小針刺兒手足心。用鹽擦之。兒痛卽縮入。并以鹽摩產婦腹。若眼閉心悶欲絕。取頂上髮如兩指大。用力挽之。眼卽開。或以米醋噀之。車前子爲末。酒下亦可。又兒先露手。速令產母仰臥。看生之婦。將兒手推上。徐徐正之。候其身正。煎催生藥服之。使兒生下。又三退散可下。攻六

盤腸產。子未下而腸先下。此因產母氣血虛弱。因而下脫。當大補氣血。兼以升提。參耆芎歸。加升麻少許。連服之自收。若腸乾不收。以磨刀水少許溫潤之。或濃煎黃耆湯。貯漆器內。候弗冷弗熱。將腸浸之。令溫緩之氣上熏。則腸自上。

或以草麻子四十九粒。研爛塗母頭頂。待腸收上急洗去。又五倍子白礬湯浸。亦好。子腸與子宮脫下者。同一治法。

胎死腹中。察產母腹脹口青。或舌黑。腹中陰冷重墜。嘔惡不寧。穢氣上衝。皆子死之證。速當下之。當歸厚樸陳皮酒水各一盞。煎半入樸硝三五錢。再煎十餘沸服。如在疑似之間。只服芎歸湯爲穩。

胎衣不下

血入胞中。胞脹而不能下。其症面垢頰赤。寒熱盜汗。上連胸腹脹痛。若因氣力衰憊。不能送出者。胸腹必不脹而痛。總當忍痛。正身俟之。不可任意欠伸。致血上衝心也。

血壅而胞衣不下。失笑散。攻牛膝散。攻生化湯。和十四加牛膝煎湯。送益母丸。
和十七又牛膝一兩。黃葵子一合。煎服即下。
氣血虛弱。不能送下。保生無憂散。和十五。

風冷乘虛而入。胞冷血凝而不下。牛膝散去硝。加桂附。攻。

血暈

胎胞既下。氣血暴虛。忽爾眼黑神昏。不知人事。速投人參芎歸。以回其氣。眼閉口開。面白手冷。六脈微弱。是其驗也。若惡露上行。心下滿悶。口噤而神脫者。宜破血下血。二者錯治。則立斃矣。

惡露上攻。急用失笑散。七枚米醋燉熱。和生韭汁。貯有嘴瓶內。將瓶口包裹。以瓶嘴對鼻孔觸之。極效。

敗血流入肝經。急飲童便。下生化湯。

瘀血奔心。虛火上炎。一卽濟陰丹或童便送鹿角炭。三寒清魂膏。

十一

陰血暴亡。心神無所養。而君相二火乘於肺經。則目瞑不省人事。宜四物湯去熟地。加生地白薇。補

飲酒血暈。血得酒熱而妄行也。川芎當歸葛根。使力過多而暈。和清魂散。十六

氣血兩虛。痰火上湧。二陳湯加朱砂。入

虛風血暈。當歸川芎桃仁荆芥。

厥

凡產用力過多。勞倦傷脾。孤臟不能注於四旁。心肝故足逆冷而厥氣上行也。經曰。陽氣衰於下。則爲寒厥。厥氣上行。滿脈去形。逆氣上行。滿于經絡。則神氣浮越。去身而散矣。此非急以峻補大劑與之。不能舉氣以歸元。回陽而復神。宜重用參耆。使氣血旺而神復。厥症自止。人參生化湯。如無塊痛。滋榮益氣湯。補三十七

惡露路不下

養胎餘血。溷以漿水爲惡露。氣血旺者。隨產而下。氣血衰弱。或挾寒冷。或挾風邪。遂留滯不行。上攻則爲血暈。蓄瘀則爲兒枕。日久不出。腹疼心痛。遍身發熱。五心煩熱。骨蒸潮熱。時作時止。渾如瘡狀。塊在兩脇。動作雷鳴。嘈雜眩暈。食少羸瘦。又與虛弱病相似。慎勿誤治。致成血臌等症。宜生化湯合失笑散。補而消之。和二十七

起枕散亦好。攻若惡露流注四肢腰背等處。久必腫起作痛。速用葱熨以散之。內服加參生化湯。如不速治。將所注者化而爲膿。宜用神仙迴膿散。攻十然氣血不旺。不可輕用。憎寒惡熱。氣虛也。十全大補湯。補十三日晡潮熱。血虛也。四物湯加參朮丹皮。補七嘔逆。胃氣虛也。六君子湯加炒乾薑。補一食少體倦。脾虛也。補中益氣湯。補六四肢逆冷。小便頻數。腎氣虛也。補中益氣湯。加益智仁。熨法用葱一把。搗爛爲餅。貼患處。襯厚布兩三層。以熨斗文火熨之。

惡露不絕

元氣不足。勞動傷經血也。或惡血未盡。適挾風冷。而致氣血不調。或過服固胎藥。產雖下而惡露不去。竟至二三月而點滴不已。皆宜補血順血。調氣通氣爲主。濟陰丹可加味用之。和二十七

氣血俱虛而淡紅不已。十全大補湯。補十三

怒火傷肝而血不藏。加味四物湯。補十二

胃氣下陷。不能統血。補中益氣湯。補六

脾經鬱熱。血不歸源。加味逍遙散。補十二

肝氣熱不能生血。六味丸。二補

脾虛不能攝血。六君子湯。一補

傷衝任之絡而不止。加味固陰煎。二補

血崩不止

產婦耗傷氣血。經脈未得平復。而或驚憂恚怒。或勞役損動。或鹹酸不節。傷於營衝。或氣衰血弱。不能固攝。皆成崩中。若小腹滿痛。肝經已壞。爲難治也。其餘鬱熱氣陷。以致血崩。與惡露不絕同治。

血多色紫。敗血也。當去之。留之反作痛。不可以作崩論。生化湯。加五靈脂生

蒲黃以破之。和二

形脫而汗不止。加參生化湯。渴加麥冬瀉。加茯苓。兩手脈伏。或右手脈絕。加北五味。麥冬。痰加竹瀝。薑汁。驚加棗仁。食不可進。聞藥即吐。胃虛也。宜用參湯送飯。鍋焦粉漸漸引開胃口。然後服藥。

崩下如牛膜。昏迷倒地。乃受驚而然。
惡血重來。如流水不止。昏迷不知人事。
此因未滿一月。妄行交媾。以致血不歸
經也。急用金狗脊散。和三

日久不止。宜升舉大補湯。和十
補四

血脫妄言妄見。宜升舉大補湯。加辰砂少許。以墜其心火。和十
補四

血崩如湧。口噤目斜。手足搐搦。肝經血耗。風生也。六味丸加荆芥穗。和二
補二

血來紫黑如豆汁色。怒傷肝也。宜加味四物湯。和十二

血來鮮紅。是驚傷。心怒傷肝。勞傷脾。致血不歸經也。生化湯。和十四
加味治之

鮮血來多。再加升麻白芷各四分。

頭痛

頭者諸陽之會。產後陰虛。陰虛則陽勝。陽氣上湊於頭。故頭痛。又有瘀血之氣。上
衝於頭而痛者。一宜滋陰。一宜去瘀。慎勿誤治。

身熱惡寒。感冒風寒也。生化湯加蓮鬚。和二

中氣虛。補中益氣湯。加蔓荆子少許。六補

氣血俱虛。

八珍湯。五補

陽氣虛。補中益氣湯加附子。六補

腎水不生肝木。六味丸加北五味。二補

氣滯。芎烏散。散十四

心痛

非陽氣虛寒。則瘀血上衝。生化湯加肉桂吳茱萸。可以治寒。失笑散加當歸川芎。可以行血。若指甲青黑。手足冷而過節。此真心痛。不治又惡血奔心。一絲入於心藏。卽死。

足純青心下痛。寒毒攻心也。人參白朮附子肉桂當歸。散其下寒而上寒自解。和二十四

食冷物而作痛。生化湯加消食之劑。和二十四

感風邪而作痛。生化湯荆芥防風生薑。和二十四

產後厥痛。血虛也。羊肉一觔。煮汁去肉。入當歸一兩。炒白芍五錢。炙甘草五分。再煎服之。詳內須精者

中無血塊。綿綿而痛。按之卽止。血虛也。宜八珍湯。

腹痛

實則有惡露不盡。乾血瘀積。食傷氣滯。虛則有氣弱寒阻。血虛空痛。須詳審施治。虛者固宜調補氣血。而實者亦勿得峻勵刻伐。

瘀血上衝。心腹脹滿疼痛。牙關緊急。按之愈甚。大便難而小便易。宜失笑散。

七枚 煎湯下。益母丸。即濟陰丹和二十七

乾血着於臍下。行氣破血之藥。投之不愈。知內有乾血也。生化湯加炒大黃炒虻蟲。和二十四

胸膈飽脹。惡食吞酸。手不可按。此飲食傷也。二陳湯加山楂神麴。和八

食消後而痛如故。按之痛止。或加頭痛。煩熱作渴。惡寒欲嘔等症。此中氣傷也。宜補脾胃。六君子湯。一補

六脈沉伏。四肢厥冷。內傷飲食。而惡血不行也。
神麁。攻如無惡血積食。則爲虛寒。宜補氣緩胃。

產後六七日。忽然臍腹疼痛。此由呼吸之間。冷氣乘虛而入也。

宜四順湯。熱三

腹中痙攣。客寒阻逆也。精羊肉煮汁。入當歸生薑煎服。

腹痛欲絕。脈浮弦。風入胞門也。川斷一兩。防風三錢。煎服。

衝任空虛。肝經血少。脈弦。熟地吳茱萸白芍木瓜蒺藜。

惡心作嘔。

六君子湯。一補

泄瀉。六君子湯加炮薑砂仁生薑大棗。一補

腹中塊積。生化湯加肉桂紅花。和二十

六脈滑數。瘀血成癰。生化湯加丹參丹皮。

腎氣虛寒。理陰煎。熟四胃關煎。熟五

血少而痛。黃雌雞湯。十四補

小腹痛

兒在胞中。食母之血。所餘者。結而成塊。產時塊從兒下。則無患。不下。則滯而痛。名曰兒枕痛。黑神散。攻十久而已。血化爲膿。又產後寒氣入腹。硬築。臍下刺痛。爲寒。症。宜用炒吳茱萸。勿誤治。

血化爲膿。流注關節。則成骨疽。脈洪而數。是其候也。失治。多爲敗症。宜急治之。若腹脹大。或轉側作水聲。或膿從臍出。與大便出。當用補以托之。然後用神仙迴膿散。攻十

子離其宮。血海陡虛。所以作痛。胞門受傷。必致壅腫。腫未消。因而拒按似塊。實非塊也。勿得作兒枕治。宜用殿胞煎。補四十二五物煎。補四十三

腸癩

怒鬱血虛。腸風皆致腸癩。食諸魚毒物。亦能致癩。以食鹽炒熟。熨臍。又箭鏃燒紅。淬入酒中。飲酒可愈。川芎當歸甘草淮牛膝。藁本爲末。酒調下。

腰痛

腰者腎之外候。胞胎繫於腎。產則勞傷腎氣。損動胞絡。虛未平復。風冷客之。故令腰痛。三聖散。撒二十五

惡露斷。腰重痛而下注。兩股如錐刺入骨。此血滯經絡。必作癰疽。四物湯加延胡。補七

真氣虛而邪乘之。當歸黃耆湯。加桑寄生。補十四

痛久不已。猪羊腎常食之。

腹脹善噫。諸藥皆嘔。脾虛也。焦朮米泔煎服。

脇痛

膀胱宿有停水。惡露下而不盡。氣血與水相激。故令脇肋脹痛。

痛而嘔吐。抵聖湯。攻十非薑桂之辛以行藥。勢反助其脹矣。

肝經血瘀。四物湯加肉桂。補七延胡蒲黃紅花。

肝經氣虛。四君子湯加當歸白芍。補四

肝經血虛。四物湯加人參白朮。補七

腎水不生肝木。六味丸。二補

肺金盛尅肝木。瀉白散。十六散二

身熱汗出。加參生化湯。和十四

氣血兩虛。十全大補湯。補十九

怒傷于肝。兩脇脹痛。吐血寒熱。

宜入珍湯。加柴胡丹皮。五補

遍身痛

產後血氣失升降常度。留滯關節。筋脈引急。是以遍身疼痛。甚則腰脊強硬。手足拘攣。身熱頭疼。切勿作傷寒治之。若認作傷寒。誤發其汗。則筋脈動惕。手足厥冷。變生他症矣。趁痛散加桑寄生。和十三

按之而痛緩。血虛也。四物湯加炮薑人參白朮。七補

遍身青腫。麥芽一重。牛膝一重。填入瓦罐。鹽泥封固。煅赤研末。酒下二錢。治血流諸經極效。

虛勞而指節疼痛。汗出不止。猪腎煮汁。煎當歸人參黃耆生薑韭白淡豆豉

少許。溫服。

遍身皮赤兩腿肉青

此敗血流經也。生化湯加荆芥肉桂淮牛膝。和十四

膨脹

產婦素弱。臨產勞傷。中氣多不足。胃雖納穀。脾不健運。先服生化湯和十四三四劑。七日後。即服加參生化湯。補五以助其脾氣。自無虛滿之患。或因便祕而誤服大黃。或因多食而過服消導。或因忿怒而誤服耗氣等藥。又或恣飲寒冷。凝滯惡露。以致脹者。或補氣。或健脾。或緩胃行血。當察其所因以治之。

血塊

因惡露未盡所致。或產後氣血虛弱。風冷乘之。搏於藏府。與血氣相結。因而成塊。切勿輕用散氣行血藥。

風冷搏血。生化湯加木香三分。磨冲服。

十四和二

冷濕乘虛而致。生化湯加肉桂白芷炒薑。

半月外不散。或如腫毒高寸許。身熱食減。

生化湯加肉桂蓬朮炭。

攻補並治。

十四和二

肢節肉裏結成小核。此血虛筋燥而攣結也。由多用行血破血藥以消塊。致血不養筋。而筋不舒耳。宜補水以滋肝血。養脾以運中氣。八珍湯。補五歸脾湯。補十四加減治之。

傷食

產後血氣已虛。胃中元氣不足。飲食偶有所傷。即不能運化。因成痞悶。

宿食停滯。口乾滿悶。

六君子湯加神麴山楂。

一補

怒後卽食。食停而悶。

生化湯加消食之劑。

十四和二

食消而仍痞。反作痛嘔。

脾胃傷也。六君子湯。

一補

嚥酸噯腐。加炮薑。作瀉。加升麻。

不應用補中益氣湯。

補六

消導過多。反致滿悶。不思穀食。宜長生活命丹。補四

嘔吐

氣血大虧。脾胃弱而中氣不運也。敗血乘虛而入脾受之。則不能運化精微而成脹滿。胃受之。則不能受納水穀而生吐逆。宜用抵聖散。攻十

勞傷藏府。寒邪入於腸胃。加減生化湯。和十三七日外服溫胃丁香散。和十三

嗽逆目眩。石蓮散。和十四

飲食傷脾。六君子湯。加砂仁。一補

腸胃氣逆。腸胃燥澀而氣逆也。宜六君子湯。加薑香砂仁。一補

胃氣虛寒。六君子湯。加炮薑木香。一補

寒水侮土。益黃散。散十七

肝木侮脾。六君子湯。加升麻柴胡。一補

命門火衰。八味丸。補十六

腹痛泄瀉手足冷。陽氣虛也。附子理中湯。七熱

口渴內煩少力。血少汗多不生津液也。宜生津益液湯。和三十五
吐蛇蟲。胃氣將絕也。人參白朮榧子白薇肉桂神麴。

吐膿血。又復發斑。因夏月受暑。未曾發出。至產始發。火毒熾盛。又不能盡發。故見症如此。不得不權用涼劑。人參當歸川芎麥冬荆芥元參。

大嘔大喘。風邪感於太陽也。難治。重用人參。佐以麥冬當歸白朮。少加荆芥桂枝。

嘔吐下痢。邪感少陰也。緣腎火衰微。火爲寒所驅逐。腎水亦隨寒上趨而作嘔。所謂真水虧。真陽飛越也。急用補陽之藥。入於補陰之中。引火歸原。是爲要法。宜入味丸加減。補十四

兩脇脹滿便血。風邪傷肝也。此猶可救者。因其有便血耳。不然。邪留兩脇。反成腹心之病。當歸麥冬川芎三七根。

霍亂

此由勞傷氣血。藏府虛損。食不運化。而邪復乘之。致陰陽升降不順。清濁亂於腸

胃冷熱不調。邪正相搏而然。

血塊疼痛未淨。

生化六和湯。

和三十六

血痛已除。

藿香溫胃散。

散二十八

渴而飲水。

五苓散。

鴆五

手足逆冷。

問無血痛用附子散。

熱六

呃逆

產後氣血皆傷。風冷搏於氣分。則氣逆上而爲呃。又脾胃虛冷。因食熱物冷熱之氣相衝擊。使氣不順而呃逆。

胃氣虛寒。

丁香乾薑肉桂。

胃中伏熱。

乾柿竹茹。

脾胃虛熱。

人參附子。

中氣大虛。陰火上衝。

八味丸。

補四十六

喘急

榮血暴竭。衛氣無主。獨聚肺中。故令喘急。此爲孤陽絕陰。真險候也。大料川芎湯救之。或生脈散合生化湯。補和二十三

敗血入肺。坐不能臥。生化湯合失笑散。或六君子湯合失笑散。補和二十四

污血感寒。桃仁丹皮茯苓乾薑蔓仁北五味桂枝桑皮紫蘇枳實。

水氣凌肺。人參白朮茯苓麥冬蘇子。

脾虛生痰。六君子湯加薑汁竹瀝。一

憂惱作喘。川芎當歸杏仁桑皮。

外感作喘。川芎當歸旋覆花茯苓半夏杏仁前胡。

氣短似喘。生化湯。和二十四加人參沉香。

六七日忽然手足踶臥。息高氣喘。惡心腹痛。此少陰感寒邪。而在內之真陽。爲寒氣逼越於上焦。上假熱而下真寒也。人參麥冬肉桂白朮吳茱萸。煎湯候其微冷頓服之。若至半月一月外。患此症。人參白朮茯苓當歸熟地麥冬吳茱萸附子牛膝。煎服之。皆爲難救之症。

七日內外感風寒。鼻塞惡寒。身熱頭痛重喫。宜用加參寧嗽生化湯。痰多加

花粉。或加竹瀝薑汁。冲服。惡寒。毋用麻黃。脇痛。毋用柴胡。火嗽發熱。毋用寒涼。總以調理血氣爲主。和十三

誤食耗氣藥。致氣促絕食。

人參生化湯。送飯鍋焦粉。補十三

蟬聲

敗血沖過於心。轉入於肺。氣與血並結成塊。入喉作聲。竟似蟬鳴。此症十不救一。

浮腫

敗血乘虛。流入經絡。日久化水。故令面黃。四肢浮腫。若作水氣治之。便致夭枉。宜小大調經湯。和三十八血流爲水者。下午腫甚。腫處必有血痕。或脇脹刺痛。

咳嗽小便澀。寒水侮土也。宜補脾肺。補中益氣湯。六補

氣虛。六君子湯。一補四君子湯去甘草加米仁炒陳葛子四補

六脈沉細無力。或咳嗽。或泄瀉不止。脾土虛寒。命門火衰也。金匱腎氣湯。四補

七

口渴惡寒。脈沉無力。體虛而有濕熱之積也。必上焦滿悶。宜補中行氣。兼用導水之劑。白朮茯苓陳皮木通。

外感風寒。氣血滯於經絡。或癟腹絞刺。嘔吐惡心。宜加味吳茱萸湯。散二十九

氣鬱作脹。

枳實炒白朮。

發熱

產後發熱。有傷力。有血虛。有停瘀。有蒸乳。有風寒。有多食。其病不一。狀類傷寒。切勿發汗。致成肉瞭筋惕。亡陽譫語。鬱冒昏迷等症。

血虛。

川芎當歸人參薑炭。

氣虛。

補中益氣湯。加炒薑。

吞酸噯腐。飽悶惡食。

此飲食停滯也。宜四君子湯。加砂仁山楂神麴。

四補

肝虛血燥。陰火內發。宜逍遙散。以清肝火。若用大補。熱躁更甚。

五和

陰虛陽無所依。浮散於外而爲熱。

四物湯。加炙乾薑。

七補

使天氣降而生陰亦妙。

失血多汗出。不臥。怔忡驚悸。妄言妄見。

加味歸脾湯。補三

血虛感風。

生化湯。

加荆芥穗。和二

血瘀。

生化湯。

加蒲黃五靈脂。和二

誤服寒涼之劑。以致寒氣隔陽於外。

四君子湯。加乾薑肉桂。不應。加附子。補四

肌膚發熱。面赤大渴。

血脫發燥也。當歸補血湯。補十八

敗血攻心。狂言奔走。

乾荷葉生地丹皮生蒲黃。

胸脇脹痛。腹中痞悶。吐血盜汗。或便血不止。

此諸藏虛損也。故有虛寒假熱

之狀。十全大補湯。補十九

產後潮熱有汗。大便不通。毋專論爲陽明症。頭痛惡寒。毋專論爲太陽症。頭疼。脇痛。毋專論爲少陽症。總由血氣兩虛。陰陽不和而類外感也。加味生化湯。調和榮衛。諸症自退矣。和四

口燥咽乾而渴。毋專論爲少陰症。腹滿咽乾大便實。毋專論爲太陰症。煩滿四肢冷。毋專論爲厥陰症。譫語便祕。毋專論爲胃中有燥屎。多因勞倦傷脾。運化稽遲。血枯腸燥。虛症類實病也。加味通幽散。和十一

乍寒乍熱

血閉於陽經。榮衛行之不通。則寒。血閉於陰經。榮衛行之不通。則熱。陽氣不足。陰氣上入於陽中。則惡寒。陰氣不足。陽氣下陷於陰中。則發熱。外經爲寒邪客之。則榮衛不通而發熱。內府爲冷物傷之。則榮衛不通而爲寒。

陰陽不和。四物湯加減用之。去熟地。加人參乾薑甘草。補七
陰陽不歸其分。陽下陷而陰上冒。八珍湯。補五

元氣未復而濕熱乘之。補中益氣湯。補六

血虛而渴。當歸補血湯。補十四

肝木侮土。致停食而寒熱。六君子湯。加木香。補一

風寒客於經絡。川芎當歸蓮鬚葱白。

乳孔脹痛。瞿麥通草連翹花粉甘草青皮桔梗煎服。
噯氣滿悶。飲食傷也。異功散。加山楂神麩。補十二

汗

汗本血液屬陰。陰亡陽亦隨之而走。故曰汗多亡陽。又曰。汗心之液也。血虛則腎中之陰不能上注於心。故心虛而汗出。又陰虛暴亡。陽氣無所歸附。則浮散於外。而汗不止。

產畢自汗。塊痛未除。

先服生化湯。卽繼服調衛止汗湯。俟汗止。減參耆以消

塊痛。和二十四補四十九

睡中妄言。大便不通。

加參生化湯。加麻黃根棗仁地骨皮。補十三

汗而泄瀉。

加參生化湯。加麻黃根肉果蓮子。補十三

汗多而小便點滴。

加參生化湯。加麻黃根麥冬葛根北五味。補十三

汗多亡陰。致筋脈拘急。

類於痓症。宜加味生化湯。和十四

大汗如雨。口渴舌乾。發熱而躁。

此精血乾枯。無以養心。陽無陰而不化也。黃

耆當歸桑葉合生脈散。和十三

聞響汗出。諸藥到口即吐。

脾氣敗也。用人參附子爲末。隨液嚥下。

昏冒瞑目。此血亡而火熾也。但補其血。

全生活血湯。補十五

產後汗出。多因勞倦驚恐所致也。內經云。

搖體勞苦。汗出於脾。驚而奪精。汗出

於心。恐懼汗出於肝。產婦有此諸因。故不能鎮守其液而汗出。宜健脾胃。使水穀之精灌漑四旁。則五臟冲和而汗自止。歸脾湯。補十

產後血虛。自汗氣促。爲肺氣上浮也。然血去過多。陽爲陰逼而汗出不止。宜滋營益氣湯。補三則血復。產婦所以喜也。

產後真陽不足。上氣喘急。手足厥冷。或短氣盜汗自汗。大聖散。補十如心虛盜汗。或睡中汗出。加味歸脾湯。補三氣脫自汗。作奪汗論。大汗淋漓。氣促膚冷。急以四君子湯補氣。補四若陰血下脫。孤陽上越而大汗出。此危候也。急服四君加黃耆五味子救之。

若自汗由血虛而外溢也。宜止汗散。補五十二

中風

發熱頭痛氣喘。面如朱粧。元陽不能自固也。脣青肉冷。目眩神昏。虛極生風也。口眼喎斜。氣血俱虛。不能榮養筋脈也。汗出不止。血虛腠理不密也。角弓反張。血虛體弱。風入諸陽之經也。牙關緊急。口噤不開。血氣空虛。風入頸頰口之筋也。筋脈

拘急而爲癇。弛縱而爲瘓。陰血去多。陽火熾盛。肝木枯而筋無所主也。頑瘡不仁。贏乏少氣。藏府虛損。風冷客于經絡皮膚也。或肝經血燥而挾風熱也。總宜大補。氣血爲主。或加荆防薑附鈎藤天麻一二味亦可。切忌薑葱并風藥以致不救。

氣虛。
四君子湯加味用之。
補四

血虛。
四物湯加味用之。
補七

氣血兩虛。
十全大補湯。
補十三

如血痛未除。
生化湯加味用之。
和四

遍身疼痛。手足癱瘓。
血虛有風痰。生化湯加薑汁竹瀝。
和二

陰虛內熱。熱盛生風。
四物用生地加丹皮麥冬。
補七

搖頭馬鳴。身反折。氣如絕。汗如雨。兩手摸空。不治。

不語

心者。君主之官。神明出焉。外應於舌。舌者。聲之機。產後虛弱。致敗血停蓄。上干於心。心竅閉塞。故神志不能明。又心氣通於舌。氣閉。則舌強不語。有熱痰迷塞心竅。

則不能言。腎之別脈上入於心。繫舌本虛則不能言。脾之脈是動病舌本強不能言。大腸之脈散舌下風熱入於大腸則不語。

目閉不語。

痰氣鬱滯也。孤鳳散。生白礬一錢。熱水調下。若瘀血壅滯。琥珀散。

琥珀花蕊石鬱金朱砂研末。童便好酒下一錢。

血氣痛上衝於心。生化湯。和二十四

氣閉不語。

七珍散。撒三十一

風火。加味道遙散。補二

舌出不收

熱壅於心也。丹砂未傅之。暗擲盆盞作墮地聲。驚之即收。

驚悸

血虛心氣不足也。心虛而受風邪。遂成驚悸。名曰心風。其狀目睛不轉。其脈動而弱。宜大補氣血。若作風治。速之危矣。

怯怯然如人將捕之。心血虛也。塊痛未除。且服生化湯。十四塊消痛止。宜加減養榮湯。補十五

發狂譫語

敗血衝心。肝火上炎。痰結於胸。熱入血室。皆致譫語顛狂。

神不守舍。八珍湯加茯神麥冬棗仁薑棗補五

寒熱如瘧。晝清夜妄。熱入血室也。琥珀地黃丸。加柴胡。攻十一一靈三聖散。孩

脇痛便血。肝血虛火上炎也。加味逍遙散。補十二

因驚悸悶。用辰砂二錢研細。乳汁調和。另用白頭活地龍一條。入熱酒滾二三沸去之。入辰砂重湯再煮。分三服。

發斑

敗血流入臟腑。充滿於肌膚。旁連於四肢。熱結留注。轉還不得。故發斑。十無一生。

見鬼

肝藏魂。心藏神。血虛心失所養。肝火上炎。神魂不能守舍。是以妄言見鬼也。
敗血停心。煩躁錯亂。小大調經湯。加薄荷。_{和三十八}
心血虛損。生化湯。加棗仁柏子仁茯神麥冬。_{和三十九}
_{十四}

煩渴

去血多則津液少。故煩躁而發渴。宜滋陰降火。可少加童便。

餘血奔心。

荷葉散。_{攻十}

六

陰虛火動。

人參當歸湯。_{補五}
_{十四}

氣虛而渴。

生脈散。_{補二十三}
_{加蓮子。}

血虛而渴。

四物湯。加花粉麥冬。_{補七}

頭眩腳弱。

飲食無味。氣血俱虛也。參地麥冬甘草花粉糯米薑棗。煎服。

咳嗽

有外邪。有內傷。有瘀血。皆致咳嗽。惟吃鹽太早。效者難治。

惡血流入肺經。面赤發喘。

生化湯合失笑散。

和攻二十七

鼻塞聲重。

生化湯加杏仁。荆芥。

十四

陰血虛。

四物湯去白芍。加人參。白朮。

補七

頭痛加蓮鬚。

陰水不足。

火冠肺金。

六味丸。加麥冬花粉。

補二

肺虛外感風寒。

補中益氣湯。加紫蘇桔梗。

補六

胃虛不生肺金。

異功散。加當歸。白芍。

補九

半月外乾嗽。

四物湯加訶子。皮菝苓。甘草。阿膠。

補七

百日內感風。重嗽汗多。

宜加參寧肺。生化湯。

補十五

口鼻黑衄

氣血大虛。惡血乘虛流入諸經。不能復出。故爲衄。五色最忌黑。口鼻屬肺胃之部。口鼻間氣色現黑。肺胃敗矣。又虛火載血上行。不循經度。溢出孔竅。肺胃爲熱逼。

熱極反從水化。致口鼻變現黑色。亦危候也。速用童便淮牛膝丹皮澤蘭二地倍人參大劑救之。止衄之法。取產婦項心髮一縷。紅線一縷。繫中指節。奇驗。

瘡疾

半月內外寒熱往來。或晝或晚或夜。寒熱交作。應期而發。或一日二三度。其證類瘡。總由氣虛則寒。血虛則熱。胃氣虛則惡寒。胃氣下陷則寒熱往來。惟大補氣血。其病自退。

污血。生化湯加生蒲黃乾荷葉澤蘭淮牛膝。十四

飲食停滯。六君子湯加山楂神曲。

補一

勞倦傷氣。補中益氣湯加川芎。

補六

氣血俱虛。十全大補湯加炮薑。

補十三

元氣脫陷。重用人參加附子。

鬱怒傷脾。逍遙散。

和五

外感風寒。生化湯加荆芥防風藿香生薑。和十二

瀉痢

惡露不行。滲入大腸。則洞泄不禁。下青白黑色。其餘非食積則寒濕。再則脾胃弱。肺氣虛。皆能致瀉。若痢亦由惡血滲入大腸。積滯而成。謂之產子痢。其病甚危。又久痢身體羸弱。謂之虛羸痢。氣不順而下痢。謂之氣痢。又有外感六溼。內傷飲食所致。總當兼氣血虛處治之。切不可用治痢常法。以致不救。

惡露未盡而泄瀉。生化湯加茯苓。俟惡血盡。然後或補或消而治之。和二若虛弱不能支持。加人參。

完穀不化。生化湯加茯苓。訶子皮。蓮子生薑。不愈。加人參。和二

乾渴。胃氣虛。不生津液也。生化湯合生脈散。和二十四

食物不化。常噫。生化湯加茯苓。神麴。山楂。砂仁。熱入

胠肋填脹。腹中痛。流注無定處。產未滿月。風邪乘虛襲之。留於肓膜。散於腹肋。故腹中陣陣作痛。水穀不化。脹鳴泄瀉也。宜調中湯。熱入

脾胃虛弱。血塊未散。先服生化湯。加木香。砂仁。益智仁。血塊已除。六君子湯。

加肉果益智仁。再加升麻柴胡。以提胃中清氣。

餘血不盡。滲入大腸。洞泄不禁。服的奇散。荆芥大者四五穗。於盞內燒炭。不可犯油火。入麝香研末。清湯調下。

年久脾泄不止。

參苓蓮子飲。補十五

產後七日內外。患赤白痢。後重頻併。最爲難治。欲調氣行血。推蕩痢邪。又慮產後元虛。欲滋榮益氣而大補產弱。又慮轉助痢邪。若行不損元。補不助邪。惟生化湯減黑薑。加茯苓木香。爲善消惡露。兼行痢積。並治而不悖也。

厥逆躁不得臥。殊難救治。

人參當歸荆芥。

積滯腹痛。人參當歸白芍紅麴醋炒升麻甘草益母草。如惡露未盡。加乳香沒藥砂仁阿膠。

渴而不喜冷飲。

胃氣虛。不生津液也。七味白朮散。補十五如夜間發熱。腎水虛。

不能潤也。

六味丸。

二補

痢而嘔吐。六君子湯。加藿香。補一如胃火盛。用活田羸麝香。搗和掩臍。後用滋陰清胃之劑。

血崩痢不止。加參四物湯。補七

脫肛。氣血兩虛也。加參生化湯。補五十八

蓐勞方

產後虛羸喘乏。乍寒乍熱。病如瘡狀。此氣血不充周也。宜大補氣血。

肝腎虛弱。口乾咳嗽。陰虛火動也。宜六味丸。加北五味麥冬。二補

脾弱血虛。月水不調。八珍湯。補五

脾虛血燥。皮膚癩癩。加味道遙散。補十二

虛汗不止。母雞湯。補十九

四肢疼痛。外邪感也。石子湯。和四十二

虛寒腹痛。黃雌雞湯。補十一

外熱內寒。外邪感也。理陰煎加減治之。四熱

陽虛內寒。理陰煎羊肉湯。補六十

大便不通

去血過多。大腸乾涸。或兼火爆。總勿用峻利之劑以亡陰。而致便祕愈甚。

血虛生火。

四物湯加麻仁。補七加味六味丸。補十五

氣血俱虛。

十全大補湯加肉蓯蓉。補十九

飲食如常。腹中如鼓。

八珍湯加桃仁。補五

脹滿欲去不能。

結在直腸。宜猪膽汁導之。

小便不通

產後亡血。或又多汗。且勞倦脾傷。不能爲胃行其津液。則其生化之氣不運。滲泄之令不行。是以上氣不行而有咽乾燥渴之症。下氣不行而有胃腎關閉之候。治當助脾益肺。升降氣血。則氣血流行。陰降陽升。自然津液充而小便利。

污血阻滯。

瞿麥蒲黃。

血虛熱鬱。

六味丸逍遙散。和五補二

熱氣客於脬中。

茅根湯。寒二

腹脹如鼓。悶亂不醒。

冷氣積於胎前也。用食鹽填入臍中。搗葱白爲餅。約一

指厚置鹽上。用艾火隔葱餅灸之。覺熱氣入腹內。即時便通。

濕氣感於胞絡。下陰腫脹。小水點滴不出。此腎虛膀胱之氣亦虛而不能化也。人參白朮茯苓肉桂米仁熟地車前子。

血從小便出。熱邪搏血。滲入胞中。而成血淋也。白茅根瞿麥車前子通草鯉魚水煎入石首魚石末服。

大小便不通。陰血不足。津液枯燥。宜服牛乳人乳。或惡血流入小腸。閉塞水道。小便不通。流入大腸。瘀積成塊。形如雞肝。肛門燥結。大便不通。宜服生化湯。加桃仁麻仁郁李仁瞿麥等味。和二十四

便血

心氣虛則小腸不能制而血流。脾氣弱則大腸無移蔭而血下。故二便出血。當責之心脾二經。

血氣虛而熱乘之。故血隨小便而出。血熱則流。故滲入胞內。用髮炭滑石末。地黃汁調下。

面黃脇脹少食。此肝木乘脾土也。加味逍遙散。補二

驚悸不寐。加味歸脾湯。三

大便下血。緣六淫七情致傷元氣。陽絡外傷而然也。

腸胃虛弱。六君子湯。加升麻柴胡。若虛寒去升柴。加肉果。如怒動肝火。加當

歸白芍。去升麻。

膏粱積熱。四物湯。加丹皮山楂。補七

大腸風熱。四物湯。加荆芥防風。同上

大腸血熱。四物湯。加丹皮槐米。同上

遺糞

腎虛無約束也。都氣飲。補二

脾腎不足。補中益氣湯。補六

脾腎虛寒。八味丸。補四十六

小便不禁

非肺氣虛而不能約制。卽腎氣竭而虛熱移於膀胱也。

氣虛不能制。

人參黃耆桑螵蛸鹿茸牡蠣赤石脂。

脾胃虛寒。

七味丸。補三十一

尿脬破損。猪羊胞煎湯。入人參黃耆當歸熟地陳皮茯苓桃仁。於極饑時飲之。然須急治。緩則不能成功也。又補脬飲。用生黃絲絹一尺剪碎。白牡丹根皮白及各一錢。俱爲末。水一盞同煮至絹爛如錫空心頓服。服時不得作聲。作聲則不效。

膀胱陰虛。補六 楊中益氣湯。加山茱萸山藥桑螵蛸。以補肺腎。則小便自不淋瀝。

乳汁不行

乳汁乃氣血所化。故人衝任之脈盛。脾胃之氣強。則乳汁多而濃。衰弱則淡而少。治宜壯脾胃。滋化源。

氣血壅閉不行。宜通草土瓜根漏蘆以疎之。

血氣衰弱不行。宜猪蹄鯽魚生地當歸之類以潤之。玉露散。補六加味四物湯。十一通乳湯。和四俱可補血以通乳汁。

乳汁湧出

非氣血虛而不攝。則滿而流溢。當以人之強弱。乳汁之濃淡。驗其虛實也。

肝經血熱。加味逍遙散。浦二十一

肝經鬱怒。加味歸脾湯。補三

漏蘆散。撒三

氣血虛弱。十全大補湯。浦九

乳癰

足陽明之脈。從缺盆下乳內廉。足陽明之經。夾脣上行。至胸中而散。其經爲邪熱攻衝。則血爲之擊搏。氣爲之留滯。擊搏則痛作。留滯則腫生。此由乳汁壅積。與氣相擊搏故也。或忿怒所逆。鬱悶所遏。厚味所釀。以致厥陰之氣不行。故竅不通而。

汁不得出。治法宜疎厥陰之滯。清陽明之熱。青皮生甘草節瓜蔓銀花當歸沒藥。皂角橘葉橘核少佐以酒。隨意消息可也。

乳懸

瘀血上攻。忽然兩乳伸長。細小如腸。直過小腹。痛不可忍。用川芎當歸。煎濃汁。不服時。又用此二味燒烟。令病人吸之。使瘀血消而乳自愈。

玉門不閉

元氣素弱。失於調養。以致血氣不能收攝故也。

氣血虛弱。

十全大補湯。補三十九

腫脹焮痛。

肝經虛熱也。加味道遙散。補一二

產戶痛

起居早。感風邪也。用祛風定痛湯。四生地當歸茯苓川芎荆芥防風肉桂大棗。

陰蝕

此因心神煩鬱。胃氣虛弱。致氣血留滯也。當補心養胃。川芎當歸白芍地榆米泔水五升煎二升。熏洗三夜。又荆芥薄荷柏葉煎湯洗淨。後用倍子青黛黃丹水粉。爲末摻之。如瘡水乾燥。用香油調末塗之。

陰中溼爛

多由七情鬱火。濕熱下注。或腫或痛或癢。先以百草煎濃湯。乘熱熏洗。或五倍子白礬葱白煎湯熏洗。或甘菊苗葉。不拘多少搗爛。以百沸湯淋汁熏洗。搗乾用烏賊骨末炒黃。水粉煅過爐。甘石煅淬童便。加冰片少許。研細末摻之。

腫痛潰爛。四物湯。補十二加梔子丹皮膽草荆芥。或加味逍遙散。補二

陰脫

此因分娩損傷胞絡也。治宜升補元氣。固澀真陰。

分娩過勞。氣陷而脫。加參生化湯。散五或歸脾湯。補三外用硫黃海螵蛸北五味。爲末傅之。

陰虛滑脫。

加味固陰煎。

二

氣虛下陷。

補中益氣湯。

補六

或十全大補湯。

補九

陰突

血虛氣陷。不能固攝。陰中突出。如芝如菌。或挺出數寸。謂之陰挺。

血虛陰挺。

四物湯。

補七

冲入煅龍骨末少許。空心連進二服。外用蛇床子五兩。

烏梅十四枚。煎湯熏洗。

鬱熱下墜。

加味道遙散。

補十二

或龍膽瀉肝湯。

寒十

胎產症治 卷中 陰突

四四

