

新刊婦人良方補遺大全卷之二

仁集

以衆疾門

經脈不調衆疾生焉故以次之

臨川陳自

良甫編集

極一方總論第一

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象效法之有類原茲婦人之病與男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治不亦言之深乎但三十六病產昏一門男子無之其如外傷風暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉與丈夫一同也依源治療可得而知之

○產寶方論第二

古者治婦人別著方論者以其胎妊生產崩傷之異况婦人之病比之男子十倍難療蓋女子嗜慾多於丈夫感病倍於男子加之慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深治之難產况懷胎妊娠

而挾病也不特避其毒藥仍須審其虛實冷熱而調治之無使妄投湯劑以致夭枉

○博濟方論第三

夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣則風冷乘虛而干之或作之於經絡或循入於腹中內受風邪脾胃虛弱故不能消於飲食也食既不充榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤若大腸氣虛則變為下利若流入關元致絕子嗣隨其所傷而變成疾醫經云凡婦人三十六種病皆由子臟冷熱勞損而挾帶下起於胞內也是故衝任之脈為十二經之會海婦人之病皆見乎少陰太陽之經而候之

○寇宗奭論第四

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者令豪是之家居與室之中處惟慢之內復以帛蒙手臂既不能行望色之神又不能彈切脉之巧四者有二關焉黃帝有言曰凡治病察具形氣色澤形氣相得謂之

可治色澤已悖謂之易已形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之於能盡其術也此醫家之通患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁逮為醫業不精往往得藥不肯服似此甚多鵠鶩見齊候之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已

○通用方序論第五

夫通用方者蓋產前產後皆可用也或一方而治數十證不可入於專門皆是名賢所處世之常用有效之方雖曰通用亦不可刻舟求劍按圖索驥而膠柱者也

加減四物湯

治婦人經血或先或後或多或少或以疼痛不一腰足腹中

痛或崩中漏下或半產惡露多或停留不出姪娘腹痛下血胎不安產後塊不散或亡心過多或惡露下服之如神。張聲道云此方治婦人

百疾只是四物湯加茱萸煎服若陽臟少使茱萸若陰臟多使茱萸與
興周端仁即中傾赴省試照曠一鄰案出場云其本醫家凡婦人百病
只是四物湯加茱萸無不效者謹以此為報徐明仲方加香附子

當歸

白芍藥

川芎

陸氏云川芎

生乾地黄洗焙生必用方熟者知劑亦然本草云男子宜熟者女子宜生者合用生者為是

右等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分去滓取六分清者帶

熱服食前。若平常血氣不調及常服只用本方日二三服。治

經血凝滯腹內血氣作夜加我戎官桂等分用之王頌云熟地黃滯血安能止

補不若用五如因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎。

若胎動不安下血每服加艾葉五七片更加葱白阿膠末減四味

之半當歸用小半如疾勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞煎

艾一塊如雞子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四服一日

令盡一方有粉日二三服至二膈為一膈日以前產後每日可

一二服。如氣虛弱血海不調服一月不妨。如產後被驚風帶

種七積滯敗血一月內惡物微少敗血作病或脹或疼胸膈脹悶

或發寒熱四肢疼痛延胡索沒藥香白芷與四物等分為細末

淡醋湯或童子小便酒調下。如血風於產後乘虛發作或產後

傷風頭痛發熱百骨節痛加荆芥穗天麻香附子石膏藿香各一

分四物料共一兩中加之每服三錢水一盞煎七分服。如虛熱

心煩與血相搏口舌乾渴欲飲水者加括樓根一兩麥門冬去心

三分。如腹刺痛惡物不下加當歸芍藥一分。如血崩不止加

熟地黃蒲黃各一兩。嘔逆加白朮人參各半兩。若寒熱往來

加炮了乾姜牡丹皮各一分。因熱生風加川芎一分柴胡半兩

。腹脹加厚朴枳實各一分身熱脈數頭昏項強加柴胡黃芩各

半兩。如臟腑滑泄加桂心附子炮各一分。若虛寒不睡加竹

葉人參各一分。煩躁引飲頭痛大渴加知母石膏各半兩。若

水停心下微吐逆加大猪苓防已各三分同煎。若平常此小虛
肢體瘦倦月信不調只用生姜薄荷如常煎服。此是婦人常服之藥益味寡而
性緩効遲而功深。一方治婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加乾薑

名四神湯。治老人風秘加青皮等分煎服。一方治小便澀大

便秘加大黃桃仁去皮尖炒黃減半煎。一方治血痢不止加阿

膠艾葉煎。陳氏方治痢疾腹痛。一方治婦人腹痛作聲經脈不快

加熟地黃一倍添桂心半倍煎治瘡疾加荆芥酒煎常服。一方

添柴胡各五神湯柴胡大能補虛退虛熱。一方以四物湯共四

兩為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心米飲下三四十圓以療年

高婦人白帶又良驗也請詳用之。一方四物湯共四兩加耳草

半兩細末煉蜜為圓每兩作八圓酒醋共半錢溫湯同化調停下

名當歸煎去敗血庄好血如人行五里再進一丸無時候用生地

此藥不知起於何代或云始自魏華佗按東氏云佗之術精微方

類單省傳稱佗術鍼灸不過數處千金方云自三代以來醫方藥

論未有如此詳備者其間有漢晉名公論方今產寶方乃宋梁時

節度巡官魯膺所撰其中有四物散。國朝太平興國中修入聖

惠方者數方自後醫者易散為湯雖無傑特之功但善明者若馭

良馬以意驅策之則隨意無所不至自可珍也自

皇朝以來名醫皆於此四物中增損品味隨意虛實寒燠無不得其效

者然亦非止婦人之疾可謂而已

○懷娠產前後加減良方

川芎洗 當歸 桂心不見 白芍藥洗

右四味各為細末取淨一兩各隨病證加減用。產前初覺胎動川

芎為藥各半錢米飲下。臨產腹痛甚川芎為藥當歸各半錢桂

末一錢溫酒下。產後惡露未快川芎當歸各半錢童子小便

調下仍時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄

調下仍時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄

調下仍時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄

調下仍時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄

調下仍時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄

調下仍時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可妄

投藥恐逐血過多則心虛氣劣三日內只服當歸川芎末各一錢
童便調下日三服三日後只服四順理中圓空心童子小便吞下
七日內補虛當歸川芎末各一錢童子小便或米飲調下 七日
外方可服補藥補得太早則留住惡血○純平善四味各半錢童
便調下○產後頭昏目 暈川芎為藥當歸末各半錢童子小便調
下未滿月已滿月四味各半錢水一盞煎至八分溫服○腹痛當
歸末一錢桂心末半錢童子小便調下○心胸煩悶當歸為藥各
一錢童子小便調下○惡露過多桂心為藥當歸各一錢童子小
便調下○大便冷用理中丸水一盞煎八分溫服

佛手散治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾總產了未進別物即先
服此藥能除諸疾逐敗血生新血

川芎二兩

川當歸三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服○一方為粗末每

服四錢水七分酒三分同煎至七分熱服將產前先安排此藥將
兩服藥末煎之產子速進之三日內日二服三日外日一服○一
方名弓歸湯只是此二味等分以咀水煎專治失血傷胎去血產
後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心
煩眩暈悶絕不省人了○頭重目暗卒頭欲倒悉皆治之若產後眩
暈宜加芍藥服之○一名桂香散治產後腹疼不可忍者加桂心
等分酒與童子小便合煎服之立效○一名當歸湯治妊娘子死
或未死胎動不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死服之便
下若未死其胎即安此經累效萬不失一○一名琥珀散臨月服
之則縮胎易產兼治產後諸疾○一名羊肉湯治虛損羸之腹中
疼痛往來寒熱吸吐少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用
精羊肉一兩姜十片水二盞煎至六分溫服○一名君臣散治婦
人室女心腹疼痛經脈不調用水煎服若妊婦胎氣不安產後諸

婦人良方二卷
婦人良方二卷
五

疾加酒煎服。一名當散治婦人血氣上喘下腫二味等分為細末每服二錢空心煎艾湯調下。又治產後損身血衝心及腹脹氣絕者神驗。雞生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末四錢煎至一盞以上分為二服未效再作。產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生姜自然汁半合煎服。又此藥兼治臟毒每服一錢半入炒槐花末半錢水一盞煎至四分無時候服三日取下血塊即愈。如產後頭痛加荆芥煎。如吐血亦宜服。

論丹參散主治。出明理方論。

四物湯婦人多用者以其不問產前產後經水多少皆可通用惟丹參散一味其主治頗相類何者以其能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脉大類當歸地黃芍藥川芎也。

丹參散

治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡

血不下並治之。蒸治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼。

丹參不以多少去土切。

右為細末每服二錢溫酒調下經脉不調食前服冷熱勞无時候服。

勝金丹

方名不換金丹治婦人諸虛不足。治婦人久虛無子產前

產後一切病患。蒸療男子下虛無力。此藥能安胎催生。妊娠臨月服五七圓。產時減痛。婦人無子是子宮冷。如服二十圓。男女自至。又治積年血風脚手麻痺。半身不遂。赤白帶下。血如山崩。及治產後腹中結痛。吐逆心痛。子死腹中。透臍痛。氣滿煩悶。失蓋汗不出。月水不通。四肢浮腫。无力。血勞。虛勞。小便不禁。中凡不語。口禁。產後痢疾。消渴。眼前見鬼。迷暈。敗血上衝。寒熱。頭痛。面色痿黃。淋瀝。諸疾。血下無度。血痢不止。飲食无味。產後傷寒。虛煩。勞悶。產後血癖。產後羸瘦。凡婦人眾疾。不論年月日深。並皆治之。

牡丹皮

當歸

白茯苓

人參

白微

白芷

白芍藥

黃藥本

石脂

赤白川芎

婦人良方卷之二
婦人良方卷之二

桂心 延胡索 白朮 沒藥 甘草各一分 沒藥各一分 甘草各一分

右十五味等分為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓溫酒化下初產了並用熱醋湯下空心食前○此方係王承宣祖傳渠家凡

婦人懷身便服此藥甚神妙常服尤好係在京師於能家傳到

金釵煎專治婦人諸疾產前產後風虛痼冷手足癱痺且淋酒化下

血風頭痛產後中風荆芥酒化下產前產後痰涎咳嗽桑白皮湯下經脈不調或前或後或多或少血氣攻刺腰脇重痛溫酒化下經脈不通產後血喘蘇木人參煎湯化下血崩不止赤白帶下側柏燒灰調酒下妊娠將理失宜或因驚動漏極妨悶漏胎下血膠艾煎湯化下臨產艱難乳香研酒化下子死腹中胎衣不下用朴消三錢重研細童便和酒化下產後勞倦傷敗血氣如瘧寒熱通身疼痛喘嗽盜汗地黃烏梅煎湯化下產後敗血浮腫姜汁少許和酒半盞化下產前服之則安胎臨產亦易產也後則逐出惡血不生諸疾用童便和酒化下常服活血駐

額大腫血海升降陰陽滋養榮衛或子宮久冷多病少子能久服之

效立致忌生冷油膩魚腥猪母白猪一切毒物

當歸 白芍藥 川芎 石斛酒炒 香附子炒 糯米各二兩

降真香細熟 地黃特秦元 具母去心 羌活 桂心

粉草 乾姜炮 北細辛 牡丹皮 大豆卷炒 茴香炒

枳殼去穢 延胡索 白芷各一分 人參 木香 石膏煨

沉香 黃苓各半 川椒三分 交加修製八兩

右為細末煉蜜為圓每兩作七圓依前服餌常服溫酒化下樽奉腕

交加散治產前後百病治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多

血少結聚為癥產後中風尤妙

生地黄 一斤研取自然汁 生薑 十二刀研取自然汁

右將地黃汁炒生薑滓姜汁炒地黃滓各稍乾焙為細末每服三錢

溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可缺

婦人良方卷之二
婦人良方卷之二

艾加散 治榮衛不和月經湛濁大能滋養血絡逐散惡血臍腹撮痛
腰腿重墜血經諸疾並皆治之

生薑兩十二 生地黃味製如前法 白芍藥 延胡索醋紙裹煨令熟
當歸 桂心各一 紅花妙用惡血 沒藥別研各 蒲黃紙炒

右為細末每服二錢溫酒調下如月經不依常時木煎酒調下若腰
疼用糖棗子煎酒調下無時候

玉露通真丸 治婦人諸疾 出經驗婦人方

半夏姜汁 人參各半 食茱萸醋 製厚朴各刃 澤蘭華半 甘草
蟬蛻炒 白芍藥 石膏 蚕蛻紙用如元以蚕 白朮

當歸 羌活 熟地黃焙 白茯苓各二 防風 乾薑
栝子仁 蒼朮 白薇 木香 黃耆 川牛膝

附子 白蕪夷與蟬蛻同炒然此方无 川芎 藥本各一
川椒 苦梗各三 白芷一

右為細末煉蜜為圓每九錢重分作十圓切記煉蜜無令太過及生

男子婦人諸虛不足狀如勞疾黃耆煎酒下。血氣痛燒秤銼淬

酒下。產前安胎用醋湯下產後諸疾用酒或鹽湯下。產前產

後瀉用米飲送下。男子婦人牙疼用半圓指疼處良久鹽湯嚥

下。產前產後血悶童子小便送下。經脈不調用紅花煎酒送

下。產後風毒生瘡芥茶下。冷痰翻胃醋心乾醫下。婦

人子宮久冷崩漏赤白帶下用童子小便米醋好酒一處煖熱下

補中圓 常服

人參 陳皮各半 白朮 地黃各一兩
川芎 白芍藥 黃耆 當歸

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服五七十圓溫水下

二聖散 產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不下方

川芎 羌活二味各等分

右為細末每服二大錢水七分盞酒少許煎七沸溫服

二聖大寶琥珀散

生地黃斤 生薑一斤二味修製

川芎 牡丹皮 芍藥 義茂 蒲黃 香白芷

羌活 八味各炒 桂心 不見 熟地黃炒

右十味各一兩同煎二味為細末於斃合內收之于後使婦人冷氣痛

天血海不調膈氣炒薑酒下二錢。產後胎衣不下暖酒調下二

錢。產婦臨月日進三服則滑胎易產溫酒調二錢。產後血犯

心眼見兒神用童便半盞酒半盞同煎調二錢。服人久服則顏

色紅白無血來相攻一生無子者久服則有孕。此藥治療婦人

百病空心日午食前日二服產後百病並服暖酒調下

木香半斤 三稜 義茂 白朮各一兩 枳殼去穢炒 黃

白茯苓 當歸 延胡索 人參 熟地黃 羌活 粉草各半

右為末米糊圓如梧桐子大每服十五圓酒下胎前常服溫酒下

湯使于后。胎前渾身并脚手痛炒薑酒下。胎前胎前胎前

胎紫草煎酒下。胎前嘔逆吐食糯米飲下。胎前飲食不得

身倦怠豆淋酒下。胎前渾身發熱甘草湯下。胎前咳嗽煨姜

鹽湯下。胎前頭痛煨葱茶下。胎前產後瀉紫蘇姜酒下。催

生胎衣不下嚼葱白三寸煨酒下。產後赤白痢乾姜甘草湯下

產後下血不止燒紗帽灰一錢調酒下先燒產後渾身虛腫陳

皮去白焙乾浸酒下。頭疼薄荷茶下酒常服飯飲下。赤白帶

下燒棕爛灰三錢調酒下。久年血氣成塊攻心痛溫酒下炒薑

酒下及良薑浸酒下皆可。婦人室女紅脉不通煎紅花蘇木酒

下。經脉不調或前或後或多或少或煎當歸酒下。大小便秘結

燈心煎湯下。乳汁不行苦蘘煮猪蹄羹下產後腰疼煎芍藥酒下

沉香燒 益榮衛滋氣血經脉不調心忪倦之腰膝疼痛赤白帶

下五心煩熱面無顏色血海久冷胎孕不固憎寒壯熱婦人諸疾並能

新刊婦人良方補遺大全卷之二

仁集

臨川陳自明良甫編集

鰲峯熊宗立道軒補遺

松軒葉文昊顯章類校

衆疾門

○中風類

此一卷論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口禁口眼喎斜風眩頭
痛血風心神驚悸癩狂骨節痛風血風走注癢癢癰疹風痰脚氣腰痛
諸疾已上諸證雖各有方論亦要先明其大體察脉之虛實辨証之冷
熱相人之強弱入臟入腑在絡在經首以爲方調治未要猛浪用藥今
之治法先宜順氣然後治風萬不失一蓋有中風中寒中暈中痰中氣
皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫者不可不詳而究之
如中風若依中氣治之十愈八九氣中若依中風治之十無一生所以
疑惑之間不問中風中氣首以蘇合香圓麝香煎五積散如中痰則有

參蘇飲如中寒則有理中湯如中暈則有白虎湯如的然見得是中風宜三生散香薷散排風續命風引大小竹瀝大八風湯至寶丹牛黃清心圓辨其冷熱虛實而投之未有不安者也然此疾積襲之久非一日所能致今人服藥三五服便責無效其責醫者亦速矣正宜大劑又服方有效孟子曰七年之病求三年之艾也

婦人中風方論第一

夫中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛風賊害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後重沓因體虛則發入臟腑俞七皆在背中風多從俞入隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明証治如眼開口閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者死

至寶丹

蘇合香圓

五積散

加香煎牛黃清心圓

方見和劑

大八風湯

方見偏枯第七篇

治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及風

入五臟等証

詳見和劑方

白鮮皮

白木

白芍藥

桂心

川芎

當歸

防風

杏仁

去皮尖

甘草

白茯苓

麻黃

去節

獨活

右咬咀每服三錢水一盞半生姜四片煎至八分去滓溫服無時候

傳云癸丑春有一婦人年四十二其三証語言氣短足弱行得數步則口若含霜七十日內三吹經行則口冷頭目眩暈足冷則透

心冷痛每行則口中冷氣不相續有時鼻中熱面赤氣熱而熱身

軀不仁不能行步手足不隨不能視物冷痺骨疼有時悲傷憂如

前夫相隨則上氣奄然而極心驚志意不定恍惚多忘却食如

此佳一年許醫者投熱藥則面赤熱而熱氣滿胸中咽中窒塞悶

絕長冷藥則瀉又一醫者以十全湯服之則發煩躁心驚而吐一

醫以和湯服之竟面上與腹中如火燦心愈驚欲吐不止大便

秘裏急後重求僕診之六脈弦緩喜見於春此是可治之疾未便

便不通加大黃心腹脹如苦亭壅滑石膈上壅滯氣促加半
夏川升麻天門冬知母思安一人年六十忽中風不省人事无汗
脉溢關此真風脉先以生薑散六
服寬氣下痰次以木香藿散而愈

附子理中湯

治五臟中寒口禁四肢強直失音不語昔有武士守邊

大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂醒

大附子炮

人參去芦

乾薑炮

甘草炙

白朮等分

右細剉每服四錢水一盞半煎七分去滓不以時服口噤幹開灌之

馬觀文夫人於七月間病氣弱倦念四肢厥逆思寒有汗少飲合
一醫謂伏暑一醫作虛寒治皆无效召僕診之六脉雖弱而兩關
差甚焉問是何証僕曰六脉雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦脾
也脾胃既寒不但有此証必有腹痛吐瀉今四肢厥冷脾寒四枝
是脾胃虛冷無疑焉曰未見腹痛吐瀉之証合用何治僕曰宜附
子理中湯未服藥間旋即腹痛而瀉莫不神之即投此藥而瘳

續命湯

治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手

足戰掉語言蹇澁肢麻痺神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣
不能屈伸骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚氣緩弱久

服得瘳又病風人每遇天色陰晦節候更變宜預服之以防瘳

麻黃去根

防己

人參去芦

黃芩

桂心

甘草

白芍藥

川芎

杏仁各一

附子炮半兩

防風

一兩半

右以咀每服五錢水一盞半姜七片棗兩箇煎至七分去滓不以時

候服取汗隨人虛實與所中輕重有人脚弱服此六七劑得瘳。精

神恍惚加茯神遠志。骨節煩痛有熱者去附子倍為藥心煩多驚

者加犀角半兩。骨間冷痛者倍用桂附。嘔逆腹脹者倍人參加

半夏一兩。躁悶大便澁者去附子倍為藥入竹瀝一合煎服。臟

寒下利者去防己黃芩倍附子一兩加白朮一兩古今無杏仁。救

急無苦藟杏仁止十味。延年無防風遺失云便利產後失血并老人

小兒用麻黃桂心甘草各二兩。一法治或歌哭或笑語無所不及

用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩無附子防風生姜有當歸一兩

白汗者去麻黃杏仁加白朮。脚弱加牛膝石斛各一兩。身疼痛

加秦芫一兩。腰疼加桃仁杜仲各半兩。失音加杏仁一兩。

不風

防風 獨活 細辛 川芎 北五味子 白茯苓 人參 白芍藥 白朮 耳草

右吹咀每服三錢水一盞姜三片杏仁五箇云皮尖搗碎同煎至七分去滓溫服如加麻黃後麥附子當歸羚羊角六味分即**天風引湯**

千金竹瀝湯

大治熱即生風

竹瀝二升 生葛汁一升 生姜汁三合

右三味相和溫服分三服朝晡夜各一服

必效竹瀝湯

治中風涎潮謔語昏塞四肢緩縱

秦芫 防風 獨活 附子 各一分

右吹咀以水四盞煎至二盞入生地黄汁淡竹瀝冬半盞再煎四五沸去滓分作四服無時熱服病勢去以他藥扶持未愈再作近世貴人用之多有神效

燒竹瀝法

新竹截尺許長去節作兩邊用兩磚對立相去八寸置竹

仰在磚上急着烟火燒之磚外兩頭以椀盛瀝七盞以絹澄清夏秋須沉冷水中以防瀝酸凡大熱有風人亦可單服冷暖隨人勿過度劑瀝亦然

補遺 星木香湯

治中風痰盛服熱藥不得者

南星 八錢 木香 一錢

吹咀每四錢薑十片水一盞煎七分溫服

星附湯

治中風痰壅六脉沈伏昏不知人服涼藥不得者

附子 生用 南星 生用 一兩 木香 半兩

右吹咀每服四錢水一大盞薑九片煎七分溫服虛寒甚者加天雄川烏各三建湯痰甚如牽鋸服藥不下宜於關元丹田二穴多多灸之

烏藥順氣散

治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻

凡卒中風手足癱瘓言語蹇澁者皆宜先服此藥以疎氣道然後隨証

投以風藥

結梗

麻黃

枳殼

去前烏藥

去穢麩炒

陳皮

甘草

川芎

乾薑

白芷

疆蚕

右為籠末每三錢水一盞姜三片棗一箇煎溫服如盛寒壯熱頭痛
肢體倦怠加葱白三寸煎熱服出汗或閃挫身軀不能屈伸溫酒調
服遍身癢痒抓之成瘡用薄荷葉同煎

○婦人中風角弓反張口噤方論第二

夫婦人角弓反張者是體虛受風也入諸陽之經也人之陰陽經絡周
環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折癱急於角弓之狀宜用小
續命湯服之 方見前

○活人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體強直口噤背反張
作瘕治之屬太陽經先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之疾疢外
證發熱惡寒與傷寒相似但其脉沉遲弦細而項背反張強硬如發痲
之狀此為異耳 新產血虛多汗出喜中風亦有此証當察有汗無汗以分別柔二瘕 無汗惡寒

名別瘕有汗不惡寒各柔生 陽瘕屬剛瘕陰瘕屬柔瘕無汗葛根湯主之有汗桂枝

加葛根湯主之凡剛柔二瘕小續命湯並可與之有汗者去麻黃加葛
根若審知剛瘕者胸滿口噤其人卧不着席脚攣急咬齒當行大承氣
湯 外瘕注云熱而瘕者死熱病瘕者反折瘕瘕樂齒也 附木湯 桂心白木散 附子防風湯
八物白木湯 桂枝黃散已上可選而用之 解語論云合面而卧為陰瘕仰目者為陽瘕又云成

因溫寒發汗多則發瘕瘕也 治剛瘕無汗惡風 產後有疾凡用麻黃更宜斟酌 大棗 三个

葛根 一两 麻黃 去根炮 姜錢 各三分 桂枝 粉草 各半 芍藥 各半
右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服取汗為度

桂枝加葛根湯 治柔瘕有汗不惡風 為藥 甘草 各六錢 乾葛 二兩 生姜 一两 棗 四枚
右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服取汗為度

○大承氣湯 愚詳之產後雜用此藥故不錄

附子散

治傷寒手足厥冷筋脉拘急汗出不止項強直搖頭口禁

附子

白朮各一兩

川芎三錢

肉桂二錢

獨活半兩

右為細末每服三錢棗二枚水一中錢煎至一半溫服

桂心散

治傷寒陰症手足厥冷筋脉拘急汗出不止

白朮

桂心

附子炮

防風

川芎

甘草各兩

右以咀每服五錢水二盞姜四片棗三枚煎八分去滓溫服

附子防風散

治傷寒陰症閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止

柴胡半兩

五味子

白朮各一兩

茯苓

甘草

乾姜

附子炮

防風各三錢

桂心半兩

右為粗末每服三錢姜四片水一盞煎七分去滓溫服

白朮散

治傷寒陰症三日不差手足厥冷筋脉拘急無汗恐陰

氣內傷

白朮

麻黃去根

茯苓

五味子

羌活略半

附子炮

桂心各三分

良薑一分

右為粗末每服四錢水一盞姜四片煎七分去滓溫服凡用麻黃宜

白朮金散

治婦人中風角弓反張口禁不能言皮膚頑痺筋脉抽掣

僵蚕

烏蛇肉炙

天麻

獨活

南星炮

川烏炮去皮

防風

蟬蛻炙

白附子炮

犀角屑

朱砂研

桑螵蛸各半

麝香

一分研

右為細末每服一錢溫酒調下無時候

烏蛇散

治婦人中風牙關緊急手足頑麻心膈痰涎壅滯

烏蛇肉炙

天麻

白附子炮

南星炮

獨活一兩

烏犀屑

僵蚕炒

全蝎炒

半夏麩

麻黃去根

當歸

晚蚕沙各半

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸溫酒吞下亦治角弓反張

補遺

辟瘟丹

治婦人中風卒然倒仆牙關緊急角弓反張口禁

不省人事并解上膈壅熱痰涎咽喉腫閉

鬱金二錢

巴豆

去皮油十四箇

雄黃二錢半

右為末醋煮糊丸棗豆大每服七丸熱茶清吞下吐出頑涎立甦

婦人良方三卷
并風類
七

通關散 治卒暴中風昏塞不省牙關緊急用弓反張藥不得下咽

細辛 薄荷葉 牙皂 雄黃 各一錢

右為末每用少許銅管吹入鼻中喉噴嚏然後進藥或用白梅擦牙更以薑瀉末着舌下牙關即開倉卒可用

○婦人中風口禁方論第三

夫婦人中風口禁者是體虛受風七入頰頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頰頰足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛入其筋則筋牽故引牙關急而口禁也

天南星散 治婦人中風口禁四肢拘急

天南星 姜汁炒黃 白附子 炮 黑附子 炮 烏蛇肉 酒炙 全蝎 等分

右為細末每服半錢以生姜汁溫酒調下無時拗開口灌

烏散 治婦人中風口禁四肢強直

黑附子 炮 天麻 各半 桂心 石膏 麻黃 去根節 蝎梢 炒

川烏 炮去尖 南星 炮 各 麝香 半分

右為細末入研藥令停每服一字無時豆淋酒調灌

烏散 治婦人中風口禁

烏蛇肉 各 全蝎 炮 天麻 南星 炮 疆蚕 各半 膩粉 半分

右為細末入膩粉令停每服一字以生姜酒調灌下

補遺 治中風口禁不知人事四肢強直

无以鹽梅擦牙齦後用白木四兩水三升濃煎頓服效

○婦人中風不語方論第四

巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語經云醉卧當風使人發瘖

治心脾經受風言語蹇澁舌強不轉涎唾流涎及瘖澀

邪擣陰神內鬱塞心脉閉滯暴不能言

白附子炮

百萵蒲去毛

遠志去心

甘草水煎

天麻

全蝎酒炒

葱活

白殭蚕炒

南星

牛膝酸如無只炮各一兩

木香半兩

右為細末煮麩糊為圓如梧桐子大量入辰砂為衣每服二十圓至三十圓生薄荷湯吞下無時候

中風湯

治中風內虛脚弱語蹇

石斛一兩半酒炒

防風

乾地黄

杜仲去皮切

丹參各一兩一分

防風

川芎

麥門冬去心

桂心

川獨活各一兩

右咬咀每服伍錢水盞半棗二枚煎至八分去滓溫服

中風湯

治中風入肝脾經年四肢不遂舌強語蹇

威靈仙

附子炮

苦梗

蔓荊子

防風

枳殼去穢

川芎

當歸各等分

右咬咀每服四錢水一盞竹瀝半盞姜三片煎至八分溫服一日四

服忌茶

補遺

三黃湯

治中風手足拘攣煩熱心亂惡寒不食半身不遂

失音不語

麻黃去根

黃耆半兩

黃苓七錢

獨活一兩

右咬咀每四錢水煎服取汗為效心熱加大黃氣滿加枳殼氣逆加

人參心悸加牡蠣渴加瓜蒌根寒加附子

小兒中風湯

治中風左癱右瘓口眼喎斜口噤全不語

身不遂手

足須麻

防風去芦

南星

湯泡各三兩

甘草各一兩

右剉散每四錢生薑十片水大盞煎熱服

○婦人風痺手足不隨方論第五

夫婦人風痺者由風寒溫二氣合而為痺風多者為風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始為痺復傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機閑弛縱故風痺而復手足不隨也

三軍湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆療

川續斷 杜仲去皮切 防風 桂心 華陰細辛 人參

白茯苓 當歸 白芍藥 甘草各一兩 秦光 生地黃

川芎 川獨活各半 黃耆 川牛膝各一兩

右吹咀為末每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去滓熱服

無時候但腹稍空服有人病左臂不隨後已痊平而手指不便無力

誠諸藥不驗服此藥總半即決

五七散 亦妙方在局方

備遺 五神湯 治風寒濕氣客留肌體手足緩弱麻痺不仁

片子薑黃 羌活 白木 防己各一兩 甘草各半兩

右吹咀每四錢姜七片煎病在上食後服病在下食前服

○婦人中風自汗方論第六

夫若治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不

得慮虛凡以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者

自汗者更用麻黃則津液轉使脫泄反為大害中風自汗仲景雖

桂枝湯至於不住發搖口眼闞動遍身汗出者豈勝對治當此之時

活湯續命黃散復榮衛却風邪不可開也

獨活湯 治昏虛昏憤不自覺知手足棄縱坐卧不能或發寒熱血虛

不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活 羌活 人參 防風 當歸 北細辛

茯神去木 半夏 桂心 白薇 遠志去心 菖蒲去毛

川芎各半兩 甘草三分

右吹咀每服五錢水盞半姜五片煎七分去滓無時溫服

續命散 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼闞動有時搖擗亡

失津液渴欲引飲此能祛榮衛去虛風中風自汗及產後中風自汗尤

宜服之 防風 獨活 當歸 人參 細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地黃

半夏

遠志

去心

荆芥穗

各半兩

桂心

七錢半

右咬咀每服五錢水一盞生姜三大片煎至七分去滓溫服不拘時汗多不止者加牡蠣粉一分半

補遺

防風白朮湯

治中風自汗不止

白朮

牡蠣

防風

各等分

為末酒調下米飲亦可日三服汗即上如不止可服黃耆建中湯

○婦人臂痛方論第七

論曰夫婦人臂痛筋脈牽急不得屈伸遇寒則劇由肝虛為風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服栝子仁圓舒經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中腕伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脈沉細宜茯苓圓控涎丹

補遺

王氏指迷方

枳實

去穢

覆盆子

炒 北五味

附子

石斛

去根切

鹿茸

酒蒸

酸棗仁

炒

桂心

沉香

黃耆

各一兩

蜜水

炙一方等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十圓

補遺

治臂痛

又名五痺湯亦治腰下疾

片子姜黃

四兩

甘草

羌活

各一兩

白朮

海桐皮

當歸

赤芍藥

各二兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服如腰以下疾空

心服腰以上疾食後服

補遺

茯苓

一兩

半夏

二兩

枳殼

半兩

風化朴消

兩

右四味為末姜汁煮糊為丸如梧桐子大生姜湯下二十九食後服

補遺

治臂痛

不能舉手或左或右時復轉移由伏痰在內中

腕痺脾氣不行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不升故上行攻臂其

脈沉細者是也後人謂此臂痛乃痰証也所以治痰無不效者予嘗以此藥治人隨服隨愈世所謂痰藥多矣未有立效如茯苓丸速也

凡人忽患臂背手足頸項腰膝隱痛不可忍連筋骨牽隱釣痛坐卧不寧時走易不定倍醫不曉謂之走症使用藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下變為此疾或令人頭痛不可幸或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸声多流唾涎手脚重腿冷脾氣脉不通誤認為癰瘰亦非也凡有此疾但以此藥不過數服即愈

甘遂 去心 大戟 去皮 真白芥子 各等分炒
右為細末糊丸如梧桐子大臨卧淡姜湯吞下五七丸如疾猛再如至十九丸

治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止此由榮衛之氣循

行失度滯經絡與正氣相搏其痛發則有似癰瘰

真白芥子 木鼈子 各二兩 蘇枳 沒藥 別研 桂心 木香 各半
為細末入研藥令停每服一錢温酒調下

芍藥 烏藥 茯苓 川芎 大黃 當歸
防風 各半兩 甘草 橘皮 各三 木香 連皮大腹 姜汁炒

右吟咀每服五錢水二盞姜二片棗一枚煎一盞去滓服

精遺 治臂痛冷痺起于甚艱或一臂或兩臂

四物湯 治血滯作臂痛加紅花煎 方見前

○婦人賊風偏枯方論第八 凡三方

論曰賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體名為偏風也其風邪入深真氣去邪氣留

發為偏枯此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於肌故令偏枯也
○論曰夫偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼痛神智如常各曰
偏枯僕原疾之由皆由陰陽偏虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風
衝坐風邪乘虛而入疾從斯作內經云汗出偏沮使人偏枯詳其義理
如榿木或有一邊津液不陰注而先枯槁然後被風所害人之身軀或
有一邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所害其理顯然王子身有
云舟行於水人處於風水能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害軀
蓋謂船漏水入體漏風傷古人云醫風先醫血血行風自滅是也治之
先宜養血然後驅風無不愈者宜用**大人風湯**增損茵芋酒續斷湯

大人風湯 治中風偏枯失音半身不遂時後恍惚

- 當歸 杏仁去皮尖 甘草 桂心 乾薑各二 五味子
- 升麻各兩 川烏炮去皮 黃芩 芍藥 獨活 防風
- 川芎 麻黃去節 秦艽 石斛去根切酒浸 人參

茯苓 石膏 黃耆 紫苑各一兩 大豆 三兩去皮炒
右為粗末每服伍錢水二盞酒一合煎至一盞去滓溫服恍惚者不
用酒煎

增損茵芋酒 治半身不隨肌肉乾燥漸細瘦或時脊痛病名偏枯

- 茵芋葉 川烏炮去皮 石楠葉 防風 川椒炒出汗 女萎
 - 附子炮 北細辛 獨活 卷柏 肉桂 天雄炮去
 - 秦艽 防已各一兩 躑躅花炒 當歸 生乾地黃各二兩 芍藥 一兩
- 右吹咀酒二斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初服一合漸增之
以知為度令酒氣相續出指迷方

續命湯 治偏枯少血

- 當歸三兩 陳皮 芍藥 北細辛各一兩 生乾地黃 一兩
- 右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服臟寒多刺者入酥
附子一兩和前藥

補遺 治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯急以麻黃發汗
恐津液枯竭惟當潤筋去風 當歸二兩 赤芍藥

續斷 白木 藁本 虎骨各一兩 烏蛇肉半兩

右為末每服二錢溫酒調下骨中痛加生地黄一兩臍自利者加天
雄半兩

虎涎膏 治中風偏枯四肢不隨一切風氣孿拳者

石斛 石楠葉 防風 虎脛骨 當歸 茵芋葉
杜仲少 川牛膝 續斷 芎藭 狗脊燎去毛 巴戟去心

右剉豆大以絹囊盛藥用酒一斗漬藥十日每服一盞溫服

○偏風口喎方論第九 凡五方

論曰偏風口喎者是體虛受風 入於夾口之筋也足陽明之筋上夾
於口其筋偏虛風因虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也

風湯 治卒然口喎斜言語牽急四肢如故別無所苦

防風 一兩 羌活 半兩 甘草 一分

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入麝香研一字溫服

○治口眼喎斜方

用草麻子七粒去皮殼細研作餅安在掌心右喎安在左手却用
左喎安在右手却用
銅盃乘湯坐於藥上絕正即洗去 一方用已豆不用草麻出本草

○廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方

生地黄汁 一升 竹瀝 一升 獨活 切三兩

右相和煎取一升頓服末正更進一劑

深部續命湯 療中風口喎諸疾卒死不知人補虛起死神方

人參 防己 麻黃去根 芍藥 川芎 甘草
黃芩 白朮略 桂心 附子炮 防風各一兩 生薑 五兩

右切以水一斗二升煮取三升分為三服不差復作忌海藻菘菜桃

李生菜葱雀肉猪肉

又千金方 炒大豆三升冬焦以酒三升淋取汁頓服
又方 用大皂莢五兩去皮子為末以三年大醋調如左嚼塗右右嚼
塗左乾更塗

補心 天山膏 治卒中風口眼喎斜

南星 白及 草烏 各一个大者 獨蚕 七箇

為末用生鱸魚血調成膏傳喎處覺正便洗去

灸法 治口喎斜

耳垂下麥粒大灸炷三壯左灸右右灸左

婦人血風心神驚悸方論第十 元三方

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變惚恍而憂懼也 緋風湯亦可用

治婦人血風五藏大虛驚悸安神定志

茯苓 去木 人參 龍齒 別研 獨活 酸棗仁 各一兩 防風

遠志 去心 桂心 細辛 白木 各三分 甘草 乾姜 各半兩

石為粗末每服四錢水盞半煎至八分去滓溫服

龍齒 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眼目不安

龍齒 別研 茯神 各一兩 朱砂 研 人參 當歸 天麻 各三分

犀角 屑 檳榔 防風 生乾地黃 各半兩 遠志 去心

赤箭 各一分 麝香 一錢

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸薄荷溫酒下

朱黃丸 治婦人血風

當歸 芍藥 白芷 羌活 乾地黃 延胡索

川芎 各半兩 土瓜根 牡丹皮 去心 白木 桂心 各一

右為末每服一錢水一盞煎至七分益酒一分再煎少時熱服重者

數服効

補遺 麥冬 羊角 治婦人血風身體骨節疼痛心神恍惚胸膈壅滯少思飲食言驚散亦如二方並在後

○失血過多心神不安方第十

治婦人因失血過多心神不安言語失常不得睡

辰砂 所 酸棗仁 炒 人參 白茯苓 去 木 琥珀 研 各一分 滴乳 研 一錢

右為末和停每服一錢濃煎燈心棗湯空心調下一方 蜜丸如彈子 大葷

荷陽化 補遺 茯苓 補心湯亦如 方見一卷第 十論補遺

○婦人風邪顛狂方論第十二

夫婦人顛狂病者猶血氣虛受風邪所為也人稟陰陽之氣而生而風邪入并於陰則為顛入并於陽則為狂陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也顛者卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足擦矣無所竟知良久乃甦狂者少卧不飢自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也

治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無度或心神恐懼

言語失常 防風 茯苓 獨活 人參

遠志 去心 龍齒 菖蒲 去毛 石膏 牡蠣 各一兩 秦光

禹餘糧 桂心 各半 甘草 三分 蛇蛻 一尺炙

右為粗末每服三錢水盞半煎七分去滓溫服

又一方 羚羊角屑 三分 獨活 遠志 去心 菖蒲 去毛 防風 各半

茯苓 去木 石膏 麥門冬 心 龍齒 別研 白鮮皮 各一 人參

生乾地黄 各三分

右為粗末每服三錢水盞半煎七分溫服無時

○素問云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝為木鐵落金也以金制木之意愚魯治一女人眼見鬼胸

言語失常循衣直視無醫多用心藥治之無效僕投養正丹二貼煎

引香湯送下以三炷飲之立愈○又一男子亦曾病此証亦用此

養正丹且養正丹與百一方均皆在元氣

治諸風緩從不隨語言蹇澁痰涎壅滯心怔健忘

感發顛狂 見奇方

飛尸風 治婦人風虛溫冷邪氣入臟狂言妄語精神恍惚志亂心驚

或與僵直視吐沫眼口喎斜 方見前中風第一論

○婦人飛尸血厥方論第十三

夫飛尸者遊走皮膚穿藏腑每發刺痛變作無常道尸者附骨入肉攻
鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫瀉四肢不知痛
之所在每發昏沉得風靈便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發絃切遇
寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯亂常覺昏發每節氣至亦交輒成大
惡皆宜用此方

忍冬葉 劉數斛煮令濃取汁煎之 服如鷄子大日三服

天心神精丹 治中風之要藥治客忤霍亂腹痛脹滿尸注惡風顛狂

鬼語蠱毒魘魅癥瘕積聚溫瘧積久百無不差但是一切惡毒無所不
治但近世少得曾青磁石為難合爾故不錄 出千金方

朱砂散 亦治此疾方見和劑更不贅錄

氣觸則發 閉因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣而成變動不巳似冷似熱

雄黃 研 朱砂 研 苦梗 羌活 當歸

升麻 川烏 炮 龍齒 別研 犀角骨 白木 芍藥

鬼箭羽 白僵蚕 炒 木香 虎骨頭 酥炙 紫蘇子

川芎 南星 炮 山柰子 陳皮 莽草 枳殼 去穢

黃芩 各一 麻黃 根節 蜈蚣 二條炙去頭足 擯御 二個 全蝎 一分

右為細末每服二溫酒調下一口二服

○人平居無疾苦忽如死人身不動搖默亡不知人目閉不能開口禁
不能言或微知人惡聞人声但如眩胃移時方寤此由汗過多血少氣
併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行改身如死氣過血還陰陽復通
故移時方寤名曰鬱胃亦名血厥婦人多有之宜服白微湯倉公散

白微湯 白微 當歸 各一 人參 半兩 甘草 一分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞溫服

令人散

治卒鬼繫鬼疰鬼刺心腹如刺下血即死不知人及卧覺齒

脚趾不覺者并諸毒氣等疾

舉

瓜蒂末九菴衛生方無瓜蒂末有皂角末

梨蘆末 雄黃研

礬石煨研各等分

右為末研停用小許吹入鼻中得嚏氣通便活未嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂炭者為正

精遺

內鼻散

治尸厥脉動而無氣七閉不通靜而若死名卒厥

石菖蒲去毛為末每用二字內鼻中吹之令入仍以桂末安舌下

菖蒲散

治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹中氣走狀如雷鳴

煨礬半兩 硫黃一兩

右細研分三服酒調灌服如人行五里又進一服不過三服即甦

新刊婦人良方補遺大全卷之二

新刊婦人良方補遺大全卷之四

仁集

血風類

婦人血風身體骨節疼痛方論第一凡五方

夫婦人血風身體骨節疼痛者內體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也

言第散治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎一兩 赤茯苓 酸棗仁炒 桂心 當歸

木香 川牛膝各三分 羌活 枳殼去穢 甘草各半

右為齏末每服三錢水一大盞姜三片煎至七分去滓熱服無時候

羚羊散

治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸棗仁炒 生乾地黄 檳榔各一 五加皮

防風 赤芍藥 當歸 骨碎補炒去毛 海桐皮 川芎各三分

甘草十兩 右為末每服二錢溫酒調下

通靈散 治男子婦人手足痛風不可忍者

白附子 僵蚕 各一兩炒去絲 全蝎 半兩炒 麝香 一字

右為末東蜜圓如梧桐子大每服七圓溫酒下一日三服

白木散 治中風身體麻痺不仁

白木 炒 芍藥 藁木 去白土各一兩 續斷 去枯者

右各等分為末每服二錢熱酒調下每日一服

大效風濕丸 治血風走疰疼痛丈夫筋骨疼及打撲傷拆疼痛甚者

虎骨 酥炙 敗龜 醋炙 當歸 桂心 地龍 去土 牛膝

漏蘆 葳靈仙 玄胡索 自然銅 製

右各等分為末每服二錢熱酒調下每日一服

白木散 治中風身體麻痺不仁

白木 炒 芍藥 藁木 去白土各一兩 續斷 去枯者

當歸 酒洗 焙各二兩 虎骨 酥炙 烏蛇 肉 各半兩

右為細末每服二錢七溫酒調下臟寒多刺者加附子半兩骨中煩

熱者加生地黄一兩

補遺養身散 治血風遍身骨節疼痛及頭旋倒地

以嫩蒼茸草心不拘多少陰乾為末酒調一錢時常服

○婦人血風白虎歷節走疰方論第二 凡七方

夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然刺手痛遊走無有

常處故名為走疰也加減小續命湯主之

漏蘆散 治婦人血風走疰疼痛無有常處

漏蘆 當歸 牛膝 各三 桂心 地龍 去土 防風 羌活

白芷 沒藥 研 甜瓜子 各半兩 虎脛骨 酥炙 敗龜 醋炙

右為細末每服二錢熱酒調下無時候

四生丸 治血風骨節疼痛擡舉臂不起行履不得并渾身麻痺

白殭蚕 炒去絲 地龍 去土 白附子 生 五靈脂 草烏 去皮尖 各等分

右為夫以米糊丸如梧桐子大每服二十九粒酒仍下或作末酒調半錢亦可

康射香丸 治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲嚙晝靜夜劇及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭 三个去皮尖生 生全蝎 什生黑豆 什生地龍 去半兩

右為細末入麝香一字同研停糯米糊為丸如菡豆大每服七丸甚

者十九夜夜卧令萋空温酒吞下微出冷汗一身便瘥許季士云予得此方凡是歷節

及不測疼痛一服便瘥在欽川日有一貴家婦人遍身走生瘥瘥至夜則發如虫齧其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服效

芍藥知母湯 治諸肢節疼痛身體尪癩脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐 三因方

吐 三因方

桂心

知母

防風

芍藥

甘草

麻黃

去根節各三兩炮

附子

三兩炮

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分去滓空心服一法有

白木川芎杏仁半夏

八寶湯 治風歷節四肢疼痛如錐鍛不可忍

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘草

桂心 各三兩

白朮 四兩

右咬咀每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服。一方去桂用乾

地黃二兩

獨活寄生湯 最治歷節風近人用之甚效

小續命湯 大治白虎歷節痛不可忍

方見第三卷第一論

○有一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流上於膝三日流於髀骨甚甚夜至於肩流於肘流於後溪或如錐鍛或如虫鼠痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無效召僕診之六脉緊予曰此真歷節証也非解散之藥不結愈但用小續命湯一劑而愈○又鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍諸藥元効召僕診之入迎真心脉虛此因中暑而得合先服酒蒸黃連丸後醫莫不笑用此藥服一貼即愈自後與人良驗

補遺 羌活湯 治白虎歷節風症四肢疼痛徹骨

羌活

附子

秦艽

桂心

木香

川芎

當歸

川牛膝

酒浸桃仁

骨碎補

防風

甘草

右剉散每服四錢水一盞薑五片煎溫服

○婦人血風癩瘡痒方論第三 凡八方

局方治婦人時發遍身瘙痒或赤腫癩疹五心煩熱血風攻注與人參
荆芥散消風散四物湯加荆芥煎或人參當歸散或逍遙散兼導赤圓
如不通者食後服皂角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此疑滯熱甚
者宜先服青木香丸三兩服以開氣道却服前藥即效

夫婦人體虛為風邪氣容於皮膚後逢風寒相折則起風瘙癩疹若赤
疹者由涼濕折於肌中之極熱結成赤疹也得天熱則劇取冷則差
白癩者由風氣折於肌中熱熱與風相搏所以為白癩也得天陰
雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減着衣暖亦差也脉當浮而洪浮即
為風洪即為氣風氣相搏則為癩瘡身體為痒凡人汗出不露肌及浴
素問云汗出見濕乃生座席使人身振寒熱生風瘡也○雷公炮炙序云遍熱癩風
酒調生側

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血風遊走不定並

服之

何首烏

防風

白蒺藜

枳殼

天麻

右為細末每服二錢煎茵陳湯調下無時候

附子酒

治痛風婦人血風身上瘙痒

出張氏方

生附子

不去皮重一兩一隻

皂角刺

二十一个

黑豆一合

右三味細剉分為二處用好酒二瓶入上件藥慢火燂候乾至半瓶
却合作一處蜜縛泥頭經二宿每服一盞溫服無時候未効又服

聖惠方

治女人風痒癩疹不止

蒼耳花葉子

各等分

為末用豆淋酒調下二錢

○治癩瘡

白蜜

不以多少

好酒調下已試有效

○治皮膚有風熱遍身生癩瘡方

初虞世

牛蒡子

水浸一兩淨晒乾炒令香

浮萍

蒸過焙乾等分

右為細末每服二錢薄荷湯調下日二服
○又治風氣客於皮膚瘙之不已方

蟬蛻洗

大葉薄荷

右等分為細末無時溫酒調下方寸七此一方出本草

又方

露蜂房洗過蜜炙

令焦

蛇蛻

洗炙令焦等分

右為細末溫酒調下一錢日二三服

補遺

烏雞丸

治諸風緩縱言語蹇澁遍身頑麻皮膚瘙癢又治婦人

血風頭疼眼暈

川烏炮去皮一兩

荆芥穗二兩

右為末醋煮麵糊為丸梧桐子大每服二十丸溫酒吞下

消風散

治証同上

方見局方

○婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四凡七方

天婦人風眩是體虛受風上入於腦也諸臟腑之精皆上注於目其血
氣與脈并上屬於腦也循脈引於目系上急故令眩也其眩不止風

邪甚者變成癩疾也

養正丹

治虛風頭旋吐涎不已蓋此藥升降陰陽補節真氣非止頭

旋而已

黑鉛

水銀

硫黃研

朱砂

各一兩研

右用建瓯一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳枝子打停取下歇少
時入二味打停候冷取下研為粉以糯米軟飯丸如菉豆大每服三
十九棗湯吞下空心食前日二服

鉤藤散

治肝厥頭暈清頭目

出本草方

鉤藤

陳皮

半夏

麥門冬

去心茯苓

茯神

人參

去芦

甘菊花

防風

各半

甘草

一分

石膏

一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至八分去滓熱服素問云

疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎拘象招搖目眩耳聾下實
上虛寸在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上
虛者肝虛也故肝厥則頭暈腎厥頭暈腎厥頭暈痛不同也

斗門方

治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者

喝起草 取其嫩心不以多少陰乾為末以常酒服一大錢七無時候其功大效服之多連服蓋善通頂明

蔓荆子散

治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語謇澁痰逆不下飲食

蔓荆子 防風 羌活 川芎 羚羊角屑 枳殼

前胡 石膏 赤茯苓 麻黃去根節 荆芥穗各三分 北細辛

其菊花 白芷 藁本 旋復花 甘草各半兩

右為粗末每服四錢姜三片水一錢煎七分去滓溫服無時候

四神散

治婦人血風眩暈頭痛九卷衛生方

菊花 當歸 旋復花 荆芥穗各等分

右為細末每服一錢水一盞葱白三寸茶末一錢煎至半分通口服良久去枕仰臥少時

川芎散

治風眩頭痛龍安常方

小川芎 山藥 白茯苓 其菊花不用人參各半 山茱萸肉

右為細末無時候酒調二錢日三服

治女人頭旋即天動地轉心曰心眩非血氣也普濟方

膽子礬一兩細研用胡餅劑子一个拌停放版子上按平一指厚以篋子勒成如散子大塊不須界斷於瓦上焙乾每服一散子大

為末煎燈心竹茹湯調下

補遺

三五七散

治八風五痺肢體不仁風寒入腦頭痛長聞人聲目

旋運轉耳內蟬鳴

附子 細辛各三兩 乾薑一兩 山茱萸各五兩 防風去芦 山藥七兩

右為末每服二錢溫酒調下

○婦人血風頭痛方論第五 附腎厥頭痛。凡九方

許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾予常處此方以授人比他藥效而捷

川芎一兩 當歸三分 羌活 旋復花 華陰細辛 蔓荆子

防風 石膏 藁本 荆芥穗 半夏麩 乾地黃
耳草 各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫服

七生丸

治男子婦人八般頭痛及一切頭痛痰厥腎厥飲厥傷寒傷

風頭痛不可忍者並皆治療徐明仲先生方

川烏 草烏 南星 三味並生去皮 半夏 冷水洗去滑

川芎 石膏 白芷 並生用等分

右為細末研韭菜自然汁丸如梧子大每服七丸加至十九嚼生葱

茶送下僕常療鄧安人頭痛如破服諸藥無效加此

芳平湯

治狀如前但發熱者不可服

生附子 去皮尖 南星 乾姜 炮 北細辛

川芎 各一兩 甘草 三分

右咬咀每服四錢水二盞姜七片茶牙少許煎至六分去滓食前溫

服中脫素者寒者不用茶牙

骨方如聖餅子

加北細辛如半夏數自合服之見効甚速

○若頭痛筋擊骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜卧欬煩寃其脈率之

則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜

玉真圓身硫黃圓

玉真圓

石膏 煨研 半夏 洗為末 各一兩 硫黃 一兩 硝石 一分 並研

右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生薑湯下三十圓○一
方無半夏有天南星

硫黃圓

治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不治服此除根

硝石 一兩 硫黃 二兩

右研令極細滴水負如指頭大空心蠟茶清爵下百一方云中暑者
以水水服之下咽即洒然治傷冷以艾湯下

○若頭痛連歲時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦

為顛海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲髻穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右

白附子散

全蝎炒五 辰砂研一 麝香研一 白芷炮一分
麻黃不去根節 烏頭炮去 南星炮各半 白附子炮一兩

右為細末酒調壹字服訖去枕卧少時

裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中秘方用生薑服汁即羅菊蜆殼仰卧注鼻中左痛注左右痛注右或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈東坡云荆公與僕言已愈數人 此方自後晁將仕明甫云是有効
○治頭風痛不可忍者

硝石 人中白 腦子 等分

右研令極細用一字搐入鼻中

補遺

小兒茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷八兩 荆芥各四 羌活 白芷 防風去土

甘草各二兩 細辛一兩

右為末每服二錢食後茶清調下

新方

治風吹項背頭目昏眩以及腦痛產前產後傷風一切頭痛

○項筋強痛方論第六 凡五方

此一卷論項筋拘攣強痛每得斯疾療之似易而實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦畧以僕考之然既有斯疾必有是方何古人言此疾證尚且畧又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所以絕無專門予因暇日擬古名方以併檢閱然自明季識淺鄙未必全備博季之士見其遺缺儻能補而完之不亦宜乎咸淳元年上元日藥隱老人書于存心堂矣

夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許太季云是足少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏故也以感外邪論之則有太陽經先因感風又感寒

濕致令外證發熱惡寒與傷寒相似頸項強急腰身反張如中風狀癱
瘓口噤其身體凡九古人以強直為瘥其脉沉遲弦細新產血虛多汗
出中風亦有此證已上並載第三卷第二論中言之甚詳不復贅錄
○又有控枕轉項不得者與三五七散見和劑方追風散仍與急風散搽項
上○若因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背筋脉拘急可與蝎附
散都梁丸○許太宰治項筋強痛不可轉側者以木瓜煎

追風散

治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣

上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘
急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行及一切頭風無療婦人血風攻症頭
目昏痛皆治之

- 川芎 甘草 荆芥穗 白殭蚕 防風 石膏
- 羌活 天麻 北地 白附子 全蝎 雄黃
- 草烏 炮去皮筋尖 沒藥 乳香 雄黃

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨卧服常服清頭目
利咽膈消風化痰

急風散

草烏頭三兩一分 生黑豆一分 丹砂一分
麝香一分 研 為細末研令停酒調塗痛處

追風散

治一切風邪頭痛夾腦風氣痰涎壅盛嘔逆惡心口吐清水
暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口眼喎邪面目瞶動頭項拘急背引
疼耳痒目昏四肢麻木及沐頭痛因象感風邪頭目昏痛兩大陽穴疼
逐年頭風經隔歲月不差不效服藥無效者並皆治之

- 附子 炮去 川烏 炮去 麻黃 去節 僵蚕 炒 南星 防風 各三
- 雄黃 朱砂 全蝎 各半 白芷 藁本 各半

右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不可服○京城之鑿用
此藥煎嚼如聖餅子治眼上眵糞眵上不明羞明多淚見物不明有效

都梁丸

香白芷

厚大塊白色新香者非以標別去塵土用沸湯洗四五次

為細末煉蜜丸如彈

子大每服一丸多用荊芥點鳩茶細嚼下食後常服只乾嚼下亦可都無所忌此藥大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二粒尤佳暴寒乍暖神思不清傷寒頭目昏暈宜服之

木瓜散

宣木瓜

二个取蓋去核

沒藥二兩研乳香一分研

右二味內木瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半盞無灰上醞二盞和之用八分錢熱暖化膏子服有人患此病自午後發黃昏時定予曰此患必未從足起經肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶秘法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是府予受此方三服而愈

補遺

烏藥順氣散

多加菴活木瓜獨活專治頸項強急筋痛不見前

○婦人腰痛方論第七 九二方

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎虛弱外感六氣內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣散及寒濕腰痛宜五積散加桃仁如虛損及五種腰痛者青娥丸神應丸諸方並見和劑皆可用也如氣滯腰痛如聖保負黑牽牛苗香橘核必有功也

如聖湯

治男子婦人腰痛

陳總領方

延胡索

當歸

桂心

等分一方無當歸有杜仲

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服

澤人勝珂云此方得之於歙川祈門老醫真如神故以名之

獨活寄生湯

夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風所得不時速

治其流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛拘攣脚重痺宜急服之

獨活 三兩

桑寄生

續斷

杜仲

北細辛

川牛膝

天麻

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

人參

熟地黄

當歸 各二兩

右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓溫服空心氣虛下利除地黃并治新產腹痛不得轉動及腰脚寧痛痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附子故無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風脚氣流注亦効

獨活散

治腰痛神効閃挫亦良

玄胡索

杜仲

官桂

羌活

芍藥

右等分為末酒調下

天羅布瓜

子仁炒焦搗酒熱服留渣炒熟封痛處効

又方

天羅布瓜子仁炒焦搗酒熱服留渣炒熟封痛處効

○婦人腰脚疼痛方論第八 凡三方

夫腎主於腰脚女人腎藏繫於胞絡若傷腎氣虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰脚疼痛也

木仁散

治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏悶食少無力

酸棗仁

川牛膝

當歸

羌活

川芎

桂心

防風

木香

海桐皮

杜仲

附子炮

草薢

川續斷

粉草

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片煎七分去滓溫服

骨碎痛散

治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急肢節不持

骨碎補

草薢

川牛膝

桃仁

海桐皮

當歸

桂心

檳榔

赤芍藥

附子

川芎

枳殼 半兩

右為粗末每服三錢水一大盞姜三片煎至七分去滓食前熱服

補遺養腎散

治腰脚筋骨間疼痛不能步履其効如神

蒼朮

乾蝎

天麻

草烏頭

生去

黑附子

炮去皮收

右為末如腎氣用烏豆淋酒調服一大錢藥氣所至麻痺少時隨愈

如骨髓中痛用胡桃酒下孕婦勿服

婦人良方卷之四 婦人脚氣方論第九 凡十一方

凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜栝柳生姜煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痛或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或頭不夫或舉步轉筋或見食嘔吐惡聞食氣或胃滿氣急或遍体酸痛皆脚氣候或是一字黃帝所謂緩氣濕痺是也頑弱各緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之煎成入生薑自暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以自合薄荷煎冷水調服極妙大便秘者脾約負麻仁負三和散主之方並見本方中仍針灸為佳服補藥与湯淋洗皆衣之大禁

○聖惠方婦人脚氣論

夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎熱虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三藏絡起於十足指若臟腑虛損則風邪先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也此皆由体虛或當風取涼或久坐卑濕或產後勞損或恚怒傷肝心氣滯致令月候不通因其虛傷風毒搏於肌骨則令皮膚不仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘挛或即冷疼或即腫滿或兩脚痺弱或卒体轉筋目眩心煩見食即嘔精神昏憤肢節煩疼小便赤黃大便秘澀並皆其證也其婦人脚氣治之與丈夫不同者以其氣血不調懷胎難產崩傷之暴是以褚澄療寡婦師凡與妻妾殊別即其義也○凡婦人有脚氣疾者必無生產

牛膝散治脚氣浮腫心神煩悶月候不通

川牛膝 羚羊角 梅柳 大黃炒 芒硝各一两防已

桂心 牡丹皮 赤芍藥 甘草各三分 桃仁五十粒製

右為粗末每服三大錢水一錢煎至七分去滓温服利下惡物為度亦要相其強弱用之

大腹皮散 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹皮 紫蘇 木通 桑白皮 羌活 荆芥

赤芍藥 青皮 木瓜 獨活 各一兩 枳殼 二兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎至七分去滓空心溫服

半夏散 治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔逆不止

半夏 陳皮 人參 大腹皮 桂心 各三分 檳榔 一兩

赤茯苓 蘇 各兩半

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片煎七分去滓溫服

木香散 治婦人脚氣卒發衝心悶亂

木香 半兩 郁李仁 赤芍藥 大腹皮 紫雪 各一兩 桑白皮

桂心 檳榔 茯苓 各三分

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫服

治婦人脚氣衝心悶亂不失人宜服此藥

紫蘇 松節 吳茱萸 半兩 檳榔 乾木瓜 一兩 陳皮 三分

右咬咀每服四兩水一盞煎至一半入童子小便二合再煎三沸溫服

紫蘇散 治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食脚重虛腫

紫蘇 莖葉 木通 桑白皮 茴香根 一兩 枳殼 一兩

羌活 獨活 荆芥穗 木瓜 青皮 甘草 各半

右咬咀每服三兩水一盞姜三片葱白一莖煎至七分去滓溫服

桑白皮散 治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐

卧不得 桑白皮 郁李仁 各一兩 赤茯苓 二兩 木香

防已 大腹皮 各半兩 紫蘇子 木通 檳榔 青皮 各三分

右咬咀每服三兩水一盞姜三片煎至七分去滓溫服

薏苡仁散 治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大便澀

薏苡仁 防風 猪苓 川芎 防已 檳榔

婦人良方四卷
血虛類
三十一

郁李仁 大麻仁各一錢 桑白皮二錢 枳實三分 甘草半及 羚羊角一分

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓放溫服

四日散 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食四肢羸瘦骨立

拘攣脚痛不能行

黃耆 厚朴 益智仁 藿香 白朮 白扁豆

陳皮各一錢 半夏 白茯苓 人參 白豆蔻仁 天台烏藥

甘草各半 京蘭芍藥各半 檀香 沉香各一分

右為細末每服三錢水一盞姜二片枣子一個煎至七分溫服

○自後諸證退只有脚攣痛不能行以**養木丸**治之效此藥大治乾濕

脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履兼補下部

養木丸

熟艾 四錢 川烏 三錢 全蝎 一錢 沒藥 各二錢 別研 川牛膝 青鹽 各半兩

右除研藥為細末入研藥令停以木瓜一個入者切一頭留作蓋去

糝入上件藥於木瓜內將蓋蓋定安木瓜於黑豆中蒸令極爛取出

去皮連藥研成膏却入生蒼木末拌令得所丸如梧桐子大每服五

下丸空心用木瓜湯下或溫酒亦得一日三服忌血與蒜乙巳年

疾發於自汗心煩身熱骨立有拘攣不舒予仲秋食少進維老醫亦不能為召僕治之六味藥而獲曰維維勞安也少進維老醫非正脚氣但當調脾生血其意以退熱後文正則可望安也尋諸方皆死對証之藥遂取四白散子與服不半刻熱退能食又處蒼木丸能行之筋脉伸足能行而愈夫

○大便秘者可與**七宣丸****神功丸****七聖檳榔丸****三和散**服之效○諸方

並見和劑

補遺 **烏藥酒** 治脚氣脚村無藥可問此時効

土烏藥不可洗用籠布楷淨以瓦片刮下屑收磁器內以好酒一升浸一宿次日空心盪熱去查多服為妙

新刊婦人良方補遺大全卷之四 畢

