

壽世保元九

新刊醫林狀元壽世保元玉集卷之九

太醫院吏

目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

外科諸證

癰疽

夫癰疽瘡癧者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而發爲癰疽也夫此疾多生於膏梁富貴之人以其平昔所食肥膾炙搏安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽六腑之氣所生也其脉浮數疽者且也平而內發屬乎陰五臟之氣所成也其脉沉數瘡者其總名也癧者有頭小瘡也經云諸癥痒瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯夾心火之熱而主癰疽之類也

然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也大廻積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵表廣大者癰也五臟風毒積熱該注於肌肉其發猛惡初生一頭如痞癟白色焦枯觸之而痛是以浮腫根小不過二三寸者癰也夫癰生疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內潰骨疽則難療而易痊復夫諸瘡之中惟皆疽疔癰喉癰之類亦其急者也至若瘰疬懸瘡瘻又各有疥癬瞼瘡風疳之類雖云俱屬瘡類而疽之疾須要察其是實是虛是冷是熱或重或輕對症用藥無失先後次序凡人年四十已上頭項脣頤背脅腰脇或筋脈便不可輕易待之若視之怠慢以爲常疾宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟腑一毫執虧飲食不進一毫冷藥亦不可用此是先後次第之要訣也夫瘡有五善七

也六廻積熱騰出於外肌肉之應心者疽也熱發於皮膚之間於六腑若燎原之火外潰肌肉躡瘡則易療惟難將息而遲瘥瘡最爲急症其次莫如腦疽腸漏諸瘡之類其症可緩而治也其輕重緩急自有不同也夫癰或輕對症用藥無失先後次序骨之上所視不見之處稍有瘡每見從微至顯喪命者多矣便救至於燎鹿之勢不可撲滅矣藥斷不可用若已破潰臟腑旣

惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清朗四善也體氣和平五善也如煩燥時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡近二惡也喘急短氣恍惚嗜臥三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便污者四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞咳逆身冷自汗無時目眩耳聾恍惚驚悸語言顛倒皆是惡症五善見三則善七惡見四必危五善併至則吉而安七惡全見必危而死矣

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處卽復者有膿不復者可消若按之都牽强者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血滯之極之不可針破也用諸拔毒之藥敷散四圍堅中軟者此爲有膿審也一邊軟亦可有膿都堅者此爲惡核或有氣也都軟者此爲有血血瘤也

當審堅軟虛實爲要若堅疽積久後若更變破也軟疽者溫煖裹衣置之耳若針炙刺破

不可療也

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌醃藏等物瘡口飲百日後不作渴症者方可

一凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時如往

有喪之家弔孝并拜望等項真瘡腫卽復發切忌切忌

用藥治法

魚羊鵝肉燒酒麪食生冷瓜果入房

一凡癰疽等項大瘡毒初起一二三日內卽服飛騰神駿膏此藥治瘡初起至將潰之際俱可服服後汙出將惡毒盡皆發散腫痛立消其効如神若瘡已潰爛勿服如無神駿膏初起卽服槐花酒或千金消毒及二三劑患處卽用

炙注灸之瘡初出至七日內皆可灸七日外不可炙瘡不及灸初起卽以葱蜜膏或金蟾膏貼之卽消至四五日腫痛未

消用芙蓉膏敷之立効敷之至六七日作膿將潰未潰之時不得頑破用簪針九頻點瘡頭自然皮破出膿

瘡毒初起至此膿將出未出之際卽服真人活命飲一二劑瀉下膿血其瘡潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏擦之內服千金內托散以托瘡毒出外間服蠟礬丸以護膈膜二藥相兼服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣血衰憊脾胃虧損肌肉不生瘡不歟口用猪蹄湯洗淨將內肌散擦上外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減入味丸可以絕根庶幾再生若平日無瘡時皆預服之尤爲防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏効者皆予百發百中之良法也

方見後諸瘡

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也

飛騰神駿膏

麻黃

二斤去節取一斤淨

杏仁

四兩澄去濁渣

泡去皮

尖用砂鉢擂爛又入水同搗

地骨皮

去骨淨用清汁

四兩

甘草

四兩

防風

去蘆淨四兩

頭髮

一大把溫水洗淨

燈草

一大把

黑鉛

一塊

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用大鐵鍋一口將前藥入鍋內注清水

木盤子

去殼十四箇

甘草

一斤淨

尖用砂鉢擂爛又入水同搗

地骨皮

去骨淨用清汁

甘草

四兩

黑鉛

一塊

二三桶煮至五六分看藥水濃時藥渣濾起藥水另放缸注又將前渣大鍋
內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注前汁內如前法三次去渣將前
二次汁并作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草三味不出其味香附磁石收貯
五年不壞遇病每服三錢好熟酒調膏臨臥服厚被蓋出大汗爲度徐徐去
被不可被風吹次早用猪蹄煨以汗後恐致虛人以此補之以復元氣好酒
調服隨人酒量以醉爲度汗出立愈此治瘡毒初起至潰破時前後皆可服
神功

○一論凡人初覺患癰疽發背已結未結赤熱腫痛卽用炙法先以濕紙覆其
上立視後其紙先乾處卽是結疽頭處取大蒜去皮橫切三文錢厚安在頭
上用大艾炷於蒜上炙之三壯換一蒜片復炙痛者炙至不痛不痛炙至痛
乃住最要早覺早炙爲上方發一二日者十炙十愈三四日者六七愈五六
日者三四愈過七日則不可炙矣若有十數頭一處生者用大蒜搗成膏作
餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者卽
用獨蒜切片如前法炙之次日去痂膜自潰矣

○一論凡癰疽發背一切無名腫毒補起

葱蜜膏

生葱生蜜猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次卽消

金蟾膏

治症同前

生白礬末五錢加麝香一分取活蝦蟇一箇去腸肚同搗爛如泥四匱留項出氣不過一夜卽愈

○一論發背及一切疔腫毒不問已成未成但焮痛者

槐花酒

槐花四五兩炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服其毒卽消神妙

○一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜

黑白牽牛各一兩搥碎好酒一碗煎八分露一宿次日溫服大便下膿血卽愈

○一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤瘰疬疔腫魚口五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚亂半卧不寧皮

膚壯熱大便閉結小便赤澁痔症並治 姨娠勿服
千金消毒散

連翹二錢黃芩一錢赤芍二錢當歸尾一錢金銀花一錢五分
天花粉一錢牡蠣一錢麻黃二錢防風一錢大黃一錢芒硝一錢

右剉一劑酒水各半煎服

○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起卽消已 腫卽潰 血從大便中出瘡潰後勿服
加減真人活命飲 又名千金內消散

當歸尾酒洗五分 赤芍一錢白芷二錢木鼈子去殼一錢 川山甲三錢蛇粉炒
金銀花三錢白角刺一錢白僵蚕一錢瓜蔞仁去殼一錢 天花粉一錢
乳香一錢 没藥五分 大黃二錢 甘草節五分

右剉一劑水酒煎服

○一論癰疽發背腫痛如錐剜不可忍者登時痛止

芙蓉膏

芙蓉葉
黃荆子各等分爲末

右二味入石臼內搗極爛用雞子清調敷患處留頂如烟起此方用在未潰之先或將潰之際

○治癰疽發背已潰爛者

三神膏

草麻子仁一合
陳醋一大碗
鹽一撮

右三味置鍋中用槐條攬成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用雞翎續續掃上其皮卽皺其肉卽生

○論諸瘡惡毒發皆癰疽痛不可忍者此藥能衛護內膜驅解諸毒自然消

加味蜡簪丸

苗蜡一兩
枯白簪兩兩
乳香一两
沒藥一两
雄黃二分

右爲細末用蜡鎔化爲丸硃砂爲衣如梧子大每服五十九粒擦上下蜜水送下

○論癰疽瘡癰皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之

加味千金內托散

黃芪

鹽水炒

人參

當歸

酒洗

川芎

酒炒

白芍

防風

川厚朴

姜炒桔梗

官桂

瓜蔞仁

去殼

金銀花

甘草節

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血出者及有汗出此藥之功也不問症候猛烈未成者自散已成者卽潰矣○痛甚加乳香沒藥倍當歸芍藥

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以爲安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉爲他病而危劇者多矣

收功萬全湯

黃芪

蜜水炒
不五分

人參

一两

白朮

去蘆炒
不一两

白茯苓

去皮一两

當歸身

一分
五分

川芎

七分

白芍

酒炒一两
七分

懷熟地黃

一两

官桂

三分
一分

白芷

三分

陳皮

五分

甘草

三分

防風

五分

右剉一劑生薑二片水煎溫服○如作渴加麥門冬五味子○如煩燥加生地黃麥門冬○如有痰加薑製半夏○如泄瀉加厚朴薑炒○如小便不和加澤瀉○如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒○如胸膈不寬加厚朴薑炒山楂右方治癰疽發背諸瘡毒潰膿後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不合口膿清欲作餘症宜之

○一論患癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無効

八仙糕

人參

去蘆四兩

白茯苓

去皮四兩

乾山藥

四兩

芡實

去殼四兩

蓮肉

去心四兩

不油白朮

去蘆米泔浸過一宿切片微炒

四兩

白糖霜

一斤半

白粳米

二升水淘淨磨細

右將藥末米粉糖霜和一處搓揉極勻篩放籠內竹刀割成小斤蒸熟入鍋再焙乾任意食之

斂瘡止痛生肌散

官米

火煅黃色一升

黃柏

一錢

黃連

乳香

沒藥

孩兒茶

各五分

右爲末掺瘡上并治下疳黃水熱泡等瘡

○一論癰疽發背潰爛便要此湯盪洗

猪蹄湯

當歸

赤芍

白芷

羌活

露蜂房

生甘草

各五分

一方加黃芩

右細剗看瘡大小用藥如瘡大加料用之先將犢豬前蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分爲兩次撥去上面油花并下面渣肉每砍用藥一兩投於汁中再用文武火煎十數沸去渣以故紙蘸藥湯溫溫徐徐澆揩瘡上死肉惡面隨洗而下淨洗訖以布帛拭乾貼膏藥仍避風忌人口氣吹之有却見人并月經見行婦人及猫犬並不許入病人房內洗瘡切勿以手觸着○一論一切惡瘡癰疽發背等症此藥能追毒去死肉有膿無頭用此點頭上自然皮破出膿

贊針丸

人言爲末人鍋內上蓋明礬燒不響爲度一不

硇砂五分

巴豆半粒

乳香三分

沒藥三分

白雄丁香七分

右爲細末麪糊爲丸如豆大用時以溫水磨化頻點瘡頭上神効
替針散

用木鼈子川烏二味磨水以雞翎蘸掃瘡上留口大一處出膿如藥水乾
再刷上不一時卽穿

○一論治癰疽發背發項發腦等大毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫毒未
潰通敷自消如已潰將此敷周圍搘掀之處其破口處以神異膏貼之每日
換兩三次不許見風神効

三合消毒散

文蛤搗碎炒黑色爲末三兩六錢

輕粉研三錢

黃柏去皮蜜炙爲末一兩

三兩

寒水石

煅爲末一兩

右末合爲一處用新涼水一半蜂蜜一半調令不稀不稠如瘡毒尚未開將
腫處遍敷之用綿紙覆干上但乾卽以水掃之朝夕更換二次如夏月或午
時再換一次亦可若已破將此藥敷干周圍搘腫處正有膿破口處用神異
膏滿貼之不必留口亦一日三換

○一論癰疽發背潰爛又不生肌肉用此立効但此方用之不可太早
合口收功散

血竭二錢

乳香

沒藥

輕粉

龍骨粉一錢五分赤石脂二錢

硃砂

海螵蛸各五分

右共爲細末散在瘡口上卽生肌肉

一論癰疽發背諸瘡毒不拘已成已潰兩三次中毒換一次其藥力方能勝毒

諸瘡潰膿後不長肌肉不合口者

勿

當歸尾五錢

川芎五錢

赤芍二錢

生地黃四錢

防風五錢

羌活五錢

白芷五錢

玄參

五錢黃芪五錢

官桂三錢

桃仁四十九箇杏仁四十九箇

木鼈子十四箇

何首烏三錢

牛旁子五錢

穿山甲四錢露蜂房三錢蛇退二錢

大黃二錢

黃柏二錢

亂髮男者一團槐柳枝四十九節每長一寸

予大

右用芝麻油二斤四兩將藥入鍋內浸春五夏三秋七冬十日以桑柴文武

火前油黑色以穿山甲浮起黑爲度絹

用十四兩柳條攬不住手成膏軟硬得

所再下乳香沒藥各三錢血竭三錢

降真香末三錢次冷定下射香末二錢

水浸二三日去火性攤用

○論癰疽瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚

不能上潤以致心火上炎水火不能既

陽發飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先

及治口舌生瘡不絕

加減八味丸

懷生地黃

八兩好酒拌砂鍋內蒸半

日搗膏

山藥

一兩

桂心去皮五錢

石棗

淨肉四兩酒蒸

搗膏

澤瀉

切片蒸焙乾

白茯苓

去皮各五錢

遼五味子

二兩五不

牡丹皮

五錢

右爲末入石膏加煉蜜少許丸如梧子大每服六七十丸空心鹽湯送下
○凡人久服加減八味丸必肥健而多子晚年服此不生癰疽諸毒不患消渴等症

濾去渣再熬油滴水成珠陸續下黃

舌或生黃及未患先渴此腎水枯竭

濟故心煩燥作渴小便頻數或白濁

瘦服此以生腎水降心火諸症頓止

○一患癰疽之人雖云有熱皆因虛而得之愈後發渴及先渴而後癰疽非八味丸不能治

○一人病癰疽多有愈後發渴而不救者治之惟八味丸最効疽安而渴者服此則渴止疽安而未渴者預服此丸則永不生渴氣血壯盛或未疽而先發渴者服此不惟渴止疽亦不作

○一人平日口乾作渴因飲酒食炙燙補劑房勞凡若此類過多致令腎水枯渴不能上制心火故有此症後必有疽發也宜先服八味丸以絕其源及癰疽後服此尤有益也

○一論癰疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒熱往來驚怪少睡以補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門神曲五味黃柏少睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白微一錢肉桂五分如膿多或清倍加參芪橘○一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以爲安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉

爲他病而危劇者多矣

附骨疽

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之症也
又曰環跳空痛不止生附骨疽以蒼朮爲君佐以黃柏之辛行以青皮冬加
桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草爲佐作大料煎人薑汁食前
飲之痛甚者恐前藥十數劑發不動少加麻黃一二劑又不動者恐疽將成
急掘地坑以火煅坑通紅沃以小便令患者赤體坐于坑中以席或綿衣圍
抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而愈

○一論瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅破
慢腫行步作痛或不能行

內托黃芪湯

柴胡

連翹

肉桂

大力子

黃芪

當歸尾

黃柏

升麻

白芷

甘草各八分

右剉一劑水酒各二盞煎至一盞食前溫服

○一治附骨疽

黃蓮消毒飲

黃連

羌活各一錢

黃芩

藁本

防已

桔梗

歸尾各五分

生地黃

知母

獨活

防風

連翹各四錢

黃芪

人參

甘草

陳皮

蘇木

澤瀉各二分

右十九味切作一劑水煎服一老人年七十因寒濕地氣得附骨疽子左腿外側少陽瞻經之分微侵足陽明經分潤六七寸長一小尺繫硬慢腫不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨大痛與此藥一服即止次日堅軟腫消而愈

○一論頑瘡惡毒年久不愈多有附骨在內先用貝母濃煎湯洗淨刮去腐肉用力潔去附骨或用蟻蝦腦子五六箇搗爛敷上其骨卽出然後用人言五厘研細末入黃銅燈盞內用好醋一小鍾慢火熬乾收起過三日卽生田銅線來研極細用雞翎蘸藥掃瘡上卽痛出水腐肉去淨然後用後藥

珍珠象牙膏

楚蘋賓江傳

珍珠用豆府一塊切兩片將珠鋪在內兩片合准繩定人水煮三炷香爲度研細末一小杯象牙末一小杯

天花粉末五分官粉末一升

白蠟一升

香油五升

右共合一處入碗內重湯煮化濾成膏紙攤貼患處神妙
○治諸瘡大疼痛不辨肉色漫腫光色者曰附骨癰又治瘡口以不合酒調服燒灰畧存性

三生散

露蜂居

蛇蛻

亂髮洗淨各等分

右三味燒灰畧存性研末酒調服一錢七分

臀癰

丹溪曰臀癰者臀居小腹之後在下此陰中之陰道遠位僻雖曰太陽多血然氣運不到血亦罕來中年後尤虛患此終有腫痛癰之脉症但見虛弱便與滋補血氣可保終吉若無滋補之功其禍多在結痂之後或半年以來乃病

多致失手慎之慎之

○一論足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻脣生癰堅硬腫痛尤作
內托羌活湯

羌活

黃柏酒炒各二分

藁本

歸尾各一錢

黃芪五分

蒼朮

連翹

陳皮

甘草

炙各三分

肉桂

腸癰

丹溪曰腸癰常作濕熱積治入風難治

千金調腸癰妄治必殺人其病小腹重強按之則痛小便如淋時時汙出復惡
寒身皮甲錯肚腹緊急如腫之狀脉數者微有膿也巢云洪數已有膿脉若
遲緊者未有膿甚者腸脹大轉側有水聲或邊脣生瘡或膿自脣出或大便
膿血急服蠟礬丸酒下兼進後方

○一論腸癰便毒癰疽初起卽消已腫節潰血噏大便中出宜

于金內托散方見力痘卽加減真人活命散

一論肚內生癰及癰疽惡毒

內消沃雪湯

當歸身

白芍

黃芪

甘草節

麝子

連翹

香白芷

貝母

陳皮

皂角刺

乳香

沒藥

穿山甲

天花粉

金銀花

木香

青皮

甚首加大黃

○右剉酒水煎服秘方是世所奇授之如神

○一論陽癰腹痛不妄或腹滿不食小便赤婦人產後虛熱多有此疾但疑惑
間便不服服亦無害視其右關脉芤者是也

薏苡仁二兩

牡丹皮一兩半

瓜萎仁二兩

○右剉一兩水煎一方加川芎桃仁

○一婦人腹痛如錐剜每痛至死不敢著手六脉洪數此腸癰毒也用

穿山甲炒

白芷

貝母

殭蚕

大黃

○右剉一大劑水煎服打下膿血自小便中出卽愈後再無患宜少食煎炒物

○治腸癰曰久潰爛山膿腹內刺痛不可忍者

用鐵打一尺長三稜針將鴨腸一條貫針在內將鴨腸曲轉輕輕送入糞門內送到痛處乃是瘡癰之處卽將鴨腸扯動針尖出刺破其毒膿隨針而出用手重按痛處膿出盡而愈此仙傳秘法也

囊癰

丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開等九懸掛水出以輔炭末敷之外以紫蘇葉包裹仰臥養之

○一論癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫等九懸者皆不死

○一方用野紫蘇葉面毒藥還是也焙乾爲末敷之如燥者以香油調敷裏無皮者外以青荷葉包之其皮自生

懸瘤

○一論懸瘤此瘡生谷道外腎之間初發甚痒狀如松子四十日赤腫如松治遲則破而大小便皆從此出不可治矣

國老湯

用橫紋大甘草一兩截長三寸許取出山澗中流水一碗不用井水河水以甘草蘸水文武火慢炙不可急性須用三時久水盡爲度剪視草中潤透却以無灰酒二碗煮至一碗溫服一口一服半月消盡爲度

將軍散

大黃根

貝母

白芷

甘草節

右爲末酒調空心服○虛弱加當歸一半

○一論肝經濕熱玉茎患瘡或便毒懸瘤囊瘤腫痛或潰爛作痛小便淋漓或

罩囊掛

龍膽瀉肝湯

龍膽草

酒洗
炒清

澤瀉各一兩

車前子炒

木通

生地黃

酒洗
炒

當歸尾酒洗

山梔炒

黃芩炒

甘草

瘰癧

右剉水煎空心服

瘰癧屬血氣痰熱必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此其屬膽經手決斷有相火且氣多血少婦人見此其月經如期不作寒熱者易治積久轉爲潮熱危矣自非斷慾食淡神仙不治也

○一論瘰癧者經所謂結核是也或有耳前後連及頤領下連缺益皆爲瘰癧或在胸前及胸之側下連兩脇皆爲馬刀半足少陽主之獨形而小者爲結核續數連結者爲瘰癧形長如蛤者爲馬刀也

○一論繞項起核名曰蟠蛇癧延及胸前連腋下者名曰瓜藤癧至耳根腫核者名曰惠袋癧右耳根腫核者名曰蜂窩癧

○一論癰癧馬刀生耳前後或項下胸腋間累累如珠者未破已破皆治
消毒花堅湯

當歸一錢

黃芪二錢

玄參六分

天花粉六分

連翹一錢

柴胡一錢

黃芩五分

半旁子七分

龍膽草四分

升麻七分

桔梗一錢

陳皮八分

羌活七分

蒲荷四分

海昆布七分

甘草四分

右剉一劑生薑煎服○一方加甘草節知母貝母海藻更佳
升陽調經丸

升麻八錢

葛根五錢

芍藥三錢

連翹五錢

黃連五錢

黃芩酒炒

生黃芩四錢

黃柏酒炒

桔梗五錢

歸尾三錢

三稜酒炒

莪朶五錢

草龍膽酒洗

夏枯草五錢

甘草錢五錢

右藥秤一半另研爲末煉蜜爲丸如棗豆大每服一百二十九白湯下一半

作咀片每服五錢水煎服半月卽痊

○一論久患癰癧流注以致氣血兩虛懷養抑鬱飲食少思或四肢患腫肉色

不變或曰晡發熱或潰而不斂久不愈者

益氣養勞湯

黃芪炙

人參

白朮去蘆一錢

砂硝當歸酒洗

川芎

白芍炒黃

懷生地黃

陳皮

香附

貝母鉻二錢

柴胡

地骨皮

桔梗

甘草各五分

右剉一劑水煎食遠服○如有痰加橘紅○如腸下刺痛加青皮或木香○如午後有熱或頭微眩加黃柏炒○如膿水清倍人參黃芪當歸○如女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母○如月經不調加牡丹皮當歸○
○一論癰瘡兼諸瘍皆治

抑氣內消散

用芎

白芍炒

白朮去蘆炒

青皮

白芷

半夏姜炒

陳皮

桔梗

獨活

厚朴姜炒

防風

黃芩

羌活

香附

枳榔各一兩

蘇子一兩五錢

沉香三錢

木香

人參

粉草各五錢

右剉水煎溫服十餘服卽消若再發照分兩製爲末酒糊爲丸如梧子大每服五十九酒送下

○一論癰瘡未破在左爲癰瘡宜
內消調經散 山東李西嶺傳

升麻

葛根

龍膽草

黃連

桔梗

連翹

黃芩

黃柏

莪木

三稜

甘草

梔子

當歸尾

白芍

右剉水煎服

○稍虛加夏枯草

○有痰加天花粉知母各五分

○少陽加柴

胡四分

○一論在右爲馬刀瘡未破宜

柴胡通經湯

柴胡

連翹

歸尾

甘草

黃芩

鼠粘子

三棱

桔梗各三分

黃連

右剉一劑水煎熱服

紅花

○一論瘰癧已破者

補中勝毒湯

黃芪一錢 人參三分 甘草五分 當歸

白芍各三分 陳皮三分

升麻

柴胡各五分

連翹一錢 生地黃

熟地黃

防風五分

右剉水煎熟服

○一治瘰廬并頸項結核或腫或痛宜夏枯草水煎食後頓服○一方用夏枯

草一把水煎三次去渣熬成膏貼患處立消

○一治瘰癧元氣無虧用此以去之若癧既去而不收斂服前益氣養榮湯若元氣怯弱宜先補後服癧毒已後仍服前湯度無他疾此方治瘰癧未成者消已潰者斂須元氣壯者可服

必効散

南硼砂二錢半 輕粉一錢

射香五分

巴豆五箇去皮心用

曰檳榔一箇

斑蝥四十枚去頭足用糯米炒熟去米

右研極細末取雞子二箇去黃用清調藥仍入壳內以濕紙數重糊口人飯

既蒸熟取出曝乾爲末每服五分用炒生薑酒五更初調服如覺小腹痛用益元散服其毒俱從大便出

○一治遠年鼠癰瘍神方

千鵝綠雲膏

松香

碎斤鎔七
瀝去渣

乳香二錢半

沒藥一錢半

血竭一錢

銅綠一錢半

杏仁

去皮一錢

孩兒茶三分

草麻子

去壳二
麻油二兩

乳汁一盞

石爲細末合作一處同乳汁油攬勻搘搗干下成膏用絹上藥貼患處
○一婦人患癩瘍久而不愈或以爲木旺之症不宜於春預用散腫潰堅湯腫硬益甚余以爲肝經虧損用六味九補中益氣湯至春而愈此症若肝經風火自病元氣無虧可用散堅瀉青之劑若肝自虧損或水不生木用六味九若金來尅木須補脾土生腎水若行政代則脾胃湯而反致木尅土矣

○一婦人頸核腫痛察其氣血虛實先以必効散一服去之更以益氣養榮湯三十餘劑補之而消益此症初起而血氣虛弱者先用益氣養榮湯待其氣血稍充乃用必効散以去其毒仍用補藥無不奏効昔已成膿者即針而補

耗之氣血復而核不消者服散堅之劑倘不應而氣血如故仍以必効散養
榮湯又不應灸肘火肩髃二穴用千糙綠雲膏自愈若氣血壯實不用追蝕
亦能自腐用藥以腐之者便易於收斂耳若血虛而用追蝕不惟無益適以
取敗凡不慎飲食七情者不治

疔瘡

夫疔瘡者由四時迭更陰陽交變此三氣五相激怒必成暴氣然暴氣卒然大
風大霧大寒大熱若不能避而遇襲於皮膚人於四體傳注經絡遂便腠理
結滿陰陽二氣不得宣通遂成疔毒但疔毒之名有十三種必發於手足間
生黃泡其中或紫色有一帶紅線道直人者用針於線處刺去毒血水針時
以知痛出血爲妙否則紅線入腹攻心必致危困凡治疔毒先以麪漿水飲
之吐則是不吐則非世大抵脉洪而數者難愈也

一 治疔瘡惡毒神效

飛龍奪命丹 方見諸瘡

○一治疗腫及無名瘡毒指頭去白水以葱蜜大貼神効

○一治無名腫毒疔瘡手指無故生蛇頭指腫痛不可忍有紅筋人心者

蜈蚣二條

歸尾二錢

雄黃一錢

土赤芍二錢

白芷稍二錢

右剉爲末頭生酒煨服神効

○一論一切惡毒疔瘡諸般無名腫毒及四時傷風傷寒增寒壯熱無汗初者
趙府小靈丹

乳香

沒藥

輕粉

血竭

硃砂

川烏

草烏尖

細辛

巴豆霜

蟾酥

麝香

減牛

右爲細末糯米糊爲丸如黃米大雄黃爲衣每服十三丸小兒五七丸用葱白三根劈開入丸在內細嚼好酒送下以被蓋出汗避風婦人有孕不可服
○一論一切疔瘡惡毒腫痛神効

類聖散

川烏

草烏

蒼朮

細辛

白芷

薄荷

防風

甘草各五錢

右爲細末雞清調塗患處留頂

○一凡患疔瘡癰疽此藥能令內消去毒化爲黑水從小便出萬無一失不可輕視

知母

貝母

白芨

半夏

天花粉

皂角刺

金銀花

穿山甲炒

乳香各一錢

右剉一劑用無灰酒一碗煎至半碗去渣只作一服溫服不得加減再將渣搗爛加秋過芙蓉葉一兩搗爛用蜜謁非花水和敷瘡口上如乾再用蜜水潤濕過一宿自然消不必用第二服藥也忌發物

一人脚面疔形雖如粟其毒甚大宜峻利之藥攻之因其怯弱以隔蒜灸五十餘壯痊遂止再灸片時乃知痛更用膏藥封貼再以人參改毒散漸愈夫至陰之下道遠位偏且怯弱之人用峻利之劑則藥力未到冒氣先傷虛之禍有所不免不如灸之爲宜

便

語

便毒一名跨馬癰此奇經衝任爲病而癰見於厥陰經之分野其經多血又名
血痛或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜
疎利之卽散或膿後如常用托裏內補之藥

○一論便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸以生薑煎食前服得利
二三行立効射干聞紫花者是

○一論便毒極効方

追毒散

當歸尾

赤芍

白芷

金銀花

天花粉各二錢

白姜絲

炒六錢

木別子

川山甲

大黃

三錢

芒硝

二錢

一方加五靈脂更妙

右判

劑好酒煎露一宿五更熱服厚蓋發利一二行卽愈其硝黃待羣

藥煎熟方入再二沸用之。一方加射干去芒硝

○一論魚口便毒方

神異散

金銀花

天花粉

木別子各三錢

山草三分

連翹黃芩各八分

山梔子

川山甲炒二錢

皂角刺五分

木香大黃三分

連翹黃芩各八分

右剉一劑酒水煎空心服

○一治便毒腫痛神方 徐宗愚傳

大黃

全蝎

蟬退

姜桑

穿山甲

炒成上焦

白芷稍

貝母

當歸尾

各二錢

右合二帖水煎後加入大黃再煎二沸去渣入好生酒同服如未散加蟬
蛇一條同煎服

○一治魚口瘡方

用猪膽一枚投熟酒一碗溫服卽內消

○一治魚口便毒方

木鼈子去壳一巴豆去壳火燒

川山甲四片炒

姜桑三箇

五倍子五箇

右爲末黃酒調下

○一治魚口便毒方

陳云岳傳

姜羣

炒三十六

川山甲

炒五蜈蚣二條

甘草節

一錢

大黃

三錢

杏仁

去皮尖一
分

五靈脂

三分

全蝎

一個

皂角子

炒一分

金銀花

二分

右剉一劑酒水各半煎服

下疳

下疳瘡乃用子玉莖生瘡皆因所欲不遂或交接不潔以致邪毒浸漬發成瘡
口久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤又魚口瘡如精瘡皆其類也
俗云疳瘡未已便覆來生也

姑精瘡此蓋因婦人陰中先有宿精因而交接虛熱薰蒸卽成此疾初發在陰
頭如粟類拂之痛甚兩目出清膿作白孔齷之大痛婦人有生於玉門內正
似疳蝕瘡不痛爲異耳

消疳敗毒方

防風六分 獨活六分

柴胡一

錢五分

連翹七分

荆芥七分

黃柏八分

知母七分

黃連七分

赤芍九分

蒼朮七分

赤茯苓九分

木通九分

龍膽草九分

甘草三分

右剉一劑燈心二十四寸水煎空心服如有便毒量人虛實加大黃二錢
煎服

○一治下疳瘡

天靈蓋

紅褐

小紅棗各燒存性各等分

右爲極細末先用好細茶煎濃洗淨摻之

○一治下廯痛不可忍如神

一官粉

煅五分

冰片一分

水銀三分用銀三分製

右爲細末摻瘡上

○一治下疳潰爛

珍珠

燒存性

片

腦各一分

人手指甲

足指甲燒成灰餘燒成灰各等分

右爲細末摻患處

○一薰下疳方

皮硝

乳香

雄黃六分

孩兒

五分

○右入小蟬內外用牛糞火煨熱蟬其硝自化薰之晚上使以心口涼爲度

○一治陰頭上瘡瘍 何和宇傳

五倍子

燒灰存性
錢七分

硃砂

七分

孩兒茶

五分

冰片

半分

輕粉

二分五厘

水銀

一分

右共爲細末撒患處○如從一邊爛起加狗骨燒灰一分○如從週圍爛起加鼈殼燒灰三分

○一方瘡瘍秘方

八寶丹

乳香

沒藥

孩兒茶

紅褐色子灰

海螵蛸

一箇

珍珠炒

象牙煅

龍骨煅各五分

右爲細末

先用米泔水洗瘡拭乾摻上神效

○一疽瘡膿清不結痂不合口久不愈者用

六味地黃丸加黃柏知母麥門冬四五劑而愈

○一治下疳瘡擦藥

陳鍾岳傳

冰片二分

珍珠另研三箇

黃柏以猪胆塗土火炙爲末二八分

蘆薈一分

輕粉炒三分

天靈蓋

火煅白色一分

右共研細末擦患處如有殼香油調擦

○治痘瘡

黃柏去皮以猪膽炙透爲末擦瘡上

○治陰囊上生瘡

用甘草煎水溫洗却用臘茶末敷之

○治陰頭生瘡

用溪港中螺螄入乾鍋內煅過先以溫水洗五七次後以此藥敷之

○治妬精瘡

用大田螺兩個和殼煅過存性爲末輕粉敷之

○治外腎生瘡

用蚕豆粉一分蚯蚓屎三分水研塗乾又敷

○治腎臟風發瘡

用紅淑去目水浸半日和生杏仁研爛擦兩手掌擦外腎極効

○治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便溫食亦減身而微腫

馬齒莧四兩研爛八青黛一兩再研勻敷上

○治下疳瘡

正伏

白礬

一兩

黃丹

八錢熬飛紫色

右研爲細末

以溝渠中惡水洗過拭乾敷上

○治蠶爛發

神方

鍾乳石

二分

硃砂

三分

珍珠

三分

琥珀

一分五厘

片腦

一分五厘

右爲細末每用土茯苓四兩猪蹄二隻煎水三碗早間服一碗調前藥末四厘半間服一碗調藥末四厘一日服三次共一分二厘十日服盡其瘡必愈其俗蹄隨用之忌動風癰物牛肉燒酒最忌之神良之秘方也

楊梅瘡

夫癰瘡者一名楊梅瘡因形相似乃氣受之故堅實凸起又名綿花瘡血受之其形扁摺而潰又名果子瘡亦類其象而俗呼之也北又曰天泡瘡皆一名異而實同原治療當別自致者重傳染者輕益自致老必謂淫慾太妄以致陰處起火及綻口恣味三焦皆熱精竭血結遺滯諸經而成者也俗傳以母猪大羊肉雞鯉等物發出謂毒盡殊不知在火上療油矣又有怕露山而求速効者過服敗毒散則傷五內冒氣毒益陷伏以藥線薰臍致使出不得收不能收延潰不能桂絕手足心皮枯似白鵝掌風反後筋骨疼痛風塊惡候皆未獲良治而然也凡遇此患托裏解毒湯外用千里光明湯頻頻洗浴大妙

托裏解毒湯

當歸一錢 五分 川芎一錢 赤芍一錢 五分 生地黃一錢 連翹一錢

黃芩一錢

一錢

黃連一錢

一錢

防風一錢

一錢

荆芥穗七分

七分

苦參酒炒二錢

二錢

羌活一錢

一錢

薏苡仁二錢

二錢

皂角子二十二錢

二十一錢

防已一錢

一錢

木瓜五分

五分

生甘草三分

土茯苓三車潔者四兩

右剉水二碗煎一碗溫服冷再煎服○虛弱人加人參一錢○自生者賀
柏一錢川生膝一錢川獨活一錢宣服二十帖每帖煎三次一日服一帖
千里光明湯

青木香

黃連

黃柏

黃芪

防風

荆芥

苦參

蒼耳子

蛇床子

羌活

升麻

麻黃

甘草各五錢

雞腸草倍

凍青葉倍

右作一劑用布包水煮於無風處服下煎藥即以此湯浴洗涼了又加熱藥
湯煮熟著實洗微汗拭乾十日後不必煩洗其藥渣并人煎藥渣再洗雞腸
草一名千里光明草又名九里明俗名膝枯賣其葉稍尖而岐開花白色處
處有之

○一治楊梅瘡初起先服防風通聖散十餘劑後服此收功永無後患

十全丹

雲乘弟驗

雄黃

硃砂

乳香

沒藥

用花椒一錢煎水調敷分

白芷

丁香

槐角絡

輕粉

當歸

右爲細末飯爲丸如菉豆大每服三十丸土茯苓湯下

○一治楊梅瘡先服防風通聖散加紫薑

二兩同煎服後服此

良十九服驗

白鮮皮

二兩

皂角子

十一面白二兩

防風

二兩

細辛

二兩三錢

川烏

三兩

草烏

二箇

薑

粟殼

四兩

○右剉十剗每一剗用生茯苓一斤豬肉半兩同煎服

○一治楊梅瘡

黃至川傳

連翹

四兩

金銀花

四兩

牙皂

二兩

杏仁

二十一箇

蟬退

十一箇

肥珠子

三十箇

冷飯

團一片

○石但剉用酒拌炒作十帖水煎服

○一治楊梅瘡毒

黃節溪傳

青藤

一兩

當歸尾

二兩

皂角刺

二兩

金銀花

一兩五錢

五加皮

一兩

白蘚皮

二兩

○右剉分作十二剗每剗用生茯苓四兩水煎服先服通聖散

○一治楊梅瘡

南塘徑驗

漢防已七錢 槐花二錢

五倍子四錢

右三味爲末用土茯苓半斤研爛猪肉半斤切碎共作一服用酒煮熟連渣
并肉通服

○一治楊梅瘡良方 胡雲齋傳

歸尾

一兩三分

牛膝

一兩三錢

黃芩

一兩三分

木瓜

二兩

大黃

二兩三分

金銀花

二兩三分

皂角刺

八錢

蟬退

五分

土茯苓

二斤

右剗分作十帖每帖用紅棗百粒皂角子各十枚葱白三根水煎臨晚服忌

菜豆

○一治天泡瘡神方

用鐵針釘醣醋磨濃搽瘡上立已

○一論凡人患楊梅天泡棉花等瘡致成一切難狀之疾或楊梅瘡爛見骨經年不收口者或筋骨疼痛舉發無時或遍身瘡瘍不消或手足皴破出血或遍身起皮癰腫好一層起一層或赤癩白癩鵝掌風癥或皮好骨爛口臭難當及年久曠瘧不愈一切頑瘡惡毒並皆神効

通仙五寶湯

鍾乳粉三分 大珠砂一分五厘 琥珀一分五厘

珍珠一分五厘

冰片一分五厘

水片一分五厘

珍珠一分五厘

珍珠一分五厘

珍珠一分五厘

右爲細末用白飛麪炒三分共一錢二分分作十二帖每一日一帖用一分
用土茯苓一斤水煎十二碗每侵晨用半碗和服其十二碗一日俱要吃盡
不可別用茶湯一日一服有不盡剉而愈者有終剉而愈者如病重未愈須

再服一料忌雞鵝魚牛羊發物及房勞

○一治楊梅風塊作腫作痛及癰疽瘻癰毒一切無名腫毒

黑虎膏

菖蒲四兩

南星二兩

半夏三兩

五倍子三兩

同桑豆五兩
共炒焦

大黃一兩

黃柏

姜黃一兩

乾生薑五兩

右各爲細末共和勻用葱汁米醋調成膏貼塊上時常以葱醋潤之毋令乾
燥其膏一日又取下加些新的復研再貼以消爲度

○一楊梅瘡愈後遺癬毒一層一層須度痒不可當

牛油

香油

柏油

黃蠅絳三兩 搶化待溫入

銀珠一不 五分官粉一不 賽香五分

右爲末八分和勻先將火烤癬令痒抓破擦上藥再烤再擦如神

○治楊梅瘡不論遠近先服防風通聖散十數劑後服此丸收功神効

輕粉一不

茶一不 糯米飯一不 芝麻一小

右共搗爲丸作一百个每早茶下十九層鹽要齋戒

○治楊梅瘡

雄黃二不五分真輕粉一不 杏仁去皮去皮三十個

右研爲細末八杏仁再研如泥用雄猪胆汁調搽瘡

要先洗淨拭乾搽三日始

疥瘡

夫疥與癬因熱客於皮膚之所致風毒浮淺者爲疥也毒之深沉者爲癬也多因風毒夾熱得之疥發於手足或至遍身癬則肌肉癰疹或圓或斜或如苔癬走散內藏汗而外藏有筐曰乾癬苦癬風癬濕癬四者莫不均有蟲者治癬去風殺蟲是也

○一論風癰疥癬癰疹紫白癰風赤遊風血風臙瘡丹癰及破傷風在上部者
加桔梗一錢在下部者加木瓜牛膝各一錢如濕氣成患而在下去蟬退姜

祛風敗毒散

枳實

赤芍

前胡

柴胡各五分

荆芥

薄荷

牛蒡子

獨活

蒼术各六分

姜蚕

連翹各七分

川芎

羌活各八分

蟬退

甘草各三分

○右剉一劑生姜三片水煎服

○一董芥如掃

銀硃一本

雄黃一本

木鼈子一个

好擗香一本

艾葉三本

右五味爲末以紙捲條陰陽瓦盛董鬲腿腕以被蓋之留頭面在外先以布包裹二便

○酒薰瘡疥蟲瘡

花椒

雄黃

薑艾

右三味共爲末將紙捲筒放被內薰之

○一洗疥如神

防風

荆芥

馬鞭草

白簪

花椒

蓆參

野菊花

右剉水煎湯洗神効

一治療如神

徐金坡傳

大楓子

五分

水銀渣

三分

樟腦

一又五分

右用油核桃同搗爛絞帛包擦疥上

○一薰疥妙方

油核桃去囊一半留

一半搗爛人人言未入匣攢

勻仍

合一處放瓦上火

薰之卽已

○一治諸瘡疥癩一掃光又名玉繡球

大楓子肉

四十個

杏仁

泡去皮四十

個二味同研

花椒

十九個

生用另研

茶葉

另研末一

不

樟腦

二又半另

研已輕粉

一不

同研

輕粉

一不

右和勻再研聽用先以槐柳桃楮桑五木枝煎湯洗
疥拭乾將前藥量疥多少用柏油八鹽少許乘熟和藥擦上一日搽三次忌羊雞魚猪頭等毒物

○一治乾疥瘡

香油四兩用花椒一兩熬至焦黑研爛八大楓子去壳七个輕粉三錢硫黃一錢人言三分爲末入油內搽之

十香膏

白礬

輕粉

水銀

雄黃

川椒

去目炒研

樟腦

各一錢

檳榔

一个研末

杏仁

四十個去皮同研

大楓子

取白肉四十個另研

右共和勻用柏油八錢俱入乳鉢內研至不見水銀星爲度丸如彈子大待瘡搔痒將藥丸子患處滾過

○治遍身風痒生瘡疥

土疾藜蘆煎湯洗之

○治老人生皮風疥瘡瘙痒

藜蘆根爲末脂油調搽即愈

○鼻聞香疥瘡後山李懷嚴傳

大楓子三十個

潮腦三錢研極

水銀一錢研至不見水

油核桃仁七个

八

右共二處再研用龜碗盛在內川紙蓋口勿令泄氣用時擦手心內以鼻聞
數目卽已或捺亦可

癬瘡

○風癬膿疮癰血風諸瘡腫毒

歸尾

一糸五分赤芍

黃芩

黃連

黃柏各一糸

大黃

各三糸防風八分

金銀花

苦參絡二木鼈子去壳二个

○右剉一劑水煎露一宿五更服○若腸風臟毒下血去木鼈子加槐花一錢
一治一切癬瘡癩痒甚者

胡粉另研

雄黃另研

硫黃另研各一錢五分大草烏三糸生用

斑蝥一糸

砒霜五分

全蝎稍三糸

麝香三分

○右爲細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處
○一治乾癬不瘥

天南星

草烏各一个生用

右爲末用羊蹄根搗汁調塗

○一治遍身頑癬

大楓子四十九个

川槿皮二兩

斑蝥去翅足五個

川椒紅輕粉紅杏仁紅海桐皮紅

右共爲末河水井水各一碗

浸一夜蘸汗擦之

○一治癬瘡妙方一萬嵩鶴傳

用馬蜂窩一个仰放炭火上用枯礬末漸上墳浦下面火炙令焦爲末

脚醋調塗癬上卽愈

○一切疥癬癬瘡及諸瘡不能收口者立見收口

腥腥草

晒乾爲雄黃

銀珠

木鼈子去壳

艾葉不拘多少

右爲末紙捲燒烟薰處立效

○一治疥癬瘡板血風痛痒神妙

孫方李存吾傳

大楓

十法壳四十九个

蛇床子

木鼈子去壳二十个

川椒

三錢

桔梗

二兩

輕粉

二錢

水銀

一錢

朝腦

一錢

右爲末柏油搗勻先將椒艾湯洗令淨時痒孤破擦處大効

○一治牛皮癬極痒孤爛

牛脚

爪燒灰存性爲末香

油調搽竅

○治癬瘡

用鉗針磨令極尖快當痒時於癬上各刺百針血出盡煎鹽湯洗之未愈再刺再洗

禿瘡

自禿之候頭上白點斑剥初似癬而上有白皮屑久則生痴疱成瘡遂至偏頭洗刮除其痂頭成瘡孔如節頭大裏有膿汁出不痛而有微痒時其裏有蟲甚細微難見尤蟲論亦云是蟻蟲動作而成此瘡至自小及長大不瘥頭髮落故謂之白禿也宜以後方而治之

○一治禿瘡方

藜盧三冬枯礬二冬苦參三錢五倍子三冬

右爲細末香油調搽

○一治禿瘡方

臨穎楊子登

傳

仙人垢

卽埋塋过人棺板底七垢膩也研爛不拘多少

右用鯽魚以香油煎熟去魚將油調仙人垢塗禿上一錢厚二次愈

○一治禿瘡

先用水洗令淨用燒酒和芥末調塗患處立已

○一治禿瘡

膽礬三冬乳香二冬沒藥

三冬紫草五冬食鹽三冬七柏油一冬

右同草鹽煎久下前三味刺

禿方擦

○一治禿瘡如神

二雲松弟驗

紫草三冬柏油一兩膽礬紅

沒藥三石乳紅樟腦紅淮鹽炒三冬

右爲細末柏油調勻先將頭髮剃淨再洗令淨擦藥一日搽一次神效

○一治小兒白禿瘡

黃柏皮五冬柏根一冬五分硫黃

韶粉

輕粉各一冬

右爲細末臍自紅油調自擦

三次又用大薪每早揩自處

○一治癰頭瘡

用鯽魚一箇重三、四兩去腸肚以亂髮填滿瓶裏燒存性雄黃一錢共爲

末清油調敷先以蘿洗拭後用藥

又方以苦練皮燒者脂調敷

元叉風

痕風

紫癜風白癬風乃因心火汙出及醉飽並浴後毛竅開時乘風揮扇得之扇風侵通皮腠所致宜服胡麻散或追風丸外以洗擦藥條之

○一論紫白癩風非疳及面上酒瘡又名粉瘡面刺但可服之

胡麻散

胡麻子赤色扁者

另研五醋

佳

白芷

三兩

何首烏

二兩

防風

三兩

蔓荆子

一兩

五錢

甘菊花

一兩

升麻

二兩

威靈仙

二兩

荳參

三兩

川當歸

二兩

小茴脣

二兩

牛蒡子

微炒

二兩

另研

白蒺藜

三兩

荆芥穗

三兩

薄荷葉

二兩

片黃芩

酒炒

二兩

白芍

酒炒

二兩

黃連

酒泡

一日

白芍

酒炒

二兩

右爲細末每服三錢食遠服秋分後至春分白酒調服春分後至秋分茶清
調服用米糊細七丸食遠白湯下亦可

○治白癩風

追風丸

何首烏四兩

荆芥穗四兩

葛根米泔浸焙四兩

苦參四兩

右爲細末好肥皂三斤去皮弦子入砂鍋內水熬成膏知爲丸如梧子大每
服五六十丸空心溫酒或茶任下忌一切動風之物

○治白癩風

用雄雞脣白果仁

搗爛擦患處

○治汗斑方

白蓮花

半夏

右各等分爲末飛麪

糊爲丸如彈子大用六安茶擦之

○治紫癩風白癩風

卽如今汙斑之類

白附子

雄黃

密陀僧

右各等分爲細末用帶皮生薑自然汁調以荳蔻蘸藥擦之卽愈

○一治紫曰癩風神方

雄黃二錢 雌黃

二不硫黃二不白砒二不並川透明者佳

右共爲末每用時先一浴令通身出汗次以搗生姜拌薑布包患處擦之良久以熱湯淋洗

○一沿白癰風方

用杜葵藜子生搗爲末作湯服之每服三錢

癩風

夫癩風者天地殺物之風燥金之氣也故令瘡而不膿燥而不濕燥金之休澁故一客于人則榮衛之行滯令人不仁而麻木也毛落眉脫者燥風伐其榮衛而表氣不同也遍身癩疹者上氣下血俱病也諸痛屬實諸瘡屬虛癩風之痒固多有蟲而衛之虛不可誣也是症也主燥劑以主之白花蛇血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈不油然而潤乎然其性中有毒同氣相求直達

厲風毒舍之處豈不
居然而効乎皂角之性善於潔身則亦可以潔病苦參
之性善於去熱則亦可以去風昔人吞以防風通聖散此方乃汗下之劑也
非榮衛虛弱者所宜今以玉屏風散更之則黃芪可以排膿補長防風可以
利氣疎和白朮可以實脾而補肌矣

補氣瀉榮湯

黃芪三分八參二分當歸三分生地黃四分黃連三分黃芩四分
連翹六分升麻六分桔梗五分甘草一分全蝎二分虫蟲一枝去足微炒
桃仁二箇蘇木三分麝香少許胡桐淚一分地龍三分水蛭三枚炒盡烟

右剗一劑水煎溫服

○一論治癩風手足麻木落眉脫遍身癩疹搔痒成瘡等症

愈風換肌丹

白花蛇二條頭尾全者酒浸一月去骨陰乾苦參四兩皂角五斤去皮弦酒浸一宿取出以水熬膏
右爲末以皂角膏和丸如梧子大每服七十九以防風通聖散送下

苦參酒

用苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服

苦參丸

苦參一斤防風

荆芥

羌活

獨活

當歸

川芎

赤芍

金銀花

連翹

黃連

黃芩

梔子

滑石

白术

甘草各二兩

右爲末麵糊爲丸如梧子大每服百丸苦參酒下

○一治癲風

如聖丹

全蝎

雨洗一兩

天麻

二兩

僵蚕

炒一兩

蟬退

一兩

蔓參

一兩

防風

一兩

荆芥

一兩

羌活

一兩

細辛

一兩

白芷

一兩

川芎

一兩

當歸

一兩

白芍

一兩

人參

五不

白米

去醋枳殼

一兩

桔梗

一兩

黃連

五不

黃柏

去皮一兩

大黃

一兩

芒硝

五不

麻黃

一兩

石膏

一兩

礞石

大楓子

去殼一兩

皂角刺

一兩

鬱金

五不

山梔子

一兩

連翹

一兩

獨活

五不

右三十味爲細末用紅米糊爲丸如梧子大每服五十九丸用六安茶送下
日三服半身全愈小便尿如漆水黑色此病之深者只用此藥二劑如眉毛

鬚髮脫落曰漸生長切不可食羊肉鵝鷄豬頭蹄鯉魚生冷如肯食淡百日全愈如瘡破裂只用大楓子殼煎湯洗春夏石菖滑石依方秋冬二味減半遇春分秋分服防風通聖散一貼空心服利三四次以粥補之方見中風

○一治癩風眉髮脫落者

取皇角刺九蒸九晒爲末每服三錢溫酒送下久服眉髮再生肌膚悅潤
眼目倍明

○一治大風惡疾雙目昏暗白髮自落鼻梁崩倒肌膚瘡爛此方特効

皇角刺三斤炭火蒸炙晒乾爲末煎大黃濃湯調服數日間髮生肌潤目
明諸病立瘥

○一治大麻風卽大風瘡

用人蛆一升細布袋盛之放在急水內沈之乾淨取起以麻黃煎炒將蟲
連布袋浸之良久取起晒乾再用乾草煎湯浸晒乾又用苦參煎浸晒乾
又用童便浸晒乾又用菖蒲煎湯投鼎入內不必取起就放鍋內煮乾就
焙乾爲末每虫一兩加麝香一錢蟾酥三錢共爲一處入磁器內每服一

錢石蘚花煎湯下花卽出中石上生白蘚如錢株以蒼耳草煎湯洗浴然

後服藥七日見効體厚者一曰一服弱者二日一服神効

臙瘡

夫臙瘡者皆由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之旁灌於陰交之側風熱更氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛臭穢步履艱難此病生于臙骨爲重以其骨上肉少皮薄故難愈至有多年無已瘡口開濶皮爛肉現臭穢可畏治瘡先取虫然後敷藥須翹足端坐勿多行履庶可痊矣

○一治臙腿生瘡或癬疥等症

四生散

白附子

黃芪

羌活

沙苑蒺藜

右各等分爲末每服二錢用猪腰子批開入藥溫紙裹包煨熟細研酒酒亦

○一論臙瘡乃濕毒所致及治遍熱瘡

黃白散

黃柏去皮一兩輕粉三錢

右爲細末用猪胆汗調至溫則乾摻

○一論遠年近日一切瞼瘡潰爛至骨疼痛當止痛生肌如神

三香膏

乳香二錢 松香三錢

右爲細末真生香油調用包粽子筍葉薄者密針刺孔將藥攢其上用筍葉貼患處葉居中上用完筍葉益其上帛扎住卽効

○一方用松香爲末入葱根鬚葉等分同搗爲餅外用石乳香爲末小參葉餅上搭在瘡口布帛緊扎二日一換鹽茶洗淨

○一治瞼瘡方

密陀僧八錢 石乳二錢 血竭一錢 銅青八分

右爲末將油紙刺孔桐油油紙上膠藥在油上隔紙貼之効

○一治瞼瘡頭瘡裙邊瘡

許敬吾傳

柏油三兩 蘭蠟三錢 白蠟三錢 香油三錢 密陀僧一兩五錢爲末

右將前四味入粗碗內火上煎化頻頻入陀僧在內揩不住手成膏爲度將

○一切無名腫毒疼痛瘡疽乳硬等 倉初發時卽用

真香油一杯溫熱飲之則毒不

攻心可以緩治

○一切無名腫毒瘡 痘頭腫起痛難當

卽將妙藥頻敷貼

免使猖狂作禍殃

○一治無名腫毒發皆癰疽疔瘡等毒

根退

白礬不拘多少爲末入新汲水內用粗紙三張浸內將一張搭患處頻頻

貼之更貼十數次立消

○一方用葱頭杵爛炒熟敷患處冷則易之

○一方用五倍子炒爲末醋調塗患處

○一方用大黃爲末醋調塗患處

○一方以端午日取白礬研爲末但遇瘡毒初起每服三錢加葱頭切拌

均酒調服

○一切無名腫毒初起

牙皂七箇燒存性爲末入真鉛粉炒過七錢擅用生酒調服

○一敷諸瘡腫未破者

○一 治諸瘡惡毒癰瘍疔瘻搭手背瘡等瘡 蝦臺一個先以石灰炒過後將蝦臺剝爛同研如泥用絹帛攢上貼

○一 治白
葱白 一斤 馬齒莧 一斤 石灰 一斤

右三味搗爲餅陰乾爲細末貼瘡即效

○一 外消腫毒方

猪苦胆 三箇 生薑 二錢

右三味合和一處以文火煎一盞

○一 治外科諸毒腫痛初起未破

腫處立消

用連翹夢數根用稻稈燒過半熟搗爛入蜜二匙再搗勻成餅敷患處立消內服白礬鉛化爲丸硃砂爲衣每服三錢用葱酒送下汗出立已

○一 治無名腫毒

用家園生地黃搗爛敷之立已

○一 切無名腫毒瘡癰

樹上馬蜂窩 二壁 錢扯破一乳

香沒藥 孩兒茶各八 雞膚皮

油紙刺孔上藥潤紙皮摺以孔在

下貼瘡

○一治兩足生臙瘡諸瘡久不已

後山李懷嚴傳

輕粉一錢

宮粉二錢

右用猪板油同搗爛開油紙上貼瘡外帛包緊一日換一次先用鹽茶

洗淨貼藥

○一治臙瘡脚方

先用米泔水洗淨再用川椒艾

葉濃煎水洗淨用黃丹不拘多少真香油

調搽碗裏以艾燒烟薰至黃色止用隔紙膏貼之妙

諸瘡

一專治疔瘡發背腦疽乳癰癰膿骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不
痛首服之便痛已成者服之立愈此乃惡症藥中至寶病危者立効復甦萬
無一失乃家傳之秘方不可輕視寶之寶之

龍奪命丹

雄黃三錢硃砂二錢輕粉五分

血竭一錢乳香二錢沒藥二錢銅綠二錢

爲衣輕粉五分

血竭一錢乳香二錢沒藥二錢銅綠二錢

胆礬一錢寒水石一錢麝香五分

蠅牛二升

吳蚣一條酒浸炙膽石

黃去頭足

僵蚕川芎好酒化

桑乾者

右爲細末先將蠅牛連殼搗爛和前藥爲丸如棗豆大如丸不就入酒打麪糊爲丸砂爲衣每服一丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於男左手右手心將藥丸裹於葱白內用無灰熱酒送下於避風處以衣蓋護之約行人五七里之外再飲熱酒數杯以助藥力發汗爲度病初醫一丸卽消如汗不出重者再服二丸汗出卽効三五日病重者再進二丸卽愈如疔瘡走黃過心者難治之汗出冷者亦難治如病人不能嚼葱搗爛亦可瘡在上食後服瘡在下食前服藥後忌冷水玉瓜茄子猪雜魚肉濕麪一切發風發瘡之物數方校正無差

瘧毒百應丸 單水雲傳

錦紋大黃一斤切

當歸

槐花

金銀花

皂角各四兩

右將六味細切水二十碗煎至十碗去渣浸大黃令透取起晒乾又浸又晒以汁盡爲度爲末麪糊爲丸如葵豆大每服六十四丸白湯送下以大便下滯物爲効

右各爲末。蚕繭扯破一錢，鼠香三錢，共鋪綿紙上捲作筒線，纏入香油點着，照患處如腫脹加艾少許。

○治諸般惡毒腫痛不可忍者

廣昌知縣刊行于世，活人多矣。

一枝箭

白芨

天花粉

知母

牙皂

乳香

金銀花

半夏

穿山甲

酥炙

貝母

各五分一錢

右剉一劑酒二

鍾煎一鍾溫服，汗出即愈。

○一切瘡毒腫痛成膿未成膿用火罐，須三次卽將膿水拔出而消散矣。

洪寶膏

天花粉三兩

赤芍二兩

白芷

兩

姜黃

二兩

兩

姜黃

一兩

右爲細末，茶調敷之。此藥一涼而已，能化血爲水，涼肌生肉，去死肌爛肉，及能破血退腫，又能止痛出膿。或用三分姜汁七分雞清調敷，能使血退，姜汁性熱，能引血潮，故血破散而後成膿，如熟盛瘡毒恐隨乾墮痛，亦腫不退者，用雞清調敷，取其難乾，如湯燒療，亦同也。

○敷治一切腫毒疼痛如神。

鐵鍑散

南星

草烏

白芨

白蔹

白薇

黃柏

天花粉

吳茱萸

白芷

芙蓉葉

右爲末

雞清調敷

○一治血風瘡并濕熱生癰其形如釘高起寸許者

追風解毒湯

連翹

黃連

黃芩

黃柏

防風

荆芥

金銀花

羌活

獨活

全蝎

姜炭

蒺藜

甘草

威靈仙

歸尾

赤芍

大棗

右剉各等分水煎服

○一治血風疥癬瘡癰瘍痛痒發熱等症

徐完初試驗

大楓子

去壳

樟腦

五錢

水銀

二錢

輕粉

核桃肉

十箇

○右共研爛爲丸如彈子大放手掌心揉擦其瘡自己連擦四五次以愈爲度
或將藥擦瘡上亦可

○一治軟瘡瘍毒久不能開口腫痛不可忍者

巴豆用簪穿燈上燒存性爲末放瘡頂上以膏藥貼之卽潰

○一治坐板瘡 瓯四九兄傳

花椒炒一錢 胡椒七分 枯礬一錢 人言一分

右爲末柏油調擦

○一治坐板瘡痛痒經年弗愈 中州傳

人言一分

密陀僧三分

硫黃二錢

石膏一錢五分

右爲末生者油調搽患處

○一諸瘡口難歛及多年惡瘡百方不癒或痛燃走不已者

馬齒莧擂罨口并周圍立効

○一諸般瘡毒臭爛不堪聞者

雄黃

生白礬

右各等分煎水洗之

○一治濕撓瘡方

黃蠅一錢

白蠟一錢 銅綠一錢

黃丹一錢

童子髮一錢

右用香油二兩入銅杓內熬入藥同煎將紙摺作十數層入鍋內熬貼瘡

○一治凍瘡

用茄子根濃煎湯洗并山雀兒

腦髓塗之

○一諸處凍瘡久不瘥年年發不歇

先寒後痛然後腫破出黃水不止

用雄雞黃一枚搗爛苦蠟各等分清油減半同於慢火熔熬調搽患處如治腳手凍瘡用橄欖殼存性爲末入輕粉油調塗上

○一治頭上風瘡腫痛臭爛

用包銀硃粗紙燒烟薰髮裹蟲卽死而愈

○一治蛇頭指

用雞子開一竅將指入內待蛋化水又換一个如此三枚卽已

○一手足患纏爪黃膿痛作癢不可忍者

用菖加石灰搗爛敷上立已

○一蛇頭指痛不可忍臭不可聞

用蝦蟆一條焙乾爲末猪膽汁調塗

○一又指無名腫毒痛不可忍

白皮末一小

蟾酥三分

右共和爲一處用雞清調塗當時腫消痛止

○治血風瘡

五膏

硫黃

豆蔻霜

右各等分柏油調搽

○治肥瘍黃水瘡

紅棗燒灰

枯礬

黃丹

官粉

松香

銀珠三分

右爲細末濕則摻之乾則香油調搽

○治脚上諸般瘡毒膏藥方

水銀一錢

沒藥五分新
瓦格乾

黃丹五

錢

細茶三錢

大楓子十箇去芦

輕粉一錢

黃蠟五錢

石乳香

五分

瓦格片腦三厘

真麻油一盞

右藥俱研極細末篩過用黃蠟麻油同煎用文武火慢慢煎鎔成膏稍冷方
下后臍再煎一刻取退用細嫩油紙薄抹隨瘡大小爲度不宜大潤二日一

換每貼用後藥煎水洗淨瘡口方貼

大黃

苦參

黃柏

蒼术

防風

金銀花

艾葉

茶葉

右各等分煎湯洗瘡口

○一年多年頑瘡久不愈者并諸瘻不收口者

黃蠟

黃丹

輕粉

乳香

沒藥各一錢

血竭

孩兒茶各一小錢

右爲細末先將生麻油牛瓦熬熟滴水成珠下黃蠟化開再入黃丹就起離火方下諸藥攢勻入罐收用

○一審花瘡及似花之狀

胭脂

貝母各三小

胡粉

分二小五硼砂

淡藥各二錢

右爲細末先用溫藥水洗淨後敷之

○一月蝕瘡蟲或生小耳內

胡粉炒微黃枯白研

等

黃連

輕粉

胭脂各三不射香少諸

右爲末以漿水洗之拭乾後擦藥上用茶油調敷即愈

○一腳生雞眼作痛者以持雞湯剝洗効

○一腳指縫自爛者

用鵝掌黃皮燒存性爲末敷之如水出用飛黃丹入花蕊石粉摻之

○一治脚前脰上生瘡腫扁頭毒潰爛久不已

隔紙膏 陳雲岳傳

枯礬三不

密陀僧三不

龍骨

煅二不

黃丹

水飛三錢

右用油紙將布針刺孔銅油調摻上貼患處

○一治軟癩方

用牛膠將滾水泡軟中留一孔出

氣貼患處久之自落

一人累年遍身生瘡疥風痒熱毒苦

當歸酒洗二兩 楚難禁子製此或服之永不生瘡疥

白芍乳汁炒二

兩 應生地黃酒洗二兩

防風去芦二兩 熟地黃酒蒸二

兩 川黃柏益水炒一半半童便

防風去芦二兩 熟地黃酒蒸二

兩 川黃柏益水炒一半半童便

知母去毛二兩酒炒

白朮壁土炒一兩

土茯苓六兩

荳蔻去粗皮四兩

甘草一兩

右爲細末用猪肚一箇好酒四壺文武火煮爛搗和藥末爲丸如梧子大每服五十九酒送下忌雞魚牛羊肉

○一治瘡疽久不愈

黃芪二兩

當歸一兩

白芍二兩

白芷三錢

川芎一兩

厚朴五錢

官桂七錢

陳皮一兩

炙甘草一錢

右剉姜煮煎服

膏藥

○一治一切風寒濕氣手足拘攣骨節酸疼男子瘡瘍婦人血瘕及腰脇諸般疼痛結核瘰疬頑癬頑瘡積年不愈瘧毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處肚腹疼痛瀉痢瘧疾俱貼臍王面白而寒尤効咳嗽哮喘受寒惡心胸膈脹悶面色癥黃心疼氣痛俱貼前心腎重傷力渾身痛者貼後心腰眼痛小腸氣等症貼臍下治無不効

翼齋傳參將方

木香

川芎

秦艽

歸尾

羌活

黃芩

貝母

赤芍

艾葉

連翹

續斷

威靈仙

丁皮

白蘚皮

玄參

霍香

山梔子

牙皂

骨碎補

蒼耳頭

麻黃

白芨各一兩

右用桃柳榆槐桑練楮七色

樹枝各三七

二斤浸藥夏三宿春五秋七冬十宿後煎藥枯油黑爲度用麻布瀝去渣滓

牛膝

細辛

獨活

防風

萆薢

半夏

白蘗

茅香

甘草節

肉桂

藁本

丁香

青風藤

烏藥

菖蒲

桃仁

穿山甲

五倍子

蟬退

鼈甲

蝶虱

一條蛇退三條

全蝎

蘇木

五加皮

降真節

金銀花

白芷

大楓子

蒼朮

兩頭尖

豆蔻

白芷

白芷

磁器內另以松香不拘多少先下淨鍋溶化後取起每香二片用薄酒四兩拭水軟硬得法仍瀝入水缸中令人扯抽色如黃金卽成膏矣

○一治風寒濕氣所侵跌撲閃_扭復損一切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼痛處
孝唯咳嗽貼背心濕痢貼臍頭疼眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒疔疽發背瘡癰濕毒癰瘡始覺時便貼患處卽消已成亦能壯腰長肉此痛甚
効不能盡述

神秘萬金膏

草烏

川芎

大黃各六分當歸

赤芍

白芷

白芍

烏藥

官桂

連翹

木鼈子絡八仙桃桑棗各四分

方加普參皂角絡五

右剉散用真麻油二斤浸藥一夜用火熬至藥焦色以生絲綢濾去渣不用
將油再入鍋內以文武火熬至滴水成珠不散方下飛過清丹十二兩要必
過陸續下勻滴水成珠不散爲度後入乳香沒藥末各四錢攪勻聽用

一方加酥合香三分

名萬應紫金膏

○一治杖撲湯火傷損瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈肉已死而用之自潰新肉易生擦至肉色漸白其毒始盡生肌最速如損裂者外皮不破內肉糜爛其外皮因內歟乾縮堅硬不潰底連好肉作痛故俗云疔癧皮致膿瘻無從而泄內創脹痛難以潰欬怯弱之人多成破傷風症每致不救若杖瘻內有瘀血者卽用有鋒芒磁片於患處破去塗以此藥則疔癧死肉自潰膿穢自出所潰亦淺生肌之際亦不結痂又免皺揭之痛殊有功

富歸膏

當歸一兩

生地黃一兩

黃蠟一兩

麻油六兩

右先將富歸地黃入油煎墨去渣入蠟熔化候冷攬勻卽成膏矣蓋當歸地黃麻油黃蠟主生肌止痛補血續筋與新肉相宜白蠟尤妙

○一治諸疮腫毒及諸病等症神効

神効萬靈膏 五臺山無窮禪師秘藏方

富歸

川芎

赤芍

生地黃

熟地黃

防風

羌活

獨活

連翹

山梔

黃連

大黃

玄參

苦參

白芷

五倍子

雨頭尖

皂角

桔梗

白蘚

紅芽大戟

山慈姑

天花粉

官桂各六錢

萆麻子

八十木鼈子

四十箇

杏仁四十箇

巴豆四箇

穿山甲十片

右剉散用真麻油二斤四兩，髮餘四兩入藥浸春秋三日。夏二日，冬五日。油藥放鐵鍋內文武火熬用槐柳枝長寸許各三十根同熬焦色，用麻布瀝去渣，再放泊鍋內熬滴水成珠，不散，傾出瓶內秤準油二斤，下山東黃丹一斤，松香二兩，姜汁煮過黃蜡二兩，桐油三兩，熬至不老不嫩，冷了下乳香沒藥血竭，孩兒茶阿魏百草霜各二錢，射香五分或一錢，輕粉三錢，馬草膏三錢，俱爲細末，藥油將好投下。恐洩藥氣，再熬不粘手，爲度。將膏藥理土內三四日，出火毒，磁瓶內收貯，遇意攤貼，倘膏嫩加杭粉，不拘多少，不粘手，爲度。

○貼諸瘡，勇疔瘻，發皆治。治臘病法于後。

○一瘡疽發，皆燙瘻瘻，毒纏起，爲癟，如有膿血之瘡，貼上膏藥，便罷不用手摩。

○一疥瘡癬瘡搔痒貼上不用手摩

○一風癩皮膚元用木鼈子火煨熟搗爛放腫上貼之

○一咽喉喘嗽貼當肓焰手摩百次

○一無名腫毒貼患處瘡初起焰手摩出汗諸毒發陰陽

男子貼丹田婦人貼

血海焰手摩百次

○一打破損刀傷貼患處如虛腫貼腫處焰手摩百次

○一熱嗽冷嗽傷刀貼肺俞焰手摩百次

○一風痰壅塞貼心坎痛處焰手摩百次

○一男婦諸痞塊用麪什圈放痞上用皮硝一兩鵝糞五錢大蒜二顆將爲一處用膏貼瘡上硝薑蒜放圈內以熨斗火熨藥上要透熱煨木鼈子肉放畜內小兒痞塊不用硝熨焰手摩百次

○一男婦偏正頭風俱貼太陽穴焰手摩百次

○一男子遺精女人白帶煨大鼈子肉男貼丹田女貼血海焰手摩百次

○一蟲脹貼心下贍上煨木鼈子肉焰手摩百次

○一左癱右瘓濕氣疼痛貼患處煨木鼈子肉焙手摩百次
○一暗風貼肺俞穴并心口下三寸焙手摩百次

○一月經不調貼血海焙手摩百次

○一醉後嘔吐貼肺俞心口焙手摩百次

○一冷氣沖心痛肚腹疼痛依病大小貼焙手摩百次

○一四時傷寒貼脊心焙手摩百次

○一已上諸般疼痛照法貼之焙手摩百次其患處即愈

杖瘡

○一杖打破脚腿腫痛

○一金鳳花稊一根搗爛如泥敷患處如乾又塗上一夜血散而愈

○一杖瘡久不愈者

○一雄猪骨髓日夜搽破腫處立已

○一杖打血侵膿腫痛

石灰三錢入水攪澄再入香油五錢用金鑲脚攪打成膏以雞翎掃上使
血水長流須臾腫消痛止

○一末杖之先

用白蠟細切人碗內滾酒泡服打着不痛

○一杖瘡方

用麻油二分水一分黃丹一錢入碗內用銀簪攪成膏用鴨毛刷上外用
紙貼日四五次趕血下行立時腫消痛止

○一治杖瘡及遠年近日一切頑瘡

黃蠟二兩

黃香

黑渣不用

香油

頭溫

乳香

未去

乳香

未去

沒藥

未去

右先將蠟入磁碗內慢火化開用筋敲碗邊續續入黃
香乳未取碗離火入溫香油於內攪勻待冷入水缸內去火毒三日取出油
甲紙攤藥貼患處

○一杖打傷毒敗而攻心欲死

蘇木三錢

紅花三錢

歸尾三錢

大黃二錢

右共爲末童便一大鍾煎至一鍾不拘時熱服

○一杖打後潰爛久不愈者此氣血虛也

人參 白朮
桂 芦炒 白茯苓

昇弓

陳皮

熟地黃 香附子 貝母

桔梗

甘草各等分

右剉一劑水煎空心服○往來寒熱加柴胡地骨皮○只乾加五味子麥門冬○膿清加黃芪○膿多加川芎○肌肉遲生加白芍肉桂

白龍捧瘡膏 方外異人傳

臘猪油一兩

七分

白蠟

輕粉

定粉各五分

黃臘三錢

朝腦分小五分

乳香

一錢

沒藥

錢

冰片一分

右爲末先以猪油同二蠟化開入羣藥末調攤貼之

寄杖神丹

何和字傳

比藥服後任行無妨且血不侵

福

乳香

沒藥各五分

血竭

孩兒茶

三七各一錢

木菖蒲

另研

白蠟各二錢辰砂七分

青木香一錢

海螵蛸五分

琥珀三分

天靈蓋

火煅

右爲末沙糖爲丸如苦珠大每服三九好酒送下卽打

盲不甚痛如未受責

用兩手搘背卽消

○一杖瘡潰爛生蛆用皂礬煅過爲末乾摻其內蛆即死

末乾摻其內蛆即死

折傷物

夫折撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刀傷皮破出血或致亡血過多
二者不可同法而治有瘀者宜攻利之若亡血者兼補行之又察其所傷有
上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛
後調氣養血補益胃氣無不効也

大凡傷損不問壯弱及有無瘀血停
○一論跌傷骨折用藥一厘黃酒調
下如重車行十里之候其骨接之有聲初
跌之時整理如舊對住綿衣蓋之勿令見風方服藥休移動端午日製忌婦

人鵝大等物

一厘金一大梁孫都督秘傳神効

土鱉上

箇新瓦

巴豆一箇

去壳

半

夏生臍乳香半分

沒藥半分

自然銅

火燒七次
用些須

右爲細末每服一厘好酒送下
被打傷重惡血攻心或木石厭
語取藥未便急劈開口以熱童便
一丸跌傷打傷腫痛不可忍者以

○一傷肢折臂者卽將折處膝上挷
內攬勻乘熱飲之仍將連根葱搗
○一折復先用止痛法

白礬爲末每用一七沸湯一碗化之以帕蘸熱敷傷處少時痛止然後排
整筋骨貼藥

○一治傷損瘀痛紅腫屬熱毒者并接斷

濟陰丹

天花粉三兩

薑黃

白芷

赤芍藥各一兩

可多用多則補得高起妙不可言
死并跌磕傷從高墜下跌死氣絕不能言
灌之一方用苧麻燒灰調酒服
生葱搗爛熱罨之甚妙

定用好酒一碗旋熱將雄雞一隻刺血在
爛炒熟敷上包紗冷再換亦治_{刀傷}血隨止

○一治跌打傷損傷骨先用手扯筋後用小奶奶一二隻搗爛搭上外用杉木板夾之次口再換取効如神

○一論打撲傷損至重大小便不通瘀血不散肚腹脹脹攻心悶氣至死者此藥逐下瘀血方可服補損藥

大成湯

大黃二分

芒硝二分

枳殼二分

厚朴一分

當歸一分

當歸一分

當歸一分

當歸一分

當歸一分

桃仁一分

蘇木一分

紅花五分

木通一分

甘草少許

甘草少許

甘草少許

甘草少許

甘草少許

右剉木煎溫服

○一論從高墜下惡血流於腸下痛不可忍

復元湯

柴胡五分

當歸六分

穿山甲

二分

二分

二分

二分

二分

二分

瓜萎仁二分

大黃酒浸二分

甘草二分

二分

二分

二分

二分

二分

二分

右剉一兩水二盞酒一盞煎八分

溫服以利爲度

○一論墮墮挫閃氣血凝滯攻刺腰痛

羌活桃仁湯

羌活

蒼朮米泔炒當歸

尾

玄胡索

桃仁去皮

紅花

牛膝去芦

杜仲

酒炒

破故紙炒

小茴香酒炒

乳香

官桂

右剉一劑半水半酒煎服

○一治跌撲傷損

真牛膠

一兩

乾冬瓜皮一兩

右二味剉碎入鍋內同炒焦枯存

仍飲熱酒二三盞厚蓋得微汗痛

○一論跌撲所傷爲敷涼藥或人元

不痛肉色不變久而不潰潰而不
回陽玉龍膏

草烏三錢炒

南星二兩煅

乾薑

一兩炒白芷一兩

赤芍一兩

妙

肉桂五錢

右爲末葱湯調搽熱酒亦可

接骨止痛神方

楮根皮

桂花枝又名合歡樹

又名夜合花

右二味用水一碗煎至七分加酒一鍾調入火燭過天靈蓋一二錢

溫服當
時漏止

○治跌撲傷頃

蟹三隻連殼搗爛好酒二碗煎去渣服消敷患處

○治打撲青腫疼痛

用青檳榔磨水頻掃患處其青腫立退

○一論打撲跌損傷牙咬刀傷出血諸般腫毒出體後肌肉不生痛不止者
止血定痛生肌散

乳香三錢

沒藥三錢

血竭二錢

黃丹飛過五錢

白芷三錢

龍骨火燭三錢

軟石

炒去火
毒

石膏二兩

朝腦少許

右爲細末磁器盛每以擦患處血止痛

定肌生

○一治傷損等症失血過多或因冠伐血氣耗損惡寒發熱煩燥作渴

八珍湯

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍

熟地黃

甘草

五分

右剉姜棗水煎服

○一治被人打傷筋骨跌撲傷氣血虛弱

等症宜

萬病無憂酒

方見補益

○一治打撲損傷落馬墜車一切疼痛

乳香定痛散

乳香

沒藥

川芎

白芷

赤芍各二兩

生地黃

牡丹皮略

二甘草五錢

右爲細末每服三錢溫酒并童便調下

○一治風損如神膏

謝醫風傳

用生薑汁葱白汁好醋各一碗下黃丹末半斤同熬又下香油四兩再入桐油四兩熬至滴水成珠不散下黃丹一兩再熬成珠入射香五分貼風損如神

破傷風

夫破傷風者有因卒暴傷損風裏之間傳
噤不開甚者邪氣入臟有因諸瘡不瘥
亦能外入於瘡爲破傷風之候有諸瘡
而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數
口噤目斜亦有破傷風不灸而病者因
易爲鬱結熱甚則生風也古方藥論甚
目惟河間論病同傷寒症治通於表裏
半裏者在表宜汗在裏宜下在表裏之
而無力者太陽也脉長而有力者陽明
法而施治不中者難矣但中風之人尚
卽轉腋多致不救大抵內氣虛弱而有
者雖傷而無害也

播經絡致使寒熱更作身體反張口
榮衛虛弱肌肉不生瘡眼不合風邪
不瘥舉世皆言斬艾爲上是謂熱瘡
微則發熱甚則生風搐或角弓反張
瘡着白痴瘡口閉塞氣壅於陽故熱
少以此疾與中風同論故不另立條
分別陰陽有在表有在裏有在半表
間宜和解不可過真治也故表脉浮
也脈浮而弦小者少陽也若明此三
可淹延歲月而破傷風始雖在表隨
轉腋多致不救大抵內氣虛弱而有
者得之若內氣壯實而無鬱熱

○一論破傷風邪初在表者急服此藥以解之稍遲則邪入於裏與此藥
不相合矣

羌活防風湯

羌活

防風

藁本

川芎

白芍

當歸

地榆

細辛

甘草各一錢

右剉水煎熱服

○一論破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪入於裏不可用矣
和解湯

羌活

防風

川芎

菊花

麻黃

豆膏

前胡

黃芩

細辛

枳殼

白茯苓

蔓荆子

甘草各五分

分薄荷

白芷各二錢半

右剉水煎熱服

○一論破傷風邪傳入裏舌強口噤頭背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胸腹滿悶便溺閉亦時或汗出脉洪數而弦也宜導之

通裏湯

川芎

羌活

藁本

大黃各二錢

右剉水煎溫服曬腑通和爲度

○一論風傷腎而腰痛者或左右痛無常處牽引兩足宣

五積散加防風全蝎三箇方見中寒

○一論破傷風及金刀傷打撲傷損并癱瘓咬傷能定痛生肌

玉真散

天南星

爲防風所制
服之不麻

防風

右各等分爲細末破傷風以藥敷口鼻後以溫酒調一錢如牙閔緊急角弓反張用藥二錢童便調下○打傷欲死但心頭微溫以童便灌下二錢并進二服○癩狗咬破先口噙藥水洗浮用綿拭乾貼藥更不再發無膿大効

○治破傷風

初覺有風急取熟糞堆內蟻蟲一二箇用手抱住待蟲口中吐出水就抹破處身穿稍厚衣裳待少時瘡口覺麻兩脇微汗出立効如風緊急速取此蟲三五個剪去尾肚內黃水自出塗瘡口再滴些少熱酒飲之汗出

立効燭草房上亦有此蟲

○治破傷風五七日未愈已至角弓反張牙關緊急服之神効

蟬退去頭足土淨五錢

右爲末用好酒一碗煎滾服之立甦

○治破傷風

奪命丹

川烏火服去黑皮一兩

雄黃

一錢

右爲末熬汁爲丸如連子大每服一丸用熟葉一片將藥裹內火微燒嚼爛

黃酒下衣蓋汗出卽愈

多法 治破傷風及風火咬傷方見 炙桂

○治破傷風牙關緊急

立効散

雄黃

香白芷

右各等分好酒煎服如牙關緊急者灌之卽活

湯火

凡遇湯火所傷切勿用冷物冷水冷

泥蓋熱氣得冷氣則却深搏爛人筋骨慎

之慎之先以鹽末和米醋調敷瘡

上次

以醋泥塗之仍用醋塗不絕暫救痛

苦一面急搗生地黃醋調敷瘡上直候

疼止雖厚至數寸不妨

○一切湯火傷呪云一龍樹王如來救吾行持北方玉癸禁火大法

龍樹王如來吾是北方玉癸水政斬

天下火星辰千里火星辰必降急急

呪畢卽握真武印吹之卽用少許水洗雖火燒手足成瘡亦可療

如律令

○治湯溫被火燒破瘡毒疼痛三方俱効

○一方用大黃末蜜和塗之立愈

○一方用鵝子清磨京畢塗之上用

三層濕紙蓋之

○一方用生白礬爲末香油調搗瘡破處不拘時

○治湯火傷

用持猪毛不拘多少焙乾燒灰存生研細末真香油調量患處大小周圍

厚敷於上中留一孔一日一次慢
圍櫬如敷急速及不留口則潰而有
○一治溫盪火燒此藥止痛解毒生血

清涼膏

生地黃二兩 渾運

山梔子

白芷一兩 葱白十根

右剉細用香油四兩煎至地黃等焦黑濾去渣再煎入黃蜡五錢慢火熬蜡化傾磁盆內以雞翎掃瘡上

○一治湯盪火燒瘡

家園生地黃旋取新者搗取自然汁入香油黃蜡少許炒鍋內熬成膏以
雞翎掃瘡上

○一湯火傷用水磨炭末塗

○或磨土朱塗○或用真桐油塗

一方用蘋頭切開水磨濃漿敷之

立効

一方用黃柏爲末香油調搽立已

蟲獸

○二癩狗咬方

班猫

以七日外記日 每日一箇至百箇 止用七箇

雄黃

二分

麝香

三分或用二

三厘

滑石

五兩

亦可

右俱觀人真氣虛實用

糯米一

勺與班猫同炒

以亦爲度

班猫去頭尾翅膀足

各爲細末

每結用二三茶匙酒

調服如不飲酒米湯亦可

服藥毒物如小

便中出或口吐出都是大小塊子

毒出後於瘡口下去三寸炙三壯効

先

熨香油一碗次用油洗瘡口

○又沙糖水調塗

仍服沙糖水一兩碗

○一被虎傷

用生葛根汁服并洗傷處或白礬末納瘡口痛即止

○一被驃馬咬

用馬鞭草燒灰油調敷之

○一百蟲入耳

用藍汁灌之或葱汁尤長或豬肉稍許炙香置耳邊亦出或薑管入耳內
口吸之虫隨出

○一癩狗咬傷

番本鼈卽馬錢子磨水吃卽看腦頂上有紅頭髮急宜扯去

○一蝎蟹方

硃砂

雄黃

膽礬

右各等分射香減半端午日取蛤蠆新蟾酥和爲丸一擦立止

○一癩狗咬傷神方

班猫去羽足七信香附七分

右共爲細末作一服燒酒調下如腹痛不可忍者吃豬肉湯二兩口解之卽止不一時小便出如狗形下來卽已避鑼鼓風一七日

○一蜈蚣入耳以雞肉置耳邊自出

○一蜈蚣咬痛不可忍用燒紙捲緊燒烟薰咬口立止○一方用紡線根搗酒研成膏藥外敷之○又宜烏鵲糞水調塗之○又蛇蠍咬之

○一蛇咬

雄黃

五靈脂

白芷

貝母

右各等分爲末每服二錢熱酒調服又以白礬用滾水泡化洗傷處効

○一蛇咬 端午製

雄黃 白礬生研

右各等分爲末溶黃蠟爲丸如梧子大每服七丸念藥王菩薩藥王菩薩七遍熟水送下

雄蝎蟇入痛在一處雌蝎蟇人諸處牽痛但將蝎牛搗碎塗傷處毒即解散蝎牛食蝎故也手浸冷水痛亦止

○一治蝎螫

天南星三箇 膽礬 五分

右用烟梢半斤化成水入二味末攢勻滴成錠子每遇蝎螫擦之立愈又治牙疼用燒酒入此錠少許漱口數次即止

○一治蛇傷

用半邊蓮研生酒吃凡被蛇傷將綿帛扎住勿令氣上行服藥後即當解去不然則所傷之處必潰爛矣

○一風犬咬人急於無風處以冷
十九日共七碗百日忌食魚腥

終身忌狗肉方得保全否則十傷九死一風

○大一日咬三人止一人用此方

得活親試其驗一用膽礬末傳患處立愈

○一辟蚊虫法

鱠蓋土炒

練花

芫花

苦參

藜蘆

川芎

右共爲末棗肉爲丸日乾燃之

○又方用黃鱗骨同鋸末捲作筒燒之

○一辟蚊虫方

用鰻鱺魚乾者於室內燒之

卽化爲水矣

○一凡蛇入七竅劈開蛇尾納川
之或飲酒食蒜以解內毒如被
蒜上氣之其毒自解凡毒虫傷並効

○一金猫辟鼠法

椿樹葉

冬青葉

絲瓜梗葉

右各等分每四季燒烟熏于堂中其風遠避一年燒四次

○治玉人耳

用猫尿滴耳中卽出取猫尿以生薑擦鼻其尿自出或用麻油滴之則玉死難出或用炒芝麻按之則出亦出更不如猫尿之速也

○治百虫入耳

搗薤汁灌耳中卽瘥○又宜川椒末一撮以酢半升調灌耳中行二十四步卽出○又宜火煅桃葉掩之取塞耳立出○又宜葱汁灌耳中虫卽出

○治蟻人耳

用川山甲燒存性爲末水調灌之卽出

○一百虫入耳不出

以雞冠血滴入耳中卽出

○一蜒躄入耳

地龍一條納葱葉中化水滴耳中其蜒躄亦化爲水

○一黃蜂螫

以熱酒洗之立効或用清油搽上卽愈

○一辟蚊虫

用黃荆子爲末入人言未加水以紙捲燒烟薰之

○一辟壁風臭虫用蜈蚣燒烟薰之方青盜水灌洗床帳永絕其迹