

湯液本草

上

東垣十書

卷十

湯液本草序

世皆知素問爲醫之祖而不知軒岐之書實出於神農本草也殷伊尹用本草爲湯液漢仲景廣湯液爲大法此醫家之正學雖後世之明哲有作皆不越此予集是書復以本草正條各從三陰三陽一二經爲例仍以主病者爲元首臣佐使應次之不必如編類者先玉石次草木次蟲魚以上中下三品爲門也如太陽經當用桂枝湯麻黃湯必以麻黃桂枝爲王本方中餘藥後附之如陽明經當用白虎湯必以石膏爲王本方中餘藥後附之如少陽經當用三禁湯必

以柴胡爲主本方中餘藥後附之如太陰少陰厥陰
之經所用熟藥皆倣諸此至於金匱祖方湯液舛定
爲常制凡可用者皆雜附之或以傷寒之劑改治雜
病或以權宜之料更療常疾以湯爲敖以散爲圓變
爲百端增一二味別作他名減一二味另爲殊法醫
壘元戎陰證略劍癰論萃英錢氏補遺等書安樂之
法湯液本草統之其源出於潔古老人珍珠囊也其
間議論出新意於法度之中註奇辭於理趣之外見
聞一得久弊全更不特藥品之咸精抑亦疾病之不
作矣

湯液本草序

神農嘗百草立九候以正陰陽之變化以救性命之昏札以爲萬世法旣簡且要殷之伊尹宗之倍于神農得立法之要則不害爲湯液漢張仲景廣之又倍於伊尹得立法之要則不害爲確論金域潔古老人派之又倍於仲景而亦得盡法之要則不害爲奇註絜古倍於仲景無以異仲景之倍於伊尹仲景之倍於伊尹無以異伊尹之倍於神農也噫宗之廣之派之雖多寡之不同其所以得立法之要則一也觀絜古之說則知仲景之言觀仲景之言則知伊尹之意

皆不出於神農矣所以先本草次湯液次傷寒論只
保命書闕一不可矣成無已明理方例云自古諸方
歲浸遠難可考憑仲景方最爲衆方之祖是仲景本
伊尹之法伊尹未神農之方醫帙之中特爲纏細參
合古法不越毫末實大聖之所作也文潞公藥準云
惟仲景爲群方之祖也昔唐宋以來得醫之名者如
王叔和葛洪孫思邈范汪胡治朱奉議王朝奉錢仲
陽成無己陳無擇輩其議論方定增減變易千狀萬
態無一有毫不出於仲景者金城百有餘載有潔古
老人張元素遇至人傳祖方不傳之妙法嗣是其子

雲岐子張壁東垣先生李杲明之皆祖長沙張仲景
湯液惜乎世莫能有知者予受業於東垣老人故敢
以題丙午夏六月王好古書

湯液本草上卷目錄

五臟苦欲補瀉藥味

臟腑瀉火藥

東垣先生藥類法象

用藥法象

藥性要旨

氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

升降者天地之氣交

用藥升降浮沉補瀉法

五味所甲

藥類法象

標本陰陽論

五方之正氣味

制方用藥附

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

用藥凡例

東垣報便

諸經嚮導

製方之法

用藥各定分兩

用藥酒洗曝乾

用藥根梢身剝

用圓散藥例

升合分兩

君臣佐使法

治法綱要

藥味車精

湯液煎造

古人服藥活法

古人服藥有法

察病輕重

海藏老人湯液本草

五宜

五傷

五走

服藥可慎

論藥所生

天地生物有厚薄堪用不堪用
氣味生成流布 七方

十劑

本草

目錄



湯液本草上卷

海藏 王好古 類集

新安 吳中珩 校正

五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急急食甘以緩之甘草欲散急食辛以散之川
芍以辛補之細辛以酸瀉之芍藥虛以生薑陳皮
之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之
母腎水也苦以補腎熟地黃黃蘖是也如無他證
錢氏地黃丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草
氏瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草

瀉心

心苦緩急食酸以收之五味子欲軟急食鹹以軟之
芒稍以鹹補之澤瀉以甘瀉之人參黃芪甘草虛
以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母
肝木也以生薑補肝如無他證錢氏安神丸主之
實則甘草瀉之如無他證錢氏方中重則瀉心湯
輕則導赤散

脾苦濕急食苦以燥之白朮欲緩急食甘以緩之甘
草以甘補之人參以苦瀉之黃連虛則以甘草大
棗之類補之如無他證錢氏益黃散主之心乃脾

之母以炒鹽補心實則以枳實瀉之如無他證以瀉黃散瀉之肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

肺苦氣上逆急食苦以瀉之詞子皮一作黃芩欲收急食酸以收之白芍藥以辛瀉之桑白皮以酸補之五味子虛則五味子補之如無他證錢氏阿膠散補之脾乃肺之母以甘草補脾實則桑白皮瀉之如無他證以瀉白散瀉之腎乃肺之子以澤瀉瀉之腎

腎苦燥急食辛以潤之知母黃蘖欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃蘖以鹹瀉之澤瀉虛則熟地

黃黃藥補之腎本無實不可瀉錢氏止有補腎地
黃丸無瀉腎之藥肺乃腎之母以五味子補肺
以上五臟補瀉內經臟氣法時論中備言之欲
究其精詳看本論

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火

木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火

梔子佐之

黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火

黃連佐之

柴胡瀉膽火亦以黃連佐之

白芍藥瀉脾火

石膏瀉胃火

知母瀉腎火

黃藥瀉膀胱火

柴胡瀉二焦火

黃芩佐之

以上諸藥各瀉其火不惟止能如此更有治病
合爲君合爲臣處詳其所宜而用勿執一也



東垣先生藥類法象

用藥法象

天有陰陽

風寒暑濕燥火 三陰三陽上奉之

溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也涼寒者天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽

金木水火土

生長化收歲下應之辛甘淡

酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也

味之薄者爲陰中之陽味薄則迺酸苦鹹平是也味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也

輕清成象

味薄茶之類

本乎天者親上

重濁成形

味厚六黃之類

本乎地者親下

氣味辛甘發散爲陽

酸苦湧泄爲陰

清陽發腠理

清之清者也

清陽實四肢

清之濁者也

濁陰歸六腑

濁之濁者也

濁陰走五臟

濁之清者也

藥性要旨

苦藥平升

微寒平亦升

甘辛藥平降

甘寒瀉火

苦寒瀉濕熱

苦甘寒瀉血熱

氣自虎之甘

調胃之甘

冬味之厚曰陰
大黃

至

陽生矣

之薄

肝中厚

陽之麻黃

味厚薄寒熱陰陽升降

文
中
醫
學
之
本
經

文
中
醫
學
之
本
經

升降者天地之氣交

茯苓淡爲在天之陽也陽當上行何謂利水而泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利水而泄下然而泄下亦不利乎陽之體故入手太陽麻黃苦爲在地之陰也陰當下行何謂發汗而升上經云味之薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而升上然而升上亦不利乎陰之體故入手太陰附子氣之厚者乃陽中之陽故經云發熱大黃味之厚者乃陰中之陰故經云泄下粥淡爲陽中之陰所以利小便茶苦爲陰中之陽所以清頭目

湯液本草 卷上 大
用藥升降浮沉補瀉法

肝膽

味辛補酸瀉

氣溫補涼瀉

肝膽之經前後寒熱不同

逆順互換入求責法

心小腸

味鹹補甘瀉

氣熱補寒瀉

二焦命門補瀉同

脾胃

味甘補苦瀉

氣溫涼寒熱補瀉各從其宜

逆從互換入求責法

肺大腸

味酸補辛瀉

氣涼補溫瀉

腎膀胱

味苦補鹹瀉

氣寒補熱瀉

五臟更相平也一臟不平所勝平之此之謂也

故云安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則

衛亡榮散衛亡神無所居又仲景云水人於經
其血乃成穀人於留脈道乃行故血不可不養
衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五味所用

舌泄

其緩

酸收

鹹軟

淡滲泄

辛散

藥類法象

風升生也

味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是

防風

純陽味辛性溫

升麻

氣平味微苦

柴胡

氣平味苦辛

羌活

氣微溫味苦

葳靈仙

氣溫味苦

葛根

氣平味甘

獨活

(氣)微溫
味苦甘平

細辛

(氣)溫
味大辛

桔梗

(氣)微溫
味甘辛

白芷

(氣)溫
味大辛

藁本

(氣)溫
味大辛

鼠黏子

(氣)平
味辛

蔓荆子

(氣)清
味辛

川芎

(氣)溫
味辛

天麻

(氣)平
味苦

秦艽

(氣)微溫
味苦辛平

麻黃

(氣)溫
味甘苦

荆芥

(氣)溫
味苦辛

前胡

(氣)微寒
味苦辛平

薄荷

(氣)溫
味苦辛

熟浮長

(氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也)

黑附子

(氣)熱
味大辛

烏頭

(氣)熱
味大辛

乾薑

(氣)熱
味大辛

乾生姜

(氣)溫
味辛

良姜

(氣)熱
味本味

肉桂

(氣)熱
味大辛

桂枝

(氣)熱
味甘辛

草豆蔻

(氣)熱
味大辛

丁香

(氣)溫
味辛

厚朴

(氣)溫
味辛

木香

(氣)熱
味苦辛

益智

(氣)熱
味大辛

白豆蔻

氣熱味大辛

川椒

氣熱溫味大辛

吳茱萸

氣熱味苦矣

茴香

氣平味辛

延胡索

氣溫味辛

縮砂

氣溫味辛

紅藍花

氣溫味辛

神麴

氣大暖味甘

濕化成

戊濕其本氣應之

己王其本氣

庚其本味

辛其本味

壬其本味

癸其本味

壬其本味

人以脾應之

黃芪

氣溫平味甘

人參

氣溫味甘

甘草

氣平味辛

當歸

氣溫味辛

一作熟地黃

氣寒味甘

半夏

氣微寒味辛平

白朮

氣溫味甘

蒼术

氣溫味甘

陳皮

氣溫味微苦

青皮

氣溫味甘

藿香

氣微溫味甘

檳榔

氣溫味辛

莪朶

氣溫味苦

京三稜

氣溫味苦

阿膠

氣微溫味甘

杏仁

氣溫味甘

苦杏仁

氣溫味甘

大麥蘖

氣溫
味鹹

桃仁

氣溫
味甘苦

紫草

氣寒
味苦

蘇木

氣平
味甘酸
一作朱酸

燥降收

氣之薄者
味甘鹹
涼是也

茯苓

氣平
味甘

澤鴟

氣平
味甘

渭石

氣寒
味甘

瞿麥

氣平
味甘

燈心草

氣平
味甘

五味子

氣溫
味酸

天門冬

氣寒
味微苦

白芍藥

氣微寒
味酸

犀角

氣寒
味苦酸

烏梅

氣平
味酸

地骨皮

氣寒
味苦

枳殼

氣寒
味苦

連翹

氣平
味苦

枳實

氣寒
味苦酸

木通

氣平
味甘

寒沉藏味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹氣寒
是也

大黃

氣寒
味苦

黃芩

氣寒
味苦

黃芩

氣寒
味苦

黃連

氣寒
味苦

石膏

氣寒
味辛

草龍膽

氣寒
味大苦

生地黃

氣寒
味苦

知母

氣寒
味大辛

防已

氣寒
味大苦

茵陳

氣微寒
味苦平

升硝

氣寒
味苦辛

瓜蔞根

氣寒
味苦

牡礪

氣微寒
味苦平

玄參

氣寒
味微苦

山梔子

氣寒
味微苦

川練子

氣寒
味苦平

香豉

氣寒
味苦

地榆

氣微寒
味甘鹹

標本陰陽論

天陽無圓氣上升浮晝動輕燥六腑

地陰有方血下降殺沉夜靜重濕五臟

夫治病者當鄉標本以身論之則外爲標內爲本陽爲標陰爲本故六腑屬陽爲標五臟屬陰爲本此臟腑之標本也又臟腑在內爲本各臟腑之經絡在外爲標此臟腑經絡之標本也更入人身之臟腑陰陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病爲本後傳流病爲標凡治者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益畜后先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先治本故也若有中滿無問標本先治中滿謂其急也若

中滿後有大小便不利亦無問標本先利大小便次治中滿謂尤急也除大小便不利及中滿三者之外皆治其本不可不慎也從前來者爲實邪從後來者爲虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者爲實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標旣肝受火邪先於肝經五穴中瀉榮心行間穴是也後治其標者於心經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之八肝經藥

爲之引用瀉心火藥爲君是治實邪之病也假令肝受讞是從後來者爲虛邪虛則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本旣受水邪當先於督經湧泉穴中補水是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是牛治其本也以藥論之八腎經藥爲引用補肝經藥爲君是也

五方之正氣味

制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味甘在人以肝膽應之南方丙熱丁火其氣熱其味辛在人以心小腸三焦

包絡應之

中央戊濕其本氣平其無氣溫涼寒熱在人以腎應之

中央己土其本味鹹其無味辛甘酸苦在人以脾應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之
北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之
人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長湏栗兩儀之氣而生化也聖人垂世立教不能渾詭必當分析以至理而言則陰陽相附不相離其實一也呼則因

陽出吸則隨陰入天以陽生陰長地以陽殺陰藏此
主說止明補鴻用藥君之一也故曰主病者爲君用
藥之機會要明輕清成象重濁成形本乎天者親上
本乎地者親下則各從其類也清中清者清肺以助
其天真清中濁者榮華腠理濁中清者榮養於神濁
中濁者堅強骨髓故至真要大論云五味陰陽之用
辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰淡味滲泄爲陽鹹味
湧泄爲陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟
或堅各以所利而行之調其氣使之平也詳見本論

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

如頭痛湏用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎

陽明白芷

少陽柴胡

太陰蒼朮

少陰細辛

厥陰吳茱萸

如湏巔痛湏用藁本去川芎

如放節痛湏用羌活去風濕亦宜用之

如腹痛湏用芍藥惡寒而痛加桂熟熱而痛加黃蘖

如心下痞湏用枳實黃連

如肌熱及去痰者湏用黃芩肌熱亦用黃芪

如腹脹用薑制厚朴

一本有
芍藥

如虛熱湏用黃芪止虛汗亦用

如脇下痛往來潮熱日晡潮熱湏用柴胡

如脾胃受濕沉困無力怠惰好卧去痰用白术

如破滯氣用枳殼高者用之夫枳殼者損胃中至高

之氣三三服而已

如破滯血用桃仁蘇木

如補血不足湏用甘草

如去痰湏用半夏熟痰加黃芩風痰加南星胸中寒

痰痞塞用陳皮白朮多用則瀉脾胃

如腹中窄狹湏用蒼朮

如調氣湏用木香

如補氣湏用人参

如和血湏用當歸凡血受病者皆宜用當歸也

如去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者必湏酒洗防

巴草龍膽黃藥知母

如去上焦濕及熱湏用黃芩瀉肺火故也

如去中焦濕與偏熱用黃連能瀉心火故也

如去滯氣用青皮勿多服多則瀉人真氣

如渴者用乾葛伏苓禁半夏

如嗽者用五味子

湯液本草
卷之三
如喘者用阿膠

如宿食不消湏用黃連枳實

如胃中煩熱湏用梔子仁

如水漏湏用白朮茯苓芍藥

如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則

可

如血刺痛用當歸詳上下用根梢

如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黃芩黃芩詳上下用

根梢及引經藥則可

如眼痛不可忍者用黃連當歸身以酒浸煎

如小便黃者用黃蘖數者濾者或加澤瀉

如腹中實熱用大黃苦硝

如小腹痛用青皮

如莖中痛用生耳草梢

如驚悸恍惚用茯神

如飲水多致傷脾用白朮茯苓猪苓

如胃脘痛用草豆蔻

凡用純寒純熱藥必用耳草以緩其力也寒熱相雜亦用耳草調和其性也中滿者禁用經云

中滿者勿食耳

用藥凡例

凡解利傷風以防風爲君葛草白朮爲佐經云辛甘
發散爲陽風宜辛散防風味辛及治風通用故防
風爲君甘草白朮爲佐

凡解利傷寒以葛草爲君防風白朮爲佐是寒宜甘
發也或有別證於前隨證治病藥內選用分兩以
君臣論

凡眼暴發赤腫以防風黃芩爲君以鴟火以黃連當
歸身和血爲佐無以各經藥用之

凡眼久病昏暗以熟地黃當歸身爲君以羌活防風

爲臣甘草甘菊之類爲佐

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草爲君當歸白术爲佐

血先後以三焦熱論

凡水瀉以茯苓白术爲君芍藥甘草爲佐

凡諸風以防風爲君隨治病爲佐

凡嗽以五味子爲君有痰者以半夏爲佐喘者以阿膠爲佐有熱無熱以黃芩爲佐但分兩多寡不同耳

凡小便不利黃蘗知母爲君茯苓澤瀉爲佐
凡下焦有濕草龍膽防已爲君甘草黃蘗爲佐

凡痔漏以蒼朮防風爲君甘草芍藥爲佐詳別證加減

凡諸瘡以黃連當歸爲君甘草黃芩爲佐

凡瘻以柴胡爲君隨所發時所屬經分用引經藥佐之

已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治病
藥內逐旋加減用之

東垣報使

太陽

羌活

陽明

白芷升麻

下石膏

下黃芩

少陽

柴胡

下青皮

太陰

白芍藥

少陰

知母

厥陰

青皮

柴胡

小腹膀胱屬太陽

藁本羌活是本方

三焦膽與肝包絡

少陽厥陰柴胡強

陽明大腸無足胃

葛根白芷升麻當

太陰肺脈中焦起

白芷升麻葱白鄉

脾經少與肺經異

升麻芍藥自者詳

少陰心經獨活主

腎經獨活加桂良

通經用此藥爲使
更有何病到膏肓

貴

南星

款冬花

升麻

桔梗

檀香

山藥

粳米

白茯苓

玉味子

天門冬

阿膠

麥門冬

桑白皮

杏仁

葱白

太陰

丁香

益智

白蔻

知母

縮砂

檀香豆蔻

使君子

黃芩

石膏

陰經

橘紅

桑白皮

白蔻

藿香

手太陽

阿膠

桑白皮

杏仁

導圖

當歸

桑白皮

白蔻

防風

葛根

桑白皮

白蔻

足太陽

當歸

桑白皮

白蔻

足太陰

葛根

桑白皮

白蔻

足太陽

葛根

桑白皮

白蔻

足太陰

葛根

桑白皮

白蔻

足太陽

葛根

桑白皮

白蔻

足太陰

葛根

桑白皮

白蔻

足太陽

葛根

桑白皮

白蔻

半夏

縮砂

延胡索

白芍藥酒浸

升麻葛根

木瓜

卵

升麻

白芷

麻仁

秦艽

薤白

白石脂

縮砂

白石脂爲使

肉豆蔻

石膏

手

奇

陽明經

連翹

大黃

足

胃

升麻

葛根

麻黃

辰

半夏

知母

白朮

升麻

導圖

丁香

葛根

縮砂

防風

石膏

白朮

梔子

佐益藥

蒼朮

神麃

葛根

烏藥

白朮

梔子

佐益藥

皇朮

亥

川芎

柴胡

青皮

白术

熟地黃

地骨皮

石膏

細辛

附子

青皮

川芎

柴胡

少陽

嚮

導

足

子

半夏

草蔻膾

柴胡

連翹

柴胡下青皮

沙参

白术

柴胡

熟地黃

牡丹皮

敗醫

青皮芩胡

熟地黃

成扇手厥陰經

五肝足腎導圖

草龍膽

山茱萸

蔓藥

代赭石

阿膠

紫石英

瞿麥

當歸

桃仁

甘草

桃仁

葛根茶

柴胡

川芎

皂角

桃仁

葛根茶

未

小腸

手太陽經

足少陽經

申膀胱

白朮 生地黃 赤茯苓 羌活 赤石脂
縮砂 赤石脂爲使

羌活

赤石脂

防風 羌活

藁本畏辛子

茴香黃藥

白朮 潤濕

防己 黃酒

藁本 羌活

羌活 黃藁本

葛根

滑石

茵陳

白茯苓

猪苓

澤瀉

桂枝

黃檗

羌活

麻黃

湯液本草

卷一

十一

午心 手少陰經

麻黃 桂心 當歸 生地黃 黃連

紫石英 梔子 獨活 赤茯苓

附子 沈香 益智 黃耆

獨活或用桔梗或用礞石 地骨皮 阿膠 猪膚
牛草

赤茯苓

細辛 熟地黃 五味子 潤瀉

地榆 附子 知母 白术

知母 牡丹皮 黃芩
梔子山茱萸

黃芩 玄參 地骨皮 阿膠

敗醬 牡礪 猪苓 潤瀉

五味子 茄黃 白茯苓 益智

縮砂黃柏 紫苑

地榆 附子 知母 白术

腎石 腎足圓導

附子

沈香

益智

黃耆

使

製方之法

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味各有所能不可不通也藥之氣味不比同時之物味皆鹹其氣皆寒之類是也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣互相氣味各有厚薄性用不等觀其方者必且明其爲用經曰味爲陰味厚爲純陰味薄爲陰中之陽氣爲陽氣厚爲純陽氣薄爲陽中之陰然味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱又曰辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰鹹味湧泄爲陰淡味滲泄爲陽凡此之味各有所能然辛能散結潤燥苦能燥濕

鹹能軟堅酸能收緩收散甘能緩急淡能利竅故經曰肝苦急急食甘以緩之心苦緩急食酸以收之脾苦濕急食苦以燥之肺苦氣上逆急食苦以泄之腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通其氣也肝欲散急食辛以散之心欲軟急食鹹以軟之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之凡此者是明其氣味之用也若用其味必明其氣之可否用其氣必明其味之所宜識其病之標本臟腑寒熱虛實微甚緩急而用其藥之氣味隨其證而製其方也是故方有君臣佐使輕重緩急

地黃酒洗亦然當歸酒浸取發之意也

用藥根梢身例

凡根之在土者中半已上氣脉之上行也以生苗者爲根中半已下氣脉之下行也人土以爲梢病在中焦與上焦者用根在下焦者用梢根升而梢降大凡藥根有上中下人身半已上天之陽也用頭在中焦用身在身半已下地之陰也用梢述類象刑者也

用圓散藥例

仲景言剉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀古之制也古者無鐵刃以口咬細令如麻豆爲粗藥煎之使藥

水清歛於腹中則易升易降也此所謂咬咀也今人
以刀器剉如麻豆大此咬咀之易成也蔽一槩爲細
末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走五臟果何
謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑咬咀之藥取汁
易行經絡也若治至高之病加酒煎去濕以生薑補
元氣以大棗發散風寒以葱白去膈上痰以蜜細末
者不循經絡止去胃中及臟腑之積氣味厚者白湯
調氣味薄者煎之和相服去下部之疾其丸極大而
光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠麵糊取其
遲化直至下焦或酒或醋取其收其散之意也犯子

夏南星欲去濕者以生薑汁稀糊爲圓取其易化也
水浸宿炊餅又易化滴水圓又易化煉蜜圓者取其
遲化而氣循經絡也蠟圓者取其難化而旋旋取效
也大抵湯者盪也去大病用之散者散也去急病用
之圓者緩也不能速去之其用藥之舒緩而治之意
也

升合分兩

古之方劑鑄銖分兩與今不同謂如咬咀者卽今剉
如麻豆大是也云一升者卽今之大自盞也云銖者
六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩也云三

兩者卽今之一兩云三兩卽今之六錢半也料例大
者只合三分之一足矣

君臣佐使法

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之
謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也帝曰三品
何謂曰所以明善惡之殊貫也

凡藥之所在者皆以氣味爲主補瀉在味隨時
換氣王病者爲君假令治風者防風爲君治上
焦熱黃芩爲君治中焦熱黃連爲君治濕防已
爲君治寒附子之類爲君無見何證以佐使藥

分治之此制方之要也本草說上品藥爲君各
從其宜也

治法綱要

氣交變論云夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此生長化成收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣失常之理則天地四時之氣無所運行故動必有靜勝必有復乃天地陰陽之道也假令高者抑之非高者固當抑也以其本下而失之太高故抑之而使下若本高何抑之有假令下者舉之非下者固當舉之也以其本高而失之太

下故舉而使之高若本下何舉之有如仲景治表虛
製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本平天者
親上故桂枝爲君芍藥甘草爲佐陽脈濇陰脈弦法
當腹中急痛製小建中湯方芍藥味酸寒主收肺中
本平地者親下故芍藥爲君桂甘草佐之一則治表
虛一則治裏虛各言其主用也後之用古方者觸類
而長之不致差誤矣

藥味專精

至元庚辰人月許伯威年五十四中氣本弱病傷寒
八九日醫者見其熱甚以涼藥下之又食梨三陽枚

痛傷脾胃四肢冷時發昏憤子形其脈動而中止有時自還乃結脉也心亦悸動吃噫不絕色變青黃精神減少日不欲開倦臥惡人語唉以炙甘草湯治之成無已云補可去弱人參大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣五臟瘦弱榮衛涸流濕劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脉通心是也加以人參桂枝急扶正氣生地黃減半恐傷陽氣剉一兩劑服之不效予再候之脈證相對莫非藥石陳腐者致不效乎再市藥之氣味厚者煎服其證減半再服而安凡藥之昆蟲草木產之有地

根葉花實採之有時失其地則性味少異矣失其時則氣味不全矣又况新陳之不同精粗之不等倘不擇而用之其不效者醫之過也內經曰司歲備物氣味之精專也脩合之際宜加謹焉

湯藥煎造

病人服藥必擇人煎藥能識煎熬制度須令親信恭誠至意者煎藥銚器除油垢腥穢必用新淨甜水爲土量水大小斟酌以慢火煎熬分數用紗瀝去粗取清汁服之無不效也

古人服藥活法

在上不厭頻而少在下不厭頃而多少服則滋榮於
上多服則峻補於下

古人服藥有法

病在心上者

先食而後藥

病在心下者

先藥而後食

病在四肢者

宜餓食而在日

病在骨髓者

宜飽食而在夜

察病輕重

凡欲療病先察其源先候其機五臟未虛六腑未竭
血脈未亂精神未散服藥必效若病已成可得半愈

病勢已過命將難存自非明醫聽聲察色至於診脉
就能知未病之病乎

海藏老人湯液本草

五宜

肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘

心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸

肺色白宜食苦小麥羊肉杏薤皆苦

脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹

腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

毒藥攻邪

五穀爲養

五果爲助

五畜爲益

五菜爲充

氣味合而服之以補精益氣此五者有辛酸甘

苦鹹各有所利或散或收或緩或急或堅或軟
四時五臟病隨五味所宜也

大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病
十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之
無使過之傷其正也蓋陰之所生本在五味陰之五
官傷多在五味是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味
過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿
色黑腎氣不衝味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過
於辛筋脈沮弛精神廻央是故謹和五味骨正筋柔
氣血以流腠理以密如是則氣骨以精謹道如法長

有天命

五傷

多食鹹

則脉凝澀而變色

多食苦

則皮槁而毛拔

多食辛

則筋急而爪枯

多食酸

則肉胝脣而唇揭

多食甘

則骨痛而髮落

五走

鹹走血

血病毋多食鹹

苦走骨

骨病毋多食苦

辛走氣

氣病毋多食辛

酸走筋

筋病毋多食酸

甘走肉

肉病毋多食甘

夫五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也

服藥可慎

熱中消中不可服膏梁芳草石藥夫芳草之氣羨石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此夫熱氣慄悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾

勝者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

論藥所生

海藏云湯液要藥最爲的當其餘方論所著雜例比之湯液稍異何哉蓋伊尹仲景取其治之長也其所長者神農之所註也何以知之本草云一物主十病取其偏長爲本文當取潔古珍珠囊斷例爲準則其中藥之所主不必多言只一兩句多則不過三四句非務簡也亦取其所主之偏長故不爲多也

天地生物有厚薄堪用不堪用

厥陰

風化

酸化

少陰

司

熱化

在

苦火

太陰

濕化

甘化生

少陽

火化

苦化火

陽明

天

燥化

泉

辛化金

太陽

寒化

鹹化水

歲物何也天地之專精也專精之氣藥物肥濃又於

故治病者必明六化分治五味五色所生五臟所宜
迺可以言盈虛病生之緒也謹候氣宜無失病機其
主病何如言採藥之歲也司歲備物則無遺生矣先

池用當其正氣味也五運主歲不足則物薄有餘則物精非專精則散氣散氣則物不純是以質同而異等形質雖同力用則異也氣味有厚薄性用有躁靜治化有多少力化有淺深此之謂也

氣味生成流布

陽爲氣陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化爲氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者爲陰薄爲陰中之陽厚則泄薄則通氣厚者爲陽薄爲陽中之陰薄則發泄厚則發熱壯火之氣衰少火之氣壯

壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色脩明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生

火位之主

甘鴻—鹹補

火之客

鹹補—甘鴻

少之勝

辛寒

之復

鹹冷

佐

苦鹹—甘瀉

少陰同法無把溫涼發不達熱

苦辛—鹹軟—酸收

辛苦—酸收—苦發

陽

在泉 濡于內 治以

鹹冷

以

苦甘—酸收—苦發—酸復之

司天 濡所勝

平以 酸冷

之主

酸鴉+辛補

之客

辛補+酸鴉+甘緩

水之勝

甘滑

苦辛

酸鴉

之復

酸寒

甘辛

酸鴉

陰在泉

溼于內治以辛涼

苦甘

甘緩+辛散

天風

淫所勝平以辛涼

苦甘

甘緩+酸鴉

火位之氣

甘瀉
鹹補

之客

鹹補
甘瀉

少之勝

辛寒

甘瀉

之復

鹹寒

苦

陰

在泉

溼內

治以鹹寒

佐

苦

司天

熱

溼筋

乎以酸寒

以

苦甘酸收

濕

燥

寒

司地

熱發勝之

治以

平寒

佐以

苦甘一酸平之以知爲利

苦冷

鹹耳一鹹平之

鹹冷

甘辛一苦孚之

治以

苦寒

佐以

苦酸

寒

燥

濕

化天

鹹寒

苦辛

金雙主

辛瀉+酸補

之客

酸補+辛瀉

陽之勝

辛甘 苦瀉

之復

酸溫 辛溫

明在泉

佐 苦甘 苦泄

司天燥

以 苦辛 十苦下

淫于內治以苦溫

酸辛+苦下 酸補

化天風

清反勝之治以

酸溫

佐 苦甘

辛平

司地

酸溫

以 苦甘

辛平

土位之主

苦瀉—甘補

甘補—苦瀉

太
之客

苦補—苦瀉

太
之勝

苦補—甘補

之復

辛耳
苦燥之泄之瀉之

溼于內

治以

苦熟

佐

酸辛

酸淡

苦燥—淡泄

司天

濕

溼所勝

平以

苦熱

以

酸辛

其辛以燥爲故而止

水位之主

鹹瀉苦補

之客

苦補鹹瀉

太之勝

苦熱

之復

鹹熱

陽在泉

其熱

司天

平以辛熱

寒

溼所勝

治以其熱

以

其

佐

其

辛

其

堅

辛酸鹹瀉

其

堅

苦辛鹹瀉

其

堅

辛潤苦堅

其

堅

其

堅

其

堅

火
熱

火
溫

養勝之治以

甘
熱

甘
熱

佐
以

苦
辛

苦
辛

鹹
平
之

鹹
平
之

火
熱

火
溫

甘
溫

甘
溫

苦
辛

苦
辛

七方

大君一臣三佐九制之大也

遠而奇偶制大其服也大則數少少則二之
腎肝位遠服湯散不厭頃而多

小君一臣二制之小也

近而奇偶制小其服也小則數多多則九之
心肺位近服湯散不厭頻而少

緩補上治上治以緩緩則氣味薄

急治主以緩緩則治其本

補下治下制以急急則氣味厚

治客以急急則治其標

奇君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也

陽數奇

偶君二臣四偶之制也君三臣六偶之制也

陰數偶

複奇之不去則偶之是爲重方也

十劑

宣可以去壅薑橘之屬是也

通可以去滯木通防已之屬是也

補可以去弱人參羊肉之屬是也

瀉 可以去閉塞壅大黃之屬是也

輕 可以去實麻黃葛根之屬是也

重 可以去怯磁石鐵礬之屬是也

滑 可以去著多葵子榆白皮之屬是也

澁 可以去脫牡礪龍骨之屬是也

燥 可以去溫桑白皮赤小豆之屬是也

濕 可以去枯白石英紫石英之屬是也

只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所

失矣陶隱居云藥有宣通補瀉輕重滑澁燥濕此

十劑今詳之惟寒熱二種何獨見遺今補二種以

盡厥古

寒可以去熱大黃朴硝之屬是也
熱可以去寒附子官桂之屬是也