

建德周學河評點

素天士醫函案存真

蔣文芳題



上海图书馆藏书



A541 212 0018 5083B

本色特書

中國臨證醫典

姚若琴編著 陸淵雷校閱

平裝七角五分 精裝一元二角

是書詳載各種病證一百數十種。古今驗方一千四百八十餘條。讀之可以明瞭病證起因及其變化。每病均有簡明證解。解說病理及治法大綱。足爲臨證參攷之助。分類清晰。檢查便利。袖珍裝訂。尤便攜帶。

三民圖書公司出版

武進謝利恆先生審定

葉天士醫案存真

(附馬元儀醫案)

川沙陸淵雷校閱

編主 武進徐進 嘉定 衡若 姚定 之琴 若琴



上海三民圖書公司印行

葉天士醫案存真凡例

凡

例

1

- 一 醫案皆係葉氏真本。非若臨證指南間有雜湊及門方案。轉令魚目混珠。
- 一 方案不分門類。仍沿昔日鈔本之舊。閱者當分別觀之。
- 一 古人用藥。本無一定分兩。隨症輕重用之。方中有載入分兩者。亦仍其舊。
- 一 用藥有用別名者。如申姜之類。申姜疑卽猴薑。不敢妄易。以俟博雅參考。
- 一 載某府某人及年歲大小。係當時門診及門所錄。今悉照原本刊刻。
- 一 研六齋藏本。後有馬元儀方案。不敢沒美。附刊于後。學海附識。

葉天士醫案存真序

序

昔者竊聞之孫真人以神鍼療龍神之疾。神龍感之。贈以禁方三十。孫因著千金方三十卷。每卷中雜一龍宮方。今人亦不能一一指出何方爲龍宮所授。惟相傳六味丸卽禁方之一。試以此方論之。山藥之甘。地黃之苦。丹皮之辛。萸肉之酸。澤瀉之鹹。五味具備。又以茯苓之淡調和之。俾五臟六腑均受其益。此其運用之妙。誠不可思議哉。由是知醫者之有方。猶匠者之有斧斤繩墨。非是無以成其事也。吾鄉葉天士先生。生在康熙初。沒於乾隆十年。工長桑之術。身歷三朝。名聞九域。夫人而知之矣。其謝世已九十餘年。至今談方術者。必舉其姓字。以爲仲景元化一流人也。其生平所製方。有萃錄成編者。其元孫訥人等。校而授梓。問敍於予。夫人祖宗一言一行。無非彙訓所存。凡爲子孫者。必多方表章之。以寄其數典不忘之志。況方書爲活人要術。可

以調元贊化。而消斯民天札癘疾之災者乎。卽如龍宮禁方。非孫氏傳之。世人又烏從而知之。諺云。施藥不如施方。訥人臯弟斯刻。不特表揚先澤。亦有合乎昔賢善與人同之義。又可緩乎哉。是爲敘。

道光丙申七月。舊史氏石韞玉撰。

葉天士醫案存真序

序

精氣神爲人身之至寶。醫能保人所寶。則醫書真寶書也。軒岐而下。惟仲景稱聖。爲製方之祖。嗣後英賢輩出。各抒心得。立法以啓後人。方書充棟。後之用法者。能得古人法中之意。而不泥於法。則因病定方。不執方以治病可也。所難者在認證耳。昔嘉言喻氏。謂醫不難於用藥。而難於認症。故先議病。後議藥。丹溪朱氏著脈因證治一書。亦以認症爲先。施治爲後。若但執某方治某病。而至於何脈。何因。何症。辨之不真。焉能用之無誤。寒熱虛實。疑似甚多。見病治病。十無一效。曷足怪哉。吳中精於醫者。代不乏人。自

葉香巖先生治稱神術。百餘年來。無有繼其傳者。惜其生平濟人事殷。無暇著述。如臨症指南一書。爲門人所採輯。久已風行海內。今復見醫案存真。係其哲嗣

訥人先生。彙集家藏方案成編。觀其施治之妙。實由辨症之的。其不惑於症之疑似。治之不違於法。而又不泥於法者。苟非根柢內經。博涉諸家。其烏能洞徹陰陽標本。隨症立方。神明於規矩若是哉。至馬元儀醫案。各抒精義製方。附刊於後。亦足資後人採擇。此書誠可寶也。書既成。先生濟世之業。與其哲嗣濟世之心。並傳不朽。而流澤孔長矣。是爲序。

道光丙申秋九月。吳郡胡國英識。

葉天士醫案存真序

序

竊嘗論之。宋後醫書。惟案好看。不似注釋古書之多穿鑿也。每部醫案中。必各有一生最得力處。細心徧讀。是能萃衆家之所長矣。第非熟精靈素及仲景法者。中無權衡耳。葉先生於外感。最長於溫熱。於雜病。最長於虛損。總是長於治鬱而已。自來醫案。皆自編輯。故必其證之稍新。治之已效者。乃從而著之。其尋常易曉者。不多見也。先生案輯於後人。得失兼收。瑕瑜不掩。固其所矣。而案之宏富。遂爲醫林中獨成一子。好學深思者。正樂受而讀之。以觀其真。豈非盛事耶。國朝大醫。私服張石頑及先生兩人。昔徐靈胎評點指南。多所攻擊。視其圈點。如晨星落落。想見筆在紙上。如蜻蜓點水。一往無停。學海術淺。謝不敏矣。祇求發揮本義。未詳者申之。未備者補之。未明者疏而闡之。必其理之極難通。與其法之顯不合者。乃從而疑之。辨之。末附馬元儀

案亦是一時之傑也。讀之便覺憊懣。不及先生之圓相矣。此天資之不可強也。先生之學。其於仲景元化。誠未知何如。若東垣丹溪。似有過之無不及也。徐靈胎陳脩園。未勉輕薄口脗。古人云。爾曹身與名俱滅。不廢江河萬古流。古今是非。何日論定。吁。不論則定矣。

光緒十九年。歲在癸巳八月。中浣。建德周學海。澂之。書於袁浦城內觀音寺之西院。

葉天士醫案存真自序

自

序

1

先高祖臨證指南一書。爲錫山華君岫雲所刻。書成於乾隆丙戌。風行海內。余成童時涉獵及之。不能識也。後檢故紙。得家藏方案一冊。魯魚亥豕。所在多有。謬謂此必指南選刻所遺者。亦愒置未暇究。近年留心斯道。因發篋讀之。然後知先哲之所以享重名者。久而彌光。蓋自有在。嘉慶丙子。獲見天元醫案於研六齋周謝庵姊丈家。精光騰躍。歎爲希世之寶。道光辛卯。於城東陳順庵家。復見方案摘錄百十條。簡潔高妙。洵爲門診之精華。又不勝遺珠之歎。因思華君居非同里。又素不業醫。能以數年採輯之勤。沾丐後人。厥功甚偉。余爲裔孫。獨珍手澤。而不公諸當世。華君有知。其謂我何。但指南類症分編。余則一無去取。亦不分門別目。自愧識淺。不敢妄爲選擇。姑還舊觀。且自來醫家。臨證雖多。豈能盡備。而茲又篇帙無多乎。其天元醫案中。載馬元

儀先生案頗多。皆神妙。與先祖方案。如驂之靳。另附於後。自竣爲卷。世有好學深思者。或再搜採選刻。則其功當不在華君下矣。其拭目以視之。

道光十二年。歲在壬辰四月。元孫萬青謹序。

葉天士先生

葉桂。字天士。號香巖。祖紫帆。通醫理。父陽生。精其術。桂少從師。受經書。暮歸。陽生翁授以岐黃學。年十四。翁棄養。乃從父門人朱某學。朱君即舉翁平日所教教之。君聞言即徹其蘊。見出朱君上。聞人善治某證。即往師之。凡更十七師。天資穎悟。故能淹有衆長。桂察脈望色。聽聲寓形。言病之所在。如見五臟癥結。治方不執成見。嘗云。劑之寒溫。視疾之涼熱。自劉河間以暑火立論。專用寒涼。東垣論脾胃之火。必務溫養。習用參附。丹溪創陰虛火動之說。又偏於寒涼。嗣是宗丹溪者多寒涼。宗東垣者多溫養。近之醫者。茫無定識。假兼備以倖中。借和平以藏拙。甚至朝用一方。晚易一劑。而無有成見。蓋病有見症。有變症。有轉症。必灼見其初終轉變。胸有成竹。而後施之。以方。否則以藥治人。實以人試藥也。年八十卒於家。長洲沈歸愚尚書重君之術。乃爲之傳。四庫提要謂桂生平無所著述。臨證指南乃門人取其方藥治驗。分門別類。集爲一書。附以論斷。未必盡桂本意也。

桂曾孫萬青。取家藏方案。輯爲一帙。皆係葉氏真本。與指南之雜奏者有異。建德周學海。一一爲之評註。未詳者申之。未備者補之。未明者疏而闡之。學海讀書極精博。所著有脈學四種讀醫隨筆等二十六卷。又校刻醫書十二種。凡一百十四卷。又評註醫書十二種。五十七卷。此案即評註諸書之一。學海之傑構也。

錄目案醫士天葉

虛損	一
鬱證	三
吐血 嘔血	六
遺精	三
痰飲	四
脇痛	七
欬嗽 哮喘	三
肺痿	七
胸痺	元
胃痛	四
隔噎 反胃	四
嘔吐 噦呃	四
吞酸	四
腹痛	五
腫脹	五
頭痛 瘰癧	五

七竅 眼耳鼻	六
喉證 失音	六
消狂 癲不寐	六
傷力 跌仆	七
漏瘍	六
痔血 便血	七
淋濁 溺血	七
便瀉	六
溫熱 春溫 冬溫	六
暑暈	六
濕溫 黃疸	三
時疫	六
傷寒	九
燥	三
眩暈	四
類中風	五

痺	三
痿	七
厥	四
脫	四
瘡疾	五
痢疾	六
疝	三
癥瘕	六
傷酒	七
痧疹	六
幼科	九
疳癩 痘瘡	五
婦科 雜證	六
調經 漏淋	六
妊娠	五
產後	六
蓐勞	九

葉天士醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

皖南建德周學海澂之評注

諸虛勞損

凡憂愁思慮之內傷不足。必先上損心肺。心主營。肺主衛。二氣既虧。不耐煩勞。易於受邪。凡治勞傷須先察有無外邪。惟養正則邪自除。無麻桂大劫散之理。故

內傷必取法乎東垣。今血止脈要形倦不食仍噎欬不已吐痰若粘涎。皆土敗金枯之象。急與甘緩補法。此所謂外疾思慮而心虛。故邪從之者也。內傷夾外邪。雖無大劫散。初起總宜兼解。

外。若連邪補住。永無愈期。

生黃芪

炒白芍

炙草

飴糖

南棗

太甘。於痰欬不食未宜。內傷夾外邪。重者急與驅邪。但須保定胃氣。及下元真氣。迨大勢已殺乃急補之。

若外邪本輕者。調理榮衛。是一捷法。即所謂養正則邪自除。

寒熱半年。少時色黃。氣短欬嘔。是內損營衛迭偏。勞怯重病。此等證候

因外感失治邪氣內陷。凡治勞須急急安未受邪之地。如前二案。病在上中二焦。治之却宜安下焦。為定法。

人參 茯苓 黃芪 炙草 煨薑 南棗

湖州^{四廿}少壯病不復元。失於保養。延為勞嗽。胃氣尙好。可與填精固下。

都氣丸。去丹澤。加胡桃肉。二仙膠。都氣丸即六味丸加五味子

幼年久有遺精。目疾。不耐勞煩。先後天未曾充旺。秋季瘧邪。再傷真陰。

冬月夜熱。嗽痰失血。是陰傷而邪陷之不饑不食盜汗傷陽。陽浮不藏。漸干胃口。皆

久虛勞怯之象。此恙屏絕酒色。怒煩。須安閒坐臥百日。必胃口漸旺。病可漸

除。古稱精生於穀食也。嗽痰總因外邪未清。雖不宜直攻。營氣不安。兼治。夜熱盜汗。是陰分有邪。營氣不安。

北沙參 女貞實 茯苓 炒麥冬 米仁 川斛 芡實 此證宜補陰中之陽。俾得鼓舞正氣。達邪于表。所謂胃口漸旺則病可除。

即此義也。沙參麥冬。清肅傷陽斂邪。

正當生旺之年。鬚蒼色變。按人身髮屬心火而炎上。眉主肝木而曲直側生。鬚應腎水。內不足而色不向榮。且脈象弱。男子精氣衰薄。不為生育

之徵。法當寧心神以處靜。寡慾養精。妙選無病瘦弱女質。不必說經調怡悅。無拘慮愁煩。遵三十時辰兩日半之旨。庶幾望其毓麟耳。

肉蓯蓉 蛇床子 覆盆子 線魚膠 補骨脂 舶茴香 五味子 兔絲子 家萆子 沙蒺藜

金式兼 按太陽經之膀胱俞。在脊骨間十九椎之旁。小便後從茲出

汗。是太陽之氣不固也。几天將雨。則頭眩目花。經云。頭眩其過在巨陽。是清氣之不升也。勞則夢寢不安而遺。飲食不適意。即作瀉。是逆其志而運化失常。此瀉在下焦。統屬太陽病。諸陽不能保舉。而生種種之疾。議茸珠丸。大安腎丸。理膀胱氣。自必獲效。此證恐亦由思慮太過。心氣不固。下方甚合。不因頭眩用平肝藥有識。下

鹿茸 茯神 人參 菴蓉 萆薢 兔絲子 秋石 柏仁 川斛 補骨脂 白蒺藜 桑螵蛸

菴蓉秋石太鹹。非心虛所宜。可改牛膝山黃。

陳升葵弟 勞病先傷陰氣。繼而陽傷。夏季脾胃不和。臌脹腹鳴晨泄。

凡陽虛外寒。陰虛熱蒸。皆虛不肯復元之象。非草木可為。病人述腹中氣通。

小愈。用藥當宗此旨。內吾每用此法。據證所立方。即木應爾也。

人參 穀芽 茯苓 白芍 炙草 新會皮病重藥輕

勞怯。形肌日瘁。食減自利。腹痛寒熱。由陰虛已及脾胃。無治嗽清滋之

理。姑以戊己湯加五味攝陰為議。是難愈之症。損病過脾不治。即自利腹痛。

下溫疏。治宜。

炒白芍 炙甘草 北五味死矣。案中明言脾胃。如何。只顧陰虛。仍是治嗽清滋。

嘉興八十腎肝內損。必致奇經失職。俗醫混稱陰虛。僅以錢仲陽小兒所

用六味。曰補陰和陽。益藏泄府。要知此時仲陽。非為虛損設法。治虛損。亦常以此。

蓋病重藥輕故也。

人參 紫河車 坎炁 人乳粉 秋石 茯苓 五味子 紫衣胡桃秋石太鹹。鹹能凝血傷津。且大損心陽。最不宜於。

咳喘多痰失血及心虛之病。吾從膨證忌鹽悟出。王好古云肉菴蓉驟用妨心。亦此義也。

心中空洞。下焦寒冷。兼有遺精便溏。議用三陰補方。

人參 山藥炒 茯苓 五味 杞子炒 建蓮 線魚膠 熟地炒
味甚合。
據證。是寒溼久鬱。漸欲化燥。急宜溫潤以壯胃氣。力

形弱脈小。腰痺酸栗。足跟痛。是下元精血暗虧。未老先衰。防致痿痺。溫
 養宜柔。勿以桂附剛復。是精血虧者不宜剛復之。極是。陳脩園乃極詆之。

鯉魚膠 沙苑蒺藜 甘枸杞子 首烏 茯神 虎骨膠 牛膝 柏子仁 溶膠爲丸

上假熱下真寒。肝腎大虛。加減八味丸。

熟地 茯苓 丹皮 山藥 五味 當歸

肝腎兩虧。虛火爍金。用納氣法。

熟地 牛膝 白芍 青鉛 童便 山藥可稍加血肉之品

脈數小。不饑。痰多陰虛伏熱。中氣結而不運。不宜止從下泄。補氣宜鬱。凡伏熱。

滑石 麥冬 竹葉 連翹 杏仁 鮮生地

陰液枯槁。陽氣獨升。心熱驚惕。條熱汗泄。議用復脈湯。甘以緩熱。充養

五液。肝主疏泄。泄。心液不濡。則神不斂。肝氣因之妄動。治宜養心。鎮攝肝氣。方甚合。

人參 阿膠 炙草 麥冬 牡蠣 麻仁 細生地

嘉興八十陰火必從晡暮而升寐中呻吟是浮陽不易歸窟形瘦食少盜

汗攝固其下爲是。脾水不滯木氣津液散而不斂。或乘心乘肺乘

六味加阿膠人中白

無錫廿嗽血秋季再發夜熱汗出全是陰虧見症。是陰虧而邪陷之大忌肺藥

理嗽。極是絕欲百日助其收藏胃口尙好腎肝陰藥中必佐攝納。因嗽非正血

也。病起外感。宜正治嗽。所謂忌肺藥者。透邪於表。麥冬輩耳。

熟地滋陰不五味子 山藥 芡實 湖蓮 茯神

吳江廿七肌肉日削竟夜內熱是內損陰虛漸延勞怯安逸可久天暖氣

洩病必漸加。津液耗竭難復。治宜填陰。此

早服牛乳一杯。另服補陰丸。苦寒不能擇陽。所謂擇者。陰充則陽氣外達而復其位也。

丹溪大補陰丸黃柏知母俱鹽酒炒地黃龜板猪脊髓丸又有補陰丸即楊氏還少丹少精實一味

錢塘五十一閱原案開列皆肺腎病。男子中年以後下元精血先虧。有形

既去。自難充復。五液耗奪。內風陽氣易越。治宜從陰引陽。勿以桂附之剛愎。

只在配
合得宜

鹿茸 鹿角霜 天冬 天麻 茯苓 淡菴蓉 枸杞子 黃菊花

虛損。心熱齟乾。咳嗽失血。因咳出血此天氣令降。身中龍相反升。下焦真氣。

不得收納。故也。惟寧神靜坐。斯天君不動。自得陰上承。陽下降。地天交而成。

泰矣。方不滋陰。而用納氣。潛陽。是無上妙法。

紫胡桃肉 坎炁 糯稻根鬚 北五味子 白蜜

海寧廿六勞怯是腎精內損。真陰枯槁。龍雷之火。閃爍無制。腎脈循喉。屢

受陰火燔灼。必糜腐而痛。冬無藏精。春生亦無生發。胃氣已索。草木何能挽

回。

豬膚湯

腎精下損。乏陰氣上承。浮陽上灼。咽喉痛痺。有喉宣發現。咳嗽喘促。是下焦元海不司收納。衝脈之氣上沖所致。故日進潤劑。望其咳減。為庸醫之良法。實釀病之禍階。現在胃弱。便溏。則非治嗽可療矣。勞怯不復。當以固真納炁。培扶胃口。希冀加穀則吉。方論俱平實。用之必有效。

人參 茯苓 芡實 坎炁 湘蓮子 秋石 五味子 胡桃

胡樸庵 脈動於右。氣熱易升。陰不上承。能食不能充津液。入春嗽血不止。養少陰之陰。勿苦降礙胃。

雞子黃 阿膠 生地炒 柏葉炒黑 麥冬 茜草

轉方加天冬 抱木茯神 是柔潤熄風法。能令方中宜加川芎。胃有風火。俟津液回後。

肝陳皮疏

初春脈動而不鼓。亦收藏之司淺矣。壯年未育。晨吐黑痰。皆水虧火炎。

精氣不充之象。胃旺能納穀。當專理下焦。不必以痰為慮。黑痰必有腥腐氣。乃痰必有腥腐所化。

若氣味止如常痰。不足為病。

牛骨髓 羊骨髓 海參膠 線魚膠 龜鹿膠 芡實 菟絲粉 金櫻子粉 五味子 家燕子

大熟地 遠志肉 建蓮肉 淡菜膠 熟首烏 覆盆子 方味厚潤而瀉。中氣不足者。恐難運化。轉令胃倒。

虛損真陰內涸。當戊己君火主令。立夏小滿。陽氣交併於上。喉舌腫腐。

是陰不上承。薰蒸膩涎。吐咯不清。是腎絡乾燥。津液失道。皆五液之變。由司氣感及軀

質而然。檢古方。以仲景少陰咽痛例。用猪膚湯。

夏至陰氣不生。乃損不能復矣。今當大熱。氣泄愈甚。百脈諸氣皆空。脂

液盡耗。難望再醒。為寒為熱。無非身中陰陽互乘。陽由陰上越。則頂巔痛。風

木之火入中。則嘔逆。噎咳。總之。液涸神竭。進兩儀煎。瓊玉膏。扶至稍涼。再為

斟酌。噎逆與頂痛。是夾外邪。同是陰火上逆。有寒熱。是夾外邪。正氣虛極。最難措手。

麥冬 竹葉 人參 烏梅肉 大麥 鮮荷葉汁水煎澄冷服。方意預防傷暑。不能治病。

交四之氣。熱勝元虛。乃氣泄之候。營衛本乎脾胃。不耐夜坐。舌心腐碎。

吸吸短氣。似不接續。中焦喜按。始得暢達。目胞欲垂難舒。四肢微冷失和。脾陽

虛大從前調理見長。每以溫養足三陰。臟兼進血氣充形之品。病減七八。足溫養

陰必是質重之補。景岳一派是治虛損不祧之法。案中常有引用。景岳方發揮一書。迥非先生手筆。今當長夏。脾胃主氣。氣泄

中虛。最防客氣之侵。是質重之補。宜緩而養。胃生津。寧神斂液。仍不可少。俟

秋深天氣下降。仍用前法為穩。擬逐日調理方法。此案原書重出。今存其一。而記其異同。

人參 茯神 天冬 棗仁一作麥冬 知母 建蓮肉 炙草 川石斛 熬膏 早上進丸藥一次

遇天氣鬱勃泛潮。以鮮佩蘭葉泡湯。一作枇杷葉非一二次取芳香。不燥不為

穢濁所犯。佩蘭疏溼。鮮蕙清暑。可免夏秋時令之病。鮮蓮子湯亦好。此句無

若汗出口渴夜坐火升舌碎。必用酸甘化陰以制浮陽。上亢宜着飯蒸

熟烏梅肉。一錢云。冰糖三錢云。略煎一沸。微溫利服一次。多服便

飯後飲茶。宜炒大麥湯。芥片。或香梗茶。其松蘿六安。味苦氣降。中氣虛

者不宜用。茶一無飲

瓜菓宜少。桃李宜忌。玉蜀黍堅澹難化。中虛禁用。蜀黍生津健脾胃。細粉用。香薷飲

泄越滲利。頗不相宜。或有人參者。此一句無。可以涼服。暫用煎藥。當和中清暑。以

雨濕已久。中焦易困耳。

人參 木瓜 扁豆 麥冬 茯苓 甘草 佩蘭葉一無扁豆佩蘭有枇杷葉

臨晚進膏滋藥 人參 熟地 遠志 甘草 綿芪 茯苓 桂圓肉 當歸身 五味 枸杞

照常法熬膏不用蜜收白水調服。一無甘草黃芪桂。圓當歸有麥冬。

當夏季反覆變幻。因天地氣機大泄。身氣久虛。無以主持。故見病治病

無功而安。中納下。四字治損金針。每每獲效。入秋常進附子七味丸。頗合。今秋分節。

天氣降。地氣收。緣久熱氣傷虛體。未能收肅。是以肢節時寒。頭巔欲冷。無非

病久諸氣交餒。斯外衛之陽少護。液髓暗耗。則血脈不營。而陰乏內守。凡此

皆生氣之淺鮮也。急當溫養益氣。填補充形。使秋冬助其收藏。預為來春生

發之用。問句有本領學內經有四季調神之訓。今投藥亦當宗此旨。腎下方一無羊肉

麥河車有冬

鹿胎 一具

羊內腎 生十對

黃狗腎 二十副

肉蓯蓉 五錢

大熟地 四兩砂仁砂

茯神 五錢

五味 一兩五錢

湖蓮肉 二兩

人乳粉 五錢

柏子霜 五錢

紫河車 一具

青鹽 八錢

右用諸膏并搗地黃為丸早服五錢人參湯送

有年勞傷神瘁。膚無膏澤。時欲腹鳴啾痛。營血不得流行之故。開懷安

逸。僅可帶病延年。

人參 當歸 肉桂 白芍 炙草 茯苓 遠志 熟地炭

鬱

形勞悒鬱之傷。脈得左部弦勁。肝血膽汁已少。目翳紅赤。治以涼肝滋

液。

稽豆皮 菊花炭 穀精草 淡天冬 枸杞子 生地黃

脈瀼小數。質弱。平昔喜飲。酒性先入肝膽。故易生嗔怒。且塗次侍親。煩勞鬱熱。自情懷而升。病屬鬱勞。惟怡悅為上用。藥不易奏功。

桑葉 川貝母 粉丹皮 山梔殼 天花粉 蜜炒廣皮

悲憂哭泣致病。不饑欲嘔。病屬鬱症。治當條達肝胃。第胃為陽土。肝寄

相火。雖結。瘕氣燥熱未宜。理極是本無庸燥熱耳。

製半夏 白茯苓 炒丹皮 炒神麩 吳茱萸 夏枯草 黑山梔 川連悲憂哭泣。屬肺金制木。鬱則克土。宜

疏肺宣肝健脾。方溫升與淡滲同用。甚妙。而大旨仍是苦降辛開法。

因嗔怒。心胸痞脹三年。左脅下堅凝有形。偶觸勞忿。則寒熱無汗。此屬

鬱痺氣血。延成肥氣。治當宣通營衛。流行脈絡。佐入攻堅。俾寒熱得止。再議。

此症何不徑用蠱蟲丸。佐煎方以和營衛。

炒柴胡 生香附 半夏麩 丹皮 桃仁 青皮 薑汁炒梔仁 生牡蠣 臨服入鱉血五匙

據述瀉血五日。血止即患咳喘。左脅下有形如梗。身動行走。必眩暈欲

仆。春夏減食。秋冬稍加。交冬人迎脈絡結癭。診脈虛。左關尺數。此肝腎精血。因驚恐憂勞所傷。陽失陰戀。絡中空隙。陽化內風。鼓動不息。日就消燦。不肯復。為鬱勞之症。四旬以外。生氣已淺。非治病可卻。春夏身中真氣不耐發洩。可知。屏絕家務。開懷頤養。望其病緩。此燥化之幻證也。為百病中最難治之證。凡燥化多生於鬱。而鬱久多

見燥化。治之總宜溫潤疏通之劑。觀此與下案方藥可見矣。

石決明 女貞實 杞子 黑芝麻 桑葉 阿膠 寄生 柏子仁 茯苓 炒當歸 方對證而嫌

婁門 七十 左右為陰陽之道路。向衰年歲。操持經營。且不獲利。心境失暢。氣血不和。久則拘束為痛。化鬱極甚於夜者。陽氣衰微。入夜陰用事而病加也。 十二味養營法。

人參 白朮 茯苓 炙草 當歸 白芍 地黃 黃芪 陳皮 桂心 遠志 加桃仁

客邸懷抱不舒。肝膽鬱遏。升降失度。氣墜精開。為遺泄。見理 地黃龍牡

鈍滯氣鬱者更鬱。論極有治法亦理氣和肝獲效。未經調理全功。當今冬令溫舒。收藏之氣未堅失血之後胸中隱隱不暢。未可凝陰。只宜降氣和血。

鈎藤鈎 降香 米仁 鬱金 茯苓 杜蘇子 丹皮 炒桃仁

問病起於功名未遂。情志鬱勃。人身之氣左升右降。怒必木火暴升。肝膽橫逆。肺反為木火乘侮。全無制木之權。呼吸病加。絡血被氣火擾動。亦令溢。出。上。竅。此即吾所謂衛氣竄入榮道則血涌出是也更加勤讀苦工。身靜心動。君相何由以寧。春夏頻發。地中氣升。陽氣應之。內起之病。關係臟真。情志安和。庶病可卻。

丹皮 鈎藤 金斛 白芍 米仁 蘇子 藕汁 眞降香

悲驚不樂。神志傷也。心火之衰。陰氣乘之。則多慘戚。擬大建中湯。此係

凌心。與藏燥不同。

桂枝 人參 蜀椒 附子 飴糖

嘉興五十情志內鬱。心痛如絞。形瘦液枯。不可氣燥熱藥。固是鬱久痛化

從何來。屬氣逆耶。屬血結耶。方意却是行血。恐行氣藥總不可少。

炒桃仁 柏子仁 小胡麻 炒丹皮 延胡索 鈎藤鈎。脅痛門內有兩方。與此大同。一有歸尾。一有降香。

吐血

附衄血

南京五三十頻年發失血症。嗽甚痰出。繼以嘔噦。日晡寒熱夜深汗泄。據

述醫見血。投以鬱金薑黃菲汁製大黃逐瘀下走。希圖血止。此是有餘治法。夫人稟陰陽偏則致病。自內損傷。即是不足。脈左動數。尺不附骨。明明腎精。肝血內奪。弱陰無能交戀。其陽衝陽上逆。吸氣不入。是以欬嗽氣并。旋必嘔噦。濁涎粘沫。內經謂五臟六腑皆令人欬。奈何今人以欬治肺。見痰降濁清熱。損者更損。殆不復藏陰。府陽消長之機。雜藥徒伐胃氣。經年累月。已非暴病。填實下隙。須籍有情之屬。

人參 紫衣胡桃 紫石英 茯神 五味子 山萸肉 河車膠 秋石

此物只宜略和水用之。若以質入藥。則太膩。

尤非失血與嗽所宜。

脈細軟。瀦。氣衝失血。寐欲遺精。今納穀不運。神思日倦。緣操持太過。上下失交。當治中焦。心脾之營自旺。諸症可冀漸復。偏熱偏寒。都是斲喪真元。

此陰津已虛而陽未甚亢。治宜攝納和肝。以杜其漸。

人參 歸身 於朮 廣皮 棗仁 茯神 白芍 炙草 可加龍鱗。鎮衝攝遺。

當夏四月。陽氣大升。體中陰弱。失守。每有吐衄神煩。已交夏至。陰欲來復。進甘藥緩補。所謂下損不得犯胃也。

熟地 蓮肉 炙草 山藥 茯神 芡實 阿膠 柏子仁

奔馳。氣火乘絡。失血。用繆氏氣降使血歸經。

蘇子 茯苓 丹皮 降香 米仁 芫蔚子 桃仁 藕節汁 宜再加涼肝藥

積勞陽動。氣蒸上欬。已三四年。仍然經營辦事。夏四月地中陽升。遂失血。咽痛音低。男子五旬以外。下元先虧。此顯然五液不充。為久延不愈之沉疴。見血見嗽。與寒降清肺。是劣極者。今日通病。無不逼入勞損。惜方中仍不出此套。然則逼入勞損。可。日中

滋胃養心
攝納肝氣。

生地黃 清阿膠 雞子黃 雲茯苓 麥冬 桔梗
生地損心陽。麥冬損肺陽。凡積勞虛火上燔。不可以鹹苦大寒。撲滅心之真陽。宜潤藥鎮導。佐以橫疏。何者。氣能橫通。則不直上直下也。

男子脈大為勞。暑月陽不伏藏。初夏陽升血溢。皆內損少固。填精固氣。是為藥餌。靜攝絕慾。經年可復。

線魚膠 真沙苑 五味 茯神 淡菜膠 龜版 金櫻膏 石蓮 芡實
厚賦酸瀆。有累中氣。

怒傷肝。恐傷腎。二志交併。真藏內損。煩勞則陽氣擾動。值春木之令。絡血隨氣上溢。失血過多。陰炁下空。陽無所附。上觸清府。致木反乘金。咳喘氣促。肺愈惡寒。脈弦數。據脈證顯是。乃下損之疾。議論澈底證清。按怒則氣升。恐則氣降。清。升降逆亂。榮衛相激。而血噴溢矣。治宜用和緩法。緩散。疏氣活絡。是也。失血過多。別加滋補而已。

山萸肉 五味子 鹹秋石 青鹽 熟地
發鹹太過。更令血凝。氣結。病何由愈。

三廿 病人述遇春季失血。煩勞必有衄血。凡冬月大氣藏伏。壯年自能聚

精彙神。不加保養。春半陽生。升發反為發病根機。是皆身中精氣之薄。胃旺安納。能自接引。靜養則神乃藏。

熟地 萸肉 山藥 芡實 湘蓮 茯苓 金櫻子 五味子 青龍骨純是收瀉。未合。宜用清肅鎮納為法。

山西九十夏季吐血。秋深入冬頻發。診脈右弦空。左濡。是形神兩傷。絡

血不得寧靜。氣血因經營而耗。不比方壯矣。

黃芪建中湯

葑門九十過勞熬夜。陽升痰血。在土旺之令中。夜熱非因外感。亦有外感。不必

風寒也。恐是脈尺中動。左數。肝腎內虛。失收肅之令。過勞夜熱入陰。脈尺所動。謂數

益衛榮以舉衛。治宜

北沙參 玉竹 麥冬 扁豆 生草 青甘蔗

秋暑失血。初春再發。脈右大。頗能納食。金匱云。男子脈大為勞。極虛亦為勞。要知脈大為勞。是煩勞傷氣。脈虛為勞。是情欲致損。大旨病根驅盡。安

靜一年可愈。

炙綿芪 北沙參 炙草 白芨 苡仁 南棗

李雲生 咳甚。嘔血吐食。肝病犯胃。陽氣升逆所致。

代赭石 新絳 茯苓 丹皮 旋覆 黑山梔

右寸浮數。餘脈虛瀼。失血寒熱已止。但喉中作癢咳嗽。大便又不堅固。

此脾肺俱虧。正在潤肺礙脾。補脾礙肺之時。清心靜氣。病可漸却。至囑。凡侯癢。

非死血即外感搏結所致。與氣由胸上搶作癢者不同。搶癢是飲邪射肺也。

川貝 丹皮 玉竹 生地 茯苓 甘草 牛膝 橘紅 北沙參

楊九冲年陰火未寧。情志不和。易於動怒。氣火迸逆。絡血隨之上溢。問

納食不旺。氣衝血上。必撫摩氣降。血不出口。但絡中離位之血。恐致凝遏。越

日必氣升湧逆矣。所慮極是。

蘇子 丹皮 降香末 炒桃仁 米仁 炒查炭 萆白汁

稚年吐衄。熱傷為多。今脈小。肌鬆食少。胃虛陽升。已露一斑。進甘涼益胃方。

炒麥冬 生扁豆 北沙參 茯神 木瓜 炙草

稚年秋月時病。愈後食蟹。自必辛酸內茹。遂致傷營吐血。先理清營解毒。

蘇子 麥冬 生蒲黃 細生地 丹皮 雞距子

自失血半年以來。心悸怔忡。脅左時動。絡脈空隙。營液暗傷。議甘緩平補。
內經曰。胃大絡虛里。在左乳下。其動應衣。宗氣泄也。此大動氣脫也。若內動痛脹。則為瘀血凝痰。故又日結而橫。有積矣。

酸棗仁 柏子仁 桂圓肉 生地 茯神 杞子 炙甘草 饑時服

血症發後。體虛氣弱。暑氣外侵。而寒熱腰痛。饑不欲食。雖咳嗽未減。當治其本。即急則治標之義也。
語意不貫

香薷 扁豆 木瓜 厚朴
是治暑。故用瓜朴。凡暑皆挾

據述病原。朝寒暮熱已止。血逆已平。稍見喘欬。近日復有惡寒發熱。此因內虛成瘧。尙宜小心。

製首烏 川貝 茯苓 白芍 甘草 丹皮 柴胡 廣皮

遺精

陰虛汗泄。精遺。理應固攝。但先哲瀆固之藥。必佐通滑。以引導瀆味。醫

知斯理者鮮矣。究竟固攝不在瀆味。

熟地 萸肉 杜芡實 五味子 龍骨 遠志 茯神 用猪脊髓金櫻子膏搗和爲丸

脈數多遺。脊痠腰墜。此督任失固。非通不能入脈。非瀆無以填精。色蒼

形瘦不宜溫補。宜滋腎強肝

熟地 牡蠣 遠志 五花龍骨 五味 茯苓 芡實 山藥 羊腎脊髓

下利皆令傷陰。值冲年情念正萌。遂患夢遺。勞煩饑餒更甚。以精血有形。必從水穀入胃。資其生長也。診脈數。面亮。莖舉則精出。溺後亦淋瀝。是陰

虛精竅不固。因陽氣下墜所致。議固下陰以和陽。治肝腎下陷。肝腎。心脾從之。

熟地 旱蓮草 生龍骨 懷山藥 杜芩實 莢肉 婁茯苓 蓮蕊鬚 金櫻子膏 煉蜜爲丸

方不甚合。宜養陰以升陽。過用酸澇。心氣雖固。中樞轉滯。

初以心動精泄。久則關鍵滑溜。食減至半。業已損及中焦。奠地滋膩滯。

胃下焦之陰未得其益。中宮之陽先受其累。議論極是而常自犯之。更甚於黃地也。至於

黃柏味苦苦更傷陰。當以妙香散加金箔治之爲穩。心氣不固。肝家疏泄

氣。清肝

人參 龍骨 遠志 茯神 金箔 益智 茯苓 硃砂 甘草 方極合

遺洩有夢屬心。無夢屬腎。據述氣火下溜。卽如溺出之狀。莖管中痛。熱

氣上沖咽喉。巔頂掀脹。語言皆怯。此任脈不攝。衝脈氣逆。治法引之導之。攝

以固之。現在便溏食少。勿投沉陰膩滯之藥。此肝氣直升直降爲患。治宜使肝氣出入橫行疏暢。則可

漸愈

砂仁炒熟地 炒黑遠志肉 炒蓮鬚 元武版 白龍骨 鎮陽 白茯苓 杜芡實未合。無沈陰之名。有

賦滯之實。以金櫻子熬膏爲丸。連鬚失實。吾但以治大腸久滑之病。

有夢遺精。治在心腎。乃二氣不交所致。冬令牙宣。亦主藏納淺鮮。用鎮

固。寧。神。方。

熟地 棗仁 茯神 金箔 人中白 女貞子 湘蓮子 旱蓮草 遠志 龍骨蜜丸

脾胃陽微不運。寒痰噫氣。腎虛陽走。遺精無夢。

人參 山藥炒 熟地炒 建蓮 生牡蠣 龍骨 杞子 麋角膠

汪正中 填。固。包。舉。遺精已緩。新正勞。煩。氣。洩。病後神耗精奪。當此升

泄氣候。以安神固攝法。此心虛之病。方治甚協。

桑螵蛸 金櫻子粉 茯神 人參 生龍骨 當歸身 金箔 龜板

痰飲

即咳嗽哮喘

徽州三十 仲景論痰飲分二要。外飲治脾。內飲治腎。仲景雖無此又云。

凡飲邪。必以溫藥和之。閱方從腎藏主治。不為背謬。陽氣微弱。濁陰固聚。自下上逆喘。不著枕。附子走而通陽。深為合理。第其餘一派滋柔護陰。束縛附子之慄疾。

庸醫每犯此病。即有一二中病之品。每致掣肘無功。

真武湯茯苓白芍白朮附子生薑

來安縣六十四病起痰飲。漸為嗽喘。外寒遇勞倦即發。發必胸膈氣脹。吐

出稀涎濁沫。病退則痰濃。氣降乃已。凡飲邪皆陰濁凝聚。兩年之久。漸漸腹中痞悶妨食。肛門尻骨坐則無恙。行動站立時時氣墜。若欲大便。顯係腎虛。不能收攝。惑於在前見痰治嗽。苟非辛解。即屬寒降。乃致釀成錮疾。

腎氣湯加紫衣胡桃沉香汁

向來下部赤疥。溼熱下注。本乎質薄腎虛。秋冬微感外邪。肺氣失降。氣墜為壅。水穀氣蒸變溼。氣阻橫瀆經脈。膀胱氣痹。小溲不爽。不司分別清濁。溼墜大腸。便稀痺塞。自下壅逆。及上喘息氣衝。坐不得臥。俯不喜仰。甚於夜

者。溼與水皆陰邪。暮夜陰用事也。夫膀胱為腎腑。宜開則水通濁泄。初因外感。太陽先受。治不得其要領。孟子謂水搏激過顙。在人身逆而犯上射肺。則肺痺喘息矣。仲聖凡治外邪致動水寒上逆。必用小青龍湯為主方。與內經腫脹開鬼門取汗潔淨腑利水相符。宗是議治。視病機來蹤去迹。歷歷如用。切真是老手。近日此證無不逼入勞損。豈非厄運使然。方必

麻黃八分 桂枝一錢 白芍一錢 杏仁十五粒 茯苓三錢 甘草二分 淡乾薑一錢 同五味子一錢

痰飲咳嗽。終夕不寐。面浮如盤。昔徽宗寵妃病此。語涉治用真蚌粉。新

瓦上炒紅。入青黛少許。用淡薑水滴麻油數滴。調服二錢。方却甚好。是治飲邪兼有溼熱者。

案。與前後諸不同。

徽州六四 此痰飲宿病。勞怒遇冷即發。十年之久。焉能除根。 桂苓五

味甘草湯 此痰喘也。方甚合。與第二案合看。彼為正虛。此為邪勝。

揚州四四 痰飲哮喘。遇寒勞怒即發。 小青龍湯去麻黃。此亦新病治法也。按哮喘

遇。喘。有。督。脈。證。遇。有。大。陰。肺。證。有。陽。明。胃。證。多。起。於。痰。證。內。常。乘。溼。因。熱。多。遇。起。於。風。寒。遇。寒。即。發。肺。氣。急。欲。死。胃。證。多。起。於。痰。證。內。常。乘。溼。因。熱。多。遇。氣。勞。較。肺。證。稍。緩。以。後。治。法。重。滌。胃。矣。其。

脅痛

形充脈弦。飲食如常。述左脅久脹。上年腫突肌潰。收結已來。脅中痛脹。仍發。入夜更甚。僅僅仰臥。不可轉側。此支脈結飲阻其周行氣機。病根非外非內。宜通其脈絡為是。脅痛脈弦。而飲食如常。但既潰復結。已成痼疾。頗。治宜補氣破血。仍須外用敷熨。方味。

熟半夏 青黛 土貝母 白芥子 昆布 海藻 海浮石 土瓜萸仁 蛤蜊殼粉

竹瀝一小盃薑汁三十匙泛丸

凡經脈直行絡脈橫行。經氣注絡絡氣還經是其常度。今絡脈窒塞。閃爍為痛。但在雲門上焦。猶是清氣流行之所。務取輕揚宣氣。亦可無礙。溼痰便血。靈樞所謂上焦如霧。凡上焦粘滯。有形之病。非輕揚之藥。所不能攻。處。

○古人本有此法。○
○必輕揚是務。○

桑葉

蘆根

冬瓜子

米仁

桃仁

炒

隨時服。臥服。威喜丸。三錢

黃蠟茯苓好。聞西醫亦有此方。即用

按茯苓易松脂更

也松脂

服威喜丸稍安。用涼潤劑不適。想過進辛寒。辛則傷肺。寒則傷胃。食入不化。噯氣甚多。咯痰氣閃欲痛。大便濇少不暢。流行既鈍。必清陽轉旋。得向愈之理。

蜜炙生薑

茯苓

炙甘草

南棗

桂枝

米仁

楓橋汪

十四

脅膈左右懊懣不舒。嘔逆帶血。凡人藏府之外。必有脈絡拘

拌。絡中乃聚血之地。中年操持。皆令耗血。血不和氣。氣攻入絡。病狀難以自明。宣通血分以和絡。俾不致瘀着。可免噎膈反胃。
噎膈多因瘀血凝痰。

新絳

青葱管

橘葉

桃仁

瓜蒌仁

鉤勾

古人治脅痛法有五。或犯寒血滯。或血虛絡痛。或血着不通。或肝火抑

鬱。或暴怒氣逆。皆可致痛。今是症。脈細弦數不舒。此由肝火抑鬱。火鬱者。絡

自燥。鬱則燥。化燥則燥。治法必當清潤通絡。六氣。其五氣皆有正化。惟燥是轉化。從他氣鬱化而來。前人皆未發明及此。

但知熱燥。而不知有堅燥。乾燥也。五氣之鬱。俱見燥化。

潮括萹 炒香桃仁 歸身 新絳 炒白芍 炙甘草

脅痛。咳則更甚。漸次腹大堅滿。敲左不能臥右。此閃氣致閉。便溏溺利。

己非腑實。乃絡病也。肝鬱脾溼。旋復花湯最合。此證用。

桂枝木 炒厚樸 新絳屑 生牡蠣 旋覆花 青葱管 生香附 雞內金

朱客 肌稍隱隱痛。臥起欬甚。冷汗。背有微寒。兩足帶冷。身體仰臥稍

安。左右不堪轉側。此皆脈絡中病。良由客寒閉其流行。極是。兩脈逆亂上犯之

過也。治在血分。通絡補虛。此病在軀壳。而內連絡膜。確宜通絡。徐靈胎陳脩園必力詆之。何也。

枸杞子 炒 鹹麥乾 當歸小苗同炒黑 桃仁 炒 炙山甲

病脅痛吐食。內經謂肝痺。又云。少陽不足。病肝痺。得之寒溼。

柴胡 防風 當歸 白芍 葶藶 米仁 甘草 茯苓 此方依經意而立。可謂獨造。與前後諸方。有氣分血分之辨。

開門橘九廿 織梭肢體皆動。過勞則氣血不流。偏倚為病在左。脅痛失血。肝絡傷瘀。發久必重。

炒桃仁 延胡索 降香末 炒丹皮 鈎藤勾

無錫十三 脅痛失血。以柔劑緩肝之急。

炒熟桃仁 柏子仁 當歸尾 炒黑丹皮 鈎藤勾

詢左脅下每日必有小痛。逾時其痛勢佈散胸臆背部。從來不延及於腹中下焦。是腑絡為病。凡久病從血治為多。今既偏患於上。仍氣分之阻。而致水飲瘀濁之凝。此非守中補劑明甚。但攻法必用丸以緩之。非比驟攻暴邪之治。當用穩法。議以陽明少陽方法。俾樞機開闔舒展。諒必有裨益矣。

生鈎藤另研粉 生香附水磨澄粉 風化硝恐引入下焦。便堅尙可。 炒半夏 茯苓 生白蒺藜去刺

竹瀝薑汁泛丸 方有巧思。此真通絡之劑矣。

脈數重按無力。左腰脅痛。不能轉側。舌胎白邊紅。心中熱悶。不欲飲。是溼邪滯着經絡阻痺。宜進氣分輕清之藥。庶幾不傷正氣。此溼溫也。是寒溼太盛。格陽於上。治宜苦辛通陽。略佐清肅。以制浮熱。

苡仁 杏仁 川貝 佩蘭葉 西瓜翠衣

復診 脈數。左腰脅疼未止。舌苔黃。昨進芳香輕劑。略安。仍不宜重藥。

佩蘭葉 浙茯苓 南沙參 薏苡仁 川貝

三診 脈數無力。左腰脅疼未止。舌色轉紅。是病邪雖稍緩。却陰氣已不振。進清餘熱。略兼養陰方。據上文不欲飲。舌紅亦不得重泄陽。

川貝 淡芩 麥冬 阿膠 川斛 知母方愈不對。須將案中陰氣改作陽氣。從此著想。便是。

又案 脈數無力。左腰脅疼未止。舌苔已退。雖病邪稍緩。但陰氣仍然不振。議用清餘熱略兼養陰方。

川貝 淡芩 麥冬 阿膠 川斛 元參

此案是陰虛內燥。而外傷於溼積久化熱也。只是津液之虧。而非精血之損。故不用味厚之補。苦淡先兼芳香。後兼甘潤。標本先後。緩急有法。微嫌杏仁知芩。過泄上陽而又少益氣理氣之藥耳。

咳 嗽

附哮喘 前痰飲門係實證此係虛證

老年冬季喘嗽。是元海不主收攝。衝陽升舉。飲邪上泛。阻遏流行。喘嗽愈甚。閱古都主八味腎氣。溫養坎中之陽。收納散失之真。不主消痰清肺。意謂非因六氣所致。奈體質不受桂附。年前議進柔陽通攝。若以建立上中之陽。乃心脾甘溫之劑。與下焦不納無謂。亦須不礙上中之陽。

紫衣胡桃肉

茯苓

補骨脂

另用胡桃肉拌蒸晒炒

鹿茸

切薄片鹽水浸一日烘燥

肉蓯蓉

五味子

遠志肉

青鹽

柏子霜

蜜丸

有飲邪不宜用鹹。千古無人見及。

老人久嗽。古人但以溫養脾腎。未必以肺藥見病治病貽害。但身小質

薄。絡脈單弱。桂附雄猛。液枯必犯肺瘍。陳脩園覆未見及此此溫劑通納。為無弊耳。

薑汁製熟地

四兩

補骨脂

一兩

枸杞子

二兩

懷牛膝

一兩

茯苓

四兩

五味子

一兩

胡桃肉霜

三兩

淡菴蓉

一兩

車前子一兩五錢 角沉五錢 蜜丸淡鹽湯送下

王公美 脈沉而咳。不能着枕而臥。此老年下元虛。氣不攝納。濁氣痰

飲。皆為陰象。乘暮夜陰時竊發。發散清潤皆非。當以小青龍法開太陽經。撤

飲。下趨。與前案合參。當得大徹悟。

小青龍細辛可略

去麻辛草

脈沉為咳嗽所忌。然濁飲太盛。或兼挾外寒者。往往如此。治法。淡滲辛溫並用。俾表邪外透。飲邪下趨。陽通則脈起矣。

著左臥即效甚。是臟陰血液傷極。用益氣甘藥者。緣有形生於無形耳。

失血後多有此證。最危而難治。其中必不分左肝右肺。只從氣血升降上設法。有識。凡病偏著一處。其生必有實邪。專虛者不能偏著。

人參 黃芪 當歸 白芍 南棗

炙草

此方未必效。絡中虛枯而濁痰居之。治宜生津活血。

關上九十氣洩。用陽藥固氣。若治嗽滋陰。引入勞病一途。

黃芪建中湯加人參

黃家巷廿七色奪脈促。寒露霜降嗽甚。風冷形肌凜凜。衛陽疏。氣易泄也。

小建中湯

久嗽失音。脈小痰冷。衝氣入暮為重。此肺虛氣餒。不易驟愈。酒家有飲邪。

桂苓甘草湯

脈細有遺症。是陰虛不主收納。因沖氣上激為咳嗽。肺藥無益。今胃綱頗好。急宜填下。絕慾安養。尙可圖愈。

熟地 枸杞 建蓮 茯苓 山藥 芡實

欬。噎。頻。多。必。嘔。吐。涎。沫。明。理。者。當。知。欬。噎。自。衝。脈。氣。沖。不。司。收。攝。為。肝。腎。陰。氣。不。足。咽。喉。久。病。者。緣。少。陰。厥。陰。脈。循。喉。陽。氣。刻。刻。擾。動。無。制。多。屬。陰。虧。脈。形。細。動。不。受。溫。補。肺。藥。久。進。必。傷。冒。口。有陰形之精為陰。納也。滋賦。世皆以

何怪不受。觀脈細而動。全是氣結。出入不利。以致升降氣逆。用清肺更撲滅之矣。必下泄而死。凡陰虛陽陷。其中必熱。用溫補。用則藥之熱復結於中。是以火濟火矣。宜其不受也。重鎮輕散。行血通絡。則血活於內。以陽通於表。而真氣自固。邪氣自散。

熟地炭 女貞子 湘蓮肉 茯苓 芡實 川石斛 炒山藥

甘瀉。非攝納衝氣法。此等病不從升降出入上設想。豈能有濟。

久嗽形寒。行走喘急。是下焦先損。入冬陽不潛伏。喘甚失音。冒納頗安。溫養元海。佐其攝納。若以清肺散邪。食減胃傷。必致敗壞。凡嗽多起於外。無出路。積久成勞。矣。何能散邪。

炒熟地 雲茯苓 胡桃肉 牛膝 鹿鞭 淡萆蓉 炒黃枸杞

運漕四十冬藏失司。咳吐涎沫。是腎病也。醫見嗽。咸以肺藥治嗽。宜其年餘無效。

桂苓甘味湯

無錫三十夏月帶病經營。暑溼乘虛內伏。寒露霜降。天涼收肅。暴冷引動宿邪。寒熱數發。形軟食減。汗出。醫工治嗽。恐其胃倒。漸致勞怯變凶。

歸耆建中湯

同里廿夏令熱氣傷陰。失血。冬藏氣降。血症必然不來。肉瘦精虧。嗽不肯已。但宜滋培。藏真預防。春深升泄。不可以藥理嗽。固本法加五味子。

人參 熟地 生地 麥冬 天冬 五味子 純陰不合。

脈數。左促右小。欬已一年。喉癢火升食減。經水仍來。從未生育。凡女人以肝爲先天。肝陰不充。相火上燔莫制。嗽久痰帶紅絲。皆勞怯勢成。日見消爍。清肺涼藥不效。根本先虧也。急養肝腎之陰。不失延久之計。此風寒失治所致。喉癢者。寒束絡外。熱結絡中。血爲灼敗也。可含藥以行療止癢。服辛溫以散上焦久寒。再用溫鎮固之丸。以補納下焦。庶可有功。無涼藥清肺之理。痰帶紅絲。只是嗽久傷絡。非真吐血也。但求其致。嗽之因而治之。嗽止卽血止矣。

烏骨雞 大熟地 麥門冬 妙白芍 清阿膠 當歸身 川貝母 炙甘草 地骨皮 北沙參

白茯苓 焦黃柏

雞去毛腸頭足翅入藥在肚內酒煮爛去骨用其藥肉搗晒重磨餘汁打糊丸 脈數。總有外邪。宜另用湯劑。調理榮衛以透外邪爲要。

脈細咳逆。不得側眠。肌消色奪。經水已閉。食減便溏。敗證見久病損及三

陰。漸至胃氣欲敗。藥餌難挽。擬進建中法。冀得胃旺納穀。庶幾帶疾延年。

建中湯去薑

杭州廿一據述遺精頻致。哮喘病發必甚。此腎虛失納。真氣散越之疾。少年形瘦。難用溫藥。治當導入任脈陰海以固之。哮喘發而遺精甚者。是肝氣被寒飲抑遏。不得上伸。

於。而疏泄也。

人參 龜腹甲 坎燕 五味子 紫衣胡桃 黃柏 芡實 金櫻子膏

蟲咳一證。趙晴初醫話稿中載之。指為創見。嗣讀張雞峯普濟方論。乃有專論蟲效之篇。但趙謂有蟲在肺。是即張氏之所謂蛀效。屬於勞瘵者也。張謂有蟲在喉。是即吾所謂喉癢為喉中有死血。風寒之所搏也。治宜活血殺蟲之藥。作丸。噙化而緩咽之。此咳嗽門一大證也。案中未備。故特敘之。

肺痿

南潯三廿凡外熱入肺而欬者。可用表散藥。若內傷累及於肺而致欬

者。必從內傷治。汗之則泄陽氣。肺痿音低。顯然藥悟。凡外寒入肺者。用辛

辛涼。陰火灼肺者。壅陰。積陽。

黃芪 黃精 棗仁 白芨無用

江寧九廿病人述上年五月住直隸白溝河。北方不比南地。溼蒸則熱。夜坐仍涼。想是時寒熱。亦是輕邪。醫用滾痰丸下奪。表邪閉結不出。肺痿音啞。喉癆嚙物艱難。仿徐之才輕可去實。用有氣無味之藥。

射干 生甘草 大力子 麻黃苗 蟬衣 芻圖滑石 連皮杏仁。亦是見病治病。未必能效。

吳江陳八三十酒客。脾胃自來不旺。大便不實。奔走勞動失血。乃形氣之傷。止血理嗽。無非清滋。聲音日啞。肺痿氣餒。難治之症。

人參 茯苓 米仁 炙草 白芨 黃精

舟里十五肺痿聲啞。胃減。食入不安。難治之虛損。

戊巳湯

嘉善二三十肺痿失音。形枯氣損。用甘藥調和。不宜辛散滋寒矣。肺痿大病。乃

。非諸小方無輕藥所能治。

黃芪 白芨 米仁 茯苓

胸痺

述胸脘脹痞。不饑不食。大便溏滑。已有五年。夫胸中乃清氣轉旋。清陽失運。濁氣凝聚為患。水穀氣蒸之溼。溼勝遂成五洩。陽氣日微。官脾陽可使氣機之運。氣行溼自去耳。

生白朮 益智仁 眞茅朮 厚樸 茯苓 藜蘆 廣木香 新會皮

中虛陽鬱。胸膈不舒。飲食不快。擬逍遙散疎肝和脾。使甲膽清陽上達。

生化氣行。病可痊愈。案語字字精切。

人參 柴胡 茯苓 歸身 炙黑甘草 焦朮 廣皮 丹皮 炒白芍陽鬱非虛。故不用大溫。

糧船十四氣塞填胸阻喉。不饑不食。問病起嗔怒。寅卯病來。臨晚病減。凡

氣與火必由少陽之木而升。故上午為劇。

瓜萋皮 黑梔皮 薄荷梗 神麩 新會皮 青蒿梗

胸中不爽。是痰氣之阻。做小青龍法。開太陽為主。蓋少陰逆。太陽氣化不至也。方中無麻桂細辛三字。小青龙法有見證。且胸中非太陽部。分。玩少陰逆。三字。當別有見證。未及細述。

五味 炙草 茯苓 杏仁 泡淡薑 生白芍

胃脘痛

婦科別出

瘀濁久留脾胃絡中。黑糞自下。肌色變黃。納食漸減。脘中時痛。不易運化。中宮陽氣日傷。新血復為瘀阻。夫脾臟主統血而喜溫暖。逐瘀鮮効。讀仲聖太陰九條。僅僅溫下一法。但下後必以溫補醒陽。否則防變中滿。

潯桂心 煨木香 生桃仁 製大黃

常山

四十

食入脘悶噯氣。嘔吐覺爽。少焉仍然痞悶。視形軀充偉。按脈

形小濡。中年陽微不運。即為不足。洩降氣分攻痰。是為有餘治法。非脈症所

宜。

經謂形盛脈細。少氣者危。脈濡非勁耳。處。尚。在。痞。悶。未。至。少。氣。且。脈。濡。非。勁。耳。處。

治中法

懷抱抑鬱。營血受傷。入暮脘痛喜按。乃傷陰絡。非實痛也。

柏仁 桂圓 茯神 遠志 廣皮潤燥行滯方意可師。

精氣不足體質。再加思慮鬱結。心脾營血受傷。口味甜。血隨溢。稱適餓。

脘中痛。治是脾敗不證。營主中焦。宜以歸脾養營之屬。於脾藏而然者。有因溼熱可

急用甘涼酸涼微苦之劑清之。日久即成癰矣。

人參 大棗 遠志 茯神 甘草 歸身 白芍 桂圓

雙林七痛而喜按屬虛。痰多肢冷。是脾厥病。大便三四日一通。乃津液

約束。亦是胃氣不轉。

炒熟桃仁 火麻仁 片薑黃 當歸鬚 炒延胡索潤燥祛痰並行有法。

淮安六四十食物有形之滯。從胃入腸。若心胸之下。皆陽氣游行之所。因

初起停食。幾年疑惑。其實陽不轉旋。而致結痺。

括蕪雜白白酒湯

補陽。不宜。

闔門 中焦痛起。四末逆冷。汗出嘔涎及食物。此屬脾厥。逆凡者陽鬱而厥

炒黑附子 粗桂枝 草果仁 延胡索 片薑黃

南京三十通中焦氣血痛緩。嘔食。是胃氣虛逆。

旋覆代赭湯照肝氣犯胃治法。若專胃虛。尚不宜此。

勞傷胃痛。

熟桃仁 延胡索 柏子仁 當歸尾 炒丹皮 漏蘆

同里四十心痛得食而緩。是積勞營虛。大忌辛通破氣。

桃仁 歸身 柏子仁 桂圓肉 炒黑芝麻

膈噎 反胃

高年少腹氣衝。腕下心肋時痛。舌底流涎。得甜味或靜臥少瘥。知饑不食。大小便日窒。此皆陰液內枯。陽氣結閉。喻西昌有滋液救焚之議。然衰老

關格病。苟延歲月而已。醫藥僅堪圖倖。

大麻仁 柏子仁 枸杞子 炒菴蓉 紫石英 炒牛膝 鎮逆不必用石礫且紫石英亦不切。

陽氣結閉。已成關格。病屬不治。姑用進退黃連湯。上下合治。

黃連 白芍 桂枝 人參

關格者經言脈數俱盛四倍。陰陽結邪。相離而不復相營。羸不及於天地之精氣。則危矣。極言關格之不可治。前賢擬方。亦皆未盡善。愚意離愁鬱結。病屬七情。果難措手。今此症由甘肥積熱。酒性燥悍。致傷臟腑。津液治以清。通。清。滋。或。尚。可。希。冀。

川連 生草 括蕞皮 元參 枳殼 膽星 苦丁茶 柏子仁 元明粉 等分蜜丸

同里 六五 酒熱深入血分。瘀嘔盈盆。越六七年。病變反胃妨食。嘔吐涎

沫。問大便仍通。結閉止在中脘。先宜通瘀開閉。

韭白汁 金墨汁 生桃仁 生蒲黃 延胡索 片薑黃

通下。下通。腕中仍結。上下格拒者。乃上熱下寒。古人用麻沸湯。煮涼藥以解上。濃煎溫補以治下。使陽氣不脫。鬱熱自罷。今倣之。既云下寒。或者久。何

通上喘。暫用溫。以救急耶。

黃芩 小川連 枳實 右三味入滾水煮五沸十沸即瀝 人參 淡附子 乾薑 上三味煎濃汁一盞和入前藥服

分煎合服。即復方法。人參可刪。當再加生附子。熱者守補。生者乃能祛格逐寒。

頻頻勞怒。肝氣攻觸胃腕。胃陽日衰。納食欲吐。胃不主降。腸枯不便。仿

仲景食穀則噦。用吳茱萸湯。

人參 黃連 茯苓 乾薑 吳茱萸

陽微。嘔吐不饑。

人參 半夏 茯苓 白芍 淡附子

春夏陽升。肝木乘胃嘔吐不已。寢食減廢。氣失下降。腸中不通。病乃懷抱抑鬱。兩月之久。不敢再以疏泄為治。

人參 川連 烏梅 川棟肉 生白芍上吐下不通。正宜調其中。苦酸只能平肝。不能疏暢中氣。

十九歲翻胃。三月粒米不存。左脈大空虛。右脈細小虛瀯。納食少停。即湧出口。面白神瘁。大便燥結。此陰血枯槁。陽氣鬱結。已成膈症。勉擬補中納下法。

人參 於朮 麥冬 葦莖 牛涎 半夏 益智 茯苓方末合

包衙前五十四 自胃痛起。咽食又噎。近加涌泛粘涎。中年經營勞瘁。陽傷。

清氣不司轉旋。上不知饑。大便不爽。九竅不和。都屬胃病。此所謂二陽之病。發心脾也。治之宜

加歸脾養榮納下。

人參 熟半夏 胡蘆巴 葦撥 茯苓 老薑汁於經營勞瘁不合。以陰分亦必傷也。

飲入腕膈鳴響。唇乾。漱不喜飲。臍腹微痛。晝欲寐。夜不寐。是脾胃未和。

陽氣不得下交於陰。宣通氣分。宗仲景腹痛不加芍藥以和陰。

人參 白芍 穀芽 半夏麴 黑芝麻 霜桑葉 茯苓 陳皮

脈弦。舌白。吐涎。食入膈上即湧出。自述由動怒得之。春病至霜降不愈。心中反痛。恐有痰仍以肝病犯胃治法。

金鈴子 延胡索 良薑 茯苓 炒半夏 砂仁殼

食下腕中噎阻。背脅氣逆而痛。脈右寸獨大。據述由嗔怒致病。當與清

金制木。制字更改作好形瘦津少。勿用破。炆燥血。

枇杷葉 桔梗 紫降香汁 川貝 蘇子 生香附汁

據述左脇痛引背部。虛里穴中。按之有形。納食不得順下。頻怒勞煩。氣逆血鬱。五旬以外。精力向衰。延久最慮噎膈。議宜通氣血藥。取辛潤。勿投香燥。即有痰濁凝留。亦可下趨。

當歸尾 京墨汁 桃仁泥 延胡索 五靈脂 老韭白 此即前治同里因酒病反胃方。

中年飽食。虛里穴痛脹。引之吐出。痛脹勢減。必起寒熱。旬日乃已。夫脾主營。胃主衛。因吐動中。營衛造偏。周行脈中。脈外參差。遂致寒熱。旬中有許

且納物主胃。運化在脾。皆因陽健失司。法當煖中。用火生土意。再以脈沉弦細參論。都係陰象。有年反胃格脹。清陽漸弱。濁陰僭竊為多。症脈屬虛。溫補宜。佐宣通守中非法。

生淡乾薑 茯苓 人參 熟半夏 白粳米

武進四十陽傷胃反。

暴病有因風寒。肝胃不和。久病必因水飲。皆陽傷也。肝腎上中焦溼熱。

逆。凡反胃。屬實者多。

熟附子 淡乾薑 桂枝 黃連 厚樸 茯苓

凡久病必入絡脈。醫但寫藥湊方。不明入絡之理。藥由咽入。過胃至腸而已。此症由肝絡而來。過膈入胃。胃翻嘔吐。致吐致脹之由。從肝而出也。偏勝病起。務以急攻。用藥如用兵。直搗中堅。使病潰散。然非入絡之方。弗能效矣。議於病發之時。疏理肝木。病緩再安胃土。

人參 厚樸 茯苓 熟半夏 磨入蓬莪朮五分

嘔吐 噦呃

厥陰犯胃。則陽明空虛。仲景云。入穀則噦。與吳茱萸湯。泄肝救胃。即史

書圍韓救趙同旨。凡噦。有胃虛。有胃敗。有大腸實。有胃溼熱。有上寒。下熱。二氣相激。有大腸實。氣不下通。

吳茱萸 淡乾薑 炒白芍 雲茯苓 人參

陽邪入厥陰之陰。嘔逆二三日不止。腹痛便秘。發熱口乾。手足冷。此邪化

燥也。宜仿小建中法。凡外風入胃。則吐不止。客寒犯胞絡。則痛而嘔。其證更急。前人有用七氣湯竊謂可用大建中。

麥冬 蔗汁 枳實 沉香 川連 阿膠 赭石 人參 韭白 蝦鼠糞

味過於酸。肝木乘胃。嘔逆心痛。用大建中法。

人參 淡乾薑 茯苓 桂木 炒黑川椒 生白蜜味過於酸。治以辛甘。此內經法。

脈轉勁。舌乾赤。噎氣不展。狀如呃忒。緣頻吐胃傷。諸經之氣上逆。填胸

聚脘。出入機逆。周行脈痺。肌肉着席而痛。轉加。平昔辛香燥藥不受。先議治

肺經。以肺主一身之氣化耳。看證內。是有風邪。不如是風入肺胃。

炒香枇杷葉 苦杏仁去皮炒 二味水煎一杯許沖入桔梗枳殼汁方未合。而法甚佳。效之可移治他病。

天氣下降則清明。地氣上蒸則晦塞。上焦不行。下脘不通。周身氣機皆阻。肺藥頗投者。肺主一身之氣化也。氣舒則胃醒。食進。不必見病治病。印定醫人眼目。

炒香枇杷葉兩一 桔梗錢一 紫菀茸錢三 炒杏仁錢三 米仁錢三 白通草錢一 右藥煎湯一杯

吞酸 食不化

江寧廿食已夕頃。酸水湧嘔。饑時不食。人不安適。此久病胃虛。而陽乏運行。濁陰凝聚使然。春季以辛溫開導氣分。不效。思虛中挾滯泄濁。溫通必佐。養正苟不知避忌食物焉能取效。

吳茱萸 淡乾薑 茯苓 熟川附 小川連 熟半夏

楓橋八十春正月寒威未去。吸受寒氣。先傷胸膈胃脘之陽。食已噯噫。陳腐酸濁之氣。是清陽不為轉旋。忌進黏腥厚味。暫用蔬食數日。

葷撥 益智仁 砂仁殼 土萆皮 生薑

雙林巷六廿早食嘔吐酸水濁涎。心口痛引腰胯。此陽微濁陰犯絡。例以

辛熱。此寒結陽明之絡。當由形寒飲冷。內外俱傷所致。寒滲內溢。非一日之故。

川烏頭 高良薑 延胡索 川棟子 白豆蔻 茯苓

闔門四三十舌粉白。心中寒。嘔酸不止。理胃陽。必佐洩肝逆。

吳茱萸 川棟子 生炒黑附子 高良薑 延胡索 雲茯苓

胃弱。肝氣不和。口中吞酸作苦。食物無味。擬進加味溫膽湯法。

溫膽湯加人參川斛二陳加竹茹枳實。為溫膽。

四十二歲。脈右濇左微。色悴不華。食減不能健運。噯嘔溏泄。此中宮陽氣欲寂。法宜辛溫通補。失治釀成中滿難調。

人參 泡萊莢 茯苓 泡淡薑 胡蘆巴

左脈弦大空虛。右脈虛軟滯。能食不能運。便澹跗腫。此係積勞傷陽。壯歲經年不復。當作虛症。宜補脾腎治。

人參 於朮 茯苓 煨益智 淡附子 白芍 甘草 乾薑 胡蘆巴

胃主納。脾主運。能食不化。泄瀉。治在太陰脾臟。此臟為柔臟。陽動則能運。凡陰藥取味皆靜。歸地之屬。反助病矣。完穀不化。何事歸地。此不待言。

淡附子 淡乾薑 生益智 生砂仁 人參 茯苓 只是温中止瀉。無深意。

病傷。久不肯復。食入不運。脾胃之陽日困。與治中法。

煨智仁 茯苓 於朮 廣皮 白芍 煨薑 南棗

酒客伏溼。脈數。汗多。咳嗽。食不易運。病在手足太陰。

茅朮 扁豆 米仁 桑皮 杏仁 半夏 茯苓

腹痛

婦科別出

久瀉欲嘔。腹中有形。升起痛楚。小便不利。喜食麥麵。皆肝厥內風襲胃之症。緣稚年驚恐。多煩多哭。氣逆風旋。蛔不自安而動。久調必痊。必當苦降辛宣酸泄。風木得和。脾胃可安。東垣老人治脾胃。必先遠肝木矣。

川黃連 白芍 烏梅 乾薑 桂木 人參 川棟子 川椒紅炒黑 爲末烏梅肉爲丸每服二

錢米飲下忌食甘

尖田人案 腹痛三年。夜分乃發。發必腹滿。嘔不出物。繼而泄瀉。此爲

脾厥。脾爲太陰之臟。在臟體屬陰。其運用則陽。厥陰肝病。必有前陰見症。不難

盡然却亦 用治中法。

人參 木瓜 炮薑 廣皮 青皮 生益智 茯苓 方意仍兼顧厥陰所謂先遠肝木也。

腫脹

秋季寒熱滯下。總是長夏爲暑溼病。蓋夏令脾胃司氣。治失其宜。致腹滿泄瀉。跗浮囊腫。皆溼邪無以走泄。阻遏流行氣機。使然。腫脹勢減。仍不饑

少食兼吐痰濁痰血。要知溼是陰濁。久鬱於中。必從熱化。初傷氣。久而入絡。病能篇中。以溼腫屬脾。以脾為陰土。得陽乃運。今氣困無以運行。諸經腑為壅痺。消則愈困。補則壅滯。當疎腑養臟為宜。凡腑以宣通為補。非徒偏熱偏寒治矣。

茯苓 厚樸 生薑芽 新會皮 生益智 澤瀉 兼用仲淳資生丸去黃連每早粥後復嚼一丸

約二錢

今年浮腫。腹脹泄瀉。皆雨溼太過。脾陽鬱遏。久則氣窒。小溲不利。凡分消健中。調治其氣。水溼自去。脾陽漸復。酒肉閉氣。食物宜忌。

生白朮 茯苓皮 生益智 椒目 厚樸 廣皮 澤瀉 豬苓

寒熱欬嗽。初起必有外邪。數語真度邪陷入裏。則陽氣傷陰濁擾亂。延

為腫脹。述腹脹大。上實下堅。濁自下起。逆氣挾痰上沖。暮則陰邪用事。着枕咳嗆更甚。本草云。諸藥皮皆涼。子皆降。想前醫是用五降肺氣。疏胃滯。暫時

通泄。昧於陰邪盛為腫為脹大旨。形寒吐沫。陽氣已寂。湯藥以通太陽。續進攝納少陰。攷諸前哲。不越此範。

早服濟生腎氣丸

晚進桂苓甘味薑附湯

此喻西昌法。治腫脹用溫補。以景岳為開山。予更佐以溫散。使肝陽得升。肺陽得運。陰邪自然退伏矣。

因時病而不慎口腹。以致咳痰嗆逆。肌肉消燦。食下臏脹。甚則吐食。而成虛損矣。病在土不生金。金衰則不制木。互相戕剋。有不能起之象。議以養金制木。使中焦無賊邪之患。壯火培土。使上焦得清化之權。亦是一法。未知何如。

甜沙參 淮小麥 鮮蓮肉 南棗 懷山藥 雲茯苓 燕窩

繼進方

人參 山藥 白芍 茯苓 炙草 南棗 鮮蓮肉 未見能壯火培土也。

咳嗽肉消。老弱腎病。食入腹脹。大便稍利。勢減。兼之晝甚夜輕。 易在此治 據

是氣分。府陽失宣。徒執虛治不效。經云二虛一實者。偏治其實。 是景岳文 開其一

面也。據經以疏方。

米仁 茯苓 澤瀉 杏仁 寒水石 淡滲泄陰以通陽。是有餘治法。老弱非宜。

太平 九四 左脅有形。漸次腹大。每投攻下泄奪。大便得瀉。脹必少減。繼

則仍然不通。頻頻攻下。希圖暫緩。病中脹浮。下部加鍼刺。以決水之出。腫消。

病仍不去。病患六年。久已斷想此病之愈。要知此病。初由肝氣不和。氣聚成。

瘕。屢發攻瀉。脾胃反傷。古云臍突傷脾。今之所苦。二便欲出。痛如刀刺。 下陽氣

於而鬱積此 蓋氣脹久下。再奪其血。血液枯。氣愈結矣。宣通。宜以利竅潤劑。

琥珀屑 一錢 麝香 一分 大黑豆皮 四錢 杜牛膝 四兩

一一便通後。接服

芫蔚子 郁李仁 杜牛膝 當歸身 冬葵子 方不可解。愚見宜用甘潤辛溫。鼓舞大氣。力建中樞。使上下升降流通。專用利藥降藥。陽

何由振。

汪介臣 鼻冷涕泪。腹脹仍空。形色衰奪。脈微而瀋。陽氣已憊。濁陰日

聚。為脹滿不食。危期至速。勉議通陽方法。

人參 茯苓 淡附子 淡乾薑

蕩口六十四面黃白。削瘦無神。腹大臍突。足冷腫重。自言如著囊沙。曾經

用藥攻下。下必傷陰。而脹滿不減。乃濁陰錮。必陽傷。見症。病在不治之條。但用藥究宜溫熱。以糞通陽泄濁。

生川附 椒目 炒乾薑 炒小茴 車前子方甚好

永隆號 屢通大便。脹勢不減。是陽氣愈傷。陰濁益壅矣。進通陽法。真武湯。去白芍。加澤瀉。瀉椒目。

腎陽虛。則乏納氣之權。濁陰凝痞。少腹漸覺有形。為脹。脾陽虛。則健運失司。食少易滯。受病既屬內傷。固以理臟真為最要。益火煖土。使下中之陽得安。迄今圖治。至冬至一陽來復。必獲全效。

川椒 附子 白芍 茯苓 甘草

脈沉。右小。左虛大。臍上有動氣。臍脹。不嗜食。艱於大便。恐將成膈此中氣大虛。亦心虛肺肝氣內變。忌用攻伐消導。宜泄肝和胃。

茯苓 益智仁 鬱金 穀芽 烏梅肝以酸為泄

寒溼損傷脾陽。遂成中滿之症。乃淡泊不堪所致。

附子 乾薑 茯苓 白芍 胡盧巴可改用吳黃

脈沉屬水。初因食物之滯。繼為下奪太速。脾陽頓傷。氣窒溼聚。為腫脹矣。

大腹皮 茯苓皮 厚樸 豬苓 澤瀉 老薑皮 新會皮 甜葶藶 杏仁因下奪太速。豈可再破氣。必體強者

或可。總不如鼓舞陽氣。為穩且妙。

痛脹甚於暮夜。病根已在陰經。從前溫補相安。今則服之不應。因以寒

凝痰滯為患。進神保丸。即上吐下瀉。此非有形之滯矣。斯臟液日耗。為虛。腑

經陽氣窒塞為實。方失

脾胃不和。腹膨痛。夜自汗。先疏利氣滯。保和丸。焦鍋巴陳茶薑湯下。

保和丸。山查神曲茯苓半夏陳皮萊菔子連翹。曲糊丸。麥芽湯下。

脈沉遲。腫脹。腹滿。莖縮。溺不利。起於上年冬底。痰飲咳嗽。氣逆不得臥。

誤認腎虛水泛之恙。療治。遂致增劇難調。勉擬進濬川丸以通水道。用久病能濬川能

是腎本不虛但脾肺寒溼耳得小便頻利。冀其勢緩。宜略加鼓舞肺氣藥。子和濬川稱

濬川丸。或當時藥肆緩有製成此丸。抑或。先生取丸以之。而改此耳。

陸家浜十三陰邪盛為腫。便溏溺短。議通腑陽。

生炒黑附子 炒黑遠志 生於朮 生厚樸 椒目 茯苓 猪苓 青皮

四九積勞傷陽。腹膨仍粟。脈弦無胃氣。形肉衰削。理中宮陽氣之轉旋。

望其進食。無能卻病矣。

人參 淡附子 穀芽 茯苓 益智仁 廣皮 炙草

湖州三十太陰腹脹。是久勞傷陽。不饑不能食。二便不通暢。溫以通陽。

苦溫疎滯。

熟附子 熟大黃 草果仁 二味非久勞所宜 生厚樸 生薑 廣陳皮

瘀積於肝。邪正錯亂。臟腑之氣交傷。而成膨疾。腹脹氣壅。擬禹餘糧丸。破血泄肝。通利二便。治之。此即血

禹餘糧丸十粒

頭痛 附療癥

沈陽 五十 住居臨海。風瘴癘氣。不似平原人衆稠密處。瘴癘侵入腦髓。骨節。氣血不和。漸次壅遏。上蒸頭面。清陽痺阻。經年累月。邪正混處其間。草木不能驅逐。憑理而論。當以蟲蟻向陽分疎通逐邪。

蜚蠊 一兩 仙靈脾 五錢 蜂房 五錢 川芎 一錢 火酒飛麵泛丸

頭痛累月。陽脈大 若陽脈短小 陰脈濇。此陰衰於下。陽亢於上。上盛下

虛之候也。陽氣居上。體本虛也。而濁氣干之。則實。陰氣居下。體本實也。而氣

反上逆。則虛。頭為清陽之位。而受濁陰之邪。陰陽混亂。天地否塞。而成病矣。
法用六味。地黃湯加青鉛五錢。滋陰潛陽

頭痛經年不愈。早則人事明了。自午至亥。神氣昏憤不寧。邪在陰分。非陰虛也。風

火之劑。雜治無功。兩脈俱沉且滑。此太陰陽明痰厥頭痛也。當用礞石滾痰丸。間服導痰湯。以蕩滌其痰。次以六君子湯。少加秦艽。全蠍。調理而安。

曹漢臣 厥陰頭痛。舌乾消渴。心下煩疼。無寢多躁。小腹脹滿。小便滴

瀝。時時痙搐。最怕厥竭。

阿膠 鮮生地 雞子黃 小黑豆皮 煎半盞。即以湯藥送滋腎丸三錢

稚年陽有餘。陰不足。驟加驚恐。厥陽直升。為頭痛。身不發熱。二便自通。

豈是風寒停滯。羌防葛薑。辛溫混發。陽經愈升其陽。必致損目。宜養陰藥。方

吳趨坊五十四 清竅在上。焦氣分。搐鼻宣通。固是好法。但久恙氣錮。溼痰

必生。茶調散臥時服五分。

薄荷八錢 川芎四錢 荊芥四錢 羌活二錢 白芷二錢 防風五錢一分 細辛一錢 炙草二錢 茶調勻服

瘰癧從情志易怒而來。然不盡久鬱氣火燔灼。值產育頻經。奇經入脈不固。陽乘脈動。經來如崩。內經謂陰絡傷則血內溢。脈來虛數。肌肉易熱。陰乏不主內守。浮陽擾越外翔。形症及脈。難用溫煖之藥。平昔飲酒不喜甘味。滋膩。徒然參苓。僅到中宮。凡經水必由血海而下。血海即衝脈。自述腰髀痠楚。其損已入奇經。攷宋元明諸賢人。凡不受熱藥體質。必用震靈丹以固下。更佐能入諸經之品。通攝兼進。

人參 茯神 女貞子 天冬肉 炙草 旱蓮草 炒枸杞 炒當歸 送服震靈脂丹六十粒
 震靈丹 禹餘糧、赤石脂、紫石英、代赭石、四味煨研。乳香、沒藥、硃砂、五靈脂、為末和勻糯米飯丸。

七竅諸病

耳聾耳鳴目暗
目翳牙宣鼻淵

五旬外不得安閒。凡惱怒煩動。多主五志之陽上舉。而肝膽相火為甚。幾年前。製壯水之劑。加磁石龜甲之沉潛。乃乙酉同治之義。今年暴暖多風。

風熱上搏。清竅爲蒙。溼熱蒸爲膿水。此爲客邪乘本體之虛。治標宜輕揚。以清上。靜坐宅中。可以向安。

連翹 赤芍藥 草決明 羚羊角 薄荷梗 黃芩 山梔皮 荷葉梗 飯後服

裏真氣衰不能貫通外膜致聲若甕中而蛙鳴蚊震之聲不絕前之流膿水時令溼熱氣加也今議補下鎮納收斂方法。

龜膠 磁石 牛膝 牡蠣 遠志 菖蒲 淡菜 膠同蜜丸

瘡後耳竅流膿是竅閉失聰留邪與氣血混爲扭結七八年之久清散不能速致當忌葷酒濁味臥時服茶調散一錢患耳中以甘遂削尖插入口內銜甘草半寸許。

瞳神散大無光乃動怒陽盛致血耗水涸精采散越之象治宜養血斂液。

熟地 五味 萸肉 茯神 女貞子 白芍 炙草

丸方 熟地 五味 茯苓 磁石 荳肉 枸杞 白芍 青鹽 龜膠丸

男子七旬。下元脂液已少。陽氣升騰。陰少承供。目恙先從左起。肝主左升也。血無內藏。陽上蒸迫。為障失明。顯然水虧無以生木不足之症。焉得用龍膽黃柏瀉火之理。倘苦寒傷胃。噬臍莫及。風火多傷肺。發於肝腎。故一陰虛血熱。故一

多從左。一多從右。歷驗之矣。

更劇。閱古人書。急則用黑錫丹。養正丹之屬。平時以溫煖下元方法。

人參 熟地 五味子 胡桃肉 熟附子 舶茴香

牙宣春發。繼以喘促。乃腎虛不能納氣。歸元。戊亥陰火。寅卯陽動。其患陽不交陰。寤不成寐。內風乘巔。髓出鼻竅。腥濁。必絕欲經年。可以卻病。乃下焦病根。歸脾湯永無效。期做丹溪法。

淡菜 阿膠 熟地 龜版 茯神 天冬

喉痺 喉癢 失音

脈虛瀯。咽中時痺。不妨食物。大便乾燥。此肺中氣不下降。不主運行。消渴心熱。皆氣鬱為熱。非實火也。

枇杷葉 蘇子 蜜炙橘紅 馬兜鈴 茯苓 川貝母

秦興二十色脈是陰虛。其喉妨食納。乃陰乏上承。熱氣從左上升。內應

肝腎陰火。前議復脈法。大便滑泄。知胃氣久為藥傷。不受滋陰。必當安閑靜室以調之。豈偏寒偏熱藥能愈。

人參 茯苓 扁豆 木瓜 石斛 北沙參

南京三十外邪窒閉肺竅。用輕劑治上。食可下咽。水入必噎者。此喉氣有阻也。仍以辛潤。

杏仁 紫苑 桑葉 茯苓 米仁 通草

霉雨滂沱。咽喉暴痛。必因溼邪干肺。痛止。納食無礙。嚥水則噎。兼吐涎。

沫此痺阻在喉不在咽仍以輕劑理肺。口按水約不入喉密。王致勳水溢謂是喉之上

故或因風寒。或因虛燥。

枇杷葉 馬兜鈴 通草 米仁 射干 茯苓

汪裕當 喉癢嗆楚形寒忽熱今早便溏臥醒咽乾不為口渴議養胃

陰以供肺。據寒熱溇更必有風寒。養陰之中宜佐疏散。若久者更宜兼活血矣。僅用清潤無功。

扁豆 北沙參 南棗 元米湯煎

楓橋二十咽管似乎狹窄一身氣化全在於肺因胃熱薰肺肺職失司。

年紀日多氣結痺阻以薄味肅清上焦藥宜氣輕理燥。此即隔在咽管起。故

此入於

鮮枇杷葉 杜蘇子 米仁 桑葉 降香末 茯苓

音啞者陽邪搏於三陰少陰之脈循喉嚨太陰之脈連舌本厥陰之脈

出咽喉故也然陽邪搏陰之候正未易治。察方中指風熱言。則陽

甘草 桔梗 萹皮 麥冬 川連 杏仁 丹皮 生蒲黃 生地

長善浜 歐詈大聲。用力氣迸失音。雖陰虛腦泄。亦必用輕揚肅上。

桑葉 枇杷葉 生甘草 象貝 米仁 沙參

水消 狂癩 不寐

腹中如有水狀。行則腹鳴濯濯。經言肺移寒於腎。水氣客於大腸。如囊裏漿。按之不堅。屬火衰陽虛。不得轉輸於膀胱。謂之涌水。

人參 附子 茯苓 白朮 乾薑 炙草

渴飲不解。經謂之膈消。卽上消症也。言心移熱於肺。火刑金象。致病之由。操心太過。刻不寧靜。當却盡思慮。遣懷於栽花種竹之間。庶幾用藥有效。

生地 天冬 棗仁 人參 柏子仁 知母 金石斛 生草 元參

善食而饑。經謂瘵成消中。膏梁蘊熱過也。禁芳草石藥。石藥發癩。芳草發狂耳。自應清胃。淡薄疏食。庶可獲愈。

萸皮 枳殼 川連 鬱金 金石斛 連翹 焦神麩

狂癩陡發莫制。病去諸事皆清。發時面青。食少。議泄肝膽。

龍蒼丸 二錢五分十服

徽州 四十 操持太過。肝腎浮陽上升。乘胃。寤不成寐。

金匱酸棗仁湯

陝西 七十 痰飲乃陰濁所化。以漸有形。阻礙陽氣。不得入於陰。陰躄穴

空。夜不熟寐。靈樞用半夏秫米湯。謂通陰交陽。痰飲不聚也。天王補心丹。一派寒涼。陰藥轉為濁陰。樹幟矣。護陽為要著。仲景云。凡痰飲當以溫藥和之。

小半夏湯加秫米

下寒便難。不寐。液涸。陽不潛伏。用辛甘化風。

熟地 歸身 肉桂 枸杞 懷牛膝 白芍 茯苓 甘菊 菴蓉 柏子仁

跌仆 傷力 失血

葑門九六望七精力不及壯盛。凡男子必下焦先虛。跌仆致損。乃係外傷。筋縱骨短。屈不能伸。是足外踝留著瘀凝。須俟夏月。令瘍醫磁鍼砭刺可愈。還少丹。

熟地 山藥 枸杞 萸肉 茯苓 杜仲 遠志 五味 楮實 小茴 巴戟 菴蓉 石菖蒲
加棗肉爲丸

努力絡傷身痛。痰嗽失血。最宜降氣通瘀。最忌沈寒呆補。

紫降香末 鬱金 茯苓 米仁 蘇子 桃仁 入韭白汁十五匙

淮安三武略用力逆氣。與酒色精傷不同。失血在長夏熱洩之令。胸脅跗骨皆痛。是肝胃絡傷。

桃仁 米仁 降香末 茯苓 蘇子 韭汁 炒山查 丹皮

漏瘍

興化四廿肛瘍成漏年餘。真陰五液皆傷。納食在胃。傳入小腸。而始變化。

因欬痰不出必嘔盡所食乃已喉痛失音涎沫吐出喉中仍似存留明明少陰脈中陰火內燦上燔陰液蒸變涎沫內損精血醫見欬嗽音低咸進清金潤肺不明此欬噎之原是速其篤已。

豬膚湯

脈濇無神便澹食少肛有瘡瘍兩月未合已成漏症延綿竟有痼疾之虞近日嗔怒氣擾中焦隱痛至於耗氣劫奪萬難再餌議進東垣益氣湯減黃芪加木瓜白芍煨薑南棗以制肝木。

東山三精損於下陰中龍雷燃爍莫制失血後肛瘍膿漏即陰火下墜所致行走喘促涎沫上湧是腎不攝納真炁五液變沫湧逆無治痰治嗽之理扶胃口攝腎真乃為對病之藥。

人參 茯苓 坎炁 五味子 紫石英 芡實 湖蓮 山藥

陳 纔交春三月每夜寒熱渴飲汗出榮衛乖離渴飲却是好象是皆陰損於下孤

陽獨自上冒也。虛勞兼有漏瘍。加以情懷悒鬱。損傷不在一處。少腹及腰肋痛。議治在肝胃之間。凡損病虛內熱內渴能飲。是眞陽未離。尙有下手處。故是好象。

桃仁 旋覆花 丹皮 新絳 青葱 柏子仁

許友官 幼年瘍潰成漏。後天不能充長。其吐血後。嗽不止。夜熱。晨汗熱止。日見色奪肉消。減食。惡心。便溏。乃勞怯陰陽中下並傷。草木藥餌。何能挽回生生真氣。難效之症。

人參 山藥 芡實 炙草 五味 熟地炭

痔血 便血

凡有痔疾。最多下血。今因嗔怒。先腹滿。隨瀉血。向來糞結。近日便溏。是風木鬱於土位。氣滯爲膨。氣走則泄。議以理中湯。泄木佐之。此案指南有之。此案結便溏作

糞前糞後。便於上下不貫。

人參 附子 茅朮 醋炒芩胡 炮薑 地榆炭 厚樸 醋炒升麻 方中參附薑朮。俱爲徐氏所直。然壯土以舉木。正

宜此種。惟薑辛燥。須炮透。不宜多用。

腸血腹脹便溏。當臍微痛。脾胃陽氣已弱。能食氣不運。溼鬱腸胃。血注不已。攷古人如羅謙甫王損庵輩。用劫胃水法。可效。據臍痛。是有實邪。如瘀血凝。痰寒結食滯。

真茅朮 紫厚樸 升麻炭 炙甘草 附子炭 炮薑炭 炒當歸 炒白芍 煨葛根 新會皮

以黃土法丸

官宰術十三酒客多溼。腸胃中如淖泥。陽氣陷。血下注。昔王損庵以剛藥

劫胃水溼。

理中湯加木瓜酒家亦不宜太辛。故甘草乾薑宜減。

黎里四十四形色脈象。確是陽虛。酒食聚溼。溼注入腸。腸痔下血。溼為陰

濁。先傷脾陽。陽微氣衰。麻木起於夜半。氣血交代之時。中年痲中。大有可虞。

人參 生於朮 炮薑 炒黑附子 炙甘草

下血不已。汗出躁煩。心悸恍惚。頭不安枕。轉側不能。兩脈虛濇。虛為氣虛。濇為陰傷。人身陽根於陰。陰附於陽。兩相維繫者也。今陰血暴亡。虛陽無偶。勢必外越矣。虛陽外越。而陰愈無主。其能內固乎。陰陽相離。氣血兩虧。法宜兼補。然血有形。難以驟致。氣無形。可以急固。固其氣則氣自充。氣充則不必治血而血自守矣。先用歸脾湯。繼以大造丸。頭不安枕。不能轉側。如風寒痰飲者。可治。如因血絡虛枯。萬無生理。此案不似先生手筆。

人參 白朮 茯神 棗仁 黃芪 龍眼肉 當歸 遠志 木香 甘草 生薑 大棗

寒熱如瘧。便血不已。左脅有塊。攻逆不已。而作痛。脈弦數兼濇。弦則為風。數則為熱。濇則氣結。此肝脾之氣。悒鬱不宣。胸中陽和。抑而成火。故神明不精。肝之應為風。肝氣動。則風從之。故表見寒熱也。人身左半。肝腎主之。肝風自逆。故左脅攻楚有塊也。肝為藏血之地。肝傷則血不守。且以風淫熱勝。蓋為亡血之由也。

生首烏

黃連

柴胡

黃芩

知母

枳實

厚樸

此藥亦不似
先生手筆。

下血既久。真陰大損。臨晚熾熱而咳。乃陽失潛伏。宜甘酸益陰為治。

熟地炭

甘草

萸肉

山藥

五味

茯苓

芡實

木瓜

屢進潤血燥熄虛風藥。諸症向安。入夏四月。苦於便難寒熱。此夏令陽氣大泄。陰液更耗。虛氣動灼為祕。古人每以辛甘化風主治。因體瘦不受溫補。復以鹹苦味入陰之意。

鮮生地

胡麻

製首烏

天冬

柏子仁

杞子

茯神

肥知母

川斛膏

便後純血。食減力疲。脈左堅。是中年陰虧。

熟地

炒白芍

當歸

柿餅炭

炙草

獨糞後血未已。是為遠血。宗仲景金匱例。用黃土湯。

黃土

生地

奎白芍

人參

清阿膠

川黃柏

歸身

泡淡附子

穉年瀉血。是飲食不調。熱蒸於絡。為腸胃之病。肛痔亦由溼熱內蒸而

致。熱甚則陰液不充。風熱上升。故乾噎。法當與甘寒之劑。俾金水同出一源。况肺熱必移大腸。腎開竅於二陰也。

鮮生地 地骨皮 麥門冬 金銀花 穉豆皮 肥知母

淋濁 溺血

八旬又四。下元虛憊。膀胱不開。溺淋窒痛。腎藏之陽。通納皆少。惟峻補元海。可冀小效。至於全好。恐難深許。

當歸 鹿茸太温 茯苓 柏子仁 菴容滅陽 杞子 熟地 牛膝宜佐生津理氣以利升降

淋屬肝膽。而酒性溼熱之氣。肝膽先受。滓汁次及腸胃。溼甚熱鬱。溺竅烝阻。莖管窄隘。久病積熱愈深。不受溫補。淋本無溫補法。有熱散法。當忌酒肉厚味。分利雖投。不能却病。從經義苦味祛溼。參以解毒。酒毒熱積。不宜肆用。其難距苦。

花天花粉。雖是例。却宜略佐。

料豆皮 牡丹皮 黑山梔 蘆薈 龍膽草 真青黛 金銀花 胡黃連

忍精而溺。尿管閉塞。此淋症也。古云痛則不通。用千金方法。

杜牛膝 麝香 三分研細調入

淋症愈後半年。交五六月復發。雖係肝膽鬱熱。亦必是暑邪內蘊。六腑皆為之不利。胸腹如悶。溺色赤混如血。宜先清熱。宣腑陽。然後再調本病。

捲心竹葉 寒水石 車前子 牛膝根 廣橘紅 黑山梔 川鬱金 滑石

便濁精濁。兩者迥殊。據述素有夢遺。濁發遺止。則知精濁矣。分清飲入

正散。治濁套藥。與此無涉。當固補下焦。不必分利。宜清肝熱。而固心氣。此案方論。皆未甚合。

擬方。側柏葉。川芎。桃仁。生龍骨。兔絲子。煨牡蠣。脈滑數而實者。加膽草。

熟地 遠志 沙蒺藜 線魚膠 山萸肉 覆盆子 兔絲餅 生龍骨 茯苓塊

濁膩膏淋。日下最易損人津液。絡脈遂槁。况入脈隧道。紆遠泛然。補劑藥力罔效。難經謂十二經屬通渠旋轉。循環無端。惟奇經如溝渠滿溢。流入深河。不與十二經竝行者也。樹根草皮。此症亦難奏效。須用血肉填補固濟。

庶可希其獲效。此必腎虛或濁已愈。乃可用此填補。若初起。必有致

取強肝健脾。效甚捷。

麋茸 河車 人參 蒸黑於朮 茯苓 湘蓮 縮砂 雀卵 茹蘭 烏賊骨 雀卵河車膏爲

丸何不即用經方

腐精瘀血。阻閉溺竅爲痛。似淋非淋。久則陽維脈傷寒熱起。五液枯耗爲便難。乃虛症也。

鹿茸 淡菴蓉 柏子仁 枸杞子 沙蒺藜 茯神 當歸

接服 鹽水炒骨脂 淡菴蓉 沙蒺藜 茯神 枸杞子 厚杜仲 鹿茸 龜版

丸方 河車膠 沙蒺藜 龜版 水煑熟地 枸杞 麋茸 茯神 菴蓉丸方可用

久勞鬱勃。夏季尿血。延及白露。溺出痛澀。血凝成塊。阻著尿管。夫淋症方書列於肝膽部。爲有溼熱阻其宣化氣機。故治法苦辛泄肝。淡滲通竅。施於壯實頗效。今望八老翁。下焦必憊。况加精血自敗。化爲瘀濁。真氣日衰。機

竅日閉。診候之際。病人自述夢寐若有交接。未嘗遺洩。心陽自動。相火隨之。然清心安腎等法。未能速效。暫以清營通瘀宣竅之劑。究竟精血何以自動。敗此必津少而血燥也。心肝主血。血燥則無以養神。而推行不利。清營最合。

天冬 生蒲黃 龍膽草 龜版 生地 阿膠 丹皮 焦黃柏 夢交不洩。是厥氣客於陰器也。病在經絡。不在心腎。猶為

易治

患溺血症。已三月矣。前用升補法不應。右脈虛瀋無神。左關獨弦。是有

莖中作痛。下多血塊。是有形色憔悴。又多噁氣。據脈論症。乃肝脾積熱也。肝

熱則陰火不寧。而陰血自動。以血為肝臟所藏。而三焦之火。又寄養於肝也。

故溺血莖中作痛。脾熱則溼氣內壅。而生氣不伸。以脾為溼土之化。而三焦

之氣。又運行於脾也。故時時噁氣形色憔悴。此案不似法當益肝之陰。則火

自平。利脾之溼。則氣自和。據脈證。宜清肝健脾。氣虛而有血。療

生地 白芍 蘆薈 丹皮 甘草 車前 方輕清甚合。但少逐瘀之品。已成之血塊。何由自化。

繼用逍遙散加車前此證正宜加血餘。

二便不利

附泄洩

橫涇十三勞傷虛體。脹病初愈。因動怒氣鬱不食。二便皆阻。從腸痺定議。

仿丹溪開肺法。以肺主一身之氣化。

杏仁 蘇子 桑葉 紫苑 薑皮 桃仁

李隆吉 客寒入於腸絡。欲大便必先腹痛。便解痛已。旬日無溺。氣下

泄。此屬腸痺。

寒客於大腸膜中。則大腸之氣既窒。而升降亦自不通。

公丁香柄 柴胡 木香 白芍 烏藥 川棟子化入更衣丸五粒

久瀉傷腎。下午黃昏為甚。非通奪藥所宜。擬溫腎法。方失此陽不固也。溫腎最合。

吳文生 胃中不和。痛瀉。

茅朮 厚樸 廣皮 木香 炮薑 茯苓 豬苓 澤瀉 砂仁

溫

熱

冬溫 春溫 伏氣 新感 挾虛 挾飲

冬溫爲病。乃正氣不能藏固。熱氣自裏而發。齒板舌乾唇燥。目微紅。面油亮。語言不爽。呼吸似喘。邪伏少陰。病發三焦皆受。仲景謂發熱而渴者爲溫病。明示後人寒外鬱則不渴飲。熱內發斯必渴耳。治法清熱存陰。勿令邪熱焚劫津液。致瘦癯。厥神昏譫狂。諸症。故仲景復申治療法云。一逆尙引日。再逆促命期。且忌汗忌下忌辛溫。九日不解。議清膈熱。

飛滑石

連翹

淡黃芩

鬱金汁

竹葉心

天花粉

橘紅

苦杏仁

朱先生勞倦愠怒。是七情內傷。而溫邪感觸。氣從口鼻。直自膜原中道。蓋傷寒陽症。邪自太陽。次第傳及。至于春溫夏熱。則鼻受氣。肺受病。口入之氣。竟由腕中。所以原有手經見症。不比傷寒足六經之病也。其原不同。治法亦異。仲景論溫邪不可發汗。汗則劫津傷陽。身必灼熱。一逆尙引日。再逆促命期。又云。鼻息鼾。語言難出。劇則驚癇瘵。無非重劫津液所致。今病發熱。原不是太陽客邪見症。所投羌防辛溫表汗。此誤卽爲逆矣。上竅不納。下竅

不便亦屬常事。張鮮不見此措必以攻下。時醫通弊。遂致或暫效。或病

下原可泄熱。便謂陽明已實。蓋氣結津傷。有形如此者。但據殊不知強汗

劫津而傷陽。妄下劫液更亡陰。頃診脈。兩手如搖而戰。舌乾燥而無胎。前板

齒乾。目欲瞑。口欲開。周身燈照而淡晦。斑紋隱隱約約。幾日來。時有呃逆。因

胃乏穀氣而中空。傷寒絕穀俗例可恨肝陽衝突。上冒肆虐耳。為今返正。先

與糜粥。使胃中得濡。厥陽不致上冒而神昏之累。可已。進藥之理。甘溫可以

生津除熱。即斑疹亦不足慮。觀仲景論中。邪少虛多。陰液陽津並涸者。復脈

湯主之。謹倣此義。風寒久鬱化熱。皆為癰疹。況本溫病。誤用辛溫耗

斑疹不足慮。真卓識也。

炙甘草 人參 生地 白芍 阿膠 麥冬 方中宜加龍蟠。仿救逆意。為有痲也。

五十七歲。豐腴體質。適值過勞。陽氣受傷。嘔吐食物。邪氣甫及中焦。無頭痛。身

熱。無表證。已非外感風寒。而間日煩躁渴飲。唇焦舌黑。是內伏熱氣由募原以

流。布。三。焦。亦。如。瘧。邪。分。爭。營。衛。者。然。然。有。年。積。勞。既。久。伏。邪。客。病。本。輕。脈。小。緩。按。之。不。爲。鼓。擊。可。爲。徵。驗。且。二。便。頗。通。略。能。納。穀。無裏證是陰未大傷邪未入下焦焉。有。停。滯。積。聚。仲。景。於。瘧。熱。無。寒。之。條。不。出。藥。方。但。曰。以。飲。食。消。息。後。賢。參。聖。意。甘。寒。以。養。胃。陰。其。熱。自。解。要。知。表。散。之。辛。溫。消。滯。之。苦。溫。以。及。苦。寒。沈。降。多。犯。聖。訓。戒。律。矣。此即溫瘧。

鮮生地 甜杏仁 麥冬 花粉 竹葉心 青蕉汁 連翹據證是有瘀血凝痰。停於胃中。方味少活血之品。恐未能效。可加桃

仁茜草焦查青皮。

勞倦伏邪。初起即用柴胡紫蘇。三陽混散。津液被劫。熱邪上結。胸中懊懣。神煩譫語。渴欲冷飲。診得脈無神。舌色白。病在上焦氣分。閱醫藥不分上下氣血。況冬溫氣泄。老人積勞。七日未見病退機關。此屬重症。豈可藐視輕談。

瓜蒌皮 黑梔子 白杏仁 鬱金 香豉 枳殼汁生津通表。然方却甚靈巧。老人真氣虛。最怕是

焦實結。攻補棘手。遂成不治。是以病在上焦。方中已兼清中焦矣。

汪天植 脈數如浮。重按無力。發熱自利。神識煩倦。咳噎痰聲如嘶。渴

喜熱飲。此非足三陽實熱之症。乃體屬陰虛。冬月失藏。久伏寒邪。已經蘊遏

化熱。春令陽升。伏邪隨氣發泄而病。所謂奉生者少。陰津不足。供陽氣之發泄也。未及一旬即現。

虛靡不振之象。因津液先暗耗於未病時也。今宗春溫下利治。

淡黃芩 杏仁 枳殼 白芍 鬱金汁 橘紅

積勞伏熱。值初冬溫暖。天地氣不收降。伏邪因之而發。是為冬溫。實非

暴感。表散無謂。其痰喘氣促。左脅刺痛。係身中左升不已。右降失職。有飲邪以礙其

道高年五液已衰。炎上之威莫制。脈現左細右搏。尤屬陰氣先傷。煩勞兼以

嗔怒。亦主七情動陽。從來內傷兼症。不與外感同法。苦辛劫燥胃津。陰液日

就枯槁。故仲景凡於老人虛體。必以甘藥調之。夫喘咳之來。凡咳多是肺

熱。若清肺熱。肺管更窒矣。以診脈面色論之。為下虛。正氣不主攝納。腎病何疑。即初起

熱。利。亦。是。陰。不。固。肝氣妄泄擬用復脈湯。此用復脈切。不

炙甘草 細生地 炒麥冬 生白芍 麻仁 蔗漿

溫邪兼勞倦。從內傷治。已獲小效。獨左脅痛難轉側。咳嗽氣觸必加閃

痛。前之方少。想因平素操持。肝陽易熾。營陰暗耗。非肝陽也。乃肝陰鬱結

日澆。額空。脹。愈澆。愈鬱。乾搶也。近日皆誤。以肝陰為肝陽。莫制。桑菊芥膽。凡

不飲食。勞倦所傷。中樞不運。則清陽內經以肝為將軍之官。謀慮出焉。故

身中左升之氣。屬肝主之。右降之氣。屬肺主之。今面微赤而咳頻。前此上焦

畏熱煩燥。其左升之令不已。右降之氣失司。已經洞悉。經以左右為陰陽之

道路。升降周行。一日夜行五十度。平旦交會於氣口。既為拂逆情志。而裏氣

鬱遏。冷熱外加。營衛因之窒阻。此陰陽道路流行。或遲或速。無平旦清明之

氣。是以發散消導清火利痰之品。昧於身中轉旋。有若天地也。再論平昔精

力頗健。今已大年。下焦先虛。夫下虛者。上必實。眩暈神昏。自利可見矣。以冬

令藏聚返根之候。見症若是。為忽然中厥亦屬常有。此亦痰閉若氣此投藥之難。自宜瞻前顧後。議用錢氏地黃湯意。栽培三陰臟陰。疎其三陽腑陽。俾臟主藏。府主通。佐以鹹降理逆。穀味有加。再為進商可也。

熟地 白芍 山藥 澤瀉 丹皮 茯苓 牡蠣 阿膠

山塘七十 立冬未冷。溫熱之氣外入。引動宿飲。始而狀如傷風。稀痰數

日。是眞新感繼則痰濃咽乾。是少陰脈中。乏津上承。五液盡化痰涎。皆因下虛。易

受冷熱。是以飲邪上泛。老年咳嗽。大要宜調脾腎。有外邪不最忌發散。泄肺

理嗽。暫用越婢法。可見不能照虛治

麻黃 石膏 甘草 芍藥 生薑 大棗

章 暴冷外加熱氣內鬱。肺窒不降。腕悶如饑。水飲欲嘔。頭痛寒熱。當

治上焦。案語簡切

桔梗 象貝 橘紅 兜鈴 北沙參 杏仁

吳風溫上受飲邪上泛臥枕則欬甚飲陰類也先以輕揚肅上再議理飲。

桔梗 兜鈴 米仁 茯苓 通草 象貝 急火煎服一次

又案 輕可去實。恰當上受風溫。但左脅引動而咳甚。經言左升太過。右降不及。然非肝木之有餘。雨水春木萌動氣升上衝。皆血液之少。不主配偶之義。

甜杏仁 玉竹 甘草 桃仁 炒麻仁

冬溫咳嗽。忽值暴冷。外寒內熱。引動宿痰。伏飲。夜臥氣沖欲坐。喉咽氣息有聲。宜煖護安居。從痰飲門越婢法。

麻黃 甘草 石膏 生薑 大棗 外寒內熱治法

王廷佑 寒包鬱熱亦屬溫邪。

桔梗 大力 連翹 蘇子 滑石 枳殼 赤芍 木通

溫邪有升無降。經腑氣機交逆。營衛失其常度。為寒熱。新是有感津液日耗。渴飲不饑。陽氣獨行。則頭痛面赤。是皆冬春驟煖。天地失藏。人身應之。患此者最多。攷古人治溫病。忌表散。誤投即謂劫津。忌直用表散也。辛甘涼。潤生津情熱仍從汗解。逆傳心包。最怕神昏譫語妄狂。是法以辛甘涼潤為主。蓋傷寒入足經。溫邪入手經也。上潤則肺降不致膈鬱。胃熱下移。知饑渴解矣。

嫩竹葉 桑葉 杏仁 蔗汁 麥冬 生甘草 石膏冰淨糖炒

陳 診脈左帶微數。右關微弦。胸脘痞悶。右眼角赤。皆是肝木乘坤土。經旨有腎藏志。脾藏意。今夢寐驚惕。是見不藏之象。倘調養失宜。內有七情之擾。外有六淫之侮。再經反覆。藥餌無過樹根草皮。焉能有濟。故重言以申其說。脈證皆痰氣固結之象。但燥痰是虛燥滯結。宜生津以滑之。不宜辛熱淡滲以燥之。

人參 半夏 枳實 茯苓 乾薑 小川連

第二案 六脈略和。舌胎已退。胸脘稍寬。渴飲至胃。微覺呆滯。大便乾

燥勢見陰枯陽結。通陽之中。佐以潤燥。亦屬至理。至於調養靜攝工夫。不必再贅。

柏子仁 茯苓 歸鬚 炒桃仁 塊苓 桂心 茯苓大礙通陽。下四方不離此味。只因腎燥便艱。何不選用甘滑辛潤。而必須鹹潤耶。

第三案立夏日診。脈氣和。病情減。清晨微覺氣悶。陽氣尙未全振。再論人身中陰陽二氣。每相眷顧。陽病久必傷陰。陰病久必傷陽。故病久之體。調養失慎。必至反覆。諄諄至囑。進苓桂朮甘湯。以宣上鬲之陽。

第四案 年過五旬。腎氣本弱。病纏日久。脾土亦餒。腎惡燥。脾惡溼。經旨昭昭。若欲平穩。宜乎分治為妥。是將來調補丸藥章旨。今上鬲已寬。且進下焦調補為法。

茯苓 歸身 杞子 茯神 小茴 柏仁 天冬 巴戟 牛膝 茯苓最傷心陽。最助脾溼。歷驗之矣。

第五案 病減六七。惟納食不易運化。飲湯不易下趨。口中味淡。時或作酸。大便燥艱。乃脾陽不振。腎陰未復。故潤劑之中。佐以辛香。有合經旨。辛

甘化風之意。

柏仁 小茴 菴蓉 車前 茯苓 牛膝 歸身 桂心

第六案 脈神俱安。大便艱澀不爽。臍間隱隱作痛。痰飲所結高年腎陰暗

虧。血液不能灌溉四旁。腸中枯燥。更衣頗覺費力。擬進通幽湯方法以潤之。

臍間隱痛。是痰凝是上。前臍潤藥所致。方中宜加桃仁山查。

歸鬚 紅花 郁李仁 柏仁 麻仁 生地 升麻

第七案 兩日連次更衣。臍間疼痛已止。去其臍潤反更衣矣。其理顯然。胸鬲之間略

覺不利。則知病纏日久。不獨血液受虧。氣分亦為之不振。擬溫填藥餌。佐以通陽。庶幾中下兩顧。

菴蓉 塊苓 杞子 小茴 柏仁 牛膝 人參 巴戟

范升九 四肢作冷。自利未已。目黃稍退。而神倦不語。溼邪內伏。足太陰之氣不運。經言脾竅在舌。邪滯竅必少靈。以致語言欲塞。法當分利。佐辛

香。以。默。運。坤。陽。是。太。陰。裏。症。治。法。是溼温治法。

生於朮 草果仁 厚樸 木瓜 茯苓 澤瀉

第二案 身體稍稍轉動。語蹇神呆。猶氣機未為靈轉。色脈非是有餘。而溼為陰邪。不徒偏寒偏熱已也。

生於朮 石菖蒲汁 鬱金 茯苓 遠志 米仁

第三案 溼滯於中氣。蒸於上。失降。不得寐。口起白疳。仍不渴飲。開上鬱。佐中運。利腸間。亦是宣通三焦也。

生於朮 寒水石 米仁 桔梗 廣皮 豬苓 澤瀉滲藥宜少用。不可祛之。起白疳者。熱之

結也。滲利太過。則津不上承。熱更亢而莫制矣。

第四案 溼勝。中宮不運。易生痰飲。不欲食。須使神機靈泛。少佐疎滯。

外臺茯苓飲去廣皮加 天竹黃 石菖蒲

第五案

人參 金斛 枳實 於朮 茯苓 廣皮

第六案 脾胃不醒。皆從前溼蒸之累。氣升痰咳。參藥緩進。

炒川貝 茯苓 地骨皮 米仁 鬱金 淡芩 陳范兩案。皆病溫也。一化燥。一兼溼。其瀰

虛寒體質。其病溫。必是冬不藏精。伏氣所成。方有入處。方有悟時。令溼溫而已。讀者須於此等處用心。

熱邪入裏。腕痞按之痛。脈浮滑者。此邪結陽分。擬仲景小陷胸湯。

川黃連 括婁實 半夏 杏仁 枳實

脈濡瀋數。至暮昏亂。身熱未盡。腹痛便黑。陽明蓄血。擬仲景桃仁承氣

以逐其邪。

桂枝木 大黃 甘草 芒硝 丹皮 桃仁

熱緩神昏。欬痰嘔逆。舌不能言。餘邪漸入心包絡。恐癰癧。進芳香入絡

法。熱緩而反神昏。正邪氣內陷之候也。不得以熱緩為病減。

萬氏牛黃丸

三才加磁硃金箔

又吸短欲躁。午後至更深爲甚。熱入陰中。子後清陽用事稍和。自云心中不舒。熱熏則楚。倣邪少虛多例用仲景復脈湯。

炙草 生芍 人參 生地 麥冬 麻仁 阿膠 雞子黃

邪灼膈中。神迷譫語。嘔痰。

牛黃丸 竹葉燈心湯化服

診脈左虛大。右濇小弱。症見短氣遺尿。目瞑肢掉。神識漸迷。渴不欲飲。侵早稍安。晡時煩躁。此乃積勞元傷。熱氣內迫。劫爍臟液。致內風欲擾。有瘞厥之慮。仲景謂元氣受傷致病。當與甘藥。就暑熱傷氣。亦屬發泄所致。東垣發明內傷。暑病益氣諸法。足爲炳據。若動攻表裏。是速其散越耳。

麥冬 生甘草 鮮蓮子 知母 竹葉心

先厥後熱。邪氣蘊伏亦久。從傳染而得。今脈數舌紅頭疼乾嘔。脘悶多

溫邪已入心營。神煩欲昏。質係陰虧。怕其液涸。不必以斑疹為慮。清神
 斯邪不結蔽矣。經云津液相成。神乃自生。故神藉津以養。

連翹心 石菖蒲 鮮生地 元參心 金銀花 天竹黃 至寶丹一粒暑喝門首案即此方以犀角易竹黃

舌音強縮。乾涸無津。邪氣已入膻中。神識昏蒙。積勞心血久虛。致熱竟
 入矣。診脈虛小無力。但補則熱閉。今晚以至寶丹三分涼開水調化。勻五六
 次銚服。

又 心氣久耗。營液暗傷。漸枯涸窒塞。小腸火腑失其變化傳導。洩溺
 欲痛。舌刺欲縮。色仍白晦。豈是血滯實火。當滋液以救燔燥。仍佐苦味以通
 火液。謂通火中之液也。究竟火液二字。道書云。心舍赤液。

鮮浙江生地 元參 竹捲心 人參 川連 菖蒲 百部 桔梗

又神氣消索。五液枯寂。此昏躁妄言。乃陰陽不肯交合。欲作脫象。不忍
 坐視。議三才湯以滋水源。參入磁硃以寧神志。

痰。皆是熱蒸營衛。慮其再厥。

羚羊 犀角 連翹心 川貝 元參 銀花 通草 鬱金

又方 連翹心 川貝 元參 銀花 通草 鬱金

又方 犀角 連翹心 川貝 通草 銀花 石菖蒲 金汁

又前方去通草加麥冬

又方 捲心竹葉 知母 生甘草 麥冬 花粉 川貝

又方 鮮佩蘭汁 麥冬 南花粉 棗仁 米仁 川貝 後四方無大分別。但輕重不同。前重心包。後重肺胃。前重開結。後重生

○津

溫熱後。肝陽乘胃。涎沫自出。胸滿如悶。咽中間或氣促。潮熱時作。四肢

微冷。慮其厥逆。進熄風和陽法。
脾為溼困中氣不靈。則木鬱。則橫而反侮。

淮小麥 炒半夏 甜杏仁 炒麥冬 南棗

又方 人參 麥冬 淮小麥 茯苓 南棗 炙甘草。
此方何能熄風和陽。且有病重藥輕之嫌。然方却有法可思。從藏燥甘棗小麥湯

來加減。

脈促神倦。目上視。咳痰欲喘。唇燥舌紅。溫邪發熱。半月外不解。所擬發散消導之藥。病不少減。正氣反傷。內風乘虛上擾。慮有瘳厥變幻。非輕小之恙。姑與甘緩法。

炒麥冬 北沙參 淮小麥 生甘草 南棗肉

脈虛細無力。熱止後。汗多心悸頭暈。寐多驚恐。舌紅。營陰受傷。理宜和陽存陰。

生地 麥冬 淮小麥 阿膠 人參 炒麻仁

舌縮。語音不出。呼吸似喘。二便不通。神迷如寐。此少陰腎液先虧。溫邪深陷。陰中癰瘰已見。厥陽內風上冒。本質素怯。邪伏殊甚。實為棘手。議護下焦之陰。清解溫熱之深藏。以冀萬一。
此病宜大劑。有生理。能將心陽氣提出。

陽分。便是裏證轉為表。

阿膠 鮮生地 元參 鮮石菖蒲 川黃連 童子小便前四味分兩宜重。再略加黨參細辛。提邪出陰。

病熱。汗出復熱而不少為身涼。此非痲瘧。狂言失志。經所謂陰陽交。卽是病也。交者液交於外。陽陷於內耳。此屬棘手症。

人參 生地 天冬

凡熱甚而厥。其邪必在陰分。古稱熱深厥深。病中遺泄。陰傷邪陷。發表攻裏。斷難施用。和正託邪。是為穩法。

草果 黃芩 知母 人參 炒半夏五更時服。方意可師。草菓能從陰透陽。半夏能通陰陽也。

寒熱雖減。腕中猶然不爽。非是食滯。乃氣結所致。尙宜開上中之痺。

川連 乾薑 淡芩 炒半夏 杏仁 白蔻 枳殼 桔梗用瀉心法。

熱久傷陰。津液不承。噎咳。舌紅罩黑。不饑不食。肌膚甲錯。渴飲不休。法

當滋救胃液以供肺。惟甘寒為宜。

麥冬 南花粉 白沙參 冬桑葉 蔗漿分兩要重。

留熱未清。營液已耗。但論清邪。恐神索氣奪。膩滯陰藥。防餘熱癰瘍。議理心之用。亦清補之意。

人參 麥冬 竹心 淮小麥

病體已虛。風溫再侵。喘嗽身熱。脘悶。小便不利。全是肺病。此症反覆太多。深慮病傷成勞。凡藥之苦味辛泄者。慎用。此太陽之經氣不充。以致外邪易入。方中宜兼用。撐法。

以振陽氣。不得一味清寒。恐有熱去寒起之虞。

青蔗汁 鮮枸杞根皮 玉竹 桑葉 北沙參 蜜炒知母 炒川貝

吳子純 連朝驟熱。必有暑氣內侵。頭熱目暝。吸短神迷。此正虛邪痺。清補兩難。先與益元散三四錢。用嫩竹葉心二錢。煎湯涼用。二三小盃。常用。菘豆清湯服。

第二案 溫邪中傷之後。脾胃不醒。不饑。口渴。議清養胃。津為穩。

鮮佩蘭葉 川斛 知母 大麥仁 炒麥冬

起自熱病。熱傷陰絡。血大瀉。自當宗血脫益氣之旨。今脈左大急疾。右
 小微弱。臍旁動氣。肌膚枯燥。陰分大耗。正當暑月。何以堪此。擬進九龍法。通
 補兼施。若得動稍減。病可平和矣。動氣。是絡中液燥而結。故也。生津以滑痰。化為燥痰。所
 養。氣行亦暢。而動息矣。

熟地炭 山查糖油 琥珀屑 新絳 沖入藕汁

脈細數。舌絳。煩渴。時熱病九日。邪氣稍衰。正氣已虧。不宜再作有餘治。
據脈證。乃邪陷膈中。大氣不能輪轉之象。案語無謂。

鮮生地 阿膠 元參 麥冬 知母 麻仁

時熱食復。胸痞。惡心欲嘔。進半夏瀉心法。

炒半夏 川連太苦 枳實 杏仁 薑汁 厚樸 草薢大燥 烈食復最宜。顧胃氣。且既有食矣。只
降氣分。古用承氣湯。即嫌太峻。亦宜略仿其例。

又方 人參 山查 枳實 乾薑 薑汁炒半夏

風溫化熱。上鬱肺氣。咽喉阻塞。胸脘不通。故呻吟呼吸不爽。上下交阻。逆而爲厥。乃閉塞之甚。病在上焦。幼科消食發散。表裏混治。久延必致慢驚。莫救。

蘆根 飛滑石 川通草 甜水梨皮 桑葉

冬溫失藏。稚年陰虧陽亢。三陰之陽。當夜分升騰。煩躁上熱不寧。晝則安康人健。宜用六味磁石方法。

生六味加磁石辰砂夜煩晝寧。陰火上冲。方法最合。

暑 暍

初病伏暑。傷於氣分。潮熱渴飲。邪犯肺也。失治邪張。逆走膈中。遂至舌縮。小便忽閉。鼻煤裂血。耳聾。神呆昏亂。邪熱蔓延血分。已經入絡。津液被劫。必漸昏寐。所謂內閉外脫。

連翹 銀花 石菖蒲 犀角 鮮生地 元參 至寶丹一粒

脈洪大。煩渴汗出。陽明中喝。的係白虎湯候也。

石膏 甘草 麥冬 知母 粳米

脈濡。懶倦。多汗。口渴。體氣素薄。炎暑燦金。當益氣。保水之源。

麥冬 人參 知母 五味子

夏月感冒。頭重壯熱。無汗煩渴。伏暑新涼外束。治以辛香開表。

陳香薷 新會皮 厚樸 藿香 甘草 知母

脈濡數。中暑。暑為陽邪。晝屬陽分。故張其勢而煩渴。夜靜屬陰。邪逼於

內。則多言嚙語。經云。煩則喘渴。靜則多言。皆由體虛邪甚致此。經謂暑傷氣。原屬虛

證。未敢以凝寒苦清。侵伐元氣。

絲瓜葉三片 金石斛三錢 白知母四錢 飛滑石一錢 水煎濾清候冷冲入西瓜汁一大茶杯

暑熱未盡。清竅不利。自言神識如迷。夜不成寐。

竹葉 元參 連翹心 菖蒲 鬱金 川貝

寒熱漸除。間一日復來。卽暑邪入裏之徵。因正氣不振故也。但煩渴不減。舌胎黃厚。胃中滯濁。猶然不清。河間方法。正宜此證。非是鈔竊舊方。乃去邪務盡之意。方失當是涼膈散。

暑風入肺。咳痰發熱。四肢無力。微冷。氣喘。神倦。恐邪犯心包。有慢脾驚搖之慮。擬進局方至寶丹。芳香逐暑。使喘緩神安。再商進和脾胃藥。

又案。有汗出。熱緩。神識昏憤。邪熱內閉。未得外越。易變癎厥。進芳香開閉。以逐穢邪。牛黃丸。

又方 生地 甘草 知貝 淡竹葉 滑石 銀花

又方 人參 生草 知母 南棗肉 麥冬 茯神 廣皮

舌心黃邊白。渴飲水漿。停胃脘。欲吐。微微冷呃。自利稀水。見敗證小便不利。診脈堅勁不和。敗象此真陽之敗也八旬又二。暑熱溼邪內著。必脾胃氣甦。始可磨耐。以尊年不敢過用清消矣。議用清暑益氣方。

人參 茯苓 廣皮 豬苓 石蓮子 川連 黃芩 厚樸 澤瀉 煨葛根

脾胃久虛不復。泄瀉嘔逆不欲食。喘促腹膨。煩渴無寐。是虛中挾暑。最慮慢驚。宜和補中土。兼清暑熱。必得嘔止瀉緩。寢食得宜。庶不致變。

人參 廣皮 木瓜 大腹皮 川連 泡薑 烏梅 茯神

脈弦。嘔吐。心中懊懣。不納水穀。條冷忽熱。雖因嗔怒七情。兼有客邪。

伏氣。汗多不宜表散。清暑和中為正治。全是肝邪犯胃見證

杏仁 半夏 鬱金 茯苓 廣皮 枳實 金斛

今年七月秋暑未除。初病頭痛身熱。是暑由上竅。傷及清陽。醫藥當辛涼取氣。同氣相求。中上之輕邪自散。無如辛溫苦寒清滋之類。雜然竝投。水穀內蒸。氤氳不解。見症仍在身半以上。軀殼之間。非關臟腑大病。能蔬食十日。可解上焦之鬱。

川芎 薄荷 芥炭 炒白芷 蔓荊子 菊花蒂 元茶三錢煎湯代水

溼溫

附痘

陽明溼熱。痞結心下。擬苦降辛泄。則邪自解耳。胃中溼熱上蒸。故曰溼熱明。

泡乾薑 半夏 桔梗 杏仁 川連 厚樸 枳實 豆豉 至寶丹

長夏外受暑溼。與水穀之氣相併。氣阻蒸迫。上焦不行。下脘不通。不嗜飲食。目黃舌白。邪結氣分。

杏仁 厚樸 茯苓 薏仁 炒半夏 薑汁

脈緩身痛。汗出熱解復熱。此水穀之氣。與溼併阻於氣分。鬱而成熱。治宜利溼。宣通氣分。溼去熱自解矣。徒進清熱不應。

飛滑石 腹皮 茯苓皮 白薏仁 豬苓 通草 淡黃芩

舌白。渴不欲飲。嘔有痰。口味皆變。頭中空痛。兩頰赤。此水穀溼熱氣併。鬱蒸腸胃。致清濁變混。忽然煩燥。難鳴苦況。法當苦寒泄熱。辛香流氣。滲泄利溼。無形之溼熱去。有形之積滯自通。亦宜兼顧

淡黃芩 野鬱金 川連 秦皮 白蔻 通草 豬苓 厚樸

徐方鶴 脈緩。舌白帶灰黑色。心中煩熱。汗多。渴飲。嘈雜如饑。肛中氣墜。如欲大便。平昔苦於脫肛。病雖挾溼熱。寒涼清溼熱之藥味難投。擬進和中法。

炒麥冬 粳米 川斛 半夏 南棗

徐 左脈數。舌白日黃。偏身發黃。左腰脅間痺痛。臥則氣逆。或噯氣。或咳噲。則痛不可忍。溼熱着於絡中。氣機阻遏。不宣。況時邪一九日。正邪勢方張之候。經云無治其盛故攻病藥餌。往往難投。輕藥為穩。

豆卷 白蔻 通草 茵陳 米仁 杏仁 豬苓 澤瀉

雨溼地蒸。潮穢經旬。人在氣交之中。口鼻吸受。從上內侵。頭脹腕悶。肉刺骨痛。蓋肺位最高。其氣主周身貫串。既被溼阻。氣不運通。溼甚生熱。汗出熱緩。少間再熱。凡風寒得汗解。溼邪不從汗解耳。仲景云。溼家不可發汗。汗

之則溼。謂溼本陰晦之邪。其傷必先及陽。故汗下清熱消導。與溼邪不相干涉也。溼也熱也。皆氣也。能蒙蔽周身之氣。原無有形質可攻。由上不為清理。

漫延中下二焦。非比傷寒六經自表傳裏相同。河間暢發此義。專以三焦宣通為法。明張司農亦以苦辛寒主治。總以氣分流利為主。氣通則溼解矣。今

兩旬不愈。入暮昏厥。厥者逆亂之稱。以邪深入至陰之中。熱蒸上冒。致神明為邪所蒙蔽矣。初溼邪下注。而大便為溏。今則氣窒結閉。而大便不通。陽初則

能運溼下出繼則氣困難運也古稱熱深厥深。又云厥少熱多則病退。厥多熱少則病進。凡

厥多隸厥陰也。案中論溼邪禁汗。却不盡然。但以汗之有法。如傷寒中風。中時時汗出。衛氣不諧。以桂枝復汗則愈。是有正

汗邪汗之分。暑溼氣虛。宜益氣。俱不得徑行發散。敢如水淋漓。宜溫中。暑溼氣虛。宜益氣。俱不得徑行發散。敢如水淋漓。

掘地坎三五尺。全無瓦礫。方是真土。入新汲井水。用木棍淘二三百下。取泥漿水。澄清二盞。另以菉豆

皮野赤豆皮馬料豆皮各五錢入地漿水中。煎湯一茶杯許。候溫。入珍珠細粉約七八分。冰片半釐。勻

三次服。

再論暑溼客氣。由上受以行中道。未按經法。致三焦否塞。逆亂為厥。厥

屬邪深在陰。故取地漿重陰之氣。珠潛水底。鹹寒少佐。冰片辛熱。能開熱痺。直走至陰。以冀厥止。究竟暑溼熱氣。乃無質之邪。瀰漫胸臆。如烟霧繚繞。諸宗氣營氣。無以展舒。焉有知味知饑。彼攻消峻尅。能滌有質之邪滯。非溼結氣分之治也。昔軒岐云。從上病者治其上。且上焦如霧。藉輕揚可以去實。半月不更衣。斷勿攻下。皆氣窒使然。天溼上受。溼下受。其證兼寒。中霧露之氣也。地

川貝 米仁 兜鈴 白蔻 連翹 射干 通草

舌紅微渴。齒痛味甘。中宮不運。氣鬱之熱。未得全去也。

連翹 米仁 茯苓皮 赤豆皮 川貝 白蔻

潘毓翁 中年衝氣。痰升喘急。隨發隨止。必是外邪內陷。入在肺胃。從肝腎本病治。

固是。未必地黃飲子用意。在濁藥輕投。勿以味厚凝滯痰氣。但以質能引導

至下。變飲為丸。純是濁藥柔溫。若歸脾湯甘溫守中。養脾之營。更與痰飲衝

逆相背。自七月間反覆。必有暑溼客氣。從呼吸而受。據述肌膚間發丹疹。浮腫甚速。腠膜映紅。相風搏熱顯痰飲若但內證未必有此。是極思夏秋口鼻受氣。上

焦先傷。與肝腎本病兩途。上焦失解。理必延漫中下。而三焦皆為病藪矣。此

脹在乎脈絡。不在腑腸。本可見非水穀無礙者。緣此。況久病大虛。溫補不受。可更

見非本病必當推其至理。是極伏邪引動宿病。破語的語仲景論必先理其邪。是極且口渴

便實。豈溫熱相宜。自言懷抱鬱結。相火內寄肝膽。如莖腫囊縱。溼壅水漬。勉

以三焦氣分宣通方。仿古二虛一實。偏治其實。開其一面也。此久風人在痰喘必與

胃中痰飲相結。非肝腎虛也。即令久病見虛。所謂伏邪引動而宿病者不同。況舊病未除。新邪又受。豈可作虛治之。

飛滑石 杏仁 茯苓皮 厚樸 豬苓 通草 白蔻仁 此與第二案方同

舌微黃。口微酸苦。脘中微悶。議用溫胆法。合四逆散。

竹茹 生白芍 炒半夏 川連 淡芩 枳實汁 桔梗

目黃舌刺色赤。伏邪餘熱未盡。

鮮生地 麥冬 川斛 蔗汁 竹葉心 花粉 鮮地骨皮 梨汁

不饑。不欲納食。仍能步趨。長夏溼蒸。著於氣分。陽逆則頭中脹悶。肌色

萎黃。與宣氣方法。頭中脹悶。非陽逆也。濁氣僭居陽位。所謂

西瓜翠衣 飛滑石 米仁 蘆根 通草 鬱金

脈緩。舌色灰黃。頭疼。周身掣痛。發熱不止。乃時疫溼溫之證。最忌辛溫

重藥。擬進滲溼之法。身痛總是兼寒。不得概禁

竹心 連翹心 厚樸 木通 杏仁 飛滑石 茵陳 豬苓 厚樸木通。一破氣。一耗津。總宜慎用。

脈左數右緩。舌白。發熱自汗。小溲溺痛。身半以上。皮膚骨節掣痛。皆是

溼邪阻痺。慮其清竅蒙蔽。有神昏厥逆變幻。擬用輕清滲溼方。溼脈多數。緩左

數右緩者。左主上焦。右主中焦。溼邪先據。風氣外加。故見此脈。且發熱自汗諸證。風象顯然。

連翹 豆卷 米仁 絲瓜葉 花粉 茵陳 通草 杏仁 飛滑石 風溼不宜此類諸藥。讀金匱便知。

脈細。舌灰白。渴不能多飲。膨悶不知饑。溼溫半月有餘。病邪雖解。餘溼未盡。良由中宮陽氣鬱遏。失宣暢機關。故舌喜得香味。理宜護持胃陽。佐以宣濁驅溼。未可再作有餘攻伐。雖取快一時。貽禍非輕小也。凡溼兼寒兼鬱者。脈皆細。

金匱謂之溼痺。

半夏 人參 厚樸 橘紅 枳實 茯苓

脈轉數。舌紅。面腫消。膚痛。汗減。耳鳴。咽噎。肛痔。溼中化熱乘竅。仍清氣邪。佐通營衛。桂枝白虎湯主之。面腫曰風。或腫消則風氣已退。似可不須桂枝。或藉以引入榮分邪。

酒家溼勝於內。暑邪穢氣亦由口鼻而入。內外相因。延蔓三焦。汗多寒熱不解。非風寒從表而散。頭脹腕悶。嘔惡而渴不多飲。兩足反冷。是熱在溼中而來。古稱溼上甚為熱。不與傷寒同論。

杏仁 半夏 茵陳汗多不用 白蔻酒家亦忌太辛温燥 厚樸 廣皮 茯苓皮 六一散 鮮菖蒲

舌白。肢厥。語錯。丹疹背多胸少。汗大出。此溼邪著於氣分。邪鬱氣痺。故

現外寒非虛脫也。生地阿膠滋清涼血。則氣溼愈阻。此屬邪鬱。不但分三焦更須明在氣在血。

羚羊角 天竹黃 射干瀉肺陷 疹大忌 川貝 米仁 茯苓 石菖蒲

素有濁陰上干之症。近因溼氣淫蒸。新舊合而為一。此病最多近皆呼壯熱吐苦水。噦上逆。舌色微白。脈小弦。木氣欲升而復為溼遏之象也。當用苦辛以劫溼邪為主。即仲景先治新後治痼之意也。

川連 泡薑 炒厚樸 半夏 塊苓

即進一劑。噦少緩。可用黃連溫膽湯一二盞。

邪熱盤踞陽明。體虛不耐重劑。宜用苦辛通泄為主。

連翹 杏仁 生香附 橘紅 滑石 鮮荷葉 通草 銀花

又方 米仁 連喬 銀花 橘紅 通草 青荷梗

脈弦緩。面目肌膚皆黃。舌白滑膩。胸脘膈間脹閉。病名溼溫。由瀕海潮

溼氣入口鼻。至募原。分布三焦。此為外因。暢達極仍食水穀腥物。與外入穢濁之邪。兩相交混。溼甚。熱鬱。三焦隧道氣血不通。遂變黃色。發汗不愈者。溼家本有汗也。清熱消導不愈者。熱從溼中而起。溼不去則熱不除也。夫溼邪無形質。攻滯乃有形治法。其不效宜矣。昔河間治溼熱。必取乎苦辛氣寒。蓋苦降以逐溼。辛香以祛穢。寒取乎氣藉。氣行不閉。寒於內也。當世醫者混以傷寒表裏為治。殊不知穢溼氣入口鼻。游走三焦。不與傷寒同治。

綿茵陳 白豆蔻 厚樸 川通草 廣皮白 茯苓皮 半夏麴 塊滑石

溼濁內蒸。瘀熱發黃。三焦壅遏。濁氣迷漫。又非有形質滯。此辛香逐穢宣通。是一定法。日期既多。恐濁閉神昏。另以銀花湯化至寶丹二粒。

綿茵陳 白豆蔻 茯苓皮 厚樸 煨草果 滑石 杏仁 木通 鮮菖蒲根汁

復診

綿茵陳 厚樸 江枳實 草果仁 細木通 黑山梔 雲茯苓 黃柏

痰滯得穢濁膠結。溼中熱起。蒸變發黃。腕中痞悶。病在氣分。兩進消導理氣。面目黃色略減。而痞結如故。議與治疸疎滯。兼以蘇合香丸逐穢為法。

茵陳 草果仁 枳實 厚樸 廣皮 木通 暮服蘇合香丸一九三服

復診

生白朮 茯苓塊 茵陳 豬苓 厚樸 滑石 澤瀉

望色萎瘁晦黯。聞聲呼吸不利。語音若在囊中。診脈右緩左急。問初病忽熱忽溫。頭中如裹。腰痛欲拊捫。此證獨重神識呆鈍。昏昏欲寐。肢節痠痠。咳痰映紅。溺洩短縮。便溏帶血。不饑不渴。環口微腫。脣乾不紅。舌白糜腐。此水穀酒腥溼熱相併鬱蒸。阻撓清氣之游行。致周身氣機皆令痺塞。夫熱邪溼邪皆氣也。由募原分布三焦。營衛不主循環。升降清濁失司。邪屬無形。先著氣分。時師橫議表邪宜汗。裏滯宜消。見熱投涼。殊不知熱由溼鬱。氣行熱走。仲景於瘧喝從溼化。忌汗忌下。明示後人。勿傷陰陽耳。但無形之邪。久延必致

有。形。由。氣。入。血。一。定。理。也。據。色。脈。症。參。之。末。見。或。可。採。用。觀前列諸證。家受傷頗重。蓋肝

房室不節所致。證頗難愈。恐非下方所能效。

羚羊角 茵陳 銀花 連翹 通草 大腹皮 茯苓皮 豬苓 澤瀉 至寶丹

脈浮緩。身熱不止。汗出不衰。此風溼鬱表。瘀熱為黃。擬麻黃連翹赤小

豆湯。麻黃汗多者忌以其迅也。東垣勝溼用羌活。不必泥古。

杏仁 生梓白皮 生薑 連翹 細赤豆 甘草 大棗 天雨水煎

面目悉黃。微見黑滯。煩渴腹滿。左脈弦數。右脈空大。此內傷發黃。為厥

陰肝木太陰脾土二臟交傷之候也。夫肝為風藏。其性喜伸而惡屈。鬱則木不得伸而屈矣。鬱極則其氣盛而風乃發。風發必挾其勢以賊脾。脾為溼土之司。土受剋而氣不行。則溼勝矣。風性雖善行。遇溼以留之。反壅滯經絡而不解。由是溼停熱瘀。而煩渴有加。其發黃也必矣。雖曰風溼所致。實由木亢而不寧。土困而不舒。非外來風溼之比。況黑色見於面。則知并傷其腎。以脾

病不行。胃中穀氣入腎反將脾中濁氣下流。故於黃中見黑滯耳。

脾滯熱入腎則流

然陽氣不伸而色亦黯

即其腹滿。亦是中氣不行。虛熱內壅。非結熱當下之比。若誤下

之。則藏氣空虛。風從内生矣。若誤汗之。則陽氣外解。溼愈不能行矣。為商治

法。平肝之亢。扶土之虛。兼解鬱熱以清氣道。除溼蒸而和中氣。

此案不似先生手筆

人參 白朮 白芍 黃連 山梔 歸身 丹皮 茵陳 秦艽 柴胡 甘草 半麴

東山

十六

血痺氣滯。腹中不和。而大便燥。夏季以柔和辛潤。交霜降土旺

之運。連次腹痛目皆變黃。此非黃疸。是溼熱瘀留阻壅乃爾。

病證只是脾滯。恐其本由於

腎水不足。

炒桃仁 郁李仁 菟蔚子 冬葵子 菠薐菜

暑溼乃夏秋時令之病。其邪先着氣分。氤氳蒙昧。有形無質。醫投攻奪。

乃有形治法。氣傷陽損。至今肢冷溇泄。何一非陽微腫脹之徵。此宜溫補下

中。莫治眼前。

人參 白朮 木瓜 淡附子 益智仁 炒廣皮 厚樸

淮海水鹹土潮。水土異氣。自口鼻受入。必聚募原。溼邪久鬱化熱。陽明絡損。血溢咳嗽。視目黃面亮。顯然溼熱變痰。況病已數年。若是陰虛。必不能延久至今也。從溼熱例治。

杏仁 厚樸 米仁 赤茯苓 塊滑石 綿茵陳

今年二三月久雨陰晦。入山行走。必有瘴氣。溼邪著於脾胃。腹中脹閉。溇瀉挾積。溺赤不爽。目眦肌肉悉黃。夫溼為陰邪。鬱久必熱。熱自溼中而出。當以溼為本治。

生茅朮 炒厚樸 豬苓 草豆蔻 新會皮 綿茵陳 澤瀉 茯苓皮 木香汁磨入

秋深曾診。擬議此病為裏溼。更傷瓜果。辛甘寒分利脾陽。又受辛寒之累。致濁氣聚形。頻遭食復。陽屢被戕。凡身中脾陽宜動。動則運。腎陰宜藏。藏則固。斯為病根。局方大健脾丸。仲淳資生丸。多以補虛通滯。芳香合用者。取

其氣通濁洩。人參補正之力得矣。

人參 茯苓 益智仁 煨木香 厚樸 新會皮

脈大弦緩。目黃。納食後中脘滯痛。腹鳴泄瀉。夏病至深冬未安。緣瀕海潮溼久蒸。兼以懷抱少暢。脾胃之陽日困。所受水穀之氣少運。清濁升降失度。外因六氣未去。留連脾胃內傷。法當辛香調氣醒中。陽氣流行。溼鬱可祛。腥羶重味宜忌。

煎方

杜藿香 煨木香 生茅朮 草果 陳皮 生香附汁 茯苓 厚樸服十劑少加桃仁山查炭降香更好。陳皮厚樸微燉傷

氣。久病慎用。

丸方

生於朮 人參 益智仁 生茅朮 砂仁 茯苓 小青皮 厚樸 新會皮

脈微弱而細。鼻準獨明。晝日形冷汗泄。不饑少納。脘腹常痞。泄氣自舒。

此陽氣失護衛而寒慄汗出。陽失鼓運而脾胃氣鈍。前進養營。亦主中宮。想因血藥柔。栗陽不驟。甦初進。甚投。接用。則力疲矣。詢其不喜飲湯。舌頗明潤。非邪結客熱之比。議用理中湯法。崑以脾胃陽氣是理。不獨治病。兼可轉運。日前之藥。旨妙昔賢以瘧稱謂脾寒。重培生陽。使中州默運。實治法之要旨。

人參 生芍 熟朮 附子 茯苓 乾薑

身重。汗出。疼痛。脈浮緩。此風溼相搏於太陽之表。陽虛邪客。當通營衛以固表。擬桂枝附子湯。

製川附 桂枝 甘草 生薑 大棗

夏月足跗肌浮。是地氣著人之溼。傷在太陰陽明。初病失血。繼而嘔涎拒食。此脾胃溼傷。漫延乃爾。

五苓散去澤瀉加 益智 厚樸 滑石 陳皮

時疫

臭穢觸入。游行中道。募原先受。分布三焦上下。頭脹腕悶。洞泄以芳香逐穢法。

藿香梗 生香附 茯苓皮 白豆蔻 飛滑石 炒厚樸 新會皮

此吸受穢濁。募原先病。嘔逆邪氣分布。營衛熱蒸。頭脹身痛。經旬。至神識昏迷。小溲不通。上中下三焦交病。舌白。渴不多飲。仍是氣分窒塞。當以芳香通神。淡滲宣竅。俾穢濁氣由此分消耳。

通草 猪苓 茯苓皮 米仁 淡竹葉 腹皮 至寶丹

穢濁不正之氣。擾中。痞悶惡心。頭疼煩渴。形寒內熱。邪不在表。未可發散。

杏仁 萹皮 滑石 通草 白蔻 鬱金 花粉 連翹

目赤脣焦。齒燥舌黑。嬉笑錯語。發曦發斑。溫毒遏伏之象。

藜豆殼 銀花露 方諸水 犀角 川貝母 人中黃 蘆根汁 徐徐溫服

又方

金汁拌浸人參 銀花露 鮮菖蒲 元參 鮮生地 羚羊角 真金箔

時疫發熱。腕悶惡心。斑發不爽。神煩無寐。舌色轉紅。邪熱將入營分。雖

胃滯未清。亦宜先清營熱。勿得滋膩為穩。觀證。凡熱由氣分。蒸入心包。便是

治。由血分壞及心包者難治。所以先清營熱為急。先生真有識力。

鮮竹心 元參 連翹心 鮮菖蒲 銀花 川貝

陰液損傷。陽氣上冒。衄血欬痰。理宜和陽存陰。冀津液稍復。望其轉關。至於疎滯解表。和表諸法。自然另有高見。非敢參末議也。

秋石拌人參 阿膠 鮮生地 麥冬

脈奕。咳痰欲嘔。饑時甚。雖是時邪未清。高年正虛。理宜養胃陰。金匱麥

冬湯。

麥冬 人參 半夏 甘草 粳米 大棗

胃津既傷。肝風上擾。神迷肢震。面浮欲喘。病勢危險。勉擬救胃陰方。
人參 麥冬 生甘草 白粳米 炒半夏 南棗

時疫六日不解。頭疼發熱。舌絳煩渴。少腹痛劇。已經心包。慮其厥瘵。

犀角 連翹心 銀花 元參 通草 鮮生地

又方

犀角 鮮生地 元參 麥冬 川貝

傷寒 中寒

高年氣血皆虛。新涼上受。經絡不和。腦後筋掣牽痛。陰氣安靜。乃陽風之邪。議用清散輕劑。

新荷葉 青菊葉 連翹殼 藁本 苦丁茶

口苦惡熱。腹滿虛煩。汗出。此陽明證也。內經云。邪中於面則入於膺。而

未全歸腑。故有是證。擬仲景梔子厚樸湯。

內經云。邪在口苦。證在膽。故陽明有口苦。證在

香鼓 梔子 厚樸 連翹 枳殼

胃。 三益號 勞倦。吸入冷氣。營衛不行。則形寒戰慄。今中焦未醒。宜和脾

當歸 白芍 桂枝 炙草 大棗 煨薑 何以加當歸若因勞倦。何不加參朮凡小勞傷氣。在脾肺。大勞傷筋乃及肝腎。

凡三陽證。邪未入裏歸腑。尚在散漫之時。用承氣湯誤下之。則熱不解而不利。神虛妄言見矣。擬苦清以通腑氣。仍用葛根解肌開表。斯成表裏兩解之法耳。

葛根 黃芩 黃連 甘草 此熱內陷。欲成痞。而表仍未解也。舒氏注傷寒論疑之。淺矣。或變承氣。傷氣者。為結胸痞氣。更有下利不止。脈微欲絕者。各因其逆而救之。若津氣俱未傷。仍從本病治。

脈微。下利。厥逆。煩躁。面赤戴陽。顯然少陰證。格陽於上也。用白通去豬膽汁。以膽汁亦損真陽也。

泡生附子 乾薑 葱白 煎好沖入人尿一杯

脈沉微。下利。嘔逆。身痛。四肢厥冷。少陰中寒。應四逆湯急救其裏。

生泡附子 乾薑 炙甘草

脈沈微。腹痛。吐利。汗出。太陰寒傷。擬冷香飲子。

泡淡附子 草果仁 新會皮 甘草 煎好候冷服

瓜果水寒。暴涼迅風。內外兩因。舌白。渴不能飲。腕中脹滿。煩不肯寐。身無熱。頭不疼微嘔。此足太陰中寒。已經冷汗肢厥脈弱濡伏。醫猶以疲敵方藥。正如隔靴搔癢矣。

生草果 生於朮 藿梗 淡乾薑 厚樸 丁香柄

燥

中氣素虛。形寒飲冷。遏伏暑溼之火。蘊於臆中。劫津耗液。盡從燥化。

燥化 肺氣不能下。輸腸胃燥滿不行。下之遂逼血下行。血既下奪。亦云竭矣。陰

不配陽。汗從外泄。即為上厥。上厥下竭。肺經獨受燥累。急進清燥救肺湯以

回陰液。

則傷寒論有當汗不汗則致衄之條。是血上行也。而肺氣不轉。此案因誤下致。

內下熱無泄。以肝血沸騰而溢下也。方中清肺。必兼涼肝。葵。有再透汗以外。止血之論。迅不傷血。靈胎所斥。而實有妙旨。此等汗法。惟麻黃。最宜。惜世無知之者。

枇杷葉 人參 麥冬 桑葉 阿膠 杏仁 生石膏 竹葉

繼進方

羚羊角 棗仁 茯神 山梔皮 黑豆皮 枇杷葉 麥冬 蔗汁 鮮菖蒲

再進方

小生地 人參 阿膠 茯苓 黑豆皮 枇杷葉 青蒿 麻仁 麥冬

脈來和靜。舌胎已退。但時或煩熱。胸中未適。此皆燥邪未盡之徵。是以神識尚未全復。究竟必以滋燥為先。

阿膠 枇杷葉 麥冬 川斛 山梔 北沙參 茯神 菖蒲

邪脈悉退。微遲和緩。用平調營衛。胃氣自復。復脈湯主之。

人參 麥冬 炎草 阿膠 茯神 白芍 麻仁 五味 炒生地

肺家留熱。頻年噲發。據說痘後有此。長夏諸陽升騰。而霉天反燥。當清肺之急迫。潤肺之燥烈。也。恐當有伏風。非留熱也。久風能化燥熱。

清阿膠 枯黃芩 南花粉 地骨皮 菘豆皮

久熱。五液全耗。陰傷非謬。頻渴安受梨蔗。晡起寒熱條然而至。驗及舌色絳赤。顯然由臟絡之空隙。致陰弗交戀其陽。按經義從下交合。難見速功。肝腎病必累及躄維所致。

人參 知母 麋角膠 元武版

用白虎法。渴煩少減。略饑必形神奕倦。津液既遭熱迫。陽明脈絡自悞。當以清燥法。清氣熱以涵液。

人參 麥冬 知母 石膏 生地 阿膠 甘草

上燥治氣。下燥治血。此為定論。今陽明胃汁之虛。因久痛嘔逆。投以香

燥破氣。津液劫傷。胃氣不主下行。腸中傳送開閣。皆失其職司。經云六腑以通為補。豈徒理燥而已。仍議清補胃陰為法。

鮮生地 甜梨肉 天冬肉 人參 生白蜜

脈虛數。喉乾舌燥欲咳。乃陰虧於下。燥燥於上。非客病也。

生地 熟地 天冬 麥冬 扁豆

眩暈

陽微陰聚。致濁氣蒙蔽清神。苓桂不應。議用大半夏湯合附子粳米湯法。

半夏 人參 白蜜 附子 白粳米

壯年形體充壯。時見眩暈。目淚暗出。前議脈濡。大便久澹。用白朮益土。桑葉泄木。入冬尻骨跟痛耳鳴。皆下少攝納。當固其下虛。不致內風自動。

九蒸首烏 補骨脂 炒黃甘菊 兔絲子 鱈魚膠 蒺藜 枸杞子 膠汁搗丸

頭中清竅痺窒。耳閉風火挾陽上升。味變酸濁。酸昏明是火化。火鬱發之。

治從經旨。以茶調散一錢。臥時用真苦丁茶一錢五分。煎汁調服。俾上竅內

膜無阻。冀有小效。

藁本 辛夷 蒼耳子 蔓荊子 川芎 菊花 苦丁茶爲末

茹素胃弱。向係肝陽熱熾。今微眩耳鳴心怔。議甘以養胃緩熱。少佐酸

味。甘酸是治虛陽上胃定法。

酸棗仁 柏子仁 炙甘草 鮮白藕汁 大生地 甜細真 北沙參 大麥冬 茯苓

萸肉炭

肝氣上巔。頭旋耳鳴。麻痺。足寒微嘔。便瀉經阻。三年久病。治從血絡中

法。此厥陽上逆。不能順降。亦不能旁通也。治宜潛陽。仍宜助陽氣旁達。從血絡治。原不甚錯。但方味不合。仍

茺蔚子 柏子仁 枸杞子 料豆皮 製首烏 甘菊此豈通絡之劑。不但不能鼓舞旁通。亦并不能降納。

類中風

精血五液衰奪。陽化內風。上巔則眩暈欲厥。乘絡則四末痠痺。老年有此。斷非攻邪可却。古方侯氏黑散。取乎培實孔竅者緣此。

熟地 杞子 藕汁 河車膠 紫石英 甘菊炭 茯苓 人乳粉 熬膏下用蜜

肝風不熄。都因天熱氣泄。高年五液皆少。不主涵木。身中衛陽亦少。擁護。遂致麻木不仁。丹溪所云麻屬氣虛。血少便艱也。苟非培養元氣。徒以痰火風爲事。根本先怯。適令召風矣。議用三才湯。合桑麻。滋肝養血熄風治法。

雖以生津補水爲重。亦宜略加鼓舞衛陽之品。

天冬 地黃 人參 胡麻 桑葉 首烏生用

奔走煩勞。暴熱上蒸。致身中陽氣不交於陰。四肢麻木。內風屬陽之化。左屬肝。肝性剛。柔劑爲宜。若用酒藥。益助其動陽。是矛盾矣。

生地 天冬 白藕汁 沙蒺藜 桑寄生 女貞子 炒枸杞 川石斛

心悸如饑。頭暈肢麻。此乃內起肝風。汗多淋漓。氣弱陽洩。近日肌浮腹

大。木傳土也。做丹溪養金制木使脾少賊邪之害。

阿膠 天冬 生白芍 細生地 麥冬 明天麻 菊花炭

口齒骨節不開。咽喉痰壅。溺阻。肌浮。是皆氣分閉塞。經言諸氣臏鬱。皆屬於肺。肺象空懸。凡重劑竟走腸胃。故久治不效。

麻黃 杏仁 滑石 牛蒡子 馬兜鈴 生甘草 射干 馬勃

楓橋二十四此肝病也。肝屬木主筋。木藏內寄風火。情志不適。熱自內起。爍筋襲脈。肢體爲之牽強不舒。惟怡悅靜養可希漸愈。藥無除根之理。

何首烏 枸杞子 桑寄生 當歸身 杜仲 沙苑蒺藜

脈左大右濡。肝風震動。陽明脈空。舌強肢呆。是屬中絡。議用緩肝熄風。

大而濡。是類中常脈。水。木亢。火盛。土衰之候。

連翹 丹參 元參 茯神 細生地 羚羊角

交冬宜藏。老年下虛。二氣少續。忽然右換。舌痞。面亮戴陽。呵欠吸氣短。

欲噲。此非外來客邪。皆根本先怯。平昔眩暈。肝臟虛風顯然。水不生木。坎中真陽內寓。必溫理其下。凡陽主乎通。陰主乎攝。扶過七日。少陽主氣再振。望其偏廢延永。倘攻風劫痰之治。非本氣自病法則。

人參 熟附 遠志 茯神 鮮菖蒲搗汁沖

右換。舌痞足痺。頭岑面戴陽呵欠。微呃。診脈小濡而緩。此腎納失司。肝風震突。但病起耳後暴腫。少陽有邪必兼溫熱客氣。清上輕揚。腫勢頗減。七日以來。當陰陽經氣一小周天。不必以時邪引病為惑。昔河間宣明方論中。謂舌強難言。其咎在乎舌下筋脈不主流動。以腎脈繫及舌本耳。其主地黃飲子。取意濁藥清投。機關漸靈。并無礙乎上氣痰熱。倣此法。

熟地 肉蓯蓉淡漂 遠志炒 川石斛 茯神 枸杞子 牛膝 石菖蒲

脈上左部稍振。水虧木中風動。左牙痛。蓋風從內旋。乃陽之化風。祇以春深地氣上升之候。多升少降。無非下元不司收納。虛證何疑。目齒常有但不虛

腫爲異。更有不紅者。更况因目恙。頻用韭子烟薰。查本草藥性。辛辣升騰助陽。孫真人於遺濁用之。藉其升陽以涵陰。更無漏泄耳。今痲中八日。聲音漸振者。乃精氣略有寧靜。裏竅略有靈機。是順境也。乃不明此理。仍用辛以泄氣。加人參。亦是清散上焦之藥。以肝腎臟虛。在於至陰。若再投辛。以傷其陰。必致虛證蜂起。焉望其向安。倘必以上有火熱。古稱實火宜清。虛火宜補。溫養柔和與溫熱剛燥迥異。幸勿疑訝。

生地 川斛 麥冬 茯神 阿膠 女貞子

十二日來。干支一輪。右肢痿木。右跗足略有痛象。舌竅未靈。味少甘美。虛象顯然。三日前。主家以齒痛爲熱。醫迎主見。卽投辛涼解散。此證虛在肝腎下焦。若不固納維本。漫無着落。仍以前法。加入涼肝。可也。

熟地 枸杞 牛膝 遠志肉 茯神 川斛 天冬 甘菊炭

張石頑治春榜趙明遠。平時六脈微弱。己酉九月患類中風。經歲不痊。

邀石頑診之。其左手三部弦大而堅。善中脈也。知爲腎藏陰傷。壯火食氣之候。且人迎斜內向寸。又爲三陽經滿。溢入陽維之脈。是不能無顛仆不仁之虞。右手三部浮緩。而氣口以上微滑。乃痰沫壅塞於鬲之象。以清陽之位。而爲痰氣占據。未免侵凌心主。是以神識不清。語言錯誤也。或者以其神識不清。言語錯誤。口角常有微涎。目睛恆不易轉。以爲邪滯經絡。而用祛風導痰之藥。殊不知此本腎氣不能上通於心。心臟虛熱生風之證。良非燥藥所宜。或者以其小便清利倍常。以爲腎虛。而用八味壯火之劑。殊不知此證雖虛。而虛陽伏於肝臟。所以陽事易舉。此肝燥而疏泄之令妄行。少陰不合亦氣脫之漸也。飲食易饑。又非益火銷陰藥所宜。或者以其向患休息久痢。大便後常有痰紅漬沫。而用補中益氣。殊不知脾氣陷於下焦者。可用升舉之法。此陰血久利之餘疾。有何清氣在下。可升發乎。若用升柴。升動肝腎虛陽。鼓激鬲上痰飲。能保其不爲喘脹逆滿之患乎。是升舉藥不宜輕服也。今舉河間地黃飲子助其腎。通其心。

一舉而兩得之。但不能薄滋味。遠房室。則藥雖應病。終無益於治療也。惟智者善為調攝。為第一義。此蓋全錄石頑案以為式

熟地 巴戟天 茯苓 山萸肉 茯苓 薄荷 淡熟川附 肉桂 五味子 麥冬 川石斛

遠志 鮮石菖蒲 宜去茯苓肉桂。加牛膝。天冬白芍青皮桂枝。

入冬天暖。陽不潛伏。質瘦脂虧。稟乎木火。血液既少。內風暗動。遂致眩暈麻痺。陡然仆倒。水不生木。肝陽橫逆。絡血流行右阻。謂之偏枯。忌用攻風逐痰。清邪涼血。漸致其和。交節不反。原可扶病延年。

犀角 羚羊角 鬱金 元參 連翹心 鮮菖蒲 川貝母 橘紅

色蒼肉瘦。形象尖長。木火之質。陰液最難充旺。春間欬嗽。雖係風溫外邪。但既屬陰虧。冬藏先已不固。因欬逆震動。浮陽上冒。清空自阻。用藥宜取沈靜質重。填陰鎖陽。方是閱方辛氣居半。與磁石相阻。菴容陰中之陽。亦非收攝不效宜矣。此因咳嗽能使津液真氣。前溫熱門。有因咳他病引動痰飲入。

藏為漸深。獨款以由藏出府為漸重。為真元日瀉於內也。

大熟地 靈磁石 萸肉 五味子 牡丹皮 雲茯苓 阿膠 懷山藥 澤瀉 龜版

形瘦身長。稟乎木火。肝風內動。挾火上巔。忽然眩厥跌仆。况陽舉遺濁。陰分久虛。擬壯水之主。以制陽光法。

大生地 大熟地 天冬 麥冬 鹽水炒川柏

肝陽化風為厥。腎液下衰。水不生木。而臟納失職。此壯盛年歲。已有下虛上實之象。大意養腎主以溫潤。治肝須得清涼。乃仿複法之方。溫不取入辛

肝燥血。可以並行不背。

大熟地 茯苓 遠志 菴蓉 鹿茸 柏子仁 補骨脂 懷牛膝 黃柏 天冬

精羊肉煑爛搗為丸

偏枯證。風論云。邪中五臟六腑之俞穴。各人門戶。為病則四肢不舉。然陽主左而陰主右也。又云。汗出偏沮。使人偏枯。此外感之邪。或營衛皆虛。邪

乘虛入。或虛風內動。皆有之。醫者治之當補正以逐邪。未可逐邪而不顧本元。然治之之法。以陽明為主。

生耆 白芍 當歸 防風 續斷 草薢 蠶砂 橘紅 虎骨 秦艽

痺

脈微而濇。微為陽氣虛。濇為陰血傷。去冬已下。肢獨冷。步趨無力。高年內乏藏納之司。入夏身動加喘。肉腠麻痺若蟲行。此真陽失蟄。胃陽失護。生意少。豈攻病藥石所宜。喻嘉言先生所謂大封大固。莫令真陽泄盡而暴脫。皆為此也。錄嚴氏三因方。

人參 白朮 附子

當風受涼。遂致左偏麻木。已經三載。今年勢緩。痛聚於腰。寒冷煩勞痛甚。此氣血凝遏。壯年不為大害。議以酒醒之。是治風先治血之意。

當歸 沈香 川芎 松節 生於朮 海桐皮 片薑黃 黃芪 桂枝 羌活 沒藥 虎脛骨

左脈如刃。右脈緩濇。蓋陰虧。本質暑熱。爲虐水穀。氣蒸溼。流肢末。遂成攣痺。已經泄瀉。食減。陽明脈中氣衰極矣。緩治可以冀功。

生於朮 茯苓 狗脊 茅朮 仙靈脾 獨活 防已 靈仙

溼痺絡脈不通。用滲溼苦溫藥小效。但汗出形寒。泄瀉食減。陽氣大衰。可難以溼甚生熱例治。通陽宣行。以冀脈絡流通。

於朮 茯苓 附子 米仁 金毛狗脊 草薢

周身掣痛。頭不可轉。手不能握。足不能運。兩脈浮虛。浮雖風象。而內虛者。脈亦浮而無力。以脈參證。當是勞倦傷中。陽明不治之候。陽明者。五臟六腑之海。主束筋骨而利機關。陽明不治。則氣血不榮。十二經絡無所稟受。而不用矣。衛中空虛。營行不利。相搏而痛。有由然也。法當大補陽明氣血。不與風寒溼所致成痺者同治。

人參 黃芪 歸身 甘草 桂枝 秦艽 白朮

患痛風。發熱神昏。妄言見鬼。手足痠癢。大便不行。此少陰腎氣受傷也。

腎既受傷。病累及肝。肝旺火熾。神明內亂。木合火邪。內入則便閉。外攻則身

痛。法當滋其內。則火自熄。風自除。痛自止。脫陽者見鬼。謂陽氣下脫也。亦

然。肝燥妄泄。厥陰不合。則魂散故也。

生首烏 萹仁 桂枝 秦艽 桔梗 黃連 知母 枳殼據案。此證不宜疏肝。當用酸甘化陰法。方用苦辛不合。

服一劑證轉減。但心神不安。身體如在舟車。此腎氣虛而肝肺爲之不

治。正內經子虛母亦虛也。母病子亦病也。夫肝藏魂。肺藏魄。二藏不治。故魂

魄爲之失守耳。前方既見效。則發陰虛。昏。何也。必兼外感。而前案但力發陰虛。

人參 甘草 生地 麥冬 遠志 棗仁 羚羊角 川貝 橘紅 茯神

脈左大堅弦。肺風震動。脾胃絡脈不利。不知饑。不安寐。口流涎。右肢腫。

當兼理中焦之絡。議用茯苓飲法。

茯苓 枳實 人參 炙草 半夏 廣皮 遠志炭

患風三月。周身流走作腫。手不能握。足不能履。診其脈浮大而數。發熱口乾。此陰虛生內熱。熱勝則風生。况風性善行。火熱得之。愈增其勢。傷於筋脈。則縱緩不收。逆於肉理。則攻腫爲楚也。

生地 黄芩 黄連酒炒 紅花 羌活

俞天音 脈左大。舌乾白胎。腫痛流走四肢。此行痺。喘急不食。二十日外矣。

羚羊角 木防已 白芍 桂枝 杏仁 薑黃風溼分治。頗爲有理。

行痺日久。時愈時發。脈來六至。溼熱居多。今關節腫痛。遊走不定。是溼熱中。又挾風火矣。總宜養血清熱。兼用風劑。庶幾有中病情耳。失方

肩背肢末。皆陽氣游行之所。牽掣不和。是絡脈中病。首用東垣舒經。接用參芪朮附。兩法不應。必客氣襲入脈中。灸刺無功。議用酒醴。通利血脈。

鑽地風五兩 千年健五兩 大黑豆六兩

三味投入無灰酒十斤隔水煮一日早晚暖服三四盃

驟然驚駭。經府氣亂。有失常度之流行。是以腫脹無定所。飲食如常。病不在裏。何得紛紛雜治。調其氣血。以俟營衛宣通。

桑枝 遠志 歸身 桂枝 鈎藤 白蒺藜

痿

精傷痿躄。尻髀跗脛皆如槁木。不知冷熱。糞黑腸枯。用潤劑通陰中之陽。病人自覺熱從內起。略有活動。但係沈痼之病。未許其能却疾也。

鹿茸 當歸 枸杞子 熟地 虎骨膠 舶茴香 沙蒺藜 牛膝

脈沈而遲。向有寒疝瘕泄。繼而腸血不已。漸漸跗膝麻木無力。此因膏梁酒醴釀溼內著。中年腎陽日衰。肝風肆橫。陽明胃絡空乏。無以束筋。流利機關。日加委頓。乃陽虛也。做古劫胃水法。此宜桂附與柏同用。

生茅朮 人參 厚樸 生炮附子 陳皮

足跟筋骨痛。不能履地。漸至延及腰脊。向患遺精。此肝腎精血內耗。將成痿躄也。

生精羊肉 炒當歸身 舶茴香 老生薑

陽明之脈。主束筋骨而利機關。今行走皆艱。納穀甚少。腹中氣攻頭痛。

自悲憂五年。日加衰憊。如靈樞經論痿云。意傷於憂愁則肢廢也。凡見人本神卒有

大憊。則心酸而四肢皆栗是也。

枸杞 當歸 防風根 黃芪 沙蒺藜 元參 牡蠣 羚羊角方無紀律

手足軟。不能坐立。是屬痿也。痿證內經歷言五臟之熱。髓枯骨軟。治應苦堅滋營。今之醫者。多作陽虛治之。痿證不愈。皆由是也。

虎潛丸

上年起病。食物不甘美。頭暈耳鳴。足力痿軟。年周甲子。向老日衰。下元元炁漸漓。水乏生木之司。液少則肝木內風鼓動。木乘胃土。必食無味。風陽

上巔攻竅。上實下虛。醫爲腎虛。黃地填陰。原不爲過。但腎水內寓真火宜溫。肝木相火宜涼。凡益腎取乎溫養。必佐涼肝以監制。方無偏黨。是證倘加暴怒煩勞。必有卒中之累。戒酒肉濁味。上氣肅清。填下。無痰火阻礙。清閑怡悅。五志氣火不燃。內起之病。關係臟眞。不徒求治於藥也。

熟地 石斛 天冬 菊炭 巴戟肉 肉蓯蓉 沙蒺藜 炒白芍 懷牛膝 線魚膠

蜜丸打入青鹽四兩

病始足脛。乃自下焦肝腎起病。其形不腫。則非六氣溼邪。當從內損門痿躄推求。黃地滋滯。久服胃傷。食減嘔逆。皆因濁味滯氣而然。經年不復。損者愈損。臟眞不能充沛。奇經八脈不司其用。經云。衝脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘦聚。夫衝脈卽血海。男子藏精。女子繫胞。今精瀝內結有形。是精空氣結。四字有學問亦猶女子之瘦聚也。凡七疝治法。後人每宗張子和。但彼悉用辛熱。與今之精空氣結迥殊。久病形消肉脫。議以精血有情。涵養生氣。

鮮河車一具。水煮搗爛。入山藥建蓮末拌勻。丸如桐子大。清晨人參湯送下。

瘖啞而痿者。內經謂之瘖痺。此陽盛已衰。入於陰也。由勞傷其腎。耗奪真陰。當以內養為主。非草木之藥。所能挽回也。

河車大造丸

河車龜板黃柏杜仲牛膝天冬麥冬人參地黃

陽明脈衰。厥陰風動。經絡交虧。麻木痛痺。肢節重著。久而成痿。當以護陽之劑。

黃耆 杞子 製川附 續斷 防風 白芍 遠志 首烏

陳家橋三十濁止。足腫。膝首痠痛。病起夏秋。必接地氣之溼。溼自下受。

酒客內溼。互蒸。內外合邪。湯藥決不取效。

獨痛丹 一錢六服

宿遷七十四冬月涉水。水寒深入筋骨。積數年而脛膝骨冷筋縱。病在下

為陰。水寒亦是陰邪。久則氣血與邪混亂。草木不能驅逐。古人取蟲蟻佐芳

香。直攻筋骨。用許學士法。

炒烏頭 全蝎 麝香 飛麵火酒泛丸

南京^{廿八}環跳筋骨痠痛。少年精傷。陽維脈少護衛。

當歸 巴戟 生虎脛骨 枸杞 沙苑蒺藜 川牛膝 羊內腎搗

崑山^{六十一}老年形寒足痿。噎痰。男子下元。肝腎先衰。真陰少承。五液變

痰。倘情懷暴怒。內風突來。有痲中之憂。戒酒節勞。務自怡悅。壯其下。以清其上。是根本治法。

熟地 萸肉 淡菴蓉 川石斛 青鹽 枸杞 淮牛膝 鹿角膠

海鹽^{二十四}據述緣季秋外邪變瘧。延及百日始愈。凡秋瘧。是夏月暑溼

熱內伏。新涼外觸。引動伏邪而發。俗醫但知柴葛解肌。暑溼傷在氣分。因藥動血。血傷攣痺。筋熱則弛。筋寒則急。遂致釀成痿痺難效證。

當歸身 桑寄生 生虎骨 枸杞子 撫芎 沙苑蒺藜

俞文調先生 靈樞云。神傷思慮則肉脫。意傷憂愁則肢廢。皆痿證也。脈形大虛無力。常餌補陽。而今操持縈思。猶未能免。病必遷延。

枸杞 歸身 甘菊 桂枝 虎骨 亦不切七情病治法

右足痛方 此痿證也。因肝腎兩虛。陽明脈絡失用。筋縮牽強。足痛不

堪動作。當溫散下焦。散字與上文莫進疎解。凡痿須辨是溼是燥。溼則附

寒則拘急。據稱筋縮足痛。及所用藥品參之。當是寒溼為患。不必重看肝腎兩虛。

川烏 北細辛 萆薢 乳香 沒藥 韭菜地上白頸地龍 晚蠶沙煎湯泛丸每日服二錢陳酒

下

長夏溼痺。經脈流行氣鈍。兼以下元脈絡已虛。痿弱不能步趨。脊膂常似痠楚。大便或結或溏。都屬肝腎奇經為病。蓋必佐宣通脈絡為正治法。倘徒呆補。夏季後必滋溼擾。須為預理。

肉蓯蓉 小茴香 巴戟天 歸天 遠志 鹿角霜 桑椹子 生茅朮 茯苓 熟地 薑汁

另用金毛狗脊三斤煎膏和丸。凡欲滋腎而惡其溼膩者。宜用鹿龜阿膠諸血肉品最合。次則女貞杞子。其質較清。

高年液涸風動。酒溼氣蒸。足趾曾經腐瘍。經年來或麻痺。或牽掣。不能轉側。已成筋骨之痿。兼之火升眩暈。頭面清竅常似不爽。大便艱澇。四五日始一更衣。陽氣不能潛伏。陰液日就枯槁。老來痿躄原無復元之法。診得脈數動疾。溫燥之補無益。反害。仿丹溪虎潛之製。稍爲加減。冀得津液少存。亦安閒永年之算。非攻病也。

大生地斤

淡天冬兩三

肉蓯蓉一兩
五錢

懷牛膝兩

生白芍兩

虎骨膠兩

柏子仁兩

肥知母兩

川黃柏兩

稚年頻頻傷風。咳嗽汗出。痰多。不嗜穀菜。乃衛外不固。肺易偏傷冷熱。當春升氣泄。忽然指握無力。走動足疲。語言或蹇。常有嘔惡。蓋衛應乎胃。胃屬陽明。其脈主司束筋骨。以流利九竅。而四肢原屬脾胃。舌爲心苗。脾竅通焉。此皆久傷氣分。乘氣泄而病。乃虛症也。治法以充脾胃脈絡。疏竅諸藥。皆

當屏絕。百日可期其效。

人參 蜜炙芪 歸身 炙草 廣皮 白芍 防風根 煨薑 棗子

未交四九。天癸先絕。今年五十有二。初冬脊骨痛連腰跨。膝跗無力。動則氣喘。立則偃僂。耳鳴頭暈。上熱下冷。呼吸必經脈閃痛。時有寒熱。穀食日減。少味。溺短便艱。枯澀。此奇經脈病。漸成痿痺廢棄之疴。夫督脈行於身後。帶脈橫束於腰。維躄主一身之綱維。今氣血索然。八脈失養。經謂陽維爲病。苦寒熱而諸脈隸肝腎陽明之間。故所患不專一所。交冬大地氣藏。天氣主降。爲失藏失固。反現泄越之象。治病當法古人。如云痛則不通。痛無補法。此論邪壅氣血之謂。今以絡脈失養。是用補方中宣通八脈爲正。冬至小寒。陽當生復。病勢反加。調之得宜。天暖溫煦。可冀痛止。然陽藥若桂附剛猛風藥。若靈仙狗脊之走竄。總皆劫奪耗散。只在配得宜。凡奇經爲人。身大脈非力厚不能達之。用柔陽辛潤通補方安。

鹿茸 鹿角膠 淡萆蓉 當歸 枸杞子 生杜仲 牛膝 蒺藜炒 鹿角霜

維。未是。蓋案中寒熱一證。亦斯病進退大關鍵也。

衝任督帶皆照顯到矣。惟不及陽

中由吉巷七十四病人述自腰以下頽然痿躄。肌肉麻木枯寂。二便不爽。

上下氣不接續。顯然崩漏亡血。陽不下交於陰。中年日就衰奪。惟辛補潤燥。

冀絡虛氣攻痛勢漸緩。

郁李仁 枸杞子 肉蓯蓉 冬葵子 柏子仁 桑寄生 松子仁 黑芝麻

厥

怒勞陽升暴厥。苦降和陽。使清神不為濁蒙。便可清爽。此論平時調理。

養肝腎之陰。宜至靜之劑。從經旨下虛上盛主治。

生地 熟地 龜版 菖蒲 遠志 茯苓

楓橋七廿眩暈嘔水。心中熱。神迷若癩。皆操持運機。君相升舉。蒙冒清神。

生薑辛可通神。但氣溫先升。佐入涼降劑中乃可。

溫膽湯。二陳加竹茹枳實。是實證治法。

血傷。驟加驚恐。氣鬱熱升風旋。清神受蒙爲厥。凡厥皆隸厥陰。今左股麻痺。忽爽忽迷。皆肝膽中相火內風未得寧靜。病延數日。左脈小濡。熱勝津液。暗傷。不宜純與攻滌苦寒。經旨以肝爲剛臟。與胃腑對待。柔緩濡潤。陽和液復。可免癩證。

鮮生地

石菖蒲

柏子仁

阿膠

天冬

茯神

血傷用地黃。宜乾者。此古法也。血熱乃用鮮者。方中略少清肝降濁之品。

此厥證也。緣情懷失曠。肝膽鬱勃。陽氣直上無制。夫肝脈貫膈入胃。循遠咽喉。今病發由脘至咽。四肢逆冷。所云上升之氣。自肝而出。中挾相火。其病爲甚。法以苦降辛宣酸泄之。治使陽和氣平。之後接續峻補陽明。此病發必稀。以胃土久受木戕。土虛則木易乘尅也。

川連

生芍

吳萸

烏梅

橘紅

杏仁

此肝風挾陽上逆爲厥。得之惱怒驚憂。屬七情之病。厥陰肝脈貫膈乘

胃。是以腕中不饑。不思納穀。木犯土位也。其頭暈目眩。亦肝風獨行至高之地。而精華之血。不得營矣。前用苦降酸泄。辛宣。病有半月不愈。議兼重鎮主之。

川連吳黃炒 白芍 烏梅 淡乾薑太辣傷血 生牡蠣。

脈左細數而勁。右數大而虛。此腎精肝血內虧。水不涵木。陽挾內風暴起。莫制。指臂拘攣。口目喎斜在左。蓋肝風陽氣從左而升。衝氣撞心。消渴暈厥。仲景列於厥陰篇中。凡肝屬陰。木必犯胃之陽。土飲食熱氣入胃。引動肝陽。即病發矣。此恙已六七年。陰損已極。必屏絕俗擾。怡悅情懷。然後滋養。填固其陰。必有小效。無驟期速功。厥因食而發。所謂食入於陰。長氣於陽也。不必見。胃實氣滯。肝邪無以泄越。遂迫令橫逆。妄行矣。此可見。肝胃之相關。故凡怒發於食前。食後者。必作厥仆。此可。

炒鬆熟地 陳阿膠 大淡菜 荳肉 五味 芡實 金櫻子粉方甚不合。恐肝脾愈鬱矣。宜用通攝。

食物滯於腸胃。太陰陽氣不旋。陶節庵用五積散。因汗冷絕逆。禁用攻

表。昨主溫通開滯氣頗應。謂陽氣宜通也。

草果 香附 厚樸 陳皮 廣木香 茯苓 化服蘇合香丸 此表裏兩解之變法也。必傷於冷物乃合。

肢冷湧涎。臍上痛墜泄瀉。而脈緩。此為脾厥。以辛香醒中。兼解少陽之鬱。

生益智 香附汁 厚樸 柴胡 煨木香 陳皮

徽州三十仲景云。厥陰病。氣上撞心。明示木中風火上行。多氣少血。陰

虛之象。治以癩證痰火有餘。大謬。

女貞子 天冬肉 茯苓 小生地 山萸肉 建蓮肉 赤金箔

厥者。脈動而身靜。謂之尸厥。此氣閉於外。氣血未亂。通其陽則生。今厥而脈亂。氣血併走於上。如天地之鬱。則沙飛水湧。莫之可當。謂之大厥。此人身之根蒂空虛。三陽并羸。俟其氣返則生。不返則危矣。厥究非脫。脈亂治而

。若細微無力。直是脫矣。

大熟地 磁石 代赭石 五味子 白芍 人參 河車

脫

傷寒蓄血。都是邪入於裏。內經謂陰絡傷。血乃下溢。陰為臟病。陰氣從下走泄。陽氣失戀。上冒。遂令神識昏狂。乃脫證也。久病神昏下氣。頻頻即脫也。况在立冬大節之交關。閱醫藥。今朝所服。猶是羌防菖根。前此柴防。服之屢屢。身中陰陽。遭此魔障。劫盡焉。有安逸之理。雖急急收拾散越。恐未穩追返耳。

人參 茯神 禹餘糧 木瓜 五味 小麥 方意是預防汗脫。因血泄不可復見汗也。但此證不妨稍多用藥味。五臟兼顧。而肝腎為重。

太陽開小水。自利陽明傷。則失其闔。濁陰上逆。四肢冷。汗氣喘。胸腹脹悶。都是陽微欲脫。脈絕厥逆。勉與通脈四逆湯。回陽驅陰以挽之。

淡乾薑 泡附子 人參 豬膽汁

服藥後。脈微續者生。暴出者死。

脈大不斂。神迷囈語。陰陽不相交合。為欲脫之象。救陰無速功。急宜鎮

固陰陽。冀其甦息。

生龍骨 生牡蠣 人參 阿膠 茯神 淮小麥

勞復。虛寒泄下。加以絕穀胃損。傷寒禁穀不知作絡血洞下。昏亂無神。

脈診三五參差。陰陽已屬脫根。恐壞於子丑二時。真氣不相維續。勉用大封固一法。

人參 熟附子 生芪 五味子 於朮

瘧疾

瘧有十二經。然不離少陽厥陰。此論客邪之傷。若挾怫鬱。嗔怒致厥。陽

肝氣橫逆。其勢必銳。經言肝脈貫膈入胃。上循喉嚨。而瘧邪亦由四末擾中。

病發四肢是脾胃病故不饑不食。胃受困也。夫治病先分氣血。久發頻發之恙。必傷及

絡絡。乃聚血之所。久病血必瘀閉。香燥破血凝滯。滋血皆是證之禁忌也。切

宜慎之。讀此可見先生通絡之義。非孟浪情同。言馬非腫背也。

青蒿 生薑甲 炒桃仁 當歸尾 鬱金 橘紅 茯苓

又方

桃仁 柏子仁 新絳屑 青葱管 歸鬚

瘧起四肢。擾及中宮。脾胃獨受邪攻。清氣已傷。不饑不食。胃中不和。夜寤不寐。小溲赤濁。卽經言中氣不足。溲溺爲變。須瘧止之期。干支一周。經腑乃和。明理用藥。疎痰氣。補脾胃。清氣轉旋。望其納穀。

熟半夏 生益智 人參 厚樸 茯苓 廣皮 臨服入薑汁三分。前案方味重泄肝。此重補脾。視本之虛實邪之盛衰而用。

之

瘧病內經謂風邪入中。雖云十二經之瘧。總不離乎少陽。少陽肝膽相附。瘧久盤踞。未免凝痰積血。卽成病根矣。虛者補正爲先。補正不應法。當破

血。先補後攻。非誤補改攻也。

柴胡 草果 炒桃仁 青蒿 半夏 歸尾 桂枝 炒黑蜀漆

金匱^十夏伏暑溼。秋季如瘧。邪不盡解。能食不化。腹中氣滯有形。脾胃不和。用東垣清暑益氣法。

人參 黃芪 白朮 青皮 陳皮 神麩 炙草 麥冬 五味 黃柏 澤瀉 當歸 升麻

葛根 芥朮 薑棗煎 東垣未嘗以此方治瘧。可悟運用古方之法。

暑邪成瘧。熱結三焦。腕痞有形。煩渴喜冷飲。從河間法主治。失方

經云。夏傷於暑。秋為痲瘧。今時已孟冬。瘧始發動。蓋以邪氣內藏於臟。

為厥少兩陰經瘧也。擬以溫臟法。邪伏久則陰虧。有不可溫者。宜察脈證。

厚樸 製附子 生牡蠣 炙甘草 大棗

高年正氣已衰。熱邪陷伏。故間瘧延為三日。此屬厥象。舌涸腕痺。噫氣

欲嘔。胃虛客逆。恐有嘔吐呃忒之變。議用旅覆代赭鎮其逆亂之氣。合瀉心

法。以開熱邪壅結為主。運用有法。尤可悟運用古方之妙。尤為巧合。尤可悟運用古方之妙。尤

人參 川連 乾薑 白芍 旋覆花 代赭石 烏梅 牡蠣 半夏

服一劑。減去半夏乾薑服。減二味亦有深意。仲景凡渴去半夏。熱邪陷伏。陰津必傷耗矣。

陽虛陰亦傷損。瘧轉間日。虛邪漸入陰分。最多延入三日陰瘧。從前頻厥。崑治厥陰肝藏而效。自遺洩至今。陰不自復。鄙見早服金匱腎氣丸四五錢。淡鹽湯送。午前進鎮陽提邪方法。兩路收拾。陰陽仍有洩邪功能。使託邪養正。兩無妨礙。大病迭見。最難措手。此與前案。皆精心結撰之作。不可以錄用。成方而忽之。

人參 生龍骨 生牡蠣 炒黑蜀漆 川桂枝 淡熟附子 炙草 南棗 生薑

此仲景救逆湯法也。龍屬陽入肝。蠣屬陰入腎。收瀼重鎮。臟真自固。然二者頑鈍呆滯。藉桂枝以入表。附子以入裏。蜀漆飛入經絡。引其固瀼之性。趨走護陽。使人參甘草以補中陽。薑棗以和營衛也。仲景

誤治。擾動真陰。致熱痰上涌。將有痰厥或狂越之患。故以此救之。先生移治此證。恰合。讀古方不可不熟求其理。理熟則運用在心。不襲成迹矣。

邪深入陰。三日乃發。問瘧至必腰腹中痛。氣升即嘔。所伏之邪。必在肝絡。動則犯胃。故嘔逆煩渴。肝乃木火內寄之臟。胃屬陽土。宜涼久聚。變熱與初起溫散不同。邪久不祛。必結瘕形瘡母。

生鼈甲 生桃仁 知母 滑石 醋炒半夏 草果仁 西醫謂人病瘧死者。剖視其肝脾。大於常人二三倍。腰痛欲嘔。肝脾漸大之徵也。非鼈甲煎丸莫治。

伏邪留於少陰厥陰之間。為三日瘧。百日不愈。邪傷真陰。夢遺盜汗。津

液日枯。腸燥便艱。養陰雖似有理。但深沈瘧邪。何以追拔掃除。極是凡因病

標病本虛也。議以早服仲景鼈甲煎丸三十粒。開水送。午後服養陰通陽藥。用復

脈湯加減。此與前用救逆案意同。

生牡蠣 鹿角霜 酸棗仁 阿膠 麥冬 炙草 生地 桂枝 大棗 可加細辛。以通陰陽。有諸潤藥。不慮燥也。

即前救逆方中蜀漆之義。

三陰瘧。是陰分伏邪。汗之清之不解。但與膩滯補藥。邪無出路。遂致吐

衄。寒自背起。督脈應乎太陽。此寒溼下受。傷於太陽。由督入巔之品。起

逐寒溼仍從下出。自易愈而無餘患。而瘧血門套藥。一用諸藥而愈。治一瘧初起。大寒大熱。以下無汗。而

川桂枝 熟半夏 炒白芍 炒黑蜀漆 生牡蠣

三日瘧。是邪干陰經。表散和解。不能去病。詢知不慎口腹。飲物之氣。亦能助邪。宜先理脾胃而廓清之。

桂枝木 生薑甲 烏梅肉 常山 廣皮 知母 草果 淡黃芩

寒熱而嘔。罷則汗出。四日一發。牝瘧也。瘧論云。邪氣客於六腑。而有時與衛氣相失。不能相得。故休四五日或數日乃作也。今脈沈弦遲。發必大吐大汗。陽氣與中氣乏竭。應扶陽補中。以固元氣。

製川附 人參 泡薑 炒白芍 草果仁 牡蠣 炙甘草 加大棗一枚

二十日來。以甘溫益氣養陰。治脾營胃衛。後天漸得。知饑納食。思瘧痢致傷下焦。奇經八脈皆損。是以倏起寒熱。背部畏冷。遇風必嗽痰。語太真火受傷則督虛。而陽不能維。陽維脈無以維持護衛。衛疎則汗泄矣。從虛損門治。

人參 鹿角霜 沙蒺藜 補骨脂 茯神 枸杞炭 鹿茸 當歸身 此必病愈無邪。乃可用。且力峻。恐不能任受。轉。

增中醫生。痰奈何。

瘧發三日。三月不止。邪留在陰。熱解無汗。氣衝胸悶。痰涎甚多。問寒起

腰髀及背部。議從督脈升陽。凡瘧。須問發時。寒自何起。最為要訣。起

起肩脅屬肺。起心中屬三焦。包絡。陰瘧多因寒溼下受。由太陽入督。故證如此。

凡參 炒黑川椒 鹿茸 茯苓 炒黑小茴 炒當歸

瘧發六七十候。寒熱邪聚。必交會於中宮。脾胃陽氣消乏。致痞脹不能納食運化。三年不愈。正氣未復。診脈沈微。陽傷必濁陰盤踞。但以洩氣寬脹。中州愈困愈劇。必溫通濁走陽回。是久病治法。

生淡乾薑 生益智 厚樸 茯苓 人參 泡淡附子

三瘧留熱。伏於厥陰絡中。左脅痠聚有形。是為瘧母。寐則驚惕。若見鬼神。夫肝為藏魂藏血之鄉。熱邪內灼。藏聚失司。非攻補可療。議清解血中之結。以祛熱。

大生地 柏子仁 炒丹皮 生龍甲 生牡蠣 郁李仁 炒桃仁

常熟廿七瘧母瘦聚有形。治有宣通氣血。第所述病狀已是產入脈交

損。字有不敢攻瘕。

當歸生薑羊肉湯

經月瘧邪。仲景謂結爲癥瘕者。氣血交病。病已入絡。久必成滿脹。瘧母膠固粘著。又非峻攻可拔。當遵仲景鼈甲煎丸之例。日餌不費。以搜絡邪。

鼈甲煎丸三百粒每服十粒日服二夜服一

瘧母竊踞少陽。氣血凝阻。

蜣螂 金鈴子 桃仁 三稜 蟻蟲 歸身 元胡索 蓬朮 韭汁丸

邪與氣血交凝。則成瘧母。病在絡。自左脅漸歸於中焦。木乘土位。東垣謂瘧母必傷脾胃。既成形象。宣通佐芳香。乃能入絡。凡食物肥膩呆滯。尤在禁例。所慮延成中滿。

人參 茯苓 木香 草果 陳皮 香附汁 厚樸 青皮宜急加破血之品。且在所禁。橘

淮安^二甘露飲止瘧。是益中氣以祛邪。虛人治法皆然。脾胃未醒。宜忌腥酒濁味。

大半夏加益智橘紅薑汁泛丸。

同里^{三五}瘦人多燥。瘴瘧熱氣由四末乘至中焦。胃中津液。為邪熱劫

燂。不饑不食。五味不美。是胃陰傷也。人身不過陰陽二氣。偏則病。離則不治矣。

人參 麥冬汁 知母 生甘草

鳳陽^{八三}瘧後脾弱。肝乃乘之。中氣不舒。所以易生嗔怒。亦是陰津被

凡潤。氣亢神煩。不盡宜用辛溫。而煩怒生。

焦白朮 生智益 茯苓 廣皮 枳實皮 檀香末 水泛為丸

宜興^{九十}瘧痢後。脾胃兩傷。用繆氏法。

雙補丸方

遺泄陰虧。瘧熱再傷陰分。聲嘶火升。易怒神躁。水不潤木之徵。議何人飲。佐降陰火。

製首烏 知母 天冬 人參 茯苓 麥冬

肝虛內熱。此瘧後骨蒸也。

製首烏 茯苓 女貞實 酒炙龍甲 歸身 酒炒白芍 香附酒炒 青蒿子熬膏略加蜜搗丸

東垣謂瘧痢皆令脾傷。以為寒為熱之邪。由四末蒸犯中焦也。蓋頭形象天。清陽不曠。故面目諸竅不和。形寒汗泄。將來浮腫腹大。已了然在目矣。

人參 茯苓 熟附子溫本固本 淡乾薑宣陽透邪 厚樸 澤瀉

瘧傷真陰。七八年來。每交春季。即脊背肩胛脹痛。入夏更甚。冬寒乃瘥。凡春夏之時。天地大氣發泄。至秋冬方始斂藏。臟真既少。升洩病來。督脈行身之背。自陰而及於陽。但內傷不復。未易見功。惟靜養斷慾。用藥可希漸效。

鹿角霜 鹿角膠 熟地炭 兔絲餅 青鹽 柏子仁可徑用內經烏則方

痢疾

食菜下痢腹痛。是初因寒溼傷脾。久變溼熱。蒸於腸胃。况利後痛不減。

腹中硬起不和。不得流通明甚。當以苦泄小腸。兼分利而治。不可

川連 黃柏 苦楝皮 澤瀉 木通 查肉 太苦可加香砂。看證仍是夾寒。可兼溫通。

裏急後重。腹痛便膿。祕塞不爽。久延交冬。乃是腸滯不通。法當宣通氣

血。久利有邪實。四年。有正虛。腹痛不爽。虛實皆有此證。診脈弦。大而滑。遂從

愈實治而

紫苑 厚樸 炒黑地榆 製軍 桔梗 木香 炒黑查肉 炒青皮 此方理氣滯。消食積。是

且凡久利。但不見虛象者。皆屬於實。皆屬溼熱。無溼寒者。

腸澀下白沫者。肺氣下移。經言氣併於陰。猶云陽下陷也。又云脈沈則

生。浮則危者。恐虛陽欲撒之象。而真氣欲離耳。寥寥數語。而非胸中雪亮者。

能。其孰

人參 炮薑 桂枝木 黑於朮 炮附子 大棗 炙甘草

口中乾燥。小水全無。泉源已竭。陰液無以上承。利證噤口。都是溼熱壅於胃口。下元衰憊。衝脈氣震高突。此攻病保真。理難捉摸。

川連 草決明 石蓮 黃芩 烏梅 白芍 生胃津而鎮肝逆。

少腹痛。下痢帶血。

黃芩 炙草 炒銀花 炒丹皮

痢止咳頻。脈虛。形寒多悸。進甘緩法。小建中去薑加玉竹。

陰絡受傷。下午黃昏爲甚。非治痢通套可效。大旨以守陰爲法。

熟地炭 建蓮 茯苓 五味子 赤石脂 澤瀉 阿膠

久痢肛墜。診脈左堅沈。溫劑不受。陰傷不司收納。前用桃花湯少減。當

與甘酸柔緩。據脈證。是溼熱瀆入血分。木鬱土中。肝氣下陷。宜用辛涼宣散。佐以苦堅。

人參 炙草 熟地炭 柿餅炭 五味子

疝

高年疝證。是下元虛。氣冷凝滯。結聚攻墜。乃沈疝之疾。藥難取效。煖氣

助陽鼓動。

只因不能達下

俾陰邪濁氣稍解。不過暫時小安耳。病在肝腎。道路紆遠。

藥必從咽入胃。由胃入腸。始達病所。而上中無病之處。必受疝藥攻剋之累。

純陽氣雄有傷胃
陰非高年所宜

倘胃減妨食。何以救療。夫陰濁盤踞成形。例取鈍陽氣雄

之藥。昔胡大封翁高年宿疝。用十全大補不效。喻氏駿其半陰半陽非法。議以薑附爲丸。參苓爲衣。喉間知有參苓。過胃始露。猛裂之威靈。恪攻病所。此議甚正。

生炮附子

淡乾薑

大茴香炒

研爲細末。真水安息香三錢。搗爲小丸。以人參末不拘多少爲衣。早

服二錢。少少進湯送下。

發熱痰喘。胸滿身痛。左邊睪丸不時逆上。痛不可忍。肝脈弦急。肺脈獨大。此肺肝受邪之故也。肝爲木藏。其化風。其生火。風火合邪。旺於木位。則爲

熱為痛。乘於肺金。則為痰為喘。法宜滋達肺金。兼疏肝木。此與下案不似。是生手筆。此證當是

風寒傷於尻陰。因勞力房室而得之。方味只能清上。不能攻下。

萹仁 紫苑 半麩 川貝 桔梗 枳殼 杏仁 蘇子 柴胡 秦艽

陰莖作痛。痛甚而憤。診兩脈浮虛而濇。浮為氣虛。濇乃精傷。陰陽兩虛。得之憂思勞鬱而傷中也。經云陽明為氣血之海。主潤宗筋。又陽氣者。精則養神。柔則養筋。今多悒鬱。則氣必傷。又任勞倦。則血必耗。氣血兩傷。宗筋失潤。故令作痛。治以當歸補血湯。此心腎之病也。發為疝痛。下極而肝鬱。故

經憤。而見心病矣。案中引。於病情不甚貼切。

人參 甘草 秦艽 桂心 紅花 繼用歸脾湯調理

渴熱向愈。自更衣。用力陰囊忽大。此宿疝舉發。明明陰虛氣墜。非子和七疝同法。身陷墜。任脈失其擔任。確切小便通調。酸甘定議。如小便不通。化。

陽法。

人參 天冬 熟地 茵肉 川石斛 炙草 宜與健脾藥並用。

疝攻上觸。必傾囊嘔物。此胃中得食氣壅。肝邪無以洩。越得吐而解。蓋木鬱達之也。此番病發。原自怒起。其為肝厥何疑。

炒黑川椒 炒小茴香 川棟子 橘核 青皮汁 青木香 此氣分之病。肝氣逆於胃絡。當從胃疏其肝氣。此方可加牡蠣木瓜半

夏白芍焦查川芎。疏降胃濁攝納肝逆。

狐疝

淡菴蓉 枸杞 巴戟 茯苓 沙蒺藜 當歸 茴香 眞肉桂 肉桂獨於此病為要藥。此方與下案俱屬肝腎虛寒治法。

狐疝者。厥陰之痺也。發則睪丸痛引少腹。得嘔氣泄則止。此屬寒溼之阻。議以利溼溫經祛風丸方服久自愈。

川棟子 小茴香 淫羊藿 胡盧巴 茯苓 半夏 杜仲 韭子 砂仁 防風 當歸

漂淡菴蓉 泡淡吳茱萸 雙合 水泛丸口服二次每服二錢五分 此等方法。乃唐人派。藥味稠疊。以氣味濃厚制勝。彼

貌託得仲景心傳。舉手便書小建中者。安得不言馬腫背。

甯波八四十 七疝肝病為多。病發有聲嚮。為氣疝。寒入募絡。積疝堅硬下墜。宜八味加大茴香胡蘆巴。

師沙橋三六十 寒入厥陰之絡。結為氣疝。痛則氣脹上升。氣消絕無形蹟。

老年下元已乏。勿與破氣攻疝。宜溫養下元為主。尿管脹。是阻溺。當佐以通陽。倣香茸丸法。

鹿茸 麝香 當歸 青鹽 韭子 蛇牀子 覆盆子 大茴香

胃病治法。疝病六經皆有。而陽明厥陰為多。而

小川連三錢鹽 鹿角霜一兩 炒當歸一兩 淡薑錢五 生香附二兩 生曬茯苓一兩 炒黑小茴一兩

山查肉二兩炒 生川棟子肉一兩 水泛為丸

厥陰腹痛引胸脅。便難。罌丸腫。使難與前小便通調。一

當歸鬚 延胡索 小茴香 桃仁泥 川棟子 官桂

精氣不旺。邪留腎絡不解。大凡邪在陽。可散。入陰之邪。必溫經可託出。

留邪。爲解之化之。不同法也。此案不似先生手筆當是假案

人參 鹿茸 鹿角霜 舶茴香 當歸 細辛

癥 痞

婦科別出

病因食物不節。其受病在脾胃。既成形象在左脅之旁。是五積六聚。喜煖惡寒。陽氣久傷。溫劑必佐宣通。食物宜慎。

草果 薑撥 雞內金 砂仁殼 厚樸 廣皮 阿魏搗丸

臍旁有塊。仍流動。按之爽。或時攻脅刺痛。外腎寒冷拘束。必有外病屬肝血腎精之損。凡腎當溫。肝宜涼。腎主藏納。肝喜疎泄。收納佐以流通。溫腎涼肝。是此病製方之大法。

當歸身 枸杞子 生牡蠣 炙鼈甲 小茴香 沙蒺藜。當歸小茴二味俱溫肝藥。

膈間腫橫如臂。堅硬痛楚。體髀骭股皆腫。經謂之伏梁。又曰風根。此下焦陽虛。氣不能運化也。此屬危證。勉擬一方。恐未能效。此蓋下受溼邪。上相。上

經。升降開闔俱痺。致成此證。峻藥緩服。或能具功。兩

淡川附 萆澄茄

人參 鹿茸

茯苓

擬方。用礬石以助心陽。礬砂以攻血結。佐以辛溫走絡之品。少少緩服。輔以補養湯劑。

傷酒漏風

吐血便血漏瘍有因傷酒者已分入各門

行走多動陽。酒溼多變熱。熱氣上升。犯胃清竅。頭蒙眩脹。衄血成流。上齧腐瘍。久必漏卮。世俗通套。每用犀角地黃。然酒性先入膽。次及胃。酒客性惡甜膩。從苦降定議。以苦能却溼也。

桑葉

苦丁茶

連翹心

荷葉邊

丹皮

射干

酒毒內燔。吐血甚多。六七日後。瘀血又從大便出。酒性先入肝膽。次及胃絡。照一藏一腑對治。勿驟用膩滯陰藥。

金石斛

丹參

稽豆皮

銀花

地骨皮

丹皮

黑山梔

雲茯苓

宜兼顧肺陰。防成肺痿。

身熱解墮。惡風汗出如雨。喘渴不任勞事。內經謂漏風證。此飲酒汗出當風。邪留腠理也。

白朮 澤瀉 糜街草 新會皮暹一味加得好。

國朝喻氏謂酒熱先入肝膽。謹慎者飲之。可以壯膽。好飲多年。以致發瘡。其酒毒頗得外泄。以分其勢。瘡愈。癩搖厥逆。全歸肝絡矣。用藥以大苦大寒。直清其下。

蘆薈 青黛 龍膽草 郁李仁 胡黃連 黑山梔調入豬膽汁。此方太苦無理。癩厥起於瘡愈。是毒氣內陷也。所以內陷。

由於瘡久氣虛也。治之正宜助氣益血。生津清熱。充其內陰。鼓其表陽。使酒毒仍從腠理達出。重用苦降。不益之內陷耶。

痧疹

溫熱痧疹已見溫熱門

痧是肺胃氣分邪火內迫津液。上焦受損。元未全復。更爲夏熱內蒸。其血不必爲陰虛治。秋末入冬。用清燥意。

天冬 麥冬 知母 貝母 水梨肉

北城下六三十溫疹是一股乖戾不正無形之氣。從口鼻吸受。上竅阻塞。

噲物不得下咽。醫不辨有形無形。但曰清火。寒降重藥。直入腸胃。與咽中不

相干涉。

連翹心 馬勃 牛蒡子 銀花 鮮薑根

耳聾。環口浮腫。是少陽陽明風熱。久而失解。邪漫經絡。倏然疹現。隨沒。當與羅謙甫既濟解毒湯。

枯苓 大黃 防風 銀花 葛根 升麻 川連 荊芥 甘草 陳酒浸半日陰乾煎

從未生育。乃是氣血不和。形軀豐溢。是外盛內虧。肌肉癢癢。搔摸成塊。風在表。溼熱在裏。乃是氣分之病。病非大恙。而取效最難。明理之醫。謂肥人不可多投。攻表泄陽。當於夏月施砭刺法。可效。

生茅朮鬚 生香附 白僵蠶 白蘚皮 白芥子 老蘇梗不合

幼損

勉強搖精。致陽縮囊縱。不但形弱。偃僂。肛門臍竅。皆為收引。咽喉牽絆。自此食物漸漸減少。由精血之傷。有形最難自復。少厥兩陰脈循喉嚨。開竅

於二陰。既遭損傷。其氣不及充注於八脈。見證皆拘束之狀。上年進柔劑陽藥。服後頭巔經脈皆脹。耳竅愈鳴。想是藏陰宜靜。試以乘輿身怖。必加跼促不安。宜乎升陽之動藥不靈矣。此太柔靜亦恐無功夫少陰內藏。原有溫蒸諸法。厥陰相火內寄。惡煖喜涼。仿丹溪潛陽法。仍候高明定議。原書此案複出於祁正明案中

今刪祁存此

元武板 知母 茯苓 秋石 生地 阿膠 遠志炭 柏子仁 原書祁案有黃柏。云食前逾時服。此不治之證也。韓飛霞

鹿峻丸。或可倖效。然非可猝辦也。近日西人有鱉魚肝油。極補精血。與此證甚合。

肝主筋。腎主骨。陰器者宗筋之所聚。男子天癸未至。強通其精。異時必有難名之病。今患腰膝痠疼。宗筋短縮。大便結滯。小便淋瀝。足腿消燦。筋肉拘攣。無非肝虧腎損所致。按脈沈細而兼微數。乃精不營筋。又有伏火。內經所謂發為筋痿。及為白淫者。是也。治宜滋腎舒肝。使精血漸充。則筋骨亦漸和柔。但幻證日久。非一朝一夕之功。幸弗期速效。

熟地 歸身 牛膝 肉桂 黃柏 線魚膠 續斷 鈎勾 水煎空心服

徐十四歲幼沖多六氣之擾。少七情之傷。痛在下焦肢末。初痛必係寒溼痺阻於經絡之中。方書謂爲寒爲痛。爲溼爲腫。砭刺疎通。引動脈中之氣血。原得小效。寒溼邪氣屬陰。久蓄不得解散。蒸腐血液。變熱成膿。附骨癰瘍。久而精神日憊。理必延爲漏卮矣。三年宿疴。寒暑迭更。邪必渙解。此爲損證。凡女子二七而天癸至。謂體陰用陽也。昔因客氣而致病。再因痛傷。已損及真氣。諸證所稱。難愈痼疾矣。今條熱蒸蒸。喉燥嗆咳。納食日減。乃損至精髓。草木攻邪。日加剝斲。參苓養氣。難充形質。投藥必不見長。無治病成法可遵。蓋以有情之虛養。句有誤字非氣味之乘。強望胃納。扶持至春回寒谷。再議丸方。身體熱蒸。多嗆火升。用糯稻根鬚。漂洗潔。陰乾。兩許。煎湯服。此能退陰分燔灼之熱。種植以來。不見天日。得水土之養。清而不尅之藥。人參非助熱之藥。本草云。陰中之陽。其氣主升。故不宜單用。食少易熱。咳嗆。芪朮歸地皆爲壅滯。

以人乳鑊成粉。和參末捏作錢許小丸。俾濡養血中之氣。藉人身之生氣。胃氣略好。當與景岳一炁丹。製膏與服。中有紅鉛一味。世間無有真者。以真坎炁二十四枚代之。合乎二十四氣以默運耳。

脈細。右濡左數。少年形瘦肌槁遺泄。是知識太早。致精血難充。臍左動氣。食減易饑。陰傷於下。漸延中宮。沉陰恐妨胃。剛補慮劫陰。男子精傷。補陰參入柔劑溫藥。取坎中寓陽之意。

鹿角霜

龜腹版

白茯苓

枸杞子

柏子仁

炙甘草

沙蒺藜

炒黑遠志

何不徑用烏則丸

唯亭

八十

讀書身靜心勞。兼以夜坐。浮陽易升。年少雖未完姻。然情欲一

萌。多致不自保惜。陰中龍雷。挾木中相火沸動。失血咳嗽。是藏陰不為寧謐。暫緩書卷。早眠晏起。百日中勿加雜念擾亂。可以全愈。若以草木希愈。非要領也。

知柏八味丸加五味子

程舜文令郎。男子思念未遂。陰火內燔。五液日奪。但孤陽升騰薰蒸上竅。已失交泰之義。此非外來之證。凡陰精殘憊。務在胃旺。納穀生陰。今咽喉耳鼻諸竅。久遭陰火之逼。寒涼清解。僅調六氣中之火。而臟真陰火。乃閃電迅速莫遏。清涼必不却病。良由精血內空。草木藥餌。不能生精充液耳。

猪脊髓 阿膠 川斛 天冬 生地

泰興七十精未生成。強洩最難充旺。至今未有生育。視形瘦。問食少。精薄易泄。形脈不受剛猛陽藥。議藉血肉有情。溫養氣血。

鹿鞭 羊內腎 淡萆蓉 瑣陽 生兔絲子 枸杞子 舶茴香 牛膝 青鹽

同里七廿幼年成婚太早。精炁未充先洩。上年洩瀉。繼加痰嗽。納食較少。形肌日瘦。今秋深喉痛。是腎精內乏。陰中龍雷閃爍無制。當此秋令肅降。藏職失司。明歲穀雨。萬花開遍。此病危矣。

秋石拌人參 生紫石英 紫衣胡桃肉 茯神 女貞實 五味子

吳江六十天癸尙未至。肉瘦形悴。嗆嗽著枕更劇。暮夜內外皆熱。天明微

汗熱減。營衛乖離痰出或稠或稀。咽中總不爽利。此先天稟賦之薄。稍長真

陰不旺。陰虛則生內熱。怡悅勿事鍼帶。必俟經來。可得熱除。不然。卽世俗所

稱乾血勞怯。咳不著枕與熱汗。總和外邪未淨。困及營衛。有和營衛以達邪之功。最合。

復脈法去麻仁觀去麻仁。蓋已便溏。是爲不治矣。

兩年前晨泄。食入嘔吐。此非有年體質之脾腎虛瀉。可以二神四神治

也。蓋幼沖陽虛。百中僅一耳。然不盡今泄瀉仍然。寒熱咳嗽失血。天癸不來。脈

得弦數。形色消奪。全是沖年陰不生長。勞怯大著。無見病治病之理。保其胃

口。以冀經通。務以情懷開爽爲要。勿恃醫藥却病。始因肝鬱。大氣下泄。繼則逆氣上。不納。泄宜。

從難經緩中調營衛法。而虛損血液枯乾。能令溼熱漸生。卽是好氣象。因胃氣爲後天根本。而虛損血液枯乾。能令溼熱漸生。卽是好氣象。

熟地炭 炒當歸 炙甘草 炒白芍 淡黃芩 烏梅肉 黑查肉歸地芩芍。於泄瀉未合。瀉

可用

十四歲室女。原無溫熱藥之例。視色奪脈弱。下焦未寒先冷。經事淋漓。是衝任虛冷。二炁不交。冬宜藏陽。用溫攝升陽。

麋茸 人參 沙蒺藜 鹿角霜 歸身 杞子 紫石英 小茴香 蛇牀子

疳 癩 痘瘍 附不瘰

腑氣鬱滯為熱。中宮少穀為虛。腹滿溺濁。口中味淡。乃幼科五疳之病。

使君子肉兩一 雞肫皮兩一 肉果錢五 川連錢五 乾蟾只一 枳實錢五 蕪荑錢五 新會陳皮兩一

山查肉兩一 白芍兩一 人參錢三 飯灰兩一 水泛為丸米湯送下二錢每早空心服一服

幼稚驚癩。至十三歲患發。每發必於子夜陽動之時。想陰未充溢。肝風乘陽。冒亂神識。痰涎上湧。治痰清火無效。蓋肝為腎子。木中陰火燔灼。腎液皆為上泛矣。女子天癸得來。斯病當有愈期。此陽欲上不得上。故病發於陽動之時。非陽衰。亦非發於

盛入。蓋寒溼久滯於上。焦血分已矣。但當理肝宣鬱。皆成煉化痰。天癸得來。出之當預也為

大熟地 懷山藥 當歸身 茯苓塊 山萸肉 紫石英 丹皮 澤瀉 河車膠 此方適增鬱助陰火耳。此

陰火。即鬱熱也。

年方二七。長者呵責受驚。即起癩厥。驚氣內應足厥陰肝。述前先見頭搖。病發仰極反弓。是厥逆內風。由前上胸起。必喟然嘆者。氣胃膈中神識自蒙蔽也。小洩通利得甦者。小腸赤府泄濁。心胞蒙神下降也。是證當理手足厥陰。諒施鍼刺。以宣其絡。服藥未易有功。是不僅有驚邪也。肝氣入心。思未定。突然一驚。必正值憂思

以致如此。洩通得甦者。肺氣化則肝有所制。心氣得降也。治宜從心。肺氣化設法。

至寶丹半丸化服 能宣化膈中陽氣。兼鎮痰涎。於驚邪甚合

痘後。四肢瘍毒。延綿日久。聚集環跳膝跗。經云脾有病其氣留於兩脾 以致不能行

走。乃沈疴難愈之疾。據述筋粗強硬。不司舒展。津耗氣虛而邪陷之。濕熱轉見虛燥名曰疹筋 內經

病能篇。筋縱筋弛。分寒溼溼熱之異。但痘漿未化之毒。混處血脈絡間。兩年之久。攻之決不應病。夫四肢血少氣多。初患當取陽明。今已流入陰分。遇風

冷輒痛。溫通逐邪。理亦可通。然男子未通精之歲。必以生陰爲要務。不盡然。調
理方法。宗錢仲陽麩茸六味。壯陰通陽。可以常進。

麩茸 大熟地 紅花 當歸 枸杞子 杜仲粉 虎脛骨 牛膝
此病總是溼熱內盛。寒束於外。雖爲日已久。仍宜疏散。

解毒。略佐補虛。不可太膩。真津虛煉。而病歸溼熱也。

據述佈痘調理少和。四五年來。不分冬夏。兩膝骨痛。甚於暮夜。必越日
乃解。更述煖熨少安。知寒溼陰氣從下而受。寒溼故痛。但痘後幾更寒暑不
愈。經脈必有留邪之氣。因新邪舉發。論病名曰痺。痺者氣血凝滯之義。古方
活絡逐邪。每施於新感則效。久則邪與氣血混處。取效頗遲。當此長夏發洩
司令。按圖鍼刺。每五日七日一舉。燔鍼治筋痺。最合靈樞法於此病。經絡氣血流行。邪氣難
以容留。徒藥無益。遵古方服活絡丹。即再造丸。

淮安三十九性情古執。氣鈍少靈慧。凡心藏神。腎藏精。少年先病。精神不
易充旺。宜用六味加遠志萸蒲開通心竅腎精。俾得兩相交合。

婦科 胃痛 腹痛 瘕聚

泰興七三卷十十年前。因夜食凝滯閉氣食物。遂胃脘痛。嘔吐。病發。腹大如懷妊。得氣後洩而脹消。經准不孕。來必腹痛。病根全在氣分。用藥必兼祛血分寒凝。乃合病機。

吳茱萸 秦椒 川楝子 高良薑 延胡索 蓬莪朮 生香附 南山楂 生薑搗汁泛丸

厥逆初平。胃口下脘觸着便痛。小便自利。大便黑粘不爽。前者經來暴止。血海恐有凝瘀。議以輕緩通血方法。

丹皮 澤蘭 桃仁 料豆皮 小生地 薑汁

昨日用交加散法。黑血略下。痛緩下移。此瘀濁停留皆爲瘕厥。以致紊亂氣血。奇經失和矣。但心悸舌赤。陰分自虧。宣瘀之藥。多辛善走。擇其辛潤者。進商回生丹。量進半丸。亦對證穩藥。交加散即生地生薑二味

細生地 薑汁 當歸鬚 丹皮 小茴炒 桃仁 料豆皮 芫蔚子

墮胎十八次。衝任奇脈血液無存。厥氣入絡。爲脹爲痛。或時沖逆犯膈。八脈皆不爲用。淹淹漸成損怯。徒欲止痛寬脹。乃不明之論。俗醫皆然。

真鹿胎 枸杞 牛膝 淡菴蓉 當歸身 沙蒺藜 舶茴香 潯桂心

齊門外卷三十

上年產蓐無乳。已見血虛之象。延半年後。經水不來。少腹

痠氣有形。病人自述背脊常冷。心腹中熱。視面黃色奪。問食少不美。夫督脈爲陽脈之海。由腰而起。劑頸而還。下元無力。陽虛背寒。任脈爲陰海之衝。虛攻入絡爲痠。考內經圖翼。病機宛然在目。先生熟讀景岳書決不肯作發揮此產損蓐勞。非是小恙。無如醫不讀書。見寒熱經閉而妄治。淹纏日久。速其篤已。

人參 鹿角膠霜 粗桂枝 當歸小茴炒 枸杞子 沙蒺藜 白薇

少腹痠聚。從左上升。每月事將至。經絡腹脅先痛。自述嗔怒病加。病在肝俞血海。由氣逆血滯。故年逾三旬。未得孕育。下焦時冷。治當理氣血以調經。若縷治病樣。未免太拙。

當歸 川芎 木香 麝香 香附 桃仁 查肉 葱白 延胡索 吳茱萸 川棟子 小茴香

韭白 水泛為丸益母草湯送 可加海螵蛸

瘕結在左腹。形長大。必大便得通。脹滿可減。年前詢病因嗔怒。且久寡多鬱。以泄木調氣得效。今冬又發。用大鍼砂丸十日。白晝頗減。入夜大脹。議通陽泄濁方法。

肉桂 麝香 阿魏 青皮 當歸鬚 郁李仁 川棟子蜜丸

無錫三十任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。問經水仍至。知是氣攻入絡。漸次有形。况產後又十六年不育。衝任之病顯然。

小茴 川棟子 橘核 甜桂枝 逢莪遂 生附子 南山查 雲茯苓

經閉不調 附漏淋

木瀆三十經水不來。是絡脈無血。古云氣旺血自生。大忌通經。

人參 歸身 茯苓 桂心太燥 鹿茸 精羊肉膠和丸

形壯色白。氣虛有痰。痰阻經絡。氣血不通。經事三年不來。古人治此必以調氣爲先。蓋氣爲血帥也。見病治病。終亦無裨。痰亦血之類也。究宜逐痰藥。痰先治氣。雖云治之。以佐。

生台朮 茯苓塊 香附 砂仁 莢藜 製半夏 淡水熬膏臨好以文火燉收清晨開水調服

寒熱因經水不來而甚。此內經謂二陽之病發心脾。女子不月。肌肉日

瘦。腹有動氣。卽風消息賁矣。內損成勞。非通經逐瘀所能愈也。略宜兼用近世凡遇稍虛

者。動云不可攻病。殊不知因病致虛。何一非虛耶。虛何由復。仲景蠶蟲丸方下所列諸證。何一非虛耶。虛何

柏子仁 歸身 白芍 桂枝 桂圓肉 生黃芪

勞煩繼以悲哀。經阻三月。是二陽之病發心脾。

當歸 澤蘭 白芍 川芎 香附 查肉 接服柏子仁丸

問生產頻多。經水失期。此衝脈厥氣直攻心下。引脅。環及少腹。嘔吐黑水。黑爲胃底之水。便出稀黑。乃腸中之水。經年累月。病傷胃憊。何暇見病治

病。務在安眠進食。為議仿仲景胃虛上逆例。此乃血化為水若全虛無地道者。宜大溫補以助通其地道。

又。使舊血去。新血生。又有所泄而不阻矣。

人參 炒半夏 代赭石 茯苓塊 降香 蘇木

滯痰阻經脈之氣。瘀濁阻絡脈之血。病甚難治。每每經水將至之候。必腹痛堅脹。上年用烏骨雞丸。堅脹勢緩痛減。不時舉發。今議治法。經水來時。用回生丹。三四日經過。用後方。但主宣通絡血中氣。可免脹滿之累。案稱難治。必

別有棘手證。括於起二句中。咳嗽。門有烏骨雞丸一案。其即此否耶。

鹿角霜 敗龜版 生香附 熟地炭 南查肉 小茴香 茅朮炭 茯苓塊

用鮑魚汁為丸二字改作吞下

太倉十八 每交夏五六月。喉間宿病俄發。既愈後。仍然鼻塞火升。上熱

下冷。經水或前或後。形瘦。脈小數。是陰弱不旺。肝陽左升太速。右降不及。夏令陰伏於裏。陽泄上浮。乃發病根由。

阿膠 石決明 生地 天冬肉 丹皮 黑豆皮 銀花 白芍藥 丹參 於下冷二字未合

紹興一三少腹痛堅。攻及當臍。每午後必氣脹滯痛。貫串腰尻環跳肉

腠之間。肌膚亦漸浮腫。再問經事愆期。僅得些微黃水。是陰寒已入血絡。病

蓋起於產蓐。累及奇經入脈。身僵不直。俯不能仰。此肝腎入奇經之見證。案語

簡透。此蓋寒溼下受。又兼風者。其膚腫。即血化為水。金匱所謂

水分也。宜用辛熱疏散。佐以重鎮。使風溼得氣化。分道而出。不

無出路。邪

炒枯腎氣湯腎氣已非。炒枯何用。 流貞巷九四漏經。繼下如卵形。已見血損氣結。按任脈為病。女子帶下

瘦聚。少腹形象是也。血傷忌投氣燥溫熱。極是但血藥不取。沈滯。更血中宣氣

為是。

南山查 芫蔚子 青葱 新絳 生香附

向來經水不調。衝任脈病。醫未明奇經脈絡。久治無功。後患陰瘡延虛

經來色淡淋漓。少腹攻觸疔痛。晨必痲泄。當通陽攝陰。非破洩真氣偏寒偏熱之治。總恐有瘵。痕泄是氣血不和。肝氣下陷不固。當升反降。

鹿角霜

補骨脂

炒當歸

小茴香炒黑

白茯苓

炒川椒

紫石英

淡肉蓯蓉

通陽總不宜此味。質賦雖不

及熱地。而鹹味傷心肺之陽過之

無錫

三十九卷

秋七月經停幾兩月。繼下血塊。疑是小產。遂經漏不止。入冬

血淨。加五心脊椎骨熱。天明微汗熱緩。凡經漏胎走下元真陰先損。任脈陰

海少液。督脈陽海氣升。所謂陰虛生熱矣。以肝腎藏陰精血損傷。醫投芪朮

呆守中土。陳脩園是也是不究陰陽氣血。不亦左乎。

人參

阿膠

建蓮肉

茯神

女貞子

萸肉

生白芍

炙草

糯稻根

常熟

三十一卷

寡居無歡悅之念。肝膽中氣火鬱勃。直上直下。莫能制伏。失

其疎泄之用。小洩成淋。謂肝脈環遶陰竅。用龍膽瀉肝法。

此木鬱土中。陽明之氣而下。隨

壓也。有升降而無出入。須設法廣疏以平其勢。豈非大逆。直

龍膽草 黃芩 梔子 當歸 生地 柴胡 澤瀉 木通 甘草 車前子

脈左數。上熱下冷。淋帶不止。此內熱溼鬱。久則元虛。

花波羅滑 爲末漿丸 卽珍珠粉丸 三錢 孕婦忌服

孕育已十一胎。未到七七。天癸已絕。八脈不司約束。脊腰痠痛。足跗骨中麻痺。問有帶淋。畏熱。此屬陰虛。虎潛法治之。

熟地 龜版 虎骨膠 知母 當歸 白芍 黃柏 牛膝

妊娠雜病

槐樹巷 廿三 自乳能令陰傷。秋初巔脹失血。是肝火上衝使然。今妊身三月。法當養陰固胎。

人參 子芩 阿膠 桑寄生 白芍 黑殼建蓮

脈右虛左弦。身麻肢冷。胎沖。脹悶不饑。吞酸。由中虛肝氣內動之因。五月當脾胃司胎。又體質不受苦寒。非清火酸泄氣分之法所宜。

人參 炒半夏 枳殼 桔梗 薑汁

妊娠八九月。胎吸母氣。陽擾煩蒸。心痛引入少腹。謂之子懸。失治有三
沖三激之累。

柏子仁 天冬肉 女貞實 茯神 生地 真陳阿膠

中由吉巷廿八案佚。

人參 北沙參 茯神 青葙 真紋銀

女科有胎氣。以立基爲要。惡阻嘔吐酸味。宜安胃調氣。方失。此案前方無

近。揣前方意在安胎。與此案頗
未審是否。不敢強合。

產後雜病

產後兩三日惡露卽止。下白甚多。明係溼阻。體虛感邪。更瘧半月。食減

氣壅。延久必致虛脫。且擬補虛鎮墜。以治氣逆。氣降進食。庶有生機。鎮逆一固

方可以兼顧。溼滲上蒸。便濁降胃開。固
微苦微酸佐於淡滲。

代赭石煨旋覆花 製半夏 人參 茯苓 新會皮 炒白芍

又服煎湯。逆氣已降。飲食漸進。有向愈之機。然產後肝腎自虛。若不填納。恐沖氣復逆。

大熟地炒砂仁 人參 枸杞子炒 炒白芍 茯苓 生杜仲

又進填納。神氣雖振。寒熱未已。白帶仍下。溼鬱所致。宜用開溼破瘀引邪。以冀瘡止。

青蒿 生鱉甲 茯苓 當歸 炒桃仁 新會皮 生香附分理固是定法。其實起手即可淡溼溫納。調肝脾。通溼瘀。並進更穩。

產後陰傷。寒熱瘡幾兩月。病發白帶淋漓。八脈空隙大著。腹有動瘕。下元虛憊已極。議固下真通脈方。此等動瘕。亦宜先補後攻。氣充自化。即有留瘀。方中桂枝一味。

表裏兼顧。頗有巧思。

人參 鹿角霜 茯苓 歸身 菴蓉 粗桂枝木

產後六日。惡露仍下。每呵欠寒慄。凡進湯必嘔逆。舌粉白有苔。面目四

肢浮腫。兼之消渴。喜得涼飲。胸脘痞悶不饑。此臨產外邪乘虛。竟入厥陰。邪犯陽明。狀如瘧證。但產後虛弱。值冬暖不藏之候。得汗方解。顯然客邪。然柴胡動竭肝陰。決不可用。議和胃清邪一法。柴胡一語。極為靈胎所詆。然細思實有至理。但配合得宜。然

自不必過泥。

製半夏 鬱金 新會皮 天花粉 杏仁 竹茹
可再加入調營衛藥。振衛陽以祛表邪。

產後下虛。血病為多。今脘中痞脹減食不適。全是氣分之病。但調氣寬

中。勿犯下焦為穩。恐有食滯。蘇梗一作蘇木誤。

生香附汁 蘇梗 神麩 豆蔻 桔梗 茯苓

濁氣上逆。惡心不食。冷汗煩躁。最防暴脫。脫象已具不可但執惡露滯滿。而

專泄氣攻血。

人參 淡乾薑 淡附子 澤瀉少用 沖入童便溫固其氣。即能行血。得其要領。自不相礙。

小產後肌肉似乎豐溢。是陽氣發泄。即外有餘。內不足。病樣甚多。何堪

縷治。在女科莫重於調經。氣血逆亂。擾動肝脾。心胸痛發而嘔迷。遇怒着冷痛甚。胃陽已衰。厥濁易逆。先理胃陽。用金匱法。

人參 吳茱萸 茯苓 半夏 良薑

產後絡脈傷。腹痛頻發。嗔怒食物不宜則甚。當調和脈絡。庶不延成痼疾。宜葱白丸。

產後腫脹不愈。顯然下焦先虛。肝腎氣散。不主收納。形寒痞悶。食少痰多。形消肉削。治從溫納。分利攻消非法。

濟生腎氣丸三錢 磨沈香汁三分沖開水送

產後下焦先虧。腰脊加痠。肛墜不爽。此乃腎虛不攝。痢血與脾病迥異。攝固其陰。略兼通腑。

熟地炭 五味子 茯神 炒白芍 炙甘草 炒查肉

產後腹堅有形。氣聚不通。漸成脹滿。乃衝脈爲病。其大便秘阻。血藥潤

滑不應。柔膩氣愈凝滯。攷徐之才云。腎惡燥。以辛溫之。

當歸身 精羊肉 舶茴香 老生薑

萬年橋廿八 半產重於正產。左脅下瘕形。小產傷胞系是氣乘肝絡。攻之則

變為中滿。從前有震動胎墜嘔逆。寒熱之傷。今當培養氣血。正旺則瘕自消。不可怠忽。致延勞怯。

當歸 白芍 蟹血製柴胡 茯苓 蒸於朮 南棗 炙甘草

方 此血痺之證。產蓐百脈皆動。春寒凜冽。客氣乘隙。襲入經絡。始而熱勝。繼則寒多。邪轉陷於陰絡。致夜分偏劇。汗多神昏譫語。由邪逼神明。豈是小病。正如仲景刮汗亡陽驚譫同例。議救逆湯減芍藥方治。寒多減芍藥。是仲景法。胎損。陰損於下。厥陽上泛。久有夙病癩證。心營肺衛。最易蒙蔽。是神志或昏或清。皆夾雜夙疾。惡露自行。豈是瘀痺。姑用輕法以開上高。

枇杷葉 薏苡仁 杏仁 通草 雲苓

蓐勞

與上篇合看

產後十三日。診脈數疾。上湧下垂。此血去陰傷。孤陽上冒。內風燔燎。肝魂不寧。面赤頭痛。晝輕夜重。陰弱陽亢。上實下虛。若不按法施治。必增瘕瘕。厥逆。議鹹潤益下和陽方。

小生地 生牡蠣 淮小麥 阿膠 麥冬 元參

產後下損。八脈交虛。形寒內熱。骨痛耳鳴。血液日耗。生氣不充。冬季不得復元。春深發泄。司令延為勞瘵矣。

杞子 歸身 紫石英 沙蒺藜 茯神 蓮肉

蓐勞下損。損及八脈。醫投清內熱滋陰。致胃傷食減。寒熱下焦。沖氣上逆。而咳嗽。藥惟治肺。與下虛內損。竝無干涉。帶淋骨熱。髓竭液枯。蓐損較平常。損怯更難。寒暑更迭不復。草木焉能奏功。勉與血肉有情。望其加穀。望其悠久。

鮮河車具一 人乳八兩 生紫石英三兩 血餘灰三兩 秋石一兩 人參煎湯送錢二

秋石總嫌太鹹。細審內經味過於鹹諸條可悟。

流貞巷

七卷十

上年五箇月小產二次。再加冬季服事病人。產虛在陰。勞

傷在陽。此欬嗽吐粘濁氣逆嘔食之由來也。凡食入胃傳陽。此欬是下虛不納。氣衝湧水上泛。胃乏運行。食亦繼出。奈庸工不明傷損。陰中之陽僅僅消

痰清肺。一派寒涼。必致胃倒敗壞。

近日此風盛行。勞病所以日多也。

桂苓甘味湯

下焦陰虧不攝。裏熱泄瀉。厥陽上泛。頭痛。又產後兼病損。

凡裏熱肝泄瀉氣

妄行。故上泛則變為頭痛。治宜疏土增水以涵木。

甘草 熟地 茯神 芡實 山藥 建蓮 川斛

蓐勞下虛溏泄。近有風溫。咳嗽發熱。暫用手太陰上焦藥四五日。

桑葉 沙參 麥冬 玉竹 甘草 扁豆 此方風溫則可。若風寒是逼入勞損矣。

久瀉無不傷腎。况兼產後起因。補中必當理下。是為脾腎兩補。

五味子 生杜仲 雲茯苓 杜芡實 兔絲粉 臺人參 補骨脂 焦白朮

產後五十餘日。腹滿不減。臍脹愈甚。二便不爽。此因下焦空虛。腑陽失氣化之司。先宜通陽。得脹勢稍緩。再議。方用五苓加椒目。不必加。

產後脈虛。舌白。背寒凜。身痛乾咳。不饑。是血氣兩損。不肯復元。有尋勞之慮。急當培養。足三陰臟。莫以肺經咳嗽治。再伐胃氣。用貞元飲方。又是景岳方。

熟地 歸身 炙草 茯苓 杞子 桂圓肉 饑時服

馬元儀先生

馬元儀。蘇州人。所著有馬師津梁八卷。是編前有雍正壬子汪濂夫序。稱元儀受學於雲間李士材。西昌喻嘉言。二人皆國初人。則元儀著書。當在康熙初矣。見四庫提要。

馬元儀醫案目錄

傷寒	一
瘡疾	六
痢疾	九
欬嗽	三
喘急	三
痺痛拘攣	五
鬱勞隔塞	六
胎前	三
產後	三
經帶	五

馬元儀醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

皖南建德後學周學海評注

傷寒

傷寒六日。兩脈微弱。面垢遺尿。自汗譫語。身重不能轉側。此三陽合病也。汗下兩不可用。發汗則偏於陽而津液傷。攻下則偏於陰而真氣損。惟有白虎一法。主解熱而不礙表裏。誠為善法。但三陽病。脈當浮大。今微弱不起。以邪熱抑遏。不得外達。非陽衰脈微之比。待清其壅。則脈自起耳。雖曰三陽

明氣實。太陽氣虛。專用白虎。究未甚合。論脈有識。張石頑曰。先生為石頑門人。其學出於東垣。細讀此書。理治。便見。張石頑曰。先生虎湯。雖主三陽合病。而實溫熱主方。設以此誤治。傷寒合病。不必不可救。蓋三陽合病。有化熱未化熱之分。即化熱。亦有熱盛不盛之辨。所謂熱盛即治同溫病矣。

石膏 知母 甘草 粳米

年逾古稀。惡寒發熱。有如瘧狀。遷延月餘。神昏食少。舌胎黑刺。少腹腫痛。上連胸脅。診兩脈弦濇而結。尺中倍弱。此內傷重。外感輕。得之勞倦。且鬱病在肝脾二經也。勞則傷肝。鬱能傷脾。肝脾氣血兩傷。邪氣內結。治宜顧慮元氣。而兼治邪。

此津液枯而絡有畜血。宜桂枝加紅花。再入甘涼生津。

人參 桂枝 黃連 肉桂 半夏 泡薑

桂枝連半。能通絡中畜血。

服後。神氣清爽。但津液尙枯。虛熱內甚。進以滋燥清熱。

人參 黃連 生首烏 半麩 杏仁 枳實 甘蔗汁 蘆根汁

首烏生者。味極苦濇。與木瓜近。可用以剝肝。

絡之痰。除脅痛胸滿。生津非所長也。

發熱七日。神氣昏憤。語言譫妄。按其心胸間。痛不可近。診其脈。左三部虛濇。右關尺微弱無神。此脈不應證。中痛爲實。脈微弱爲虛。發熱譫語爲陽。而脈虛濇爲陰。證陽脈陰。證實脈虛。皆爲難治。所謂枝葉未害而本實先撥也。當峻補元氣。以俟氣充而邪解。擬桂附理中湯。

心胸間痛。是熱痰凝結。

者。亦令脈氣瀯弱。故常謂痛脈屬氣。多弦動。屬痰血食滯者多瀯弱。

人參 炙草

乾薑

附子

白朮

肉桂

薑桂必脈細緊乃合。拒按。屬寒結者。亦可。胸

傷寒數日。面赤躁煩。手足搖擗。起臥不安。口燥渴。大便結。診其脈。虛瀯兼結。夫瀯則傷陰。結則氣滯。得之憂思勞鬱。肺胃交傷。津液虧而虛邪結也。治須大劑滋解。

瓜蒌仁

枳殼

秦艽

杜蘇子

半夏麵

桔梗

杏仁

紫苑茸

傷寒十餘日。胸中滿結。讖語神昏。舌胎黑刺。診脈虛瀯無神。此積勞陰傷。以致邪氣內結。證頗危急。夫胎刺胸滿讖語。種種陽證。至切脈。虛為氣虛。瀯為陰傷。脈病若出兩途。證陽脈陰。法在不治。生死關頭。用藥未易易也。

瓜蒌仁

桂枝

桔梗

杏仁

枳殼

蘇子

製半夏

淡乾薑

見證俱是津枯血乾之象。治宜生津行瘀。

方中薑半未合。可改用蒲黃。仲景瀉心法。乃與芩連並用。

發熱神昏譫語胸滿。舌胎黑刺。面色枯瘁。時有喘咳。日晡益甚。此肝木

內鼓。心火上炎。肺金失養。而胃土無滋也。爲定開結滋燥法。

瓜萸仁 枳殼 桃仁 蘇子 杏仁 半夏麩 蘆根

服後。倦臥片時。神氣頗清。右脈亦透。但瀋象不減。重按少神。舌上胎刺。去而復生。雖有轉機。但津液元氣枯竭之極。所恐者。藥之假。不能濟其真水火也。轉用。

人參 生首烏 知母 生地 川連 蘆根

兩劑後。瀋象漸減。胸滿頓釋。面色轉澤。眠睡頗安。但舌胎未盡去。中脘以下尙有滯悶。此上焦津液雖回。而中州運化失職也。

前方加 枳實 山楂 一劑而中滿釋。轉用 人參 石斛 茯神 桑仁 歸身 白芍 橘紅

貝母 生地 炙草 麥冬 川連 用養液之藥。而邪得外達。可見治溫熱。始異終同。

服後。周身發疹。表間微熱。此餘邪盡從外達用。

荊芥 大力 乾葛 防風 杏仁 桔梗 前胡 蘇子 薄荷

諸症悉已用

人參 製首烏 白芍 茯苓 鱉甲 丹皮 石斛 半麴 甘草

發熱半月。神昏錯語。面色青中帶黑。診其脈浮之虛。沉之濇。乃津液元氣兩虧之候。法宜補氣則陰火自斂。養陰則神氣自爽。

人參 熟首烏 枳殼 茯神 廣皮 半麴 桔梗 丹皮

二劑後加 白芍 歸身 川石斛

因偶患風寒。誤投麻黃。汗出不止。語音短怯。神氣不收。面色枯白。時有寒熱。診其脈微濇而虛。虛則氣少。濇則陰傷。此元氣津液兩傷之候也。蓋麻黃辛溫。爲發汗重劑。不當用而用之。不特劫其津液外亡。并元氣亦從之內脫。以胃中元氣。卽寄養於津液之中也。神失不收者。汗爲心之液。心者神之宅。汗多則并傷其臟。而神爲之不收矣。時有寒熱者。氣入而陽往乘陰。陰虛不勝。則熱。頃之氣出。而陰復乘陽。陽虛不勝。則寒。陰陽兩不足。則更實更虛。

而不循尺度也。今之治法當陰陽兩補。

人參 茯苓 製首烏 炙草 廣皮 半麩 白芍 丹皮

發熱惡寒。口渴胸滿。身疼中痛。晝夜煩躁。診得兩脈虛澹。此積勞積鬱積虛之候。勞則虛其中。鬱則傷其上。虛則衰其下。由是風寒之邪乘虛內陷。乃生寒邪。邪氣既張。正氣愈虛。血不得榮。面色則黑。以陰氣素虧。則為口渴煩躁。以中氣素虧。則為胸滿中痛。晝夜不寧。夫邪因氣入者。非解鬱則風不出。邪因虛陷者。非補虛則邪不達。治法先滋其上。次和其中。次補其虛。轉機用法。斯為善治。三法次第。亦難板分。觀後方可知。胸滿已見裏證。和中即兼補下。惡寒是有表邪。滋上即兼和中。

法疏表而裏氣自降。

瓜蒞實 泡薑 枳殼 桂枝 桔梗 半夏 杏仁 蘇子 從小陷胸諸瀉心法化出。

服後寒熱稍減。胸滿稍釋。而中痛未已。轉用

人參 桂枝 淡薑 川連 枳實 厚樸 半夏 炙草 以此治中痛。即瀉心湯法。

服後諸症悉退。惟大便燥結不行。此勞鬱所傷。下中二焦之氣。漸次安和。而下焦積虧之陰未復也。

人參 秦芩 杏仁 製首烏 蘇子 廣皮 枳殼 半麩 方不是復下焦之陰。何也。

發熱惡寒。頭身俱痛。口中燥渴。時自譫語。兩脈洪數而瀉。此是外感。而病勢轉危者。以五志過極。陰氣素虧。邪復乘之。重傷其陰。而火熱愈甚也。用解肌湯

服一劑。惡寒得已。發熱未除。讖語轉增。神魂飛越。是陰虛陽亢。法當養肝之陰。

生地 知母 甘草 茯神 丹參 貝母 花粉

傷寒四五日。兩脈微虛。神氣昏亂。躁煩不寧。時欲得水。復置不飲。棄衣而走。勇力倍於平時。言語狂妄。不避親疎。知為羣陰格陽。欲脫外顯假熱。內伏真寒也。人參理中湯。陽餘於上。不知當日何以參用。且此方明是理中。不能

訂之書。竊怪案多雷同。方無變化。令人可詫。

傷寒。下利。吐逆。煩躁。手足厥冷。脈微欲絕。此腎中真陽素虧。外邪入之內。寒與外寒相合。由是陰氣上逆而為吐。下逆而為利。陽氣外越則煩躁。內鬱則肢寒也。仲景云。少陰病吐利煩躁。四逆者死。正以吐利並見。陰氣之上攻。下徹已極。加以煩躁四逆。虛陽不能主事。其為中州氣敗可知。軀殼之中。有陰氣。無陽氣。物其能長乎。不得已。用白通湯。仗通脈救陽之力。以冀挽回。若得脈微續。則生之機也。

葱白 乾薑 附子

頭痛發熱。口乾便秘。不得安臥。此邪風外熾。實熱內燔。表裏邪結之候。當上下分消其勢。表裏交治其邪。斯汗不傷表。下不傷裏。此陽明實證。與傷寒於風溫。與傷寒

異治。當甘寒清裏。而表自通也。

防風 荊芥 薄荷 大黃 芒硝 山梔 石膏 桔梗 滑石 黃芩 連翹 方有本通領

散也

發熱中痛。譫語神昏。右寸獨鼓。餘脈虛濇。此元氣積虧。津液枯槁。虛邪為之內結。得之悒鬱勞倦所傷也。於此而補虛則熱不除。治邪則虛不任。庶幾先固根蒂。佐以治邪。可圖萬一。

人參 桂枝 黃連 乾薑 枳實 厚樸 半夏 炙草

服後神氣清爽。津液未回。當即從事於陰。

人參 生首烏 川連 知母 橘紅 半夏 梨肉汁 蔗漿 蘆根汁

發熱惡寒。口燥煩渴。胸滿中痛。兩脈虛微。此真陽大虧。虛邪入客。若無煩渴等症。但需溫藥。今陽病適當陰虛。治陽之中。不得不顧慮其陰。為權衡於其際。而得一法。滋陰之燥。毋使擾陽。養陽之虛。不使賊陰。

瓜萋仁 淡乾薑 桂枝 枳殼 半夏

服後口燥已。煩渴解。此陰氣得滋之驗。可從事於陽。

人參 桂枝 淡薑 川連 肉桂 厚樸 炙草 枳實 方案均與前同。似此重複。並存無謂。

寒熱數日。中痛嘔逆。胸滿身疼。左脈弦濇。右關尺虛微。此中氣虛寒陰道長而陽道消。是以胸中之陽不化而為滿。胃中之陽不布而為嘔。衛外之陽不固而為痛。夫陽微之處。即陰盛之處。而陽微之故。則由於胃氣虛損而生發之。令不行也。當行溫補之法。

人參 白朮 茯苓 炙草 肉桂 川連 附子

發熱喘急。頭痛下引胸脅。晝夜不安。面赤不渴。二便如常。左脈弦虛。右脈空大。此無形之感。挾有形之痰。表裏合邪。互結於胸脅之位也。口不渴者。外邪挾飲上逆。不待飲水自救也。二便調者。病在胸脅。猶未擾亂中州也。仲景治傷寒。表不解。心下有水氣。欬而微喘發熱不渴。小青龍湯主之。今倣此治。

傷寒六七日。譫語狂妄。不知人事。時自喘嗽。兩脈微弦。按之則濇。此邪

熱內熾。而火邪入肺也。脈應數大。而反弦濇。是爲陽證得陰脈。法在不治。所冀者。津液雖虧。而元氣猶堪支持。或可背城借一耳。

瓜萸仁 桂枝 枳實 半夏 蘇子 杏仁 黃連 秦朮 陳胆星

傷寒六七日。發熱煩躁。面赤如妝。診其脈。左浮弦兼濇。右寸獨大。關尺虛微。此陰盛格陽。外顯假熱。內伏真寒也。用參附理中湯。

發熱煩躁。胸滿中痛。足寒。自汗不寐。口燥不欲飲。診其脈。右虛微。此邪氣阻滯中焦。以致陰陽不通。上下不化也。仲景云。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。以其胃中有邪氣。阻遏陰陽升降之機。由是陽不降而胸中熱。陰不升而腹中痛。故用此以和解中焦。而敷布胃氣。所謂欲通上下。交陰陽。必先治其中也。今者元氣素虧。邪氣得以直入陽明。阻塞上下。故口燥胸滿者。陽獨治於上也。足寒腹痛者。陰獨治於下也。陰陽既乖如此。正宜用黃連湯以交通上下。但以煩躁自汗脈虛。陰陽且有相脫之機。必

於本方加入肉桂以補虛陽。且倍用人參以助中焦樞握之機。使氣和而運。其陽之在上者。得下通於陰。陰之在下者。得上交於陽。陰陽既和。邪氣自解。且補不傷於滯。攻不慮其峻。爲善法也。

人參 乾薑 肉桂 川連 炙草 桂枝 半夏

發熱錯語。胸滿身疼。脈象結澹。此非傷寒。乃情志發熱。內火鬱蒸津液。今現脈澹則津傷。結則氣滯。當是悒鬱過多。而肺胃受傷也。肺主氣化。胃藏津液。氣結則津枯。津枯則氣益滯。二者理實相因。今之治法。先當清肅肺氣。使下行及胃。以宣布津液。次當滋補胃陽。使上潮及肺。以滋生氣化。自然陰火內熄。神明清爽。而發熱錯語之證自愈矣。總不能無外感也。不然何以身痛也。

紫苑 葛根 枳殼 桔梗 半麴 杏仁 秦朮 柴胡

寒熱彌月不差。胸中有塊高突。按之則痛。時見厥逆。兼多自汗。診其脈右三部虛微。按之如絲。此證實脈虛。邪實正衰之候也。攻補俱屬棘手。然不

用補則正愈虛而邪愈結矣。養正祛邪。古人豈欺我哉。補並用。有識力。凡氣攻血證。邪在血分。不相礙。補。

人參 炙草 泡薑 黃連 半夏 桂枝

頭痛身痛。口燥煩渴。發熱惡寒。自胸及少腹作痛。手不可按。病經七日。兩脈弦濇。此表裏俱病。陰陽同感。正屬少陰厥陰兩感之候。欲救其表。而口燥煩渴腹痛。裏證不為不急。欲救其裏。而發熱惡寒頭身俱痛。表證俱在。雖古人云。兩感之病。救表則用桂枝救裏則用四逆。今燥渴若此其甚。又非桂枝薑附可獨行其事者。據證。此非兩感。案語意游移。且古人四逆救裏是。又云厥穀。非此之燥渴實痛。可擬。

瓜蒌實 乾薑 桂枝 半夏 杏仁 蘇子方意重在陽明太陰。厥少兩陰何涉。

服二劑。脈氣漸透。口燥寒熱俱已。惟腹痛不減。此陽邪易散。而陰氣難解也。與附桂理中湯。服前方。濁氣上蒸於肺。則前證顯係胃中溼痰。

病經一月。兩脈虛浮。自汗惡氣。此衛虛陽弱。人身之表。衛氣主之。凡所以溫分肉。肥腠理。司開闔者。皆此衛氣之用。故經曰陽者衛外而為固也。今衛氣一虛。則分肉不溫。腠理不密。周身毛竅。有開無合。由是風之外入。汗之內出。其孰從而拒之。用黃芪建中湯。以建立中氣。而溫衛實表也。

桂枝 生薑 芍藥 甘草 大棗 飴糖 黃芪

越一日。病者叉手自冒心間。脈之虛濇特甚。此汗出過多。而心陽受傷

也。仲景云。發汗過多。病人叉手自冒心。心下悸者。桂枝甘草湯主之。此所以有變者

以前方多辛散而缺收斂。為不知養榮以存衛也。黃芪建中。是鼓營以通衛脈。浮虛者。營不任鼓矣。既無心悸。即不當用此方。幸有鼓營矣。能合甘草生津以存陰。心苦緩。辛甘益陽。神明飛越。何不急加酸斂。經曰。心苦緩。急食酸以收之。

桂枝 甘草 大棗

病經一月。口燥咽乾。胸滿不能飲食。二便俱閉。診其脈虛而且濇。此少陰客熱。腎經虛燥也。腎開竅於二陰。腎氣既虧。竅不滑澤。所以二便俱閉。少

津除
滿。

陰之脈。循喉嚨。挾舌本。腎熱則經絡亦熱。所以口燥咽乾。腎者胃之關也。關門不利。胃氣亦爲之阻。所以胸滿不能飲食。當用仲景猪膚湯治之。夫猪水畜也。其氣先入腎。膚味甘寒。能解少陰客熱。故以爲君。加白蜜以潤燥除煩。白粉以補虛益氣也。

小便全閉者。氣化不運也。點上潔者。瀉痛者。此能生津。

胸中滿。結作痛。飲食則嘔。嘔甚則痰涎湧出。多成五色。更醫數手。或主攻剋。或主補虛。卒無一效。診之兩關尺微。少神。體倦神煩。胸中結痛。按之愈甚。此正氣內傷。陰邪內結。攻之既足以傷其氣。補之又適以滯其邪。當以仲景藏結法治之。用黃連湯加桂一錢。

晝夜發熱。煩渴引飲。焦躁不寧。診其脈細數而急。尺脈帶弦。神氣不清。此房勞過度。真陰受傷。陽往乘之也。且燥渴身熱神昏。火邪內擾。外淫已極。當此盛夏。火炎土燥。垂絕之陰。其足以供燔灼乎。若不急救。陰氣益消。陽氣

益長。大事去矣。

生首烏 黃連 知母 柴胡 枳殼 半夏 橘紅 枳柴 橘半 難任 訓救 也 且 仲景 效。殊。不。可。解。而。二。劑。有。

服二劑。神氣清。熱勢減。轉用

人參 製首烏 鱉甲 丹皮 甘草 白菊

寒則戰慄。熱則躁煩。口渴引飲。胸滿中痛。其脈左三部弦濇。右三部微濇。其原起於勞腎且鬱。以致陰陽兩虧。而虛邪內陷也。

人參 桂枝 泡薑 川連 枳實 厚樸 半夏

服二劑。右脈已透。寒熱少可。而躁煩口渴未已。蓋緣陽分之邪。已從外達。而陰虛之象尙在。燥結不解。則當轉溫法。而用滋法。易陽劑。而用陰劑。然後陰陽兩和。而邪氣無所容矣。

滲陽邪。傷寒久鬱化熱者。然溫熱亦常用竹葉石膏。是在神明以辛溫淡。

傷寒先治溫。用若辛溫。散用甘寒。輕揚。馬先治熱。

人參 生首烏 桂枝 枳實 半夏 黃連 杏仁 蘇子

服後大便得通，煩渴即已，復用

人參 製首烏 半糲 茯苓 甘草 柴胡 鼈甲 丹皮

惡寒發熱，倦怠懶言，神氣怯弱，兩脈虛弦。此甲木內鬱，生氣不榮，陽明受病也。蓋甲木乃少陽初生之氣，勾萌始坼，其體柔脆。一有怫鬱，即萎軟遏抑，而不能上升，則下尅脾土，亦病矣。二臟受病，樞機不利，虛邪從之，入與陰爭，則寒。頃之既出，而與陽爭，則熱。倦怠者，乃胃病，而約束之機關不利也。神怯者，乃本病，而心藏之神明失養也。是皆木鬱土衰之故。木氣既鬱，惟和風可以達之。陰雨可以滋之。逍遙散

柴胡 當歸酒炒 白芍酒炒 茯苓 炙草 白朮土炒 加煨薑薄荷

右傷寒諸方，多從瀉心陷胸諸方套出。且諸案重複不厭者，予始頗疑之。繼讀張石頑傷寒緒論，有論傷寒多兼溼熱一條，其義正與此合。蓋南方地氣溼熱薰蒸，人體本氣虛多痰，一受風寒，便與溼痰相

結。狠。狠。爲。奸。況。人。情。初。病。勢。微。忽。不。加。意。及。至。困。頓。始。延。醫。治。已。在。三。四。日。後。矣。此。時。麻。桂。固。無。所。用。即。白。虎。止。走。氣。分。承。氣。止。行。中。焦。且。溼。鬱。於。中。大。便。未。燥。也。獨。有。陷。胸。瀉。心。能。從。上。焦。清。氣。之。分。瀉。其。濁。氣。痰。涎。過。中。焦。而。直。下。清。裏。透。表。最。合。病。情。因。其。寒。熱。虛。實。之。微。甚。而。加。減。用。之。無。不。如。志。此。先。生。爲。傷。寒。特。闢。一。法。門。也。是。起。手。即。從。病。之。中。半。截。用。法。不。待。誤。治。即。從。救。誤。法。治。之。蓋。其。人。苟。氣。壯。無。痰。風。寒。感。冒。往。往。遷。延。自。愈。至。於。病。困。延。醫。多。係。挾。痰。爲。患。矣。故。南。方。傷。寒。難。治。於。北。先。生。案。中。屢。書。不。厭。正。其。親。切。示。人。也。

瘧疾

患瘧症中痛逆滿。口乾。胸中有塊。結硬如石。下半徹冷。脈弦虛兼瀼。弦爲肝邪。虛爲氣虛。瀼爲陰傷。此營衛交虧。虛邪內陷。陽浮上。陰伏下。寒熱不可獨行。攻補難於偏任。治宜補正散邪。交通上下。

此乃寒溼下受。痰飲中下。宜用辛

泄。通。溫。

- 人參
- 泡薑
- 黃連
- 肉桂
- 桂枝
- 炙草
- 半夏
- 厚樸
- 枳實

寒則戰慄。熱則躁煩。兩脈虛滑。得之風暑痰滯所傷。表裏俱實。陰陽俱病也。勢雖危困。而證脈有餘。可能攻達。

蘇葉 葛根 柴胡 知母 石膏 黃芩 白朮 厚樸 檳榔 生薑 橘紅 半夏 此專治

裏之邪。但瘧起於下焦。寒溼者多。宜詳察之。

寒熱似瘧。胸滿中痛。下半徹冷。兩脈弦虛帶瀼。此七情饑飽房室。內虛藏氣。以致經絡虧損。虛邪內結。非汗之則邪不解。非補之則邪不伏。此案並方均與首案同

人參 桂枝 泡薑 黃連 枳實 半夏 厚樸 肉桂 炙草

痢疾

年逾古稀。下痢膿血。調治半載。尙不能差。診其脈。左見弦瀼。右關尺微。按之則幾微若絕。此脾腎俱勞之候也。脾主轉輸。腎主二陰。二臟不治。將何以爲健運蟄藏之本。所喜者發言清越。神氣明爽。擬用參附湯。

下痢呃逆。兩足徹冷。兩脈虛微。此火衰於下。土虛於中。因之升降失常。

而輸泄無度。飲食所生之津液。不能四布而反下泄矣。當大劑溫補。以恢復元氣。擬桂附理中湯。

腹痛下痢。此溼熱傷脾。利久而積氣上攻於胃。致飲食不進。幸服黃連清溼熱之藥。而利止食進。但補之太早。餘邪未盡蘊蓄於腸胃之中。所以不飢而食不得進。脈息左手弦數。右手滑大。係胃中溼痰積滯。尙未清爽也。法當和胃理氣。疎肝清熱之藥治之。是方論俱佳。方味尤妙。用在補藥之後。

黃連 木香 半夏 廣皮 枳殼 青皮 白芍

欬嗽

欬嗽經久。語聲低怯。面色黧黑。痰氣腥穢。診其脈。浮虛且濇。此陰氣內傷。風邪外襲。邪正相搏。氣湊於肺故也。蓋語言低怯者。肺為金象。金空則鳴。邪氣入之。則金反實也。面色黧黑者。肺合毛皮。其榮在外。邪客於中。則血不華也。脈浮為虛風。脈濇為陰傷。表邪與內燥相合。即係風燥。二邪為病。不當

但。從。表。散。一。法。以。風。劑。多。燥。轉。能。耗。液。為。害。愈。逆。也。然。使。以。苦。寒。之。劑。治。火。而。遺。風。則。不。但。壅。遏。外。風。為。逆。且。苦。從。火。化。而。亦。傷。血。以。氣。結。津。枯。之。體。尙。堪。重。奪。其。血。而。益。其。火。乎。治。法。先。宜。肅。清。肺。氣。氣。清。而。火。降。火。降。而。風。熄。矣。

紫苑

葛根

枳殼

桔梗

杏仁

蘇子

前胡

薄荷

以此為清肅肺氣之劑。不致有如瀉白散之後慮。

後方用

製首烏

蘇子

貝母

杏仁

桔梗

甘草

花粉

瓜蒌仁

蔗漿

蘆根

兩寸浮大。關尺虛小。欬嗽夢遺。面色枯白。不任風寒。此衛外之真陽不固。腎中之真陰又弱。當擬玉屏風散。以益其氣而充腠理。早進七味丸。以養腎氣而主蟄藏。兼服大造歸脾丸。以補心脾而充血氣。

欬嗽。食減。寒熱自汗。脈空大急疾。此中氣大虧。虛陽不為外固也。陽既不固。陰氣不能獨存。先當固衛外之陽。次補內守之陰。則真氣內振。而虛風可息。

玉屏風散加貝母 杏仁 蘇子 人參 桔梗

喘急

發熱喘急。頭痛引脅。面赤不渴。二便如常。左脈弦虛。右脈空大。此無形之感。挾有形之痰。表裏合邪。互結於胸脅之位也。口不渴者。外邪挾飲上逆。不待引水自救也。二便調者。病在胸脅。猶未擾亂中州也。仲景治法。表不解。心下有水氣。欬而微喘發熱不渴。小青龍主之。方用麻桂以達表散邪。半夏以滌飲收陰。乾薑細辛以散結而分邪。甘草以補土而制水。用芍藥五味之酸收。以馭青龍興雲致雨之力。但使其翻波逐浪。以歸江海。斯在表之邪從汗解。在裏之陰從內消。

此案與傷寒類復外有表寒。束其毛竅。內有水飲。窒其氣腕。

喘嗽氣急。面色枯白。飲食減少。夢泄不禁。兩脈虛微。此真氣上脫。陽氣外散也。面色枯白。脾肺氣衰而不榮也。飲食減少。脾胃氣衰而不化也。夢泄不禁。腎藏氣衰而不固也。

人參 黃芪 肉桂 炙草 茯苓 半夏 橘紅。此病若因喘嗽而致夢泄者。是有外感者。因夢泄者。致喘。直脫而已矣。玩案中嗽急。并方中諸味。是起於外邪內潰也。若脫者。擬方如左。人參附子破故紙杜仲巴戟龍骨牡蠣山萸煎吞黑錫丹。

痰喘發熱。口乾胸滿。身痛惡寒。其脈弦數且濇。此鬱結內傷。風火外熾。邪正相搏。氣湊於肺。肺燥氣逆。痰涎入之。升降不清。齟齬有聲。內經所謂心、肺有病。而呼吸為之不利也。清氣既傷。濁氣上升。津液轉為稠痰。經絡壅塞。遂成是病。治宜清氣潤燥。喘自愈矣。

瓜蒌仁 半夏 枳殼 秦艽 杏仁 桂枝 蘇子

欬嗽多痰。氣逆作喘。不得安枕。自汗少食。其脈虛微無神。此勞倦致傷脾肺。蓋脾為元氣之本。賴穀氣以生。肺為氣化之源。又寄養於脾土者也。有所勞倦。穀氣不盛。則形氣不充。經所云勞則氣耗也。氣與陰火。勢不兩立。氣衰則火自勝。土虛既不能生金。陰火又從而剋之。故喘欬自汗。法當實脾補

肺。

人參 炙芪 炙草 川貝 紫苑 蘇子 杏仁 桔梗 防風 兼進七味丸以培土母

欬嗽半載。喘急不臥。舌燥無津。脈右關尺虛濇無神。此肺腎兩虛也。肺為出氣之路。腎為納氣之府。今腎氣虧乏。吸不歸根。三焦之氣出多入少。所以氣聚於上。而為喘嗽口乾。不得安臥。法當清氣於上。納氣於下。使肺得其清寧。腎復其蟄藏。則氣自納而喘嗽平矣。方用蘇子降氣湯。加 人參 肉桂。 繼用金匱腎氣丸。

脈兩寸浮數。餘俱虛濇。火升痰喘。喉間窒塞。此悒鬱過多。肺金受病。金病則火動。火動則痰生。火痰相搏。氣湊於上。故喘促不寧。而氣道不利。法當舒通肺鬱。肺氣舒則火降痰消。肺鬱起於寒溼。其火乃氣化鬱久而生。凡喉中窒塞。有腎枯肺燥脾溼肝逆胃熱。上干與津液不朝。而大旨只是濁氣。

紫苑 葛根 枳殼 半麩 橘紅 杏仁 蘇子

脈兩寸溢上。右關短濇。欬血逆上。氣急不止。此肺金鬱熱。招風之候也。

肺居上焦而主氣化。其藏潔。其氣肅。以治節一身。今鬱久成火。火動風生。肺為嬌藏。不任燔灼。故欬嗽不寧。失於解透。轉鬱轉甚。氣亂於中。血逆於上。治法。補陰之內。兼行清降。斯為合度。

生地 枇杷葉 川貝 秦艽 牛膝 茜草 炒山查 童便

後以六味地黃湯加 青鉛

痺痛拘攣

手足腫痛。痛處熱。飲食少。面青。肌瘦脈弦細數。此血虛受寒。營不營於中。衛不衛於外。營衛不行。肢節腫痛。病名周痺。是也。治當養血舒筋。疏溼潤燥。俾經絡通暢。則腫消熱退。而痛止矣。痛止後。當大補陰血。實其下元。據脈

燥不能細是溼。數是寒也。此溼盛於內。寒束於外。氣鬱久化燥也。治用苦堅辛散。甚合。

五加皮 蒼朮 當歸 防風 黃柏 紫荊皮 蒼耳子 羌活 紅花 秦艽 米仁

痛減更以

生地 龜板 牛膝 蒼朮 黃柏 蠶沙 蒼耳子 米仁 當歸 秦艽 海桐皮

調理丸方

人參 熟地 枸杞 鹿角膠 黃柏 桂心 澤瀉 蒼耳 虎骨 仙茅 牛膝 蠶沙 茯苓 秦艽

六脈大而無力。手足肢節腫痛。肌肉消瘦。日進粥一碗。月汎兩月一行。此名行痺。

人參 白朮 米仁 當歸 枸杞 杜仲 蒼耳子 附子 秦艽 防風 甘草 黃柏 龜板 晚蠶沙

痛止腫消。改用六君子加

當歸 白芍 米仁 丹參 紅花 石斛 紫荊皮

左膝腫痛。不能行走卓立。大便泄瀉。脈來弦緊。此脾虛有溼熱。凝於經絡。流於下部也。古謂腫屬溼。痛屬火。

蒼朮 黃柏 豬苓 桂枝 五加皮 甘草 防風 木通 米仁 澤瀉 可加牛膝 瓜以引經 木

腫消瀉止用

蒼朮 烏藥 枳子 杜仲 蒼耳子 五加皮 米仁 黃柏 丹參 當歸酒糊爲丸

絡。
右手疼痛。右脈滑。左平。此溼痰生熱。熱生風。治宜化痰清熱。兼流動經

二陳湯加 威靈仙 黃芩 殭蠶 秦艽

手足拘攣。指掉不能屈伸。由氣虛血弱。邪乘虛入。不能束筋骨而利機
關。不可誤作風治。法當大補氣血。既云邪乘虛入。所謂邪者。非溼即風矣。誤字當作專字。且拘攣矣。不當

云不能束筋骨也。雖語病小疵。究血祥愼。

人參 鹿角膠 虎骨 當歸 丹參 地黃 龜板 蒼耳子 五加皮 申薑 紅花 米仁

半身不遂。面赤口喎。唇麻。手足躄拽。脈左大右滑。

二陳湯加 全蠍 殭蠶 天麻 菖蒲 黃芩 紅花 秦艽

加入竹瀝一杯薑汁五小匙一日兩進晚更與大活絡丹 卽人參再造丸

後以歸芍六君加薑汁紅花鈎藤天麻竹瀝

繼用天麻丸全鹿丸以次調理

此證必先疎通經絡。活血調氣。後以補劑收功。

痛痺。手足癱瘓。周身盡痛。不能轉側。口乾煩躁。其脈弦數且澀。此陽明津液不足。則生熱。熱勝則生風。手足癱瘓者。風淫末疾也。口乾煩躁者。火邪內熾也。治宜滋燥清熱。不治風而風自熄矣。

生首烏 生地 黃連 黃芩 秦艽 半夏 桔梗 枳殼

鬱勞隔塞

肌體素豐。然多悒鬱而任勞倦。時覺喉癢。如蟲行皮中狀。閱五載不得愈。兩脈浮虛而沉澀。此陽明氣血不榮。火動生風之候也。體雖盛而內實虧。加以憂勞過度擾其中。是以氣傷而血耗。血耗而風生也。陽明之脈。起於鼻。

交頰中。下循鼻外。挾口環唇。循頰車。上耳前。其支者。從大迎前。下人迎。循喉嚨。入缺盆。是皆陽明所循之路。今者血虛風熾。是諸脈不爲血所榮。而爲風所淫矣。風勝則乾。風行則動。故頭面作癢。喉間乾澇。皆風淫於上之明徵也。用藥之法。不當治風。而當治血。蓋風藥多燥。轉能耗血。血既虛。不堪再虛。故必以治血爲急。血得養而風自熄矣。

天冬 秦艽

白蒺藜

甘菊

蔗漿

蘆根

甘草

宜兼用禽化緩咽法
藥用破血生津。

發熱口乾。胸滿中痛。滴水不得下咽。水入卽吐。脈左弦數且澇。右脈細數而澇。此是鬱結所傷。而成津枯氣滯之症。肺胃肝三經受病也。蓋有鬱結。則火起於胃。淫風及肺。肺受火邪。淫氣於肝。肝暴不受邪。必復轉而傷其胃。二藏一府。互相剋賊。而氣愈鬱。氣鬱其熱則亂。太虛之府。雲霧不清。中和之氣。驥劣有加。水不下咽者。肺金受邪。清肅不行也。水入則吐者。木邪橫肆。胃氣上逆也。發熱口渴者。肝風內鼓。兼以外風入而增其勢也。然肝氣雖暴。而

治肝無益也。夫木之剛由金之柔。金之柔由火之熾也。惟滋其燥。則火立解。而金復其剛。木不得不轉為柔矣。由是而胃氣和。則肺氣清。肝氣平。何出納之不自如哉。

此象恐成胃脫。病能曰病胃脫。難者。胃脈當沈細。與此右脈細數而濇正合。

瓜蒌仁 紫苑 枳殼 桔梗 半麩 川貝 杏仁 蘇子 黃連 蘆根

繼與 人參 石斛 川貝 茯苓 製首烏 生地 蘆根 橘紅

場屋不遂。鬱鬱而歸。神識不清。胸滿譫語。上不得入。下不得出。脈虛濇。兼結。此因鬱氣所傷。肺金清肅之氣。不能下行而反上壅。由是木寡於畏。水絕其源。邪火為之內擾。津液為之乾枯。胸中滿結者。氣不得下也。神昏譫語者。火亂於上也。上不得入。下不得出。氣化不清。而顯天地否塞之象也。法宜疏通肺氣。清肅下行。則邪火不擾。而胸滿自愈矣。

既有憂鬱。非專通肺所能見功。

紫苑 乾葛 枳殼 桔梗 杏仁 蘇子

脈上出魚際。此情懷失曠。鬱而成熱。少火化為壯火。久欬食減形瘦。已

是損象。議用逍遙散。養心脾營血。舒肝胆鬱結。主治。

當歸 白芍 茯苓 甘草 丹皮 柴胡 鈎藤 廣皮 大棗

年六十餘。患關格症。上不得食。下不得便。口燥胸滿。已三十餘日矣。診其兩脈。俱虛而澹。此因客邸思家。肺胃之氣。鬱而不宣。鬱久成火。胃中津液。日就消燦。有失升降之常。則上下不交。而成痞塞矣。今之治法。宣通肺鬱。則清肅下行。而燥火可除。滋養胃元。則津液四布。而升降自如矣。

紫苑 瓜蒌實 枳殼 結梗 杏仁 蘇子 半夏 鬱金

憂勞抑鬱。肝木日橫。胃土受剋。蓋司納主胃。必須脾陽鼓動。方得運化耳。今也有形氣衝。必得暖氣而流暢。丹溪所云。上升之氣。自肝而出。其爲肝木侵犯脾胃何疑。所以納穀竟日。仍上湧出口。昔賢云。噎膈反胃。本乎陰枯陽結。良由上逆不下。腸中乏津以潤濡。腕中氣痺不行。漸至窄隘。不堪容物。謂之關格。極難治療。頃閱調攝諸方。或以鎮墜殺蟲。或以辛香耗氣。殊不知

氣洩則津液更枯。鎮重則清陽欲寂。近代喻嘉言法律。已申明之矣。夫曰反者。陰陽錯綜之謂。不知順逆之理。徒以補漏為法。經年之恙。望六之年。生氣日奪。吾恐春木生發正旺而病加。純陽之令而病劇。據理若是。同志以為然否。

人參 黃連 淡附子 淡薑 茯苓 甘草

動怒下血。胃脘刺痛。飲食留中不運。高年恐延噎膈反胃之症。大忌辛燥。宜辛甘以理肝。兼潤燥以開結。

柏子仁 旋覆花 青葱管 桃仁 麻仁 歸身

胎前

妊娠八月。下利二十餘日。利後患小便閉淋。渴而引飲。飲畢。方出滴許。瀉痛異常。診得肺脈獨大。餘脈虛瀉。此火據於肺也。金被火制。氣化不及。州都便溺何由而出。經云。病在下者治上。令上竅越。則下竅自行矣。且妊娠之

體。脈見虛濇。氣血不能養胎可知。若再行趨下。不惟病不除。而且有胎動之

憂。恐是將患肺癰。由于汗下。利後津液大虛。滯脈熱化燥。灼肺成癰矣。觀仲景論

涼疏散。佐以甘潤苦堅。

紫苑 蘇子 乾葛 杏仁 薄荷 枳殼 桔梗

妊娠八月。患利。晝夜四五十行。腹中痛。胎氣攻逆。不思飲食。兩尺沉微。下半徹冷。明係火衰於下。土困於中。五陽乏敷布之道。則水穀之氣。順趨而下。故津液不充。而血脈衰少。胎元失養。而攻逆為患也。夫便膿脈沈。腹痛脈微。均屬危險。今之治法。庶幾舍症而從脈。可以相保。

人參 白朮 附子 乾薑 甘草

產後

產後惡寒。重裊厚被不除。診兩脈沉伏。面赤口燥。此胎前邪伏也。肌表惡寒。是邪熱內鬱。逼陰於外。口乾面赤。是邪火挾食。上凌清道。治宜一表一

裏使從外入者驅而出之於外。從內結者驅而出之於下。表裏兩和。繼商治

本。何以知是胎前伏邪。蓋以新感必見發熱。此證見于表而不純于表。故知是伏邪也。是從重裊厚褥不解及脈沈伏得聞看出。

葛根 防風 蘇梗 桔梗 枳殼 杏仁 蘇子 薄荷

產後一月神氣昏倦。上氣喘急。胸滿作痛。欬嗽發熱。兩脈沉瀼兼結。此胎前已有伏邪。兼以產後氣血兩虛。邪益內結。法宜表裏兩和。使邪從外達氣從內洩。病自愈。

柴胡 桂枝 蘇梗 枳殼 半麴 萊菔子 杏仁 廣皮

服後大便不行。津液內傷。腸胃失養之所致也。

柴胡 桂枝 半夏 瓜蒌仁 枳實 杏仁 桔梗 蘇子 生首烏

產後胸中作痛。痛甚則迫切不能支。延至五月。病轉危急。診脈兩手弦瀼少神。症現不能轉側。不得言語。此陰邪交結胸中。不得宣通也。胸中乃陽氣所治之位。今為陰邪入踞。陰與陽搏。所以作痛。此破氣和血溫補鎮逆諸

法。所以不應耳。不知陰陽適當相結補之。則無益。攻之。則愈結。鎮墜之。則遏抑。生陽而阻滯邪氣。惟交通一法。足以開陽入陰。通上徹下之妙。然後陰歸於下。陽治於上。太陰之府。曠然廓然。何胸痛之有哉。擬仲景黃連湯。加人參肉桂。

產後一月血來不已。厥逆自汗不止。醫以養血補陰之藥。連進不效。診其脈空大無神。此脾腎之真陽內弱。故血無所附。而溢出於外。所謂陽虛陰必走耳。法常大補真陽。以攝陰虛。若養血補陰。恐血未必生。而轉傷陽氣。陽氣傷而陰血愈爲之不守矣。

人參 白朮 附子 茯苓 炙甘草

產後半月。寒熱日甚。頭身俱痛。胸前滿悶。上氣喘急。脈象兩手浮數而搏。此胎前先有伏邪。因產後正氣虛損。邪氣乃竊發也。脈浮數非產後所宜。而與病情適相符合。又非此論。

厚樸 萊菔子 柴胡 枳殼 蘇子 杏仁 葛根 防風 荊芥炭 蘇梗 方不甚合

產後。耳鳴。腰痛。心悸。乃陰不足。陽多亢也。此非陽有餘之比。實陰不配。陽所致。閱所服方。半屬氣辛。皆為流動。已失陰體寧靜之道。古人每以酸甘之補用藥。全在氣味相需耳。

熟地炭 甘草 山藥 茯神 五味 芡實 白芍 女貞

經帶

天癸過多。肢面微腫。熱勝風旋。皆五志之陽未和。恐躁急怫鬱。沖和頗

忌。法以涼肝調和奇脈。微腫。是血燥生風。經曰面腫曰風足。腫曰水。沖和湯。即九味羌活湯。

雄烏骨鷄一隻、洗淨、用青蒿湯、童便各半、醋醇酒各一盞、煮熟、折碎、連骨炙脆、用生地四兩、知母四兩

白芍二兩 麥冬二兩 青蒿四兩 熬膏入白蜜為丸

調經論云。先期為血熱。後期為氣滯。今脈芤帶淋。畏冷。全是體質素虛。元海氣怯。奇脈不固。數年不得孕育。皆原於此。當以生氣有情之屬。通之補

之攝以固之。俾經調脈和。可以宜男。但須情懷怡悅。勿躁急嗔怒爲上。

紫河車 茯苓 人參 歸身 杞子 菴蓉 小茴香 紫石英 桂心 牛膝 熟地 白芍

艾炭 香附

少腹痛滿。厥陰肝病。二便略通利則緩。顯是肝不主乎疏洩。濁陰填塞。痛必不通。年未四九。天癸已斷三年。衝任內虛。液枯氣滯。此苦辛氣剛無效。柴芍白朮動血。升表守中。皆是禁忌。故下咽痛勢加劇矣。議用朱南陽方法。

老韭白根 小茴香 穿山甲 桂枝木 蝦鼠糞 冬葵子

寒熱每來。腰脊必痛。帶淋如注。督帶綱維盡撤。補方必須通脈。

人參 歸身 茯苓 鹿茸 桂心 黃芪 桑螵蛸

煩勞經行。奇經八脈交傷。閃痛氣難呼吸。畏冷。不能屈伸。議用溫通絡。

脈一法。觀首四字。似是天癸已絕之年。煩勞而動經也。以下文溫通及方味揣之。行字又當是閉字。

歸身 小茴香炒 杞子炒 沙蒺藜 鹿角霜 淡菴蓉

久病形神日消。脈象堅大。是謂脈無胃氣矣。曾診於上年夏季。便洩腹痛。食減。舒肝健脾疏補。春進安胃丸。總無效驗。此生氣不至。當女子天癸將通之歲。經脈氣機怫鬱。久逆熱聚。漸為枯涸之象。最足慮也。議用汪石山勞鬱治法。

川芎 歸身 白芍 熟地 青蒿 胡黃連 查炭 香附 此病難以草木治

病是經水不調。致奇脈損傷。如近日腹痛瀉積。陰晦潮疹水。穀不運之。溼過時即解。不必縷治自愈。據述經水已調。納食如昔。但膚腠中忽熱氣逆。必洩氣始安。用補仍以宣通絡脈。不越調經正治。

人參 當歸炒炭 生杜仲 另磨去綿 茯苓 小茴香炒黑 鹿茸 沙蒺藜 淡補骨脂胡桃肉拌炒 蜜丸開水送三錢



A541 212 0018 5083B

中華民國二十三年十一月初版
中華民國廿五年四月再版

葉天士醫案存真

(附馬元儀醫案)

此書有著作權翻印必究

每本大洋八角

外埠酌寄費

編纂者 姚若琴

校閱者 陸淵雷

發行者 吳拯寰

印刷者 三明明印刷廠

總發行所 上海法界呂平街 公司

分發行處 國內國外各埠各大書局

