

醫方類聚卷之一百一十

積聚門二

千金方

堅癥積聚

三台圓治五臟寒熱積聚臏脹腸鳴而不  
不生肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不  
復發食後服五丸飲多者十九常服令人大  
小便調和長肌肉方

大黃熬 前胡各二兩 消石 葶藶 杏仁各一



升厚朴 附子 細辛 半夏各壹兩 茯苓

兩半

右十味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大服五丸稍加至十九以知為度

五石烏頭圓治男子百病虛弱勞冷宿寒久癖及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治之者

鍾乳鍊 硫黃 礬石 紫石英 赤石脂

枳實 甘草 白朮 紫菀 山茱萸

防風 白薇 桔梗 天雄 皂莢 細

辛 菴蓉 人參 附子 藜蘆壹兩 麥

門冬 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心各二

兩 烏頭三兩 厚朴 遠志 茯苓各壹兩 當

歸二兩 棗膏五合 乾地黄一兩十

右三十二味為末蜜和搗五千杵丸如梧

子大酒服十凡日三稍加之

烏頭圓治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆搶心心痛痺悶吐下不止婦人產後

羸瘦方

烏頭十五枚 吳茱萸 蜀椒 乾薑 桂心

各二兩半 乾地黄兩半 前胡 細辛 人參

芎藭 白朮六銖 皂莢 紫苑 白薇

芍藥各十銖

右十五味為末蜜丸如梧子大酒下十九日三稍加以知為度

治心腹疝瘕脅下及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使人腹中冷發甚則上搶心氣滿飲食

喜嘔方

大黃 茯苓各壹兩半 桂心 黃芩 吳茱萸

細辛 人參 蜀椒 乾薑壹兩六銖 男髮灰

半兩 牡丹 甘草 芎藭 菴蓉 蠶蟲各十銖

八兩 芍藥 防葵 蠹蟲 厚朴 半夏各一兩

右二十味為末蜜丸如梧子大服五九日

再漸加之

恒山圓治脅下邪氣積聚往來寒熱如温瘧

方

恒山 蜀榛 白薇 桂心 鮫甲 白

朮 附子 鼈甲 蟻蟲 貝齒各半 蜚

蠹六

右十壹味為末蜜丸如梧子大以米泔清  
服五九日三

又方蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽  
半升令焦內湯中飲之大吐瘥若手足痛  
者燒青布內小口器中熏痛處

神明度命圓治久患腹內積聚大小便不通  
氣上搶心腹中脹滿逆害飲食方

大黃 芍藥各二兩

右二味為末蜜丸如梧子大服四九日三  
不知可加至六七丸以知為度

治萬病積聚方七八月收蒺藜子不限多少  
以水煮過熟取滓曝令乾搗篩蜜丸如梧  
子大酒服七丸以知為度其汁煎如飴服  
之

陷胃湯治胃中心下結積飲食不消方

栝萋實 大黃 黃連各二兩 甘草一兩

右四味咬咀以水五升煮取二升五合分

三服

太乙神明陷冰圓治諸疾破積聚心下支滿  
寒熱鬼注長病欬逆唾噫辟除衆惡殺鬼逐  
邪氣惡胃中結氣咽中閉塞有進有退繞臍  
惻惻隨上下按之挑手心中愠愠如有蟲狀  
毒注相染滅門

雄黃油煮壹日 丹砂 礬石 當歸 大黃各二兩

兩巴豆壹兩 犀角 鬼臼 射罔 藜蘆各

兩真珠 附子各壹兩半 麝香 牛黃 人參

各半 蜈蚣 蜥蜴各壹枚 芫青五枚 烏頭八枚 杏

人四枚 斑猫七枚 樗雞 地膽各三枚 桂心三

石二十四味爲末蜜和搗三萬杵丸如小

豆大先食飲服二丸日二不知稍加仍以

藥二丸安門戶上令衆惡不敢近家及視

病人夜行獨宿服二丸令衆惡不敢近傷

寒服之無不即瘥

蜥蜴圓治癥堅水腫蜚尸遁尸百注尸注骨  
血相注惡氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡  
留飲結積虎狼所嚙獠犬所咋鳩毒入人五  
臟服藥已消殺其毒食不消婦人邪鬼忤亦  
能遣之

蜥蜴 蜈蚣 各二枚 地膽 五十枚 蠶蟲 蠹蟲

杏人 各三枚 蟻蝦 十四枚 朴消 巴豆 各壹兩十八銖

欬冬花 犀角 桃奴 澤漆 桑赤雞

鬼督郵 各一兩 芍藥 虎骨 各一兩 甘草

乾薑 各壹兩 甘遂 一兩六銖

右二十味為末別治巴豆杏人如膏內藥  
末研調下蜜搗二萬杵丸如麻子先食飲  
服三九日一不知加之不敢吐下者一丸  
有人風冷注癖堅二十年者得瘥

大五明狼毒圓治堅癖痞在人胷脅或在心  
腹方

狼毒 乾地黃 四兩 附子 大黃 菝葐

人參 當歸 細辛 蜀椒 五味子

藺茹 熬令烟盡 各一两 半夏 二兩 乾薑 桂心 各一两

芫花 莽草 厚朴 防已 旋復花 兩

杏人 三十枚 巴豆 二十枚

右二十壹味為末蜜和丸加梧子服二九日二夜一以知為度

小狼毒圓治同前

狼毒 三兩 附子 旋復花 半夏 藺茹

白附子 各二兩

右六味為末蜜和擣五千杵丸如梧子大

飲服三丸 肘後方食 前日三服 加至十丸 日三 肘後方無

半夏白附子 藺茹只三味

狼毒圓治堅癰方

狼毒 五兩 半夏 杏人 各三兩 桂心 四兩 附子

蜀椒 細辛 各二兩

右七味為末別擣杏人蜜和丸如大豆飲服二丸

甘遂湯治暴堅久痞腹有堅者方

甘遂 黃芩 芒消 桂心 細辛 各壹兩

大黃 三兩

右六味咬咀以水八升煮取二升半分三服

治卒暴癥腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治百日必死牛膝二斤咬咀曝令乾以酒壹斗浸之密塞器口煎取半服半升一服便吐失宿食神效○聖惠方牛膝一斤去苗剉右以酒一斗清密封於熱灰火中

爰令味出每於食前量力頻服以差為度

治卒暴癥方搗碎商陸根蒸之以新布籍腹

以藥鋪著其上以衣物覆其上冷復易之

數日用之旦夕勿息○聖惠方治卒暴癥

腹中有物如石痛如刀刺晝夜啼呼右用

商陸根不限多少剉搗蒸之以新布裏熨

病上冷即換之 瑣碎錄同

又方蒜十片取五月五日戶上者去皮桂壹尺

竈中黃土如雞子大壹枚○別後如鴨子壹枚

右三味合搗以淳苦酒和塗布上以掩病處不過三日消肘後不凡蒜亦佳○聖惠方蒜二斤桂心壹斤伏龍肝壹斤右件藥合搗以醇醋和之如泥便攤於布上罨病處罨三日差遂日換之

野葛膏治卒暴癥方

野葛壹尺當歸壹尺附子壹斤雄黃壹斤油煮壹日細辛壹斤兩蜀椒半兩烏頭二兩巴豆一百枚右八味咬咀以人醋浸壹宿猪膏二斤煎

附子色黃去滓內雄黃粉攪至凝傅布上以掩癥處復以油重布上復著十重紙以熨斗盛火著其上常令熱日三夜二須膏乾爲度

消石大圓治十二癥瘕及婦人帶下絕產無子并欲服寒食散而腹中有癥瘕實者當先服大丸下之後與寒食散大丸不下水穀但下病耳不令人困方

消石六兩朴八兩大黃八兩人參各二兩甘草各二兩

右四味爲末以三年苦酒三升置銅器中以竹筯拄器中壹升作壹刻凡三升作三刻以置火上先內大黃常攪不息手使微沸盡壹刻乃內餘藥又盡壹刻餘壹刻極微火使可凡如雞子中黃凡合藥當先齋戒壹宿勿令小兒女人奴婢等見之欲下病者用二丸若不能服大丸者可分作小丸然亦不可過四丸也丸欲令大不欲令細能不分爲善若人羸者可少與強者可

二十日五服和調半日乃下若婦人服之下者或如雞肝或如米汁正赤黑或壹升或三升下後慎風冷作一杯粥食之然後作羹臠自養如產婦法六月則有子禁生魚猪肉辛菜若寒食散者自如藥法不與此同日一服

土瓜圓治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中蠱毒或食生物及水中蟲卵生入腹而成蟲蛇若爲魚鼈留飲宿食婦人產瘦帶下百病陰

陽不通利大小便不節絕傷墮落寒熱交結  
 脣口焦黑身體消瘦嗜臥少食多魘產乳胞  
 中餘疾股裏熱少腹中急結痛引陰中方  
 土瓜根 桔梗 各半 大黃 壹斤 煮二斗 杏  
 人壹 升

右四味為末蜜丸如梧子大空腹飲服三  
 九日三不知加之以知為度

治凡所食不消方取其餘類燒作末酒服方  
 寸匕使吐去宿食即瘥有食桃不消作病

者以時無桃就樹間得槁桃燒服之登時  
 吐病出甚良

治卒食不消欲成癥積方煎艾汁如飴取半  
 升作壹服使刺吐去宿食神良古今錄驗  
 方白艾五尺圍壹束薏苡根壹大把貳味  
 同煎

治食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方狗  
 屎五升燒末絲裹以酒一斗浸再宿濾取  
 清分十服日三三日令盡隨所食癥結即

類聚

卷之三十一

出

治雜食瘀實不消心腹堅痛者方以水三升  
煮白搗一升令消分三服刺吐去所食并  
治暴癥

治癥堅心下有物大如杯不得食食則腹滿  
心腹絞痛方

葶藶子 大黃 各二兩 澤漆 四兩

右三味別研葶藶為膏其二味擣五百杵  
入蜜更搗千杵和丸如梧子大服五丸不

知加之日三

治小腹堅大如盤胃中滿脹食不消化婦人  
瘦瘠者方暖水服髮灰壹方寸匕日再并  
灸肋端

又方飲服上好麴末方寸匕日三又灸三焦  
輪隨年壯瘥

治伏梁氣方白馬尿銅器中盛取每旦服壹  
升

治癥瘕方榭樹白皮煎令可丸服之取知病

動若下減之

椒熨方治患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍左右或在臍上下或若鼈在左右肋下或當心如合了大法先針其足以椒熨之取一新盆子受壹斗者底鑽一百二十孔孔上著椒三合上著壹重紙紙上著冷灰壹升冷灰上著熟灰半升上著剛炭火壹斤經一食頃盆底熟徹當病上初安甌壹重即安火盆火盤大熱以漸更加壹

重若火更熱不可忍加至三重暫歇進一口冷飲還上火消二分許即停止經三日勿著及至七日決得頓瘥然後食美食自補若小不瘥作露宿左服之

治腹中積癥方葶藶子壹升熬以酒五升浸

七日每服三合

壽域神方衛日三  
生易簡方同

治蛇癥方白馬尾切長五分以酒服方寸匕

大者自出更服二分者壹方寸匕中者亦出更服三分者壹方寸匕小者復出不可

頓作一服殺人馬尾壹本作馬毛

大黃湯治蛇癥方

大黃 茯苓 各半兩壹 烏賊骨 二枚 皂莢 六枚

如猪 甘草 如指大壹尺 芒消 如雞子壹枚

右六味咬咀以水六升煮三五沸去滓內

消適寒温盡服之十日壹劑作如上法宿

勿食平旦空腹服病根當下也

治鼈癥腹堅硬臄起大如盆眠臥不得方 食

得病為鼈癥 取藍壹斤擣水三升絞取汁 中

每服一升日二

又方蒟藿根白皮壹握研取汁以水和頓服之

又方白馬屎壹升雞子三枚取白合煎取二

合空腹頓服不移時當吐病出 壽域神方 衛生易簡

同方

又方雞屎壹升炒令黃収五合以酒壹升浸

取半搗為末以所浸酒服方寸匕日二服

三口中作壹劑

治蛟瘖病

開皇六年三月八日有人食芹得

食寒食餽過多便吐狀似蛟龍有頭有尾

服寒食餽三斗大

驗○聖惠方治蛟龍病三月八月近海及

水邊因食生芹菜為蛟龍子生在芹菜上

食入腹變成龍子須慎之其病發似癩面

色青黃小腹脹狀如懷妊宜食寒食餽方

寒食餽三升右勿服五合壹日三服吐出蛟

龍有兩頭開皇六年又灞橋有人吐出蛟龍大驗

山野人有嚙蟲在腹生長為蟲癥病治之方

故敗篋子

故敗梳

各壹枚

右二件各破為兩分各取壹分燒為末又

取壹分以水五升煮取壹升服上件燒末

頓服即出

常欲食米若不得米則胃中清水出為米癥

治之方

雞屎壹升白米五合

右二味合炒令米焦搗末以水二升頓服

取盡須臾吐出病如研米若無米當出痰自此永憎米不復食之矣○聖惠方治米癥其人恒欲食生米常吐酸水若食米則胃中清水止宜服此方雞糞半白木半右件藥合炒取米煇為度擣細羅為散用水一中盞調頓服取盡少時卽吐吐出病如米末也

人有思肉不已食訖復思者為肉癥治之方空腹飲白馬尿三升吐有肉出不出必死

食中有髮不覺因食而入久卽胃閒如有蟲狀上下去來惟欲飲油一日之中乃至三

二斤不欲飲食者為髮癥方油壹升聖惠方一

斤以香澤煎之大鐺勞聖惠方大鈔鐺貯之安病

人頭邊令口鼻臨油上勿令得飲傅鼻面令有香氣當叫喚取飲不得與之必當疲極大睡其髮癥當從口出令壹人專守視之并備石灰壹裹見癥出以灰粉手捉癥抽出及盡卽是髮也初從腹中出形如不

流水中濃菜聖惠方隨髮長短形亦如之  
 又方酒三升煮猪脂二升三沸服一升日二  
 白馬尿服之亦佳無白馬白牛亦得  
 千金翼方

大補養

草烏頭圓破積聚治積結冷聚陽道弱大便  
 有血婦人產後血出不止方

- 烏頭拾五分 炮去皮 大黃 乾薑 厚朴炙 吳茱萸
- 芫藥 前胡 芎藭 當歸 細辛

- 桂心各九分 蜀椒三分 去目 白薇半兩 黃芩

- 白朮 人參 紫苑 甘草炙各壹兩

右壹十八味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子  
 大酒服十圓日三服漸漸加之

大理中露宿圓主風勞四十年癖絕冷并主  
 欬逆上氣方

- 人參 桂心 吳茱萸 烏頭炮去皮 礬石燒等分

右五味搗篩為末鍊蜜和圓如梧子大酒

服三圓日再以知爲度

凶奴露宿圓主毒冷方

礬石

燒

桔梗

皂莢

炙去皮子

乾薑

附子

炮去

皮吳茱萸等分

右六味搗篩爲末鍊蜜和丸如梧子大飲

服三圓日再稍加以知爲度

千金月令

注疰癘久不差方

大黃

十兩

鼈甲

五兩

朴消

三兩

右搗篩爲末以三年米酢和人黃如稀粥

於瓷器中盛重湯煎待欲堪丸下鼈甲末

及朴消和之衆手丸如桐子大空腹酒飲

任下三十九忌人寬

聖惠方一 積聚

治肝積氣諸方

夫肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭

足久不愈令人發瘡瘰連歲月不已以仲夏

戊巳得之何以言之肺病傳肝肝當傳脾脾

以仲夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以仲夏得之也  
治肥氣在左脇下似覆杯咽酸吐水而目萎黃胃膈不利宜服蓬蘽根散方

蓬蘽根

二兩

牡丹

兩

赤芍藥

兩

桂心

三分

三稜

壹兩

枳殼

三分

麩炒

檳榔

兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治肥氣在左脇下結聚成塊心腹妨實不欲

飲食宜服防葵散方

防葵

兩

訶梨勒皮

三分

白朮

三分

郁李人

湯三分

去皮

吳茱萸

半兩

湯浸

七

桂心

三分

枳實

微炒

木香

三分

檳榔

三分

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治肥氣在左脇下按之堅不能食脉候弦而

緊肌體萎瘦宜服鼈甲散方

鼈甲

壹兩

牛塗

醋炙

當歸

一兩

到

京三稜



右件藥搗細羅爲末入研了藥令勻以米醋壹升熬令稠入少麵作糊和丸如棗豆大每服以溫酒下十九空心服

治肥氣體瘦無力少思飲食鼈甲丸方

鼈甲壹枚可重四兩淨洗以醋和黃泥固濟背上可厚三分令乾京三

稜三兩川大黃三兩枳殼三兩麩炒木

香壹兩桃人三兩易浸去皮尖雙人麩炒黃細研如膏

右件藥除鼈甲外搗羅爲末然泥壹風爐

子上開口可安得鼈甲取前藥末并桃人

膏內鼈甲中川好米醋二升時時旋取入

鼈甲內以慢火熬令稠取出藥却將鼈甲

淨洗去泥焙乾搗羅爲末與前藥同和搗

爲丸如梧桐子大每日空心以溫酒下二

十九晚食前再服

治肥氣結聚不散腹脇脹滿嘔逆酸水食飲

減少宜服牽牛煎丸方

牽牛子末三兩以生薑汁半升壹兩附

子壹兩炮裂壹兩鼈甲壹兩半壹兩醋炙壹兩檳榔壹兩

桃人一兩半湯浸去皮尖雙人吳茱微黃研入神巧萬全方壹兩黃半兩湯浸七硃砂壹兩不夾石者仁微炒一兩細辛三分

右件藥擣細羅爲末入牽牛子煎中和滾爲丸如梧桐子大每服食前生薑湯下二十九

治肥氣結固不散腹脇急疼食少體瘦宜服  
三稜煎丸方  
濕三稜七斤淨洗去泥土川大黃三兩芫花一兩醋拌

炒令乾鼈甲三兩塗醋炙木香一兩

右件藥先以水二斗煮三稜至三升去滓擣羅諸藥爲末入前煎中於銅器內慢火熬之更入米醋一升同煎熬令稠候稍冷併手丸如梧桐子大每日空腹以溫酒下十九

治肥氣積年不散左脇下狀如覆杯天陰卽疼痛宜服硃砂煎丸方

硃砂二兩不夾石者細研以酒醋各一升熬如膏乾漆一兩擣碎炒令

煙防葵 壹兩○神巧萬全方 木香 一兩○  
出用菊花微炒一兩半 萬全方  
 一兩 川大黃 一兩半制碎微炒○  
 半 萬全方用决明子  
 右件藥搗細羅爲末入礮砂煎中入少饊  
 餅和溲爲丸如棗豆大每日空心温酒下  
 十九

治肥氣結聚不散方

川大黃 四兩剉碎與鼈 木香 二兩 鼈甲 四兩  
甲同煮焙乾 醋二升與大黃同 煮令醋盡炙令黃  
 右件藥持細羅爲末以酒煮麩糊和丸如

梧桐子大每日空心生薑湯下二十九

治心積氣諸方

夫心之積名曰伏梁起於臍上大如臂上至  
 心下以秋庚辛得之何以言之腎病伏心心  
 當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還  
 腎腎不肯受故留結爲積故知伏梁以秋得  
 之也

治伏梁氣在臍上心下結固如梁之狀胃膈  
 不利食飲減少宜服防葵散方

防葵兩 京三稜兩 炮制桂心兩 赤芍藥壹兩 鼈

甲壹兩 牛漆醋炙當歸 訶梨勒皮兩 川

大黃壹兩 碎微炒枳殼 微黃去瓢三分 製炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治伏梁氣橫在心下堅硬妨悶不能食宜服

鼈甲散方

鼈甲一兩 剉塗醋炙吳茱萸 半兩湯浸七

郁李人壹兩 湯浸京三稜 炮制枳實 三分

微柴胡三分 桂心三分 檳榔壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢水壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治伏梁氣心下硬急滿悶不能食胃背疼痛

宜服半夏散方

半夏壹兩 半湯洗川大黃 壹兩剉桂心 壹

前胡壹兩 去京三稜 壹兩剉當歸 壹兩剉青

橘皮壹兩 湯浸鼈甲 壹兩剉枳實 壹兩

訶梨勒皮兩 木香壹兩

兩

類聚百

三

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盪人  
生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱  
服

治伏梁氣結固在心下橫大如臂飲食漸少  
肢體痛瘦宜服川烏頭丸方

川烏頭半兩炮裂 芫花半兩醋拌 京三稜  
半兩剉桂心半兩 神巧萬壹兩 鼈甲壹兩  
醋拌炒防葵兩 乾漆半兩 搗碎硃砂壹兩  
者細川人貴壹兩 醋拌微炒木香兩  
研

右件藥搗細羅為末先以米醋三升熬令  
稍稠入少麩作糊和浚搗三二百杵為丸  
如菉豆大每服空心以溫酒下七九漸加  
至十九丸以取下積滯物為度隔兩日再服  
治伏梁氣橫在心下堅牢不散胃中連背多  
疼宜服乾漆丸方

乾漆壹兩 搗碎川烏頭半兩 去皮臍剉芫  
花壹兩 醋拌桃人半兩 湯浸去皮尖雄黃  
壹分鼈甲壹兩 塗醋炙木香兩 硃砂壹兩  
細研

類聚百

三五

石者麝香壹分  
細研研入

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻以醋  
煮麵糊為丸如菜豆大每服食前以溫酒  
下十九

治伏梁氣久積在心下橫大如臂發歇疼痛

曾背拘急腹脇滿悶宜服礪砂煎丸方

礪砂二兩不夾石者細研以乾漆一兩搗

出桂心壹兩漢椒壹兩去目及閉汗乾薑半兩

判附子壹兩炮裂檳榔兩川大黃二兩對

右件藥搗細羅為末入礪砂煎中更入蒸

餅少許和浚為丸如梧桐子大每日空心

溫酒下十五丸至二十九

治伏梁氣心胃妨實背膊煩疼不能食四肢

無力宜服大黃煎丸方

川大黃二兩到碎微炒別搗羅為京三稜

壹兩到碎醋木香壹兩桃人壹兩湯浸去皮

黃訶梨勒皮兩桂心兩青橘皮壹兩湯浸

檳榔壹兩○神巧萬全方加麥門冬壹兩

類身百十  
三五

右件藥搗細羅為末入大黃煎中更入饊餅少許和淩為丸如梧桐子大每日空心以溫酒下十九至十五丸

治伏梁氣橫在心下不能進飲食宜服此方

木香壹兩不夾石川大黃二兩割碎醋拌

炒令乾右件藥搗羅為末入研了硃砂令勻

以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服食前

生薑湯下七丸

治伏梁氣在心下結聚不散方

消石半斤牽牛子壹兩木香半兩

右件藥搗細羅為末以米醋二升內藥末

慢火蒸令稠入少麩糊和淩為丸如梧桐

子大每服空心溫酒下十九丸

又方桃奴三兩右件藥搗細羅為散每服食前

溫酒調下二錢瓊碎錄壽寶不流對食宜

治脾積氣諸方

夫脾之積名曰痞氣在胃管覆大如椳久不愈令人四肢不收發黃疽飲食不為肌膚以

冬壬癸得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎以冬適王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬得之也

治痞氣結聚在胃管心腹妨實不能飲食宜

服訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩 龍甲壹兩半 醋炙白朮 壹兩

人參三分 去桂心 三分 防葵三分 川大黃三分 剉碎

微炒郁李人 三分 湯浸甘草 半兩 炙令 炒微赤 剉

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治痞氣心腹脹硬食飲不下宜服檳榔散方

檳榔壹兩 牽牛子壹兩 木香半兩 白朮三分 陳橘皮

半兩 湯浸高良薑 半兩 訶梨勒皮三分 枳實半兩

去白微炒 甘草半兩 炙微赤 剉

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞煎

至六分去滓食前稍熱服

治痞氣結聚在胃管盤牢不動食飲漸少四

肢無力宜服龍甲散方

龍甲 壹兩半塗醋炙 川大黃 一兩半剉 木

香 壹兩 郁李人 一兩湯浸 京三稜 壹兩 當歸

兩 壹兩 檳榔 壹兩 草豈 壹兩 寇 三分 枳殼 三分 黃去 一分 神

巧萬 全方加 白朮 一兩

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治痞氣在胃管狀如覆杯心腹脹滿不能飲

食肌體漸瘦宜服三稜九方

京三稜 二兩剉碎醋 訶梨勒皮 壹兩 川大黃

碎微炒 龍甲 壹兩半塗醋炙 木香 一兩 乾漆

壹兩搗碎 桃人 壹兩湯浸去皮尖 檳榔 一

炒令煙出 川烏頭 一兩去皮臍 剉

右件藥搗細羅為末取米醋三升熬成膏

入少饑餅和浚為丸如梧桐子大每日空

心溫酒下二十九

治痞氣積年不差結聚在於胃管大如覆杯

心腹脹痛食少無力宜服厚朴九方

厚朴 壹兩半去麁皮塗 木香 壹兩 青橘皮 壹兩

牛薑汁炙令香熟

頁及百十 二十九

類聚百一

三十一

湯浸去川大黃壹兩半到碎 醋拌炒令乾 硫黃壹兩細研水飛 過 檳榔一兩

右件藥搗細羅為末入研了硫黃令勻以酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服食前以生薑湯下十九

治痞氣結固不散心腹冷疼食少體瘦宜服

硫黃丸方

硫黃二兩細研 木香一兩半 川大黃二兩 水飛過 為末 炒桃人四十九枚湯浸去 皮尖雙人別研

右件藥四味先取大黃末用酒灑濕內新竹筒子內閉口入炊飯甑中蒸令飯熱熟為度取出與桃人同研極爛入硫黃木香末研勻入少麵糊和為丸如梧桐子大每日空腹以酒下壹十九神巧萬全方同

治痞氣當胃管結聚如杯積久不散腹脇疼痛體瘦成勞不能飲食宜服鼈甲丸方

鼈甲三兩去裙襖以米醋一小盞化研附砂壹兩用塗炙鼈甲令醋盡為度附 子壹兩炮裂 京三稜壹兩微 乾漆壹兩搗去皮臍

煙木香一兩 川大黃二兩 判碎醋吳茱萸半

湯浸七遍 焙乾微炒

右件藥擣細羅爲末以醋煮麵糊和浚擣  
三二百杵丸如梧桐子大每日空心溫酒  
下二十九

治痞氣結聚不散心腹疼痛硃砂煎丸方

硃砂一兩 不夾石者 研荒花 一兩醋拌木香 壹兩 京

三稜一兩 微川烏頭 半兩去皮臍 判鹽拌炒 令黃龍甲

一兩塗醋炙 令黃去裙襖

右件藥除硃砂外擣細羅爲末先以米醋

壹升慢火熬硃砂次下諸藥同熬令稠入

少饊餅和浚爲丸如棗豆大每服食前以

生薑湯下十九

治痞氣結聚在胃管心腹脹硬藏腑壅滯宜

服牽牛子丸方

牽牛子壹兩 半甘遂 壹兩判碎 訶梨勒皮三分

木香三分 京三稜三分 半炒 令乾青橘皮 湯三分 浸

去白瓢焙

右件藥搗細羅為末以生薑汁二兩蜜四兩煎令稠熱和淩為丸如梧桐子大每服臥時生薑湯下二十九以利為度

治痞氣心腹堅脹飲食不消木香丸方

木香壹兩 川大黃二兩 硫黃壹兩 細研水飛過

右件藥搗細羅為末研入硫黃令勻以酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服空心以生薑湯下十九

又方訶梨勒皮一兩 鼈甲壹兩半 塗醋炙令黃去裙襴

右件藥燒細羅為散每服二錢食前以生薑橘皮煎湯調下

治肺積氣諸方

夫肺之積名曰息賁在右脇下覆大如梧久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺癰以春甲乙得之何以言之心病傳肺肺常傳肝肝以春適王王者不受邪肺復欲還心心不肯受故留結為積故知息賁以春得之也

治息賁氣脅膈妨實右脇下堅急上氣欬嗽  
宜服檳榔散方

檳榔壹兩赤茯苓三分赤芍藥三分食茱萸三分京

三稜二分訶梨勒皮三分郁李人壹兩湯浸青

橘皮三分湯浸去白蠹焙

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中蒸入

生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治息賁氣在右脇下結聚脹痛喘促欬嗽宜  
服紫苑散方

紫苑一兩去苗土吳茱萸半兩湯浸七白朮半兩

當歸半兩桂心半兩鼈甲壹兩塗醋炙令黃去

三檳榔兩半郁李人壹兩湯浸枳實半兩麩

○萬全方加  
款冬花三分

右件藥搗篩為散每服三錢水一中蒸入

生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘不利宜  
服枳實散方

枳實半兩麩兩木香半兩檳榔兩訶梨勒皮兩

類聚

甜葶藶 半兩隔紙炒令紫色 赤茯苓 半兩 五味子 半兩

草 半兩 微赤剉 或杏人雙 人 雙 湯浸去皮尖

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治息賁氣腹脇脹滿喘急欬坐臥不安宜

服大腹皮散方

大腹皮 五枚 赤茯苓 兩一 前胡 壹兩 去蘆頭 訶梨勒

皮 半兩 漢防已 兩 木香 壹兩 檳榔 兩半 桃人 壹兩 湯浸

去皮尖 雙 人 雙 川大黃 壹兩 剉 碎微炒

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治息賁氣令人喘欬心腹脹滿脇下疼痛宜

服牛蒡子散方

牛蒡子 壹兩 微炒 木香 壹兩 當歸 兩壹 京三稜 壹兩 炮剉

碎 吳茱萸 半兩 湯浸七 檳榔 兩半 川大黃 兩一

剉碎 鼈甲 二兩 塗醋炙 微炒 令黃去裙襴

右件藥搗細羅為散每服二錢以溫酒調下食前服生薑橘皮煎湯下亦得

治息賁氣右脇下結硬如杯心腹脹痛不能飲食胃膈壅悶欬嗽喘促宜服桃人煎丸方

桃人三兩湯浸去皮尖雙人細研 礶砂膏

半不夾石龍甲 二兩漆醋炙 川烏頭 半兩

者細研鹽 紫苑半兩去 猪牙皂莢 半兩去

臍到碎黃 防葵半 木香三 檳榔三 乾薑半兩

炙令焦防葵 木香三 檳榔三 乾薑半兩

黃去子防葵 木香三 檳榔三 乾薑半兩

到

右件藥搗細羅為末入桃人礶砂煎中滾和為丸如梧桐子大每服食前以生薑湯

下十五丸

治息賁氣右脇下結聚成塊喘欬胃痛嘔吐痰涎面黃體瘦宜服三稜丸方

京三稜壹兩炮裂 川大黃二兩剉碎 附子

壹兩炮裂 龍甲壹兩半塗醋炙 檳榔壹 訶

去皮臍龍甲 令黃去 裙襴炙 檳榔兩 訶

梨勒皮壹兩 木香兩 桃人壹兩湯長去皮尖

吳茱萸半兩湯浸七 右件藥搗細羅為末以醋煮麩糊和搗三

二百粒丸如梧桐子大每服食前生

治腎積氣諸方

夫腎之積名曰奔狔發於小腹上至心下若狔走之狀上下無時久不愈令人喘逆發骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎欲復還脾脾不肯受故留結爲積故知奔狔以夏得之也 又曰奔狔氣者是腎之積氣也起於驚恐憂思所生若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志氣積於腎而

氣下上遊走如狔之奔故曰奔狔其氣乘心若心中踴踴如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胃中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔狔之狀也若氣滿支心心下悶亂不欲聞人聲休作有時乍差乍劇翕翕短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此憂思奔狔之狀也診其脉來觸祝觸祝者病奔狔也腎脉微急沉厥者奔狔也其足乃收不得前後皆從驚得之腎間有膿故也

治奔狔氣從小腹起上至心下妨脹壅悶胃中短氣坐臥不安宜服赤茯苓散方

赤茯苓壹兩大腹皮半兩檳榔半兩桂心一兩

吳茱萸半兩湯浸七高良薑半兩訶梨勒半兩

皮壹兩牽牛子壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞煎

至六分去滓不計時候稍熱服

治奔狔氣臍腹脹痛翕翕短氣發作有時四肢疼悶宜服甘李根散方

甘李根二兩吳茱萸半兩湯浸七半夏壹兩

湯洗七人參壹兩去去附子一兩炮裂桂心壹兩

當歸壹兩乾薑半兩炮裂檳榔壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

治奔狔氣小腹脹硬心中滿悶宜服檳榔散方

檳榔壹兩沉香半兩白茯苓半兩微去刺木香半兩附

子壹兩炮裂桂心半兩訶梨勒皮壹兩青橘皮壹兩

半兩湯浸麝香壹分  
去白瓢焙研入

右件藥搗細羅為散入麝香令勻每服不計時候以溫酒調下二錢

治奔弛氣上衝心胃悶亂臍腹脹痛飲食輒嘔宜服木香散方

木香兩青橘皮半兩湯浸壹分檳榔兩白朮兩

沉香兩懷香子兩木瓜兩桂心兩蓬莪

茂兩杉木節兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調一二錢

治奔弛氣上攻心胃喘悶脹滿桃人散方神巧

萬全方  
天雄散

桃人一兩湯浸壹分牽牛子壹兩檳榔

椰兩青橘皮半兩湯浸壹分水香兩懷香子兩

微郁李人全方加天雄炮壹兩皮壹兩炒壹兩

右件藥搗細羅為散研入桃人郁李人令

勻每服不計時候以溫酒調下二錢

治奔弛氣攻築心腹膨脹疼痛而色唇口青

黑四肢不和宜服硫黃丸方

硫黃壹兩細研木香兩青橘皮壹兩湯浸桂心壹兩湯浸

肉苳菑壹兩懷香子兩附子壹兩去皮膚

乾薑裂一兩炮兩銅青壹兩檳榔兩

右件藥搗細羅為末以酒煮麩糊和搗三

二百杵為丸如梧桐子大每服以生薑溫

酒下二十九

治奔狫氣小腹積聚疼痛或時上攻心胃壅

悶宜服沉香丸方

沉香半兩阿魏半兩作餅子以少麩和淡木香壹分桃

人半兩雙兩湯浸去皮尖檳榔半兩吳茱萸壹分湯浸

七兩編焙懷香子半兩青橘皮一分湯浸研砂

三兩兩不夾石者細切以湯蓋化澄蚘蚘

去洋取清內銀器中煎成霜研入蚘蚘

右件藥搗細羅為末入硃砂令勻以酒煮

麩糊和丸如梧桐子大每服食前以薑塩

湯下二十九

治奔狫氣在小腹積聚成塊癸歇疼痛宜服

硃砂煎丸方

硃砂三兩不夾石者細研以酒附子壹兩醋各一升慢火熬令如膏

去皮吳茱萸半兩湯浸七木香三分桃人臍湯浸去皮尖雙入防葵三分剉碎醋拌炒

蘇炒微黃研入

無方檳榔三分○萬全方加芭戟去心乾漆打碎炒令烟出覆盆子各壹兩

右件藥搗細羅為末入桃人令勻內硃砂煎中入少饊餅和浚為丸如梧桐子大每服食前以溫酒下十五丸

治奔狫氣逆上衝心滿悶臍腹虛脹宜服此

方

檳榔一兩訶梨勒皮壹兩木香壹兩吳茱萸三分湯浸

七徧焙牽牛子二兩

右件藥搗細羅為散每服壹錢以溫酒膏合童子小便一合相和調下不計時候服

治奔狫氣在心胃迫滿悶亂宜服此方

半夏二兩湯洗桂心一兩人參一兩去檳榔壹兩吳茱萸半兩湯浸七甘草半兩炙

右件藥搗羅為散每服三錢水壹中煮

入牛薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治奔弛氣上下衝走悶亂面青宜服此方

甘李根皮三兩生薑二兩吳茱萸一兩湯

焙乾

右件藥搗細羅為散每服二錢水壹中盞

煎至六分去滓不計時候熱服

又方檳榔三枚搗生薑汁半

右件藥以童子小便一大盞微煖過入前

藥一味攪令勻分為三服如人行五六里進一服須臾下利為效

治積聚諸方

夫積者陰氣也五藏所生聚者陽氣也六腑所成此皆寒溫失宜飲食不節邪氣蘊積在內不得宣通結搏於藏腑之間故為積聚之病也

治積聚氣心腹結痛食飲不下宜服鼈甲散方

鼈甲壹兩塗醋炙京三稜壹兩當歸半兩

炒桂心半兩芍藥半兩木香半兩枳殼半兩

去訶梨勒皮半兩檳榔半兩川大黃一兩碎微炒

右件藥搗羅為散每服三錢小壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治積聚氣腹急心胃脹滿不能飲食宜服

檳榔散方

檳榔壹兩京三稜壹兩木香壹兩桂心半兩桃人

雙壹兩湯浸去皮尖青橘皮半兩湯浸郁李

人壹兩湯浸去皮微炒

右件藥搗篩為散每服四錢水壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

治積聚氣心腹脹痛食飲減少四肢不和宜

服吳茱萸散方

吳茱萸壹兩湯浸白朮壹兩當歸壹兩

紫苑壹兩桂心壹兩檳榔壹兩鼈甲壹兩

黃壹兩郁李人壹兩枳實壹兩微炒

右件藥搗篩為散每服三錢小壹中盞入

生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服  
治積聚氣心腹脹硬如石肚上青脉起食飲  
不下宜服防葵散方

防葵半兩桔梗三分去川朴消三分川大黃三分

剉碎桃人半兩湯浸去皮木香半兩

右件藥搗篩為散每服三錢水壹中煮煎  
至六分去滓食前稍熱服當利下惡物為  
度未利再服

治積聚氣在腹脇胃背疼痛宜服人黃丸方

川大黃二兩剉炒桃人二兩半湯浸去皮

榔半兩鼈甲一兩塗醋炙京三稜二兩乾

薑壹兩炮川烏頭壹兩炮裂桂心壹兩吳茱

萸壹兩湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗細羅為末以醋煮麪糊和丸如  
梧桐子大每服食前以生薑橘皮湯下二  
十九溫酒下亦得

治積聚氣心腹堅脹食飲減少面色萎黃肌  
體羸瘦宜服乾漆丸方

乾漆壹兩炒令煙出碎鼈甲壹兩塗醋炙訶黎勒

皮壹兩當歸壹兩微炒附子壹兩炮木香三分枳

殼壹兩黃去白木一桂心壹兩京三稜壹兩

桃人雙人雙湯浸皮尖川大黃二兩碎微炒厚

朴二兩薑皮塗川椒三分去目及閉汗

右件藥搗細羅為末以酒煮麵糊和搗三

五百杵丸如梧桐子大每服食前以粥飲

下三十丸

治久積聚氣不消心腹脹滿食少體瘦宜服

京三稜丸方

京三稜壹兩炮判桂心壹兩川大黃壹兩半判檳

榔壹兩吳茱萸半兩湯浸七乾漆壹兩檮

煙出附子壹兩皮去臍裂木香壹兩桃人壹兩半湯

雙人麩炒青橘皮去白兩鰾焙鼈甲壹兩半塗

右件藥搗細羅為末以醋煮麩糊和丸如

梧桐子大勿服食前以溫酒下二十九

治積聚氣久不消心腹虛脹不欲飲食宜服

鼈甲煎丸方

鼈甲二兩塗醋炙防葵壹兩炒令黃川大黃二兩

剉研

已上三味並搗細羅為末以醋二升煎

令如膏

乾漆壹兩搗碎桂心三分附子壹兩炮裂川

椒紅壹兩桃人一兩半湯浸去皮尖雙木

香一兩枳實一兩微黃

右件藥搗細羅為末內前煎中更入少饑

餅和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食

前以生薑橘皮湯下二十丸

治積聚氣久不消散腹脇脹痛面無顏色四

肢不和宜服硃砂煎丸方

硃砂二兩不夾石者細研以醋壹荒花一兩

炒令黃擣川烏頭半兩炮裂川大黃壹兩

羅為末壹兩塗醋炙當歸半兩桂心

微木香兩鼈甲壹兩塗醋炙當歸半兩桂心

兩蓬莪茂兩京三稜兩乾漆三分搗碎

青橘皮三分湯浸

去白瓢焙

右件藥擣細羅為末內煎中更入少蒸餅和搗三二百杵丸如梧桐大子每服食前以溫酒下十五丸

治積聚氣結成塊段在腹脇下久不消散癸歇疼痛宜服狼毒丸方

狼毒細剉醋拌炒令乾 芫花醋拌炒令乾 乾漆擣碎炒令煙出

雄雀糞微炒 五靈脂 鼈甲塗醋炙令黃去裙襴 硫黃

細研入 硃砂不夾石者細研已上各一兩 膩粉半兩入

右件藥擣細羅為末入研了藥令勻以醋

煮麵糊和丸如梧桐子大每服空心以醋湯下三丸至五丸常利下惡物

治積聚氣多年不消變成勞證腹內結塊疼痛兩脇脹滿常吐清水食飲不下硫黃丸方

硫黃半兩細研 硃砂半兩不夾石者細研 木香半兩為末 巴豆

去皮四十九粒 蘿蔔壹枚四破開鑽四 上九竅每壹竅內巴豆一粒却依舊合之 蕞在土坑中深壹尺四十九日後取出 巴豆細研如膏 裏壁去油後研

右件藥取蘿蔔壹枚剉作坑子內前硫黃硃砂却 蘿蔔蓋頭用紙壹重裹以好黃

泥固濟曝乾用大火斷令通赤候冷去泥  
取出藥并蘿蔔壹時細研入前木香末及  
研了巴豆令勻以醋煮麵糊和丸如菜豆  
大每服空心溫酒下五丸晚食前再服以  
利為度

治積聚氣塊防葵丸方

防葵半兩芫花半兩醋拌乾薑半兩炮鼈甲  
青兩塗醋炙硃砂壹兩不夾石  
令黃去裙襴硃砂者細研入  
右件藥搗和羅為末研入硃砂令勻以米

醋壹升煎令稠下諸藥末慢火熬入少饊  
餅和淡可丸即丸如菜豆大每服空心以  
溫酒下十九

又方芫花壹兩京三稜壹兩青橘皮半兩湯浸乾

漆半兩木香兩川大黃壹兩

右件藥搗碎以米醋二升慢火煎令醋盡  
焙乾擣細羅為末以醋煮麵糊和丸如菜  
豆大每服空心以生薑湯下十五丸漸加  
至二十九

治積聚心腹痛諸方

夫積者陰氣也五藏所生其痛不離其部故  
 上下有所窮已聚者陽氣也六腑所成故無  
 根本上下無所留止其痛無有常處此皆由  
 寒氣搏於藏腑與陰陽氣相擊上下故心腹  
 痛也診其寸口脉沉而橫脇下有積腹中有  
 橫積痛又寸口脉細沉滑者有積聚在脇下  
 左右皆滿與背相引痛又云寸口脉緊而牢  
 者脇下腹中有橫積結痛而泄利脉微細者

生浮者死也

治積聚心腹兩脇疼痛宜服檳榔散方

檳榔壹兩 赤芍藥半斤 枳殼半兩 麩炒芍藥 芎藭半兩

赤茯苓兩半 柴胡一兩 木香兩半 川大黃壹兩

微當歸二分 陳橘皮壹兩 湯浸桃人 兩

湯浸去皮尖雙 甘草一分 炙

右件藥擣羅羅為散每服三錢以水壹中

蒸煎至六分去滓不計時候稍熱服

治積聚心腹疼痛胃膈氣滯四肢無力不思

飲食木香散方

木香兩半訶梨勒皮兩半檳榔兩半白朮一分青橘

皮半兩湯浸去白甄焙赤茯苓三人參壹分去厚朴

壹分薑汁分炙令香熟生朴心一分

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢生薑棗湯調下亦得

治積聚心腹疼痛面無潤澤日漸黃瘦宜服

桂心散方

桂心壹兩川大黃壹兩到桔梗壹兩去附子

壹兩碎微炒壹兩去蘆頭

一兩炮裂壹兩白朮壹兩高良薑半兩芎

去皮壹兩當歸壹兩微炒壹兩檳榔壹兩赤芍藥壹兩枳實

半兩麩半兩炒微黃

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢生薑湯調下亦得

治積聚心腹疼痛全不欲食宜服青橘皮丸

方

青橘皮二兩湯浸壹兩當歸壹兩到枳殼壹兩

壹兩微炒壹兩乾漆壹兩炒令煙出壹兩附子壹兩炮裂壹兩

壹兩去麩壹兩微炒壹兩乾漆壹兩炒令煙出壹兩附子壹兩炮裂壹兩

壹兩去麩壹兩微炒壹兩乾漆壹兩炒令煙出壹兩附子壹兩炮裂壹兩

壹兩白朮壹兩桃人壹兩湯浸去皮尖桂心兩  
川椒三分去目及閉川大黃二兩劉厚朴兩  
壹兩去蘆皮塗生黃汁炙令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸  
如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治積聚心腹相引疼痛胃膈氣滯不能飲食

宜服訶梨勒丸方

訶梨勒皮兩川大黃二兩劉烏藥壹兩當歸兩  
一兩劉木香兩白朮兩桂心兩吳茱萸兩  
微炒

湯浸七檳榔壹兩蓬莪茂壹兩青橘皮壹兩  
焙乾微炒壹兩附子壹兩炮裂麥藥  
夫白神麴壹兩微炒令黃附子壹兩炮裂麥藥  
微炒令黃

右件藥搗羅為末後將硃砂三兩用醋二  
升煎瀘去滓入前藥木四兩內硃砂醋中  
攪和勻於銀鍋內煎成膏和餘藥末搗三  
二百杵丸如梧桐子大每於食前以生薑  
橘皮湯下二十九

治積聚氣心腹妨悶疼痛大黃丸方

川大黃二兩判當歸三分判芎藭三分訶梨

勒皮壹兩檳榔壹兩吳茱萸半兩湯浸七乾薑

三分炮川烏頭壹兩炮裂裂桃人壹兩湯浸

裂判人麩炒微黃

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫酒下三十九

治心腹積聚時有疼痛宜服巴豆丸方

巴豆二十枚去皮心杏仁五十枚湯浸去

微藜蘆壹兩去蘆皂莢二兩去皮塗酥桔

梗壹兩去蘆頭

右件藥先擣桔梗皂莢藜蘆等羅為末後

細研巴豆杏仁如膏鍊蜜和擣三二百杵

丸如小豆大每日空心以溫水下三丸如

未覺即加至五丸

治積聚心腹脹滿諸方

夫積者陰氣也五藏所生其痛不離其部故

上下有所窮已聚者陽氣也六腑所成故無

根本上下無所留止其痛無有常處也積聚

成病蘊結在內則氣不宜通氣還搏於藏腑  
心腹脹滿心腹脹滿則煩而短氣也

治積聚心腹脹滿不能下食宜服檳榔散方

檳榔兩半芎藭兩半桔梗兩半去頭當歸兩半微炒

桂心兩半赤芍藥兩半白朮兩半木香兩半川大黃

一兩制碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治積聚心腹脹滿不能下食四肢瘦弱訶梨

勒散方

訶梨勒三分煨木香三分檳榔三分前胡兩半

頭桂心兩半京三稜兩半炮當歸兩半微炒黃耆

半兩人參兩半去枳殼兩半微黃去白朮兩半

赤茯苓兩半芎藭兩半厚朴三分去薑汁炙香熟

青橘皮三分湯浸去白瓠焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於

食前稍熱服之

治積聚心腹脹滿不能飲食宜服白朮散方

白朮二兩赤茯苓兩枳殼壹兩麩炒人參

去蘆桔梗蘆頭去桂心兩京三稜一兩枳

榔一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食前溫服

治積聚心腹脹滿四肢逆冷宜服沉香散方

沉香兩吳茱萸半兩湯浸七檳榔壹兩青橘

皮壹兩湯浸去附子壹兩藁香子半兩微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調

下一錢

治積聚心腹脹滿食少宜服乾薑丸方

乾薑半兩炮壹兩去黑皮塗酥菖蒲

三分桂心三分川烏頭半兩炮柴胡三分人

參三分去黃連三分赤茯苓三分吳茱萸半

湯浸七偏川椒三分去目及閉厚朴壹兩

皮壹兩生薑汁

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子人每於食前以溫酒下二十九  
治積聚心腹脹滿臍下結硬宜服京三稜煎  
丸方

京三稜二兩當歸壹兩剉壹兩草薺壹兩陳橘

皮壹兩湯浸壹兩厚朴壹兩薑汁炙壹兩合香熟壹兩肉桂

壹兩去壹兩赤茯苓二兩木香三兩檳榔兩

右件藥搗羅為末以酒三升煎壹半藥末  
如膏後入餘藥末和搗三二百杵丸如梧  
桐子大每於食前以溫酒下二十九

又方礪砂半兩木香壹兩青橘皮壹兩湯浸壹兩檳

榔壹兩桃人壹兩湯浸壹兩去皮壹兩懷香子二錢炒

右件藥搗細羅為散每於食前以生薑汁  
半合熱酒壹中盞攪和令勻調下二錢

治積聚心腹脹滿或時疼痛宜服木香丸方

本香兩青橘皮二兩湯浸壹兩芫花三兩

右件藥先搗羅木香橘皮為末後別搗羅

芫花為末以醋三升煎成膏入前藥末和

丸如梧桐子大每服以熱酒下七丸

治積聚心腹脹如鼓者宜服狼毒丸方

狼毒四兩剉碎附子三兩炮裂防葵三兩剉碎

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵

如梧桐子大每於食前以粥飲下五丸以

利為度

治積聚宿食不消諸方

夫積聚皆由五藏六腑所生也而宿食不消者蓋藏腑為寒氣所乘脾胃虛冷水穀不化留為宿食診其脉來實者是其候也

治積聚氣脾胃虛弱不能化穀致宿食不消

腹脇脹痛宜服京三稜散方

京三稜壹兩炮剉桂心三分丁香半兩益智子三分

木香半兩大腹皮壹兩前胡壹兩厚朴壹兩

去麤皮塗生薑壹兩白朮三分乾薑半兩郁李

人壹兩湯浸蓬莪茂三分青橘皮壹兩湯浸

赤茯苓壹兩川大黃壹兩剉碎微炒

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中  
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每

於食前稍熱服

治積聚宿食不消四肢羸瘦乏力宜服訶梨勒散方

訶梨勒壹兩煨用皮 附子一兩炮去皮臍 草薺壹兩去皮  
 白朮三分 當歸半兩到 人參半兩去蘆頭 神麴壹兩  
 微黃耆二分 桂心壹兩 檳榔壹兩 陳橘皮湯一兩  
 去白瓢焙 赤茯苓一兩 郁李人壹兩湯浸  
 右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中  
 蒸入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治積聚宿食不消腹脇下妨悶四肢羸瘦骨節酸疼多有盜汗宜服白朮丸方

白朮壹兩 黃耆壹兩 牡蠣壹兩燒為粉 人參壹兩去蘆  
 頭赤茯苓一兩 川烏頭壹兩炮裂 乾薑半兩炮裂  
 剉木香一兩 當歸壹兩到 赤芍藥三兩 桂心壹兩  
 甘草半兩炙 防葵半兩 鼈甲壹兩塗醋炙 紫  
 茆半兩去土 檳榔壹兩 桔梗半兩去 枳殼一兩  
 微黃去瓢

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下二十九

治積聚氣脾胃虛冷宿食不消心腹氣滯脹

滿疼痛宜服木香丸方

木香三分白朮三分人參三分去去赤茯苓三分吳

茱萸半兩湯浸七乾薑半兩炮炮桂心三分陳

橘皮壹兩湯浸壹兩訶梨勒壹兩煨煨檳榔壹兩神

麴壹兩炒炒大麥蘖壹兩炒炒川大黃壹兩剉剉

當歸半兩剉剉桔梗半兩去去蘆頭

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治積聚宿食不消心腹脹滿疼痛宜服巴豆

丸方

巴豆壹兩去皮去皮心心附子壹兩炮炮裂裂硫黃壹

半半細細研研桂心壹兩五靈脂壹兩雄黃壹兩細細麝

香壹兩乾薑壹兩炮炮香黑半兩

右件藥搗羅為末入巴豆都研令勻用糯

米餅和丸如小豆大每於食前以生薑橘

皮湯下二丸

治積聚氣宿食留滯不能消化丁香丸方

丁香兩半木香兩半巴豆一分去皮心出油研入硫黃半

細研朱砂半兩細膩粉壹錢麝香壹錢乳香半兩飛水飛

神麩壹兩半別搗末

右件藥搗羅為末都研令勻以酒煮神麩

末為糊和丸如小豆大每服食前以生薑

橘皮湯下三丸

又方木香兩壹青橘皮壹兩湯浸去白瓢焙肉苳蔻三分去殼

巴豆半兩去皮心出油研入神麩壹兩微炒

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻以醋煮

飯和丸如小豆大每服食前以生薑橘皮

湯下三丸

治積聚宿食不消虛羸腹脹宜服此方

肥皂莢半兩炙去皮子搗為末甘遂三錢噉乾生搗羅為末

牽牛子二錢生搗為末

右件藥膏處更研細如麩患人二十匕上

用藥末壹錢用水濕拌用麩捏作餛飩子

十枚煮熟別用暖水嚼破下之良久方取  
下積聚如未轉卽更以煎水調藥末半錢  
投之良久取下積食初服藥後患人如欲  
睡是藥力行量人虛實加減服之

又方吳茱萸

二兩湯浸七  
日焙乾微炒  
巴豆半兩去  
皮心研如膏紙  
裹

壓去  
油

右件藥先搗羅茱萸爲末以醞醋壹大椀  
浸茱萸末一宿至來日於銀鍋內熬候茱  
萸似膏卽入巴豆膏更熬候可丸卽丸如

菘豆大空心以溫酒下三丸如氣散惡物  
下卽住服

治鼈瘕諸方

夫鼈瘕者由腹中瘕結如鼈之狀是也有食  
鼈觸冷不消而生者亦有食諸雜肉得冷變  
化而作者皆由脾胃氣虛弱而遇冷則不能  
剋消所致瘕言假也謂其有形段而推移也  
昔曾有人共奴俱患鼈瘕奴在前死遂破其  
腹得一白鼈仍舊活在有人乘白馬來看此

鼈白馬遂尿墮落鼈上其鼈即縮頭及脚尋以馬尿灌之即化為水其主曰吾將差矣即服之果如其言得差如故矣

治鼈瘕方

川大黃

半兩到碎微炒

乾薑

半兩炮裂到

附子

半兩炮裂去皮

臍

蝥蟲

七枚長壹寸者微炒

側子

半兩炮裂去皮臍

人參

半兩

去蘆

桂心

半兩

貝母

半兩微黃

細辛

半兩

白朮

兩

檳榔

兩

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調服壹

錢日三四服

又方防葵

壹兩

鼈甲

壹兩塗醋炙令黃去裙襴

苦楝子

兩

李人

壹兩湯浸

檳榔

壹兩

右件藥搗細羅為散每服以溫酒調下二

錢日三四服

治魚瘕諸方

夫人胃氣虛弱者食生魚因為冷氣所搏不能消之結成魚瘕揣之有形狀如魚是也亦有飲陂湖之水誤有小魚入腹不幸便即生

長亦有形狀如魚故以名也

治食魚鱠及牛肉住胃膈中不化吐之不出

便成癥瘕方

厚朴

壹兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

川大黃

二兩剉碎微炒

右件藥細剉分爲二服每服以酒一大盞

煮取六分去滓放溫盡服良久再服立消

治食鱠不消方右搗馬鞭草汁壹大盞煎五

七沸分溫二服服盡卽消服生薑汁亦消

瑣碎錄同○壽域神方食魚膾及生肉住胸膈

不化乃成癥瘕搗馬鞭草汁飲之壹升卽

消生薑水亦可

又方右以魚鱗燒作灰細研每服以新汲水

調下壹錢

治米癥諸方

人有好食米

巢氏病源啞米

轉久弥嗜之若不得米

則胃中清水出得米水便止米不消化遂生

癥結若不能早療致不能飲食久則斃也

治米癥久不療羸瘦宜服此方

葱白壹握切烏梅十五枚

右件藥以水壹大盞浸壹宿去滓温煖分爲二服當吐出米末爲度未吐卽再服之

治髮癥諸方

曾有人因食飲內誤有頭髮隨食而入成癥胃喉間如有蟲下上去來者是也

治髮癥云云飲油方方見千金方

治蛟龍病方

蛟龍病者云三月八月蛟龍子生在芹菜上

巢氏病源人食芹菜不幸隨食入腹變爲蛟

并菜上龍其病之狀發則如癩也

治蛟龍病云云寒食飭方方見千金方

治疰氣諸方

夫疰氣者由陰陽不調藏腑虛弱邪冷之氣結聚所生也其狀腹內連臍左右各有青條筋脉急大如臂次者如指拘急如弦之狀名曰疰氣也

治疰氣急痛腹脹胃虛不下食檳榔散方

檳榔兩川烏頭壹兩炮裂當歸半兩剉赤

芍藥半兩陳橘皮三分湯浸人參半兩去枳

殼半兩麩炒乾薑壹兩炮桂心半兩厚朴半

去麩皮塗生薑半夏半兩湯洗甘草壹兩

汁炙令香熟半夏七偏去滑赤

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盪

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治痰氣胃中寒不思食肉荳蔻散方

肉荳蔻三分燕莢兩高良薑壹兩桂心兩

木香兩白朮兩吳茱萸半兩湯浸七桃人

雙兩湯浸厚朴四兩去香熟

右件藥搗篩為散用生薑壹斤細切相拌

更擣作團以麩裹灰火中煨令通熟去麩

候乾擣細羅為散每服不計時候煮棗粥

飲調下一錢

治疝氣脇肋脹痛腹內氣結不能下食四肢

少力狼毒丸方

狼毒壹兩 川烏頭一兩炮裂 檳榔壹兩 木香

微煨 乾漆一兩 炒令煙出

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗壹二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下五

丸漸加至十九

治疝氣發即兩脇弦急心肋脹痛不能飲食

檳榔九方

檳榔三分 枳殼壹兩 麩炒微黃 鼈甲一兩 塗醋炙令黃

桔梗半兩 去人參半兩 去白朮三分 桂心三分

蘆頭半兩 去蘆頭

木香三分 前胡三分 去川烏頭三分 炮裂川

大黃壹兩 剉當歸三分 剉微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十丸

治疝氣急痛不思飲食肌體瘦弱桂心丸方

桂心三分 川烏頭一兩 炮裂柴胡一兩 亦芍

藥三分 檳榔三分 木香半兩 桃人壹兩 湯浸去皮

黃當歸三分 剉微炒

黃當歸三分 剉微炒

黃當歸三分 剉微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸

治疝氣急痛不能飲食桃人散方

桃人壹兩湯浸去皮尖吳茱萸壹分湯浸

雙人炒黃川烏頭壹兩炮裂檳榔壹兩木香壹兩當歸

一兩到微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水盪中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

治疝氣兩脇痛不可忍木香丸方

木香三分川烏頭半兩炮裂附子半兩炮裂

乾薑半兩炮裂巴豆壹兩去皮心當歸三分

炒

右件藥搗羅為末入巴豆同研令勻以醋煮麵糊和丸如棗豆大每服不計時候煎生薑醋湯下五丸

治疝氣發歇衝心疼痛不識人方

胡椒 附子炮裂去蓬莪茂已上各

右件藥搗細羅為散每服不計時候以醋湯調下半錢

又方川烏頭一兩炮裂去皮臍芫花壹兩醋浸壹宿炒令乾青

橘皮壹兩湯浸去白瓢焙吳茱萸壹分湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子

大每服不計時候以橘皮湯下十丸

又方桃人壹兩湯浸去皮尖雙人吳茱萸三兩

右二味相和以慢火熬桃人色稍黃即取

出用合器盛之密蓋定待冷擇去茱萸留

桃人每日空心爛嚼二七顆以熱酒下晚食前再服

治癖氣諸方

夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液通流雖復多飲水漿不能為病若攝養乖方則三焦否隔三焦否隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更過寒氣即聚而成癖也癖者謂癖側在於兩脇之間有時而痛是也

治脇肋下有癖急硬氣滿不能飲食胃背疼  
悶半夏散方

半夏一兩湯洗七遍去滑桔梗三分去蘆頭前胡壹兩半去蘆頭

吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾人參二分去蘆頭檳榔七枚

鼈甲壹兩半塗醋炙枳殼三分炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水盞中煮

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治癖氣兩脇下硬如石按之痛心腹痞滿不

能下食心悶欬逆積年不差鼈甲丸方

鼈甲壹兩半淨醋炙牛膝半兩去苗芎藭半兩川大

黃三分炒當歸半兩炒乾薑半兩炮桂心

半兩辛兩附子半兩炮裂巴豆二十枚去

兩細辛兩附子半兩炮裂巴豆二十枚去

壓去防葵半甘草半兩炙

右件藥搗羅為末研入巴豆令勻鍊蜜和

搗三五百杵凡如梧桐子大每服食前以

粥飲下五丸以微利為度  
治癖氣兩脇下硬按之痛心間欬逆不下飲

食四肢羸瘦積年不差防葵丸方

防葵三分芎藭兩半赤茯苓三分鼈甲壹兩塗醋令黃去

欄桃人三分湯浸去皮尖枳殼半兩雙炒黃去飢炒

木香兩半川大黃二兩對當歸半兩對乾薑

半兩炮桂心兩細辛兩桔梗蘆頭半兩去京三

稜三分微煨到

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三

十九

治癖氣脇下硬痛心煩不能食紫葛丸方

紫葛壹兩赤芍藥三分桔梗三分去紫苑兩

去苗木香三分訶梨勒三分煨郁李人兩

浸去皮川大黃壹兩半對牽牛子壹兩微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候煎木通湯下

二十九

治癖氣在兩脇結聚不散硃砂丸方

硃砂半兩乾薑兩炮川烏頭壹兩炮裂去皮

芫花

半兩醋拌

皂莢

半兩去黑皮塗

京三

稜

牛兩

五靈脂

壹兩

巴豆

半兩去皮心研

右件藥搗羅為末入硃砂巴豆同研令勻

用醋熬為膏旋丸如梧桐子大每服空心

及臨卧時以生薑橘皮湯下二丸神巧萬全方同

治癖氣脹痛吳茱萸丸方

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙令乾微炒

附子

壹兩炮裂桃

人

雙兩湯浸去皮尖

巴豆

秋夏用三十枚春冬用五十枚

去皮心研紙

乾薑

壹兩炮裂

裏屋去油

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻以軟飯

和丸如黍粒大每服不計時候煎生薑橘

皮湯下五丸

治癖氣結硬不消皂莢丸方

猪牙皂莢

四兩去黑皮塗酥炙令焦黃去子

巴豆

壹分去

紙裏壓

硃砂

半兩用酒盞

不件藥搗羅為末入巴豆研令勻用硃砂

膏和丸如梧桐子大每服食前以粥飲下

三丸

治腹滿癖硬如石積年不損方右取白楊東  
 南枝去蒼皮細剉三斤熬合黃絹袋盛用  
 酒一斗浸密封三五宿每於食前煖壹小  
 盞服之瑣碎錄同

治疝癖諸方

夫疝癖者本因邪冷之氣積聚而生也疝者  
 在腹內近臍左右各有一條筋脉急痛人者  
 如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰弦  
 氣也癖者側在兩肋之間有時而僻故曰癖

也夫疝之與癖名号雖殊針石湯丸主療無  
 別此皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得  
 宣流邪冷之氣搏結不散故曰疝癖也

治疝癖氣連心肋相引痛堅急大黃散方

川大黃壹兩剉 當歸壹兩剉 白木壹兩 枳殼壹兩  
微炒 柴胡壹兩半 鼈甲壹兩塗醋炙  
微黃去瓢 去苗 令黃去裙襴  
 右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
 入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫  
 服

治痿痺氣脇肋妨悶不欲飲食四肢瘦弱木香丸方

木香半兩乾薑壹兩炮裂草荳蔻壹兩去皮桂心壹兩

當歸壹兩微炒陳橘皮壹兩湯浸去白熟焙附子壹兩炮裂

去皮巴豆九十枚去皮心磨紙裏壓去油

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如棗豆大每服食前以粥

飲下五丸

治痿痺積冷氣攻心腹如錐刀所刺及鬼疰

往來者烏頭丸方

川烏頭壹兩炮裂去皮臍人參壹兩去頭桂心壹兩附

子壹兩炮裂去皮臍乾薑壹兩炮裂赤石脂壹兩朱砂

三兩細研水飛過

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時

候以暖酒下二十九

治痿痺氣塊不消令人羸瘦面色萎黃四肢

少力不欲飲食鼈甲丸方

龍甲

三兩塗醋炙

京三稜

三分微煨

川大黃

三兩微炒

陳橘皮

白麵煨

右件藥搗羅為末於銀鍋中入米醋三升以慢火熬成膏候可丸即丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

治疝癖氣時攻心腹疼痛令人不思飲食漸

為瘦病大黃丸方

川大黃

一斤生為末

龍甲

三兩塗醋炙

枳殼

二兩

半錢炒微黃去麩

當歸

壹兩半微炒

赤芍藥

壹兩

京三

稜

三兩微煨

吳茱萸

壹兩湯浸七

右件藥搗羅為散先以米醋三升熬大黃為膏次入諸藥和丸如梧桐子大每於食前以溫酒下三十丸

治疝癖冷癥塊及療丈夫腰脚補暖水藏善

治婦人血氣暖子宮殺三蟲伏火礪砂丸

方右先取臘月細桑條子不限多少燒作

灰略以水淋却苦汁後燉令灰乾收之每

壹兩礪砂管灰三兩先研礪砂以水化消

拌灰令乾濕得所取壹固濟了瓷瓶子底  
下先鋪乾灰半寸已來次下礶砂灰填實  
口頭更著乾灰覆蓋然用文火燒後武火  
斷令通赤候冷取出重研於竹梢箕內鋪  
紙三重然安灰以水淋之候藥透過紙待  
礶砂味斷卽休淋水別取小瓷鉢子壹兩  
箇盛藥汁於熱灰火內養之常令魚眼沸  
直至汁盡候乾別入固濟了瓶子內便以  
大火斷一食久待冷取出細研用粟米飯

和丸如紫豆大每日空心以煖酒下五丸  
治瘧癘氣冷熱不調兩肋下痛惡聞食氣四  
肢疲弱口乾唾粘頭目昏痛氣衝背膊虛腫  
煩悶大小便澁髮落耳鳴加健忘宜服桂  
心丸方

桂心兩 一川大黃四兩 剉兩 川朴消 二兩 赤芍

藥兩 壹

右件藥搗羅爲末鍊蜜和擣三二百杵丸  
如梧桐子大每於食前以煖酒下二十九

以微利為度

治痲痺氣疼痛芫花丸方

芫花 半兩醋調 砂 壹兩醋化 乾薑 半兩炮

京三稜 半兩到碎醋

右件藥搗羅為末用醋熬成膏以饅餅少許同和左如菜豆大每服食前以生薑橘皮湯下十九

治痲痺氣不消吳茱萸散方

吳茱萸 半兩湯浸七 鼈甲 三兩塗醋炙 川

大黃 壹兩到 當歸 二分到 京三稜 壹兩微

檳榔 壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以煖酒調下壹錢

治積冷痲痺氣不思飲食四肢羸困宜服此

方

葇荳子 三分水淘 大棗 四枚

右件藥以水三升相和煮水盡即取棗去皮核每於食前喫一枚粥飲下亦得覺熱

卽止

治疝瘕氣心腹疼痛肌膚瘦弱面無顏色及  
男子元氣婦人血氣並宜服此桃人煎方

桃人二下枚湯浸  
去皮尖雙入

右件藥細研如膏以酒二斗淘濾取汁於  
淨鐺中以慢火煎成膏每於食前以煖酒  
調下一茶匙

治疝瘕不著脇下痛硬如石方

生商陸根汁升一杏人  
去皮尖

右件藥研杏人令爛以商陸汁相和研濾  
取汁以火煎如飴每服取棗許大空腹以  
熱酒調服之漸加以利惡物為度

治疝瘕氣不消方

京三稜壹兩  
煨剉 川大黃壹兩  
剉

右件藥搗羅為末用醋熬為膏每日空心  
以生薑橘皮湯調下一茶匙

治久疝瘕諸方

夫久疝瘕氣者本因邪氣所生不離陰陽之

氣結畜而成也此皆由藏腑不調脾胃虛弱  
 飲食積滯不能宣行復遇寒氣在內即結聚  
 而不散於臍脇左右弦急組起時有腹痛時  
 人多患此疾卒差極難累月逾年積聚成塊  
 故名久痞癖氣也

治久痞癖氣心腹脹滿時時築心背痛宿食  
 不消嘔逆不思飲食休息氣痢喘促黃瘦面  
 目虛腫京三稜丸方

京三稜 三分微煨到 鼈甲 壹兩塗醋炙川 大黃

一兩半剉 木香 半當歸 三分剉 白朮 三分厚  
 碎微炒 朴 青兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟 吳茱萸 半兩湯浸七  
 訶梨勒 一兩煨 枳殼 壹兩麩炒微黃 麥蘖 壹兩炒  
 神麴 壹兩剉 桂心 兩一檳榔 兩  
 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸  
 如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三  
 十丸

治久痞癖氣腹內積聚邪氣往來厥逆搶心  
 心胃痺悶吐逆飲食烏頭丸方

川烏頭壹兩半炮裂去皮吳茱萸三分湯浸七遍川椒三分去目及閉口者微炒出汗乾薑三分炮裂桂心壹分柴

胡壹兩去苗生乾地黃壹兩細辛半兩芍藥半兩紫苑半兩

半兩去苗去苗人參半兩去白朮半兩白薇半兩赤芍

藥半兩皂莢半兩去炙令焦黃去子

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵九

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二

十九

治久痲痺氣或時嘔噦腹痛不能飲食葦茛

九方

葦茛壹兩乾薑三分炮裂胡椒三分桂心三分人參

壹兩去陳橘皮三分湯浸訶梨勒壹兩煨

赤茯苓兩檳榔二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵九

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二

十九

治久痲痺氣發歇不定肌肉消瘦往往吐逆  
肩背疼痛宜服大黃九方

川大黃三兩到川朴消壹兩蓬莪茂兩訶梨

勒壹兩煨桂心三分枳殼壹兩吳茱萸

三分湯浸七金星礬石二兩泥裏燒柴胡

壹兩狼毒半兩巴豆壹分去皮心研

右件藥搗羅為末研入巴豆礬石令勻以

熟棗瓢和搗三二百杵丸如梧桐子大每

日空心以溫酒下十九老少臨時加減丸

數服之

治久疝瘕氣不消桃人丸方

桃人三合湯浸去皮尖鼓三合川椒壹兩

及閉口者乾薑壹兩炮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服於食前以溫酒下二十

丸

治疝瘕氣食物不消宜服此方

木香壹兩硫黃壹兩細研川大黃二兩到

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大食前以溫酒下二十九

又方蒼木壹兩剉川烏頭二兩炮裂去皮臍赤芍藥

兩半

右件藥擣羅為末用醋煮麩糊和丸如梧  
桐子大每於食前以生薑橘皮湯下二十  
丸

治疝癖心腹脹滿諸方

夫疝癖心腹脹滿者由陰陽不調食飲宿滯  
積聚成病蘊結在內氣不宣通邪氣搏於正  
氣脾胃虛冷故令心腹脹滿也

治疝癖冷氣脹滿不能食白朮散方

白朮壹兩訶梨勒皮壹兩殼三分桂炒陳橘  
皮三分湯浸乾薑裂三分炮人參壹兩去桔  
梗半兩去桂心三分木香三分檳榔三分

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞  
又棗二枚煎至五分去滓不計時候溫服

治疝癖氣急硬滿脹心肋多痛不能食物氣

攻胃背壅悶半夏散方

半夏三分湯洗桔梗壹兩去大腹皮壹兩  
七遍去滑蘆頭

前胡壹兩去頭 鼈甲壹兩半塗醋炙 枳殼兩

蘇炒微 人參三分去蘆頭 檳榔兩 赤芍藥兩 吳

茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治痞瘕氣脹心肋急痛不能下食四肢少力

枳殼散方

枳殼壹兩麩炒 桔梗壹兩去蘆頭 鼈甲壹兩塗醋炙令

黃去 人參壹兩去蘆頭 柴胡五兩 檳榔七 芎藭

三分 桂心兩 陳橘皮壹兩湯浸 赤茯苓兩 木

香三 川大黃壹兩剉 當歸五分剉 赤芍藥

三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治痞瘕氣腹脇脹滿喘息促急不思飲食宜

服大腹皮散方

大腹皮壹兩 赤茯苓三分 桔梗三分 去牡丹

分桃人雙半兩湯浸去皮尖 檳榔一兩 桑根白

皮一分 枳殼三分 炒微黃一分 鱉甲一分 塗醋炙

郁李人去一兩湯浸 川大黃壹兩半 碎微炒

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治疰癖氣心腹脹滿不下食飲胃膈壅悶喘

嗽氣急宜服桃人散方

桃人壹兩湯浸去皮尖 龍甲三分 塗醋炙

川烏頭三分 炮裂皂莢 炙半兩 去黑皮塗醋

枳殼三分 炒微黃一分 白朮二分 桔梗三分 去檳榔

分防葵兩 紫苑三分 去乾薑 半兩炮 細辛

兩陳橘皮去白 瓤焙

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣五七百杵凡

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三

十九

治疰癖氣攻兩脇脹滿心胃不利少思飲食

訶梨勒丸方

訶梨勒壹兩用皮梔梗三分去赤芍藥牛枳

殼一兩麩炒白木壹赤茯苓壹桃人一兩

去皮尖雙人鼈甲壹兩塗醋炙桂心三分木

香兩川大黃碎微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子人每服不計時候以溫酒下三

十丸

治疝瘕氣心腹脹滿不欲飲食京三稜丸方

京三稜微煨木香肉荳蔻去桃人湯浸

尖雙人麩乾薑炮裂青橘皮湯浸去蓬莪

茂已上各巴豆半兩去皮心水煮膏

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻鍊蜜和

擣五七百杵丸如梧桐子大每服空心以

生薑橘皮湯下三丸

治疝瘕氣吐水沫食飲不得氣逆脹滿方

檳榔兩高良薑壹兩桃人三合湯浸去皮

黃尖雙人麩炒微

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如彈子大每服不計時候以溫酒研下壹丸

治痲痺不能食諸方

夫痲痺不能食者由脾胃虛弱為邪氣所搏故也脾主摧伏水穀以養四藏榮於氣血若其氣和平則中膈宣暢以納五味也若藏腑虛冷為寒氣所乘則宿食不消積聚痲痺在於腹中脾氣虛弱故不能食也

治痲痺氣不能食腹中痛時嗽四肢少力杜心丸方

桂心壹兩訶梨勒皮兩白朮壹兩厚朴壹兩

塗生薑汁陳橘皮三分湯浸附子三分

炙令香熟防葵三分吳茱萸七分

臍乾薑二分炮木香三分

微鼈甲壹兩塗醋炙右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑棗湯

下三十九

治痿痺氣發即兩脇急滿四肢煩悶不能食  
宜服檳榔丸方

檳榔一兩枳殼三分麩炒三分桔梗三分去三分人參

三分白朮半兩桂心半兩柴胡壹兩陳橘皮

三分湯浸川大黃碎壹兩芎藭半兩草薹壹兩

壹兩去皮兩右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十九

治痿痺氣腹脇痛不能食四肢少力宜服木

香丸方

木香三分訶梨勒壹兩煨壹兩黃耆壹兩龍甲壹兩

壹兩塗醋炙令白朮亦壹兩桂心三分枳殼

壹兩黃去壹兩陳橘皮壹兩湯浸當歸微炒壹兩

檳榔壹兩五味子三分右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二

十九

治痿痺氣不能食心脇下滿四肢骨節痠疼

白朮丸方

白朮三分黃耆壹兩牡蠣三分燒人參三分

頭赤茯苓兩壹川烏頭二分炮裂乾薑半兩

剉赤芍藥三分當歸三分剉訶梨勒皮二分

辛半兩桂心半兩前胡半兩去甘草半兩防

葵兩半鼈甲壹兩塗醋炙紫苑苗三分去檳榔

壹兩桔梗半兩去

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十九丸

治痿痺氣不能食四肢少力人參丸方

人參壹兩去白朮三分枳殼三分麩炒陳橘

皮半兩湯浸桂心三分甘草半兩炙桔梗半

去蘆乾薑三分炮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下三

十九丸薑棗湯下亦得

治疰癖氣每發痛不能食京三稜散方

京三稜三兩微煨到益智子壹兩去皮吳白朮兩木

香膏兩

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中  
盞煎至五分去滓不計時候稍熱服

治疰癖羸瘦諸方

夫疰癖羸瘦者由寒溫不調藏腑虛冷飲食  
不化邪氣與藏氣相搏結聚所生也若久不  
差則經絡否澀氣血不和四肢洒淅寒熱腹

中鬱鬱而痛不欲飲食脾胃氣虛不能榮於  
肌肉故令羸瘦也

治疰癖氣心腹滯悶面色萎黃日漸羸瘦紫

苑丸方

紫苑三分去苗土柴胡三分去苗川烏頭半兩炮裂

吳茱萸半兩湯浸七厚朴三分去麤皮塗

熟皂莢半兩去黑皮塗酥川椒一分去目

改炒桔梗半兩去蘆頭黃連半兩去鬚肉桂半兩去

芥茯苓半兩菖蒲半兩人參半兩乾薑半兩

剉巴豆半兩去皮心研

右件藥搗羅為末入巴豆同研令勻鍊蜜和壽五七百杵丸如菜豆大每服空心以粥飲下五丸

治痲痺氣多吐清水面色萎黃心肋脹痛不

欲飲食四肢羸瘦宜服附子丸方

附子四兩炮裂去皮臍白朮三分陳橘皮一兩湯浸去白吳茱萸一兩湯浸七桃人壹兩湯浸去皮黃乾薑半兩炮裂木香半兩桂心三分川大黃兩

剉碎神麴壹兩炒丁香三分草薺壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯下三十丸

治痲痺氣攻心肋痛不欲食四肢羸瘦白朮

丸方

白朮三分蓬莪茂二分烏藥半兩木瓜兩桂心半兩

硃砂壹兩半生薑屑半兩益智子三分木香兩

兩蕪黃兩神麴二兩擣羅為末并

右件藥搗羅為末用硃砂麴膏和丸如梧  
桐子大每服不計時候煎生薑橘皮湯下  
三十九

治痿痺氣四肢羸瘦心神虛煩皮膚乾燥不  
欲飲食宜服羊脂煎方

羊脂壹升牛髓壹升川椒壹兩去目及閉桂心  
青人參壹兩去五味子壹兩芎藭壹兩乾薑  
兩壹兩炮生乾地黃二兩遠志壹兩生薑汁二  
當歸一兩剉生地黃汁壹升吳茱萸三分湯  
微炒

焙乾  
微炒

右件藥搗細羅為散先用羊脂牛髓生薑  
地黃等汁以慢火煎令沸後入藥末煎鍊  
成膏收於瓷器中每服以溫酒調下半匙  
日三四服

治痿痺冷氣不能飲食四肢羸瘦少力枸杞  
子九方

枸杞子三兩乾薑壹兩炮白朮壹兩川椒二兩  
及閉口者兩吳茱萸三分湯浸陳橘皮兩  
微炒去汗兩遍焙乾微炒

湯浸去白瓢焙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三三百杵丸如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治痲痺氣不能食飲虛乏羸瘦牛膝丸方

牛膝三兩生乾地黄四兩當歸壹兩半桂心三兩木香壹兩五味子二兩肉蓯蓉三兩酒浸壹兩炙令乾神麴末三合炒大麥蘖二合炒白朮壹兩人參壹兩白茯苓三兩檳榔兩陳橘皮二兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十九晚食前再服

治痲痺氣胃滿背痛不能食日漸羸瘦四肢

無力時時驚悸檳榔丸方

檳榔壹兩桔梗壹兩去當歸壹兩剉人參壹兩去蘆兩桂心壹兩前胡壹兩去陳橘皮三分湯頭厚朴壹兩生薑汁炙令香熟白朮壹兩甘草壹兩炙微赤剉川烏頭壹兩去皮臍乾薑壹兩剉炮茯神

壹兩 龜甲二兩塗醋炙 川大黃二兩剉碎微炒 龜齒兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵凡如梧桐子大每服以粥飲下三十九日三服

治癥病諸方

夫癥病者由寒溫失節致腑藏之氣虛弱而食飲不消聚在於內染漸生長塊段盤牢不移動者是癥也言其形狀可徵驗也若積引

歲月人即枯瘦腹肚轉大遂至於死診其脉弦而伏其癥不轉者必死矣

治食飲不消結成癥病烏頭丸方

川烏頭半兩 京三稜半兩微煨 芫花半兩醋拌炒令乾

巴豆半兩去皮心研 硃砂半兩湯化去石熬乾 消石半兩

半川大黃半兩剉碎微炒 青橘皮半兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻以酒壹升醋二升相和以慢火煎如稀錫即住火後用丁香壹分木香壹分肉豆蔻半兩搗

羅為末朱砂壹分細研與前藥同和丸如  
菜豆大每日早晨以生薑橘皮湯下三丸  
夜臨卧時再服

治癥病不消四肢羸困不欲飲食久不差  
砂九方神巧萬全方

硃砂壹兩細研水飛過萬全硫黃壹兩細研木

香半兩檳榔一兩川大黃三兩牽牛

子三兩吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾京三

稜一兩微炒當歸微炒肉桂微炒青橘

皮一兩湯令黃大鼈甲一兩塗醋炙

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊密和  
擣三二百杵丸如梧桐子大每日空心及

晚食前以温酒下三十丸

治癥病腹中硬痛不欲飲食經久不差羸弱  
無力朱砂九方

朱砂一兩細研肉桂壹兩去巴豆二十

皮心研紙禹餘糧壹兩燒醋淬紫石英兩

裏壓去油三遍細研飛過

右件藥都研令勻以湯浸蒸餅和九如菜  
 豆大每服食前以溫酒下五九  
 治癥病心腹妨悶不欲飲食四肢不和大黃  
 九方

川大黃半兩剉碎微炒 木香半兩 肉苳蔻半兩去殼 礶砂  
半兩 乾薑半兩剉 炮 青橘皮三分湯浸 吳茱  
細研 黃膏兩湯浸七 檳榔兩半 桂心兩半 蓬莪茂兩壹  
遍煨乾微炒 巴豆壹分去皮心研  
 右件藥擣羅為末入巴豆礶砂研令勻以

醋熬成膏和九如梧桐子大每服空心以  
 粥飲下三九

治癥病結硬心腹疼痛京三稜九方

京三稜一兩半微煨剉 檳榔壹兩 木香壹兩 乾薑壹兩剉  
 剉 陳橘皮壹兩湯浸 桂心兩半 當歸壹兩剉  
 巴豆半兩去皮心研  
用紙裏壓去油

右件藥擣羅為末用醋熬巴豆成膏入前  
 藥末和九如梧桐子大每服空心以生薑  
 橘皮湯下五九神功萬全方同

類聚百十  
九

治積年癥塊及血塊方

砒霜壹分 粉霜壹分 礪砂壹分 膩粉三錢

右件藥細研令勻用肥棗去核入藥在棗裏面以線繫定用白麩餅子逐箇裏燒熟餅子為度取出去棗皮研熟丸如棗豆大每服空心及夜臨臥時以薑棗湯下三九

治癥病腹中結硬五靈脂丸方

五靈脂壹兩 防葵半兩 桂心半兩 猪牙皂莢半兩  
皮塗酥炙令焦黃去子 巴豆半兩 和皮麩炒令黑去  
皮膜心研爛紙裏壓去

油木香半兩

右件藥擣羅為末入巴豆更研令勻用醋煮麪糊和丸如黍米大每服空心及夜臨臥時以生薑湯下三九

又方硫黃壹兩 礪砂壹兩 巴豆壹兩 附子壹兩  
去皮臍搗 羅為末

右件藥先用頭醋二升煮巴豆令赤色卽出之却入冷水椀中浸兩炊久洗淨去皮心研如粉又以醋二升與巴豆同煎至壹

升然下硫黃硃砂附子等末以文火熬令  
稀稠得所別入乾薑末壹兩和丸如黍米  
大每服空心以生薑棗湯下三丸夜臨臥  
時再服

治癥病久不消令人萎黃羸瘦不欲飲食巴

豆丸方

巴豆壹兩去皮心硃黃細研附子炮裂去  
五靈脂炮裂木香肉荳蔻去丁  
香檳榔硃砂研乾漆搗碎炒令出

右件藥持羅為末入諸藥研令勻

治久積癥癖諸方

治久積癥癖氣不散脇下似覆杯多吐酸水  
面目萎黃或腹中疝痛蓬莪散方

蓬莪茂兩鼈甲二兩塗醋炙赤芍藥兩檳  
榔壹兩肉桂壹兩去枳殼微黃去歸壹

判微乾薑半兩炮裂判京三稜壹兩炮判川大黃壹兩  
 炒碎木香一兩柴胡壹兩半  
 微炒右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中  
 蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候  
 溫服

治久積癥癖氣不差令人羸瘦不思飲食京  
 三稜丸方

京三稜二兩微川烏頭二兩炮裂陳橘皮  
 二兩湯浸壹兩乾薑壹兩雄雀糞  
 去白瓢壹兩硃砂壹兩

一兩  
微炒

右件藥搗羅為末入硃砂研令勻以醋

治久積癥癖不差漸至羸弱宜服此方右取  
 雄雞壹隻飼之令肥後却餓二日項碎  
 日以好朱砂壹兩研令細拌飯飼雞著板  
 上養收取糞曝乾杵羅為末每於食前以  
 溫酒調下壹錢

治久積癥癖及心腹鼓脹並宜服此方右用  
烏牛尿五升於銀器中微火煎如稀錫每  
服空心以熱酒調下壹匙頭服後當腹中  
鳴轉病出隔日更服

### 熨癥癖方

吳茱萸升一川烏頭三兩

右件藥搗碎用醋拌炒令熱分作二包更  
番熨之

### 治暴癥諸方

夫暴癥者由藏腑虛弱食生冷之物藏既本  
虛不能消之結聚成塊卒然而起其生無漸  
名之暴癥也本由藏弱其癥暴生至於成病  
斃人俱速矣

治暴癥堅結四肢瘦瘁食少無力蜴蜥丸方

蜴蜥壹枚蜈蚣一枚鬼白壹兩半漢防己

當歸壹兩川大黃三兩川芒消

赤芍藥二兩日草壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以溫酒下十九以  
利為度

治暴癥氣攻心腹脹痛不欲飲食宜服巴豆  
丸方

巴豆

壹分去皮心研  
紙裏壓去油

川大黃

半兩判  
微炒

乾薑

半兩炮  
裂判

木香

半兩

蓬莪茂

半兩

右件藥搗羅為末入巴豆同研令勻鍊蜜  
和搗三二百杵丸如小豆大每服空心以  
生薑湯下五丸

治卒暴癥腹中有物如石痛如刀刺晝夜啼  
呼宜服此方

蠶砂

壹斗

桑柴灰

壹斗

右件藥以水三斗往復淋之五六度取生  
蠶長壹尺者壹枚內灰汁中煮之爛熟取  
出擘去甲及骨於砂盆中研令細更入灰  
汁中煎熬候可丸即丸如梧桐子大每於  
食前以溫酒下二十九

又方蒟藿根

壹斤  
細剉



葵三分食茱萸兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫酒下三十九

治食不消成癥癖令人四肢乾瘦不欲飲食

檳榔丸方

檳榔壹兩川大黃二兩碎白朮三分枳殼三分

麩炒木香兩半柴胡壹兩鼈甲二兩塗醋黃去瓢

襴

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以煖酒下二十九

治食不消結成癥癖心腹脹痛礪砂丸方

礪砂壹兩京三稜兩半芫花兩半醋半猪

牙皂兩塗酥兩去黑皮黃巴豆半兩去皮心研

乾漆兩炒令煙出乾薑兩炮大戟兩炒令黃

色川烏頭兩炮裂

右件藥搗羅為末入研了藥令勻於銀鍋

子內以頭醋壹升半慢火熬候可丸入油

單內裏旋丸如菜豆大每服空心及夜臨

臥時以生薑橘皮湯下三九

治脾虛不能化穀宿食留滯致成癥癖木香  
九方

木香兩半肉荳蔻半兩檳榔兩半巴豆三十枚

皮心紙裹乾薑半兩炮裂到半夏壹兩湯洗朱

壓去油陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗羅爲末入巴豆朱砂更研令勻  
以醋煮麵糊和丸如菉豆大每服空心以  
生薑棗湯下三九

又方芫花壹兩醋拌神麴炒三兩末巴豆油煎

令黑去皮心研以醋壹

碗與芫花等同熬成膏

右件藥都和擣作壹團川油單裹之旋取  
丸如菉豆大每服空心以生薑橘皮湯下

三九

又方木香三分蓬莪茂壹兩京三稜壹兩微巴豆

二十枚去皮心朱砂三分細研研紙裏壓去油

右件藥前三味搗羅爲末入後二味更同  
研令勻川麴糊和丸如菉豆大每服空心

以生薑橘皮湯下三丸

治食不消化結聚成癥塊頭面浮腫腹脹不能食香墨丸方

香墨三分肉苳蔻三分檳榔三分甘遂三分麩

續隨子半錢朱砂壹錢麝香壹錢巴豆一分

心研紙裏木香三分猪牙皂莢壹錢去黑皮

去子

右件藥搗羅爲末入研了麝香朱砂巴豆等更研令勻以醋煮麵糊和丸如棗豆大

每服以生薑湯下三丸

治宿食不消結成堅癥形如杯卵腫硬如石宜服此方

巴豆壹兩去皮心生研與杏仁半兩湯浸

人製炒皂莢二兩去皮以前巴豆壹荒花兩

半醃并川烏頭半兩去皮用雄黃壹分乾漆

炒令煙出研砂半兩

右件藥搗羅爲末醋煮麵糊和丸如棗豆大每日空心以溫酒下三丸

治食不消化腹中結聚癥塊玉華丸方

消石兩半硫黃兩半白礬兩半硃砂分壹

右件藥搗末用坩鍋子內文火燒令赤直候乾硬停火候冷取藥於濕地合著以土擁之出火毒一日後取出細研為末以粳米飯和丸如梧桐子大每服以醋湯下七丸老少臨時加減

醫方類聚卷之一百一十