

神效集

全国中医药图书情报工作委员会选编

中医古籍辑录大全

中医古籍出版社

五十年月王燕霞

江泽民主席题写书名

中国古籍总目

全国中国古籍总目编辑工作委员会

前 言

中医药学是我国古代科技宝库中的一枝奇葩，它以博大精深的医理，神验奇效的医术，济世活人，相传数千年，屹立于世界医学之林。这份宝贵的医药学遗产，保存在历代流传下来的医药典籍中，虽历经沧桑，岁月磨蚀，存留至今的仍不下万余种，其中沦为孤本者亦逾千种。这些孤本医书中不乏稀世之珍品，如宋元以来历代精刻之善本、名医手稿、名家批校本、精写本、刻书底稿、手绘本草图、经络图等。这些珍贵的医药典籍，由于多年的自然侵蚀和保管条件不善，不少已面临绝本危险，抢救、保存这些珍贵的文化遗产已成为当务之急。鉴此，国家中医药管理局决定选编影印出版《中医古籍孤本大全》一书，并责成「全国中医药图书情报工作委员会」具体承担选编任务。本书的选编基本遵循以下原则：一、经考查各家书目，证实已成为孤本的医书；二、内容有较高的学术价值与实用价值者；三、在理论和实践上有独特的见解和经验，具有参考价值者；四、书品较好，无重大残缺者。根据以上选编原则，预计入选孤本医书将

有三百种左右。

孤本医书收藏单位遍及全国各地，本书的编辑出版，得到许多藏书单位的通力合作，使我们的选编出版工作得以顺利进行。为确保这套丛书的选编质量，国家中医药管理局和全国中医药图书情报工作委员会聘请了全国二十多位知名学者、中医专家为该书的学术顾问。

本书的选编出版，是弘扬我国古代科技成就，抢救民族文化遗产，继承发扬中医药学术的一件大事，得到国家、部、局各级领导的重视和支持，江泽民主席亲笔为本书题写书名，这对本书编辑出版工作是一个很大的鼓舞。我们相信，在各级领导重视、社会各界的关怀与支持，和有关专家学者的参与指导下，我们一定能够克服各种困难，胜利完成这部划时代的大型系列丛书的选编出版工作。

编者 一九九三年九月

嘉慶丁丑年鑄

神效集

青村艸堂藏板

据清嘉庆二十二年丁丑
(一八一七)刻本影印
高一百八十毫米
宽一百二十三毫米

嘉慶二十二年
五月

師
文
集

青
山
堂
藏
本

内 容 提 要

《神效集》是一部小型临床治疗手册，扉页未署作者名讳。现存嘉庆二十二年（一八一七）刻本，仅见于北京图书馆。

书分二卷，选方大多辑于多种临床医著，惟以切于临床实效为收方原则。其中包括部分著名的经方和时方，但全书方治仍以专病通治方和单秘验方作为其基本内涵。

此书编者辑选之效方，约有以下数类：

一、列主治病证而无方名。如「治胃气痛」方、「治冒风寒」方、「治偏头风」方、「治疟疾」方、「治臃胀」方、「治疗毒肿病」方、「治发背」方、「治跌打损伤」方、「治杨梅结毒」方、「治杨梅疮」方、「治疥疮」方、「治走马牙疳」方等。

二、突出主治作用的无名方。如「止疟方」、「调经方」、「安胎方」、「保产方」、「消肿止痛方」（洗药方）、「退翳明目方」等。

三、具有明确方名之专病通治方。如「除瘟救苦丹」治瘟疫时症，「调经种

子丸」治妇人血虚不孕，「慢惊散」治疗小儿慢惊风，「神验疗毒丸」治多种疗毒，「烟仙绳方」治无名肿毒等。

四、兼收少数名医之专病通治方。如「倪涵初治疟疾奇效三方」、「王耀庭治痢疾方」、「王耀庭治血崩二方」等。这类选方较为成熟可取，特别是清初名家倪涵初，生平尤擅于治疗疟痢，所撰《倪涵初疟痢三方》在内科临床有较大的影响，值得我们深入研究。

全书之方治，主要针对常见多发病。选方大多来自方书著作，或属于医家个人之经验效方。列述每方之方药、用法，相当简要。有些效方的介绍则较为详明，如神验疗毒丸，不仅介绍其方药组成、制法、服法、饮食宜忌、预后等内容，并分析常见疗毒的不同部位、不同病名和不同症候。使读者对此效方的实际应用提高了理性认识。

神效集目次

卷一

治浮腫方

治心氣痛方

治疰方

治傷寒方

治溫疫方

治霍亂方

治中暑方

止汗方

治頭風方

治鼻衄方

黑髮固齒方

治咽喉肿痛方（咽喉诸症方）

治噎食方

治胃脘痛方

治腰痛方

治臌胀方

治痢方

治便血方

治小儿惊风疳泻方

治小儿遗尿方

稀痘方

治痘毒方

退翳明目方

附麻疹约要

軒校書

卷一

卷二

伤损诸方

治诸肿毒方

治虫兽伤方

治疗毒肿痛方

治诸中毒方

治杨梅结毒诸方

治诸痈疽疮毒方

治乳痈方

治口疮牙痛方

美容诸方

治痰核瘰疬病方

治误吞物梗喉方

治眼疾方

治便秘方

治腹泻方

治疝气痛方

治遗精白浊方

治小便不利方

种子方

治妇人虚劳方

治血崩方

调经诸方

安胎诸方

治难产方

治产后中风方

神效集

治氣虛浮腫。利水健脾。

陳皮 一錢

香附

白茯苓

各二錢

桔梗

砂仁

厚朴

薑汁炒 各八分

青皮

醋炒 三分

大腹皮

五分

麥芽

炒

陳神麴

炒各七分

生薑三片煎服消腫後加白

朮二錢

陳土炒焦

治心口氣痛

當歸

白芍

青皮

各一錢五分

山楂肉

二錢

枳

榔 八分

石菖蒲

五分

延胡索

一錢

白苳蔻



研三分
台烏藥 一錢
公丁香 五個。去丁蓋乳子。
白杜棟

核 三錢。鹽水煮。去皮肉。打碎炒。
加沉香末二茶匙冲服連服

五六劑即效。如恐再發。加重分兩研末。煎白疾藜

湯。和煉白蜜少許為丸。梧桐子大。每服二錢。臨卧

開水下。

又方 千槌草 一把。即船上繫纜木椿頭上。打成蓬頭者。剪下。名千槌草。 煎服

治胃氣痛

香附 一兩 製
砂仁 五錢 鹽水炒
生甘草 三錢
荔枝

核 十個
共研末。每服二錢。黃酒下。或薑湯下。

神香散 治男婦氣痛

母丁香 白荳蔻仁 等分。研末。重者一錢。輕者八分。黃酒薑湯皆可冲服。一方用砂仁。公丁香。

治九種氣痛

鬱金 醋炒

香附 酒醋薑汁童便各浸炒一遍。

生甘草 等

分。研末。黃酒冲服。

治瘧疾

何首烏 白芍 半夏 陳皮 山查 青皮

生甘草 蒼朮 各一錢 酒水各一碗。煎至一碗。上

蓋鐵器露一夜病發日清晨空心温服重者三服

治日日瘧疾

蘇葉 半夏製 厚朴製 木通 枳殼各八分

防風五分 檳榔六分 青皮四分 麥芽 山

查肉錢一 生薑一片 葱白五分 清晨煎服

治間日瘧疾

防風 羌活 陳皮 穿山甲各七分 猪苓 黃

苓各五分 青皮三分 生甘草四分 知母六分

草薹仁 赤茯苓 白葛根 柴胡 法半夏各八分

分 生薑一片。桃葉心七個。煎好露一夜。早溫服。
止瘧方

當歸 川芎 防風 甘草 陳皮 蒼朮 杜

仲 檳榔 草菓 半夏 常山 荆芥 知母

各一錢 烏梅 五錢燒熟打碎 將藥共放鍋內炒熱。瘧未

發時。用稀布包裹。捆於臍上。臍內先以藥末三分
填滿。其發必輕。再炒再捆。卽效。間日瘧者更效。輕
者一服。重者兩服。

倪涵初治瘧疾奇效三方。瘧之爲害。南人患之。北人尤甚。弱者患之。強者尤甚。

雖不至遽傷大命。然不治則發無已。治之不得其
道。則惡邪內伏。正氣日虛。久而久之。遂不可藥。予
所定三方。甚為平易。無奇絕。不人常山草菓等。却
劑。且不必分。陽瘧陰瘧。一日二日三日。及非時瘧。
人無老幼。病無久近。此三方不用加減。唯按次第服之。無不應手而愈。

第一方

廣陳皮 陳半夏薑汁 白茯苓 威靈仙各一錢

蒼朮米泔水浸一日切炒 厚朴薑汁 柴胡 黃芩各八分

青皮 枳榔各六分 炙甘草三分 生薑三片 井

水河水各一鍾煎九分。饑時服。渣再煎服。如頭痛。

加白芷一錢。此方平胃消痰理氣除濕有開

先之功受病輕者二服即愈勿再藥若三服後病勢雖減而不全愈用第二方少則三服多則五服

第二方

生何首烏 三錢 廣陳皮 柴胡 白茯苓 黃

芩各八分 白朮炒 當歸 威靈仙各一錢 知母

鱉甲醋炙脆研粉各二錢 炙甘草 三分 生薑 三片 井水

河水各一鍾煎八分加無灰酒五分再煎一滾空

心服渣再煎服此方妙在補瀉互用虛實得宜不

用人參黃耆屏去常山草葉平平無奇實有神效

即極弱之人。纏極重之病。十服後。立奏萬全。所云
加減一二。即不靈應者。正此方也。

第三方

人參

白朮

炒各一錢

黃耆

蜜炙

當歸

各一錢二分

錢

廣陳皮

柴胡

各八分

炙甘草

三分

升麻

四分

或加何首烏

二錢

知母

炒一錢

或加青蒿子

八分

麥芽

一錢

生薑

一片

大棗

一枚

水

二鍾

煎八分

半饑時服用三五服。元氣充實。永不發矣。方雖有

三。惟第二方實為主治之良方。既不刻削。亦不竣

補。是以功獨歸之。其第三方。需為有力者而設。貧家安得有參。宜多服第二方可也。

王耀亭止瘧二方

苦參不拘多少

研末以醋糊神麩為丸。梧桐子大。晒

乾。磁餅收固。每服三錢。用向東桃枝尖。向西柳枝尖。各七個。熬濃湯。於瘧發日。清晨向東吞。即止。

又方

胆礬

八分順研成稀水

以飛羅麵為錠。男塞左鼻。

內。女塞右鼻內。即止。俱忌油膩生冷瓜菓等物。

麻黃湯

治傷寒發熱頭痛身痛腰痛骨節痛項背強怕寒怕風氣喘無汗宜服此方

麻黃連節三錢

甘草一錢

杏仁去皮尖七粒

桂枝二錢

將麻黃煮數沸去沫入各藥同煎熱服取汗無汗

再服得汗即愈忌油膩葷腥

桂枝湯

治傷風發熱頭痛怕風怕寒鼻鳴乾嘔有汗宜服此方

桂枝

白芍藥

生薑各三錢

甘草二錢

大棗

二枚

水煎熱服服後吃稀熱粥一大碗出微汗

即愈忌油膩葷腥

荆防敗毒散

治傷寒頭痛怕寒燥熱項強睛暗鼻塞聲重風痰咳嗽及時疫嵐瘴鬼瘧或聲

如蛙鳴赤眼口瘡濕毒流注脚腫腮腫喉痺毒痢諸瘡斑疹

荊芥

防風

錢各二

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

枳殼

麩炒

桔梗

茯苓

錢各一

甘草

薄荷

分各五

生薑三片。水煎服。輕者二三服。重者

四五服愈。忌油膩葷腥。

芎蘇飲

治四時外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽鼻塞。腹痛瀉泄。輕者二三服。重者四五服。

紫蘇

錢五分

川芎

柴胡

前胡

乾葛

半夏

薑汁炒

茯苓

陳皮

甘草

枳殼

麥麩炒

桔梗

錢各一

木香

研五分

生薑三片。大棗二枚。水煎服。

人馬平安散

治一切傷寒傷暑水土不服。以及四時不正之氣。

硃砂

明雄各四錢

麝香四分

硼砂五錢六分

大

赤佛金

張十六

牙硝

二錢四分

冰片

四分

牙皂

北細辛

生半夏各二錢

共研末。五月五日製磁

餅收固。

酥雄丹

治一切沙證。並暑氣惡氣。

上硃砂

研飛

真茅山蒼朮

丁香

明雄黃

真蟾酥

各淨末一兩二錢

將蟾酥以好酒化開。不住手

攪粘。將各藥俱入酥內。搗勻。丸如粟米大。凡遇惡

心。腹痛。頭痛。四肢酸脹。頭暈眼昏。心煩意亂。用一

丸含於舌下。聽其自化。微覺舌麻。不過一時即愈。至重者不過二丸。切勿多用。亦可治螫蝎蜂叮發癢瘡。一二丸水浸化敷患處。忌生冷辛辣油膩。

青蒿丸

青蒿葉

不拘多少。陰乾為末。

用稀麵為丸。梧桐子大。晒乾。

磁磬收貯。採時宜五月五。六月六。七月七等日。每服三錢。一切瘧疾。前一日下午。無灰酒下。次早再服一服。紅痢。燈心湯下。白痢。薑湯下。腹痛吐瀉。有胃寒。胃熱而作者。有飲食失和。臭氣入腹而作者。

均煨薑湯下。或酒下。傷寒內熱。燈心湯下。黃疽紅

棗湯下。虛癆盜汗。煩熱口乾。麥冬湯下。

平安萬應丹 治一切山嵐瘴氣疫氣暑氣遠行出征

大黃 焙乾研末

蒼朮 米泔水浸焙乾

天麻 焙乾

透

明硃砂 研飛

明雄黃 透明者研飛

麻黃 去節

生

甘草 去皮各研末

公丁香

母丁香 各為末

以真蟾酥九錢。搗碎。於三日前用乾燒酒浸泡。臨

用時。蒸極軟。或木臼。或磁臼。搗成稀膏。先將諸藥

按方製出。各包。至五月五日午時。將各藥同蟾酥

和勻。爲丸。梧桐子大。如蟾酥不敷。加糯米汁少許。務於午未二時丸完。

抱龍丸

九轉胆南星 八錢

天竺黃 四錢。如無真者。以九轉胆南星代之。

明雄黃 飛過

天麻 紙裏煨

僵蠶 薑汁炒去絲

硃砂

飛過

鈎藤鈎 各四錢

麝香 一錢

各研末。五月

五日午時。用甘草二兩。熬成濃汁。爲丸。梧桐子大。硃砂爲衣。如甘草汁不敷。加糯米汁少許。每服少壯一錢。老弱五分。小兒二分。氣痛。木香湯下。大便

結。枳殼湯下。小便結。燈心湯下。腹痛。茱萸湯下。傷寒。紫蘇湯下。嘔吐。煨薑湯下。中風。荊芥湯下。中暑。野荊芥湯下。瀉泄。炒黑粘米湯下。出汗。舊蒲扇燒灰煎湯下。一切感冒潮熱。燈心薄荷湯下。孕婦忌服。一方加真牛黃八分。大赤佛金一百張。名牛黃抱龍丸。治小兒一切驚風抽掣。痰壅氣喘。燒熱重。大每服三分。燈心薄荷湯下。此外不可亂服。

寸金丹

治男婦大小。中風寒。暑口眼歪邪。牙關緊閉。霍亂吐瀉。腹痛轉筋。內傷飲食生冷。胃口停痰。胸膈脹滿。不服水土。作嘔心疼。惡心。水瀉瘧疾。感冒傷寒。頭疼。遍身疼痛。無汗。傷風咳嗽。山嵐瘴

氣噎氣吐酸。紅白痢疾。產後昏朦。惡路不盡。小兒急慢驚風。一切雜症。每服大人二丸。小兒一丸。薑湯下。孕婦忌服。此係江西泰和縣人蕭宗任加減方。

白烏藥 神麴 防風 川羌活 薄荷 紫蘇

葉 麥芽炒 七製香附酒製三次。薑製三次。童便製一次。 前

胡 廣陳皮 川芎酒浸切片 白芷 薑製半夏薑汁

炒 西砂仁 廣木香 川厚朴薑汁炒 蒼朮炒

白荳蔻仁淨 茯苓各三兩 草菓仁一兩。麵裹煨。熟去殼用仁。

藿香 枳殼各二兩 黨參五錢。蜜炒 生甘草一兩。五錢

共為末。以神麴二十三兩研末。同薑汁泛為丸。每

九乾重一錢。飛過硃砂為衣。

救苦丹

治男婦一切中風寒暑氣傷寒頭痛身熱畏風怯寒停食飽脹胸腹疼痛瘧疾紅白痢疾

傷風咳嗽吐瀉霍亂及感冒四時不和之氣。此係江西泰和縣人蕭宗任加減方。

紫蘇葉

葛根

川羌活

各四兩

北細辛

生甘

草

黃芩

酒炒各一兩

防風

白芷

生地黃

川

芎

廣陳皮

各二兩

香附

炒

蒼朮

各三兩

共研

末薑汁糊飛羅麵為丸。皂莢子大。硃砂為衣。每服

少壯五七丸。老弱二三丸。葱湯下。

除瘟救苦丹

治瘟疫時症。傷寒感冒。

瓜兒天麻 麻黃 乾薑 松蘿茶 綠豆粉 各

錢兩二 硃砂 飛過 雄黃 飛過 甘草 各八錢 生

大黃 二兩 共研末煉蜜為丸每丸重一錢五分

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出即愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

不忌矣。

神白散 治時行一切傷寒不問陰陽輕重老弱男女孕婦皆可服之。

白芷 一兩 甘草 五錢 生薑 三片 葱白 三寸

棗子 一枚

豆豉 五十粒

水二碗煎服取汗不汗

再服病至十一日未得汗者皆可服之此藥可卜人之生死也如煎成黑色或誤打翻難愈煎得黃色無不愈者煎時忌婦人鷄犬見之

菩提萬應丸

川厚朴 薑汁炒

神麴

山查肉 炒

紫蘇葉

陳

皮 半夏製

藿香 微炒

黃芩 炒

麥芽 炒

甘草 炒

薄荷

枳殼 炒

西砂仁 鹽水炒

白扁

豆 炒

香附 炒

白芍

蒼朮 米泔水浸各二兩

用新

荷葉三四片煎湯

如無新者乾者亦可

將各藥拌勻晒乾再

拌再晒湯盡為度共研末薑汁泛為丸每丸乾重

一錢每服一丸傷寒頭痛項強脊腰疼發寒發熱

無汗羌活湯下心胃痛檳榔湯下暑症藿香湯下

瘡疾開水加薑汁下泄瀉薑湯下霍亂吐瀉胡椒

七粒綠豆四十九粒煎湯下紅白痢疾車前子湯

下其餘山嵐瘴氣水土不服胸膈飽悶宿食不消

一切雜症清茶開水俱可下瘟疫時症渾身發燒

頭痛口渴舌乾唇燥舌上胎厚並不發寒亦有微

汗。此係瘟症。若作傷寒治。誤為發汗。汗多者死。重者三四丸。輕者二三丸。黃芩湯下。

治冒風寒方

旅次倉卒無藥不
論陰陽皆可服之

生薑 一兩

葱白 十根

黃酒兩中碗煎滾乘熱

服蓋被取汗

夏月薑葱減半冬
月加炒黑豆兩合忌油膩葷腥五日

一方用葱薑熬人稀飯內熱服取汗一方生薑片

葱白

四根連鬚

紫蘇葉 三錢

泡湯熱服俱效

葱豉湯

治傷寒初起
頭痛身熱

葱白

連鬚五根

淡豆豉

四十九粒

水煎熱服取汗愈

神朮萬應散

治嘔吐瀉泄頭痛發熱腹滿胸脇脹痛中食中氣中惡山嵐瘴氣食瘧痢疾並

服一切時行不正之氣輕者一服重者三服即愈王耀亭方

六神麴炒焦

南藿香梗略八

蒼朮米泔水浸陳土炒

川厚朴薑汁炒

廣陳皮各二斤

生草菓仁四兩

甘草蜜炙十兩

共研末每服三錢薑湯冲服

陰陽二症誤投藥餌殺人最烈其法以雞蛋四五枚

煮極熟去殼用銀簪於雞蛋中橫門過透出簪柄

些須乘熱直立臍中候雞蛋微溫驗看簪柄若色

帶青黑即係此症隨將熱雞蛋於腹上輪轉蛋微

温再換總使熱氣內達後用連根鬚葱同椒薑搗極爛敷臍上以艾灸十餘壯通身汗出令緊束臍毋得脫落睡一覺愈倘一時難得椒薑艾即葱一味亦可以粗草紙代艾灸之如簪柄不甚青黑則非陰陽二症矣

治中暑不省

道上熱土壅於臍上令人溺之即甦

治男婦大小瘋症

辰砂一錢 硃砂五分 牛黃三分 共研末用

雄猪心一個。不見水。用刀劃作數層。將藥撒於猪心內。用紙包。水浸透。煨熟。空心薑湯送食。四服愈。

血餘散 治汗不止

男子髮 洗淨燉存性

研末。絹袋盛撲。

走馬散 治中風口噤四肢強直

黑附子 炮

天麻 各五錢

桂心

石膏 各一錢

麻

黃 去根節

蝎稍 炒

南星 炮

川烏 炮去皮尖各一錢

麝香 三分

共研末。每服三分。豆淋酒調灌。

治偏頭風

南星 白芷 半夏 等分研末。生薑葱頭共搗

爛為小餅貼太陽穴兩面痛貼兩面。

又方

全當歸

一莖重一兩者佳切片。

川芎

五錢

水二碗

煎服蓋被出汗。

治箭風

紅花

白芷

防風

葳靈仙

各五錢

陳酒二碗

煎八分熱服取汗三服愈。

治鼻血不止

亂髮

一團煨

研末吹之立止。男用女髮女用男髮。

呂真人治目昏方

大生地

大熟地

各八兩

川椒

八錢。炒去閉口及目。

共為

末煉蜜為丸。梧桐子大。每服五十九丸。空心鹽湯下。

還少丹

此丹極能固齒。壯筋骨。生腎水。凡年未及八十者。服之。鬚髮返黑。齒落更生。年少服之。至

老不衰。昔日越王曾遇異人。得傳此方。蓋風有仙緣也。

蒲公英

連根帶葉一斤。洗淨。勿見天日。秋分前後。

方塊青

鹽一兩

香附

五錢

將青鹽香附研為細末入

蒲公英內醃一宿。分作團。紙裏用韭菜地內蚯蚓

糞和濕團裏紙外。烘乾後。文武火煨通紅為度。取

出冷定去泥為末早晚擦牙嗽口吐嚙隨便

治牙痛

毛栗殼 煎湯嗽口愈

通關神效散

治一切咽喉腫痛雙單乳鷺喉痺纏喉等症。

冰片

紅鐵皮

煨

珍珠

煨

川黃連

入薑內煨熟

辰砂

硼砂

海巴

煨

明礬

煨

山慈姑各三

共研末磁餅收固臨用以鵝毛管吹三五次於喉

內痛處重者三五次愈

治纏喉風

喉症惟此最速治之少遲死在旦夕。

巴豆七粒。將三粒去殼生研。厚紙包。搗去油取霜。四粒炒黑存性。

透明雄黃

三分 鬱金 一個

共研末。每服一分二釐。茶調

服。如口噤咽塞。將藥末入蘆管內。吹四五次於喉

內痛處。即吐痰醒。

治喉内生癰喉症惟此最遲久。則失音便不可救。

冰片 牛黃各一分 血珀三分 硼砂一錢 川

黃連 燈草灰各五分 山羊血 青菓核灰各二分

共研末。每一茶匙。藥用蜜一茶匙。調勻。放舌尖上。

緩緩嚥下。日五六次。兩月可愈。

治鎖喉風

茶子

五個搗末即茶葉內茶子

用陳米醋半碗調勻含口內

片刻吐出再含再吐即有血絲粘涎吐出三服愈

治咽喉急症

龍骨 五錢

滑石 三錢

石膏 一錢五分

兒茶 一錢

冰片 三分

共研末吹愈或腐爛不堪以及走馬

牙疳每藥一錢加珍珠末一分人參末一分吹之

又喉症

細辛 一錢研末

巴豆 一粒去油

共研末以棉紙包裹如

捲火煤子樣用線紮住兩頭中間剪斷左症塞右
鼻孔內右症塞左鼻孔內一夜即消如係雙蛾即
塞兩鼻。

又方

壁上壁喜窩

五分

冰片

五分

先將冰片

入鍋內微火焙俟有烟起即下喜窩炒存性研末
吹喉內一方壁喜窩用箸夾住燈上燒灰存性入
冰片一釐共研吹

治喉閉

蝦蟇

一個

油燴爲末吹愈

八仙丹 治噎食

生藕汁 生薑汁 梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁

蜂蜜 白菓汁 竹瀝 各一盞和勻坐飯甑上

蒸熟隨意飲之

治噎食

蝎虎 一條或小二條

以燒酒二斤磁罐盛貯將蝎虎

入酒內埋地下一月取出隨意飲之即開關能食

如不能待十日亦可

王耀亭治胃脘諸痛方

延胡索

醋炒

草薹仁

去隔膜 微炒

洋沒藥

去油

五靈脂

醋炙各三錢

共研末磁餅收固每服一錢黃

酒冲服愈

治腰痛

吳茱萸

研末 茶一杯

以黃酒一杯拌勻入鐵杓內炒

熱攤於油紙上敷患處用寬布條捆縛立時止痛

如冷再炒再敷

治絞腸痧

嫩車前草

七片

揉軟塞鼻孔內男左女右

又方 白棉紗不拘多少煎湯温服。

治臌脹

雄猪肚子一個 蝦蟇一個 砂仁七粒 將蝦

蟇砂仁裝入肚內線紮住口以清水入砂鍋內煮

熟不用鹽清晨空心食之至重者兩個即愈

倪涌初治痢奇方妙論痢為險惡之症生死所關不

法千家多不得其道是以不能速收全效今立方

何以為奇不泥成法故奇也立論何以為妙不膠

成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有識
者切切不可更張勿為庸醫所誤遵而用之百試百
效者也。

初起煎方

川黃連去蘆

條黃芩

生白芍

山查肉

各一錢二

分 陳枳殼去穢

紫厚朴去皮薑汁拌炒

堅枳榔

厚青皮去穢各八分

當歸

甘草

地榆各五分

桃

仁去皮尖研如粉一錢

南木香二分

水二碗煎一碗空

心服渣再煎服此方或紅或白裡急後重身熱腹

痛者俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅四分

木香可用三分如滯澁甚者或大黃二錢用酒拌

炒服一二服仍除之若用一服滯澁已去不必又

服二服矣。用大黃於年幼之人，又不可拘用二錢也。右方用之三五日，神效。用之於旬日，亦效。惟十日半月外，則當加減矣。另詳於左。

加減煎方

川黃連 條黃芩 大白芍藥各酒炒六分 山

查肉一錢 廣橘紅 厚青皮 堅栝榔 地榆

各四分 甘草炙三分 當歸五分 桃仁粉六分

紅花三分 木香二分 水二碗煎一碗空心服

渣再煎服如延至月餘覺脾胃弱而虛滑者法當

補理具方於左

補理煎方

川黃連

條黃芩

各酒炒
六分

大白芍藥

酒炒
四分

廣

橘紅六分

當歸

人參

白朮

土炒

炙甘草

各五
分

用水煎空心服渣再煎服以上三方隨用

輒效其有不效者必初時投參朮等補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛纏綿不已欲補而澁之則助邪欲清而疎之則愈滑遂至於不可救藥雖有奇方無如之何則初投溫補殺之

也如婦人有胎者去桃仁紅花檳榔。

微理妙論古今治病皆曰熱則清之寒則溫之初起熱盛則下之有表症則汗之小便赤澀則分利之此五者舉世信用如規矩準繩之不可易予謂五者惟清熱一法無忌餘則犯四大忌不可用也今詳於後。

一曰忌溫補痢之爲病由於濕熱蘊積膠滯於腸胃中而發宜清邪熱導滯氣行淤血其病卽去若用參朮等溫補之藥則熱愈盛氣愈滯而血亦凝久

之正氣虛邪氣盛不可療矣。此投溫補之禍爲最烈也。

一曰忌大下。痢因邪熱膠滯腸胃而成。與溝渠壅塞相似。惟用磨刮疎通則愈。若用承氣湯大下之。譬如欲清壅塞之渠而注狂瀾之水。壅塞必不可去。無不岸崩堤塌矣。治痢而大下之。膠滯必不可去。徒傷胃氣損元氣而已。正氣傷損邪氣不可除。壯者猶可弱者危矣。

一曰忌發汗。痢有頭痛目眩身發寒熱者。此非外感

乃內毒薰蒸自內達外。雖有表症實非表邪也。若發汗則正氣既耗邪氣益肆。且風劑燥熱愈助熱邪。表虛於外邪熾於內鮮不斃矣。

一曰忌分利。利小便者治水瀉之良法也。以之治痢則大乖矣。痢因邪熱膠滯津液枯澁而成。若用五苓等劑分利其水則津液愈枯而滯澁愈甚。遂至纏綿不已則分利之爲害也。若清熱導滯則痢自愈而小便自清。又安用分利爲哉。余於此一症素畏其險惡用心調治經今二十餘年百試百驗。既

而身自患之。試驗益精。然後能破諸家之迷。而
為奇妙之方。論是用述其顛末。以拯斯人之疾苦。
而悉登諸壽域也。

王耀亭治痢疾方

山查肉炒焦 一兩
生薑粗皮 二錢
熬湯以黑沙糖

二錢冲服二次愈。

王耀亭治噤口痢

石蓮子去殼 二錢
山查肉成炭 炒
用醃肉骨洗淨

打碎熬湯去骨煎服即愈。

治痢疾 不論紅白

大黃 白芍 黃連各六分 連翹八分 梔子一錢

六分 山查二錢 黃芩一錢八分 莪朮一錢六分 木通

八分 滑石二錢五分 車前子二錢 台烏藥五分

黃柏一錢一分 水煎服

治痢疾

羌活六兩 生大黃一兩 蒼朮四兩米泔水浸炒 草

烏一兩兩麵裏煨 杏仁五錢去皮尖 共研末五月五六月

六七月七九月九等日製貯備用或煉蜜為丸每

服老弱五分。少壯一錢。紅痢燈心湯下。白痢薑湯下。水泄米湯下。紅白者燈心湯下。噤口痢年久陳臘肉骨熬湯下。

又方 木香 方圓一寸一塊以黃連五錢同煮去連取木香焙乾研末 均分三

服。一服陳皮湯下。二服陳米湯下。三服甘草湯下。

又方 天花粉 七錢五分 甘草 五錢 公丁香 雄黃

各二錢五分 共研末薑湯冲服。大人三分。小兒二分。

治久痢並血 氣弱及病虛者服半劑。初得痢疾者不可服。

臭椿樹皮 四兩要土內根上老皮向東南者刮去外層搗碎。 金銀花

當歸各二錢五分

地榆炭

紅花各二錢

生甘草五

分 陳黃酒二斤十分

水三碗煎一中碗分四次

服忌燒酒一百日

紫金丸

治男婦大小紅白痢疾禁口腹痛吐嘔裏急後重瀉泄腹痛時痛時瀉

川黃連

切片吳茱萸煎湯拌炒六兩

公丁香

生南木香

生青木香兩三

共研末米湯糊為丸梧桐子大

硃砂為衣小兒七丸大人十四丸開水下

治腸紅

柿餅

一枚炭火燒焦黑色

研末米湯冲服

治大便血

阿膠 蒲黃 澤瀉 當歸 等分研末米湯糊

為丸開水下服至四兩愈忌房事燒酒

治蠱脹

葫蘆藤 煎湯代茶飲數月愈

治腸枯不出茶者

熟地碗一茶 溫服

治大便不通不論老幼虛弱病後產後均可服之

肉蓯蓉 油當歸各三錢 黑芝蔴炒二合 河水煎服

治水瀉

黑沙糖 三錢

陳柿餅

煨薑

車前子 各二錢

水煎服

治小腸氣偏墜

赤茯苓

猪苓

澤瀉

白朮

陳土炒焦

川棟子

橘核

木通

枳殼

沉香

白烏藥

鹽水炒

木

香等分。酒水各一杯煎八分。空心服。取微汗即

消愈後以白烏藥一錢鹽水炒。小茴木通滑石各

一錢。稀布袋盛之。用無灰酒三斤。磁罐盛貯。煮透。

共研末煎蜜為丸不再發

又方 小茴香

橘核二兩二味以青鹽一兩化水拌炒乾

荔

枝核三十個焙乾

共研末每服三錢開水冲服

治疝氣

川棟子二錢二分

小茴三錢

延胡索一錢五分

葫蘆

巴三錢

荔枝核七個搗爛

橘核仁十五個去殼

煎服

治遺精

山藥 兔絲子

茯苓各三兩

五味子一兩

共

研末煉蜜為丸早晚鹽湯下

治白濁淋症

生甘草梢

鬱金各五錢

黃酒煎服汗出即愈

又方

紅蚯蚓

七條瓦上焙乾

研末燒酒冲服

小便閉

紫菀四兩

水煎服即通

又方

瓦松

不拘多少陰陽瓦焙乾

水煎服

大補陰丸

治男子相火熾盛內熱遺精尿血

黃柏鹽酒炒

知母鹽酒炒

熟地

龜板

去旁酥炙各六兩

共研末煉蜜和猪脊髓為丸梧桐子大每服七十

丸空心鹽湯下。隨下四五錢

烏羊丸種子方

赤首烏各五斤。竹刀切片忌鐵器。白首烏各五斤。竹刀切片忌鐵器。麥冬去心黃

薯蜜炙山菜肉去核當歸酒炒各四兩大熟地

砂仁大生地酒炒白茯苓各八兩天冬去粗皮

兔絲子酒炒牛膝鹽水炒山藥炒黃色紫杜仲

鹽水炒破故紙鹽水炒甘枸杞酒炒炙甘草各三兩

兩遠志肉去骨一兩石菖蒲八錢先揀無雜毛

肥壯純黑雄羊一隻去毛穢洗淨畧煮去骨連心

肺肝腸肚切碎。以黑色馬料豆一京斗。鋪於籠底。中放羊肉。上蓋何首烏。桑柴火蒸。以羊肉化為度。取出。同各藥拌勻。入石臼內搗如泥。曬乾。再搗細末。煉蜜為丸。梧桐子大。早晚服四錢。開水下。一方加黃毛鹿茸一付。

治婦人虛勞

黃耆 香附 黨參各八 當歸 桂圓肉各一

共入銅鍋內。文武火熬至滴水成珠。以白蜜半斤收膏。清晨開水調下四五錢。

全驚丸 治婦人骨蒸癆疾

天冬 麥冬 各去心 陳皮 各二兩 生地 酒洗 熟

地 各四兩 知母 酒炒 貝母 去心 地骨皮 酒洗

益母草 各三兩 當歸 酒洗 甘草 各三錢 共入砂

鍋內以清水一斗煎六分。濾出渣晒乾。俟汁冷用重一斤驚一個。放入藥汁內令飲。剩汁卽以煮驚汁乾。取出肉用艾火烘乾。甲用酥炙。同前藥渣研末。煉蜜爲丸。梧桐子大。每服四錢。清晨開水下。

王耀亭治血崩二方

金毛狗脊

一兩切片

荆芥

四錢炒成炭

水煎服二次愈

又方

管仲

五錢

黃酒煎服

治血崩

舊蒲蓆

燒灰二錢

溫酒冲服

又方

舊椽器

燒灰

酒冲服

又方

西砂仁

炒研一錢

黃酒冲服

香附丸

治婦人經水不通。虛癆無往不宜。

香附

一斤

以米泔水童便酒醋鹽水薑汁青蒿

煎水浸炒各一遍。肉荳蔻六個。麵裏煨熟研末去

油煎湯浸炒一遍。又用白茯苓煎湯，連茯苓拌入。香附內晒乾，研末用熟地四兩、黃酒熬膏，和香附末搗成餅，晒乾，露一夜，搗成細末，煉蜜為丸。梧桐子大，每服四十九丸，空心薑湯下。

調經種子丸

治婦人血虛不孕

大熟地

炒赤芍

各三兩

白全當歸

酒洗四兩

延胡

索

益母草

一斤石臼搗為細末，忌鐵器

香附

四製三兩

共研末，煉蜜為丸。梧桐子大，每服三五錢，清早米

湯下，服一料即孕。

調經方 治婦人經水過期或四五十日或一二月服之應期自至。

當歸 四錢 酒洗

艾葉 一錢 炒黑

荆芥炭 五錢

炙甘草

五分

熟地炭 三錢

薑炭 一錢

川芎 酒洗

香附 四製

阿膠 蛤粉炒成 珠各三錢

用黃酒一杯水二

杯煎服至三十劑後照方加十倍共研末煉蜜為

丸梧桐子大每早晚服三四錢黃酒下

安胎方

婦人有胎元不固屢孕屢墮此胎滑也。有孕一月後食之即固。

老黃母雞 一隻 去毛 穢洗淨

以糯粟米裝入雞肚內黃

酒水各半蒸好不用鹽連吃三五雞永無小產患

安胎方

孕婦有胎元不固。或一二月。或數月。偶觸胎墮。於受胎後服之。即固。未受胎者服之。即孕。

杜仲

八兩。米湯浸炒斷絲。

續斷。皮筋酒浸炒。

懷山藥六兩。

炒黃

共研末。用紅棗百枚。去核。煮爛。剝皮。搗膏。

為丸。梧桐子。大清早。米飲下。八錢。不可間斷。

保產方

川芎

川貝母

去心各一錢

羌活

細甘草

各五分

荆芥穗

八分

紫厚朴

薑汁炒

蘼艾

醋炒

枳殼

米炒各七分

全當歸

酒洗

白芍

酒炒各一錢五分

兔絲

子。錢四分。酒泡。

生黃耆

八分。蜜炒。

水二碗。薑一片。煎。

八分。溫服。如兩三月胎動者。服一劑。五七月預服。一二劑。臨產服一劑。順利無比。如橫產逆生。三五日不下者。服一劑。即順生。包衣不下。服一劑。立下。

順生保命丹

治胎產百發百中。傳方之家。施捨百餘年。無有不效。

天麻

七錢二分

真沒藥

百草霜

飛羅麵

各一兩八錢

各為細末。用年久好陳香墨。無根水。或天落雨更好。研濃墨為丸。如櫻桃大。每料均作二百四十九。不見日光。在淨室內翻晾乾。

勝金丹

治難產

香白芷 百草霜 等分爲末。臨時以童便一杯

開水冲服。二錢卽下。

治難產並治死胎不下。

蓖麻子一兩。去殼研爛。

以少許入產婦肚臍內。餘均作

兩餅貼於產婦兩腳心裏。住頃刻卽生。將藥取去。

愈風散治產後中風。口噤。或產後血暈。不省人事。或心眼倒築。吐瀉欲死。

荊芥穗微焙研末。每服三錢。豆淋酒調服。童便亦可。

千金保命散治小兒痰喘急慢驚風。撮口臍風。

真西牛黃要層數多。搽於指甲上。透過者始真。廣黃勿用。

梅花冰片

琥珀各三釐

甘草一分

全蝎

僵蠶

川黃連

各薑汁炒五釐

硃砂二釐水飛

明天麻

陳胆星各二分

共研末磁瓶收固每服六七釐薄荷燈心同金銀

器煎湯調下。但能灌入腹者無不神效

鎮驚散治小兒慢驚風肚腹膨脹不思飲食澹泄無度疳痞等症。

艾葉心七個要鮮者

桃葉心七個何東者

葱頭七寸

雄羊屎七粒尿上有四者即是。

亂髮一把女人梳下者不必洗

將

各藥入鍋內用麻油炒透取起以麵打薄餅二個將藥放於中間合成一餅鍋內烤熟燒酒灑之乘

熱取起貼小兒臍上外用布紮緊經一夜解去慢

風一次即愈疳痞症數次愈。

生肌散治小兒初生無皮視其遍身色赤惟有紅筋此乃受胎未足也。

早稻米研粉紗囊撲之其肌自生。

又方 黃土末紗囊撲之。

破故紙散治小兒膀胱虛冷夜間遺尿或小便不禁。

破故紙研末開水冲服三服愈。

千金稀豆丹服之稀者無重者稀。

黑豆 綠豆

小豆各二十粒

珍珠一分

甘草

節二分 燈心二尺 細茶一錢 羊屎一粒
陰乾

水二茶盃煎五分。每月朔望清心服。

浴兒免痘法此異人所傳方

大烏魚尾一尾或小鱼者二三尾一名七星魚

煮湯於除夕黃昏時

密室烘暖浴兒遍身七竅如浴不到處出痘必多

稀痘方

蓖麻子四十九粒去殼 硃砂一錢飛淨 麝香二釐

將後

二味研末同蓖麻子搗爛。每年三次。端午七夕重

陽搽小兒兩手心兩手臍兩脚心兩腿臍前後心。

顛門兩肘窩肚臍女子肚臍一處不搽聽其自落
不可洗去搽過三年可免出痘

四聖散

治痘毒

珍珠

一粒

亂髮

燒灰一錢

豌豆

綠豆

炭火煨過各四十粒

共研末敷患處外用膏藥蓋上

痘子黑陷不起漿

寶竹葉

煨石膏

各五錢

煎湯去渣以糯米一撮

手心擦熟紅棗九枚鮮蘆根汁一小酒杯煮作粥
與出痘人當茶飲落痂後不可服如無鮮蘆根用

乾者五錢同竹葉煎亦可

治痘後火毒傷目

男婦大小痘後火毒傷目有赤脈
或雙目或一目

或微紅治之不早必盲此方在痘
後收靨用之如過四十九日不治

梅花冰片

二分

上輕粉

二錢

共研末加退醫

明目藥數分磁鑽收固患雙目者以細竹管吹入

兩耳日吹三四次患一目者左目吹右耳右目吹

左耳

退醫明目
方載後

退翳明目方

蘆甘石

製三錢

石決明

煨飛

硼砂

各一錢

上冰

片一分

麝香五釐

硃砂飛淨三分

共研末磁餅

收固備用

製蘆甘石法載後石

製蘆甘石法

用銀匠所用銀窩子兩個將蘆甘石盛內上下扣定炭火架煨以半炷香盡色如松花樣為度取出淬入童便內畧輕攪一遍取浮上者石脚不用烘乾再用三黃湯煮過晒乾

煮蘆甘石三黃湯

川黃連

黃柏

川羌活

黃芩

山梔仁

防

風 木賊 蟬退 家菊花 白芷 蘇薄荷

細辛 川芎 當歸身 荆芥穗 大黃 赤芍

藥 連翹各等分 水四碗煎二碗去渣澄清入煨

過蘆甘石煮透連藥汁晒乾

治四肢拘攣筋臂疼痛腰膝無力昔有一婦人年五旬始則腰膝痛繼

則四肢拘攣卧床兩年以為萬無治法後得此方服之一年大愈但少婦不可服服之難產謹記

白木耳四兩微烘乾勿令熟 萵苣子炒熟 甘枸杞子一兩

酒浸炒熟 共研末煉蜜為丸梧桐子大每服三四錢

開水下

麻疹約要

長安劉照黎先生著宛平問齋氏張琛錄

疹雖胎毒多帶時行氣候傳染而成其發也與痘

相似其變也較痘更深蓋痘之吉凶有形而易見

疹之吉凶無形而難明治失順逆立判生死不知

毒起於脾疹發時多有吐症宜用平胃散蒼朮陳皮厚朴甘草等分爲末薑湯下每服三五分猶當量兒大小熱流於心多有心慌之症始發時用

小以定多少分兩始終之變腎則無病臟腑之傷肺

升麻葛根湯加牛蒡子研炒爲尤甚氣壅痰喘者是初則發熱驚戰亦似傷寒

升麻葛根湯傷寒陽明胃或目流淚不止或鼻流

經藥也疹與同經故用之

涕不乾咳嗽太急煩躁難當治咳方在升麻湯加減條下隱隱

皮膚之內磊磊肌肉之間一出沒乍隱乍見表急

也如錦之明十有九全如煤之黑百無一生此二語方

書所載也依此方用之無有不全活者毒有輕重治有緩急腠理鬱

拂即當發散即後加紫蘇以解肌之言也腸胃秘結急與疏通

即毒結於心用牛黃散之治也先衄不必憂未見形邪從衄解瀉

痢不必止始終有此症者吉毒以痢鬆未出聲啞發表中

須加解毒清涼之劑加減飲水不休解毒中更加

生津止渴之藥渴者毒甚雖飲涼水亦不妨也出之太遲發表為

急出之太甚。解毒為先。毋伐天和。常視歲氣。寒風

凜凜。毒氣鬱而不行。敗毒與解表共施。加紫蘇症火日

炎炎。邪氣乘而作病。清涼與解毒並濟。毒氣大甚不能出亦

可少與牛黃散疏通症雖百出。治法大同而小異。病有淺深。

惟在詳審而定劑。如疹之初起。呵欠發熱。惡寒咳

嗽。噴嚏鼻涕。頭眩。睡時有驚。醒時有戰。宜服

升麻葛根湯。分兩看人之大小。毒之輕重加減之。升麻 葛根 白

芍藥。各一錢五分甘草 五分 右剉生薑三片。葱白三根。

水煎服。忌大汗。此藥不但麻疹宜用。即痘瘡初起。與傷寒瘟疫。必不可少之藥。

月天寒加紫蘇以解肌下氣切不可飲酒食蒜並
 油膩等物見形之後班不紅者亦宜用之腹痛加
 黃芩生白芍咳嗽加桑白皮有痰加陳皮貝母譫
 語加連翹黃連喉乾加桔梗渴加麥冬天寒加防
 風荆芥身痛加羌活咽喉腫或咳嗽痰中帶血加
 黃芩黃連山豆根連翹黑參如疹既出一日而復
 沒者乃為風寒所冲毒氣內攻若不急治則胃爛
 而死可再用升麻葛根湯表之如再不出者用

消毒飲

牛蒡子

炒研四錢

荆芥

錢二

甘草錢一 防風

錢五或加犀角一錢尤妙。如再表不出及消毒不解者。此毒已甚。必腹痛氣喘。用

二仙丹

黃芩

去

生白芍

各等分煎溫服

若一日二

日。或三日已完。毒氣未盡發喘氣壅睡臥不安。此

毒入心肺乃至危之症。鼻燥者猶可治。稍遲恐毒

太深。鼻中流血則心肺為火燍爛。無能為矣。故有

是症者宜急用牛黃散救之。

牛黃散

牽牛子

用黑柏頭

大黃

右等分為

末。溫水調服。凉水亦可。一歲及氣弱者用五七分。

三歲倍之。二十歲及氣充者。三四錢皆可。然必須有喘症而後投之。恐投之太早。毒尚在半表半裏之間。亦為害不淺。如毒氣太重。服牛黃散之後。猶然餘毒未除。痰嗽未淨。此時再不必用牛黃散。下之當以白虎解毒湯。徐解其毒。

白虎解毒湯 石膏 知母 黃芩 黃連 黃柏

各一錢 梔子九分 甘草五分 右用水煎服。譫語加

赤芍。小便閉。加木通。下痢。加赤芍。生地。牡丹皮。渴。加麥冬。犀角汁。嗽。加桑白皮。瓜蔓霜。有痰。加陳皮。

貝母。腹脹氣喘身熱。加大黃。如疹已出後泄瀉不

止。宜用。

四苓湯。猪苓錢各一澤瀉錢各一白朮錢各一茯苓錢各五

右用水煎服。如疹已出寒熱往來似瘧者宜用。

柴胡四苓散。柴胡錢各一茯苓錢各一猪苓錢各一

澤瀉錢各一白朮錢各一甘草錢各一右用薑棗水煎

服。如疹已出大便下血或小便下血二便秘瀯。

熱渴赤痛宜用。

犀角解毒湯。犀角錢一以生蘇代之。

生大黃錢一

赤芍 黃連 枯黃芩 黃柏 梔子各五 右

用水煎服如疹前後有潮熱不退等症並為血虛

血熱可服

四物湯 當歸 川芎 地黃血虛用熟 白芍各

分 右水煎服發渴加麥冬犀角汁嗽加瓜蔓霜

有痰加貝母陳皮去白如麻疹既出之時雖不進飲

食者但得麻疹淡紅潤澤真正不為害蓋熱毒未

解內蘊實熱自不能食如退後不食者當隨用四

物湯加神麩砂仁一二劑決能飲食如胃氣虛者

少減地黃分兩。如麻疹既出已過三日不能沒者，乃內虛有熱亦宜服四物湯。如孕婦出疹當以四物湯倍加白朮、條芩、艾葉以安胎，清熱為主。則胎決無厄而疹易出。如胎氣上冲急用艾葉、條芩煎湯磨檳榔服之，更以四物湯大進之。如疹後痢下

赤白宜用 黃連 桔梗 木通 澤瀉 甘草

燈心 白芍 條芩 厚朴薑製 杏仁去皮尖

如下墜加枳殼炒 水煎服無不立愈

藿香正氣丸 治霍亂吐瀉傷食受寒中暑反胃心痛脹滿傷風咳嗽等症。

南藿香 九斤十

紫蘇 斤十二

桔梗 八斤

茯苓

製半夏 二斤十

大腹皮 七斤十

白芷

厚朴 斤七

廣陳皮 斤五

甘

草 斤五 水泛為丸每丸重三錢開水化服常年端

午製送起至中秋止多效。

達原引 治疫邪傷寒四時不正之氣感冒諸症

檳榔 錢二 厚樸 錢二 知母 錢一 草薺仁 分五 白芍

黃芩 錢一 甘草 分五 水煎服 如脇痛耳聾寒熱往來嘔吐口

苦加柴胡一錢腰背項痛加羌活一錢眉
稜骨眼眶脹痛鼻乾不眠加葛根一錢

治拘麻

此病發時兩眼白吊上手脚拘攣狀似中風有稱為羊癲風者。

生木耳

滾水發開。

未發時取木耳細嚼一二兩飲黃

酒三四杯蓋被睡出微汗服至二三斤全愈除根。

治小便不通。

大田螺一個。

用水片三分放在螺中連螺搥碎。

用長手巾縛在臍下一寸三分即通如無大田螺

即小者用三四個亦可。

又方用連鬚葱白一斤搗爛炒熱加麝香些微用

長手巾包縛臍下即通。

又方 用葑菜畦內。蚯蚓糞一碗。滾水冲澄清服之。即通。

治一切心腹等痛方。

青皮。靈脂。川練。大茴香。川山甲。各二錢。良

薑。炒。玄胡索。沒藥。各二錢。檳榔。一錢半。木香。

一錢二分沉香。一錢砂仁。五分用川木鱉數個計重

一錢二分同前藥炒。炒焦去木鱉。不用將前藥共為細末。每服一錢。加鹽一分黃酒下。

神效集

七釐散治一切跌打損傷骨斷筋折金刃重傷流血

釐燒酒冲服輕者一服重者三四服如刃斷食噤

敷上不必用雞皮包紮又治一切無名腫毒湯泡

火灼用燒酒調敷重者一服孕婦忌服凡敷此藥

瘡上忌見水如見水即要流膿並忌食一切發物

硃砂二分 麝香 冰片 沒藥 紅花 兒茶

治刀斧傷

細末五月五日午時製合貯久者好臨時製亦可

降真香 銼末

敷上即止痛不可見水數日愈

又方 白沙糖敷上愈一方加紫蘇葉末少許

三黃寶蠟丸

治跌打損傷刀箭鎗傷棒傷破傷風刑傷血奔心及瘋狗毒虫蛇咬墜馬瘀血

凝滯痰迷心竅危在頃刻諸險症

製淨騰黃

四兩製法以秋荷葉露水化開燉滾湯內十餘次去上浮下沉

劉寄

奴

紅芽大戟

去骨

血竭

各三

孩兒茶

雄

黃

各二

乳香

去油

官粉

水銀

麝香

各三

朴硝

一兩

琥珀

二錢

歸尾

一兩

竺黃

三兩

真者以九轉胆星三兩醋炙左龍子一兩代之竺黃生南海鏞竹中乃大竹津之氣結成如黃土着竹成片者真

各研末將水銀同官粉入鐵杓內乘熱

炒末。以提淨黃臘二十四兩。煉溶離火。入滾湯內。坐定。將藥末滲入。不住手攪勻。急爲丸。磁罐收固。忌經婦人之手。傷重者一錢。輕者五分。無灰黃酒化服。會飲酒者。多飲數杯。蓋被取汗。切不可睡暖炕。外敷用芝麻油隔湯溶化。不可見火。如受傷日久。連服數次。能令週身瘀血盡變爲新。服後忌食生冷。瓜菓薑腥。燒酒。鷄三日。

治跌打損傷

亦可接骨

鷄骨炭

又名銀炭。不拘多少。燒紅透。

入石臼內。加紅糖搗爲

末敷傷處

又方 黑松香 二兩

乳香 沒藥 製半夏各一

先將三香入鍋內熬化。晾冷再熬。如此九遍。攤在青石上晾冷。同半夏共研細末。磁瓶收固。每服一錢。黃酒沖服。重者五服。輕者三服。

後服此方

漢三七 三錢

沒藥 乳香 各去

兒茶 龍骨

煨 虎骨 酥油

紅花 血竭 南五加皮 各一

硃砂 五分

乾土 蠶 五十 共研末 每服三錢 黃

酒冲服日三服

接骨箍藥方

南五加皮

四兩搗末

以舌黑烏骨公鷄一隻去毛連

皮骨血入石臼內和藥末搗如泥攤黑皂布上箍

於傷處外用毛竹片帮住捆縛勿令轉動若一轉

動則接骨參差即成廢人過週時去箍藥又以新

磚一塊用刀刮下磚灰鷄蛋清調攤布上捆前傷

處即愈如傷處皮破血出先以松香六兩白礬一

兩爲末敷上後用箍藥捆如前法

治跌打傷不損骨

透骨草 五錢

當歸

海桐皮

川芎

各三錢

川

椒 一錢

防風

甘草

葳靈仙

各八分

乳香

沒藥

各二錢五分

水煎溫洗一日平復

治金刃跌打破傷

生半夏

竹刀刮去臍

生松香

砂鍋內煮百沸俟冷後取面上潔淨者陰乾

等分入石臼內搗極細末敷傷處愈一方去半夏

用鷄骨炭亦效並治癩瘡磁罐收固備用

花蕊石散

治打撲傷損腹中瘀血脹痛服之化血為水

硫黃明色者四兩

花蕊石一兩

共研末先用紙筋

和鹽泥固濟瓦罐一個候乾入藥再用泥封口安

在磚上用炭三十斤煨一炷香久離火冷定將藥

取出研末每服一錢童便下

接骨方

半兩錢一枚醋炙七次

甜瓜子陰陽瓦焙存性

等分研末黃

酒冲服

又方

土鱉不拘幾個焙乾研末要多年酒缸下的

珍珠五錢火煨醋淬七次

研末等分每服一分好酒冲服取汗

治金刃並磕碰傷破並治牲口脊梁打用菜油調搽

黃柏五錢 黃芩 細辛各一 共研末敷患處

還魂丹跌打氣閉。但脈尚動。皆可灌服。若口不開。用箸搥開。藥水從箸流下。如不下。喉將鼻拈緊。

紅蚯蚓搗爛 韭菜汁 童便 等分 黃酒冲服

跌打損傷蒙古洗方

五味子十五粒 白礬 當歸 生甘草各五錢 大

葱三根連鬚 水煎洗愈

治無名腫毒並一切險症

大蝦蟇一個 先置泥碗一個於五月五日將蟇

四脚捆住以竹棍輕敲。墓遍身俟肚脹入碗內蓋好。四圍炭火炙存性。研末唾津調茶患處數日即消。磁餅收固備用。

治無名腫毒

蒲公英

金銀花

各四兩

小生地

當歸

各二兩

新汲水煎服愈。

又方

亂髮

六兩 淘洗淨

黃蠟

各二兩

香油

四兩

共

入銅鍋內熬好。以漂淨百草霜四兩收膏。油紙攤貼患處。上用布蓋。俟有毒水滲出。另換一布。換數

次水盡毒消

治初起腫毒

當歸 酒洗 三錢

金銀花 酒洗 五錢

穿山甲 土炒

牛蒡

子黑丑 打碎

白芷

僵蠶

生大黃 錢二

酒水各一中碗煎服重者兩服輕者一服服後忌飲冷水瀉一二次愈如已潰或出頭便不可服

二兩散 治無名腫毒未成者服之即消已成者服之立潰

生黃耆

金銀花 各五錢

全當歸 八錢

生甘草

二錢

毒在上部加白芷一錢中部加桔梗一錢

下部加牛膝一錢酒水各一碗煎服蓋被出汗愈

網仙繩方治無名腫毒未出頭者敷消

白芨

研末

硃砂

明雄

黃丹

錢各三

白礬

枯礬

各五分

共研末井水調攪千遍敷上乾另換

收瘡口方

醫士訛錢不令諸瘡收口用此愈

白頸蚯蚓

不拘多少

放磁碗內撒白沙糖一把蓋好

一二日化成清水以指甲挑少許入瘡內即收口

治毒蛇咬

香白芷

鴨嘴胆礬

麝香

等分研末先以水

洗患處用紬帕拭乾敷藥次日再洗再敷數日愈

治瘋狗咬

地骨皮搗爛用黃酒熬當茶飲一二日愈

又方 黑牽牛一兩 水煎服

又方 萬年青連根搗汁 飲之腹內小犬變成血塊從

大便出愈

又方 白芷五錢炒 杏仁八粒去皮尖炒 麝香五釐 斑

螯八個去頭足同米炒 共研末冷水調服一錢

五分當日治之一服過一日二服若兩日則不救

凡被咬之人頭頂上若有紅髮必要拔去。毒蛇咬亦然。一方用炒斑蝥米不用斑蝥。

蝎螫方當時擠去毒水以膏藥烤熱貼上即止痛。

白礬 生半夏各三錢研末 調塗愈

又方 枸杞根搗汁塗愈

治蜈蚣咬

生甘草 嚼爛敷患處。

如意散治男婦子玉莖生瘡。如旋疔袖口疔等症。先洗淨後敷此散。輕者旬餘。重者月餘。

川黃連五錢打碎水半碗熬濃汁備用。 蘆甘石五錢用銀匠所

上下扣住。文武火煨半炷香久。取出浸於黃連汁內。以汁盡為度。須日曬乾。切忌火焙。

洋

冰片

珍珠

硼砂各五分

龍骨一錢

生麝香

不拘

滑石

一錢

共乳細末敷上。若腫脹破爛

色黑紫者。係毒氣深重。用指甲三四個。瓦上焙焦

黑色。婦人亂髮一團。燒灰不可存性。加入同研敷

後忌食生冷發物。雄鷄魚肉煎炒。婦人陰戶潰爛

看其輕重。亦將此藥照依加減敷治。洗藥方

消腫止痛

洗藥方

金銀花

薄荷

甘草

艾葉

各五錢

苦參

防

風 川花椒 荆芥 生大黃 槿稍花 大楓

肉 蛇床子各三錢 新汲水煎久薰久洗日二次

將濃洗淨然後敷藥婦人亦如之

神驗疔毒丸

雄黃 生大黃 生巴豆去心皮各三錢 共用石臼石

杵搗為末以飛羅麵陳醋煮糊和藥再搗如泥為

丸鳳仙子大病重者二十三丸輕者二十一丸再

輕者十九丸單數為度放在舌上熱水送下服後

打噎則愈如泄更好俟泄三四次以新汲井水飲

之卽止如病重不省人事將二十三丸用滾水化開從口角邊灌入服後將病人扶起端坐藥入腹中片刻卽甦初服藥時勿吃冷物冷水恐不泄瀉忌食蒜葱鷄魚牛馬犬肉並炙燂辛熱飲酒行房至七日方好不可疎忽按疔瘡乃外科迅速之病有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死至一月半月而終死者其瘡最惡其毒最烈治之之方雖多而應手者實少此藥諸疔皆治但疔有數種部位旣殊形色亦別其發甚微人多疎忽若不指

明貽害不淺如火焰疔其患多生唇口手掌指節
間其發初生一點紅黃小泡抓動癢痛非常左右
肢體麻木重則寒熱交作頭暈眼花心煩發燥言
語昏瞶此等出於心經之病也紫泡疔次日破流
血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目抹
指甲純青舌強神昏睡語驚惕此等出於肝經之
病也黃鼓疔其發初生黃泡光亮明潤四邊紅色
纏繞其患多生口角腮頰眼泡上下及太陽正面
之處發之便作麻癢翹急硬強重則惡心嘔吐肢

體木痛寒熱交作。煩渴乾噦。此等出於脾經之病也。白刃疔。其發初生白泡。頂硬根深。破流紫水。癢痛驟然。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐濃痰。鼻掀氣急。此等出於肺經之病也。黑靨疔。其患多生耳竅。胸腹腰背腎偏僻軟肉之間。其發初生黑斑紫泡。毒串皮膚。漸攻肌肉。頑硬如釘。痛徹骨髓。重則手足青紫。驚悸沉困。軟陷孔深。目睛透露。此等出於腎經之病也。紅絲疔。起於手掌節間。初起形似小瘡。漸發紅絲。上攻手膊。令人多作寒

熱甚則惡心嘔吐。遲治紅絲至心。常能壞人。用針於紅絲處挑斷。出血。凡治此症。貴在乎早。更易痊。可倘若分辨不清。以生黃豆令病人嚼之。不腥。卽是疔毒。速服此藥。萬無一失。

又方

治疔瘡
初起

桂圓肉 冰片 等分。搗爛貼患處。紙蓋縛好。卽有毒水流出。消後以獨蒜切厚片。中剗一孔。不要剗透。蓋於瘡上。以艾炙蒜上。不痛者灸至痛止。痛者灸至不痛止。一應腫毒俱可灸。要灸在瘡頭上。

治疔毒腫痛

明礬 三錢

葱頭 七個

共搗為丸酒吞服飲微

醉蓋被出汗如汗不出以葱頭熬酒熱飲汗即出

定風膏藥方

治一切傷口進風此係陝西華嶽廟道士方

陳猪油 二斤

槐條 十二寸

亂髮 燒灰

官粉 各二

兩 黃蠟 四兩冬月用二兩

將槐條亂髮灰同猪油入

銅鍋內文武火熬至紅色滴水成珠方下官粉再

熬至黑色以黃蠟收膏貯磁餅內聽用再入撒藥

撒藥方
載後

撒藥方

沒藥 乳香酪去 漢三七 象牙 海硝 文

蚶 亂髮燒灰 雄黃 上硃砂鎔一 珍珠

瑪瑙 冰片 輕粉 血竭 寒冰石 象皮

赤石脂 白石脂 陽成丹酪五 兒茶 龍骨

各三錢 枯礬八分 麝香一分 共研末撒在定

風膏藥內止痛生肌

治發背未潰者即散
已潰者合口

白蒺藜研末 猪胆調敷

奇功散 解中砒霜毒

柏子殼 炒

紅土 各三錢

共研末。鷄蛋青調服後。

作一寒顛愈重者不過兩服。

治中砒霜毒

白礬 五錢

新汲水化服

又方 生鷄蛋五六個。打開和勻灌服。以吐盡砒霜

為度。如有醒後發顛者。以綠豆湯飲之。毒盡自愈。

治中巴豆毒

黃連 煎湯服愈

又方 熟豆腐漿一碗服之即愈。

治中煤毒

移患人於風涼處用鹽菜水灌服愈。

治中燒酒毒

鍋蓋上氣水半茶杯灌服愈。

治人咬傷

糖鷄屎塗咬處愈。

治服銀鋤毒

黃泥水服兩茶杯即愈。

治服鹽鹵毒

生豆腐漿水灌下。一方油膩拭棹布。擰水灌服。一方肥皂熬水攪冷灌下。三方皆能令吐。吐出即愈。切不可用熱水灌服。

治吞金

夜明沙。蘸字齋吃。即下。

治食魚中毒

冬瓜汁飲之。

治食諸菜毒發狂吐下欲死。即愈。

鷄屎燒灰水調服

治中野菌毒

金銀花啖之即解

治中牛馬肉毒

人乳飲之即解

治中飲食毒

硼砂 生甘草各四兩

以真香油一斤盛磁瓶內

將藥浸入愈久愈好凡有中毒者服油一小酒杯

即愈如生惡瘡亦可服之

治楊梅結毒服過金石藥久而

土茯苓打碎 白菓七枚連殼衣心 皂角七枚同子肉

用新汲水以沙壺熬濃汁當茶飲之切不可吃茶

如吃茶鬚眉盡落未服之先吃開水半月服此藥

後仍吃開水一月重者服半年愈輕者三四月愈

治楊梅瘡即開天瘡又名天泡瘡

生大黃 水銀 明礬 牙硝 食鹽 苦杏仁

硃砂 皂礬各二錢 共入鐵鍋內以粗碗蓋住鹽

泥封固文武火煨三炷香久離火冷定啟開將碗

上藥刮下。細研。乾麵糊爲丸。金箔裏住。每服二錢。清晨開水下。

又方 土茯苓 四兩 皂角子 金銀花 各二兩

甘草節 二兩 用大砂鍋熬濃汁。要一日吃完連

服十日。奇效在第十一日上。如間斷。則前功盡棄。

又方 明雄 三錢二分 紅花 三錢 川椒子 七粒

明礬 三錢 杏仁 去皮尖 油核桃 三錢

者。 掃盆 三錢 用銀罐 大黑棗 七枚 共研末

酒泛爲丸。梧桐子大。凡患此病。先日以明礬三錢。

用豆腐皮包好開水吞服。次日用火酒合開水嗽口淨。將藥均分七服。強壯者日一服。弱者間日一服。忌食鹽一月。少亦須半月。不能忌鹽及服過八寶丹者不必服。忌油膩煎炒發物。病痊後元氣未復。用老鴨五六隻。清燉淡食。如係結毒。一料不效。兩料必效。

又方

麻黃

一錢

茶葉

五錢

白鳳仙梗

八錢

核桃肉

紅棗

各二兩

大胡麻

一兩

黃酒煎服

以醉為度。重者三四服。

又方 皂角子 大麻仁 麥冬 紅棗 白菓烙

十粒 土茯苓 八兩 水二十碗煎八碗分十次服

治魚口便毒

核桃 兩個 全蝎 三個 以一核桃夾一全蝎一

夾兩蝎瓦上焙乾研末黃酒冲服

治魚口初起內消方

當歸 酒洗 薄荷 荆芥 白芍 山梔仁 炒

桔梗 錢各一 滑石 防風 車前子 各一分 金

銀花 淨 土茯苓 錢各二 連翹 茯苓 各八分 甘

草五分 燈心二十根水煎服

治喉內小瘡

樹上乾桃子。摘下焙乾吹愈。

治唇菌

蜘蛛露水絲匝繞兩道愈。

治唇疔

濕地內之灰色虫。吸毒愈。

俗名地虱。

治陰毒初起

銀硃 輕粉各一錢 五月五日獨蒜一枚 共搗

爛作餅貼手心上男左女右兩手合定頃刻瘡上
氣回汗出愈。

拔毒散

治癰疽疔毒疔瘡對口發背無名腫毒

麝香

冰片

各一錢

雄精

淡鹽硝

硃砂

各五錢

共研末唾津調敷輕者五六次重者十餘次以散

為度。

治賺瘡湯火傷

龍骨

煨

白蠟

蘆甘石

煨各三錢

冰片

三分

共

研末麻油調敷。

治疥瘡

杏仁去皮尖

大楓子肉各二十粒半

白礬二錢

共

研末以水銀二錢燭油二錢搗勻。搽數次愈。

治凍瘡

瀝青末

黃蠟各一兩

香油二兩

合一處溶化

搽患處愈。

治乳癰初起

生半夏蒂邊挖一小孔用冰片麝香等分填滿以紗包紮瘡左入右鼻內瘡右入左鼻內孕婦忌用

治乳妬

赤小豆

搗一兩爛

温酒冲服將豆滓敷患處愈

治無名腫毒及乳岩

血竭

沒藥

兒茶

各一錢

黃丹

五分

共研末

未成者以葱汁調敷即消已成者鷄蛋清調敷留

一頭一夜後用銀針刺破膿盡後以膏藥加飛麵

少許貼上即愈

治走馬牙疳

五倍子

青黛

枯礬

黃柏

等分爲末鹽湯

嗽淨口搽上

治口瘡牙疳

冰片一分

青黛二錢

熟黃柏三錢

人中白

二錢白者佳

搗細末以米泔水將瘡洗嗽淨敷上

治脫疽

發於腳趾漸至膝色黑痛不可忍逐節脫落而死發於手指者亦然

土蜂窩

一個研末

醋調搽

治被火薰死

生蘿蔔搗汁灌之即甦

治湯火傷

南瓜穰厚敷患處愈

治湯火傷已潰爛者

紫草茸

蘇木

各二兩

當歸

一兩五錢

麻油 四兩

用銅鍋同煎一時去滓離火再以白蠟一兩

礪

砂 五錢

梅花冰片 一錢

蘆甘石

製七錢

共研

末入油內攪勻磁罈收固鴨毛刷敷

治黃水瘡並疥瘡

硫黃

五錢研末

葑菜根

汁半碗

先將葑菜根搗汁去

滓澄清盛於碗內將硫黃拌入開水內燉乾取出

將碗覆轉燒艾葉薰半炷香久研末麻油調搽。

治汗斑

殭蠶 四錢

牙硝 五錢

生薑 二兩

共研末陳

醋調搽。

治癬方

川槿皮 四兩

肥皂 兩枚

雄黃 三錢

共研末

陳醋調搽。

治腎囊風濕

陳艾 一把

食鹽 一撮

熬水洗二三次愈

點痣方

煥水 一杯

石灰 一撮

糯米 一撮

先將石灰

盛碗內用煥水泡入後撒蓋糯米於上過三日後
看糯米泡透通亮如水晶用針將痣挑破以泡透
糯米點上即去。

治頸項痰毒紅腫未破者

綠豆

一碗泡軟磨粉。

開水冲服。

治發背對口

古石灰

研末一兩以百
年外者為佳。

黃丹 三錢

西牛黃 分

若遇小恙。土黃亦可。

銅綠 三錢

共研末以芝麻油一兩

五錢。雞蛋清一個調勻。外用黑色舊雨傘紙。必須用過久受風雨之氣者。拆去傘中竹片。如傘紙破損有漏眼處。即用皮紙條粘補。勿令滲漏。將傘紙照患處大小剪成兩片。三面包邊縫好。留一面灌藥裝畢。仍包邊縫好。四角縫上帶子。掛於患處。如隔宿後紙摩皮膚作痛。即袋內藥乾用針挑開口。袋一面將藥取出。再加麻油蛋清調勻。裝入再乾。再調不數日。即可得膿收口。不須再吃他藥。亦不

可另用別藥調敷此方專治發背對口如別症瘡
癰用萬應膏撒藥末亦無不效。

地麥湯

治項頸瘰癧不拘已潰未潰輕者十餘服重者數十服無有不愈愈後仍時服之永不復發。外用六和膏貼蓋兩日一換。毒水流盡即愈。六和膏藥方載後。

小生地 三錢

大麥冬 去心一錢五分

甜貝母 二錢 要川產甜

者佳。

粉丹皮 一錢五分

香附 炒一錢五分

牛蒡子 炒一錢五分

赤茯苓 二錢

夏枯草頭 二錢

陳佛手 三分

水煎間日服忌燒酒辛辣房事。

六和膏藥方

治瘰癧痰塊並一切癰疽無名腫毒貼時再加麝香少許更好。

猪膽約一百二十個 葱汁 薑汁各一杯 麝香錢一

五分 乳香製淨 沒藥製淨二兩 用燈草四兩炒去

灰 三味共研末。先將猪胆葱汁薑汁攪勻。日晒

如膏。人後三味和勻。磁罐收固。臨用以油紙攤貼

若瘡口潰爛。用湖茶將瘡洗淨貼土。

治誤吞金銀並銅錢

羊脛骨 炭火燒存性。為末。每服三錢。米飲下。金

銀銅錢俱從大便出。

珊瑚紫金膏 治七十二種眼疾。一二十年不明者均能治。惟瞳人反背而驚散者不治。

白蘆甘石

一兩童便浸七日用炭火銷銀砂鍋內煨紅浸入童便內十日曬乾研細末。

黃丹

一兩滾水飛過三次曬乾研細末。

海螵蛸

二錢即墨魚骨刮皮甲微火炙

過研細末。

乳香

沒藥

各二錢均入砂鍋微火炒出烟研細末。

白礬

砂二錢

青鹽

麝香

各五分

洋冰片

三分均研細末

以上俱成細末合一處乳鉢研極細然後入麝香冰片二味拌勻用蜂蜜以絹袋濾過熬蜜成珠夏老冬嫩春秋酌看老嫩之間將藥末調入蜜內用磁罐封固不可洩氣點眼神效。



蘇難性固不同於屏蝶翅
轉皎
...

...

水二和料白甲純靈以蘇
...

...

...

厚香 效藥
...

...

白蓋甘石
...

顾问(以姓氏笔划为序)

于生龙 马继兴 王雪苔 王绵之 邓铁涛 田景福 龙致贤
朱杰 刘渡舟 李辅仁 李明富 李任先 余瀛鳌 张瑞祥
张灿岬 施杞 祝湛予 高辉远 唐绍明 唐由之 顾廷龙
盛国荣 董建华 傅世垣 焦树德 裘沛然

编选：薛清录 傅景华 赵璐 刘国正 毕俊英 李世勤 徐金香

巴恩荣 魏菊仙

印制：蒋放年

田隸 薛如平

田隸 薛如平

田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平

田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平

田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平

田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平

田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平 田隸 薛如平

田隸 薛如平

责任编辑：徐岩春

中医古籍孤本大全
神效集 一函一册

(清)著者佚名

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九三年九月第一版

一九九三年九月第一次印刷

ISBN7-80013-497-0/R·494

国内定价：壹佰玖拾圆

(京)新登字〇二七号