

stum, nudum, viride. Stylus filiformis sub angulo adscendens. Stigma obtusum sub apice oblique barbatum villis sericeo-niveis. Legumen longum; erectum, uniloculare, bivalve, nudum, apice acuminatum, polyspermum; seminibus ultra decem rotundis. Odor nullus.

CCCLIV.

LATHYRUS APHACA.

Lathyrus pedunculis unifloris; cirrhis aphyllis; stipulis sagittato-cordatis.

Linn. spec. plant. pag. 1029. num. 1. Scopol. flor. carn. 2. p. 2. pag. 61. num. 887. Gerard. gallopr. pag. 493. num. 1. Necker. del. gallob. pag. 305. num. 3. Pollich. palat. II. pag. 298. num. 1. Schrank. flor. bav. pag. 254. num. 1075. Allion. flor. ped. I. pag. 329. num. 1216.

Lathyrus aphyllus, stipulis sagittatis latissimis. Haller. hist. I. pag. 191. num. 442.

Aphaca. Lobel. obs. pag. 518.

Vicia, quæ Pitine Anguillaræ, lata siliqua, flore luteo. Joh. Bauh. II. pag. 316.

Recentem inter segetem frequens ubivis circa Goritiam initio visitur Maji. Plures quaquaverum diffusi, & procumbentes una de radice, eaque omnia, gracili, fusiformi, gracilioraque passim in brachia divisa, exent caules, & ipsi sat graciles, tetragoni, laves, virides, ramosi, ab una ad semialteram cum tempore prolongati spithamam, omnino aphylli, foliorum nihilominus loco, cirris simplicissimis filiformi-setaceis alterna per intervalla obsiti, quibus & passim cerealium se illigant culmis scandentes.