北京华宝古籍展览

木集

休寧東山古菴方 黃約之類集

# 小兒門 下

## 痘瘡 一百

丹溪心法

○痘瘡分氣虛血虛用補　氣虛者人參白术加解毒藥血虛者四物湯中加解毒藥　酒炒黃芩黃連名解毒藥

凡痘瘡初出之時色白者便用大補氣血人參白术黃芪川芎升麻乾葛甘草木香丁香酒洗當歸白芍藥　若大便瀉加訶子肉豆蔻

但見紅點便是葛根湯恐發得表虛也

吐瀉食少為裏虛　不吐瀉能食為裏實裏實而補則結癰毒

陷伏倒靨為表虛灰白者亦表虛或用燒人屎　紅活綻凸為表實

表實而更復用實表之藥則要潰爛不結痂

吐瀉陷伏二者俱見為表裏俱虛

黑陷甚者亦用燒人屎蜜水調服　出子和方

痘瘡初出時或未見時有患者宜預服此藥多者令少重者令輕方以

絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌乾喫入硃砂末尤妙

痘瘡分人清濁就形氣上取勇怯

黑陷二種曰氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪酒紫草人參

顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸川芎酒洗芍

藥之類或加紅花

將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒牛蒡葛根黃連黃芩桂

枝連翹之類甚者犀角大解痘毒

爐灰白色靜者怯者作寒看

勇者燥者煩發者作熱看

痘瘡鼠粘子連翹山查甘草此四味始終必用之藥

全白色將靨時如豆殼者蓋曰初起時飲水多甘靨不齊俗呼倒

靨不好但服實表之劑消息他大小便如大便秘通大便小便秘通

小便

有初起煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以涼藥解其

標如益元散之類亦可服

痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯　虛則脉無力氣怯

輕者用淡蜜水調滑石末以羽潤瘡上

虛痒者以實表之劑加涼血藥
實痒如大便不通者以大黃寒涼之藥少許與之下其結糞
疎則無毒密則有毒宜涼藥解之雖數十貼亦不妨無害眼之患
瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火只用輕劑荊芥升麻葛根之類瀉濕
乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類
如痘瘡傷眼必用山梔決明亦為藥當歸尾黃芩防風連翹升麻桔
梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣復自明
痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩已成膿必用活
藥為主赤芍甘草平節連翹桔梗　上引用升麻葛根　下引用
柴柳牛膝助以只母忍冬草白芷不蒸之類　大便燥用大黃蒸
寒熱用黃芩黃柏
痘瘡黑屬血熱涼血為主　白屬氣虛補氣為主　中黑間白外
白起得遲者則相兼而出但
初起時自汗不妨蓋濕熱熏蒸而然故也
痘風分氣血虛實以日子守之多帶氣血不足　虛則黃芪生血活血
之劑助之畧佐以風藥　實則白芍為君黃芩亦為君佐　以白
芷連翹續斷之類
若屬寒陳氏方亦可用
入方　解痘瘡毒
絲瓜　升麻　酒芍藥　生甘草　黑豆
山查　赤小豆　犀角等分
右㕮咀每服三錢水一盞煎六分溫服
又方　治痘瘡已出未出皆可服
硃砂

右爲細末蜜水調服多者可減少者可無

痘瘡敷藥

貝母　南星　殭蚕　天花粉　寒水石最多

白芷　草烏　大黄　猪牙皂角

石爲末醋調傅之

附諸方

○補虛

黄芪紫草人參湯　治痘瘡后表虛黑陷　即前丹溪方

黄芪酒炒　紫草酒炒　人參各等分

右爲粗末每服五錢水一大盞煎六分加酒服

小異功散　治痘瘡裏虛吐瀉及和胃助氣　楊氏方

人參　茯苓　白术　甘草　陳皮

木香各等分

右爲末每服五錢水一大盞姜棗同煎六分加服

白术散　治裏虛吐瀉煩渴除身熱清神生津痘無顏色首尾可服

人參　白术　茯苓　甘草　木香

藿香各七分　乾葛一錢四分　一方作乾姜止泄瀉用

右爲粗末水一大盞姜棗同煎至六分温服

大補湯　實表裏補氣血治痘瘡陷伏不紅者

當歸　川芎　白芍藥　生地黄　人參

白术　白茯苓　甘草　黄芪　官桂各等分

右㕮咀大小兒每服五錢小小兒三錢水煎服

痘瘡治例

心法附録曰小兒凡覺身熱証似傷寒若未經瘡痘疑似未明且先與

惺惺散參蘇飲或人參羌活散

熱甚者則與升麻葛根湯人參敗毒散

痘瘡已出則少與化毒湯

出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯紫草木通湯或快斑散

絲瓜湯

出太甚者人參敗毒散犀角地黃湯

小便赤澁者大連翹湯甘露飲麥門冬五苓散

大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最當或少與四順清涼飲

若咽喉痛者大如聖湯鼠粘子湯

喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

胷腹脹滿者枳殼桔梗湯三陳加枳殼湯

煩渴者甘草散烏梅湯

若下利嘔逆者木香理中湯甘草乾姜湯

若陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄傅其身厚傅其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散入射香者酒調劑或不用酒則木香煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散加青皮主之

然而瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其有大便自利所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用化毒湯可也或不用亦可若大小二便一或閉焉則暗胃壅塞脉絡凝滯毒氣無從而發泄眼閉聲啞肌肉黧然不旋踵而告變矣

○發熱

惺惺散　治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓　細辛　桔梗　瓜蔞根　人參

甘草炙　白朮　川芎各等分

右爲末每二錢水煎入薄荷三葉同煎服

參蘇飲　治小兒時氣傷風傷寒發熱惡寒咳嗽未明痘瘡是與不是疑似之間此藥甚爲穩當　楊氏調解散即是此方

前胡　人參　紫蘇葉　乾葛　半夏湯炮七次姜汁製

茯苓各三分　枳殼　陳皮　甘草　桔梗各二分

右㕮咀姜棗煎微熱服

人參羌活散

羌活　獨活　柴胡　人參　川芎

枳殼　茯苓各三分　前胡　甘梗　天麻

地骨皮　甘草各一分半

加麻黃薄荷葱白煎服　汗後尚熱宜服此去麻黃加紫草

如已見三五點加紫草陳皮赤芍使熱退瘡出亦輕更調辰砂末半

錢以制胎毒

消毒救苦散　拔萃方治癍疹悉具消化便令不出如已出稀者再不生

班

麻黃　羌活　防風各五錢　川芎　藁本

葛根　蒼朮　酒黃芩　生黃芩　柴胡各二錢

細辛　橘皮　紅花　蘇木　生地黃

酒黃柏　連翹各五分　黃連三分　生甘草一分　吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞煎去粗熱服

三豆子湯　治天行豆瘡但覔有此証即服之

赤小豆　黑豆　菉豆各一兩　甘草節五錢

右淘淨水煮熟任意食豆飲七日自不發

惡實膏

用悪實子為末蜜調貼顖門上免有患眼之疾

○熱甚者

升麻葛根湯　加山查大力子其瘡稀疎而易愈

川升麻　甘草　白芍藥各一錢半　葛根一錢半

右㕮咀作一服水一盞半煎八分温服

人參敗毒散　方見前

涼膈散　治小兒瘡疹未出三焦積熱煩躁多渴及面赤面熱頭昏咽燥喉咽腫痛口瘡便溺赤澁狂言譫妄睡臥不安並宜服之

大黄　朴硝　甘草　梔子仁　黄芩

薄荷葉各一兩　連翹四兩

右為末每服二錢竹葉五片蜜少水一盞煎六分温服

若瘡疹已出發熱作渴脉實鬧亂便實者亦宜服此便不實者切不可服恐内虚而毒氣不能發外也

謹按瘡疹已發有寒熱温涼不同形氣盛虚之異虚寒者用異功散實熱者用涼膈散有起死廻生之效若以實熱為虚寒用異功散虚寒為實熱用涼膈散死生在反掌之間慎之慎之

○已出

化毒湯　治瘡痘已發以此消毒

紫草茸半兩　升麻　甘草各二錢半

右剉散每服二錢粳米五十粒同煎服

○出不快者

四聖散　簡易方　治小兒瘡疹出不快透及倒靨一切惡候

紫草茸　木通去節　甘草　枳殼去白麩炒各等分

右㕮咀每服二錢水一盞煎服

加味四聖散

紫草　木通　黄芪　川芎

甘草炙減半　木香等分

右為粗末水煎服　大便秘加枳殼　大便如常加糯米百粒

楊氏曰糯米能解毒發瘡

紫草木香湯　治瘡出不快大便泄利

紫草　木香　茯苓　白术等分　甘草炙少許

入糯米煎服　楊氏云紫草能利大便白木木香佐之

紫草木通湯

紫草　人參　木通　茯苓　糯米等分

甘草減半

右剉煎二錢温服　内虚大便利者可入南木香去紫草

快斑散

紫草　蟬殼　人參　白芍各二錢半　木通一錢

甘草炙半錢

右剉散煎二錢温服

又方

紫草茸五錢　陳皮三錢　黄芪三錢　赤芍五錢　甘草炙三錢

右剉加糯米百粒煎三歲已上服三錢已下一錢服後瘡徧匀四肢

住服

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性為末湯調　楊氏云發痘瘡最妙或加甘草紫草

消毒散和劑方　治毒飲雜逼壯熱心煩瘡疹難出未能匀透

牛蒡子炒六兩　荆芥穗一兩　甘草炙二兩　防風　升麻各一兩半

右㕮咀每服二錢水一盞煎服如大便利者不宜服

○出太甚者

人參敗毒散 方見前

犀角地黃湯

犀角一兩 生芐二兩 赤芍七錢半 牡丹皮一兩

右㕮咀三歲兒三錢水煎

○稠密者

加味犀角消毒散

惡實四兩炒 甘草炙一兩 防風半兩 荊芥穗二兩

宜加山查酒黃芩酒洗紫草減食加人參

右為末煎紫草糯米荒麥湯調服食後臨臥日三

黍粘子湯 援萃方 治癍子已出稠密身表熱急與此藥以防已後青乾

黑陷

鼠粘子炒香 當歸身酒洗 甘草各一錢炙 柴胡 連翹

黃芩 黃耆各一錢半 地骨皮二錢

右為粗末每服二錢水煎去滓溫服空心藥進且休與乳食

○小便赤澁者

大連翹湯

連翹 瞿麥 荊芥 木通 車前

當歸 防風 柴胡 赤芍 滑石

蟬蛻 甘草炙各一錢 黃芩 山梔子各半錢

甘露飲子

生芐 熟芐 天門冬去心 麥門冬去心 枇杷葉去毛

枳殼麩炒去穰 黃芩 石斛 山茵陳 甘草炙各等分

右剉每二錢水一盞煎八分食後服

五苓散

加麥門冬煎服　方見中暑

○大便閉結內煩外熱者

小柴胡湯

加枳殼同煎服　方見温熱類

四順清凉飲子

當歸　赤芍　大黄　虛者煨實者生　甘草各等分

一方加陳皮粳米煎

○咽喉痛者

如聖飲子

桔梗　甘草生　鼠粘子炒各二錢　麥門冬三錢

鼠粘子湯

鼠粘子炒四錢　荊芥穗三錢　甘草一錢　防風半錢

右爲細末沸湯點服　一方加荊芥防風重者竹瀝同煎

○喘滿氣壅者

麻黄黄芩湯

麻黄三錢　赤芍　黄芩各二錢半　甘草炙　桂枝各半錢

○胷腹脹滿者

桔梗枳殼湯

枳殼　桔梗各二兩　甘草炙半兩

右剉姜煎

二陳加枳殼湯

右爲末竹葉同煎二三錢點服　一方加荊芥防風重者竹瀝同煎

半夏　橘紅　茯苓　甘草　加枳殼

右剉姜煎

○煩渴者

甘草湯

甘草　瓜蔞根等分

右為末每一錢煎服

烏梅湯

小黑豆　菉豆各一合　烏梅二箇

右㕮咀新汲水一碗煎取清汁旋服

人參麥門冬散集驗方　治發熱煩渴

麥門冬去心　人參去芦　甘草炙　陳皮　白朮

厚朴姜製各半兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎六分去滓溫服不拘時

○下利嘔逆者

木香理中湯

本方中加木香甘草乾姜　方見中寒

○陷入者

加味四聖散　方見前

胡麥酒

以荒麥煎酒薄傅其身厚傅其足噴其衣服併以厚綿蓋之

獨聖散

牛蒡子炒五錢　白殭蚕二錢半

右末入紫草三莖同煎連進三服　前條云獨聖散入射香老酒調

劑如不用酒則木香煎湯調服

又方

穿山甲湯洗淨炒焦黃為末每服半錢入射香少許木香煎湯調下

或紫草煎湯入紅酒少許調下

○黑陷者

宣風散

檳榔二箇　陳皮　甘草各半兩　黑丑四兩半生半熟

右為末每一錢量大小與服蜜湯調下

無價散御藥院方治癍瘡不出黑陷於死者

人猫猪犬膽晨燒　少許微將蜜水調

百者救生無一死　黃金萬鋌也難消

右將前四物於臘日早辰日未出時貯於銀鍋內用炭火煨令烟盡

白色為度但是瘡發不快便服黑陷者及一切惡瘡每用一字蜜

湯調服其效如神

一說人糞用九歲以下無疾童子者猪猫犬糞用未破陽雄者先於

重九日各置於淨處飼之以飲勿令雜食盈旬日換盡腸之宿垢方

收其糞陰乾候臘八日日未出時燒

百祥丸

紅芽大戟不以多少陰乾浸水煮極軟去骨日中曝乾後絞汁

中煮汁盡焙為末水丸如粟米大每服一二十丸研赤芝麻湯下

又湯氏方　治小兒痘疹黑陷者

羌活一兩　川山甲醋炒黑　生人骨火煅存性各半兩助人牙　射香少許

石四味為細末麻黃薄荷煎湯調一錢只用一服便起萬不失一

乳香散　治痘瘡既收心痛不可忍者餘毒歸心急煎乳香散服之

乳香半錢或一錢

右用水一盞煎服　一方加沒藥赤芍藥當歸同煎

○疔毒

四聖丹　治瘡瘡中有長大紫色者為疔毒把住瘡瘡不起發急用簪尖挑破紐入此丹

珍珠三五粒煅黑上燒微黃色研　豌豆四十九粒燒灰存性　頭髮燒灰存性

右為細末用捺面油臙脂調成膏子將兒在溫煖處安存忌風寒穢氣先用簪尖平撥開疔口將藥紐入疔內即時變為紅白色餘瘡皆起　又嘗見有疔瘡者但挑破出其黑血即愈或挑開用口唾去黑血或用綿裹指甲掐出黑血展去亦可蓋自疔瘡破而毒氣得散也

○愈後諸疾

五福化毒散湯氏方　治疹痘餘毒未解并上焦熱壅口齒出血

玄參一兩　桔梗去芦八錢　赤茯苓　人參　牙硝別研各半兩

青黛二錢半　甘草一錢　射香半錢別研

右為末入青黛和勻煉蜜為丸如芡實大金銀箔為衣磨生犀水化下　齒血臭氣用生地黃汁化下

人參白术散錢氏方　治痘已靨留身執不退此藥清神生津除煩止渴

人參　白术　藿香葉　木香　川草

白茯苓各一兩　乾葛二兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分溫服不拘時

雄黃散集驗方　治小兒目豆瘡牙齦生疳蝕瘡

雄黃一兩　銅綠二錢

右同研極細末量瘡大小乾糝其上

綿蛩散陳氏方　治目豆瘡身體肢節上有疳蝕瘡膿水不絕

用出蛾綿蛩不拘多少以生白礬槌碎置其內炭火燒令礬汁冬

取細研乾糝瘡上

穀精草散 陳氏方 治豆已靨眼目翳膜或癢澁多淚

穀精草一兩 生蛤粉二兩

右為末猪猪肝一葉以竹刀批作片子糝藥在內用宁繩縛定於磁器內貯水慢火煮熟令兒食之

一方 治癍瘡入眼 張子和方

麸炒蒺藜 炙甘草 羌活 防風等分擣

每服二錢將水下 撥雲見日直到老

又方 張子和方

硃砂 腦子 水銀 麝香 各等分

右四味研為細末用水銀調滴耳中

一方 治小兒出瘡疹眼內有雲翳 出竹堂方

輕粉 黃丹 各等分

右為末竹筒吹入耳內左眼有翳吹右耳右眼有翳吹左耳即退

麥湯散 治水痘 陳氏方

地骨皮半分炒 麻黃一分去節 甘草炙半分 人參一分 滑石半分

大黃一分濕紙裹煨 知母各一分 甜葶藶一分用紙隔炒 羌活一分

右為末每服半錢水一盞小麥七粒同煎十數沸服

○陳氏豆疹證治

凡小兒瘡疹未出已出之間有類傷寒之狀其瘡疹病証自然憎寒壯熱身体疼痛大便黃稠此乃是正病也若無他疾不宜服藥

凡瘡瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治如表裏俱實者其瘡易出易靨也如表實裏虛者其瘡易出難靨也

凡初覺豆瘡可用胡荽酒逸房噴之以辟穢濁之氣則豆瘡易收又急

乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則豆瘡不入眼內

若豆瘡已出未出之時或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛速與十一味木香散治之以和五臟之氣

若豆瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也速與十二味異攻散治之以表六腑之氣

若瘡瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發根窠不紅或腹脹或瀉渴或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散送下七味豆蔻丸治之以助五臟六腑表裏之氣

若纔覺傷風身熱未明是與不是瘡瘡便宜發散可服四味升麻葛根湯

若瘡瘡始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足稍冷者或身熱泄渴者或身熱驚悸腹脹者或身熱汗出者皆不宜服升麻葛根湯已上四證宜服十一味木香散治之

若瘡瘡始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱實也其瘡必光澤起發肥滿易靨而不致損傷也

若豆瘡已出發熱口乾煩渴不止者切不可飲冷水亦不可食蜜及紅柿西瓜等冷物又不可妄投清涼飲消毒散等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙則難治咬牙者齒橋也乃血氣不榮不可妄作熱治之

若豆瘡雖出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解散致令臟腑受冷榮衛滯則氣血不能衝貫皮膚肌肉其瘡不得起發不得充滿不得結實不能成痂故多痒塌煩躁喘渴而死皆曰宣利解散之過也縱得其生而必罕矣

若瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者煎十一味木香散送下七味肉豆

蔻亢治之如瀉止住服不止者多服

若瀉頻多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能靨也如身溫腹脹吹牙喘渴者難治緣水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者湯散真氣故多死矣速與十一味木香散救之

若四五日不大便者可用肥嫩猪腩一塊以淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子大與小兒食之令臟腑滋潤使瘡痂易落百無滯碍切不可妄投宣藥恐內虛瘡毒入於裏傷兒真氣

若六七日身壯熱不大便其脉緊盛與三味消毒散微得利即住

若小兒神氣軟弱瘡疹自初出兩三日至十三日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡疹

若身反發熱煩渴者宜服六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白术散

若豆瘡欲靨已靨之間或不能靨服脹煩渴者不可與水蜜若飲者轉渴而死急煎十一味木香散救之

若豆瘡欲靨已靨之間頭溫足冷或腹脹瀉渴氣促者不可與水蜜若飲者即死急煎十二味異攻散救之

若十日至十一日當靨不靨當其身不壯熱悶亂不寧卧則哽氣煩渴咬牙急煎十二味異攻散更加木香當歸以救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物食之速死

若十二日十三日瘡痂已落其瘡瘢猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡浴亦不宜食炙煿物又不宜食五辛五味并有毒之物恐熱毒薰蒸肝膈眼目多生翳障若不依此禁忌必為小兒終身之患用兩味穀精草散治之

若豆瘡已靨其痂欲落不落煩渴不止切不可與水蜜西瓜紅柿等冷

物食之若食之轉生焦渴或頭温足冷或腹脹或時瀉或咬牙以致
難愈速與十一味木香散救之即瘥
若身壯熱經日不除別無他證以六味柴胡麥門冬散治之熱退住服
如不愈只服七味人參白术散治之
若身壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆是瘡氣餘毒未尽以四
味射干鼠粘子湯治之如不愈者以七味人參白术散主之
若風熱咳嗽咽膈不利三味桔梗甘草防風湯治之如不愈者以七味
人參白术散主之
若涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黄赤以十六味人參清膈散治
之如不愈只服七味人參白术散立效
若痰實壯熱胸中煩悶大便堅實則喘急以五味前胡散殼湯治之
凡豆瘡首尾不厝與水喫少與冷熱湯則可若悞與之瘡靨之後其痂
遲落或身生癰腫若鍼之成疽餘瘡血水不絶甚則面黄唇白以致
難愈者何也蓋脾胃屬土外主身之肌肉秪緣飲水過多濕損脾胃
博於肌肉其脾胃肌肉虚則津液衰少津液衰少則榮衛澁滯榮衛
澁滯氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而生癰腫也
若微作渴者以六味人參麥門冬散治之如不愈者只服七味人參白
术散治之
若身熱大渴以七味人參白术散治之如不愈者只服十一味木香散
治之
若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身温渴者或身
熱面㿠白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴
不止者以上九證即非熱也乃脾胃肌肉虚津液衰少故也宜服十
一味木香散治之如不愈者更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂

發表其表裏俱實而瘡不致於痒塌喘渴死矣

若豆疹已靨未愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膚腠之間則津液澁滯故成痒蝕瘡也宜用雄黃散綿繭散空藥治之久而不愈者潰骨傷筋以致殺人

凡斑駁疹毒之病俗呼疹子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤斑遍体也凡發赤斑者十生　死發黑斑者十死一生難治葛根麥門冬散生地黃散主之

○廣按丹溪斑疹豆瘡各立病目所治不同而陳氏瘡疹混同立論豈不誤哉夫豆瘡出於脾其間有熱燥者有寒濕者而斑疹出於心肺心肺屬陽多是風熱燥痰而作宜於通聖散中消息之陳氏比篇却言斑疹乃是肺胃蘊積熱毒每因時氣所觸而作用葛根麥門冬散生地黃散治之方合病情可見若疹不可一途而治也明矣

凡豆瘡或悞抓成瘡膿血淋漓緣血氣裏肌肉虛故也切不可用新牛糞燒灰貼之其臭穢反觸其瘡宜用敗草散治之仍服十一味木香散加丁香肉桂煎服

黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰虛用木香散加丁香官桂治之陰盛則補陽虛用異攻散加木香當歸每一兩藥共加一錢異攻散能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使豆瘡易出易靨不致痒塌木香散性溫平能和表裏通行津液清上實下扶陰助陽之藥也善治小兒腹脹瀉渴其效如神不能盡述大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生長者也今瘡疹之病臟腑調和則血氣充實自然易出

易靨蓋曰外常和煖內無冷氣之所由也

凡痘疹五不治一痒塌寒戰不止者二紫黑色喘渴不寧者三灰白色陷頂腹脹喘渴者四頭温足冷悶亂飲水者五咬牙氣促泄瀉煩渴者皆難治

若豆瘡已出七日之間其瘡不光澤不起發根窠不紅痒塌抓搔謂之表虛也可隨証服藥蓋脾主身之肌肉肺主身之皮毛今豆瘡出是肌肉皮毛受其證也治法先當調和臟腑滋養血氣使脾不虛而肺不寒表裏冲和其瘡自然易出易靨也故經云表病裏和不治而自愈也

今將豆疹輕重開具于后

輕者　作三次出　大小不一等　頭面稀少　眼中無根窠紅　肥滿光澤

重者　一齊并出　如蚕種　稠密　瀉渴

灰白色　頭温足冷　身温腹脹

輕變重　犯房事　不忌口　先曾瀉　飲冷水

飲凉藥

重變輕　避風寒　常和煖　大便稠

今將豆疹方開具于後

胡麥酒

以荒麥煎酒逃房噴之以避穢濁之氣

胭脂膏

以乾胭脂用蜜調塗兒兩眼眶則豆瘡不入眼內

升麻葛根湯四味　方見前

木香散十一味

木香　大腹皮　人參去芦　桂心　赤茯苓去皮
青皮去穰　前胡去芦　訶梨勒去核　半夏薑製　丁香
甘草各三錢

右㕮咀每服二錢水一盞薑三片同煎空心温服量兒大小加減
一方去桂心丁香加桂枝藿香

異攻散十二味

木香　當歸各三錢半　官桂去粗皮　茯苓去皮　白术各二錢
人參　厚朴薑炒　肉豆蔻　丁香　陳皮各二錢半
半夏薑製　附子炮去皮各一錢半

右㕮咀每服二錢水一盞薑五片肥棗三枚同煎空心温服量大小
加減　一方去丁香附子加藿香乾姜

肉豆蔻丸七味

木香　硇砂仁各三錢　白龍骨　訶子肉　肉豆蔻各半兩
赤石脂　枯白礬各七錢半

右爲細末麵糊爲丸如黍米大一歲服三五十丸三歲服百丸米飲
湯下溺甚者煎異攻散吞下溺不止多服或溺水穀白色淡黃色木
香散送下

消毒散　出後身壯熱不大便其脉緊盛用此微利

牛蒡子炒　荊芥穗　甘草炙各一兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎温服量大小加減

人參麥門冬散六味　出後身反發熱煩渴者　方見前

人參白术散七味　出後身壯熱大渴嘔吐泄瀉　方見前

紫胡麥門冬散六味　出後身壯熱經日不除

柴胡　甘草炙　人參去芦　黑參各二錢半

龍腦草一錢半　麥門冬去心三錢

右㕮咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減

射干鼠粘子湯四味　壯熱便實口舌生瘡咽喉腫痛

鼠粘子四兩沙香　甘草炙　升麻　射干各一兩

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減

桔梗甘草防風湯三味　治風熱咳嗽咽膈不利

桔梗　甘草炙　防風各半分

右每服二錢水一盞煎溫服量兒大小加減

人參清膈散十二味　治涕唾稠粘身熱鼻乾

入參　柴胡　當歸　芍藥　知母

桑白皮　白朮　黃芩　栀子　地骨皮

茯苓　甘草　桔梗各一兩　黃芩一兩半　石膏

滑石各一兩半

右每服二錢水一盞姜三片同煎溫服量大小加減

前胡枳殼湯五味　疾實壯熱胸中煩悶大便堅實

前胡一兩　枳殼　赤茯苓　大黃　甘草炙各半兩

右㕮咀每服二錢水一盞煎溫服量大小加減如身溫脉微并瀉者不可服

雄黃散　目豆瘡牙齦生瘡觸齒　方見前

綿黏散　目豆瘡身体肢節上有瘡蝕瘡膿水不絕者　方見前

敗草散

用蓋房多年爛草或蓋墻爛草亦可其草經霜露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取草不以多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐臥可用二三升攤於席

上令兒坐臥其效如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

韶粉散　豆瘡絶愈而毒氣尚未全散瘡痂雖落其瘢猶黯或凹凸內起當用此藥塗之

韶粉一兩　輕粉一錢

右和研勻入煉過猪脂油調和如膏薄何瘡上如豆瘡欲落不落當

滅瘢痕

又方

用羊髓骨髓一兩入輕粉一錢研成白膏以甆盒盛之塗瘡上如豆瘡痒甚俱搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂落亦無

紫黑瘢痕

[illegible]梅草散　治熱毒熏於肝眼目多生翳障　方月前

[illegible]末散　治豆瘡入眼

蔓木　乾葛各一兩　槐花　藁本

防風　枸杞　白蒺藜各二錢　黄芩　蛇蛻

白菊花　木賊　甘草各二兩　蟬蛻四錢　川芎各半兩

沒藥各半錢　硬石膏煅半兩　穀精草三錢　乳香

右為末每二錢白水煎食後服

菊花散　治豆瘡入眼

白菊花三兩　蒹豆殼　蜜蒙花　旋覆花　穀精草

甘草各一兩

右為末每服二錢用乾柿一枚栗米泔一盞煎乾為度取乾柿食後服之

蟬菊散　豆瘡入目或病後生翳障

蟬蛻去土淨洗　白菊花各等分

右為末每服二錢水一鍾入蜜少許同煎乳食後温服量兒大小加減

葛根麥門冬散　治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根　麥門冬去心各三錢　人參去芦二錢　石膏半兩　川升麻二錢

甘草　茯苓各二錢　赤芍藥一錢

右每服二錢水一盞煎温服看兒大小加減

生地黄散　治斑駁疹毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黄半兩　麥門冬去心七錢　杏仁湯炮去皮　款冬花　陳皮各三錢

甘草二錢半炙

右每服二錢水一盞煎服量大小加減

麥㴱散　治水豆方見前

○廣投瘡疹之源蓋由母姙娠之時飲食煎炒炙煿厚味醇酒兒在腹中受漬食母血穢蘊而成毒伏於五臟之間及生之後或回外感風氣內傷生冷跌撲驚恐時氣流行觸動鬱火發於肌膚之間心臟之毒為斑肺之毒為疹肝臟之毒為水泡瘡脾臟之毒為膿泡瘡小兒稟厚毒少氣血調勻表裏充實則易發易靨苟或稟弱毒盛表裏虛氣血弱必須醫藥調治庶幾有生前輩明醫錢仲陽氏出究其病源是熱是燥故用辛涼之藥以清熱潤燥又陳文中氏出又見病源之中有寒濕者故用辛温之劑以温寒散濕此二先生兩得之後之宗錢氏者惟知辛涼之是務而寒濕者不宜宗陳氏者惟以辛温之是從而熱燥者不可小兒罹此禍患可勝計哉苟能用二子之長而無二家之弊斯可也故丹溪朱先生曰豆瘡看氣血虛表裏虛用補又曰瘡乾者是火宜退火瘡濕者是濕宜瀉濕又曰爐灰白色靜者怯者作寒看勇者燥者炊發者作熱

看先生之言可謂活潑潑地矣以此觀之小兒痘瘡表裏凡實者固不必於藥而虛中有寒濕者與夫虛中有熱燥者必須於藥也今將附方補虛及痘瘡治例具之於前使小兒痘瘡屬熱燥者宗之又以陳氏痘疹證治附之於後使小兒痘瘡屬寒濕者宗之後之業是科者必以補虛為主視其形色脉證寒濕熱燥及天時寒暄而分治之嬰孩之幸也

又按王節齋論曰丹溪痘瘡治法最為明備近世通用陳文中木香異攻等方乃一偏之術若豆瘡陷伏淡白色及內瀉渴腹脹者此屬虛寒宜用陳文中方若勇盛稠密紅紫色及大便燥結者此屬熱毒急宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救豆是胎毒古人治法只解毒然吐瀉裏虛則送毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊必須詳究丹溪陳文中二法通用斯無弊也○痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方死屬毒盛轉紫色者不過七八日蓋痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡發於表七八九日成膿而結痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入臟腑故須於六日以前毒氣該出之時急服涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日久而後死此虛實輕重之分也○痘瘡多者是毒氣盛便先宜解毒然多則恐氣血周貫不足故隨後亦宜兼補藥以助成膿血

休寧東山古庵方廣約之類集

# 雜治門

## 論倒倉法 一百有一

丹溪心法

○倒倉法治癡勞蠱癩等証推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯午腿精肉二十斤或十五斤順取長流急水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可用冷水以肉爛成柤為度濾去柤用肉湯再熬如琥珀色隔宿不喫晚飯大便秘者隔宿進神芎丸不秘者不用五更於密室不

通風處温服一鍾伺膈間藥行又續續服至七八鍾病人不欲服強令
與之必身躰皮毛皆痛方見吐下寒月則重湯温之病在上欲吐多者
須緊服又不可太緊恐其不納病在下欲利多者須疎服又不可太疎
恐其不達臨時消息大抵先見下方可使吐須極吐下伺其上下積俱
出盡在大便中見如胡桃肉狀無臭氣則止吐利後或渴不得與湯其
小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二椀非惟可以止渴抑者可
以滌濯餘垢睡一二日覺飢甚乃與粥淡食之待三日後始與少菜羮
自養半月覺精神渙發形躰輕健沉痾悉安矣　六槩中間飲至七八
鍾時藥力經涉經絡骨節搜逐宿垢正邪寧不牴牾悉有急悶似痛非
痛自有惡況此皆好消息邪不勝正將就擒耳尤須寧耐忍受又於欲
吐未吐欲泄未泄交作皆有惱括意思皆須歡喜樂受一以靜處之此
等有大半日景象不先說知使方寸瞭然鮮有不張皇者矣　未行此
法前一月不可近婦人已行此法半年不可近婦人五年不可喫牛肉
性急好淫不守禁忌者皆不可行此法倒倉全在初起三鍾慢飲最緊
要能行經隧中去

法曰腸胃為市以其無物不有而穀為最多故曰倉倉積穀之室也
倒者傾去積舊而滌濯使之潔淨也經曰胃為受盛之官故五味入
口即入於胃留毒不散積聚既久致傷冲和諸病生焉今用黄牯牛
肉其義至矣夫牛坤土也黄土之色也以順為德而效法乎健以為
功者牡之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也横散入肉絡
由腸胃而滲透肌膚毛竅爪甲無不入也積聚久則形質成依附腸
胃回薄曲折處以為栖泊之窠曰阻礙津液氣血熏蒸燔灼成病自
非剖腸刮胃之神妙孰能去之又豈合匀銖兩之丸散所能竅犯其
籓墻户牖乎夫牛肉全重厚和順之性潤枯澤槁豈有損也其方出

於西域之異人人於中年後行一二次亦却疾養壽之一助也

**附諸方**

霞天膏 韓飛霞方 此方即倒倉古法傳自西域有人指予投煎劑治痰而遂推廣之

黃牯牛一具 選純黃肥澤無病才一二歲者

右洗淨取四腿項脊去筋膜將精肉切成塊子大栗大秤三十斤或四五十斤於靜室以大銅鍋（無則用加新鐵鍋）加長流水煑之不時攪動另以一新鍋煑沸湯旋加常使水淹肉五六寸掠去浮沫直煑至肉爛如泥盡去渣却將肉汁以細布濾入小銅鍋用一色桑柴文武火候不住手攪不加熱水只以汁漸加如稀餳滴水不散色如琥珀其膏成矣（此節火候最要用心否則壞矣）大段每肉十二斤可煉膏一斤為度磁器盛之是名霞天膏也 用調煎劑初少漸多沸熱自然溶化 用和丸劑則每三分攙白麵一分同煑成糊或用煉蜜寒天久收若生黴用重湯煑過熱天冷水窖之可留三月

○廣按治痰之藥用南星半夏者所以燥之也用橘紅枳殼者所以散之也用茯苓猪苓者所以滲之也用黃芩黃連者所以降之也用巴豆附子者流通之義也用竹瀝瓜蔞者潤下之義也雖然實痰新痰之為病宜此而虛痰老痰之為病所不宜也夫老痰胴粘膠固於胷臆之間依附盤蓮於腸胃之處苟非霞天膏之浸潤流動而能從上從下以出之乎夫用霞天膏吐瀉以去痰積則不致虛損元氣所以為美也前條云倒倉法能治癩勞皷嗌夫癩勞皷嗌之症乃虛中有痰積也愚意治此四證於補虛藥中加霞天膏以去痰積必然安愈無入知此之妙訣也

# 論吐法 一百有二

**丹溪法**

○凡藥能升動其氣者皆能吐　如防風山梔川芎桔梗芽茶以生姜汁少許醋少許入薑汁搗服以鵝翎勾引之　附子尖桔梗芦人參芦瓜蒂藜芦砒不甚用　艾葉末茶此皆自吐之法不用手探但藥但湯皆可吐吐時先以布荅膊勒腰腹於不通風處行此法　一法用蘿蔔子五合擂入淅水濾過入清油白蜜少許旋半温用帛緊束肚皮然後服以鵝翎探吐其鵝翎平時用桐油浸皂角水洗晒乾待用　又法用鰕帶殼半斤入醬葱姜等料物煮汁先喫鰕後飲汁以鵝翎勾引即吐必須緊勒肚腹　又法苦參末赤小豆末各一錢薑汁調重則宜用三錢吐法取逆流水　益元散吐濕痰　白湯入鹽方可吐　人參芦煎湯吐虛病　凡吐先飲二椀隔宿桔梗半兩陳皮二錢甘草二錢煎湯凡吐不止齊者鮮藜芦瓜蒂　葱白湯亦鮮瓜蒂　甘草揔鮮諸藥白水揔鮮

充按三法中惟湯劑為難用有輕重卷舒之機汗下則一定法也故先生特註吐為詳者恐人不深造其理徒倉皇顛倒反有害於病耳今揔列諸法于此使臨病隨機應變披卷瞭然不必搜檢而便於施治也

**附諸方**

獨聖散　治中風痰迷心竅癲狂煩亂人事昏沉痰涎壅盛及治五痫心風等證

瓜蒂不拘多少

右為細末每服一錢以薤汁調下

二神散　治證同前

常山一兩　葱管藜蘆半兩

右為粗末用水一鍾煎二錢至七分食後温服

三仙散　治證同前

防風去芦　瓜蔕微火烘細剉研為細末各五錢

葱管藜蘆一兩

右為粗末每服三五錢以薤水二鍾煎七八沸去柤將柤又用薤水一鍾煎至半鍾却將先二鍾藥汁合作一處再熬五七沸去柤澄清放温徐徐服之不必盡劑以吐為度

四靈散　治證同前

瓜蔕一錢　人參蘆二錢　赤小豆

甘草各一錢半

右為細末每服一二錢或少至半錢量情與之食後薤汁調下

五玄散　治證同前

猪牙皂角不蛀者去皮弦炙　綠礬各一錢　明礬二錢　赤小豆一錢

葱管藜蘆五錢

右為細末每服半錢或一二錢漿水調下如牙關緊閉斡開灌之

六應散　治證同前

鬱金　滑石　川芎各等分

右為細末每服一二錢量虛實加減以薤汁調空心服

○凡服吐藥不須盡劑服藥後約人行十里未吐以温茶一鍾入香油數點投之良久以鵝翎喉内徐徐牽引得吐耶止未吐再投吐藥如服吐藥嘔吐不止者以麝香少許研水飲之即解

## 丹溪法

魚骨鯁用砂糖白炭皮末柴蘇葉滑石末和丸含口中津液嚥下骨自隨下

蕈毒用木香青皮等分作湯飲之

衆藥毒用五倍子二兩重研細用無灰酒調服毒在上即吐在下即瀉

## 鮮一切毒

用粉草五兩重細切微炒搗細量病人斟得多少酒取無灰酒一處研去相温服須臾大吐瀉毒亦隨去雖十分渴不可飲水飲水難救

鮮九里蜂用皂角鑽孔貼在蜂叮處就皂莢孔上用艾灸三五壯即安

天蛇頭　用落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫萁天蕎麥切碎用十分好醋濃煎先熏後洗

又方　用人糞雄黃泥搗之裹在患處即安

又方　用撲蛇燒為炭存性地上出火毒研為細末用香油調傅如洗只用井花水

天火帶　用白鱓泥炒研細香油傅之

又方　雉鷄毛及鵝毛燒灰傅之

治蜈蚣全蝎傷　方同九里蜂灸法

治一切蛇咬　用金線重樓水磨少許傅咬處又為細末酒調飲

又方　柏樹葉魚腥草皺面草草決明一處研細傅咬處佳

中牛馬肉毒　方同鮮一切毒法

狗咬　以紫蘇口嚼碎塗之

風狗咬　取小兒胎髮炒新香附野菊花研細酒調服盡醉

附諸方

救自縊法　三因方

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被卧之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按據胸上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰氣盛為難救爾

又法以一人兩手掩其口勿令透氣一人用手摩其頸痕兩時氣急則活

半夏散　三因方治魘寐卒死諸暴絕証

用半夏不拘多少湯洗七次為末每用少許吹入鼻中心頭溫者可治倉卒與藥急於人中穴及兩脚大拇指內醫申一雞葉各灸三五壯即活

救凍死法　經驗方四肢直口噤只有微氣者

用大盆灰煖以熏盛熨心上冷即換之日開氣出然後以粥清稍稍進之若不先溫其心便將火灸則冷氣與火爭必死

孫真人救溺水法　醫方大成

急解去死人衣帶艾灸臍中即活

救溺水法　經驗方

凡人溺水者救上岸即將牛一頭剝將溺水之人俯卧橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹中之水如醒以蘇合香丸之類或老薑擦牙若無牛以活人於長板凳上仰卧即令溺水人如

而法將肚相抵活人身上水出即活蘇合香丸見中風

治絞腸沙証　手足厥冷腹痛不可忍者醫方大成

以手旋溫水於病者臍穹內柏木有紫黑點處以針刺去惡紫血即愈

治骨鯁醫方大成

以野芋根洗淨搗爛如泥血用龍眼大如枚雞骨所傷以雞黃化下

如被魚骨所傷以魚汁湯化下

治一切骨鯁醫方大成

用金鳳花子嚼爛嚥下無子用根亦可

治魚骨入喉百一選方

縮砂　甘草各等分

右為末以綿裹少許嚥之旋旋嚥津久之隨痰出出

金鉤釣食丸　治諸鯁

用歲靈仙根不拘多少以好米醋浸一二日晒乾為末醋糊為丸如梧桐子大每服一丸或二丸半茶半湯下如要吐轉用沙糖銅青為末半匙滴油一二點同茶湯調服即吐出原物如藥性來遲令患人兩手伏地用清水一盆以鵝翎口中攪探即吐出於盆內

又方　治魚刺并骨鯁在喉內

用山查樹獨根向下者與玉簪花根同搗取自然汁用匙或竹筒盛汁送入口內不可着牙着牙皆化

太乙神丹　一名追毒丹　又名紫金丹

雄黃一兩　文蛤一名五倍子槌碎洗淨焙三兩　山茨菰去皮洗淨焙二兩

紅芽大戟去皮洗淨焙乾一兩半　千金子一名續隨子去殼研去油取霜一兩　硃砂五錢

射香三錢

右除雄黃硃砂千金子射香另研外共餘三味為細末却入前四味
再研勻以糯米糊和劑杵千餘下作餅子四十箇如錢大陰乾治一
切醫所不療之疾毒藥蠱毒瘴氣狐狸鼠蓐惡菌河純等毒喫死牛
馬肉毒蛇犬惡虫所傷中惡瘟疫傷寒結胸發狂纏喉諸風癮疹赤
腫丹瘤生薑薄荷汁入井花水磨服　大人中風諸痼用酒磨服
小兒急慢驚風五疳八痢一餅作五服入薄荷一葉同井花水磨服
牙關緊者塗之即開　癰疽發背疔腫一切惡瘡用井花水磨服及
塗患處未潰者覺痒立消　頭疼用酒入薄荷同研爛以紙花貼太
陽穴上立效　体實者一餅作二服体虛者一餅作三服凡服此丸
但得通利一二行其效尤速如不要行以米粥補之　若用塗瘡立
消　孕婦不可服

解毒丸　三因方　治誤食諸毒草并百物毒救人於必死

枳藍根干者四兩　貫衆去土一兩　青黛別研　生甘草各二兩
右為末蜜丸如梧桐子以青黛別為衣如稍覺精神恍惚惡心即是
誤中諸毒急取藥十五丸爛嚼新汲水下
青黛雄黃散　三因方　凡中毒及蛇虫咬傷即服此藥乃令毒氣不得聚
上好青黛　雄黃各等分
右為末新汲水調服二錢
礬茶散　濟生方　治中諸物毒
晋礬　建茶各等分
右為末每服二錢新汲水調下得吐即效未吐再服
丹砂丸　濟生方　治蠱毒
雄黃別研　硃砂別研各半兩　藜蘆略炒　鬼臼　巴豆去殼心膜油各一錢半
右為末蜜丸如大豆每服三丸空心乾姜湯下當轉下惡物并蠱等

如煩悶後以鴨為羹食之

雄麝散 濟生方 治五種蠱毒

雄黃末　麝香末各等分

右取生羊肺如指大以刀開內果藥吞之

又方　治蠱毒

用升麻末三錢溪水調服

又方　治中毒下血者

用蝟皮燒為灰細研以水調下二錢日進三服立愈

又方　治五種蠱毒

以馬兜鈴根三兩搗篩分為三貼用一貼以水一大盞煎至五分去滓空心頓服當時吐蠱出未快再服之以快為度

○袖珍方云蠱之為毒醫書所載雖有數種而中土少見之今古相傳多是閩廣深山之人於端午日以蛇蝨蚣蝦蟇三物同器貯之所其自相食啖候一物獨存者則謂之毒欲害其人密取其毒於酒食中啖之若中其毒者令人心腹絞痛如有虫咬吐下血皆如爛肉若不即合食人五臟即死然此毒中人有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則其毒流注於傍人亦成蠱注人抵驗試蠱毒之法令病人咳唾水中沉者是毒浮者非也或含一大豆其豆胀皮脫者蠱也豆下脹皮不脫又非也又以鴿皮至病人卧下勿令知覺病甚者是否則非也治療之法必須審而後行試而後可令人凡有積聚脹滿之病類乎蠱者便以為蠱尤為非也世說閩廣深山之人專有以蠱行毒於人者若欲知其姓名呼喚將云其病自愈又一說病者若能知元中毒是何物終身不服此物其毒亦不復作雖相傳知此供未之見謹用載之以備博覽

鮮砒毒百一選方

漢椒四十丸粒　黑豆十四粒　烏梅二箇打碎　甘草節一寸炙之

右㕮咀用水一碗煎至七分溫服

又方百一選方　鮮砒毒

白扁豆　青黛　甘草各等分　巴豆一錢去殼不去油

右㕮咀為末以沙糖一大塊水化開調一大盞飲之毒隨利去即服

五苓散之類五苓散見中暑類

中砒毒醫方大成

以地漿調鉛粉服之豆鮮豉汁又佳

鮮砒毒經驗方

用早禾稈燒灰新汲水淋汁絹帛濾過冷服一椀毒從利下即安

又方用花水調水粉吞之或黑豆擣水服皆可

鮮砒毒鼠莽毒醫方大成

用旋刺下羊血或雞鴨血熱服效　又有用烏桕根擂水亦好

鮮鼠莽草毒

用大黑江豆煮汁服之如欲試其驗先用鼠莽草葉以豆汁澆其根從此敗爛不復生矣

又方　鮮鼠莽毒

用枯過明礬同極等好茶末少許新汲冷水調服令人用之累效

鮮諸毒醫方大成

用玉簪花根擂水服

又方　鮮諸毒醫方大成

用黃連甘草節水一椀煎服

治食河豚魚中毒醫方大成

一時用治倉卒無藥急以清油多灌之使毒物盡吐為愈

中烏頭天雄附子毒醫方大成

用大豆汁解　遠志防風棗肉飴糖並能解

中巴豆毒醫方大成

以黃連大豆菖蒲汁並解之

解砒毒及巴豆毒經驗方

用藍根沙糖二味相和擂水服之或更入薄荷汁尤妙

治中諸藥毒百一選方

生甘草　黑豆　淡竹葉各等分

右㕮咀用水一椀濃煎連服

解一切菌毒百一選方

掘新地窟以冷水於內攪之令澄清取飲之即解謂之地漿

又方　解食野菌中毒

用耳草不拘多少以麻油一盞煎數沸冷服其毒即解

治毒蛇惡犬蜈蚣蝎子咬傷

細辛　白芷各二錢　椎黃一錢　射香少許

右為末以好酒調服一錢

治一切蛇虫作傷百一選方

用貝母為末酒調令病者盡量飲之少頃酒自傷處為水流出候水盡却以藥滓傅瘡上即愈

治蛇虺蜈蚣咬傷百一選方

用艾於傷處灸三五壯拔去毒即愈

治蜈蚣諸毒虫所傷經驗方

用清油灯心點灯以傷處於煙上熏之其痛即愈　又方用雞糞塗

之

一方 治蛇傷

雄黃 五靈脂 貝母 禾白芷 各等分

右為末每服二錢熱酒調服 又方用白礬以滚水泡洗其傷處

治惡蛇所傷 秘方

用青木香不拘多少煎服其痛即止

治蜈蚣咬 秘方

用香附子嚼擦患處立效

一方 治悞吞馬蝗腹痛 即水蛭

用田中泥為丸水吞下其虫必隨屎瀉出

治狗咬 有一選方

用杏仁去皮尖同馬蘭根研細 先以葱湯洗然後以此塗傷處

治犬咬傷 經驗方

用草蔴子五十粒去殼以井花水研成膏先以塩水洗傷處後以此膏敷貼 一方用虎骨屑傅

一方 治頻犬咬傷及經久復發者

雄黃 黃明者五錢 射香 五分

右研勻以酒調服二錢服後得睡為佳俟其自醒利下惡物再進一服即見效

定風散 治風狗咬傷

南星 防風 各等分

右為末先以口嚼漿水洗淨傷處用綿拭乾以藥摻上更不發無膿易瘥

又方 治風狗咬傷風 經驗方

此病雖為小可乃九死一生之病可急用班猫七箇去翅足為末酒調服於小便盆內見衣沫似狗形者為效如無再服七次無狗形亦不再發也此方累試經驗

又方　治風狗咬傷 秘方

用班猫七箇去翅以糯米一撮炒黃去米不用將班猫研為細末麵糊丸如菉豆大每服七丸溫酒下

又方　治顛犬所傷 醫方大成

用班猫大者二十一隻去頭翅足用糯米一勺先將班猫七隻入米內於微火上炒不令米赤去此班猫別以七隻丹於前米內炒令班猫色變後去之又別用七隻如前法炒以米出青烟為度去班猫不用以米研為粉用冷水入清油少許空心調服須臾又再進一服以小便利下惡毒為度如不利再進一服利後肚腹疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可不宜便食熱物

又方　治風犬傷 經驗方

隨用蝦蟆後兩腿搗爛酒調服或醋亦可先於頭頂上拔血髮二三根小便內見衣沫

又方　治風狗咬傷 秘方

用葱白心四十九根搗爛如膏用生蜜一同調和用濕筒兒盛放用紙封一七日如有人被傷用此膏貼傷處瘡口上七日又用葱白皮封着如瘡口大再換膏子貼共二七日切忌諸般葷腥一百日外用消風散一錢用熟犍猪肉七片葱白七莖蜜一小匙和撲再入原煮猪肉汁泡使葱白熟方可患人熱食小兒用肉七小片消風散一錢蜜半匙煮服消風散 方見頭風類

# 十危病方 一百有四　新增

附諸方

華陀十件危病方 經驗方

漢神醫華陀字元化嘗云人有危病急如風雨命醫不及須臾不救觀其橫夭實可哀憐予因暇日選十件危病處三十妙方以救橫夭詳録于後不可不知

## 一霍亂吐瀉

其證始因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐吐不止令人下瀉吐瀉併作遂成霍亂頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用藥遲緩須臾不救

吴茱萸　木瓜　食盐各五錢

右三味同炒焦用磁罐盛水三升煑令百沸却入前藥同煎至一二升已下傾一盞隨病人意冷熱服之藥入即醒　如倉卒無藥用枯白礬末每服一錢用百沸湯點服　如無白礬只用盐一撮醋一盞同煎八分温服或盐梅酸鹹皆可煑服

## 二經喉風喉閉

其証先兩日胸膈氣緊出氣短促驀然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

巴豆七粒三生四熟生者去壳生研熟者去壳炒去油存性

僱黄皂子大明者研

鬱金一箇蟬肚者研為末

右三味研每服半字茶調細呷如口禁咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒　如無前藥用川升麻四兩剉碎水四椀煎一椀灌

服　又無升麻用皂角三錠槌碎授水一盞灌服或吐或不吐即安

三吐血下血

其証皆因內損或因酒色勞損或心肺脉破血氣妄行血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉蒸乾　人參培乾各一兩

右二味為末每服二錢入飛羅麵二錢新水調和如稀糊服　如無前藥用荊芥一握燒過蓋地上要出火毒碾如粉陳米飲調下三錢不過二服　如無荊芥用金底墨研如粉服三錢米飲下連進三服

四中砒霜毒

其証煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面口青黑四肢逆冷命在須臾

用黑鉛四兩磨水一椀灌之　如無前藥青藍兩握研井水調一椀灌之　如無藍用清油二升許灌服其毒即解　又無油掘地用水作漿濃吃一二椀土用黃色者佳

五尸厥

其証奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣出如雷鳴

焰硝五錢　硫黃二兩

右研如粉作三服每服用好舊酒一大盞煎覺焰硝起傾於盞內蓋着服如人行五里又一服不過三服即醒兼灸百會穴四十九壯臍下氣海丹田三百壯身溫止　如無前藥用附子七錢重炮熱去皮臍為末分作二服用酒三盞煎一盞服　又無附子用生姜自然汁半盞酒一盞同煎令百沸併灌二服仍照前灸

六中忤中惡鬼氣

其証暮夜或登廁或出郊野或遊冷屋或行人所不至之地忽然眼

見鬼物鼻口吸着惡鬼氣驀然倒地四肢逆冷兩手握拳鼻口出清血性命逡巡須臾不救此証與尸厥同但腹不鳴心腹俱煖凡中惡驀然倒地切勿移動其屍即令親戚衆人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香蘇合香樟木之類直候醒記人事方可移歸

麝香 末五錢 硃砂 各二錢半

右為末每服二錢井水調下 如無前藥用雄黃末服一錢煎桃枝葉湯調灌 又無雄黃用故汗衣或觸衣汗衣者着在身上多時久遭汗者佳觸衣者久着內衣襯衣也婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調下

七脫陽

其証多因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不省人事或傷寒新瘥誤與婦人交其証小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽証須臾不救先以葱白數莖炒令熱熨臍下次用

附子 一枚重一兩剉八片 白术 乾姜 各半兩 木香 二錢半

右四味各研末用水二椀煎八分椀放令冷灌服須臾又進一服令滓併服 如無前藥用桂皮二兩剉酒二升煎二升分作二服灌之

又無桂皮用葱白連鬚三七根細剉沙盆內研細用酒五升麥奄二升分作二服灌之陽氣即回先用炒鹽熨臍下氣海勿令氣冷

又無葱白用生姜二七片亦好依前法服

八鬼魘鬼打

其証初到客舍館驛及久無人居冷房牀中魘鬼物魘打但其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒此乃鬼魘也不救即死

牛黃 一錢 椎黃 一錢 硃砂 半錢

右研為末和勻每挑一錢床下燒次挑一錢酒調灌之 如無前藥

用桃柳枝東邊者各折七寸煎湯灌下　又無桃柳枝用龜心上搥碎末服二錢开水調灌更挑半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中次并灸兩脚大拇指內離甲一韭葉各灸七壯

## 九孕婦逆生

其証孕婦欲產時遇腹痛不肯舒伸行動多曲腰眠卧忍痛其兒在腹中不得轉動故脚先出謂之逆生須臾不救子母俱亡

烏蛇退　條　蟬退十四箇　血餘胎髮一錢

已上各燒灰服二錢酒調下併進二服仰卧霎時兒即順生　如無前藥用槐子二七粒并井花水吞下　又無槐子用小繡針於兒脚心刺三五針急用鹽少許叅脚心刺處即時順生子母俱活

十胎衣不下惡血奏心

其証心頭迷悶胎衣上逆衝心須臾不治其母即亡

乾漆五錢為末　大附子一枚炮去皮臍為末

已上用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味為丸梧桐子大每服三十丸淡醋湯吞下須臾又進二服胎衣立下此藥可預先合下妙

如無前藥用赤小豆一升炒過用水三升煮二升去豆取汁溫服其胎衣立下　又無豆用婦人自己手足指甲燒灰酒調須臾又進一服更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下妙

# 備用要方

一百有五　新增　出明醫雜著

## 附諸方

夏月傷暑發熱汗大泄撅氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也服後方

人參一錢　黃耆一錢蜜炙　麥門冬一錢去心　黃連五分炒　黃柏三分

白术一錢二分　白芍藥一錢　甘草五分炙　陳皮一錢　白茯苓一錢
香薷七分　知母七分

右用水一鍾半生姜三片煎七分食前温服

夏秋暑熱因熱過飲食冷物茶水傷其內又過取涼風傷其外以致惡寒發熱胃脘飽悶飲食不進或兼嘔吐泄瀉此內外俱傷寒冷也

人參一錢　白术一錢半　乾姜一錢炒紫色　甘草五分炙　厚朴一錢姜水炒
陳皮一錢　羌活一錢　枳實一錢　白茯苓一錢

右用水二盞生姜三片前至八分食前温服

夏暑若在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之免中暑霍亂泄瀉劇疾等證

人參一錢二分　麥門冬一錢去心　五味子十粒杵碎　白术一錢半　白芍藥一錢炒
甘草五分炙　知母二分炒　白茯苓一錢　黄芩三分炒　陳皮七分

香薷七分

右用水一盞半生姜三片前至七分食前温服

人遇勞倦辛苦用力過多即服後方二三服免生內傷發熱之病此方主於補氣

黄耆一錢半蜜炙　人參一錢　甘草五分炙　五味子二十粒杵碎　麥門冬一錢半
陳皮一錢　白术一錢　勞倦甚加熟附子四五分　前法同上

人遇勞心思慮損傷精神頭目眩昏心虛氣短驚怪煩熱即服後方補血為主

人參一錢二分　五味子十五粒　當歸酒浸一錢　麥門冬去心一錢　白芍藥炒一錢
山梔子五分炒　茯神一錢去心　酸棗仁一錢炒　生地黄五分酒洗　甘草五分炙
陳皮五分　川芎五分

右用水一盞半生姜三片煎至七分食前温服

## 體氣 一百有六 新增

**丹溪心法**

○狐臭用硇砂蜜陀僧明礬銅青白附子夜砂為末先以皂角水洗一三次後傅上不過三次全好 又方加黃丹水銀用白梅肉為丸擦之

又方飛黃丹蜜陀僧枯礬以蒸餅蘸藥擦之

**附諸方**

田螺散 治體氣 患此疾者耳內有油濕是

用大田螺一枚水中養之俟蠶間以巴豆一粒去殼將針挑巴豆放在內取去拭乾仰頓盞內夏月一宿冬月五七宿自然成水取搽腋下絕根 一方先用臙脂搽腋下其出狐臭之處黃色就將前說巴豆田螺去蠶擁於狐臭之上綿帛勒緊其狐臭從大便出則絕根矣

一方

用熱蒸餅一箇擘開作兩邊掾蜜陀僧細末一錢急夾在腋下暑時少時候冷棄之除根

## 汗瘢 一百有七 新增

**附諸方**

一方 治汗瘢紫白色者

右用白附子硫黃各等分為細末以茄帶蘸醋粘末擦之

又方

用夏枯草濃煎水日洗數次

肥皂丸方 去白瘢黑黯白癜諸般瘡痕令人面色好

白芷 白附子 白殭蚕 白芨 猪牙皂角用
白蒺藜 白歛 草烏 山柰 甘松
白丁香 杏仁 豆粉各二兩 輕粉 蜜陀僧各半兩
孩兒茶三錢 肥皂去裏外皮筋并子只要淨肉一茶盞 樟腦半兩

右先將淨肥皂肉搗濾用雞清和晒去氣息搗各藥為末同肥皂雞清和為丸

一方 點疔塗瘤去痣

人言一錢 椎黃一錢 巴豆一箇 蟾酥二分

右為細末將瘡口用針撥開以藥點上如貼瘰癧瘡去蟾酥用輕粉

## 烏髭髮一百八方 新增

附諸方

犀皮膏御藥院方 治髭髮乾燥能令潤澤

小麥麩半斤 半夏湯洗 沉香半兩 生姜兩和皮

右用水一椀生姜一兩和皮細切同煎去滓取清汁入腦麝少許攪勻洗髭髮自然潤澤

洗髮菊花散

甘菊花 蔓荊子 乾桑葉 川芎 白芷
細辛去苗 桑白皮去黃粗皮生用 旱蓮根莖花葉各一兩

右㕮咀每用藥二兩浆水三椀煎至二椀去滓洗髮

三聖膏御藥院方 治髭鬚脫落能令再生

黑附子 蔓荊子 柏子仁各半兩

右為末烏鷄脂和搗研乾置瓦合內封固百日取出塗在髭髮脫處三五日即生自然光壯不脫

巫雲散 御藥院方 治髮鬚黃白不黑

膽礬　五倍子　百藥煎　青胡桃皮　酸石榴皮　訶子皮　木瓜皮　猪牙皂角　何首烏　細辛各等分

右為末陳蜜丸如錢大常於木炭內培養勿得離灰如要烏髭髮時用熱酒化開塗髭髮上好熱醋亦可

一方　生姜半斤　生地黃半斤各洗淨研自然汁留滓

右用不蛀皂角十莖去黑皮并筋將前藥汁蘸皂角慢火炙黃用藥汁盡為度前藥滓同入罐內用火煅存性為末用鐵器盛藥末三錢湯調停二日臨睡將藥離汁髭髮即黑

烏鬚方

訶子皮五分　百藥煎上分　白芨五分　皂礬二分半　硃砂一錢一分研淨者用好醋浸過一上沸起晒乾用好醋少許慢火炮砂二三遍起紫色為度

右各搗為末用好醋調勻如爛泥稀節至晚調塗鬚上勿濟却用青菜葉預先用久炷軟包鬚上再加油紙護包却用手帕或用絹包裹令緊勿令透風正過一夜至清晨解脫用肥皂角洗去即黑極妙用核桃肉油潤之如連肌肉黑了用黑豆粉白布一擦即去

黑鬚散 天生至寶

官粉　真蛤粉　黃丹　密陀僧各二錢　石灰一錢二分

右為細末水調搽上如乾水洗去藥核桃油潤之

華山處士摘鬚髮白口　每日辰時面東摘

正月初四　十七　二月初八　二十　三月初八　初十　十二　四月初三　十六　十八　十九

五月十一　十六　六月初四　十四　十七
七月初三　初四　十八　八月十五　十九　二十
九月初二　初四　十五　十月初七　十二　二十二
十一月十五　十七　二十　十二月初七　十六　三十

旱蓮花　没石子　荷葉　活猪鬃

各等分先將猪鬃鐵銚內炒次將餘藥並炒令焦黑存性為末以柳
枝自然汁調少許拔白即蘸入藥以柳枝蘸藥妙不可言

烏髭髮方

用大水蛭一箇放磁硯中餓一七將水蛭洗淨用白毛烏骨雄鷄血
以好清煙京墨磨濃傾泉胸內任水蛭吮飽將針刺破水蛭流出血
汁將髭髮留根二分其汁浸漬入內髭髮一年茂黑不退且柔軟不
損妙如

一方

五倍子炒黑色青綿布包裹鄉跟踏成餅子三錢　銅末銀鍋內煅成灰六分
白礬枯三分　訶子皮三分　硇砂一二分　細辛三分
右各為細末對和一處次用石榴皮一箇烏梅三箇細茶一撮水二
盞煎至七分去查用磁茶盞盛將前末藥汁納放鍋內重湯煮藥至
皺面取起至晚間用抿子蘸藥刷上次早溫水洗臉鬚髮如漆

又方

五倍子用桿杖在板上桿為蒙豆大小堰吹揀去虫窠粗滓用新
砂鍋內炒黑色成稀粥白烟出時為度用青布一塊水濕了包倍子稀粥撮住用脚跟踏良久冷定取出成餅擘破看查純黑色好間黃色不好縱染亦不上色每次用三錢二分為極細末五倍子餅旋取為末如都為末放二三日亦不上色
銅末五分用打銅器上起薄皮研為細末用水研淘五六次澄去泥滓只用淨末如畫匠淘顏色一般
白礬五分　硇砂四分　没石子一分半

共為極細末用煮烏梅水調和如稠糊捺時臨晚先將鬚髮用菉豆粉和水洗再用減水洗如無減水用淋灰水洗只要洗去油膩仍將白鬚用礬水洗過然後揉前藥勻遍方纔上色

○已上諸方外傅之劑

駐顏小丹煉方 韓飛霞方 此有古方主烏鬚不驗方外一衲報一煉法

茯神四兩去木 赤石脂紅潤五色者炒火煅存性四兩 赤砂墻壁鏡面精神者佳水飛一兩

滴乳香二兩好 川椒二兩淨先以炭燒黃土地通紅掃淨 草研 置椒于上以瓦缶蓋之冷為出汗

右五味為細末以人乳和稀劑入鵝鴨彈殼內糊紙封固加以絳袋令體潔婦人帶于胸乳之間四十九日旦夕不離取出乾透則成否則壞再研用棗肉和丸如菉豆大每日空心人乳送下或人參麥門冬湯代之臨時酒下亦可 凡心血不足怔忡健忘等疾皆宜

一方 前藥一味各一兩用雞彈二箇去清黃只將乳砂乳香各裝一彈內用紙糊七層以青絹袋盛之令精壯婦人懷於肚上乳砂懷三十五日乳香懷四十九日取出各為細末棗肉為丸用庚申甲子之夜幽靜處修合忌婦人雞犬見之每日清晨空心好酒服三十丸至一月外加至四十九服至十次鬚髮自然發黑百日通稍發黑

詩曰遐齡萬壽丹服食魂魄安養藥雞抱邪日期要週全修合宜深室一切人勿觀甲子庚申夜為丸不見天一返增六十二返百廿年服藥非凡骨壽同天地間秘之深秘之玄之又更玄

一秤金

熟地黃二兩 甘州枸杞 蓮蕊 槐角子去黑皮俱用酒浸晒乾各三兩

沒石子一兩 人參 木香各五錢 薄荷三兩一半藥一半為衣

右為細末煉蜜為餅鑿棋子大每日空心嚼化一餅日進三餅久之鬚髮皆黑凡酒浸者春秋三日夏一日冬六日

七仙丹　此藥補心腎注顏容黑髭髮之聖藥

何首烏（酒瓜瓣者九蒸九晒四兩）　人參（去芦二兩）　生地黄（二兩酒洗）　熟地黄（二兩酒洗）

麥門冬（去心二兩）　天門冬（去皮心二兩）　小茴香（二兩炒黄色秋冬用）

白茯苓（去皮二兩春夏用）

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸嚼爛好黄酒送下塩湯亦可或丸如梧子大每服五十丸空心酒送下亦可忌三白房事合時勿犯鐵器有奇效三白者葱蒜與蘿蔔也

治菴心腎虛　補心腎烏髭髮　方見補損

○已上諸方內服之劑

駐容顏（一百有九　新增）

附諸方

麝香湯（百一選方）

木香　丁香　檀香　沉香　人參

甘草（各一兩）　桂郎（五錢）　白茯苓（去皮一兩）

右曰乾為末沸湯點服　此藥香能散氣不可久服

橙子湯（百一選方）

橙子（十斤）　乾山藥（一兩）　塩（四兩炒）　甘草（二兩）

塩白梅（四兩打碎去仁不去核）

右先用五味一處爛研作餅子焙乾再碾為末百沸湯調

橄欖湯（百一選方）

白藥煎（三兩切片）　甘草（炙二錢半）　檀香　白芷（各五錢）

右為細末沸湯點服

桂香湯 百一選方

桂花 旋摘三升揀去蒂細研 乾姜 甘草

右為末同桂花拌匀入炒鹽少許磁器盛貯沸湯點服

洞庭湯 百一選方

用薄皮黃柑子二斤於盆內薄去核留汁生姜去皮半斤甘草四兩鹽三兩炒神曲麥芽各四兩拌和罨一宿以橘汁盡為度取出焙乾碾為細末沸湯點服

楊梅煎 醫方大成

取熟楊梅於瓦器內罨一宿即爛用絹袋搦出汁慢火熬成膏瓦罐貯每用入蜜少許沸湯點服

金櫻煎 醫方大成 能活血駐顏

霜時取金櫻子先除去刺洗淨然後去穰搗爛用酒下取汁絹帛濾過慢火熬成膏後入檀香諸香在內瓦罐收貯沸湯點服酒調

木瓜煎 醫方大成

用木瓜去穰子蒸過爛研如泥入鹽少許用瓦罐盛貯每用入蜜少許沸湯點服

梅花湯 醫方大成

旋摘梅花半開者溶蠟封花口投蜜罐子過時用之以匙挑花一二朵連蜜一匙沸湯斟服

集香湯 秘方

白豆蔻 剉一兩 縮砂 剉一兩 白檀 一兩不見火 人參 一兩切 胡椒 泡濃乾 古椒 半兩

甘草 剉三兩

右六味除檀香人參胡椒泡乾外將白豆蔻甘草白鹽四兩相合盒一宿次日就慢火上鐵器內炒乾不可火急恐作火氣與檀香三味

共碾細用磁器收湯點

分氣丸 秘方

糖毬子即山查 廿草二斤 香附半斤 藿香葉 甘松各一兩

右為末炒面糊丸如梧桐子大每服四五丸嚼茶清下不拘時服

補真丹

蜜半斤煉熟以綿濾去沫 酥油四兩 牛髓四兩 杏仁四兩去皮尖

核桃仁四兩去皮 山藥四兩 白茯苓各四兩為末

先煉蜜酥并髓勻後下諸藥拌勻或丸或散空心湯點服之

白砂丹

茯苓三五斤去黑皮為紙末須要堅實者其赤筋最損目亦宜去之

用水淘三五遍去筋膜用白砂蜜對分拌勻固封鐺口鍋內懸煮一晝夜出埋三日去火毒白湯調服補虛補心

瓊玉膏

生地黃一百六十斤取汁重羅濾過熬膏慮過二十四斤 棟人參二斤半去頭芦取淨末二十八兩

白茯苓四斤去皮蒸爛去水去筋絲晒乾取淨末五十六兩 白沙蜜十斤重湯煉熟去粗沫濾過入藥

右四味共入一處攪勻重羅濾過納磁罎內用蜜蠟打成綿紙固封罎口七八層懸於大鍋內用桑柴火煮三晝夜如水涸旋添熱水煮畢取出沉於井中水浸一晝夜出火毒取出又煮一時出水氣如遇夏熱放陰涼所在或埋地中其製時要靜處不聞雞犬婦人方妙藥成先用些祭過天地方可自用每日用黃酒納藥一二匙攪勻飲之不用酒白湯下日進二三服有能服過一料者活百餘歲白髮變黑老返童顏妙不可言矣

地黃煎

生地黃不拘多少取汁熬成煎

生麥門不拘多少取汁熬成煎

右二煎入作一處濾過入砂鍋內同熬一時四分入蜜一分再熬一時取出納磁罐內收之亦然前服瓊玉膏法服之

人參膏

治傷寒汗吐下後壞証及行倒倉法吐下後用此補之韓飛霞曰人參煉膏固元氣於無何有之鄉王道也又肺虛嗽亦宜入參膏補之如肺虛兼有火邪者入參膏與天門冬膏對服之妙

人參去蘆剉細如煎常藥法量水於銀石器內煎至一半查再煎兩度去查通以所煎汁文武火熬稠而止諸藥煎膏倣此

地黃膏

男婦血虛者用之

牛膝膏

男子腎虛及腰膝疼痛或痿弱者用之女人血虛及有血病者用之

八仙茶 韓飛霞方

粳米　黃粟米　赤小豆　黃豆

菉豆五者炒香熟各一斤　細茶一斤　芝麻淨五合

花椒淨一合　小茴香淨二合　乾白姜炮一兩　白鹽炒一兩

已上十一味俱為極細末和合一處外用小麥麵炒黃熟與前藥等分拌勻磁罐收之胡桃仁肉棗松子仁瓜仁白砂糖之類隨意加入每用二三匕白湯點服

長松酒 韓飛霞方

長松此酒中之聖藥產太行西北諸山似獨活而香用一兩五錢　黃芪酒製七錢　熟地黃酒浸八錢

生地黃酒浸七錢　蒼朮米泔浸去粗皮三錢　陳皮去白七錢

枳殼去瓤四錢　當歸身五錢　白芍炒四錢　天門三錢　半夏姜制三錢

厚朴姜制半兩　甘菊花五錢　麥門三錢　砂仁三錢　木香二錢
人參四錢　點椒二錢　酥七錢　黃柏五錢　黃連三錢
小紅棗去核八箇　胡桃仁去衣二錢　老米一掬　灯草五寸長一百二十根
一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒五罇煮一袋窨又用之

**枸杞酒** 韓飛霞方　治火症酒性熱三藥制之

枸杞五錢　黃連炒五錢　蒺藜一錢

右作一劑絹袋盛之用米五升造酒五尊用前藥煮窨又用之

**固本酒** 古卷方

生地黃懷慶新肥者竹刀切　麥門冬二味各一斤半用淡酒浸二日去心
熟地黃懷慶肥者竹刀切　天門冬二味各一斤半用淡酒浸二日去心煎并皮
遠人參四兩去芦頭　川牛膝去芦酒浸四兩
甘州枸杞二兩　川黃柏去粗皮剉酒炒褐色三兩

賈木香半兩　縮砂仁半兩
料分作十劑絹袋盛之每劑用擣米一斗擣醇酒納瓦罐壇中納藥於內煮熟窨又用之每次冷飲一二盃或三五盃為止

**仙家酒** 大能益心氣補腦髓治消渴勞怯及風火症老人尤宜

揀潔淨婦人乳每用一吸即以指塞鼻孔按唇貼齒而漱乳與口津相和然後以鼻內引上吸使氣由明堂入腦方可徐徐嚥下凡五七次為一度不漱而服者何異飲酪止于胃腸爾

**班龍宴** 韓飛霞方

養壯鹿一二隻每日煎人參一兩湯飲之渣和草料飼之每用預夜減食次晨空心以布縛鹿於床首低尾高用三稜針刺眼大皆前毛孔名天池穴銀管三寸許揷向鼻梁吃其血和以藥酒任意或八珍散加沉香煮者盡量月可一鹿無恙若有暑刺鹿血乘熱和酒一醉亦妙

小刀圭　此方所授與古方小異　韓飛霞方

用黃牛犢一隻未知陰陽者肥嫩純黃色先期辨後開藥料至臘月初八日或本月戊巳日宰取血撏毛留皮碎切臟腑分寸不遺用長流水大鍋煮至半熟下後項藥肉以半斤為塊每肉十斤入

人參二兩　伏苓去皮三兩　綿黃芪刮淨五兩　良姜去挑　肉桂去粗皮各半兩

陳皮去白一兩五錢　甘草去皮一兩　花椒去目一兩　白鹽臨滓對半八分　醇酒二斗上下

右各件同牛肉煮文武火旋添熟水常以八分為節牛肉爛如泥糜骨內之髓煎化入汁中漉去渣但存稠汁如稀餳待冷入密甕掘黃土坑埋齊甕口封固几早飡不拘何樣飲食加此每每調和人事勞苦并房慾之後以醇酒調服造酒至醇來之日加此甚嘉

北京大学古籍保护中心