

农村常见病 民间中草药验方手册

35310



广州市药品检验所
广州市医药卫生研究所 合编

前 言

毛主席教导我们：“中国医药学，是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”祖国的民间中草医药经验，相当丰富，千百年来，劳动人民同疾病作斗争实践中积累的草医草药治疗经验，对消除人民疾病痛苦，保障人民身体健康方面，作出了极重大的贡献。因此，必须根据毛主席这一重要指示，把这些宝贵的经验，努力发掘、提高及积极推广。

无产阶级文化大革命已经取得决定性的胜利，毛主席关于把医疗卫生工作的重点放到农村去的光辉指示更深入人心，农村医疗卫生事业正在日益蓬勃发展。为适应当前农村合作医疗制度的建立与巩固；和“赤脚医生”的培训与提高；以及当

前广大革命医务人员，积极贯彻毛主席《6·26》伟大指示，奔赴农村，为贫下中农服务，也很需要掌握一些民间草药治疗经验知识，以利因地制宜，就地取材，更好地开展农村防病治病工作。

广东及华南地区，地理和气候上得天独厚，草药资源极为丰富，这更需要把民间草医草药的经验加以总结、整理和推广，使取之不尽，用之不竭的草药资源更好地为人民服务。

这本小册子，就是根据上述目的要求，组织有关医药部门和草医草药人员，经过收集、整理、讨论，力求符合确有疗效，使用简便、药源广泛的方针，以农村常见病、多发病的治疗处方为依据，经过去粕存精选编而成。以供各地广大医疗卫生人员学习参考。

参加编订工作的有：广州市药材公

司，广州中药制药总厂，广州市荔湾区草药门诊部，荔湾区金花、清平卫生院等单位。

由于我们政治水平和业务知识有限，在编订工作中一定有错之处，请读者批评指正。

敬祝

毛主席万寿无疆

编者

一九六九年六月

目 录

上 编

内科病

1. 感冒 1
2. 咳嗽 6
3. 哮喘 12
4. 感冒 16
5. 中暑 18
6. 疟疾 20
7. 黄疸 24
8. 痹症（风湿痛） 27
9. 腹泻 33
10. 胃痛 38
11. 呕吐 43
12. 痢疾 45

13. 肠道寄生虫病（蛔虫、
蛲虫、钩虫、绦虫）……50

妇科病

1. 痛经……59
2. 月经不调……61
3. 白带……66
4. 妊娠呕吐……70
5. 产后腹痛……72
6. 产后血晕……75
7. 产后乳汁过少……77
8. 乳疮……80
9. 子宫脱垂……85

儿科病

1. 麻疹……89
2. 百日咳……95
3. 水痘……101
4. 疝气（腮腺炎）……103
5. 疳积……106

6. 遗尿..... 112
7. 夏季热..... 113

外科病(包括皮肤病)

1. 跌打损伤..... 116
2. 汤火烫伤..... 120
3. 蛇咬伤..... 123
4. 蜈蚣咬伤..... 126
5. 蜂刺伤..... 128
6. 皮肤外伤出血..... 129
7. 湿疹..... 132
8. 风疹..... 134
9. 疖疮..... 137
10. 水田皮炎..... 139
11. 石硬..... 141
12. 鸡眼..... 143
13. 癣..... 145
14. 痔疮..... 146
15. 蛇头疔..... 148

16. 无名肿毒.....149

五官科疾病

1. 暴发火眼..... 151
2. 中耳炎..... 155
3. 鼻出血..... 158
4. 白喉..... 160
5. 咽喉肿痛..... 162
6. 扁桃腺炎..... 165
7. 牙痛..... 167
8. 喉头骨鲠..... 170
9. 眼偷针..... 172

下 编

草药品种介绍

一 画

1. 一枝香

二 画

2. 九里明

3. 九里香

4. 丁癸草

5. 七叶一枝花

6. 入地金牛

7. 了哥王

三 画

8. 三 稔

9. 三星草

10. 土三七

11. 土牛七

12. 土荆芥

13. 土加藤

14. 山芝麻

15. 山白芷

16. 山紫苏

17. 山海螺

- | | |
|----------|-----------|
| 18. 山 橙 | 19. 山大刀 |
| 20. 山橘叶 | 21. 山菩提 |
| 22. 大茶药 | 23. 大 青 |
| 24. 大风艾 | 25. 小飞扬草 |
| 26. 小金牛草 | 27. 小叶双眼龙 |
| 28. 千斤拔 | 29. 千斤红 |
| 30. 广地丁 | 31. 马鞭草 |

四 画

- | | |
|---------|---------|
| 32. 水杨梅 | 33. 水胡满 |
| 34. 水蓼衣 | 35. 水翁花 |
| 36. 火炭母 | 37. 火秧籐 |
| 38. 木棉树 | 39. 木 贼 |
| 40. 木鳖子 | 41. 木芙蓉 |
| 42. 五月艾 | 43. 五指柑 |
| 44. 五爪龙 | 45. 牛大力 |
| 46. 牛奶树 | 47. 凤仙花 |
| 48. 凤凰藤 | 49. 天南星 |

50. 文殊兰

51. 毛麝香

52. 井栏青

52. 87

52. 87

五 画

53. 白鹤藤

新

54. 白玉兰

55. 白花茶

56. 白花丹

57. 玉叶金花

58. 玉芙蓉

59. 半枫荷

60. 半边旗

61. 半边莲

62. 石楠藤

63. 石仙桃

64. 龙脷叶

65. 布渣叶

66. 瓜子菜

67. 仙鹤草

68. 田基黄

69. 东风桔

六 画

70. 地胆头

71. 地 稔

72. 羊蹄草

73. 过岗龙

74. 白扣草

75. 如意草

76.安石榴

77.百部

78.吊兰

79.灯笼草

80.老鼠拉冬瓜

七 画

81.谷精草

82.谷木

83.还魂草

84.沙姜

85.阴香

86.车前草

87.何首乌

88.杜衡

89.豆豉姜

90.走马箭

91.旱莲草

八 画

92.金樱子

93.金盞银盘

94.金丝草

95.金花草

96.金沙藤

97.金钱草

98.金银花

99.爬山虎

100.爬墙虎

101.狗贴耳

102. 狗肝菜

104. 知羞草

106. 青 蕒

103. 虎耳草

105. 使君子

九 画

107. 香花菜

109. 独脚乌柏

111. 独脚金

113. 柚树寄生

115. 墨色草

117. 红丝线

119. 珍珠草

121. 盆上芫茜

123. 虾钳菜

108. 香 附

110. 独脚球

112. 茅 根

114. 枸杞根

116. 扁 豆

118. 孩儿草

120. 苦 楝

122. 葵 黄

十 画

124. 乌 药

126. 穿心莲

125. 乌 柏

127. 穿破石

128. 倒扣草

130. 桂木干

132. 益母草

134. 草决明

136. 盐霜柏

129. 夏枯草

131. 射干

133. 鬼羽箭

135. 臭屎茉莉

十一画

137. 猪笼草

139. 岗稔

141. 猫屎草

143. 梧桐

145. 贯众

147. 细叶七星剑

149. 淡竹叶

151. 槲子

138. 猪鬃稔

140. 岗梅根

142. 崩大碗

144. 鱼藤

146. 望江南

148. 紫苏

150. 救必应

152. 蛇泡蕨

十二画

153. 黄花菜

154. 黄瓜仁草

165. 黄花母 166. 蛤蟆草

167. 黑老虎 168. 犁头草

169. 番石榴叶

十三画

160. 鸡血藤 161. 鸡屎藤

162. 鸡骨草 163. 铁包金

164. 铁线草 165. 枫香寄生

166. 枫 香 167. 狮子滚球

168. 阔洋花 169. 路边菊

170. 葫芦茶 171. 辣 蓼

十四画

172. 宽筋藤 173. 酸味草

174. 蒲公英 175. 苍 耳

176. 莞 荑 177. 豨签草

十五画

178. 蔓荆子 179. 寮刁竹

十六画

- | | |
|-----------|----------|
| 180. 鸭跖草 | 181. 鸭舌草 |
| 182. 鸭脚木皮 | 183. 磨盘草 |
| 184. 篱 栏 | |

十七画

185. 藜苋菜

十八画

- | | |
|-----------|----------|
| 186. 鲫鱼草 | 187. 韩信草 |
| 188. 鹅不食草 | |

十九画

189. 雾水葛

廿四画

190. 麝不泊

内 科

感 冒

感冒又叫伤风，是由一种或多种病毒引起的呼吸道传染病，多在气温较低或天气突然变冷时发生。根据中医“辨证论治”的原则，一般可分为感冒风寒和感冒风热两大类。

【主要症状】

感冒风寒症状：喉痒，咳嗽，鼻塞，打喷嚏，流清鼻涕，并有头痛，四肢酸痛，面部和唇部有些淡白，无汗，不想喝水，而且多怕风吹，发热较轻一般在 38°C 以下。

感冒风热的症状：喉咙干燥，咳嗽，鼻塞，流黄色鼻涕。头部胀痛，有汗，口

干，想喝水，面部和唇部都有些潮红，且多有发热，不大怕风。

此外，还有由于感染了流感病毒而发生的流行性感冒（流感），一般多发于冬、春二季，且常在人群中广泛传播。流感症状轻微的与一般感冒相似。典型的流感患者除一般感冒症状外，其主要特征是起病很急，有畏寒或寒颤，体温迅速升高至 39°C 以上，并伴有较剧烈的头痛，全身肌肉痠痛、疲倦等。

【治疗方法】

一、感冒风寒：可选用下列处方之一治疗，

1. 葱白淡豉汤

适应症：感冒风寒、头痛、鼻塞，流清涕、微恶风寒。

处 方：葱白三条 薄荷二钱 食盐五分 淡豆豉三钱。

用法：用水一碗半煎取大半碗温服。

2. 葱白生姜汤

适应症：感冒风寒，头痛，无汗、鼻塞，打喷嚏，口中淡，咳嗽。

处方：葱白五条 生姜三片

用法：用水一碗半煎取大半碗温服。
服后盖被取汗。

二、感冒风热：根据症状选用下列处方治疗。

1. 一味豨签汤

适应症：感冒发热，恶寒，流清鼻涕，头痛。

处方：豨签草（又名感冒草）干用二两。

用法：用水二碗煎取大半碗服。有暑热的可加水翁花一两，芦根一两。

2. 一味黄皮叶汤

适应症：感冒风热，头痛，咳嗽，恶寒发热，周身骨痛。

处 方：黄皮叶 鲜用一两(干用五钱)

用 法：用水一碗半煎取大半碗温服。

说 明：本方用于预防流行性感胃也有效果。

3. 五腐汤

适应症：感冒发热，头痛，口渴，大肠湿热，肝火上升。

处 方：五指柑一两 腐不泊一两半，
岗梅根一两

用 法：用水三碗半煎取一碗服

4. 五指三花汤

适应症：感冒风热，发热，头痛，咳嗽。

处 方：五指柑叶五钱 路边菊五钱
如意花头五钱 黄花母五钱
金盏银盘五钱

用 法：用水四碗煎取一碗，乘热服。

5. 岗梅根汤

适应症：感冒风热

处 方：岗梅根一两 倒扣草五钱 黄
花猛一两

用 法：用水三碗煎取一碗服。

6. 一味如意花汤

适应症：感冒发热。

处 方：如意花根二两

用 法：用水四碗煎取一碗服。

7. 爬墙虎汤

适应症：感冒风热，发热恶寒

处 方：爬墙虎（全株）十二两 红枣
二两

用 法：用水六碗煎取一碗服

8. 芋莢汤

适应症：感冒风热，发热恶寒，头痛。

处 方：芋莢干四钱 倒扣草一两 如
意花根一两 木槿根一两

用法：用水四碗煎取一碗服。

9. 岗梅狗肝汤

适应症：外感高热，斑疹伤寒，温病大热。

处方：岗梅根一两 狗肝菜八钱 倒扣草一两 木槿根四钱 鸭脚皮四钱

用法：用水四碗煎至一碗服。

咳 嗽

咳嗽是一年四季都有发生的常见病，特别是在天气变化较多的时候，更容易发生。

引起咳嗽的原因虽很多，有因感受风寒的，有因感受风热的，也有由于其他原因引起的，但一般可分为“寒咳”和“热咳”两大类。

【主要症状】

寒咳的症状：鼻塞，流清鼻涕，咳嗽，痰多色白而稀，喉痒，没有口渴，面部和唇部淡白。

热咳的症状：咳嗽，无痰或有痰而难咳出，痰粘而稠，色黄，口唇及面部潮红，口干，鼻孔有呼出热气的感觉。严重的有咽喉痛，声音嘶哑，大便结，小便色赤等症状。

【治疗方法】

一、寒咳

1. 姜蜜茶

适应症：外感风寒咳嗽

处 方：生羌一两 蜜糖一两

用 法：先把生羌磨烂榨汁，羌渣再加水半碗调匀再榨。将前后二次榨出的羌汁混和煮沸，即离火加入蜜糖调匀，作一次缓缓饮下。一日可服二至三次。

2. 香花菜餐

适应症：风寒咳嗽。

处 方：鲜香花菜叶二至四两 豆腐适量 生葱二条

用 法：将香花菜叶及豆腐、生葱放入锅内同煎熟。作一次服，或以鲜香花菜叶四两与鸡旦一个同炒亦可。

3. 鹅不食草汤

适应症：寒咳

处 方：鹅不食草五钱

用 法：将鹅不食草捣烂，加入清水一碗半煮沸，即离火热浸五分钟，加入蜜糖或沙糖再煮沸溶匀后，一日三次分服。

4. 胡椒炖雪梨

适应症：老年日久寒咳。

处 方：雪梨一个 胡椒七粒

用法：将雪梨上端切开，挖一小洞，将胡椒放入洞内，然后再将切开的上段雪梨盖回洞口，以竹签插紧，放碗内隔水炖一至二小时，将雪梨取出吃肉。

二、热咳

1. 东风桔汤

适应症：疏风热，清肺热，解臃滞，治风热咳嗽。

处方：东风桔根一两 木槿根一两
红丝线五钱 布渣叶三钱

用法：用水四碗煎取一碗服。

附注：或单用东风桔根一两煎服亦可治风热咳嗽。

2. 坝王花汤

适应症：风热咳嗽

处方：坝王花（剑花）干用一两，瘦猪肉适量

用法：以坝王花与瘦猪肉同煲汤佐膳。

3. 一味吊兰根汤

适应症：肺热咳嗽

处方：吊兰根（硬叶吊兰）一两 冰糖一两

用法：用水二碗煎取一碗服。

4. 吊兰五爪猪肺汤

适应症：肺虚咳嗽

处方：吊兰根一两 五爪龙五钱 生羌三片 猪肺适量

用法：以上四味同煲汤服

5. 一味木槵子汤

适应症：肺热咳嗽、喉痛。

处方：木槵子（去壳）二至三粒

用法：捣烂，加水适量煎服

6. 木槵山桔汤

适应症：感冒咳嗽。

处 方：木槿根二两 山桔根二两

用 法：用水三碗煎取一碗。如属寒咳
可用本方加生羌五钱，冰糖煎
服。

注 意：孕妇忌服

7. 东风桔汤

适应症：外感发热，咳嗽。

处 方：东风桔根一至二两 马鞭草一
两 枇杷叶一两 蛇泡藕一两

用 法：用水四碗煎取一碗服。或单用
东风桔根一味煎服亦可。

8. 鲫鱼草汤

适应症：咳嗽痰多。

处 方：鲫鱼草（干）一钱 蜂房二至
三分

用 法：用水一碗半煎取大半碗服。

9. 一味蚌花汤

适应症：热咳

处 方：蚌花（干）二钱

用 法：用水二碗煎取一碗服。

10. 一味龙鬃叶汤

适应症：热咳。

处 方：龙鬃叶七至八片

用 法：用水二碗煎取一碗服，或加蜜枣数个同煎。

11. 红丝线汤

适应症：热咳。

处 方：红丝线一钱

用 法：用水二碗煎取一碗服。或加瘦猪肉适量，蜜枣数个同煎亦可

哮 喘

【主要症状】

哮喘是气喘中的一种突出的症候，多由反复外感、剧烈咳嗽逐步形成，或与遗传有关。往往在气温、气压变化较大时，

或过多吃生冷瓜果，或过度疲劳，或外感时，即引起发作。

哮喘是反复发作的，多在夜间突然发生。患者突觉胸闷，随即阵咳，呼吸困难，吸气短促，呼气长而不畅，发生喘鸣响声，这时只能坐起不能平卧，待咳出大量痰涎，才暂时缓解。发作持续的时间，短者数分钟，长者达1—2小时。在不发作期间则没有什么症状。

【治疗方法】

1. 哮喘烟丝

适应症：在哮喘发作时作止喘用

处 方：

一 方：闹羊花五两 毛麝香叶一两
生羌五钱（榨汁）

用 法：将闹羊花，毛麝香叶切成丝，再加羌汁混合均匀，炒至微黄。于哮喘发作时作卷烟吸

用，每次一枝。

二 方：闹羊花五两 烟叶一两

用 法：将闹羊花及烟叶切成丝，混合均匀，炒至微黄。于哮喘发作时作卷烟吸用，每次一枝。

2. 花生壳汤

适应症：实性哮喘，咳嗽，气紧，呼吸急促，胸部胀闷。

处 方：生花生壳二两 女贞子树叶五钱至一两

用 法：将花生壳、女贞子树叶同放锅中略炒，加入片糖一两，用水五碗煎取一碗半，一日三次分服。

注 意：如果是病久体虚，症见心累、气短、口唇发绀的虚性哮喘忌用。

3. 鹅不食草汤

适应症：哮喘。

处 方：鹅不食草二两 瘦猪肉一两

用 法：加水适量煲汤，一日多次分服
代茶；连服半个月。

4. 姜蜜茶（处方见咳嗽）

5. 山白芷汤

适应症：哮喘

处 方：山白芷四两 瘦猪肉二两

用 法：用水三碗半煎取半碗，一日三
次分服。

6. 七叶一枝花汤

适应症：肺癆久咳及哮喘。

处 方：七叶一枝花五钱，猪肺或鸡肉
适量。

用 法：加水适量煲汤服。

感 暑

感暑是在热天感受暑气而发生的病，特别是在露天烈日曝晒或室内高温环境进行劳动作业，身体过于劳累时，较容易发生。

【主要症状】

初起时精神疲倦，发热，出汗，口渴，头晕，头痛，心胸有烦闷感觉，小便短少而色黄赤。治疗以疏风解暑、清热止渴为原则。

【治疗方法】：根据不同症状选用下列处方治疗。

1. 水翁花汤

适应症：感暑发热

处 方：水翁花五钱 狗肝菜二两

用 法：用水四碗煎取一碗服

2. 三瓜汤

适应症：感暑发热，精神疲倦，出汗，口渴，头晕头痛，心胸有烦闷感觉，小便短而黄赤色。

处 方：丝瓜络一两 冬瓜皮（或仁）一两 西瓜皮一两

用 法：用水四碗煎取一碗半，一日二次分服，隔三小时服一次。

3. 一味金丝草汤

适应症：感暑发热，口渴。

处 方：金丝草二两

用 法：用水三碗煎取一碗半，一日二次分服。

4. 狗肝鲜莲冬瓜汤

适应症：感暑发热

处 方：鲜狗肝菜四两 鲜莲叶一块
生薏仁二两 老冬瓜（连皮、仁）半斤

用 法：用水十五碗煎取四碗，一日二

次分服。

中 暑

中暑是在热天于烈日曝晒或高温环境中，在高温和热辐射长时间作用下，由于体热放散困难，体温调节发生障碍而发生的病。

中暑的症状：初起头痛难受，烦躁不安或恶心呕吐，身热面红，体温高达 40° — 41°C 或更高，呼吸短促，甚至突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，汗出，四肢冰冷等。

【治疗方法】

对中暑病人，应迅速进行急救。首先将病人抬到通风荫凉的地方，平面仰卧，上半身垫高一些，把衣服和钮扣、带子解开，头部先用温水敷，接着再用毛巾或布块浸湿冷水敷胸部，勤敷勤换。昏迷的病

人，可针刺人中、十宣等穴进行急救。如清醒后无其他症状，可以鲜西瓜皮或冬瓜煎汤，酌量随饮，以解暑清热。如病人醒后有发高热等症状，可选用下列处方治疗：

1. 鲜西瓜一个，切开，随意吃多少。

2. 羽箭竹叶汤

适应症：中暑后发高热。

处方：鬼羽箭三钱 淡竹叶四钱

布渣叶三钱 鸭脚皮三钱

冬瓜仁四钱 西瓜皮四钱

用法：用水三碗半煎取一碗服。

3. 老麻叶汤

适应症：伤暑身热，大小便不利及暑月大便泄泻。

处方：老麻叶（黄麻）五钱 红糖适量

用法：用水二碗煎取一碗服，每天一服，连服二至三天。

疟 疾

疟疾，又叫发冷，打摆子，是由一种带有疟原虫的蚊子叮咬人体，把疟原虫带到人体血液里所引起的。疟疾有一定反复发作时间；如果每天发作一次的，叫“每日疟”；隔一天发作一次的叫“间日疟”；隔两天才发作一次的，叫“三日疟”。其中以间日疟较常见。如果发高热连续一两天还未退，或发热虽退但随又再发高热，则为“恶性疟疾”。

【主要症状】

初起时，病人的发热大多不规则，经过一段短时间后，出现疟疾典型发作的症状。患者先有些怕冷，打呵欠，跟着全身颤抖（阵发性的寒颤）约半小时后，寒颤消失，而体温升高至40℃左右，伴有头痛、面红，噁心，呕吐和全身疼痛，发热

持续 1—8 小时，然后全身出汗，体温下降，症状消失，但觉疲倦。整个发作过程约 6—12 小时。恶性疟疾患者在发病过程中，可能出现体温突然高升至 42°C — 43°C ，谵妄、昏迷等险恶症状，应加以注意。

【治疗方法】

根据不同症状选用下列处方治疗：

1. 了哥王汤

适应症：疟疾新起，寒战往来，头痛身痛，舌苔黄腻，大便秘结。

处 方：了哥王一两 黄皮树皮一两

用 法：用水八碗煎了哥王五小时，约一碗左右，（如水不足再加适量开水，以前用五小时以老汤度，因了哥王有毒，必须煎至小时以上才能破坏其毒性。）
黄皮树皮另用水二碗煎至一碗。两种药液煎好后分三次

服，每隔四小时服一次，每次均两种药液同时服用。

2. 倒扣草汤

适应症：疟疾发作有时，先寒后热，汗出。

处 方：倒扣草根 鲜用二至四两（干二两）

用 法：用水三碗煎取一碗，分二次服（发作前四小时，二小时服一次。如发作时间不定，则一日三次分服），连服三天。

3. 磨盘草根汤

适应症：疟疾慢性反复发作，症状较缓慢轻微者。

处 方：磨盘草根二至三两

用 法：同上倒扣草汤

4. 酸杨桃餐

适应症：恶寒发热，汗出，发作有时。

处 方：酸杨桃(五敛子)二两牛肉二两

用 法：将酸杨桃及牛肉切片，同放锅内煮熟淡食(不加盐)，连食二至五天。

5. 豆豉生羌外治法

适应症：新久疟疾，寒热往来，发作有时者。

处 方：淡豆豉一两 生羌一两

用 法：将两药同捣烂，于疟疾发作前一小时敷两手脉门处(用布带绑扎固定)，同时并可加灸大椎穴三壮(直接灸)

6. 白花螞蟥草外治法

适应症：疟疾，寒热往来，发作有时者。

处 方：白花螞蟥草一两 紫苏叶一两

用 法：共研末，以纱布包裹如花生仁大小，塞于鼻中。

黄 疸

黄疸，广东民间又叫“黄食”，它的特征是病人眼白、皮肤、指甲都呈黄色，小便亦多见黄色，一般是由于感受湿热或寒湿而引起。

【主要症状】

根据病者的体质和症状的不同，可分为“阳黄”和“阴黄”，但在临床上以“阳黄”较多，“阴黄”较少。

阳黄的症状：全身（包括皮肤、眼白、指甲）发黄，黄色鲜明，发热，口渴，口苦，腹满，右胁下胀痛，小便大多呈深黄色而短少。治疗以清热利湿为主。

阴黄的症状：全身发黄，黄色晦暗不鲜明，精神疲倦，懒说话，口不渴，头昏眼花，怕冷，饮食减少，大便稀烂或肚子胀，治疗原则以温运脾阳为主。

【治疗方法】

一、阳黄

1. 鸡骨草汤

适应症：肝胆郁热，脾胃困湿，全身发黄，头昏胁痛。

处 方：鸡骨草 田基黄 金钱草各一至二两

用 法：用水四碗煎取一碗服。每日服一次，连服三至四天。以后隔日服一次，至愈为止。

注 意：鸡骨草须注意把荚果拣出，荚果有毒。

2. 鸡骨环草汤

适应症：阳黄症口渴，便秘，全身桔黄，脉沉实者。

处 方：鸡骨草二钱 环草五钱

用 法：用水三碗煎取一碗服（或加瘦猪肉同煎亦可）连服五至六

犬。

3. 鸡骨金丝汤

适应症：阳黄症，全身发黄，黄色鲜明者。

处 方：鸡骨草三钱 金丝草三钱

用 法：用水三碗煎取一碗服。

二、阴黄

1. 鹰不泊汤

适应症：阴黄症全身发黄，黄色晦暗不鲜明者。

处 方：鹰不泊根一两 食糖一两

用 法：用水三碗煎取一碗服。

2. 山白芷汤

适应症：同上方

处 方：山白芷一斤 草决明四两

用 法：用水六碗煎取一碗服（如无草决明，单用山白芷一味亦可）

痹 症

痹症，是肌肉、筋骨、关节发生疼痛、红肿，四肢运动呆滞的病。包括部分风湿性关节炎、类风湿性关节炎和痛风等，俗称风湿骨痛。这病大都是由于感受风、寒、湿的邪气和感受热邪引起的。感受风寒湿邪而引起的，可以合而成为风寒湿痹；感受热邪而引起的成为热痹。

【主要症状】

风寒湿痹的症状：主要是身体四肢关节疼痛，或者有麻木、沉重的感觉，不红不肿，或肿而不红，疼痛的部位或固定于一处，或游走不定，天阴下雨或天气变动时疼痛更厉害，喜欢热敷和按摩，怕风或有轻微的发热，且常有口淡，食欲不振，小便清长等症状，治疗以活血通络，祛风去湿为主。

热痹的症状：主要是关节红肿热痛，喜欢冷敷，发热，口苦而干。严重的会发高热，口渴，精神烦躁不安，小便黄，大便结。治疗以疏风通络为主。

【治疗方法】

一、风寒湿痹

1. 半枫荷汤

适应症：风湿肿痛

处 方：半枫荷一两 千斤拔一两 豆豉羌一两 山白芷五钱 过江龙一两

用 法：用水六碗煎取一碗服。

2. 独脚球汤

适应症：风湿腰腿痠痛

处 方：独脚球一两 千斤拔一两 臭屎茉莉五钱 走马箭五钱 豆豉羌五钱

用 法：用水四碗煎取一碗温服。

3. 千斤马箭汤

适应症：风湿关节走痛，小便短赤。

处 方：千斤拔一两 走马箭一两 老
桑枝二两

用 法：用水四碗煎取一碗温服。

骨节红肿热痛者加土牛膝五
钱，独脚球一两，木棉根五
钱；清水六碗煎取一碗温服。

4. 鹰牛汤

适应症：风湿痛

处 方：鹰不泊一两 牛大力一两 千
斤拔一两 石楠藤八钱

用 法：用水四碗煎取一碗服。或加瘦
猪肉适量同煎。

5. 双眼龙汤

适应症：寒湿或风湿反复发作。

处 方：细叶双眼龙根一两（鲜用或干
用量同）

用法：将根切碎，用水酒各半共一
碗，慢火煎取半碗。一日三次
分服。

6. 豆豉羌汤

适应症：风湿筋骨痛，腰痛。

处方：豆豉羌二两

用法：用水二碗煎取大半碗，一次温
服。每日服二次（上、下午各
一次）。

7. 枫香寄汤

适应症：风湿反复发作，四肢痛痹，无
力高举。

处方：枫香寄五钱（干量）
鸡脚（或猪筋）适量。

用法：用水一碗，隔水炖三小时服，
每日服一次。

8. 二龙汤

适应症：风湿骨痛。

处 方：五爪花五钱 过江龙五钱 千斤拔七钱 鸡血藤八钱 土加藤五钱 豆豉羌五钱 半枫荷五钱

用 法：用水四碗煎取一碗服。

9. 豨签草汤

适应症：风湿骨痛

处 方：豨签草一两半 风沙藤八钱 牛大力七钱 菘筋藤五钱 走马箭七钱 桑寄生五钱 石楠藤五钱 路路通五钱 夜交藤五钱

用 法：用水五碗煎取一碗服。

10. 臭屎茉莉汤

适应症：风湿痛，脚气。

处 方：臭屎茉莉根二两

用 法：用水四碗煎取一碗服。或加鸡脚、猪脚等同煎。

11. 缸瓦礫湯

适应症：风湿关节痛，神经痛，腰痛。

处 方：缸瓦礫根二两 络石藤五钱
乌豆二两 猪骨适量。

用 法：用水六碗煎取一碗服。

12. 千斤拔湯

适应症：风湿痹痛

处 方：千斤拔二两 猪脚(或瘦猪肉)
适量

用 法：用水三碗煎取一碗服，或加宽
筋藤五钱，五加皮一两同煎。

二、热痹

1. 葛根瓜络湯

适应症：急性关节风湿，局部红肿疼痛，活动困难，或游走疼痛。

处 方：鲜葛根半斤 丝瓜络一两

用 法：用水五碗煎取一碗温服。

2. 山萹提湯

适应症：同上

处 方：山善提一两 蛇泡藕一两

用 法：用水五碗煎取一碗温服，或加
通草钱半同煎。

腹 泻

腹泻一般民间叫作“肚痢”或“痢水泻”。这种病一年四季都有发生，但以夏、秋两季发病较多。本病一般是由于吃了不干净的东西或吃了过量的刺激性的、粗糙不易消化的食物引起的，也有由于感受了风寒暑热引起的。因此，根据病人的体质和病因的不同，可以分为“虚寒泻”、“暑热泻”和“食滞泻”。

【主要症状】

虚寒泻的症状：大便次数多，白色，稀烂，或者纯是清水，或者粪中带有未消化的食物。小便清白，口不渴，腹痛作响，

怕冷，四肢疲倦无力，严重的有四肢冰冷和抽筋等症状。治疗以温中止泻为主。

暑热泻的症状：泻出的大便黄色，有腥臭气味，肛门灼热，腹部阵痛，痛一阵即泻一阵，很想喝水，小便短少。治疗以清暑解热去湿为主。

食滞泻的症状：泻出的大便中带有未消化的食物，有酸臭气味，肚子胀痛，泻后痛即减轻，不想吃东西。治疗以消滞化湿为主。

【治疗方法】

一、虚寒泻

1. 番石榴叶汤

适应症：虚寒泻

处 方：番石榴叶一两 白米一两

用 法：同炒至米转焦黄色，淬入水二碗半，煮取一碗半，一日二次分服。或用番石榴嫩叶心一

两，开水洗净后放入口中嚼烂，热开水送下亦可。

2. 火秧藟汤

适应症：急性胃肠炎，痾呕腹痛，胃气痛。

处 方：火秧藟茎（去皮）四两（或叶二两）白米适量。

用 法：将上两味同炒至微黄，用水五碗煎取一碗温服。

3. 风沙藤汤

适应症：风寒腹痛泄泻。

处 方：风沙藤一两 樟木子八钱

用 法：用水三碗煎取一碗服。

4. 樟木汤

适应症：水泻腹痛

处 方：樟木一两 猪鬃捻二两 半枫荷一两

用 法：用水四碗煎取一碗服。

5. 五爪龙汤

适应症：痾嘔腹痛。

处 方：五爪龙二两 半枫荷一两
穿心莲一两 龙胆草一两

用 法：用水四碗煎取一碗服。

6. 樟龙汤

适应症：虚寒腹痛下泻。

处 方：樟木一两 过江龙一两 米一
小撮。

用 法：上三味同放锅内炒至米微黄
色，泔水二碗煎取一碗服。

7. 生羌陈皮汤

适应症：脾虚泄泻，呕吐。

处 方：生羌、陈皮各二钱
炒米，百草霜适量

用 法：用水一碗煎取大半碗服。

二、暑热泻

1. 火炭母汤

适应症：湿热下痢腹痛。

处 方：火炭母一两

用 法：用水三碗煎取一碗服。

2. 白花茶汤

适应症：暑热腹痛泄泻

处 方：白花茶一两 金银花四钱

车前草六钱 鸡旦花三钱

用 法：用水三碗煎取一碗服。

3. 鸡旦花汤

适应症：湿热泄泻

处 方：鸡旦花一两 金银花六钱 车

前草六钱

用 法：用水三碗煎取一碗服。

三、食滞泻

1. 布渣叶汤

适应症：食滞腹痛下泻，胸闷作呕。

处 方：布渣叶五钱 五指柑叶五钱

生羌二钱

用法：用水二碗煎取一碗，一日二次分服。

如兼有吐泻的加火炭母五钱同煎。

胃 痛

胃痛，是指在上腹部心窝附近发生的疼痛。也有人叫作“心气痛”。胃痛的原因，多数由于日常饮食不注意，吃肥滞和不易消化的东西过多，或饮食没有定时定量和过饿过饱所引起。根据病因和症状的不同，可分为胃寒痛、胃热痛，胃气痛。

【主要症状】

胃寒痛的症状：痛时手足冰冷，呕吐酸水，口不渴，大便烂，小便清，面色青白，唇色淡，用手按在痛处或以热的东西敷上，痛可减轻。治疗以温中散寒为主。

胃热痛的症状：痛时作时止，但痛起

来的时候却非常剧烈，胃部里面有灼热的感觉，口干而想多喝水，且喜欢饮冷的，或者面红身热，大便秘结，治疗以清热镇痛为主。

胃气痛的症状：痛时自觉胃部象有气结成一块，以上腹部冲上心窝似的，胸部胀满难受，痛如针刺，痛时放屁，嗝气，甚至作呕，有时还要呼出一口大气，才觉松快一些。要等气散开了，痛才能止。治疗以行气止痛为主。

【治疗方法】

一、胃寒痛

1. 鸡骨香汤

适应症：胃脘痛胀不舒，嗝气频频，口淡无味，或呕吐酸水，体质与症候偏于寒者。

处 方：鸡骨香两半 黄皮树根两半
猪横膈（猪脾）一条

用法：用水四碗煎取一碗服。

2. 黄皮树根汤

适应症：胃寒痛

处方：黄皮树根一至二两（或黄皮叶十二片）

用法：用水三碗煎取一碗服。

3. 地稔樟木汤

适应症：胃寒痛

处方：地稔（干）一两半 樟木皮一两。

用法：用水三碗煎取一碗服。

4. 地稔山松汤

适应症：胃寒痛

处方：地稔一两 山松根三两 入地金牛一两

用法：用水四碗煎取一碗服。

5. 盐焗鸡旦

适应症：胃痛偏于寒者

处 方：鸡旦二个 生盐适量

用 法：鸡旦放瓦盅内，加上生盐，将旦藏着封密，加盖，然后将瓦盅放入锅中隔水炖四小时左右，将鸡旦取出剥壳服。每次服二个。

二、胃热痛

1. 金盞银盘汁

适应症：消化性溃疡

处 方：金盞银盘（鲜草）六两

用 法：槌烂榨汁，用开水适量冲服。
药渣外敷患处。

2. 丝瓜络汤

适应症：胃热痛

处 方：丝瓜络二两

用 法：用水二碗煎取大半碗服。

3. 蜜糖溜汤

适应症：胃热痛

处 方：蜜糖一汤匙 米酒数滴

用 法：用白开水适量冲稀，搅匀饮下。

三、胃气痛

1. 山橙汤

适应症：胃脘胀痛不舒，频频噯气。

处 方：山橙（切开）约五钱（旧者更佳）

用 法：用水二碗煎取一碗服。

2. 火殃藜汤（方见腹泻）

3. 红铁树汤

适应症：胃气痛，腰部扭伤疼痛及血尿初起。

处 方：红铁树叶十二片（或红铁树花适量）瘦猪肉适量

用 法：将铁树叶切碎与瘦猪肉加水适量煮汤服。

呕 吐

引起呕吐的原因很多，如受寒、受热、或吃得过饱，或吃了不干净的东西，都可引起呕吐。因此，根据病因和症状可以分为虚寒呕吐、胃热呕吐和食滞呕吐等。

【主要症状】

虚寒呕吐的症状：吐出来的食物还未消化，或早上吃的东西到晚上吐出，或晚上吃的东西到第二天早上吐出，或呕吐清水，不想喝水，手足清冷；或怕冷发热，喜欢接近热的东西；面色苍白，小便多而色淡白，有的还兼有腹泻，腹痛绵绵。治疗以补虚止呕为主。

胃热呕吐的症状：呕的时候很急速，而且有力，吐出来的东西有酸臭气味，口渴喜饮水，烦躁不安，面红唇赤，小便短

少、色黄。

食滞呕吐的症状：吐出来的食物还未消化，有酸臭气味，不想吃东西，只觉肚子饱胀或疼痛，吃了东西胀痛更厉害，甚至吃了以后，不久又吐出来。治疗以消滞止呕为主。

【治疗方法】

一、虚寒呕吐

1. 漆大姑汤

适应症：胃寒呕吐

处 方：漆大姑干根两半

用 法：用水二碗煎取一碗，分二次服。

2. 灶心土汤

适应症：虚寒呕吐腹泻

处 方：灶心黄土一两（须用烧柴、草的灶心黄土，烧煤的不可用）

用 法：用水一碗煎取大半碗，澄清去

渣，温服。

3. 羌蜜茶（方见寒咳）

二、胃热呕吐

1. 竹茹汤

适应症：胃热呕吐

处 方：竹茹（即竹树二层皮）一两 生
羌五钱（磨烂榨汁）

用 法：用水二碗煎竹茹，至约余一碗
左右时将羌汁加入，分二次
服。

三、食滞呕吐

1. 取鲜番石榴叶数片，洗净，放入口中
嚼烂，慢慢嚥下，立即可以止呕。

痢 疾

痢疾是一种消化道传染病，多发生于夏、秋两季。是由于吃了不干净，带有痢疾杆菌或阿米巴原虫包裹的食物引起的。

根据病因的不同，分为细菌性痢疾和阿米巴痢疾两类。

【主要症状】

细菌性痢疾的症状：一般起病较急，患者有畏寒发热，伴有头痛和全身不舒服，肚子扭痛，将要大便时痛更厉害，一天内排大便数次甚至数十次不等。有明显的里急后重。大便最先是质稀或呈水样，粪量较少且带有红色白色的脓血和粘液，以后每次大便都只是一些脓血和粘液。

阿米巴痢疾的症状：与细菌性痢疾相似，但起病较缓慢，一般没有发热、腹痛不很厉害，大便一般粪质较多，混有果酱色的血和粘液，有特殊的肉类腐败臭味。里急后重的程度比细菌性痢疾较轻。

【治疗方法】

民间草药治疗痢疾，不论菌痢或虫痢，一般均以清热解毒，消滞化湿为主，

可隨症選用下列處方：

1. 旱辣蓼湯

適應症：濕熱內蘊，腹中窘痛，下痢膿血，不論菌痢蟲痢均可。

處方：旱辣蓼根 鮮用一至二兩（干用五錢至一兩）

用法：用水二碗煎取一碗服。

2. 魚腥草馬齒莧湯

適應症：濕熱內蘊，腸炎下痢，腹痛不舒。

處方：魚腥草（即狗貼耳）鮮用三兩
馬齒莧（即瓜子菜）鮮用四兩

用法：用水四碗煎取一碗，加入蜜糖適量服。（方中二藥如不齊時，任用其中一種，亦可有效）

3. 井欄茜湯

適應症：下痢膿血，里急後重。

处 方：井栏茜（即鸡爪草、小叶凤尾草）鲜用二两（干用一两）
用 法：用水二碗煎取一碗，加入蜜糖适量服，连服二至三天。

4. 鸦胆子粒吞

适应症：痢疾、疟疾

处 方：鸦胆子

用 法：将鸦胆子去壳取仁，用易子吸水的纸包裹压实去油（或以子仁原粒，不可破碎），以龙眼肉包裹鸦胆子仁吞服，每次服鸦胆子仁十至十五粒，每日一至二次。

5. 藕莧菜汤

适应症：痢疾

处 方：藕莧菜根一两 黄花猛一两
水瓜叶五钱。

用 法：用水三碗煎取一碗服。或单用

竊苋菜二兩煎服亦可有效。

6. 火炭母湯（方見腹瀉）

7. 穿心蓮散

適應症：細菌性痢疾及腹瀉腹痛、胃腸炎

處方：穿心蓮 晒干研末

用法：每次服二至三分。本品味極苦服時可用糖水送下或沖服。

8. 成酸蒜頭（醋醃大蒜）每日吃四個，連服二、三天。

9. 桉葉湯

適應症：腹瀉、痢疾

處方：桉樹葉二至四兩（大、小葉桉樹均可，但以大葉者效果較好）

用法：用水二碗煎取一碗半，一日三次分服。

讀者問
文獻部

肠道寄生虫病

(蛔虫、绦虫、蛲虫)

肠道寄生虫病包括蛔虫、绦虫、蛲虫、钩虫等，是由于吃了带有这些寄生虫的虫卵或包囊的未煮熟的蔬菜、猪肉、牛肉和鱼肉，或未经洗干净的水果引起的。

【主要症状】

蛔虫病的症状：时常腹痛，有时痛得很厉害，夜间磨牙、鼻痒，较严重的腹部可以摸象绳索的东西，痛得厉害时四肢冷，吐涎沫和清口水，有时在大便时有蛔虫排出，甚或从口中吐出来。

蛲虫病的症状：病人肛门常常发痒，晚上痒得更厉害，不想吃东西，大便次数多，腹痛，夜惊失眠，精神不安，甚或夜间遗尿。

钩虫病的症状：钩虫幼虫初侵入人体皮肤时，感觉很痒，非搔抓不可，当时发生小水泡湿疹，俗称“大粪毒”。有时会引起发热咳嗽等反应。

钩虫成虫在人体内寄生后，患者常有上腹不适和疼痛，由于钩虫吸食血液，当患者丧失血液过多时，便出现无力，易倦、耳鸣、眼花和稍一劳动即气促心跳等症状，面部和全身皮肤呈蜡黄色，但眼白不黄，食慾正常或稍减退，但有喜食生米、泥土、木头、石灰等偏好。儿童患者发育迟缓，男子可能有阳痿，妇女可有月经不调，孕妇可致流产。

绦虫病（寸白虫）的症状：病人一般渐渐消瘦，腹部不舒服或有微痛，吃了东西不久又饿，有时腹泻或便秘，大便中往往可以发现片段白色扁平的绦虫体节。

【治疗方法】

一、蛔虫病

1. 苦楝葫芦汤

适应症：肠道寄生虫病（包括蛔虫、烧虫、钩虫病）。

处 方：苦楝根皮五钱至一两，葫芦茶一至二两。

用 法：用水三碗煎取一碗服（或单独选用其中一味服亦有效）。

2. 使君子五、六枚，煨熟去壳取仁吃。
或用使君子肉五钱与瘦猪肉适量同煲汤服亦可。

3. 葫芦布渣汤

适应症：蛔虫病、烧虫病。

处 方：葫芦茶二钱，布渣叶二钱。

用 法：用水一碗半煎取半碗服。

4. 苦楝百部蛋

适应症：蛔虫病。

处 方：苦楝根皮五钱，百部根三钱，

鸡旦二个。

用法：先将鸡旦煮熟去壳，然后将鸡旦与上药加水适量同煮一小时左右后，吃旦。七岁以下儿童药的份量减半，鸡旦不减。

5. 使君子叶粥

适应症：蛔虫病。

处方：使君子叶十片，粘米适量。

用法：用水适量煮粥吃。

二、烧虫病

1. 葫芦布渣汤（方见蛔虫病）。
2. 苦楝葫芦汤（方见蛔虫病）。
3. 茶仔头（即茶麸）适量，黑醋适量，同煮，于夜间肛门搔痒时外洗肛内。
4. 蒜头肉五粒，捣烂，用冷开水一小酒杯（约十毫升）浸之，于夜间取浸液作灌肠用。
5. 蒜部三钱，用水一碗煎至半碗，作灌

肠用。

6. 安石榴叶二两，用水二碗煎至半碗作灌肠用。或用安石榴叶适量，捣烂，于夜间临睡前敷贴肛门。

三、钩虫病

1. 贯仲苦楝汤

适应症：钩虫病。

处 方：贯仲三两，苦楝根皮五钱，山紫苏五钱，土荆芥五钱。

用 法：用水三碗煎取大半碗服（如无山紫苏，可改用假紫苏；无藜科土荆芥，可用唇形科土荆芥）。

注 意：孕妇忌服。

2. 七味贯仲汤

适应症：钩虫病。

处 方：贯仲三两，苦楝根皮五钱，紫苏五钱，土荆芥五钱，金银花

三钱，土茯苓八钱，甘草一钱。

用法：用水四碗煎取大半碗服。

注意：孕妇及严重慢性病，身体极度衰弱或正在患急性病的病人均忌服。

3. 复方贯仲糖浆

适应症：钩虫病（防治均可）。

处方：鲜贯仲95市斤，荆芥（干用）12市斤，鲜苦楝树皮20市斤，红糖及香精各适量。

制法：将贯仲、苦楝树皮洗净，砍碎，放锅中，加水约200市斤，用猛火煎煮约四小时，煎成药液约45市斤；同时，用另一锅加入荆芥12市斤，水约70市斤，煎煮约一小时卅分，煎成药液约15市斤。然后，将两种药液

混合和过滤，放入锅中再煎约卅分钟，使药液浓缩为60市斤左右(约24000—25000毫升)，再加入适量红糖和调味的香精，便可待用。

用法：每人每日服一次，每次服60毫升。

说明：(1) 本方可供农村卫生院或下乡医疗队作集体防治钩虫病使用。

(2) 本方对孕妇，及严重慢性病或正在患急性病的病人或身体极度衰弱者，均禁忌使用。

(3) 服药后一般没有什么反应，仅个别有头晕、恶心等轻微反应。

四、绦虫病

1. 南瓜子汤

适应症：绦虫病，蛔虫病。

处 方：南瓜子二两，贯仲一两，苦楝根皮二两。

用 法：将贯仲、苦楝根皮二味先用水五碗煎至一碗半左右，然后将南瓜子捣成粉碎，加入再煎约20—30分钟，至约余大半碗左右，于晚上七时左右空腹服。成人一次服完，小儿1—3岁服1/5，4—6岁服2/5，7—10岁服3/5，11—15岁服4/5，60岁以上者服4/5。

服药后翌晨服硫酸镁催泻。

2. 南瓜子四两，炒香，于早晨空腹时剥壳吃，连吃三天。

3. 槟榔汤

适应症：绦虫病、羌片虫病。

处 方：槟榔一两（切片）。

用法：用水二碗煎取一碗，空腹时一次服，连服三天。

注：上列 2、3 两方可同时使用，服三天后。如大便中尚未见绦虫的虫头排出。可继续服用三天。

妇 科 病

痛 经

妇人在行经之前或在经期中，下腹部疼痛称为痛经。从月经初潮就开始有疼痛者，患者生殖器多无显著病变，可能是因为精神紧张，发育不良所引起。初潮以后过一时期才发生痛经者，多为生殖器炎症所引起。

【主要症状】

月经前或月经来时，下腹部胀痛，胸部也感到胀痛，胸闷想呕，乳房发胀，经水量少而不通畅。

【治疗方法】

1. 豆豉羌山白芷汤

适应症：妇女月经痛，月经不调，闭经

处 方：豆豉羌根二两，山白芷三两，
玉不留行根一两，雄鸡仔一只。
用 法：将鸡剖净切碎和药，加水适量
炖服。经期腹痛者须在行经期
服，闭经者随时可服，经期腹
痛者单用豆豉羌二两，清水二
碗煎取一碗服，亦可有效。

2. 益母草汤

适应症：经期腹痛。

处 方：益母草（鲜用一两，干用五
钱），红糖适量。

用 法：用水二碗煎取一碗服。
或用益母草嫩根二两，酒水各
半同煎服，每次月经前四、五
天连服二、三剂，连服三个月
亦可。

3. 姜虎汤

适应症：妇女经期腹痛。

处 方：豆蔻姜二两，黑老虎一两。

用 法：用水三碗煎取一碗，一日一至二次分服。

4. 豹皮樟根一两、瘦猪肉二两煎服，治痛经。
5. 十大功劳叶一两，煎服治痛经。

月 经 不 调

妇女月经来潮，一般是二十八天一次，所以叫做“月经”。如果经期一向准确，忽而提前或过期七天以上，连续几个月，或月经过多等，统称月经不调。

【主要症状】

月经过多（机能性子宫出血）的症状：月经比正常量多且行经期延长。一般常见的病例，多是月经先期而至，也有在起病前有短期停经的（40—50日）。月经来潮时，血量特多，时间也延长，甚至可

连续数星期之久，也有经净一、二日又再来的。

闭经的症状：月经两、三个月不来，称为“经阻”或“闭经”。因血枯而经闭的，症见消瘦，面色苍白，心跳气促，头晕眼花，腰背疲软，四肢无力，饮食无味，严重的可有潮热盗汗，毛发脱落等症状。因血滞而经闭的，多有腹内胀痛，接之更甚，胸闷，精神抑郁，口干而不想饮水，或有头眩眼花等症状。

【治疗方法】

一、月经过多

1. 益母鸡旦汤

适应症：妇女身体虚弱而月经不止。

处 方：益母草 鲜用二两（干用一两）鸡旦两只。

用 法：用水四碗煎至鸡旦熟后，取出剥壳，放入再煎至一碗连旦服。

2. 艾叶金樱汤

适应症：月经过多，头晕心跳，疲倦乏力，面色无华。

处 方：艾叶（五月艾）一至二两，金樱子根一两。

用 法：将艾叶炒至微黄后与金樱根用水三碗煎取一碗服，或加鸡旦一只同煎亦可。

3. 岗稔汤

适应症：妇女身体衰弱，月经过多。

处 方：岗稔子一至二两（如无岗稔子可用岗稔叶代，分量相同）

用 法：先将岗稔子（叶）和米一撮放锅内同炒至米色微黄，用水三碗淬之，煎至一碗服。

4. 百草霜生姜汤

适应症：妇女身体虚寒，月经过多不止。

处 方：百草霜二汤匙（约三钱）生姜二两。

用 法：将生姜磨烂炒焦后与百草霜和匀，加入黑醋一碗煮沸服。

5. 双稔汤

适应症：妇女月经过多，头晕心跳，四肢软弱无力。

处 方：岗稔子（或根）一至二两（果去萼及心），地稔根二两。

用 法：先将两药放锅内微炒然后煎服。如觉小腹胀痛的用醋水各半共二碗（黑醋一碗，清水一碗）煎取大半碗服。小腹不胀痛的用酒水各半共三碗（白酒一碗半，清水一碗半）煎取一碗服。一日可煎服二至三次。

6. 猪鬃稔叶煎

适应症：妇女月经过多（血山崩）。

处 方：猪鬃稔叶半斤。

用 法：将猪鬃稔叶切碎放镬内炒透，
用米酒（或黑醋半斤淬之，取
酒或醋）服。

二、闭经

1. 鹅不食草汤

适应症：妇女闭经

处 方：鹅不食草二钱，猪肉四两。

用 法：用水二碗煎取一碗服，连服三
日。

2. 蚕沙酒

适应症：妇女闭经

处 方：蚕沙一两，黄酒（或白酒）一
斤。

用 法：将蚕沙放入酒内同煮数沸后，
过滤去掉蚕沙，每日温服一小
杯。

白 帶

在正常情况下，妇女阴道内原有少量白色分泌物仅是湿润阴道表面，使其它细菌不易生长，这称为“阴道自洁作用”。这种作用如发生障碍，就容易受其它细菌感染。

白带，是指阴道分泌物较正常者增多而言，如果阴道内常常有白色粘液流出，身体又觉不适，才是病理变化所引起的白带。

【主要症状】

从阴道内经常有白色的粘液排出，有时有臭味。常有头晕、腰痠、腹胀等现象，精神疲倦等。

【治疗方法】

1. 双花汤

适应症：妇女赤白带下。

处 方：佛桑花五钱 鸡冠花五钱
用 法：用水二碗煎取一碗服，每日一次，或单用鸡冠花（白色者更佳）五钱与瘦猪肉适量同煮汤服亦可。

2. 蚌肉汤

适应症：妇女白带

处 方：生蚌连壳一斤 老姜七钱

用 法：先将姜捣烂放镬内炒香，再将蚌洗净加入同炒，然后加入白酒一碗煮取半碗，服酒及蚌肉。

3. 鸡鹤汤

适应症：妇女白带

处 方：鸡冠花一两 白鹤藤一两 小榕树须五钱 瘦猪肉二两

用 法：用水三碗煎取一碗服

4. 苦黄红花汤

适应症：妇女白带

处 方：苦蕒菜一两，红花一钱

用 法：用水二碗煎取大半碗服。

5. 塘边藕汤：

适应症：妇女白带

处 方：塘边藕四两 瘦猪肉(或鸡肉)
适量

用 法：加水适量煮汤服。

6. 小叶榕树浆

：适应症：白带、淋浊、红白痢疾。

处 方：小叶榕树乳汁一酒杯(约十五
毫升)

用 法：以米汤冲服。

7. 牛菊洗剂

。适应症：妇女白带、阴痒。

处 方：入地金牛根一两 野菊花一两

用 法：用水三碗煎取二碗，候温作冲
洗子宫颈及阴道用。

8. 蛇床子洗剂

适应症：妇女白带、阴痒。

处 方：蛇床子五钱 苦参五钱

用 法：用水三碗煎取二碗，候温作冲
洗子宫颈及阴道用。

9. 石榴皮洗剂

适应症：妇女白带、阴痒。

处 方：石榴皮一两

用 法：用水三碗煎取二碗，候温作冲
洗子宫颈及阴道用。

10. 干带止痒球

适应症：妇女白带、阴痒。

处 方：蛇床子二钱 明矾二钱 樟脑
一钱 杏仁六分 铅粉三分

用 法：把前四味研为细末，用蜂蜜适
量调制成药球状，以铅粉为衣。先
用外洗方（如上列7、8、9方）
煎水冲洗外阴部，然后将此球

放入阴道内，外加棉塞一个，棉塞同粗线系着，线的一端露出阴道口，外加丁字带固定。两天换一次。隔日一个。

妊娠呕吐

妇女受孕后，常有恶心呕吐的症状，而且多发生在受孕二、三个月的时候，这叫做妊娠呕吐，又名恶阻。一般病势轻微的，无须服药治疗，只要在饮食、休息、精神生活方面加以注意，经过一段时间，症状自然逐渐消失。但也有部分孕妇呕吐很剧烈，妨碍饮食，以致营养缺乏，严重地影响身体的健康和胎儿的成长。必须积极治疗。

【主要症状】

受孕后，常常恶心呕吐，头晕眼花，疲倦喜睡，懒于操作，不思饮食，或者择

食，闻饭气就觉胸闷欲吐，喜欢吃酸咸的东西。

【治疗方法】

1. 香花鸡旦汤

适应症：妊娠呕吐

处 方：香花菜鲜用半斤 鸡旦一只

用 法：用水适量煮汤加少许盐油吃。

2. 桑寄生郁金汤

适应症：妊娠呕吐，且易于发脾气，胸胁胀闷的孕妇。

处 方：桑寄生一两 郁金三钱

用 法：用水二碗煎取大半碗，候温，慢慢饮下。

3. 灶心土汤（方见腹泻）

4. 番石榴叶一片，洗净，放口内嚼烂，吞汁去渣。

5. 糯米不拘多少，用姜汁适量同炒，至糯米熟透爆破，随意慢慢嚼吃，

产后腹痛

妇女在产后一个月内下腹部疼痛的，就是产后腹痛。有因血瘀引起的，也有因受寒而引起的，所以临床上分有“血瘀痛”和“寒痛”的区别。

【主要症状】

①血瘀的症状：痛在脐下小腹部位。胀满或有硬块，不喜欢按摩。如用手按，痛得更厉害，恶露很少，或提早停止。治疗以化瘀镇痛为主。

②寒痛的症状：下腹绵绵而痛，用手按之松软不坚硬，感到脐下冷痛，不喜欢按摩，用热敷则减轻，头晕耳鸣，腰痛，面色苍白，手足冷。治疗以祛寒活血为主。

【治疗方法】

一、血瘀痛

1. 蜆蜆酒

适应症：妇女产后血瘀腹痛，月经前后腹痛。

处 方：蜆蜆半斤 白酒适量

用 法：先将蜆蜆洗净，去小爪，剖开去肠杂，放在铁锅里略炒后，加酒煮十五分钟服。服量以病人能饮多少酒而定。

2. 益母草汤

适应症：同上方

处 方：益母草鲜用一两(干用五钱)

用 法：如用鲜益母草则与瘦猪肉同煎汤加白酒少许服。用干益母草则与红糖适量同煎服。

3. 一味豆豉姜汤

适应症：产后瘀血不清腹痛

处 方：豆豉姜根一至二两

用 法：先将豆豉姜根炒香，再以酒水

各半煎服。

4. 仙鹤草汤

适应症：产后恶露未清而腹痛，口渴汗出

处 方：仙鹤草鲜用二两(干者一两)鸡肉四两

用 法：用水三碗煎取一碗加入白酒少许服。

二、寒痛

1. 半姜龙柏汤

适应症：妇女产后腹痛属于寒痛者及产后血虚头晕。

处 方：半枫荷叶一两 豆豉姜一两
细叶双眼龙根一两 盐霜柏根一两

用 法：用水三碗煎取一碗服。产后血虚头晕可用本方剂量三倍，酒水各半煎服。

2. 细叶双眼龙汤

适应症：同上方。

处 方：细叶双眼龙根二两

用 法：用水三碗煎取大半碗加入白酒少许服。或用细叶双眼龙二两浸米酒一斤。每次服二钱亦可。

3. 益母羌龙汤

适应症：同上方

处 方：豆豉羌（干根）四两 益母草（干）一两 细叶双眼龙（干根）一两 金狗脊（干）一两

用 法：用水三碗半煎取一碗服。

4. 猪鬃稔叶煎（方见月经过多）

产后血晕

妇女产后忽然头晕、眼花、不能起坐，或胸部觉闷，恶心呕吐，或痰涌气

促，严重的甚至口噤神昏，不省人事，这些症状，叫作产后血晕。引起产后血晕的原因有由于血虚的，有由于瘀血上冲的，在治疗时应加以区别。

【主要症状】

血虚症的症状：产后失血过多，突然头晕，面色苍白，心跳作呕，渐至昏迷不知人事，眼闭口开，两手松软，四肢冷，甚则全身出汗。

血瘀症的症状：产后恶露不下，或下亦很少，小腹阵阵作痛，以手按之痛更厉害，面色苍黄，唇红，渐至胸部胀满，甚则呼吸气促，神昏口噤，不省人事，两手握拳，牙关紧闭，面色紫黯。

【治疗方法】

一、血虚症

1. 荷龙菟酒

适应症：产后血虚头晕

处 方：半枫荷四两 细叶双眼龙四两
老生姜四两

用 法：将上药蒸熟，加入白酒三市
斤，浸十五天可用。每天饮一
次，每次饮一至二两，并用少
许外搽头额及太阳穴等处。

2. 半姜龙柏汤（方见产后腹痛）
3. 豆豉姜枝或叶二两，清水煎服。

二、血瘀症

（处方尚缺，）

产后乳汁过少

产后乳汁过少，是指妇女产后，乳汁分泌不足，不够哺儿之用。乳汁过少的原
因，有因气血虚弱，致乳汁不能生化的；
有因肝气郁滞，乳络不通的。

【主要症状】

因气血虚弱，乳汁不能生化的；乳房

无胀痛感觉，面色苍白或黄黯，皮肤干燥，精神困倦，身体虚弱，头晕耳鸣，心跳气短，不思饮食。治疗以补血养气为主。

因肝气郁滞，乳络不通的，乳房胀满而痛，按之木硬，甚或有发热，面色微黄，精神郁闷，烦躁，胃脘胀痛，胸肋不舒。治疗以疏肝解郁为主。

【治疗方法】

一、气血虚弱

1. 木瓜鲜鱼汤

适应症：产后气血虚弱，乳汁过少或全无乳汁。

处 方：木瓜（广东产作水果用的番木瓜）半斤，鲜鱼（或鲜虾）四两

用 法：用水适量煮汤吃。

2. 豆腐红糖汤

适应症：同上方

处 方：鲜豆腐五两 红糖一两

用 法：用水一碗煮熟，加入米酒二两，一次服完。

3. 猪肠汤

适应症：同上方

处 方：猪肠半斤

用 法：加水适量煮汤，淡食。（猪肠可分数次食。）

二、肝气郁滞

1. 酸辣鲜鱼汤

适应症：妇女产后肝气郁滞，乳汁过少。

处 方：鲜鱼四两 米醋二碗 生姜五片 花生油五钱

用 法：先把花生油入锅炒鲜鱼、生姜，然后再放入米醋，加清水适量，煮成鱼汤，每日吃一

次，连吃三、四天。

2. 王不留行通乳汤

适应症：同上方

处 方：王不留行果壳 鲜用二两（干用一两）鲜鱼尾一条。

用 法：用水适量煮汤吃。

3. 山海螺汤

适应症：同上方

处 方：山海螺一至二两 猪蹄或猪肉六至八两

用 法：用酒水各半煮汤吃，每日一次，连吃三至五天。

乳 疮

乳疮几乎都是发生在产后哺乳期的妇女，特别是以初产妇为多。致病原因主要是乳头损伤感染细菌或乳汁分泌多，婴儿少吃，致乳汁积滞而成。

【主要症状】

乳疮可发生在乳房的任何部位。初起乳房肿胀疼痛，并有硬块，逐步形成脓肿，乳汁不畅，恶寒发热，头痛，如未经治疗，则脓肿部位皮肤穿破流出脓液，创口经久不愈。

【治疗方法】

一、内服方

1. 桔橙汤

适应症：乳部生疮，红肿热痛，未成脓者。

处 方：五指柑五钱 山橙五钱 入地金牛五钱

用 法：用水五碗煎取二碗，以一碗内服，其余一碗分数次热敷患处。

2. 蒲公英内服外敷方

适应症：乳疮。

处 方：蒲公英 王不留行

用 法：(1)先用蒲公英一两半，王不留行五钱，加水二碗煎取一碗内服。

(2)再用蒲公英四两，王不留行叶二两，黄糖适量共捣烂敷患处。

(3)如无王不留行，可用蒲公英一两半，银花藤（叶）一两半捣烂加水适量煎服，或单用蒲公英一味（鲜用约二两）捣烂加白酒适量炖四十分钟后服（或榨汁冲酒服亦可），药渣外敷患处。（或另用鲜蒲公英适量捣烂调白醋或加片糖和匀，外敷患处）。

3. 地胆头内服外敷方

适应症：乳疮（乳腺炎）

处 方：地胆头连叶四两

用 法：取地胆头连叶四两捣烂加米酒
适量煮沸服（或加水适量煎取
药液加入白酒适量冲服）。药
渣外敷患处。

4. 了哥王且

适应症：乳疮初起未化脓者。

处 方：了哥王二两 鸡旦五个

用 法：用水适量同煮，至鸡旦熟后，
取出去壳，并在且上刺十余小
孔，再将且放入药液中煮至且
白变成黑色为度。每日吃鸡旦
一个，连服五天。

5. 鲫鱼草汁

适应症：同上方

处 方：鲫鱼草二两

用法：以白酒适量与鲫鱼草共捣烂榨汁煮沸内服。第一天服二次，以后每天服一次，连服四天。药渣外敷患处。

6. 千斤拔一两半，煎水冲酒服。每日一次，连服三天。
7. 犁头草、半边莲各五钱，捣烂加入白酒适量煮沸服。
8. 野菊（叶或花）适量，捣烂加入白酒适量炖热服。药渣外敷患处。

二、外敷方

1. 鲜半边旗叶二两，捣烂外敷患处。
2. 鸭脚木根皮、凤凰翔，还魂草，早糯米各适量，共捣烂外敷患处。
3. 井栏茜，铁线草各适量，共捣烂外敷患处。
4. 狮子滚球（鲜用）适量，捣烂外敷患处。

5. 芙蓉花叶（木芙蓉叶）适量，加白酒少许捶烂外敷患处。

子宫脱垂

子宫脱垂俗称“阴挺”，造成子宫脱垂的原因，主要是由于宫韧带松弛，阴道和会阴等软组织在生孩子时裂伤后未加缝合，或产后过早参加重体力劳动等。

【主要症状】

患者初时感到小腹下部下坠，走路时加剧，小便有时困难。检查时子宫较正常位置为低，用力时脱垂程度增加。严重的甚至整个子宫脱出阴道口外，子宫颈和阴道粘膜增厚而且干燥，甚或子宫颈口溃烂，子宫体发炎肿大。

子宫脱垂的程度：第一度是轻度，子宫下降，但子宫颈口还在阴道内；第二度，子宫颈口已露出阴道口；第三度是重

度，子宫体露出阴道外。

【治疗方法】

(1) 第一度应暂停重体力劳动，内服升官汤或金樱汤。

(2) 第二、三度应休息，服升官汤或白背叶根醋剂。宫颈发炎时涂山大靛醋糊或蒲公英适量煎水候冷外洗患处，将子宫送上原位，再用已消毒的棉花纱布塞入阴道，外加丁字带固定。如子宫体发炎肿大，难于推送回原位时，可以暂时不推送，先如上法上药或外洗，候宫体消炎退肿后再送回原位，并先服双草汤，至能送回原位时续服升官汤。

1. 升官汤

适应症：子宫脱垂

处 方：土人參一两 千斤拔一两 牛
大力一两 鸡血藤五钱 金樱
根一两 艾根五钱

用法：用水六碗煎取一碗半，一日二次分服。

2. 金櫻根汤

适应症：子宫脱垂

处方：金櫻根四两

用法：用水五碗煎取一碗，加甜醋或米酒2—4钱一次混合冲服（最好晚上睡前服）

3. 白背叶根醋剂

适应症：子宫脱垂

处方：鲜白背叶根十两

用法：用白醋及清水各二斤（共四斤）加入白背叶根共煮至余药液半斤，露放一夜，翌日晨早一次顿服。连服三天。

注意：（1）初服本方后腹部会有微痛，是子宫收缩的现象。
（2）有胃溃疡病者忌用。

4. 山大颜醋糊

适应症：子宫颈炎

处 方：山大颜嫩叶适量

用 法：将上药晒干研末，用米醋调成稀糊作涂剂，外涂子宫颈。

5. 双草汤

适应症：子宫脱垂

处 方：冰糖草二两 益母草二两

用 法：用水四碗加猪骨四两同煮取一碗半，一日二次分服。

儿 科 病

麻 疹

麻疹，是小儿常见的传染病，多发生在冬天和春天。病的经过，主要分为初热期、发疹期、收没期三个阶段。如果护理得好，可以避免合并症的出现病是会快好的。

【主要症状】

麻疹初热期症状：麻疹初起大约发热三数天才见疹点，这称为初热期。在这时期病人觉得发热、怕冷、流鼻涕、鼻塞、喷嚏、咳嗽、眼泪汪汪、眼白发红、怕光、眼胞浮肿、烦躁不安，唇颧红赤，耳珠冷，口颊内近白齿处有微白色小疹粒，不想吃东西，此期治疗应以透疹为主。

发疹期症状：麻疹已见形，疹点先从耳背、项部出现，然后由头面到肩背、胸腹，而达手足。全身都可见到红色疹粒，稍为凸起，用手摸去粗糙有颗粒感觉，发热较高，精神疲倦，咳嗽多，不想吃东西，唇干口渴。此期要神清气爽为好。治疗应以清热解毒为主。

收没期的症状：麻疹经过二、三天透发，一般都已出齐，自然慢慢收没隐退，先出者先收，后出者后收，脱落的皮屑则留下一点点黯红色的斑痕，各种症状慢慢减退，身体也一天天好起来。这期治疗应以养阴生津为主。

【治疗方法】

一、预防：在麻疹发病较多的季节，对易感儿除注意避免着凉和注意饮食，避免和麻疹病人接触外，可选用下列处方预防：

1. 紫草根二至三钱，白糖适量，用清水适量煎服，每日二次，连服三天。
2. 丝瓜络三钱，用清水三碗煎取一碗半，一日三次分服，连服三天。
3. 贯仲一两，丝瓜络五钱，加水适量煎服代茶。
4. 垂丝柳，向东桃树枝，各适量，煎水口服或洗澡。

二、初热期

1. 葛根苏叶汤

适应症：麻疹初热期

处 方：葛根三钱 紫苏叶钱半 蝉蜕钱半

用 法：用水二碗煎取一碗，分数次温服。

2. 芫荽马蹄汤

适应症：麻疹初热期

处 方：马蹄（荸荠）二两 鲜芫荽一

两 红萝卜二两 鲜芫荽五钱
竹蔗约长一尺（切片）

用法：用水适量煎服代茶。

三、发疹期

1. 丝柳竹蔗汤

适应症：麻疹发疹期麻疹不透或肺胃热盛伤津者

处方：垂丝柳（鲜）五钱 竹蔗一斤
红萝卜二两

用法：用水七碗煎取一碗半，一日三次分服。

2. 黄瓜仁草汤

适应症：麻疹不透（当出不出，当收不收）

处方：黄瓜仁草（全草）一至二钱

用法：用水一碗半煎取大半碗，一日二次分服。

3. 桑虫浆

适应症：麻出不透，高热气促，咳嗽不止。

处 方：桑虫（活者）一条

用 法：将桑虫捣烂，以开水适量冲服。

注：桑虫系生于桑树木材中之虫，比蚕粗大色白，民间常用治疗麻疹。

4. 牛角狗肝汤

适应症：麻疹后期高热不退。

处 方：水牛角尖（大约尖部二寸可用）
二岁以下用二钱，四岁以上可用至一两（用时将牛角刨成薄片或锉碎）

狗肝菜五钱

用 法：用水五碗煎取一碗，分二、三次温服。

5. 芫荽重方

适应症：麻出不透

处 方：鲜芫荽一两 生葱三两

用 法：将芫荽、生葱同捣烂，放入有咀瓦茶煲中，加水一碗半密封，煲咀套上橡皮管，将水煮沸，蒸气即从橡皮管口喷出，病儿在床帐中保温避风，将橡皮管带入帐内持管口向病儿颈项胸前、背后及耳底、头面、四肢等部位皮肤以蒸气喷薰（注意保持一定距离，以微热为合，防止烫伤）喷后随即用毛巾掩护并吸去水气。

四、没收期

1. 茅根竹蔗水：鲜茅根一两，竹蔗半斤，加水适量煎汤作饮料，
2. 红萝卜，适量，煎汤作饮料

百日咳

百日咳发病以冬天和春天为多，是由于感染百日咳嗜血杆菌而引起的，有传染性。发病年龄以十岁以下的小孩为多见。年龄愈小，病情就愈重。因为这种病拖延时间长，不能迅速痊愈，故叫“百日咳”。又因咳嗽时有间歇停顿，和有像鸡叫的尾音，民间又叫做“鸡咳”。

【主要症状】

主要是咳嗽，但区别于一般咳嗽的特点是，咳一阵停一阵，咳起来连续咳十几声以至几十声，中间因吸气而暂时停止，在吸气的时候发出一种长而响亮的呼吸声，跟着又连续作咳和再吸气，这样反复循环三次，最后咳出粘稠痰液，或呕出食物，咳嗽才告停止，轻的每天发作十几次，重的几十次。

【治疗方法】

1. 鸡胆汁

适应症：百日咳

处 方：鲜鸡胆二个（或猪胆半个亦可）

用 法：用针刺破鸡胆，挤出胆汁，加入白糖或蜜糖适量调匀，略炖一下（或放饭面上蒸亦可）一日二、三次分服（一周岁以下每次用鸡胆一个，每隔二天一次）

2. 鹅不食草汤

适应症：百日咳口干淡，舌苔白厚滑，咳时气紧者。

处 方：鹅不食草三至五钱，蜜糖（或白糖）适量

用 法：先用水大半碗入鹅不食草煮沸约五分钟。即加入蜜糖（或白糖）调匀，一日三次分服。

3. 百咳糖水

适应症：百日咳

处 方：风栗壳（用风栗的内壳）二两
粟米须二钱 糖冬瓜一两。

用 法：用水一碗煎取半碗温服。

4. 三夹草汤

适应症：百日咳

处 方：鲜三夹草（三星草）一两（干者用五钱）蜜糖（或白糖）一两

用 法：用水二碗煎三夹草成一碗，去渣，加入蜜糖（或白糖）调匀，一日三次分服，连服五至十天（本方剂量系五岁小孩用量，年龄大小，可酌量增减）。

5. 白兰糖浆

适应症：百日咳中期

处 方：鲜白兰花一两（干者用五钱）

蜜糖一两半。

用法：将上二味放入有盖瓦盅内，加水二碗，盖好，隔水炖五小时，去渣，一日分三次服完。连服四至五天（本方剂量适用于5—10岁小孩，年龄小的，可酌量减轻）。

6. 百部车前汤

适应症：百日咳

处方：百部六钱 车前草四钱

用法：用水二碗煎取一碗，一日四次分服。

7. 白柠檬汤

适应症：小儿咳嗽阵发，连声不断，咳时面红耳赤，甚则吐出痰涎。

处方：白柠檬一个（如无柠檬改用四季桔五钱）蜜糖适量。

用法：用水一碗煎至半碗，分二次温

服。

8. 扁柏红枣汤

适应症：小儿百日咳，咳至出血者。

处 方：扁柏（鲜、干均可）五钱 红
枣六枚

用 法：清水三碗煎取大半碗，一日二
次分服，连服一星期。

9. 丁葵草鸡胆汤

适应症：百日咳

处 方：丁葵草一两 鸡胆一个（或猪
胆汁半茶匙）

用 法：用水适量加蜜糖或白糖炖服。

10. 百部糖浆

适应症：百日咳

处 方：百部一斤 红糖或白糖半斤

用 法：用水三斤加入百部煎至约余半
一水共三斤，去渣，加入红糖或白糖搅
匀，装入瓶中待用。每日服三

次，每次一匙，连服五、六天或八、九天。

11. 玉芙蓉汤

适应症：小儿百日咳偏于风热者（口干、舌苔白黄厚滑，咳时气不紧的）

处 方：玉芙蓉枝梢嫩叶十朵（约重五钱）

用 法：用水大半碗煮沸约五分钟，即加入蜜糖五钱调匀，一日三次分服，或将玉芙蓉捣烂，加入蜜糖适量，隔水炖服亦可。

12. 猪仔笼汤

适应症：百日咳

处 方：猪仔笼（干者）一至二两

用 法：用水二碗煎取大半碗，一日二次分服。

13. 大蒜头二钱，去皮捣烂，用冷开水一两浸十小时，去渣，加入蜜糖

或白糖适量调和，一日二、三次分服，连服一星期。

水 痘

水痘是小儿常见的传染病，是由于感染水痘病毒所引起的，这种病多流行于冬天和春天，发病以十岁以下小儿为多。病情比天花、麻疹为轻，发过一次以后多不再患。

【主要症状】

水痘初起时，症状和感冒相似，发热、头痛、咳嗽、烦躁、不思饮食。发热一、二天后红色如米粒大的疹点即于头面部出现，随着胸、背、腹、四肢逐渐出现。疹点透出后由红点而变水泡，顶尖白亮，周围微有红晕，会有透明液体，但不化脓，水泡出现三、四天即逐渐干枯，结成干痂而脱落。水痘的特点是疹点有大有小，有刚刚

出的，有结痂的，有水疱样的，不象天花的疹点大小相等，一齐透发，而且水痘浆液澄清，不化脓，天花灌浆化脓。天花从见点到结痂要十多天，水痘只有四、五天。

【治疗方法】

1. 茅根竹蔗水（方见麻疹）

2. 柚树寄生汤

适应症：水痘（防治均可）

处 方：柚树寄生一两

用 法：用水三碗煎取一碗，一日二次分服（如作预防用，剂量减半，连服三、四天）

3. 英明野菊汤

适应症：小儿水痘感染化脓，身发高热者。

处 方：蒲公英一两 九里明一两 野菊花五钱

用 法：用水二碗半煎取一碗，一日二

次分服。

痄腮（腮腺炎）

痄腮又称流行性腮腺炎，是由于感染病毒引起的一种传染病。广东有些地方叫“蚝腮”或“猪头皮”。这种病多发生在冬天和春天，一般以4~15岁小儿为最多，成人患者较少，患过一次很少再患。

【主要症状】

初起时，一般有发烧、怕冷、头痛、疲倦、胃口不好或恶口呕吐等，跟着耳下腮部就肿胀起来，表皮潮红，有灼热疼痛感觉，轻者只肿不红，不发热，有的单侧发生，有的两侧同时发生，牙关紧闭不方便，吃东西和说话都感到困难，经过3~5日左右才逐渐热退、消肿痛止而恢复健康。

【治疗方法】

1. 公英枯草汤

适应症：疔腮

处 方：蒲公英一两 夏枯草五钱

用 法：用水二碗煎取大半碗，留渣再煎一次，隔三小时服。

2. 了哥王汤

适应症：疔腮、喉痹、小肠气痛。

处 方：了哥王根（干者）一两

用 法：用水五碗煮取大半碗，以一半内服（分二次服，每次隔三小时），一半用棉花纱布蘸敷患处。

3. 银英汤

适应症：疔腮、疔疮

处 方：金银花三钱 蒲公英三钱

用 法：用水二碗煎取大半碗，一日二次分服。

4. 根蓝根汤

适应症：疥癩

处 方：板蓝根一两

用 法：用水二碗煎取一碗，一日三、四次分服。

5. 射干汤

适应症：疥癩

处 方：射干根鲜用五至八钱（干者用三至五钱）

用 法：用水二碗煎取一碗，一日二次分服（饭后服）。

6. 井底泥搅成糊，涂敷患部。

7. 大青叶一两，加水适量煎成浓汁，外涂患部。

8. 鲜扁柏叶适量，蜜糖一匙，将扁柏叶捣烂，加入蜜糖和匀，涂敷患部。

9. 青黛、米醋各适量，共调成稀糊，涂敷患部，每天五、六次。

10. 入地金牛一两，炖酒外搽患部。

11. 龙胆草、鸭舌草（潺竹叶）红糖各适量。捣烂，外敷患部。
12. 用灯芯蘸豆油或生油灼灸两耳尖。

疳 积

疳积，是指小儿消化不良、营养障碍或感染寄生虫而引起的一种疾病。这种病，由于患者体质各异，所以症状亦各有不同，临床上要辨别实证和虚证来治疗。

【主要症状】

(1) 实证的症状：发烧、烦躁、易发脾气，肚子胀硬，有时会响，大便秘，泻出来的粪便腥臭，或有寄生虫，小便白如米泔，不想吃饭，只想喝水，好吃瓜果咸酸，肚子有时痛有时不痛，甚至外现青筋，睡中磨牙，常常吮指甲，挖鼻孔，肌肉消瘦，或者黑眼珠有白膜、夜盲（晚上看不见东西）。治疗以理脾消积为主。

(2) 虚证的症状：面色萎黄，皮肤苍白，肌肉消瘦，毛发干焦稀少，没有精神，不想吃东西，肚子胀，大便泄泻，午后潮热，口唇淡白，潮热时变为焦红，脚软无力。治疗应以补虚、健脾、消积为主。

【治疗方法】

一、实证：根据不同症状选用下列处方治疗。

1. 孩儿珍珠汤

适应症：小儿疳积，食欲不振，消化不良，烦躁不安，易发脾气。

处 方：孩儿草四钱 珍珠草四钱 白花螞蟥草四钱 独脚金二钱
葫芦茶四钱 榧子肉四钱。

用 法：用水二碗半煎取一碗分二次服。

2. 葫芦布渣汤

适应症：小儿疳积，消化不良，腹痛。

处 方：葫芦茶 布渣叶 田鸡草（箕
笃叶） 狮子滚球 各四至五
钱。

用 法：用水二碗半煎取一碗分二次
服。

3. 二金汤

适应症：小儿疳积，消化不良。

处 方：金钱草三钱 独脚金二钱 珍
珠草五钱

用 法：用水二碗煎取一碗分二、三次
服。或加蜜枣、猪肝同煎。

4. 蜆金汤

适应症：小儿疳积，消化不良。

处 方：白花蜆蜆草五钱 独脚金二钱

用 法：用水二碗煎取大半碗分二、三
次服。

5. 石仙桃汤

适应症：小儿疳积，消化不良。

处 方：石仙桃一两 独脚金五钱 瘦猪肉适量

用 法：用水二碗煎取大半碗分二次服。

6. 寮刁竹汤

适应症：小儿疳积，消化不良，肚子胀并有青筋显露。

处 方：寮刁竹二至三钱 蜜枣四至五枚

用 法：用水二碗煎取一碗分二次服

7. 黄花猛汤

适应症：小儿疳积，久热不退。

处 方：鲜黄花猛二至三两 瘦猪肉适量

用 法：用水二碗半煎取一碗分二、三次服。

8. 满天星蒸猪肝

适应症：小儿疳积，眼生翳膜

处 方：满天星（即盆上芫荽）一两
猪肝（或鸡肝）适量。

用 法：将满天星洗净与猪肝（或鸡肝）
拌匀同蒸熟食之。

9. 含羞草汤

适应症：小儿疳积，消化不良，日渐消
瘦

处 方：鲜含羞草一两 瘦猪肉适量

用 法：用水二碗煎取一碗分二次服，
连服数日。

10. 五爪葫芦汤

适应症：小儿疳积，日渐消瘦，形如猴
子。

处 方：五爪龙一两 葫芦茶一两 瘦
猪肉四两

用 法：用水三碗煎取半碗加盐少许，
分两次服。

11. 使君子花炒鸡旦

适应症：小儿疳积

处 方：鲜使君子花五钱 鸡旦一个

用 法：将使君子花切碎与鸡旦搅匀，
放锅内同炒熟食之。

二、虚证

1. 六角英（即罂床）一钱 金锁匙二钱
与猪肝适量同煮熟淡食（不放
盐）连食五、六天。
2. 鲜梧桐叶，瘦猪肉各适量。以鲜梧桐
叶将猪肉包着，放入热火灰中
煨至肉熟（约三至五小时）取
出去叶，吃肉。
3. 鲜白花膨蟆草五钱，蒸猪肝或牛肝吃。
4. 独脚金一两，瘦猪肉一两同煮汤吃。
5. 鲜乌柏叶六片，鲮鱼一条（约重二两
开肚去脏洗净）同蒸熟吃。或将乌柏
叶放入鱼肚中（鱼肚去脏洗净）同蒸

熟，去乌柏叶，吃鱼。

6. 珍珠草一两，蜜枣四枚，加水适量煮汤吃，或与猪肝（或鸡肝）同蒸熟吃。

遗尿

小儿遗尿又叫“尿床”，常见于幼童。但一、二岁小儿因脑髓未充，排尿的正常习惯尚未养成，或因精神激动，引起暂时的遗尿，都不属于病态。

【主要症状】

本病的特征是经常在夜间睡眠中遗尿，病情较严重的，往往伴有面色苍白，恶寒，手足冷，小便清长，或不想吃东西，或大便泄泻，肌肉消瘦，唇白等症状。

【治疗方法】

1. 白果（银杏）三至五粒，用湿纸包裸

放炉内煨熟，于夜间临睡前吃（注意：白果因有毒性，不宜过量吃）。

2. 破故纸适量微炒，研末，每晚睡前用开水调服五分。
3. 龙虱三至五只，加油、盐少许同炒熟，睡前服。
4. 花生米四两加水煎成汤，用此汤煮糯米成饭，吃此饭，数次即可见效，对小儿及成人遗尿均有效。（连花生同服也可）。

夏季热

本病发生于夏季气候炎热的时候，患者以1—5岁小孩为多，发热经久不退，并伴有口渴、多尿、少汗等症状，至秋凉后发热才逐渐消退。因本病和一般暑症有所不同，故名夏季热。

【主要症状】

发热经久不退，往往持续二、三个月之久；气候炎热，则发热较高，或上午发热下午则稍退，或下午发热上午稍退，或头身发热而四肢较凉。并有口渴想饮水，尿多（特别是夜间较多），无汗或少汗。发病初期精神尚好，往往嬉戏如常；但若缠绵日久，则身体渐趋瘦弱，皮肤苍白，贫血，许多兼有食欲不振，烦躁，睡眠不宁，咳嗽咽干，大便不调等症状。

【治疗方法】

1. 葡萄叶汤

适应症：小儿夏季长期发热。

处 方：葡萄叶（即广东俗名菩提子的叶）七片。

用 法：用水一碗半煎取半碗分二、三次服。

2. 倒扣草根二两，用水四碗煎取半碗分二、三次服。

3. 青蒿二钱，大蕉皮三只，椰衣五钱，同煎水，可退热，此方不但可治夏季热，对其他病发热，如感冒发热也有效。

外 科

跌打损伤

跌打损伤分伤筋(肌肉挫伤)、脱臼、骨折、创伤出血等四方面，脱臼、骨折要用手术复位，创伤出血已另有介绍，故本节范围仅限于伤筋。

【主要症状】

轻者只觉伤处有些疼痛，重的伤处立即青肿起来，痛得很厉害，该部肢体活动受到阻碍。有时因跌撞胸背腰腹等部位，伤及内脏或经络，会引起当时吐血，咯血，或内部刺痛等症状，一般叫跌打内伤。如因挑过重的担子在起肩时过分用力而引起的，往往有气促气紧，心髻胁痛等症状。

【治疗方法】

根据不同症状选用下列处方治疗：

一、内服方

1. 香台汤

适应症：跌打肿痛

处 方：毛射香一两 天台乌一两
亚婆钱二两 三丫虎二两

用 法：用水四碗煎取大半碗，加入白
酒一至二两温服

2. 跌打消肿止痛汤

适应症：跌打肿痛

处 方：黑老虎一两 刘寄奴五钱
大还魂五钱 小还魂五钱
血见愁五钱 鸡骨香五钱

用 法：用水四碗煎取大半碗加入白酒
一至二两温服。

3. 桃叶汤

适应症：跌打肿痛

处 方：桃 叶一两 血见愁五钱

透骨消五钱 大还魂五钱
小还魂五钱

用法：用水四碗煎取一碗温服。

4. 龙虎汤

适应症：跌打外伤筋络痛

处方：过江龙一两 黑老虎五钱
千打槌五钱 鸡骨香五钱

用法：用水四碗煎取一碗服。

5. 凤牛汤

适应症：跌打损伤疼痛

处方：凤凰翔五钱 入地金牛五钱
透骨消五钱 黑心姜三钱

用法：用水四碗煎取一碗温服；或将
上药为末，煮酒外敷患处。

二、外用方

1. 跌打散

适应症：跌打外伤，伤处红肿痛甚，不
宜按摩涂擦者。

处 方：田基黄 血见愁 鸡骨香 透骨消 毛射香 入地金牛根皮 各等分

用 法：将上药共研末，贮封备用。用时取适量酒水调煮成羔状，温敷患处，用棉花纱布绷带固定。

2. 跌打肿痛外治方：

(1)毛射香二两 鸡骨香二两 豆豉姜一两 捣烂外敷患处。

(2)韩信草 毛射香 穿破石各等分，捣烂外敷患处。

(3)细叶七星剑捣烂外敷患处。

(4)九里香叶四两捣烂，用米酒半斤浸数小时后用酒外擦患处。

(5)白花丹叶一两 鸡旦白一个。先将白花丹叶捣烂，和鸡旦白搅匀煮成药饼，贴于患处。贴后如觉痛立即

除去，否则可致皮肤溃烂。白花丹对皮肤有刺激性，可使皮肤起泡，故只宜搽，不宜敷。为了防止皮肤起泡，可先用生油搽患处，然后再搽白花丹。（此处方中之白花丹叶也可用牛奶树子代替，捣烂外敷，则可避免对皮肤之刺激性）

汤火烫伤(水火烫伤)

汤火烫伤是一种意外伤害，有因沸水，滚油，蒸气，石灰水等烫伤的，也有因烈火，金属溶液，化学物质烧伤的，统称“汤火烫伤”。

【主要症状】

凡被汤火烫伤的皮肤，会立即变红，起泡，刺痛。轻伤者，伤面较小，皮肤潮红刺痛，或逐渐起水泡；重伤者，伤面较大，伤部立刻起泡焦痛；更重伤者，立刻

皮塌肉烂，或皮焦肉卷，很快化脓流水，疼痛剧烈，心烦口干，发烧，神志不清醒，说乱话。对于烫伤面积很大的病人应迅速送医院处理，以免延误病情。

【治疗方法】

1. 用生姜磨烂敷伤处(可制止起水泡)。
2. 烫伤后皮肤潮红或起水泡，尚未化脓溃烂者，可选用下列处方之一治疗：
 - (1)鸡旦白，茶油(或花生油)共混合调成糊状，外搽患处，日搽数次。
 - (2)食用碱水二两，鸡旦白三个。将鸡旦白与碱水共放碗内调匀，外搽伤处，觉伤处热痛再搽。或单用碱水将消毒棉花湿透外敷，轮流更换，至伤处皮肤清凉感为度。
 - (3)生石膏粉一两，冰片2钱(研粉)，加花生油适量，共调成糊状涂搽伤处。可止痛并可防止皮肤起泡。

(4) 仙人掌，捣烂，外敷伤处。

(5) 广东万年青适量，加入黄糖（或食盐，酒糟亦可）少许共捣烂，外敷伤处。

(6) 金樱根二层皮（或叶）适量，捣烂外敷伤处。

(7) 鸡屎藤叶，适量，捣烂加白酒少许，外涂伤处。

(8) 鲜青蒿叶一两，鸡旦白二个，白糖一两，共捣烂，外敷患处，连敷数天。

(9) 南瓜瓢，捣烂外敷伤处。

(10) 石灰水湿敷患处。（生石灰浸泡在水中较久时间，取上层清水用。）

3. 烫伤后，皮肤发红起泡或伤部化脓溃烂，可用下方外治：

处 方：地榆末 麻油（或茶油，花生油）各适量。

用法：用麻油调地榆末，成膏状，外敷患处，每日换一次。如患处起水泡，先用消毒针刺破。流出泡内水液后再敷药。

蛇 咬 伤

常见的毒蛇有金脚带，饭铲头，银环蛇，百步蛇等，毒蛇一般是头大颈细，头是三角形，尾短而细，身上体纹色采比较鲜明。因毒蛇有毒牙和毒腺，所以毒蛇咬伤的地方出现二至四个齿痕。遇有毒蛇或疑为毒蛇咬伤，尽快采取处理。

【主要症状】

咬伤处皮肤很快发红，甚至发紫、坏死，有时流出稀薄血水，局部有烧灼样剧痛或不疼痛而麻痒，并出现怕冷、恶心、呕吐，甚至眩晕，呼吸急促，牙关紧闭等症。如不及时治理，很快死亡。

【急救处理】

立即用布带扎紧伤口的近心处，即伤口的上方，如咬伤手指便扎指的根部，即近掌心处，咬伤前臂便扎肘关节上方，咬伤小腿扎膝关节上端。目的是阻止毒素从血管侵入人体重要脏器。被咬伤后，结扎得愈早愈好，而且要扎得紧，使血流暂时不能通过，要注意扎的时间不能过长，一次不能超过一小时。扎紧后，立即用干净的针头或小刀将伤口周围皮肤刺破，从伤部四周用手挤出或用拔火罐法吸出毒液。

【治疗方法】

1. 蛇咬伤后，如随身带有火柴，可立即取火柴约20枝，扎成一扎，将火柴头置伤口处，另点燃火柴一枝，引火燃着伤口处的成扎火柴，使其在伤口处迅速产生高温，以破坏蛇毒，可达到抢救目的。

2. 蛇咬散

适应症：毒蛇咬伤，头晕眼花，胸膈作呕，伤口红肿疼痛，或不疼痛而觉麻痒者。

处 方：金耳环四钱 寮刁竹五钱 吴黄四钱 白芷五钱 川连三钱 细辛三钱 川红花四钱 两面针六钱 黄芩四钱 细叶七星剑四钱 鲫鱼草四钱 穿心莲三钱

用 法：上药共研细末，每服三钱，每日三次，白开水送服。外用开水调药末涂伤口周围，可消肿止痛。（本方或用作煎剂分二次服亦可）。

3. 半边莲汤

适应症：同上方。

处 方：七叶一枝花半斤 入地金牛根

四两 半边莲六两 耳草二两
一枝香一两半

用法：将上药切碎用水六碗煎取两碗，加入白酒半斤，分二次服，重症每四小时服一次；轻症每日服二、三次。服此药后如病情无发展变化，可渐渐减少服药的次数。

4. 半剑汤

适应症：同上（二）方

处方：半边莲 七星剑 寮刁竹 蛇王草各五钱

用法：用水三碗半 取一碗冲入白酒适量，乘热服。

蜈蚣咬伤

被蜈蚣咬伤后，常出现一对小孔样的伤口，毒液即由小孔进入人体。

【主要症状】

被咬后的伤口随即出现红肿，热痛。严重时出现恶心、呕吐、头昏等，同时身上被蜈蚣爬过之处，皮肤常发红而瘙痒，有时出现带状疹块。

【伤口处理】

被蜈蚣咬伤或被爬过的部位，先用消毒的针头将创面附近刺伤数处，挤出含有毒素的污血后，再用肥皂水，氨水或小苏打水等硷性药液擦洗患处并冷敷，以中和蜈蚣的酸性毒液，达到消肿止痛。伤口切不可涂碘酒等杀菌剂，因被咬的皮肤不宜再用刺激性药品，否则会使皮肤红肿甚至起泡，增加痛苦。

【治疗方法】

1. 番薯叶（地瓜叶）加入红糖适量共捣烂外敷患处。
2. 七星剑（大、小叶者均可）适量，捣

烂外敷患处。

3. 黄皮核（或叶）适量，捣烂，外擦患处。
4. 将火柴擦燃，在咬伤处上面连烤二、三枝。
5. 用手指甲磨水，搽患处，可消肿止痛。

蜂 刺 伤

【主要症状】

被蜂刺后，伤处立刻出现红肿或发黑等现象，周围会起水泡或风疹块样的红斑，如蜂刺断在皮肤内，宜小心地将毒刺取出。

【治疗方法】

1. 半边旗（鲜叶）适量捣烂，擦患处，可止痛消肿。
2. 火殃筋叶，捣烂，搽患处。

3. 鲜七叶一枝花加入白酒适量，捣烂，外敷伤处。
4. 蜜蜂刺伤用氨水或肥皂洗伤口；黄蜂刺伤用白醋外洗伤口。

外 伤 出 血

本节所指外伤出血，包括锋利的金属、竹木、玻璃、枪炮等损伤和擦伤等造成的开放性创伤，一般可分为擦伤、割伤、刺伤、裂伤等。

【主要症状】

一、擦伤：因摩擦而引起的皮肤表层损伤、创伤表面有少量的出血和淋巴液渗出。

二、割伤：指由刀、玻璃片等锋利的东西所造成的损伤。伤口边缘整齐，内有出血，周围皮肤很少受损。

三、刺伤：指由尖锐的利器造成的损

伤。伤口往往小而深，有时易带进泥、沙等异物，易引起伤口感染和化脓。

四、裂伤：常因钝器所造成。如工厂机器损伤和爆炸伤等都属这类损伤。伤口边缘不齐，往往有肌肉和肌腱的断裂及缺损；有时伤口内有异物存留，发生感染化脓的机会较多。

【治疗方法】

如有出血的，应先鉴别是动脉出血或静脉(毛细管)出血。如果出血来势凶猛，颜色鲜红，随心脏的搏动而呈喷射状涌出的，系动脉出血，应迅速用止血带，或用指压止血法进行急救止血，及时送到医院抢救。一般创伤出血，可选用下列处方治疗：

一、外伤出血

1. 鲜半边旗，花生油、生姜，各适量，捣烂外敷伤口，或单用半边旗捣烂外

敷亦可。

2. 鲜白花蜆蝶草适量，捣烂外敷伤口。
3. 鲜白咸虾花叶（即猫屎草）适量，捣烂外敷伤口。
4. 鲜羊蹄草适量，捣烂外敷伤口。
5. 鸭脚艾（即广东刘寄奴）全草晒干研末，外敷伤口。
6. 鲜岗稔叶捣烂（或晒干研末）外敷伤口。
7. 龙眼核脱出外面黑衣，研末，外敷伤口。
8. 崩大碗（积雪草）适量，捣烂，外敷伤口。
9. 鸭跖草一撮，捣烂，外敷伤口。
10. 鲜香附子适量，捣烂，外敷伤口。
11. 谷木树叶适量，捣烂，外敷伤口。
12. 阴香树皮晒干，研末，外敷伤口，可以止血。

二、竹木或铁器、玻璃等物入肉不出

1. 土狗（蜈蚣）七只，蓖麻子十余粒，共捣烂，外敷伤口24小时，可将异物拔出。
2. 乌梅肉捣烂敷伤口，可将异物拔出。或用火殃藜之乳汁涂在伤口处也可。

三、枪伤、炮伤、炸弹伤

1. 蕉树蕊心（或蕉树花）捣烂，外敷伤口。
2. 南瓜瓢，捣烂，外敷伤口，每日换药3—4次。
3. 番薯叶适量，捣烂，外敷伤口。

湿 疹

本病是一种常见的发炎性皮肤病，皮疹多对称发生，呈多形性，如发红，水肿，水泡，糜烂，渗液、结痂和落屑等。自觉瘙痒，常反复发作。

适应症状：一般多发生于面部和四肢；女性的乳房和外阴；男性的阴囊等处均可发生，急性湿疹，最初皮肤潮红，水肿，随即出现水疱，水疱破裂后形成糜烂面，面上有大量渗出液并结痂。慢性湿疹局部皮肤肥厚，皮肤小沟纹加深，表面粗糙，有鳞屑附着亦可发生轻度糜烂，有小量渗液，可拖延数月，甚至经年不愈，并易复发。

【治疗方法】

1. 桉树叶五两，松树二层皮五两，煎水，待温和，浸洗患处（如无松树二层皮，单独用桉树一味亦可有效）。
2. 火炭母适量，煎浓汁，外洗患处，每日三次。
3. 鲜苦楝树叶（森树叶）适量，煎水，浸洗患处，连续数天。
4. 玉叶金花（又名凉藤、白纸扇）适量，

煎水外洗患处。并用根五钱，红糖适量，煎水内服。

5. 乌柏树叶约半斤，煎水候暖，浸洗患处。
6. 大叶七星剑（细叶者亦可用）适量，煎水外洗患处。
7. 狮子滚球（毛果算盘子）适量，煎水候暖，外洗患处。
8. 苍耳草（全株）一斤，九里明半斤，金银花叶（连藤）半斤，加水适量浓汁，冲枯矾一两，外洗患处。
9. 如意花枝叶适量，煎水外洗患处。

风 疹

风疹又叫荨麻疹，也有人叫“风团”、“风团”。引起风疹的原因很多，有由于对某些食物（如虾、蟹、鱼类、酒等等），药品或吸入花粉，灰尘等过敏所引起的，

也有由于胃肠道障碍、肠道寄生虫，精神紧张以及外界的各种物理、化学性刺激引起的。

【主要症状】

皮肤突然发痒，经搔抓后局部发红，跟着隆起成块成片，形状不一，大小不等，越搔越多，奇痒难忍。全身任何部位皮肤均可发生，常因气候冷热而减轻或增剧，发生和消退都很快，可以在几分钟或几小时内完全消退，不留痕迹，但可复发。治疗以疏表、祛风，活血为主。

【治疗方法】

一、内服

1. 蕤菜汤

适应症：周身风疹，痕痒

处 方：蕤菜 甘草 白糖 各适量。

用 法：煎水内服。或用蕤菜炒饭食，也可治风疹，如患者有热气，

则不宜用此方，可用第 2 方，
因蔬菜性燥热。

2. 一味蒲公英汤

适应症：同上

处 方：蒲公英鲜用二两（干用五钱）

用 法：用水二碗煎取大半碗服。

二、外洗

1. 酒饼叶洗方

适应症：周身风疹痕痒。

处 方：穿珠酒饼叶 山桔叶 毛麝香
大风艾各二两

用 法：将上药切碎，煮汤，加入烧酒
少许，热洗患处。保留此液，
一日洗二至三次。

又 方：桂枝一两，假苏一两，龙眼叶
四两，共煎水外洗，洗前加生
盐少许。

2. 马齿苋洗方

适应症：同上

处 方：马齿苋 红背菜（即羊蹄草）
各八两（鲜用）

用 法：煎水洗擦全身。

3. 桉树叶适量煎水外洗。
4. 细叶浮萍五两煎水外洗。
5. 火炭母叶适量煎水外洗。
6. 五指柑适量煎水外洗。

以上内服、外洗方法可同时并用，也可单独使用其中一种。

疖 疮

疖疮，是生于皮肤上的小疮，是细菌在一个毛囊或皮脂腺内所引起的脓性发炎，民间叫做“生疮仔”和“生疖子”。多发生于夏天和秋天，以小孩为多。一般多生于头面部。

【主要症状】

一般初起略坚硬，突然渐见红色浮肿，疼痛或有微热，数日后变软，皮薄光亮，就快穿破，破后先流出黄白脓水，接着脓中带血，最后流淡红色的水液，等到脓水流清以后，才逐渐愈合。

【治疗方法】

1. 芙蓉叶（或野菊花叶）黄糖各适量，共捣烂，外敷患处。
2. 鲜九里明适量，捣烂外敷患处。
3. 苦瓜捣烂榨汁，外搽患处。（如无苦瓜，可用苦瓜叶代）。
4. 鲜了哥王叶适量，捣烂，外敷患处。
5. 鲜蒲公英二两，鲜田基黄二两，捣烂外敷患处。
6. 入地金牛根，磨冷开水，外搽患处。
7. 仙人掌适量，加入米饭少许，共捣烂，外敷患处。
8. 金银花三钱，绿豆五钱，生苡仁五

钱，煎水代茶饮。

稻田皮炎

稻田皮炎，是从事水田工作的农民易于发生的一种皮肤病。主要发生于春夏农忙季节。

【主要症状】

初起时和田泥、田水接触的手、脚、前臂、小腿等部位的皮肤有瘙痒和灼热感觉，继而出现大小不一的紫红色斑点；较重者可起水泡，并可发生红肿，糜烂，渗液，结痂现象。局部痒痛明显。皮肤损害轻者，于停止下水田2—3天后即可痊愈。

【治疗方法】

1. 明矾一两，茶叶（旧者更佳）一两，用水二斤，煮沸半小时，过滤待用。先将患处用温开水洗净，然后用消毒

棉花球蘸药水搽患处，每小时搽一、二次。

2. 桉树叶五两，苦楝树根皮十两。煎水，待温暖，浸洗患处。
3. 紫苏叶二两，大飞扬草一两，毛射香一两，如意草二两煎水外洗患部。
4. 大叶七星剑一两，煎水洗患处。
5. 毛果算盘子（狮子滚球）煎水洗患处。
6. 旱辣蓼煎水洗患处。
7. 如意草（即臭花草），毛射香，大风杨草，六耳苓各五钱，煎水外洗患处。如患处出水者则只外洗一次，如患处不出水者，可多洗数次。洗后外敷以下药粉则效果更佳。

药粉处方：人工冰片二钱，熟石膏三钱，滑石粉二钱，大黄粉三钱，扁柏叶粉三钱，毛射香

粉三钱，六耳苓粉三钱，紫苏叶粉三钱，白芷粉三钱，如意草粉三钱，共混合均匀。

脚底石硬

【主要症状】

本病是由于脚底胼胝受到微小损伤，感染细菌而引起的。初起的脚底趾前周围痒痛、硬实，皮色不变，内里灼热，行动则疼痛增加，有时还可看到表皮下面有黄灰色脓点。日久则内部化脓，由于脚底胼胝表皮坚厚，脓液往往向下穿破真皮而形成皮下脓肿，此时患部由硬实转为肿软，疼痛也随之增剧。

【治疗方法】

1. 仙人掌一块，去刺，放在烧热的砖块上，再将患脚踏在仙人掌上，使热气

通过仙人掌透入患处，砖块冷后再烧热，如法行之，连续数次。

2. 火殃萋一段，去刺，煨热，乘热放在患处，使热气透入患处，冷后再煨热，连续数次。
3. 樟脑、豆豉、蒜头各适量共捣烂敷患处。
4. 将樟脑少许放在患处，用火点着樟脑灸之，见痛为度，连灸数日，每日一次。
5. 生葱、生蒜头、槟榔灰各一两，捣烂，用黑醋煮糊微热敷上，冷则再煮，反复敷之。
6. 尖尾风（痕芋头）适量，捣烂，用黑醋煮成糊状，热敷患处，冷后则煮热再敷，反复敷之。

鸡 眼

本病主要是由于脚底或趾缘局部长期受压和摩擦，使皮肤角质层增厚所致。

【主要症状】

高于皮肤面的硬结，结的中心为一圆锥形的再化物质，尖端压迫真皮的神经而产生疼痛。本病好发于易受压迫和摩擦的部位，如趾缘和脚底等处。

【治疗方法】

1. 鸦胆子外治法：

- ①将鸦胆子压榨后取油涂治鸡眼。
- ②先将患部以热水浸渍，使鸡眼软化后，即将患部进行消毒，以消毒的小刀分次由浅至深削去鸡眼，随即用鸦胆子捣烂敷患处固定。药量按鸡眼大小而定。
- ③鸦胆子一粒去壳，放在灯火上烧熟

压扁，贴在鸡眼上面，用胶布固定，每日换药一次，约敷26天，即可脱落。

2. 满天星（鲜）适量。先将鸡眼用热水浸软，将外层硬皮割除，用消毒针将鸡眼刺破微出血后，将满天星捣烂，贴上，外敷纱布，约三天则鸡眼全部脱去，并无痛苦。
3. 乌梅肉、白醋，各适量。共捣烂，敷于鸡眼处，敷前先用消毒针刺鸡眼周围然后敷药。
4. 用热水浸渍鸡眼患部，使鸡眼软化，用小刀剥除鸡眼外皮，然后用消毒针刺鸡眼心处，使见血。再用火柴或香烟烧鸡眼心处，数次即愈。

癣

本病是由感染真菌所引起的一种传染性皮肤病。传染性强，传播相当广泛，是一种常见的皮肤病，有“金钱癣”、“股癣”、“牛皮癣”等。

【主要症状】

初起时先感觉皮肤发痒，以后起红色粟粒一样大的丘疹，表面稍有损皮落屑的现象。搔损之后，逐渐扩大，融合成片，边缘明显，形状不一大小不等，多发于颈项，肘部、腋窝、两腿内侧等处。治疗以杀菌止痒为主。

【治疗方法】

1. 蒜头一个，切开擦患部，日擦数次。
2. 椰子壳油：外用患处。

附椰子壳油制法：用炭火在椰子壳上面燃烧，油自然流下，以杯盛装，装

入瓶中待用。

8. 熟烟叶四两，黑醋十两，同煎至黑醋约余四两，除去烟叶不要，将存下黑醋加面粉一两，搅成药羔，外搽患处。
9. 火秧藨（榨汁）涂敷患处。
5. 老糠油（即米糠榨出之油），外搽患处，日搽数次。
6. 珠兰叶一至二两，卷成筒状，夹生盐擦患处至微出血为止，连擦三次，至皮肤呈黑色则愈。
7. 白花丹叶外搽，治牛皮癣。
8. 樟树枝的乳汁，外搽可治婴儿奶癣。

痔 疮

痔，是肛门直肠的静脉发生曲张而形成的。位于肛门括约肌内侧称为内痔；在外括约肌外侧称为外痔。

【主要症状】

内痔最初症状是便后滴鲜血，大使用力时痔核脱垂，大便后能自动退回肛门内，最后由于痔核经常脱垂，即不易退回肛门内，而产生剧痛、水肿、发炎甚至坏死而引起排便困难。

外痔通常无症状，但当排使用力过猛，引起静脉破裂出血，形成血栓后，则疼痛剧烈，局部可变紫黑色硬结，有明显压痛。

【治疗方法】

1. 丁癸草五钱，银花四两，苦楝皮四两，用水适量煎取药液，倒于浴盆内，乘热坐于盆上熏肛门，待水稍凉后即坐于药水内浸洗，约浸半小时即可，每日1—2次，连续4—5天。
2. 鲜马齿苋二斤，酸醋二斤，用水三斤煲浓，先熏后洗。

注：本方对痔疮初起有效，亦可缓解

疼痛。

3. 白茅根六两，龙眼肉二两，加水 10 碗，久煎至 1 碗，内服，可治痔疮出血不止。服后可感到痔疮收缩进去，服三次可见效。如用鲜茅根(10两)则效果更佳。加瘦猪肉四两同煎尤佳。

蛇 头 疔

蛇头疔是指头深部的急性脓性感染，俗称“蛇头箍指”，多由于针或木刺伤所引起。

【主要症状】

最初发炎的指头有针刺样触痛，以后有肿痛，发热和胀痛，化脓时除胀痛外还有剧烈的跳痛，这时体温有升高和全身不遑。当大部分组织已经坏死时，疼痛反而减轻。蛇头疔常引起指骨坏死而转为慢性骨髓炎。

【治疗方法】

1. 大叶七星剑 1—2 两，煎水外洗，或加黄糖少许共捣烂敷患处。
2. 猪鬃稔（全草）六钱，瘦猪肉适量，清水煎服。
3. 了哥王二层皮为末，鸡旦五只，将鸡旦顶上开一孔，每个鸡旦入了哥王粉一分五厘，搅匀蒸熟给患者服，每隔 2 小时一个。
4. 白花螞蟥草、羊蹄草各适量，捣烂敷患处。
5. 闹洋花叶、酒糟各适量，共捣烂敷患处。如无酒糟，单用闹洋花叶亦可。
6. 风雨草（根）适量，捣烂外敷患处。

无名肿毒

【主要症状】

本病主要特点是患部无明显创伤，突

然红肿热痛，或肿而不红，木硬微痒而痛，无明显边缘分界。

【治疗方法】

1. 菊花叶、羊蹄草各适量，与红糖共捣烂外敷患处。已溃的与蜜糖共捣烂外敷。溃后脓水不干者，加车前草适量与蜜糖共捣烂外敷，或单用车前草叶烫开水后以叶片贴患处。
2. 崩大碗、虾钳草各适量，共捣烂（或加梅片少许）外敷患处。
3. 杨柳叶、杨桃叶、扁柏、绿豆各适量，共捣烂外敷患处。

五官科

暴发火眼

暴发火眼即急性结膜炎 系细菌感染所致的疾病。此病常在春秋二季流行。由于手、手帕、毛巾等用具不洁而将细菌带入眼内引起。

【主要症状】

眼白发红疼痛、流泪、怕日光、眼屎多，眼痒，眼痛，严重者眼白起红筋，眼泡肿、头痛、有先患一目而传及二目，有二目齐起，又有一目刚退，另一目又起的。

【治疗方法】

1. 英明汤

适应症：风湿眼痛。

处 方：蒲公英八钱，九里明八钱。

用法：用水二碗煎取大半碗温服，日服一次或二、三次。

2. 榕英汤

适应症：风热眼痛。

处方：细叶榕树叶六钱，蒲公英一两

用法：用水二碗煎取大半碗温服。

3. 草决犁头汤

适应症：风热眼痛。

处方：草决明五钱，犁头草五钱，珍珠草五钱，白花蜘蛛草五钱，

用法：用水三碗煎取一碗温服。或单用珍珠草、犁头草二株亦可。

4. 自扣草汤

适应症：眼热发红而痛。

处方：自扣草五钱，老鼠拉冬瓜一两。

用法：用水二碗煎取一碗，饭后服。

如无老鼠拉冬瓜可改用犁头草三钱同煎。或单用自扣草一味

加红糖适量煎服亦可。

5. 苦地胆二两，瘦猪肉适量，煮汤服。
6. 白花螞蟥草一两，黄豆五钱，瘦猪肉二两，清水四碗煎取二碗服。
7. 草决明五钱至一两，清水一碗半煎取大半碗服。
8. 夏枯草一两，白豆一两，清水三碗煎取一碗加入白糖(或红糖)少许温服。
9. 鲜桑叶一两，狗肝菜一两，白豆五钱，清水三碗煎取一碗服。
10. 土公英一两，野菊花五钱，清水二碗煎取一碗温服。并将药渣复煎薰洗患眼。
11. 鲜犁头草七钱，清水一碗半煎取大半碗服。
12. 倒扣草二两，蔓荆子五钱，猪肝一两，清水煎服。
13. 草决明五钱，猪肝一两，清水煎服。

14. 白面豆花三至五钱，清水煎服（或加瘦猪肉同煎）

15. 自扣草外敷脱膜法

适应症：风热眼痛、眼生点膜

处方：鲜自扣草适量，捣烂。

用法：以胶布一小块（约1.5寸见方）中间剪一小孔，贴在手腕尺脉处（小孔对正尺脉）然后将捣烂的自扣草放小孔中，再用纱布包裹，约一小时后将药除去。左眼有膜敷右手，右眼有膜敷左手。

注意：本药有刺激性，勿用手指接触，否则接触处皮肤即起水泡，更不能入眼。敷药后让敷药处的水泡自行吸收，切勿弄破，以防感染。

16. 鹅不食脱膜法

适应症：风热眼痛，眼生点膜。

处 方：鲜鹅不食草（全草）约三钱。

用 法：将鲜鹅不食草搓软，分塞两鼻孔内，每日塞三次，每次塞一小时。如喷嚏将药喷出则再塞。塞时要松紧合度。连塞二至三天。

中 耳 炎

中耳炎系指中耳化脓发炎，是耳孔里面有脓液流出来的一种疾病。多由于化脓性细菌感染而引起。在临床上有关实证和虚证的分别。

【主要症状】

1. 实证的症状：发病较急，耳孔里面忽然肿痛，初起时或有兼见怕冷发烧，约五至七天溃破，流出黄色或红色稠脓，这时才烧退痛减。治疗以清热泻

火为主。

2. 虚证的症状：初起多见怕冷，发烧，肿胀疼痛，而且不易消散，经过时间较久才化脓，流出的脓水黑臭或青白，耳内有蝉鸣或耳聩，有的许久不愈，终年脓水不干。治疗应以滋阴降火为主。

【治疗方法】

1. 金线吊芙蓉(虎耳草、老虎耳)捣烂，(或加盐少许)取汁滴耳内二至三滴，每日三、四次，滴时先用醋洗净耳内脓液。
 2. 蚕茧一只烧灰加冰片五分，先将醋洗净耳内脓液，然后掺入。
8. 旱莲草汤

适应症：耳痛流脓。

处 方：旱莲草一两，金银花六钱。

用 法：清水三碗煎至八分温服。

4. 磨盘草汤

适应症：耳痛、耳聋。

处 方：磨盘草二两（干用，或甩子20—30个），瘦猪肉适量。

用 法：清水四碗煎成一碗服。

5. 入地金牛适量磨烧酒或醋搽患部，治耳道生疮疖，耳部红肿。

6. 猪鬃稔汤

适应症：耳痛。

处 方：猪鬃稔一两，猪耳一个。

用 法：清水煎服。

7. 山白芷盘草汤

适应症：耳聋。

处 方：磨盘草根二两，山白芷二两，望江南二两，猪尾适量。

用 法：清水煎服。

鼻 出 血

鼻出血（俗称衄血）是一种症状。往往由于指头挖鼻，鼻粘膜干燥而出血。鼻出血通常是一侧鼻出血，很少双侧鼻出血。

【主要症状】

鼻孔流出鲜血，有的患者神经紧张，如大量鼻出血患者面色苍白，脉弱，全身无力，头昏，血压下降，甚至引起休克，长期反复大量鼻出血，可引起贫血。

【治疗方法】

1. 安石榴花瓣卷筒状塞鼻孔中。
2. 药棉花一球蘸浓黑墨汁（现在市上卖的墨汁无效，一定要松烟墨或药墨磨汁），塞鼻孔中。
3. 茅根花一两，清水两碗煎成一碗内服（孕妇忌服）。

4. 旱莲草(鲜)若干，洗净后捣烂取汁，每次取五酒杯炖热，饭后服，日服两次。
5. 九节茶(树皮)五分研末、开水送服(本方并可治吐血)。
6. 藕粉适量，蜜糖适量炖服。
7. 生藕节二两，捣汁服或清水煎服。
8. 茅根一两，枝子炭三钱，清水煎服。
9. 生大蒜瓣若干、去外皮，捣烂贴两足心，用布捆扎，一夜取下洗净，一二次即可断根。
10. 线(细线、缝衣线)，用线扎中指近掌第一节、左鼻出血扎右手，右鼻出血扎左手，左右鼻出血，两手俱扎，可临时止血。
11. 肉桂子(干)五钱，塘虱鱼两条，清水煎服，治鼻出血反复发作。

。治小一。治

白 喉

白喉是由于白喉杆菌感染而引起的一种喉科疾病，多见于幼婴，患过此病后多数不再患。

【主要症状】

患者精神稍差，中度发热，热度常不太高，食欲减退，喉痛和头痛，咽和扁桃腺发红，继而扁桃腺体上出现白点或薄膜，以后白点渐渐扩大变厚成灰白色假膜紧附于咽和扁桃腺上，不易除去，严重者可蔓延至软腭，咽后壁鼻咽和喉部，呼吸困难，患者由不安而转入昏迷，如不及时抢救则窒息而死。

【治疗方法】

1. 土牛膝根一两，清水煎服。
2. 木槵子十粒，去壳打碎，蜜糖适量，清水半碗，炖一小时服。

3. 木槵子核五粒，冰片一分研末和匀先吹喉，过半小时后以开水送下小许，分数次。
4. 土牛膝二两，枇杷叶一两，甘草二分清水两碗，煎至一碗温服。
5. 巴豆内仁，朱砂各等份，分别研细末，再混合研匀，每次取约三厘，置一般万应羔上为药心，贴病者眉心稍上印堂处（勿误入眼目）经八小时后取去，局部皮肤现红紫色，并生小水泡，小心刺穿吸去泡内水液（慎勿误入眼目）然后涂上龙胆紫液。并保护局部皮肤。
6. 旱莲草二至三两，捣烂加盐少许，冲开水出渣服。
7. 鹧地菊一两，清水煎服，每隔日服一次，服七次可预防白喉。

重刊 草部 卷之三

咽喉肿痛

咽喉肿痛是指咽喉部位局部红肿发炎引起疼痛，多系局部或全身受凉而引起。

【主要症状】

咽喉部有干痒和疼痛，声音嘶哑，干咳有少量粘液，体温正常，儿童可能出现呼吸困难等。

【治疗方法】

1. 鹧地菊汤

适应症：咽痛喉炎

处 方：鹧地菊三至六钱（鲜五钱至一两）

用 法：清水煎至半碗。漱口二至三次后剩下温服。

2. 单味旱莲草汤

适应症：喉炎

处 方：旱莲草适量

用 法：捣烂取汁一杯服

3. 黄石汤

适应症：咽喉肿痛

处 方：黄瓜仁（全草）三两 石羔四至五钱。

用 法：清水煎调白糖，早晚饭前各服一次忌食酸辣酒。

4. 霜牛皮汤

适应症：咽喉痛

处 方：盐霜柏二钱 土牛膝一钱 陈皮八分。

用 法：清水四碗煎至大半碗服。

5. 一味穿心莲散

适应症：扁桃腺炎、喉头炎所引起的喉痛。有清热解毒功用。

处 方：穿心莲

用 法：全草晒干研末，开水冲服，每次一至二分。

6. 香刀汤

适应症：喉头炎

处 方：一枝香二两 山大刀五钱

用 法：煎水加蜜糖分三次服。

7. 单味葫芦茶汤

适应症：咽喉肿痛。

处 方：葫芦茶二两

用 法：煎水含咽。

8. 单味无棣子蜜

适应症：喉毒肿痛。

处 方：无棣子（去核）二两，蜜糖四两。

用 法：浸半个月可用，每日含三至五次，每次含咽半只。

9. 水瓜络五钱至一两，清水二碗煎至半一次服。治喉痛声嘶。

10. 橄榄汤

适应症：儿科喉痛

处 方：橄榄20个、水芦根四两。

用 法：清水四碗煎至一碗温服。

11. 水瓜叶汤

适应症：儿科喉痛

处 方：水瓜叶（干）一两 篱栏藤一
两。

用 法：清水四碗煎至一碗温服。

扁 桃 腺 炎

扁桃腺炎（俗称喉蛾），是由于细菌侵入扁桃腺体引起的一种炎症。

【主要症状】

患者感到畏寒发热全身不适，头痛肢体和腰背痠痛，吞咽疼痛。这些症状在起病二至三天最为显著；腭扁桃腺体发红肿大；两侧扁桃腺体上都可以看到一些淡黄色或白色的脓点。小儿患者一般体温较高，

可高到 40°C 或更高，有时还伴有呕吐或腹泻等。

【治疗方法】

1. 卤地菊汤

适应症：治蛾喉

处 方：卤地菊六钱（鲜一两）

用 法：和醋煎再用消毒过的棉花包扎
筷子头蘸药醋拭患处，如果牙
闭不开，则用开口器开之然后
抹拭，毒涎流出后，口即自
开。

2. 倒扣草（鲜）全株捣烂取汁开水冲服
治双、单蛾喉。

3. 岗梅根四两（鲜用）切片，清水三碗
煎至一碗服，治双、单蛾喉。

4. 土牛膝鲜根半斤，捣烂榨取自然汁，
加盐少许，煎浓汁缓缓吞咽并留一部
分含漱。治喉痛，双单蛾喉。

5. 黄牛汤

适应症：蛾喉

处 方：田基黄一两 土牛膝一两

用 法：清水煎服，另用鲜药捣敷患处。

牙 痛

牙痛是由于龋齿（俗称虫牙），齿髓，牙周膜引起细菌感染，发热，局部肿胀刺激牙部神经而引起牙痛，甚至牵引面部及头部疼痛，为农村中常见的一种疾病。

【主要症状】

口腔内牙龈边缘红肿，甚至溃烂，牙齿松动，局部疼痛甚至牵引面部及头部疼痛，精神欠佳，厌食，如不即时治疗可蔓延为溃疡性口臭或溃疡性咽喉炎。

【治疗方法】

1. 水杨梅根汤

适应症：牙龈红肿疼痛，或蛀牙疼痛。

处 方：水杨梅根五钱 蛇泡藕五钱
人地金牛五钱 山芝麻五钱

用 法：清水三碗煎取一碗温服。

2. 人地金牛汤

适应症：风火牙痛

处 方：人地金牛一两 山芝麻五钱

用 法：清水三碗煎取碗半，服半碗其
余含漱。

3. 露蜂房汤

适应症：牙龈红肿疼痛

处 方：露蜂房一两 冰糖二两

用 法：清水二碗半煎至一碗温服。

4. 山石汤

适应症：牙龈红肿热痛。

处 方：山枝根一两 生石膏一两 冰
糖适量。

用法：清水二碗煎至一碗温服。

5. 单味救必应散

适应症：风火牙痛

处方：救必应一两

用法：研末分五次开水冲服。

6. 乌梅五个 白糖五钱清水碗半煎至半碗温服。

7. 酸味草（叶）适量用开水洗净捣烂放患牙上适应烂牙痛及牙肉浮肿。

8. 杜衡（叶）适量塞于蛀牙孔中治蛀牙痛。

9. 指甲花全草（凤仙花）四两 生盐五钱，捣烂敷患处，治牙龈红肿疼痛将化脓。

10. 苧麻根一两，糖冬瓜适量清水煎服。治牙龈出血。

11. 地骨皮烧灰和食盐研末，抹于牙龈出血处或每日用以刷牙，治牙龈出血。

12. 食盐 将食盐少许塞在患牙牙肉处，可临时止痛（或用盐水常漱口）。
13. 香蕉两只、麦门冬三至四钱煎水服，治风火牙痛或龋齿肿痛。（香蕉可食）。
14. 英明汤
适应症：口腔粘膜红肿疼痛。
处 方：蒲公英一两半 草决明一两
用 法：水三碗煎取一碗温服。

喉 头 骨 鲠

喉头骨鲠是由于饮食不慎，将鱼刺或其它动物的骨碎等异物刺伤喉头或软腭，卡于喉头部位，不能吞咽下去亦无法吐出来，称为喉头骨鲠。

【主要症状】

喉头感到疼痛，刺激气管引起呛咳，并伴有恶心，呼吸困难，时间久会引起局

部充血肿胀，甚至感染化脓，需要迅速就医治疗。

【治疗方法】

1. 威灵仙五钱，白醋少许，煎汤后缓缓咽服。
2. 凤仙花（鲜全草）捣烂调醋适量取汁含咽。
3. 凤仙花全草山松叶各适量供烧成炭研末，每次服五分，用酒送服。
4. 生橄榄 嚼汁吞之。
5. 咸梅汁（酸梅汁）用开水冲淡连续含之。
6. 铁包金一钱 千斤拔六钱 沙姜三钱 硝磺（炮竹药）三钱 烧酒四两。共捶烂，煨熟烫敷颈部、同时患者自行旋转颈部作咽物状，一般敷一小时其骨自下。如有红肿加蓖麻叶三钱。另用马鞭草二钱，淡竹叶二钱煎水含

嫩。

眼 偷 针

眼偷针又称“针眼”“粟疮”。多因过多食辛辣食物，胃经热毒上攻而引起。

【主要症状】

上眼睑或下眼睑突然出现象粟粒大小的硬块，微痒微肿，继则红痛，并有脓液，穿破后即自行消散。

【治疗方法】

1. 生南星 生地黄，研成膏状，涂两太阳穴。（注意：生南星有毒勿入口眼，要用纱布胶布固定太阳穴处。）
2. 用线一条缠紧中指近掌心节处。左眼缠左指、右眼缠右指。
3. 用针（消毒后）刺破耳朵最高点，流血一二点即愈，左眼刺左耳，右眼刺右耳。

备战、备荒、为
人民。

毛泽东

1.一 枝 香

【别名】一枝香（增城、东莞、清远），老虎屎（增城、东莞、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、潮阳、潮安、五华），一支箭（罗定、清远），山介菜（新会、阳江、高州、茂名），山白菜（台山、新会），老虎须（花县、番禺、河源、连平），土细辛（化州），黄花蚊（从化），本土细辛（化县），一枝香，六月雪（东莞），大叶七星剑，金边菊，一枝黄花，一柱香（广州），山厚合（潮汕），黄花老虎屎（普宁），金汤匙，山金汤匙，金顶龙牙（潮安、潮州、澄海），金花草（饶平），土红花（潮阳），山蒺藜（海丰）。

【植物形态】多年生直立草本，高达1米，茎单生或有时有少数的分枝，被疏柔毛。叶纸质，下部较大，具柄，卵形至矩圆形，长1—2.5厘米，稍有极小的锯齿。头状花序，单生或2—4个聚生于一腋生的短花序柄上，或为一顶生。瘦果秃净或有小柔毛。

【药用部分与性味】药用为干燥全草，味辛，性微温。

【效用】功能破血，通关窍。

【用量】每用5钱—1两，煎水至沸即服，不可久煎，久煎令人作呕。



1. 一枝香

Solidago virgo-aurea Linn. (菊科)

。黃蘗根，西... (1911)

2. 九 里 明

【别名】 九里明（高州、化州、阳江、阳春、茂名、顺德、罗定、合浦、湛江、乐昌、植物名实图考），千里及（本草拾遗），千里光（图经本草），九龙光（湖南）。

【植物形态】 多年生草本，茎木质，攀援状多分枝，枝稍作之字形，有浅条纹，密被细软毛；高1—2米。单叶互生具短柄，长卵圆形或披针形，边缘有不整齐的齿或浅缺刻，端渐尖，基部楔形或近楔形，表面深绿色，背部灰绿色，两面被细软毛，侧脉5—6对，在背面隆起；头状花序常呈伞房状或圆锥状扩展，腋生和顶生，白色；瘦果圆柱状有棱，多数，顶端冠以白色冠毛。

【药用部分与性味】 全草，味苦辛，性微寒。

【效用】 能清热解毒，杀虫止痒，活血消肿止痛，清肝明目，去湿，治眼目肿赤，翳障不明，迎风流泪，痢疾，大肠湿热，小便不通，腹痛下痢，热毒疮疖，外敷烂头痔疮，火疗蛇伤，外洗瘰疬及一切皮肤痒疹。

【用量】 1—2两，外用适量。



2. 九里明

Senecio scandens Buch-Ham. (菊科)

3. 九里香

【别名】 九里香（从化、花县、增城、南海、番禺、新会、台山、罗定、清远、乐昌、五华、紫金、澄迈、琼海），千里香，九牛入城（广宁、四会、德庆、封开、怀集，生草药性各要），万里香（海口、定安、屯昌），九树香（普宁），七经通（电白、徐闻、海康、遂溪、廉江），石桂树（陆丰），月橘（中山传信录），半天雷，木万年青，七里香（广州）。

【植物形态】 常绿灌木或小乔木，高1—3米，（或有高达3—8米）木材极硬，分枝多，小枝圆柱形，秃净或幼嫩部被小柔毛，叶互生，奇数羽状复叶，叶轴无翼，无托叶，小叶3—9片，互生，具油点，叶片变异大，卵形，倒卵形，倒披针形，椭圆形或近菱形，端渐尖或急尖，有时钝而凹入，基部阔楔形或楔形，很少近圆形，全缘，表面深绿色，有光泽，背面绿色，中脉两面凸起，无毛，侧脉不明显，聚伞花序具小数的花，顶生或腋生，花白色，极香；浆果朱红色，有疣点，种子具棉质毛。

【药用部分与性味】 叶、根。味苦辛、性温。

【效用】 能行气，止痛，活血散瘀，止血，消肿解毒，杀虫止痒，治跌打肿痛，风湿气痛，牙痛，蛇咬伤，疥癣，湿毒。

【用量】 鲜用1—2两，干用5钱—1两。



3. 九里香
Murraypaniculata (L.) Jack. (芸香科)

4. 丁 癸 草

【别名】 丁贵草（从化、花县、博罗、东莞、番禺、顺德、南海），人字草（高要、罗定、高鹤、新兴、阳江、阳春、茂名、高州、化州、湖阳、潮安、博罗、东莞），瓜仁草（澄迈、琼海、海口、定安、屯昌），铺地锦（新会、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、合浦、湛江、钦县、惠阳），乌蝇翼草（梅县），砂甘草（五华），牛心莫沙草（增城），双雀瞷草（罗定、新兴），龙川草（乐昌），砂甘葛（紫金），乌龙草（普宁、陆丰、惠来），地沙草（南海），乌蝇羽（增城），苍蝇翼（潮汕），金鸳鸯，披地凤（潮安、潮州），螺蚌草，蚁古草（汕头、澄海、南沃、潮阳），蚂蚁草（普宁），且蚁草（南沃），铁成草，乌豆草（惠来）。

【植物形态】 本品为长约20—40厘米的纤弱草本，根较粗壮，圆柱形，地上茎紧密丛生，细长纤瘦，粗1毫米左右，灰褐色或黄褐色，无毛，微具小叶二枚，生于叶柄顶端，披针形，总状花序纤细，长约2—6厘米，花2—10朵，花小，青绿色，荚果2—4节，棕褐色。

【药用部分与性味】 药用干燥全草。味淡性凉。

【效用】 清热，解毒，凉血，散瘀。

【用量】 5钱—1两。



4. 丁癸草

Zornia diphylla Pers. (蝶形花科)

5. 七叶一枝花

【别名】 枝花头（广州），重楼，重楼金线（唐本草），蚤休（本经），重楼草（植物名汇），七叶一枝花（增城、东莞），七叶枝花（阳江、阳春、罗定），七叶莲（电白、茂名），七枝莲（电白），七指莲（连平），鸡爪莲（乐昌），金线重楼（广州）。

【植物形态】 多年生草本，高达1米。根状茎肥厚，伏地横生，节间短，地上茎不分枝，直立基部有数片鞘状叶，单叶轮生，着生于近茎的顶部，排成1轮，很少有排成2轮，每轮有3—10叶，但通常为七叶，具柄，叶片长椭圆形或阔披针形，端急尖或渐尖，基部钝或圆形，边全缘，叶面绿色，叶背浅绿色，有时带淡紫红色，两面无毛，小叶具柄。花单独面顶生，花柄长，花绿色，基部淡黄色。浆果球形，暗紫色。

【药用部分与性味】 根状茎。味甘辛，性平。（本草纲目：味苦性微寒，有毒。）

【效用】 能祛痰平喘，熄风定痫，散结解毒，消肿治痰多咳喘，喉风喉痛，小儿惊痫，小儿风痰，肺癆久咳，慢性胃病，跌打损伤，无名肿毒，毒蛇咬伤，痈疽初起，瘰疬痈肿，疟疾寒热。

【用量】 2—5钱。



5. 七叶一枝花

Paris polyphylla Sm. (百合科)

6.入地金牛

【别名】两面针（广州、陆丰、普宁、惠来、高明、英德、阳江），川椒，山胡椒（阳春），山椒（海南），上山虎，下山虎，恶家婆（东莞），猫支笔（惠阳），刺刀根（潮安），两边刀（番禺），山胡椒（惠来），鸡胡椒（阳春），落地金牛（广州），双面刺，鞋底刺（潮汕），野牵牛（揭阳、澄海），牵牛刺（惠来），胡椒刺（揭阳），花椒根（潮安），牛刀刺（普宁），草鞋刺（澄海），夜牵牛（陆丰），牛鬃勒（广州）。

【植物形态】本品为木质藤本。幼枝，叶柄及小叶的中脉上多少有钩状小刺。叶为羽状复叶，长7—15厘米，有小叶3—9枚，小叶具短柄，革质而亮，卵形，长4—7厘米，宽2—3.5厘米，花小，为腋生。

【药用部分与性味】用根。性微温，味苦辛。

【效用】祛风，行气，活血，散瘀，消肿，止痛，可治跌打肿痛，风湿骨节痛，小肠疝气，牙痛（煎水含漱），疮疡。

【用量】内服1—2两，外用适量。



6. 入地金牛

Zanthoxylum nitidum (Lam.) DC. (芸香科)

7. 了哥王

【别名】地棉根（梅县），鸡仔麻（罗定、阳春），消山虎（广州），狗屎麻（湛江、合浦、钦县），九信药，九虎药（番禺、南海），山黄皮（惠阳），坡笠麻（化县），哈仔草（阳春），地棉苳（五华）。

【植物形态】本品为分枝小灌木，高约30—60厘米。单叶对生，叶纸质，近无柄，倒卵形，长2—5厘米，宽8—16毫米，叶全缘。花黄绿色。浆果卵形，长约6毫米，熟时大红色。

【药用部分与性味】主要用根二层皮，叶也可外用，叶有腥气，味苦，性寒有毒，如久熬或加酒九蒸九晒可降低其毒性，性也由寒转凉。

【效用】清热，解毒，消肿，祛湿，化痰，可治痲疹发热，腹胀，风湿骨痛，疔疔，梅毒，麻风，外用于疮科，治疗痲疮肿毒，烂肉溃伤，煎汤外洗或配合其他药作成药羔外敷，鲜叶捣烂外敷也可治种毒疮疡。

【用量】内服5钱—1两（根二层皮），外用适量。

【说明】本品有毒，内服须久煎可降低其毒性，应煎2—3小时或更久，广州中药总厂出品的中成药“解毒消炎片”及“解毒消炎羔”即为本品根二层皮制成。



7. 了哥王

Wickstroemia indica C. A. Mey. (瑞香科)

8.三 稔

【别名】 阳桃（本草纲目），杨桃（高州、化州、茂名、阳江、阳春、乐昌、高要、罗定、增城、五华、电白、陆丰、普宁、定安、屯昌、海口、澄迈、琼中、乐东、清远、钦县），新杨桃（从化），三敛（广州），酸三稔（广州常用草药），五敛子，三廉子（广州植物志）。

【植物形态】 常绿小乔木，高达8米，树皮灰白色，幼枝深棕色，具明显的皮孔。叶互生或近对生，奇数羽状复叶，纸质，有小叶5—9片。叶柄及叶轴被柔毛，小叶具短柄，椭圆形或卵形，端渐尖，基部偏斜，叶面绿色，有光泽，叶背淡绿色，主脉处被柔毛，全缘。花集成腋生圆锥花序式的聚伞花序，花序柄棕红色，花小，白色至淡紫色，近钟形。浆果卵状或椭圆形，具五棱成熟时黄绿色，表面光滑。

【药用部分与性味】 叶、果、花、根。味酸甘澀，性平。

【效用】 能健胃消食，润肺，化痰止咳，排脓拔毒，收敛止泻，止渴生津，利小便，治肠胃食滞痛，伤风咳，风热感冒，咽干口燥，咳嗽痰多，消化不良，外敷疮痍。

花能治跌打。

【用量】 1—2两。



8. 三 稔

Averrhoa carambola Linn. (酢浆草科)

9. 三星草

【别名】 三荚草，顶棍草。

【植物形态】 根茎柔弱，横伸茎纤弱，高10—50厘米，秃净，通常散生。叶狭，长短不一，长3—10厘米，宽1.5—3毫米。头状花序常单生，卵形，绿色。坚果扁形，长约1毫米。

【药用部分与性味】 药用干燥全草。味甘淡，性平，气微香。

【效用】 透达表里伏邪，镇咳祛痰。

【用量】 鲜用2—3两，干用5钱—1两。



9. 三星草

Kyllinga brevifolia Rottb. (莎草科)

10. 土三七

【别名】黑心姜（广东大部分地区），兰肉姜，血母姜，毛黄姜。

【植物形态】直立草本。根茎厚，肉质，稍有香味，淡黄色，块茎多数，圆柱形。叶大成对，直立具柄，中部常有紫斑，椭圆形，长25—70厘米，宽5—15厘米，全缘叶背光滑，叶柄长于叶片。花茎从根茎生出，春天始见，常先叶而出，花粉红色，顶端淡黄色，春季开花。

【药用部分与性味】用根茎。性微温，味苦辛，气微香。

【效用】祛风行气，散瘀，消肿，止痛，止血，治跌打损伤，产后风，产后恶露不清腹痛，刀伤出血，血出不止者可研末外敷及内服。

【用量】内服3—5钱（干者），外用适量。



10. 土三七

Curcuma zedoaria Rosc. (姜科)

11. 土牛七 (广东土牛七)

【别名】 土牛七 (广州、花县、从化、东莞、台山、新会、清远)，六月雪 (广州、从化、花县、东莞、高要、高鹤、化州、高州、茂名、电白、徐闻、海康、廉江、江溪)，多须公 (东莞、南海、番禺、顺德)，土黄菊 (普宁)，斑骨相思 (岭南采药录)，兰草 (广州植物志)。

【植物形态】 本品为多年生草本。枝条蜿蜒状，稍被柔毛。叶对生，具短柄，卵形或披针形，长2.5—5厘米，基部近心形，边缘有粗锯齿。头状花序为顶生，成繖房花序式排列，开白花。

【药用部分与性味】 用根。味苦，性凉。

【效用】 清热，解毒，凉血，散瘀，舒筋活络，化痰。为喉科常用药。可治疗喉炎，扁桃腺炎，近年来各地用作预防与治疗白喉特效药。另外还可治疗感冒发热，痈疽疮毒，跌打损伤，筋骨肿痛，肺热痰多咳嗽，及毒蛇咬伤。煎汤内服，疮科可用来煎汤外洗。

【用量】 内服5钱—1两，外用适量。

【说明】 本品在广东一般称土牛七，但与外省常用之苋科的土牛七 (*Achyranthes aspera* L.) 不同，后者在广东称为倒扣草，切勿误用。



11. 广东土牛膝

Eupatorium chinensis Linn. (菊科)

12. 土 荆 芥


【别名】 土荆芥（从化、花县、南海、番禺、顺德、博罗、东莞、新会、台山、广宁、四会、德庆、封开、怀集、连平、乐昌、韶关、清远、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、五华、潮安、普宁、陆丰、海口、定安、屯昌），假鱼香（从化、增城、罗定），荆芥（阳江、阳春、茂名、湛江、高州、合浦、钦县、高鹤、新兴、五华），香花草（顺德），石芥苧（广州）。

【植物形态】 一年生直立草本，多分枝，高30—60厘米，有强烈气味，多数被白色小毛。叶具长柄，下部的卵形，上部的椭圆形或披针形，长1.5—4厘米，宽8—15毫米，叶柄长6—10毫米。总状花序柔荑，生于枝顶，花极小，花为淡红色。

【药用部分与性味】 药用干燥全草。味辛，性温。

【效用】 祛风止痒，燥湿杀虫，辟蚊蝇。

【用量】 一日量1.3至3钱。



12. 土荆芥

Orthodon lanceolatum (Benth.) Kudo.

(唇形科)

13. 土 加 藤

【别名】 亚婆巢（高要、高鹤、广州、化州、清远、花县），牛奶藤，了哥架（电白、徐闻、海康、廉江、遂溪），猪椴藤（合浦、钦县、阳江、阳春、湛江），大神鸭，坡草（儋县），甜甘草（阳江、阳春、高州、茂名、化州），虎包藤，豆腐藤（德庆、封开），鲫鱼胆（素羌、番禺、南海、增城、罗定、新兴），大叶葵（紫金），亚婆潮（增城、乐昌、罗定），大凉藤（合浦、钦县、湛江），节节花，黑面先锋（化县），糯米藤（新兴），牛白藤（广西），涂藤头（潮汕），白碎玉（潮安、潮州、澄海、惠来），甜白碎玉（潮州），白嘴玉（潮阳），白花鸡屎藤（潮安、潮洲），杜藤，狗头藤（惠来），大吐龙胆草，大叶鲫鱼草，甜茶（广州）。

【植物形态】 缠绕性木质藤本，高3—5米；小枝四棱形，老时变圆柱形，单叶，对生，膜质，长4—10厘米，宽2.5—4厘米，卵状长椭圆形，边全缘，侧脉通常为4对，叶柄极短，托叶长4—6毫米，顶端有刺毛状4—6条。花为球状，果，近球形蒴果。

【药用部分与性味】 茎藤。味甘淡，性平。

【效用】 舒筋活络，治四肢筋骨痠痛。

【用量】 3—6钱。



13. 土加藤

Oldenlandia hedyotideae (DC.) Hand-Mazz.

(茜草科)

14. 山 芝 麻

【别名】 山芝麻(广东通称)(广州、从化、花县、新会、南海、番禺、顺德、罗定、清远、新兴、琼海)，山油麻(增城、东莞、高要、韶关、高鹤、广宁、四会、德庆、封开、怀集、陆丰、海丰、普宁、潮阳、潮安、五华、紫金)，假芝麻，假油麻(阳春、阳江)，油麻甲，岗油麻(新会)，野麻甲(五华)，山芝麻根(潮汕)，山油麻甲(陆丰)。

【植物形态】 矮小灌木。枝密被黄色茸毛，单叶，互生，叶片披针形至狭披针形，长4—8厘米，宽1—1.5厘米，全缘，叶背密被灰色星状毛，叶柄短。花小，生于叶腋，淡紫色。果实为蒴果，卵状长圆形，长1—1.5厘米，外被星状柔毛。

【药用部分与性味】 用根。味苦，性凉。

【效用】 清热，凉血，散瘀，解毒，滑肠通便。治斑痧大热，感冒发热，痢疾。煎水含漱可治牙根肿痛。煎水外洗可治皮肤生疮及无名肿毒。

【用量】 内服5钱—1两(干用)，外用适量。



14. 山芝麻

Helicteres angustifolia Linn. (梧桐科)

15. 山 白 芷

【别名】白牛胆（广州），山芷梅（广州），白面风（博罗、增城、东莞、番禺、高鹤、新会、五华），白背风（罗定、乐昌、阳江、阳春、湛江、合浦、钦县），白毛茶（顺德、茂名、高州、徐闻、海康、廉江、遂溪、化县），白面虎（五华），大力牛（广宁、四会、德庆、封开、怀集），毛将军（潮汕），牛耳风（揭阳），羊耳草（潮阳），山鹿茸，冲天白（普宁），叶下白（海丰）。

【植物形态】本品为小灌木，高达1.5米，茎粗壮，被绵毛，根粗厚，木质，叶革质，具短柄或上部的叶近无柄，狭长椭圆形至倒卵形，长5—15厘米，宽1.5—4.5厘米，边缘稍有小齿，叶面有疏短毛，背面密被雪白色绵毛或厚绢毛，头状花序组成稠密的伞房花序式，花顶生或生于上部叶腋内，花淡黄色。

【药用部分与性味】用根，味辛，气香，性温。

【效用】祛风行气，散寒，消肿止痛，止咳去痰，治感冒咳嗽，头风痛，产后风痛，跌打肿痛。

【用量】1—2两（干用），煎汤服。



15. 山白芷
Inula cappa DC. (菊科)

16. 山 紫 苏

【别名】白苏，野苏，野紫苏（广州）。

【植物形态】一年生直立草本，具香气，高0.5—1.5米，有分枝。茎绿色圆角四方形，有沟，基部木质，光滑，上部密生细长白毛。叶对生，绿色，具叶柄，叶片卵圆形或圆形，先端急尖或渐尖，或尾状，基部圆形，边缘有粗锯齿，背面有腺点，两面均具毛茸，沿脉较密。花每两朵轮生，集成总状花序，腋生或顶生，花白色。小坚果倒卵圆形，黄褐色有网状皱纹。

【药用部分与性味】茎、叶、种子，味辛性温。

【效用】叶（苏叶）：能发散风寒，行气健胃，理气宽胸，解郁化痰，安胎，解鱼蟹毒，治外感风寒，胸闷呕吐，胎气不安，脚气，鱼蟹毒。

茎（苏梗）：能发散分寒，理气宽胸，解郁化痰，安胎解蟹毒，治外感风寒，胸闷呕吐，胎气不安，脚气，鱼蟹毒。

子（苏子）：能下气定喘，消痰止咳，温中开郁，治咳嗽痰喘，胸闷气逆。

【用量】各为1.5—3钱。



16. 山紫苏

Perilla frutescens (L.) Brit. (唇形科)

17. 山 海 螺

【别名】 山海螺(纲目拾遗)，乳树(南雄、连平)，冇皮芋(钦县、英德)，破皮芋(廉江、遂溪)，五爪金龙(湛江、合浦)，五爪龙(钦县、高州)，薯莨头(广州区)，白芍(澄迈、信县)，土洋参(惠阳)，羊乳，奶薯，四叶参(中药材新品种介绍)奶树(植物名实图考)

【植物形态】 多年生蔓生草本，有时攀伏在石上；具乳汁，根倒卵状纺锤形，粗壮而长；茎细长多分枝，长达2米以上，无毛绿白色或带紫色，叶着生于茎上的互生，较小，着生于短侧枝上的，通常2—4片，对生或近轮生，长椭圆状披针形，披针形至椭圆形，全缘或有微波状疏齿，端尖基部楔形，表面深绿色，背面灰绿色，两面无毛有短柄，无毛，花单生或成对生于枝端，花冠钟状，外面乳白色内面深紫色，蒴果圆锥形，多少肉质，种子多数，细小椭圆形，稍扁光滑。

【药用部分与性味】 根，全株，味甘性平。

【效用】 能润肺祛痰止咳，催乳，排脓解毒，滋养津液，治乳水不足，乳疮、肠痈、肺痈、瘰疬、疮疖、过度疲倦。

【用量】 1—2两



17. 山海螺

Codonopsis lanceolata Benth et Hook.

18. 山 橙

【别名】 狼子果，马骝藤果（中山）

【植物形态】 高大，木质藤本。叶具柄，革质，卵形，矩圆形或略带披针形，长5—8厘米，两端均渐尖，上面平滑面亮，叶柄长6—12毫米。花白色，芳香。浆果圆球形，直径5—6厘米，熟时橙红色。

【药用部分与性味】 药用为成熟果实，干者微苦平，有小毒，鲜者味苦性凉。

【效用】 行气止痛。

【用量】 用量1—2个，煎汤服。陈旧者更佳。



18. 山 橙

Melodinus suaveolens Champ. (夹竹桃科)

19. 山 大 刀

【别名】山打大刀，暗山公，大舟叶（生草药性备要），九节（海口、定安、屯昌、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、乐昌、罗定），山九节（普宁），吹筒树（南海、增城），蚊同树（陆丰），刀斧枪（湛江、合浦、钦县），六月雪（罗定），厚皮楠（高要），火筒树，刀背香（阳春），山大颜（惠阳），大口樟（东莞），驳节兰（英德），大节（澄迈、琼海、乐东、琼中），白面将军（五华），水母子（中山），山打劫（南海），苦竹条，九节草（惠阳）。

【植物形态】直立灌木，高1—3米。嫩枝具4棱角，老枝圆柱状，茎节略膨大。单叶对生，纸质，椭圆形，长8—20厘米，宽2—7厘米，叶背的侧脉腋内有时有簇毛，托叶阔，合生膜质，早落。花绿，白色。核果，近球形，熟时红色。

【药用部分与性味】叶，根。微苦，性温。

【效用】清热解毒，煎水熏洗痔疮，鲜叶捣烂或干叶研末外敷治跌打，煎汤内服治大肠血热。

【用量】内服干用5钱—1两。外用适量。



19. 山大刀

Psychotria rubra (Lour.) Poir. (茜草科)

20. 山 橘 叶

【别名】大叶山橘叶，酒饼山橘叶(广州)，山黄皮(罗定、肇庆)，甜糖木，胶碗只(钦县、高州)，山柑(陆丰、普宁)，盐糖叶(廉江、遂溪)，山楂树(广州)，甜糖子(合浦、湛江)，山桔，甜糖(海南)。

【植物形态】常绿灌木，高2—3米，嫩枝和芽常被褐棕色短绒毛。羽状复叶，通常3小叶，小叶互生，椭圆形，长6—18厘米，宽2.5—5厘米，边全缘或微波状。花白色。浆果球形，直径约1厘米，淡红色或朱红色。

【药用部分与性味】根。味辛，性温。叶。味微甘淡，性平。

【效用】行气，止咳。主治小肠疝气痛，感冒咳嗽，劳伤咳嗽。煎水温洗浴冻疮。

【用量】内服5钱1两。



20. 山桔叶

Glycosmis citritolia (Willd.) Lindl. (芸香科)

21. 山 菩 提

【别名】野葡萄（阳江、阳春、乐昌、罗定），假葡萄（增城、化州、海南），葡萄（合浦、湛江），蚊树（番禺、南海、顺德），粉藤（澄迈），野菩提子藤（龙门），山葡萄，乌葡萄，山浮桃，野葡萄（潮汕）乌嘴莓（潮阳）破布藤（潮安、潮州、揭阳、澄海），酸藤（植物名实图考）。

【植物形态】落叶藤本。枝细长，嫩枝常被短柔毛，卷须分叉，与叶对生。单叶，纸质，阔卵状心形，长和宽约5—7厘米，边缘有粗齿，叶柄长3—7厘米，三出伞房状聚伞花序；花淡黄色。浆果小熟时紫蓝色。

【药用部分与性味】茎叶。味甘淡，性平。

【效用】祛湿消肿，利尿，治脚气肿痛。

【用量】5钱——1两，煎服。



21. 山菩提

Vitis balanseana Planch. (葡萄科)

22. 大 茶 药

【别名】 大茶药（始兴、合浦、钦县、紫金、兴宁、增城、花县、乐昌、从化、顺德、罗定、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、五华、阳江、阳春、高州、化州、茂名、英德、连南），甘晚树（陆丰）断肠草（阳江、阳春），大茶（阳春），胡满瓠（广州），胡蔓草（广州），钩吻，胡蔓藤，大炮叶，甘尾（中国经济植物志），朝阳草，荷班药，苦晚公，虎狼草，大柴药，野葛（岭南草药志）。

【植物形态】 本品为木质藤本。单叶，膜质，对生，有时轮生，卵形至卵状披针形，长5—10厘米，宽3—5.5厘米，先端渐尖，基部浑圆或阔短尖，边全缘，侧脉4—5对，上面平川，背面凸起，叶柄长8—12毫米。夏季顶生或腋生，聚伞花序，花冠漏斗状，淡黄色。蒴果，长椭圆形，长10—14毫米。

【药用部分与性味】 药用根叶，气辛，味苦，性有大毒。

【效用】 外治能攻毒拔毒，生肌，杀蠹止痒；忌内服，误服能杀人。

【说明】 1.有毒部位：全株有毒，根极毒。
2.有毒成份：一种称为钩吻生物硷类，另二种为胡蔓藤硷 ($C_{22}H_{30}N_2O_4$) 及次胡蔓藤硷 ($C_{23}H_{28}(OH)N_2O_4$) 根含量最高。

3.中毒症状，人食根皮不到一钱重或茎叶的汁液30滴1小时内便能致死，如食后再饮白醋，毒性发作更快，但猪及羊食之并非毒害，且能肥大，使毛色增加光泽，并有防瘟疫之效。中毒后，先口渴发烧，口吐泡沫，咽喉腹部灼痛，继之晕眩，眼瞤，瞳孔扩大，下鄂肌肉衰弱，体温下降，最后由于呼吸急促而死亡。

4.解救方法：迅速用1—2%或0.2—0.5%高锰酸钾溶液洗胃，每小时用5—10滴碘或活性炭冲开水服用，并实行体外加温，行人工呼吸。

注射可拉明及咖啡因等兴奋药。

5. 民间解救法:

(1) 用通菜根煲汤饮，或捣烂取汁灌服。

(2) 用生油或熟猪油灌服催吐，也有用新鲜动物血，如鸡、羊血灌之催吐，然后洗胃，或用生鸭蛋去壳生吃，或用鸡蛋未解成雏者研烂和麻油灌之，也可催吐。严重者应立即送至医院抢救。



22. 大茶药

Gelsemium elegans Benth (马钱科)

23. 大 青

【别名】（根称）板蓝根（叶称）大青叶，蓝靛叶。

【植物形态】小灌木，茎幼时四棱形，叶对生，通常两片叶不相等，叶缘具疏钝齿。花紫色。蒴果棒状，无毛，种子卵形扁平，褐色，无毛。

【药用部分与性味】根、叶，味甘淡性凉。

【效用】清热，破血，解毒，凉血，利咽。主治头面红肿，咽喉肿痛，疔腮等炎症。并可用于丹毒，流火，败血症，对脓毒性发热有退热作用。大青叶主治时气头痛，火热，疮，用叶制取蓝靛（靛蓝）治疔腮等炎症。

【用量】 2—3钱。



23. 大青

Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek. O. Ktze.

(爵床科)

24. 大 风 艾

【别名】牛大艾(徐瓦、海康、廉江、遂溪、五华)，山大艾(罗定)，冰片艾(保亭)，大艾(海南)，打蛇艾(澄迈)，鹤老麻(广州)。

【植物形态】多年生草本或亚灌木，高达3米。茎粗壮，圆柱状，密黄褐色柔毛。叶纸质，互生，椭圆形，长5—25厘米，宽2—10厘米。茎上部的叶渐小，叶面被短柔毛，叶背密被黄白色绵毛，边缘有细锯齿，基部或叶柄上通常有1—4对线形小裂片，叶柄粗壮，长5—20毫米，被毛。花黄色，管状。瘦果圆柱状，有5棱密被柔毛。

【药用部分与性味】嫩枝及叶。辛温，芳香。

【效用】驱风消肿，活血散瘀，治产后风肿，麻痹。煎汤外洗治跌打，风湿骨痛，皮肤瘙痒。配红蓖麻叶，石膏蒲煮水洗，治肿胀，风湿关节炎。

本品为提制艾片的原料。

【用量】干用内服1—2两，外洗用4两至1斤。或鲜用适量捣烂外敷均可。



24. 大风艾

Blumea balsamifera (Linn.) DC. (菊科)

25. 小 飞 扬 草


【别名】 乳汁草，痢疾草，千斤草（广东中药），千斤草（广州植物志），痢子草，乳仔草（岭南草药志），细叶飞扬草，细飞扬，小飞扬草，飞扬草（广州），小未乳仔草，红森草（潮安、潮州），小号乳汁草（惠来、普宁），小样乳汁草，扁蓄草（海丰），披翅凤（潮安、潮州、澄海），牛乳草，蜻蜓翅（澄海）。

【植物形态】 一年生匍匐状草本。茎多分枝，高20—40厘米，根小，茎细长纤弱，通常红色，稍被毛，质稍韧，中空，叶对生，椭圆形至矩圆形，先端钝，基部偏斜而截头状边缘有极小的锯齿，腋生小的花序组成的聚伞花序，淡紫色，蒴果三角形，有毛，种子有纵沟纹5—6条。

【药用部分与性味】 全草。味酸性凉，有小毒。

【效用】 能内消溼热，外解湿毒，治天泡疮，烂头胎毒，乳痈，缠腰蛇，蔓延性疮疖及湿疹，并治痢疾，煲猪脚可治咳血。

【用量】 鲜用2—4两。



25. 小飞扬草

Euphorbia thymifolia Linn. (大戟科)

26. 小金牛草

【别名】 小金不换，小兰青，小金，小花远志（广东中药），金牛草（中药志），细叶金不换，细金草（岭南采药录），细金，土元金，细金不换草（广州）。

【植物形态】 一年生矮小草本，高5—15厘米。根细小而硬，土黄色，茎直立或伏地，茎细长少分枝，被柔毛。叶小，近无柄，卵形，倒卵形至矩圆形，先端钝或短尖，基部钝，边略背卷，秃净，主脉明显，侧脉全不显。花极小，丛生于一极短腋上生的花序柄上，花序短于叶。蒴果秃净，种子极小被绢毛。

【药用部分与性味】 全草。味微苦、性平、气无。

【效用】 能去瘀、止咳、治伤症咳嗽、跌打痛症、吐泻腹痛。

【用量】 干用3—5钱。



26. 小金牛草

Polygala telephioides willd. (远志科)

27. 小叶双眼龙

【别名】 双眼龙（清远、从化、新会、台山、广宁、四会、德庆、封开、怀集、高鹤），狗深藤（五华），下山虎（从化），虻仔仁（陆丰），山辣蓼叶，毛果巴豆（广州）。

【植物形态】 常绿小灌木，高1—1.5米，被灰黄色星状柔毛，叶互生，椭圆形，长5—10厘米，宽1.5—2.5厘米，具3脉，边缘疏生小锯齿，叶基部有两个小腺点，叶脉隆起，并具星状毛。花密被星状毛。蒴果扁球形，被粗毛和星状毛。

【药用部分与性味】 叶，根。味辛，性温。

【效用】 祛风湿，治关节肿痛，肌肉痹痛，散瘀止痛，治跌打伤，驱风解毒，主治皮肤痕痒及疮癣疥癩等疾。

【用量】 5钱—1两。



27. 小叶双眼龙

Croton iachynocarpus Benth. (大戟科)

28. 千斤拔

【别名】 千斤拔(广东通称)(从化、番禺、增城、广宁、四会、德庆、封开、怀集、新兴、罗定、高要、高鹤、清远、韶关、合浦、湛江、钦县、五华)，老鼠尾(广东通称)，土黄耆，金牛尾(博罗、增城、东莞)，千斤黄(乐东、琼中、儋县)，千斤木(龙川)，千斤吨(英德)，钉地根(潮安、潮阳、普宁)，千斤草(乐昌)，千里镜(澄迈、琼海)，牛石头(惠阳)，猪脚窠(东莞)。

【植物形态】 直立或披散亚灌木，高1—2米，幼枝有角，被柔毛。小叶矩圆形，长6—10厘米，宽2—3厘米，先端略钝，具小锐尖，叶背脉上薄背紧贴的丝毛。总状花序稠密，长2—2.5厘米。荚果长6—7毫米，被小柔毛。

【药用部分与性味】 药用根，味淡，性平。

【效用】 补肝肾，壮筋骨，舒筋活络，治风湿痹痛，腰膝痠痛无力，风湿关节炎，手足软弱无力，跌打折伤，久咳。

【用量】 干根1—2两煎服。按需要可加适量米酒配合服。



28. 千斤拔
Moghania prostrata (Roxb.) Wang et Tang.
(豆 科) 【假根】

29. 千斤红

【别名】千斤拔（增城、东莞、番禺、罗定、高鹤、新兴、湛江、合浦、钦县、电白、徐闻、海康、廉江、遂溪、海口、定安、屯昌），大叶千斤拔，红药根（从化），三脚马，山豆根（阳春），老鼠尾（广州），干勉拔（广州植物志），直立千斤拔，豆叶千斤拔（新会）。

【植物形态】直立亚灌木，高1—2米，嫩枝有棱且有沟槽，被毛，老枝近圆柱形，有褐色皮目而无毛，叶互生，3出复叶，小叶薄，长椭圆形，侧生的较小，偏斜，端渐尖，基部钝或圆形，全缘，表面近无毛或被小柔毛，背脉上被疏紧贴的丝状毛，侧脉在背面凸起，顶生的叶在基部有明显3脉，具叶柄有狭边，呈三角状被粗毛，托叶线形，早落，总状花序稠密，无花序柄，小花柄短，花冠略长蝶形，紫色或红紫色，荚果长椭圆形，膨胀，2瓣开裂，有种子1—2粒。

【药用部分与性味】根，味甘、性平。

【效用】能祛风去湿、舒筋活络、活血去瘀、去痰火、行气固肾、清热利水、治风湿痹痛、跌打损伤、四肢酸软无力、瘫痪、痲疹大热、喉肿喉痛。

【用量】1—3两。



29. 千斤红

Moghania macrophylla (Milld) O. Ktze. (豆科)

30. 广 地 丁

【别名】土地丁，紫花地丁（广州），地丁（两广通称），华南龙胆（广州植物志），兰花地丁（成都）

【植物形态】：矮小草本，高3—8厘米。茎直立、成丛、少分枝、略粗糙。叶对生、无柄，叶小，矩圆状椭圆形或矩圆状披针形，近基部的叶较大，上部的较小，顶端有小锐尖，边狭而透明，有小睫毛，全缘主脉明显，侧脉不明显。花单生于枝顶，花冠漏斗状，外面绿黄色，里面紫蓝色。蒴果倒卵形压扁，先端浑圆种子1枚。

【药用部分与性味】 全草，味苦，性寒。

【效用】 能清热解毒，消炎，消脓肿，治疮疽疗肿，瘰疬恶疮（内服外敷均可）。

【用量】 1.5—3 钱。



30. 广地丁

Gentiana loureiri Griseb (龙胆科)

31. 马 鞭 草

【别名】 马鞭草（广州、南海、陆丰），顺将草（广州），狗牙草（琼海、定安、屯昌），铁马鞭，马板草，龙牙草（广州常用草药），凤颈草（儋安、澄海、南沃）。

【植物形态】 多年生草本，高50—70厘米，根粗厚，多分枝，茎四棱形，棱边常被硬毛。单叶，对生或轮生，卵形或长椭圆形，端渐尖，基部楔形，3深裂或不规则的羽状分裂，有锯齿两面被粗毛，侧脉和支脉在背后较明显，叶柄很短或不明显。穗状花序顶生及腋生，单独或多枝集成圆锥状，花淡紫色或蓝色漏斗状，蒴果长椭圆形，成熟时裂为4小坚果，小坚果背面有纵脊4—5条。

【药用部分与性味】 全株，味苦，性微寒。

【效用】 能通经、散瘀、清血热、解毒、破瘀、久疔、祛风、逐水、消肿、杀虫、止痒、治闭经、疝气、皮肤瘙痒、赤白痢疾、虚火牙痛、寒湿足痛、脚软无力、产后瘀血不行、胎衣不下、跌打肿痛、全身水肿、下部阴疮、外敷痈疮疔毒、皮肤疥癣。

【用量】 干用1—2两。



31. 马鞭草

Verbena officinalis Linn. (马鞭草科)

32. 水 杨 梅

【别名】水杨梅（广州、阳江、阳春、高州、茂名），凤箱树（植物名称），大叶水杨梅（增城、罗定、乐昌、电白、阳江、阳春），水杨柳（清远、韶关、兴宁、徐闻、海康、廉江、遂溪、五华、普宁），水央（澄迈、琼海），水常（广宁、四会、德庆、封开、怀集），狗毛树（阳春），水杨芦（新兴）。

【植物形态】小灌木，高达1—4米；分枝极繁。叶近革质，卵形或椭圆状披针形，长7—13厘米，宽2.5—8厘米，叶全缘，叶背有柔毛，托叶三角形。头状花序单生或总状花序式排列，花白色，花期秋季。

【药用部分与性味】根。味苦涩、性凉。

【效用】清热降火，消肿拔毒，治痈肿疮疡疔毒，可浸酒外敷或研末用油调敷，疮未溃可消，已溃脓可溃。治胃火牙痛，牙疮，可煎水含漱。治跌打积瘀肿痛，可用根浸酒外搽患处，并可内服。

【用量】内服5钱—1两（干根），外用适量。



32. 水杨梅

Cephalanthus occidentalis Linn. (茜草科)

33. 水 胡 满

【别名】假茉莉，许树（广州植物志），水孤闷，苦魁，红瓦寐，猪髓怕，相公担屎桶，路边清，水美满（广州），苦霖三，苦卡（新会）

【植物形态】直立或攀援状灌木，高1—2米。茎枝被灰色柔毛，嫩枝尤甚，幼枝四棱形。叶对生，纸质，卵形或椭圆形，先端钝基部楔尖全缘，两面秃净，叶背面脉纹明显，叶面色较深为暗绿色，背面黄绿色。腋生聚伞花序有花3—7朵。核果倒卵形。种子扁长卵形。

【药用部分与性味】根（去青皮），气微臭味苦，性寒。茎枝叶有毒，不可内服。

【效用】根能散瘀止痛，清热消肿，治风湿关节炎，神经痛，腰痛，跌打肿痛，大热症。鲜叶1—2两捣烂取汁加酒炖服治跌打内伤，服后微泻，或鲜叶捣烂后用酒调和外敷，煎水外洗皮肤可治疮疥癣癩，皮肤湿毒有良效。

【用量】根1—4两，叶外用的量。



33. 水胡满

Clerodendrum inerme Gaertn. (马鞭草科)

34. 水 蓼 衣

【别名】水蓼衣(救荒本草)，六角英(潮阳)，墨菜(两广、惠阳)，鱈鱼胆(增城、乐昌、罗定、电白、阳江、阳春)，鱼骨草(罗定、高鹤、新兴、五华)，细叶鱈鱼胆(从化)，水箭草(新会、台山)，水剑草(乐昌)，毫卡菜(潮安)，水胆草(化州)，冰汀药(英德)，疳积药(广西)。

【植物形态】1—2年生直立草本，高达80厘米，有时近根斜展开，节着地可以生不定根，节大，茎微作4棱形，秃净或嫩茎被短柔毛，叶无柄，单叶对生，矩圆状披针形，横状或线形，纸质，全缘，端渐尖而钝，基部狭楔形，叶面深绿色，背绿色，侧脉7—9对，两面均被许多针状结晶状小线条。花无柄为腋生一束，3—6朵或更多，花冠浅蓝色或带白色。蒴果长椭圆形2纵纹，褐色。种子多数，细小扁圆形，浅茶褐色，被弹性白色绒毛。

【药用部分与性味】全株，味甘微苦，性凉。

【效用】能健胃消食、清热消肿、解表、治反胃、消化不良、咽喉肿痛、乳疮。

【用量】1—2两



34. 水蓑衣

Hygrophila salicifolia (Vahl) Nees. (爵床科)

35. 水 翁 花

【别名】水翁叶（南海、番禺、顺德），水榕树（增城、东莞、五华），水翁树，水龙树（惠阳），黑叶水翁树（阳春），水葵（高要），水秧（电白、徐闻、海康、廉江、遂溪），水映木（乐东、儋县），大叶榕（高要、高鹤）。

【植物形态】常绿乔木，高达15米，小枝近圆柱形或有四棱无毛，叶对生，具柄，近革质，阔卵状椭圆形，长8—20厘米，宽4.5—6.5厘米，叶面绿色，干时背面有黑色小斑点，全缘。花小淡绿色。浆果球形，熟时紫黑色。

【药用部分与性味】花：苦，寒，根，皮，叶：苦涩，性凉。

【效用】花：解表，清热，去湿，生津止渴，治感冒发热，湿热下痢，陈花更佳，树皮：杀癣止痒，浸酒外涂或取其二层皮煎水外洗可治疥癣，香港脚，绣球风（即举丸皮搔痒）等皮肤病。

【用量】五钱至一两。

【说明】水翁花树皮即广东使用的中药土槿皮，民间用以外洗皮肤病，治香港脚。



35. 水翁花

Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr & Perry

(桃金娘科)

36. 火 炭 母

【别名】赤地利（唐本草），五毒草（本草拾遗），炭炭藤（高州、茂名、化州、合浦、湛江、钦县、定安、屯昌、琼中、琼海、乐东），火炭草（海康、徐闻、廉江、遂溪、湛江、兴宁），火炭须（增城、乐昌、阳江、阳春、电白），火炭星（南海），火炭煤（高要），火潭煤（番禺），火炭药（罗定），火炭屎（英德），襖梗席，天师印，假杨梅（东莞），鹤糖梅，麻梗煎，红梅仔叶（新会），火炭毛，斑烤饭，毛甘蔗，盲更蔗（广州），白饭草，白饭藤（潮安、澄海），白饭菜，枯锥饭（惠来），白米饭桃（潮安、澄海），乌饭藤（海丰）老虎尿，蝴蝶草（澄海），火炭只药（饶平），水拖沙（潮州）沙虱仔，白饭仔（陆丰）

【植物形态】本品为直立或半攀援状，多年生草本，高可达一米。茎蜿蜒似藤，甚长，棕色至棕紫色，无毛，节间颇长，节稍膨大，质脆易折，髓部疏松。叶互生，单叶膜质，卵形或卵状椭圆形，全缘或有极微小齿，两面均绿色，无毛，常有紫黑色斑块。花白色或淡红色，集成头状花序。瘦果三角形，褐黑色。

【药用部分与性味】全草。气微，味淡，性凉，无毒。

【效用】能宣导大肠湿滞，缓解体力过度疲劳，治大肠结热，痢血，湿热肚痛，疳痢疝气等，外敷疮疖，皮肤痒疹。

【用量】干用1—2两，鲜用2—4两，外敷鲜的适量。



36. 火炭母

Polygonum chinense Linn. (蓼科)

37. 火 秧 筋

【别名】羊鸟鸦（阳江、阳春、海口、电白），杨丫，糙羊（广州），霸王鞭（植物名实图考）。

【植物形态】直立常绿灌木，高可达7米。茎肉质，具白色乳汁，枝圆柱形或略起棱角，小枝有波浪形的厚翅3—5条，在翅的凹陷处有一对刺。叶小而少，由翅边伸出，肉质，倒卵形，叶脉不显。花黄色。蒴果小直径约1厘米。

【药用部分与性味】茎，味苦，性凉，有小毒。

【效用】祛风，行气，消肿，止痛，去湿热。

【用量】4—8两（鲜用）。



37. 火秧筋

Euphorbia antiquorum Linn. (大戟科)

38. 木 棉

【别名】木棉树（植物名，及通称名），英雄树（广东习称）。

【植物形态】大乔木，高可达25米，树干和枝有短而大的圆锥形的刺，枝平伸，叶冬初脱落，有小叶5—7枚，叶柄略长于小叶，小叶具柄，革质，卵形至椭圆状矩圆形，长10—20厘米，宽5—7厘米，边全缘。花大，红色，春月叶前开花，聚生于枝的近顶，花萼厚革质，蒴果大，矩圆形，木质，长10—15厘米，宽4.5—6厘米，果瓣内有绵毛，种子多数，花期3月。

【药用部分与性味】根，花，味淡，性微寒。

【效用】除痰火，清湿热，广东民间用花作凉茶原料。为五花茶（木棉花，鸡旦花，槐花，葛花，金银花），原料之一，治大肠湿热，便血，痰火瘰疬。

【用量】1—2两，煎服。



38. 木棉树

Gossampinus malabarica (DC.) Merr. (木棉科)

39. 木 賊

【别名】木賊（增城、东莞、南海、番禺、顺德、高要、罗定、新兴、乐昌、清远、韶关、连江、合浦、钦县、高鹤、广宁、四会、德庆、封开、怀集、岑溪、高州、化州、阳江、阳春、电白、信县、临高），土木贼（从化、新会、台山），木贼草（潮安、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白），驳节草（河源、始兴、兴宁、五华），笔塔盐（茂名、高州、化州、阳江、阳春），笔塔草（罗定、新兴），驳骨草（增城），田葛（澄迈、琼海），驳节花，虾公脚，马节草（五华）作草（潮阳）纤木贼（广州植物志）。

【植物形态】多年生草本。根状茎匍匐，黑褐色，各节生不定根，黄褐色，地上茎绿色，直立，单生或簇生，不分枝或不规则的分枝，高40—100厘米，有些小枝上再分小枝，绿色，中空有节，上下节互相钩接，作管状的鞘包着，相邻两节间近等长，易逐节折断，节部微肿胀，表面具棱11枚左右，棱上密生短刚毛。退化叶膜质，轮生，三角状，端尾状，渐尖，全缘，叶的中央有一纵线状的脊，直达顶点，叶脱落后留有黑点叶痕，孢子囊群于茎顶集成密穗状长椭圆形，黑色具短轴，囊群略成轮状11—15轮，圆形黄白色。

【药用部分与性味】全株。味甘，微苦，性平。

【效用】能散风解表，清肝热，利小便，除湿热凉血，治风热感冒，目赤肿痛，目昏眼屎过多，迎风流泪，湿热带泻，便血，血痢。

【用量】3—5钱。



39. 木 賊

Equisetum debile Roxb. (木賊科)

40.木 鳖 子


【别名】木别藤(高要、高鹤)，乌鸦爪(海口、乐东、定安、屯昌)，水炷(南雄)，木别子(台山、新会)，壳木鳖，木鳖，土木鳖，鸭鳖子(广西)。

【植物形态】一年生攀援状草本。茎具槽纹，具不分分枝的螺旋状卷须，长可达20厘米。叶为单叶互生，卵圆形掌状叶，分裂3—5裂片，边缘疏生小齿，基部有腺体2枚，叶长8—18厘米，宽6—10厘米，叶柄长4—9厘米。花腋生淡黄色或白色，果肉质，圆头状，长7—11厘米，宽5—8厘米，上具瘤状软刺，熟时黄红色，具无数种子，扁平鳖状，有皱纹，黑褐色直径2厘米。

【药用部分与性味】种子。性温味苦微甘。

【效用】消积利肠，散肿退毒，生肌。治疳积泻痢及瘰疬脓肿，痔疮，乳痈，踏疮等症，为外科要药。

【用量】3—4分，内服慎用。



40. 木鳖子

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.

(葫芦科)

41.木芙蓉

【别名】大叶芙蓉，醉福芙蓉（广州），芙蓉花叶（潮汕），秋芙蓉，水芙蓉，清凉羔（潮安、潮州），大芙蓉叶（南沃、海丰）。

【植物形态】直立，分枝，大灌木，高2—4米，被星状灰色短柔毛。叶大，阔卵形宽10—20厘米，3—5深裂，裂片三角形，边缘有钝齿，上面稍有毛，背面密被茸毛。花白色或粉红色，至下午变成深红色。果球形长约2.5厘米，被粗长毛。

【药用部分与性味】叶。气微香，味甘淡，性凉。

【效用】清热凉血，解毒，止痛，排脓，治一切大小疮疖，恶疮肿毒，无论已溃，未溃均可，捣烂或研末外敷，干用，鲜用均可。

【用量】本品多为外用，用量适量。



41. 木芙蓉

Hibiscus mutabilis L. (锦葵科)

42. 五 月 艾

【别名】艾(顺德、番禺、南海、高要、高州、鹤山、普宁、陆丰、潮阳、新会、台山、合恩、湛江、钦州、龙中、东海、乐东)，鸡仔艾(广宁、四会、德庆、封开、怀集)，大叶艾草，野艾(河源、连平)，生艾(惠阳)，大艾(五华、增城、博罗、东莞)，火艾、蚊艾、细艾(广州)艾草，艾叶(潮汕)山艾(饶平)。

【植物形态】本品为灌木状草本，直立被毛，高达1米，枝柔弱，揉之有香味，被灰色柔毛，叶纸质，羽状深裂，上部的叶较小，叶面深绿色，被疏柔毛，背面被灰白色短绒毛，裂片2—4对，卵披针形，通常全缘，或有时3浅裂，由多数头状花序组成圆锥花序，花淡黄色，瘦果圆柱形。

【药用部分与性味】叶，地上全草，味微苦，气芳香，性温。

【效用】能祛风，逐寒湿，理气血，调经治腹中冷痛，经闭，月经不调。

鲜艾叶2两捣烂取汁，加入鸡旦煎服，民间用治产后风。

鲜叶煎水外洗治烂肉，内服治虚肿风湿脚，老叶可制艾茸，供针灸用。

【用量】干用1—2两。



42. 五月艾

Artemisia vulgaris Linn. (菊科)

43. 五指柑

【别名】 牡荆叶，布荆叶，黄荆子叶，蚊蠅叶（广州），山埔羌，埔羌，埔羌（潮汕），五叶埔羌（汕头、普宁），五爪埔羌（海丰），布荆，布惊（广州），土蔓荆子（潮安）。

【植物形态】 灌木，高达5米，有香气，小枝四方形，被柔毛，叶具长柄，通常有小叶5枚，也有三枚的，中央小叶最长有明显柄，小叶椭圆形至披针形，长3—10厘米，边全缘，或每边有深齿2—6枚，被小柔毛，干时黑色。花淡紫色，果球形，直径2—3毫米。

【药用部分与性味】 叶，气香，味微苦，性微凉。

【效用】 化胃肠湿浊，透肌解暑，主治感冒，痢疾，小儿五疳，煎汤外洗治风湿肿痛，皮肤湿疹。

【用量】 干用5钱—2两。



43. 五指柑

Vitex negundo Linn. (马鞭草科)

44. 五 爪 龙


【别名】五爪龙(广州)，五爪金龙(高鹤、南海)，五指毛桃(佛山市、乐昌、增城)，五叉牛稔(钦县、高州)，五爪牛乳(廉江、徐闻、遂溪、海康)，五指牛奶(罗定、阳江、阳春、电白)，五指牛奶桐(广州郊区)，五叉牛乳(合浦、湛江)，五指香(化州)，佛掌榕(海南)，粗叶榕(广州植物志)。

【植物形态】小灌木或小乔木，高2—6米，有乳汁，枝叶、叶柄和花托均密被伸展锈色的粗毛。单叶，互生，形状变异大，阔卵形至长椭圆状披针形，长8—25厘米，宽4—13厘米，先端渐尖，基部圆形或浅心形，边缘具细锯齿，全缘或3—5深裂，两面均粗糙，背面密被粗硬毛，基出脉3—7条，叶柄长约6厘米，粗状。花托球形，成对着生于叶腋。花期夏季。

【药用部分与性味】根(效果好)，叶也可用。味甘淡，性平。

【效用】清热，消滞，健脾化湿，舒筋活络，行气祛痰，止咳，治脾虚水肿，久咳，肝肿痛，痰火伤，浸酒服治风湿性关节炎，叶煎水外洗可消疮毒。

【用量】干根1—2两煎服。



44. 五爪龙

Ficus simplicissima Lour. var. *hirta* Migo.

(桑科)

45.牛大力

【别名】牛大力（广东大多数地区通用，广州、罗定、新会、新兴、德庆、封开、高州、化州、阳江、阳春、茂名、潮阳、潮安、普宁、陆丰），大力牛（从化、东莞、番禺、南海、韶关、清远、电白、徐闻、海康、廉江、遂溪），牛粘大力（湛江、合浦、钦县），入地蜈（广宁、四会、怀集），叶芝麻（乐昌），毒辣藤（琼中），美丽蝶豆藤（豆科植物图说植物名称）。

【植物形态】为攀援灌木，高4米以上，幼枝密被黄褐色短柔毛，叶互生为奇数羽状复叶，长10—15厘米，小叶7—12枚，革质，全缘，长椭圆形，长5—7厘米，宽2—3厘米，叶面深绿色无毛，叶背绿色有薄毛，秋间腋生总状花序，花白色，花后结荚果，长达10厘米，宽1.5—2厘米，密被黄褐色茸毛，种子5—7粒，卵圆形，花期8月。

【药用部分与性味】根，味甘，性微凉。

【效用】降气，润肺，化痰，止咳，壮筋骨，强腰膝，治肺热气喘咳嗽，胸闷不愉快，风湿关节炎，筋骨衰弱，四肢无力，跌打后遗症，筋骨不舒。

【用量】干根1—2两，煎汤服或浸酒服，如和瘦猪肉或猪脚，或猪骨同煎则疗效更佳。



45. 牛大力

Millettia speciosa Champ. (蝶形花科)

46. 牛 奶 树


【别名】 六种牛奶树（博罗、东莞、钦县、潮安、澄迈、文昌），牛奶稔（南海、番禺），葫芦草（高州、茂名），练总草，练汁公（惠阳），猪母茶（惠阳），千里行（定安、屯昌），无花里，络树（增城），猪奶树，牛奶麻，能麻（海南）。

【植物形态】 灌木或小乔木，高约5米，有乳汁，幼枝直立，被粗毛。叶通常对生，纸质，粗糙卵形，长10—30厘米，宽6—12厘米，边全缘或具不规则细锯齿，表面粗糙，被疏刚毛，背面被密毛，叶柄长2—4.5厘米。花着生于较老的枝条上，扁球形或梨形，成熟时带黄色，被毛。

【药用部分与性味】 叶。味淡，性凉。

【效用】 清热，祛湿，消积滞。治食积，热滞，伤风感冒，咳嗽，痢疾，斑疹发热。

【用量】 3—5钱煎服。



46. 牛奶树

Ficus hispida Linn. f. (桑科)

47. 凤 仙 花

【别名】 指甲花、灯笼花（本草纲目）

【植物形态】 一年生直立分枝肉质粗壮草本，高达1米，被柔毛或近秃净，叶互生，狭披针形，长尖，边缘有深锯齿，叶柄有腺体，花大，具柄，生于主干及枝的叶腋内，通常为红色，但亦有红色、白色、紫色或杂色的。蒴果，椭圆形而尖，密被粗毛，成熟时果皮裂开弹出种子。

【药用部分与性味】 花、种子、根、叶。根、叶味苦甘辛，性温。种子、花味甘性温。

【效用】 花能活血清毒、消肿散瘀、治蛇伤、跌打引痛。种子（即急性子）能破积通经、催生解毒，治顽痰积块、哑弱、骨哽、月经不调、经闭、白膜避孕。

根、叶治跌打损伤、肿痛、蛇咬伤。

【用量】 0.5—1两。种子1钱—1.5钱。



47. 凤仙花

Impatiens balsamina Linn. (凤仙花科)

48. 凤 凰 肠

【别名】 凤凰肠(广州、从化)，大罗伞(广州、阳江)，大凉伞(廉江、遂溪、电白、徐闻、海康、韶关)，小罗伞(高明、南海)，小凉伞(广宁、四会、德庆、封开、怀集、从化、花县、增城、东莞、清远、罗定、新兴、乐昌)，娘伞树(始兴、普宁、惠阳、陆丰)，散血丹(英德)，金鸡爪(从化、花县)，落地螭螬(增城、东莞)，金牛根，平地木，石膏子(东莞)，宋砂根(植物名称、本草纲目)。

【植物形态】 直立，秃净灌木，高达1.5米。叶鞘圆状披针形，长6—10厘米或更长，宽2—3厘米，边常有皱纹或波纹，向叶背卷边。花为繖形花序，生于长约10厘米的花枝上，花白色或淡红色。果球形，直径约6毫米，有黑色的斑点，果柄长约1厘米。花期6月。

【药用部分与性味】 根，味苦辛，性温。

【效用】 活血散瘀，消肿止痛，温通血脉，祛风消肿。主治跌打损伤，肿痛，风湿痹痛。

【用量】 内服3—5钱(干根)煎服。本品多配料作成跌打风湿药酒使用。



48. 凤凰肠

Ardisia crenata Sims. (紫金牛科)

49. 天南星

本品商品中为天南星属许多种植物的干燥球状块茎，省外调进的多为天南星属植物天南星 *Arisaema consanguineum* Schott. 的球状块茎，本省产的多为天南星属植物异叶天南星 *Arisaema heterophyllum* Bl. 的球状块茎，为便于就地取材和应用，现介绍的是异叶天南星。

【别名】 生南星、南星（广东通称）

【植物形态】 多年生草本，高60—80厘米。块茎近球形或扁球形。叶单生，叶片鸟趾状全裂，呈小叶状，裂片9—17枚，通常13枚左右，长圆形，倒披针形或长圆状倒卵形，先端渐尖，基部楔形，中央裂片最小，花序柄长，佛焰苞筒状，绿色，花序轴先端附属物鼠尾状延伸于佛焰苞外甚多，浆果红色。

【药用部分与性味】 球状块茎。味苦辛，性温，有毒。

【效用】 能燥湿、祛风、化痰、散结消肿、镇痛、镇痉。治中风口眼喎斜、半身不遂、破伤风口噤强直、小儿惊风、风痰癱瘓，外用治金疮、折伤、瘀血、虫蛇咬伤、疥癣、恶疮、痈肿等。

【用量】 8分—1钱。



49. 天南星

Arisaema heterophyllum Bl. (天南星科)

50. 文 殊 兰

【别名】 文殊兰（广州植物志），十八学士（梅县），朱兰叶（广州），罗裙带（广西中药志）。

【植物形态】 常绿大型多年生草本。地下有鳞茎，须根丛生，干短，粗状，叶多数，聚生于干顶，披针形，长可达1米，先端渐尖，暗绿色。花茎直立，粗状，绿色，高约与叶等。佛焰苞分裂至基部，花纯白色，芳香，约20朵或更多，具花柄。果近球形，不规则开裂。

【药用部分与性味】 叶、根，味性平。

【效用】 能消肿散瘀、止痛、去毒、散风痰、治跌打损伤、乳癌、心气痛、腰痛、喉痛、热毒疮肿、皮肤溃瘍、蛇咬伤、煎水可洗外痔。

【用量】 1—3钱，外用适量。



50. 文殊兰

Crinum asiaticum L. Var. *sinicum* Baker.

(石蒜科)

51. 毛 麝 香

【别名】 饼草（广州），凉草、山薄荷、五郎草（新会），川麝香（罗定），射香草（清远），三枝香（乐昌），荆芥（合浦、高鹤、五华），土荆芥（陆丰、普宁）。

【植物形态】 本品为一年生直立粗状草本，分枝多，揉之有麝香之香气。单叶对生，纸质，卵形或卵状披针形，两面均被柔毛，背面有黑色腺点，边缘具钝齿。花紫兰色，单生于上部叶腋内。蒴果圆锥形。

【药用部分与性味】 全草，芳香，味微苦辛，性温。

【效用】 能祛风止痛、消毒、消肿、散瘀、疏风通络、治山岚瘴气、水土不服、产后口渴，外治皮肤搔痒、跌打疮科。

【用量】 干用 3 钱—1 两。



51. 毛麝香

Adenosma glutinosum (Linn.) Druce (玄参科)

52. 井 栏 茜

【别名】井边茜(岭南采药录), 凤尾草(增城、电白、阳江、阳春、合浦、湛江、澄迈、琼海), 红尾草(徐闻、海康、廉江、遂溪、高州、钦县), 青脚凤尾毛(普宁), 雉鸡尾(罗定), 高脚雉鸡尾(河源), 虾蟆藤(五华), 七叶(乐东), 鸡爪蕨(从化), 浪基(番禺), 小凤尾、翠云草(岭南草药志), 细叶凤尾草、剑叶凤尾草、三叉草(广州), 凤尾笔、井底笔(潮汕), 贴墙笔、土黄连(潮安、潮州、澄海), 乌脚笔(潮阳、揭阳、惠来), 五爪笔(潮州), 青脚鸡爪笔(揭阳), 乌脚鸡爪笔(澄海), 金端凤尾笔(南沃), 井口笔(普宁)。

【植物形态】本品为多年生常绿草本, 地下茎粗壮, 坚硬, 节间短, 密被披针形黑褐色鳞片毛, 叶丛生近革质, 为1—2回羽状分裂, 裂片卵形, 叶柄直立坚韧秃净, 或疏生鳞片毛, 浅绿色, 叶轴秃净, 有翅, 有时最基部的两对羽片无翅, 羽片每侧有3—5小片, 对生, 最上部的小羽片单出特长, 营养叶的边缘有小锯齿, 下部的羽片有2—3裂片, 或有短柄, 叶面绿色, 背浅绿色, 孢子囊群线形, 膜质, 着生在叶背的边缘, 嫩时白色, 后黄色。

【药用部分与性味】全草, 味淡微湿, 性平。

【效用】能利尿、祛湿, 而不伤阴, 治痢疾、消化不良、吐泻、白带、感冒喉炎、痢痔疮毒、疔疮。

【用量】干用1—2两。



52. 井栏茜

Pteris ensiformis Burm. (凤尾蕨科)

53. 白 鹤 藤

【别名】 白背线调（广州）。

【植物形态】 缠绕藤本。叶卵形至椭圆形，长5—11厘米，宽3—9厘米，叶背面密被银色，紧贴的柔毛。花白色，花萼外被银色毛。果近球形，胭脂红色。

【药用部分与性味】 叶。味微酸苦，性凉。

【效用】 化腐生肌，去湿消肿，消腹腹胀，煎汤外洗疮疡及婴儿鹅口疮。治膨胀，肾脏性水肿。

【用量】 5钱—1两。



53. 白鹤藤
Argyreia acuta Lour. (旋花科)

54. 白 玉 兰

【别名】 白兰、白兰花、白玉兰花、白缅花（广东通称）。

【植物形态】 乔木、高达10米。树皮灰色，叶革质、椭圆形或矩圆形，两端均渐狭，两面均秃净，或于背面薄被疏毛。网脉于干时两面均甚明显。具叶柄，上有短的托叶痕迹，长不及柄全长1/3。花白色，极香。花被裂片狭披针形。果多数不结实。

【药用部分与性味】 花。气芳香，性温，味辛。

【效用】 能治白浊及女子白带，民间用盐生浸，以咸花煲粥治小儿咳嗽。

【用量】 0.5—1两。



54 白玉兰

Michelia alba DC. (木兰科)

55. 白 花 茶

【别名】 扭肚藤（番禺），青藤（新会、台山），硬骨青（合浦），青藤仔（广州、花县、增城、罗定、乐昌、海康、徐闻、廉江、遂溪、电白、阳江、阳春、高州、化州、茂名），人字草（从化、清远），哩囉刺（乐东），秀英藤（阳江），谢三娘（海南）。

【植物形态】 藤状灌木，叶为单叶，对生，具短柄，卵状披针形，先端短尖或钝尖，基部浑圆，截头状或稍心形，被微毛或近秃净或沿背脉上有柔毛。花为白色，果球形。

【药用部分与性味】 药用干燥叶及幼枝，味甘淡、性凉。

【效用】 清热祛湿。

【用量】 1—2两，煎服。



55. 白花茶

Jasminum amplexicaule Buch-Ham. (木犀科)

56. 白 花 丹

【别名】 白云花，假茉莉，白雪花叶。

【植物形态】 攀援状亚灌木，高2—3米，分枝较多。叶纸质、短圆状卵形至卵形，先端短尖或渐尖、基部渐狭而成一短柄。穗状花序。花冠白色或白而略染蓝。

【药用部分与性味】 药用干燥枝叶、根或新鲜叶。苦凉，有毒。

【效用】 消肿散瘀、解毒祛风、清肝热、行气。

【用量】 干用5钱—1两，煎服。

【说明】 1. 有毒部位：叶、根皮、枝、根。

2. 有毒成分：蓝雪精 $C_{11}H_{16}O_7$ 。

3. 中毒症状：有刺激性苦味，尿带红色，肝阵痛，涂于皮肤会引起发炎、肿胀及生水泡，中毒出现麻痹。

解救办法：内用粘滑剂，如有痲疼，可给止痛药如阿片等。



56. 白花丹

Plumbago zeylanica Linn. (兰雪科)

57. 五叶金花

【别名】 白纸扇（高要、增城、电白、阳江、阳春、罗定、乐昌），凉九（英德），野白纸扇（广州），白毛茶（化州），白花藤（高州、化州、茂名），白花茶（韶关、花县），春甘藤（五华），山甘草（惠阳），凉藤仔（河源、连平），小凉藤（合浦、湛江、钦县），尤藤（琼中），凉白茶（龙门），白叶仔（新兴），蝴蝶藤，蛛蝶藤，尾蝶藤（潮汕），山甘茶、水甘茶、甜茶（潮安、潮州），仙甘藤（揭阳、潮阳、普宁），凉藤（普宁），白蝶藤（惠来）。

【植物形态】 直立或攀援状灌木或亚灌木。小叶被柔毛，单叶，对生少有轮生，膜质或薄纸质，卵状长椭圆形或状披针形，端渐尖，基部广楔形，叶面无毛或疏被毛，叶背被柔毛，托叶2深裂，裂片线状，叶柄短，伞房状的聚伞花序，顶生，无柄，具花多数，在花序外围的萼片有2片少有1或4片变成白色叶状，这种叶状的萼片呈阔椭圆形，有5—7纵条，顶端钝或短尖，基部狭楔形，花黄色漏斗状，浆果近球形。

【药用部分与性味】 全草，味苦涩，性凉。

【效用】 能清热疏风，清心降火，止渴生津，去腐生肌，止咳、解毒，去湿，治风热感冒，口舌生疮，心经伏热，中暑，风湿骨痛，伏暑下痢预防中暑、皮肤疮疥溃烂。

【用量】 1—2两



57. 玉叶金花

Mussaenda pubescens Ait. f. (茜草科)

58. 玉芙蓉


【别名】芙蓉菊、香菊、千年艾、蕮艾（广州植物志），细叶芙蓉（广州）。

【植物形态】直立，分枝亚灌木，高10—40厘米。叶互生，紧聚于枝顶，狭倒卵形状楔形，密被灰白色短柔毛，顶端3—5齿裂或分裂，基部狭长，裂片卵形或狭矩圆形。头状花序生于上部叶腋内，具柄，成一顶生，具叶的总状花序近球形。

【药用部分与性味】叶、地下根。味苦、性微凉。

【效用】叶能清热解毒，辟臭秽，化痰止咳、解麻痘毒、治鸡咳、麻疹咳嗽、麻疹发痒、小儿腹泻、疮疡、乳疮。根能治内伤咳血。

【用量】2—5钱。



58. 玉芙蓉

Crossostephium chinense (L.) Mak. ex. Cham &
Schlecht (菊科)

59. 半枫荷

【别名】半枫荷（广东通称），翻白叶树（海南、广州植物志），鹅掌枫（合浦、钦县），大叶半枫荷（广宁、四会、德庆、封开、怀集），姚婆枫（阳江、阳春），红白背（电白），白背枫（高州、茂名、阳江、阳春）。

【植物形态】常绿乔木，高可达15米，幼枝被红色或黄色茸毛。叶二型，单叶，互生，革质，生于幼苗上或再萌发的新枝上的叶为盾形，直径20—30厘米，掌状五深裂，基部截头形，有脉8—11条，于叶柄着生处向四面放射，叶柄约与叶等长。其他的叶为长椭圆形或卵状长椭圆形，长7—15厘米，3.5—8厘米，先端渐尖，基部略扁斜，圆形，截形或微心形，边全缘，叶背密被黄色茸毛，叶柄长约1厘米，托叶长椭圆形，较叶柄为短，花叶生，花瓣白色，果实为蒴果，具短柄，椭圆形，长4—5厘米，宽1.8—2厘米，外密被锈色星状毛。花期8月。

【药用部分与性味】根。味微辛，气香，性微温。

【效用】祛风湿，利筋骨。主治风寒湿痹痛，关节炎，四肢疲软无力，手足麻痹。

【用量】干根1—2两，煎服或浸酒服。



59. 半枫荷

Pterospermum heterophyllum Hance (梧桐科)

60. 半 边 旗

【别名】 单边旗（广宁、四会、德庆、封开、怀集），半边梳（罗定、新兴、广州），半边莲（湛江、合浦、惠阳），凤尾（徐闻、海康、廉江、遂溪、电白），井毛、凤尾毛（陆丰、潮安、普宁），凤尾草（河源、连平、龙川、五华），小凤尾（海口、罗定），望仔藤（澄迈、琼海），大叶雉鸡尾（龙川、河源），野莲草（乐昌），半边牙、半边蕨（广州），黑骨芒、雷公翼、雷公人、铁线莲（新会）

【植物形态】 多年生草本高约30—100厘米。根茎粗短，横生，外表暗棕色，质坚硬，被褐褐色线形的鳞片，须根众多，丛生。叶疏生或成簇，为一回羽状复叶，卵状披针形、纸质，近生，叶柄长20—50厘米，赤棕色，无毛，粗壮，叶端渐尖，羽状深裂，裂片线形，羽片近对生，斜出，愈近上部的羽片愈小，羽片下侧呈线状长椭圆形的裂片，上侧裂片缺或不发达。孢子囊群线形，连续排列于叶缘，孢子囊群盖与孢子囊群同形，膜质，由多少变形的叶缘反卷而成。

【药用部分与性味】 全株，味微辛、性温。

【效用】 能祛风解毒、散瘀消肿、治跌打瘀血肿痛、刀伤出血、疮毒，煎水外洗治皮肤瘙痒、疮疖，鲜草捣烂外敷毒蛇咬伤。

【用量】 干用5钱—1两。



60. 半边旗

Pteris semipinnata Linn. (凤尾蕨科)

61. 半 边 莲

【别名】 细叶半边莲(广州)，急解索(本草纲目)，顺风旗，单片芽(岭南草药志)，蛇胆草(五华)，蛇舌草(花县)，孖带藤(化县)，半畔莲(潮汕)，半畔花(潮安、澄海、南沃)，一畔花(潮安、澄海)，一片莲、单片莲(普宁)

【植物形态】 半直立秃净草本，茎细弱，光滑无毛，节上生根，单片互生薄纸质，线形或狭披针形。夏初腋生单花，淡红色或淡紫色，花后结蒴果，内藏多数种子。

【药用部分与性味】 全草，味微辛，性平。

【效用】 能退炎消肿，凉血解毒，利尿。

【用量】 内服干用5钱—1两，外敷适量，多鲜用。



61. 半边莲

Lobelia chinensis Lour. (山梗菜科)

62. 石楠藤


【别名】 菊苣（唐本草），山菊（增城、新会、台山、乐昌、合浦、湛江、钦县、阳江、阳春、电白、文昌、澄迈、琼海），山菱（高鹤、湛江、合浦、钦县、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白），石楠藤（广州、广宁、四会、德庆、封开、怀集、始兴），也侧苗（始兴），酒饼藤（连平），血姜（化县）。

【植物形态】 草质藤本，常以气根攀于树上或岩石上，节肿胀，常生根，长可达数米。叶互生，具柄，革质，椭圆形或长椭圆状披针形，长6—12厘米，宽2.5—4.5厘米，全缘，具3脉或5脉，叶柄长3—8毫米。花小，绿色，浆果黄色球形。

【药用部分与性味】 茎、叶。性温，味辛。

【效用】 祛风寒，止咳，强腰足，补肾助阳。主治风寒湿痹痛，腰脚无力，风寒感冒，咳嗽气喘。

【用量】 5钱—1两。



62. 石楠藤

Piper hancei Maxim. (胡椒科)

63.石 仙 桃


【别名】 上石斛、大吊兰、蚂拐爪、浮石斛、上石仙桃。

【植物形态】 根茎短粗，匍匐状，披膜质鳞叶，每隔1—2厘米，分生一假鳞茎，其下侧有须根1—2条，假鳞茎肥厚，短圆柱形，或长卵形，外表皱缩，污黄色至黄棕色，光滑，顶端有疤痕（叶痕），顶端中央常有锥尖状干枯的芽。基部有鞘状鳞叶，质坚稍韧，断面白色，总状花序生于花茎之顶，下弯，有绿白色的花8—20朵。

【药用部分与性味】 假鳞茎。味甘淡、性凉、气微。

【效用】 能清肺郁热、养肺阴、化痰止咳、利尿。治内伤咳嗽、小儿热积、肺热咳、湿热浮肿。

【用量】 干5钱—1两煎服。



63. 石仙桃

Pholidota chinensis Lindl. (兰科)

64. 龙 脷 叶

【别名】 龙脷叶（佛山、新兴、乐昌、罗定、增城、阳江、阳春、台山、新会、电白、茂名、德庆、封开），龙舌叶（合浦、湛江），龙味叶（清远、广州）。

【植物形态】 常绿小灌木，高达40厘米，叶互生，具短柄，常聚生于小枝顶端，阔卵形至长椭圆形，长5—9厘米，宽2.5—4厘米，全缘，叶柄粗壮，长约1—2毫米，托叶卵状三角形，长约3—4毫米，老熟时草黄色。花小，暗绿色，丛生于叶腋内或排成极短的总状花序。蒴果具短柄，形如豌豆。

【药用部分与性味】 叶，味甘淡，性平。

【效用】 清肺热，主治痰火咳嗽

【用量】 0.3—1两，煎服或加瘦肉蜜枣煎服。



64. 龙脷叶

Sauròpus rostratus Mig. (大戟科)

65. 布 渣 叶

【别名】 破布叶、布渣叶（番禺）、破布树（普宁、阳江、阳春）、布渣叶（南海、顺德、化县、台山、新会）、渣布叶（阳江、阳春）、布豆叶（高州、茂名）、崩补叶（广宁、四会、德庆、封开、怀集）、布渣木（合浦、湛江、钦县）、牛筋子（琼中、琼海、乐东）、假布渣（从化）、布包仔（惠阳）

【植物形态】 本品为灌木或小乔木。单叶互生，具短柄，纸质，卵形或卵状长圆形，长10—15厘米，宽4—8厘米，先端渐尖，基部浑圆，边缘有小锯齿，托叶绒状披针形，长约为叶柄之半，圆锥花序顶生或生于上部叶腋，被星状柔毛，黄色。核果近倒卵形，直径约7毫米，无毛，全缘，核有毛。

【药用部分与性味】 药用为干燥叶。

【效用】 功能清热消滞。



65. 布渣叶

Microcos paniculata Linn. (椴树科)

66. 瓜子菜


【别名】瓜子菜（增城、东莞、番禺、博罗、台山、新会、德庆、封开、高州、岭南采药录），马屎苋（增城、罗定、电白、乐昌），猪母菜（陆丰、普宁），鱼鳞菜（海口、定安、屯昌、琼中、澄迈、合浦、湛江、茂名），蜆壳菜（广州），酸甜菜（阳江、阳春），老鼠耳（连平），马苋（名医别录），马齿苋（蜀本草），五行草、长命菜（广州植物志），酸菜、马排菜（新会），蚝肉菜、长寿菜（广州），猪肥菜（海南），五方菜（草药纲目），红猪母菜、红胶墙（潮汕），红骨猪母菜（饶平），山滑菜、猪母酸（海丰），红马齿苋、胶墙菜（潮安、潮州），狗头狮草（惠来）。

【植物形态】一年生，匍匐或披散，分枝，肉质草本，全体光滑无毛，高10—50厘米。茎常淡紫色。叶互生或近对生，肉质，扁平，椭圆状倒卵形，端圆形，截形或微凹，基部宽楔形，全缘，叶面深绿色，叶背浅绿色，除中脉外侧脉不明显，叶柄极短，花轴射对称，无花柄3—5朵排成头状花序，腋生及顶生，花白色，蒴果长形，干壳质，盖裂，种子多数黑色，扁圆形。

【药用部分与性味】全草，味酸，性寒。

【效用】能清热、除湿、解毒、凉血、散血、消肿、通利大小便、消瘀化积热、杀菌止痢、治赤白痢、关节肿痛、睾丸红肿刺痛、肛门肿痛、小便刺痛、大便不便、淋浊、烧虫、痔疮出血、外治疮疖丹毒、蛇虫伤。

【用量】干用1—2两，鲜用2—4两。



66. 瓜子菜

Portulaca oleracea Linn. (马齿苋科)

67. 仙 鹤 草

【别名】 仙鹤草（通称），龙牙草（救荒本草）。

【植物形态】 多年生草本，高40—120厘米。根深入土中，主根黑棕色，细根颇多。茎直立，丛生圆柱形，表面具纵沟和棱角，密生白色或淡黄色长柔毛，有时散生白色短柔毛，上部分枝，基部木质。叶为奇数羽状复叶，具根出叶和茎生叶，基部具托叶2片，托叶斜卵形或近卵形，顶端骤尖或斜截，基部抱茎，两面均被白色柔毛，边缘具稀疏深裂齿膜质，小叶3—9片，在叶轴上对生或近对生，各对小叶间常杂有威对或单生的小型裂片，和小叶片呈间隙状排列，小叶片大小不等，顶端中部小叶较大，愈至下愈小，倒卵形，椭圆形或近卵形，偶为披针状倒卵形，顶端锐尖，基部楔形或近圆形，有时略偏斜，上面绿色疏被淡黄白色长柔毛，下面淡绿色，脉上被柔毛，叶两面均集布透明小腺点，侧脉和主脉呈锐毛，直达叶缘，叶脉下面隆起，边缘具整齐圆齿状或缺刻状锯齿。总花序长而纤弱，略被疏毛，花黄色。果为瘦果，通常1—2枚包于宿存在萼内，外面具钩刺。种子倒卵形，细小。

【药用部分与性味】 全草。味微涩苦、性温。

【效用】 能止血、补虚、收敛、健胃、治劳嗽、吐血、咯血、尿血、便血、牙龈流血、崩漏带下、血痢、月经不调。

【用量】 2—4钱



67. 仙鹤草

Agrimonia pilosa Ledeb. (蔷薇科)

68. 田 基 黄

【别名】 黄花气、黄花屎、禾下屎、耳盘草（五华），鸡骨香（惠阳），地耳草、雀舌草、禾下丝、禾霞气（广东中药），花舌草（广州），黄花仔、黄花草（潮安、澄海），七寸金（南沃），干下植、干打植（普宁、海丰），四稔植（普宁）。

【植物形态】 一年生草本，茎披散或直立，高5—35厘米，无毛，稍具四棱，叶小，对生，抱茎、卵形，长5—10毫米，基部有3脉，端部钝，有黑色斑点。花黄色，集成2歧聚伞花序，蒴果，红棕色，长卵形。种子细小多数。

【药用部分与性味】 全草。味微甘苦，性平。

【效用】 能解毒散瘀、消肿、清血热、治肝炎、乳癌、肺癌、丹毒、流注、毒蛇咬伤、跌打肿痛、恶疮毒肿。

【用量】 干用5钱—1两。

(科属名) 田基黄

南...
山...
...

【各...】
...



68. 田基黄

Hypericum japonicum Thunb. (金丝桃科)

69. 东风桔 (广东通称)


【别名】酒饼糖 (广州植物志, 广州、海南、番禺、新会), 东风橙 (新兴、罗定), 东风桔 (广州、新会、台山、番禺、阳江、阳春), 山桔, 鬼甘糖 (湛江、合浦、钦县), 山柠檬 (广州、花县、从化、南海), 鬼桔仔、鬼力登 (高州、化州), 九结树 (海口、定安、屯昌、澄迈、澄海), 虾力眼 (增城、博罗、东莞), 山桔仔 (罗定、乐昌), 狗骨糖 (广州、南海), 乌甘刺 (陆丰), 鬼桔栗 (东莞)。

【植物形态】小灌木, 茎枝坚硬, 分枝多, 刺坚硬, 腋生。单叶互生, 无托叶, 叶片厚革质, 有油点, 倒卵状椭圆形或倒卵形, 长1.5—5厘米, 宽1—2.5厘米, 先端极钝或凹入, 基部狭长而成一短柄, 有多数纤弱的叶脉。花无柄或近无柄, 单生或2—3朵聚生于叶腋内, 花白色至黄色, 花瓣5枚, 长3—4毫米。果为浆果, 近球形, 绿色。花期6—7月, 果期9—10月。

【药用部分与性味】根、叶。味苦辛、气香、性温。

【效用】祛风、散寒、行气、止痛、去积、止咳、治感冒发热、咳嗽、胃痛、腹痛、风湿骨痛。

【用量】干用1—2两, 煎服。



69. 东风桔

Atalantia buxifolia (Poir) Oliv. (芸香科)

70. 地胆头

【别名】毛连菜（救荒本草），地胆草（徐闻、乐东、廉江、遂溪、电白、琼山），牛过埔（普宁），地龟头（五华），药丸草，牛食埔（潮安），牛舌草，假公英（临高），蛤仔头（阳春、阳江），蛤仔草（阳江），土蒲公英（东莞），磨地胆，天芥菜，土公英，苦地胆，草鞋底（广州），牛喫埔（潮汕），埔大葵（汕头、澄海、南沃），地斩头（潮安、海州、揭阳、南沃），了鸦头（潮安、潮州、饶平），角蚁草，埔芝（潮安、澄海），羊耳草，贴地枇杷（潮安、潮州），酒饼草（澄海、南沃）杜盏头（海丰）。

【植物形态】多年生草本，直立，高30—60厘米，全体被白色粗毛，根茎短，丛生多数须根，新鲜时黄白色，干燥后灰黄色，叶大部分根生，匙形，或长圆状倒披针形，长5—10厘米，边缘具钝细齿，花淡紫色，瘦果有棱，顶端有4—6枚长而硬的刺毛。

【药用部分与性味】全草。性凉、平，味苦。

【效用】民间常用为消暑解热剂，散瘀凉血解毒，去瘀止血，治一切肿毒，叶可贴热毒疮，治肠风下血，根1两，生苡仁3钱同煎服，治腿脚肿而无痛甚效。

【用量】0.6—1两。



70. 地胆头

Elephantopus scaber Linn. (菊科)

71. 地 稔(广东通称)

【别名】铺地锦(岭南采药录)、山地稔(生草药性备要)、地稔(南海、番禺、顺德、高鹤、电白、徐闻、海康、廉江、遂溪、紫金、兴宁、罗定、新兴、台山、新会、合浦、湛江、化县、高州、化州、茂名、高要)、磨地稔(从化、花县、高州、增城、东莞、南海、番禺、顺德)、矮脚地稔(河源、连平)、短地稔(五华)、铺地稔(普宁)、地甲草(乐昌)、地稔藤(化县)、铺地藤(东莞)、连地稔(英德)。

【植物形态】 被散或匍匐状小灌木。枝秃净或被疏粗毛。单叶对生，小，卵形，倒卵形或椭圆形，长1.2—3厘米，宽8—20毫米，先端短尖，基部近圆形，有3—5脉，除叶面边缘和背脉上薄被粗毛外，余均秃净，叶柄长2—4毫米，被粗毛。花1—3朵生于枝梢，直径约2.5厘米，花瓣紫红色。果实为浆果，球形，熟时紫红色，被粗毛。花期5月。

【药用部分与性味】 根。味微酸，性平。

【效用】 安胎。治胎动不安，习惯性流产，可煎汤燉鸡服，又治产后腹痛，赤白痢疾，足膝痠软无力，其叶或全株煎水外洗皮肤，可治痔疮，热毒疮，疥癬，烂脚，小儿胎毒引起之疮。

【用量】 干根1—2两煎服，外洗用全株也可。



71. 地 稔

Melastoma dodecandrum Lour. (野牡丹科)

72. 羊蹄草

【别名】 星毡草、小叶下红、假透骨草、生草、一点红(广州植物志)、红背叶(增城、东莞、高要、高鹤、清远、乐昌)、马蹄草(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、阳江、高州、茂名、化州)、叶下红(湘阳、潮安)、紫背红背叶、细叶红背叶、(连平、河源)、叶底红、(普宁、陆丰)、红背紫苑(从化)、紫毛菜(罗定)、披艾菜(乐东)、烂耳洋(新会、台山)、后红(临高)、羊蹄菜、马蹄香(阳春)、走马天红、红背灯(英德)、红背果(普宁)、片江育(昌江)、耳背羊、紫背菜、山芥兰、匙羹菜、红背草(新会)、紫檀、布芥草、红背紫檀、爆仗草(广州)、红背菜(中药材新种介绍)、紫背草(澄海)、红下叶(普宁)、叶背红、斋缸仔草(南沃)。

【植物形态】 直立草本，高30—50厘米，无毛或被疏毛，根茎细长，圆柱形，浅棕黄色，多分枝，细圆柱形，有纵直纵纹，灰青色或黄褐色。单叶，互生，稍肉质，灰青色，或暗绿褐色，生于下部的叶阔卵形或狭倒卵形，基部狭细，延长成柄状或否，叶片常呈琴状分裂，并有粗钝齿，生于上部的叶较小，宽披针形，叶缘有浅齿或近全缘有者琴状分裂，基部多少抱茎，无柄，叶背常带紫红色，花紫红色。头状花序狭钟形，瘦果圆柱形。

【药用部分与性味】 全草，味淡，性凉，无毒。

【效用】 能溶解大肠湿热，消肿拔毒，清凉去湿，凉血解毒，活血消肿，治痢疾，麻疹热毒内蕴，湿热痱疹疮节痈肿，湿疹痒痛，乳疮，小

儿生殖器红肿，目赤，跌打肿痛。

【用量】 干用8钱—1.5两 外用酌量。

【禁忌】 孕妇慎用。



72. 羊蹄草

Emilia sonchifolia (L.) DC. (菊科)

73. 过 岗 龙

【别名】过江龙(广州、佛山、从化、罗定、德庆、封开、韶关)，扭骨风(徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、茂名、合浦、湛江)，左脑风(高州、欽县)，利洛藤、猪鞭麻(琼中、乐东)，陈刺婆(儋县)，左扭风(广宁、四会)，圆龙，血龙，五花血龙，龙须藤(广州)。

【植物形态】攀援灌木，嫩枝全株被柔毛。叶卵形或心形有5—7条脉，长2.5—11.5厘米，阔2—9厘米，基部心形，其凹入约5毫米，顶部二裂，裂至为全叶的 $\frac{1}{3}$ ，卷须不分枝，和叶对生。花白色。荚果扁，多毛，长约7.5厘米，阔2.5厘米，有3—5颗种子。

【药用部分与性味】茎木。味辛，微苦，性温。

【效用】祛风湿，行气活血，壮筋骨。治风寒湿痹，关节炎，筋骨痠痛，跌打积瘀作痛，老年人腰痛。煎服或加瘦猪肉同煎服。

【用量】内服1—2两。

【说明】商品另有一种剑骨过岗龙，俗称骨龙，茎扁而扭曲，有脊状隆起，外表黄色，横断面木部亦密布针孔，但无棕红色菊花状纹，其功用与本品相似。



73. 过江龙

Bauhinia championi Benth. (豆科)

74. 自 扣 草

【别名】毛芹菜（广州）

【植物形态】一年生草本，被毛，茎直立，高0.3—1米。叶互生，有小叶3枚，小叶三深裂，边缘有粗锯齿，长1.5—3厘米，宽1—2厘米，两面均具毛。花黄色。果为瘦果，群集于花托上而成一圆头状体。

【药用部分与性味】全草，味淡微苦，性寒。

【效用】眼科用药，除炎去膜，外敷脉门（不超过12小时）去眼中黑点，有微毒。

【用量】2—3钱，其汁液切不可点眼。

【说明】《生草药性备要》记载自扣草谓：“性烈不内服，治眼病去膜如神，其法，先以铜钱一个置脉门上，将捣烂的汁敷钱眼处，毒即由钱眼处扯出，眼膜自消，虽致至起泡亦无碍。”据此，本品不可内服。但现在有的医生认为可内服，要用晒干者，用量5钱左右，布袋装起煎服。



74 自扣草

Ranunculus cantoniensis DC. (毛茛科)

75. 如意草

【别名】 马纓丹、五色梅、臭草（广州植物志），臭金凤、香花、如意花、如意花草、五代同堂、臭花、臭花草、五色花（广州），头晕花、七姊妹（新会）。

【植物形态】 直立灌木，有强臭味，茎方形，有毛和下弯的钩刺，单叶对生 卵形或卵状椭圆形，边缘有锯齿两面均有毛，叶面特别粗糙。花腋生穗状花序或稠密的头状花序，淡绿色，粉红色，红色，黄色或橙黄色。核果球形，肉质，熟时紫黑色。

【药用部分与性味】 嫩枝，花叶，根头，味微苦，性凉。

【效用】 嫩枝叶外用能驱风止痒，消肿止痛，解毒，研末外敷治疔肿疮毒（或用鲜叶捣烂外敷），煎水洗浴治疥癬，皮肤湿毒，外用适量，根治外感传里，久热不退，并治痰火核。

【用量】 干用 1—2 两。



75 如意草

Lantana camara Linn. (马鞭草科)

76. 安 石 榴

【别名】石榴（通称），石榴皮，石榴花，石榴树皮，石榴根皮，石榴叶（药用通称）。

【植物形态】落叶灌木或小乔木，高可达7米，通常具针刺，小叶四棱形光滑，木材黄色，叶略对生或丛生，长椭圆形或长倒卵形，全缘，光滑，先端尖或钝两端均狭，具短柄，萼具托叶，花红色，顶生或腋生，果实球形，假浆果，顶端具宿存的萼裂片，果皮黄色，肥厚不整齐开裂，露出种子，种子常呈淡红色，外种皮透明，含有甘酸的液汁。

【药用部分与性味】根皮，果皮，茎皮，花，叶，种子。果实味甘酸温涩，性平。

【效用】果皮（石榴皮），能因瀉，杀虫止痛，治肠炎泻痢，下血，脱肛，遗精，崩漏，带下，大便下血，绕虫腹痛。

茎皮（石榴树皮），根皮（石榴根皮），能杀虫，收敛，涩肠止痛，驱肠虫，绦虫，治寸白虫，蛔虫，泻痢脱肛，崩带。叶（石榴叶）煎水可洗眼。

花：（石榴花）治心热吐血，衄血，金疮出血。

种子，果实，治胃病，心病。

【用量】 3—5钱。



1. 花枝 2. 果实

76. 安石榴

Punica granatum Linn. (安石榴科)

77. 百 部


【别名】 百部，百部根（通称）

【植物形态】 多年生攀援草本，高可达5米。块根肉质，纺锤形或圆柱形。茎上部缠绕，表面平滑无毛，具细纵纹。叶通常对生，广卵形基部浅心形，全缘或微波状，叶脉7—11条。花腋生，具花梗，花淡紫色。蒴果扁倒卵形，果内含多数种子。种子长椭圆形，深紫褐色。

【药用部分与性味】 块根。味甘苦，性微温。

【效用】 能温肺止咳，杀虫。治肺劳咳嗽、寒嗽，蛔虫、蛲虫，外敷皮肤疥癣，浓煎外搽灭诸虱。

【用量】 1—2钱。



77. 百 部

Stemona tuberosa Lour. (百部科)

78. 吊 兰

【别名】 吊兰、吊兰子（广州），~~覆叶吊兰~~（广州植物志）。

【植物形态】 附生植物，茎短而粗壮。叶簇生，厚而坚韧带状，先端钝而有不等的2侧裂，叶片与鞘间有明显的节，干时叶即由此脱落。花茎远长于叶，由叶簇侧抽出，基部有鞘状鳞片，上有延长，倒垂，多花的总状花序，花通常暗紫褐色。蒴果似三角形。

【药用部分与性味】 全草、种子、根茎。味微辛，性平。

【效用】 全草能清肺热，止咳，止血凉血，治声嘶音哑，妇女经闭，白浊，白带，跌打损伤。

种子：能治百日咳。

根茎：治肺热咳嗽，吐血，据云可作避孕药。

【用量】 5钱——1两。



78. 吊 兰

Cymbidium pendulum (Roxb) Sw. (兰科)

79. 灯笼草

【别名】水灯笼草、打卜草、荷卜草、打头泡、打额泡、苦灯笼草（广东中药），善灯笼、水灯笼、荷卜仔草、打泡草、鬼灯笼（广州）。

【植物形态】直立或披散草本，高40—90厘米。主根明显；茎棱柱形，被疏毛，老茎粗壮，无毛，灰青色至灰褐色。叶互生，稍厚，卵圆形，灰绿色至茶褐色，叶端短尖，边缘疏具不规则的粗齿，叶基楔形或微心形，叶面近光滑，叶背之叶脉疏被柔毛，叶柄细长被毛。花腋生，阔钟形，黄色，花柄细弱，浆果球形，灰青色。种子多数，阔肾形，扁平，黄棕色。

【药用部分与性味】全株。味苦、性凉。

【效用】能清湿热，解毒，治睾丸炎，疝气痛，湿热病之热毒，炽盛发斑，天泡疮。

【用量】干用5钱——1两，外用适量。



79. 灯笼草

Physalis peruviana Linn. (茄科)

80. 老鼠拉冬瓜

【别名】 马屨儿（救荒本草），蜂尾冬瓜（广州）。

【植物形态】 本品为柔弱草质藤本，长1—2米，茎蔓细长，有纵沟槽，卷须纤细，不分枝，叶薄纸质，三角状，卵圆形，先端短尖或渐尖基部阔心形，边近全缘或不规则的浅钝齿，有者稍分裂，两面粗糙，灰绿色，背面色浅，叶面密具白色粗糙小圆斑点，叶柄细长，疏被长毛。花白色，单生或数个聚生于一叶腋内，果卵形或椭圆形，果柄线形。种子扁平，有强边缘。

【药用部分与性味】 地面茎叶。味甘，性凉，气微味淡。

【效用】 能清肝热，去湿利水，治湿吹骨痛，睾丸肿大。

【用量】 干用5钱——1两



80. 老鼠拉冬瓜

Melothria indica Lour. (葫芦科)

81. 谷 精 草

【别名】谷精草（从化、新会、台山、高要、高鹤、广宁、四会、德庆、封开、怀集、清远、乐昌、电白、阳江、阳春、高州、茂名、化州、徐闻、海康、廉江、遂溪、兴宁、陆丰、惠来、潮阳、潮安、新兴、开宝本草），谷丁草（陆丰），铜鼓钟（东莞、增城），衣钮草（琼中），顶子草（儋县、乐东），田桑（澄迈、琼海），田川（海口、定安、屯昌），馱子草（高州），水精子（文昌），簪子草（澄迈），乌耳草（宝安），珍珠草（大埔），白草（茂名），谷精珠，谷精（广州）。

【植物形态】多年生草本，丛生，高约30厘米。叶簇生，近直立，线状披针形，端短尖或钝，具多数基出脉，有透明的横格。花序柄多数簇生纤细草黄色，五棱形，旋扭状，稍斜裂，松弛透明，先端渐尖，头状花序稍圆状卵形，坚硬，基部截形，被白色粉状柔毛，蒴果膜质，3裂。种子小，卵形，熟时棕褐色，外被白色细毛。

【药用部分与性味】全株，花蕾。味甘，性平。

【效用】能清凉祛风明目，消炎清肝泄热，利尿，散风火，治感冒，喉头炎，热病头部充血性疼痛，小便不畅，淋沥浑浊，两目赤肿，目翳不明，畏光流泪，各种眼疾，头痛，齿痛，喉痛。

【用量】3—4钱。



81. 谷精草

Eriocaulon wallichianum Mart. (谷精草科)

82. 谷 木(广东通称)

【别名】 构树(广州植物志)，栲树(植物名实图考)，谷树(中国植物图鉴)，栲实子树(广州)。


【植物形态】 乔木，高达16米，树皮暗灰色而平滑，小枝有毛，叶具长柄，叶纸质阔卵形至短圆状卵形，长7—20厘米，先端渐尖，基部略偏斜，心形，边缘有粗齿，幼时常3—5深裂，叶面粗糙，叶背密被柔毛，叶柄长2.5—8厘米，托叶膜质，大，脱落。雌花序头状，具长柄，直径12—18毫米，果肉质，砖红色，光亮。花期3—4月。

【药用部分与性味】 根，味淡，性凉。

【效用】 清热，解毒，利尿祛湿。治水肿淋浊，梅毒，小便刺痛，湿火骨痛。

【用量】 干用，煎服5钱——1两，治梅毒用4—8两。

草 藥 圖 解



82. 谷 木

Broussonetia papyrifera Vent. (桑 科)

83. 还魂草

【别名】 还魂草、卷柏、万年松、瓦松、九死还魂草、生长草、万岁、长生不死草、豹足。

【植物形态】 多年生草本。茎短或细长，分枝直立，密生于茎顶，呈扁形。叶异形，下面的密集，向上，阔卵形，长约2.5毫米，质地坚韧，边缘略具小齿，中肋明显，近软骨质。孢子叶卵形，边缘灰白色，膜质，具小齿；孢子囊单生于孢子叶腋间，大孢子圆球形，灰黄色，有大孢子1—4枚，多生于山地岩石，石壁上或石隙间，能耐旱，故干后数天浸泡水中，仍能生长。

【药用部分与性味】 全草。性平，味辛。

【效用】 理血疏风；主治瘀微血闭，月经腹痛，产后恶露不下，四肢浮肿。

【用量】 1—3钱。



83. 还魂草

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring.

(卷柏科)

84. 沙 姜


【别名】 山奈、三奈、三藜、山辣。

【植物形态】 多年生宿根草本，根茎单生或数枚连生，芳香。叶根生，薄，近无柄，平卧地面，圆形或阔卵形，长7—15厘米，宽5—12厘米，干时全黄色，叶缘及叶尖有紫色斑点，花白色，中心紫红色。蒴果。

【药用部分与性味】 根茎。味辛，性温。

【效用】 健胃散寒湿，治霍乱等病，阴虚内热者不宜使用。

【用量】 1—3钱。



84. 砂 姜

Kaempferia galanga Linn. (姜科)

85. 阴 香

【别名】 阴香、山玉桂、香胶叶（岭南采药录），月桂（本草纲目），天竺桂（开宝本草），假桂枝（高州、化州、茂名、阳江、阳春、徐闻、海康、廉江、遂溪、从化），土桂枝（广州、花县、陆丰、普宁、清远），山桂（寮中、儋县、乐东），桂木（湛江、合浦、钦县、电白），假玉桂（台山、新会），老贼骨（兴宁），香胶仔（阳江、阳春），土肉桂（台湾），~~山桂皮（湖南）~~，~~野玉桂树、野桂树、香桂、桂秧（海南崖、瓊志）~~。

【植物形态】 常绿，无毛乔木，高达15米，树皮不裂，叶厚革质，不规则的对生或互生，有离基3出脉，中脉与侧脉所成的脉腋内无隆起的腺体，卵形至长椭圆形，端短渐尖，基部阔楔形，表面绿色，有光泽，背面粉绿色，圆锥花序顶生，通常短于叶，花绿白色，浆果小，卵状。

【药用部分与性味】 茎、叶、树皮，味辛，性温。

【效用】 茎、叶、树皮能祛风止痛，消肿，行气，化气，活血破瘀健胃，外治恶毒大疮飞蛇疮。

【用量】 0.6—1两



85. 阴 香

Cinnamomum burmanii Bl. (樟科)

86. 车 前 草

【别名】 车前（本草经），车轮菜（救荒本草），钱贯草、田贯草、钱串草（广州），车前子（通称），车茶草（潮汕），青茶草、踏不死（潮安、潮州），蛤婆草（潮安、潮州、南沃），五条根（汕头南沃）野甜菜（潮阳）。

【植物形态】 多年生草本，有一短而厚的根茎。叶全部根生，具柄，直立或斜展，阔卵形或矩圆状卵形，全缘或有不明显的钝齿有脉5—7条，叶柄常与叶片等长，穗状花序，直立，纤弱，花通常密集，花冠小，淡绿色，蒴果卵形，盖裂，有种子8—10颗。

【药用部分与性味】 全草、种子。味淡，性凉。

【效用】 全草：能清热去湿，利尿通淋，止血，止烦，下气，除小虫，补五脏，明目，治小便刺痛，淋浊，白浊，疝气，祛痰止咳，滑胎，降泻，除湿痹，祛膀胱湿热，散血消肿。

种子：能止痛，利尿，通小便，养肺，强阴益精，明目，去风毒，镇咳，止泻，肝中风，热毒去心胸烦热，养肝，导小肠热，治气痿湿痹，男子伤中，女子淋沥不欲食，风冲眼赤痛，障翳，脑痛泪出，难产泻痢，血淋，阴下痒痛，小便不利，暑热下痢。

【用量】 1—2两。



86. 车前草

Plantago major Linn. (车前科)

87. 何首乌

【别名】首乌（广东通称），土首乌（增城、罗定、乐昌、电白、阳江、阳春），首红、乌肝石、夜交藤（广东中药），首乌藤、交藤、地精、夜交藤根（药材学），马肝石、芮草、蛇草（广州植物志）。

【植物形态】多年生，落叶，半木质，缠绕藤本，长达3—4米，根块状，茎块状，横走近肉质，白色，茎下部攀援状而蜿蜒平滑有棱角，绿紫色，老茎粗糙，有纵裂纹，棕褐色，上部缠绕呈线状，光滑，单叶互生，具柄叶片卵状心形，端渐尖，基部楔形至近心形，全缘，两面均无毛，绿色，近纸质，微含一种特殊的臭气味；托叶鞘状膜质，花细小，多数白色，密聚成多枝大形圆锥花序，顶生或腋生，花柄纤细，瘦果极小，卵形，黑色，平滑光亮。

【药用部分与性味】块根、叶、茎藤（夜交藤），块根：味苦、甘、涩，性微温；叶：味微苦涩，性平；茎藤（夜交藤）：味苦甘涩，性温。

【效用】块根：能补肝肾，益精血敛精气，强筋骨，乌须发并能促进血液新生及发育，治神经衰弱，未老先衰，阴虚久疟，遗精带下，腰膝酸痛，瘰疬肉肿，脑病，尙倦病，痢症，淋巴腺炎，便秘，久疟。

叶：能补肝益肾，和气血，化虚痰，去风湿，杀虫消肿拔疮毒，乌须发壮筋骨，治瘰疬肉肿五痔，久痢，便秘跌打肿痛，茎藤（夜交藤）：能宁心神，调营卫，治风寒通经络，除痹痛，壮筋骨，祛风除湿，失眠，便秘久痢，虚汗，疥癣作痒。

【用量】5钱—1两。



87. 何首乌

Polygonum multiflorum Thunb. (蓼科)

88. 杜 衡


【别名】 南细辛(中国经济植物志)，马蹄细辛，马辛，土细辛(浙江)，马蹄香(江苏)。

【植物形态】 多年生草本，有地下根茎，节间短，须根多，具有特异的辛香气味。根茎的顶端生有几枚鳞片及1—2个具长柄的叶片，叶片两年生，戟状广卵形或广卵形，质厚，顶端钝尖圆形或微凹，基部深心脏耳形稍向外开展，全缘，表面深绿色，有光泽，染有白色斑，仅背脉上及缘边有短毛。花单生于叶腋，具梗，花外为淡棕紫色，有淡黄色显著陷入的网纹，内面紫色，网纹隆起。果实为浆果状，熟时不裂，腐败后开裂，露出多数种子。

【药用部分与性味】 根茎，根：味辛辣，性温，有麻舌感，气芳香。

【效用】 能散风寒；化痰平喘，催吐，祛痰利尿，发汗，治风寒咳逆，痰瘤，水肿，支气管炎，感冒头痛，蛇伤，疮毒，损伤疼痛，口舌疮，用叶填塞蛀牙孔中可治牙痛。

【用量】 1—2钱。



88. 杜 衡

Asarum forbesii Maxim. (马兜铃科)

89. 豆 豉 姜 (广东通称)

【别名】 山苍子根 (清远), 山鸡椒 (植物名称, 兴宁), 山苍 (信县), 山苍树 (高要、高鹤、兴宁、紫金、河源、连平、清远、五华), 豆豉姜 (广宁、四会、广州、德庆、封开、怀集、花县、从化、清远), 毕澄茄根 (广州), 满山香、过山香 (广州、花县), 白救主、广九樟 (阳江、阳春、电白、高州、化州、徐闻、海康、廉江、遂溪), 乌皮樟, 赶狗樟 (湛江、合浦、钦县), 樟樟, 风樟 (增城、东莞), 苍子树 (广宁、四会、德庆、封开、怀集), 姜树 (琼海), 满山李 (花县)。

【植物形态】 落叶小乔木, 高可达10米, 木材, 叶和果均具有芳香气味。单叶互生, 叶纸质, 披针形或长椭圆状披针形, 长约10厘米, 宽1.5—2.5厘米, 先端渐尖, 基部广楔形, 叶面亮绿色, 叶背灰绿色, 羽状脉, 侧脉6—8对, 叶柄纤细, 长1—2厘米。花先叶开放或同时开放, 淡黄色, 气芳香, 生在小枝上, 伞形花序。果为核果, 球形, 直径4—6毫米, 熟时黑色。

【药用部分与性味】 根, 茎, 叶, 味辛, 气芳香, 性温。

【效用】 祛风, 去湿, 散寒, 行气, 散瘀, 消肿, 止痛, 治风寒湿痹痛, 风湿性关节炎, 脚肿软弱无力, 跌打肿痛, 消水肿, 治营养不良引起之水肿, 产后风, 产后头晕, 身肿痛, 煎水外洗及内服治风疹痲疹 (即荨麻疹)。

【用量】 煎服, 干用1—2两, 外用适量。



89. 豆豉姜

Litsea cubeba (Lour.) Persoon. (樟科)

90. 走 马 箭(广东通称)

【别名】尺苓叶根(广州常用草药)，走马风(东江一带)，接骨草(本草纲目)，蒴藋(名医别录，植物名称)，七星剑(潮汕)，金桃叶(潮安)，七叶星(普宁)。

【植物形态】为小灌木，高达1米以上，叶大，对生，奇数羽状复叶，叶长45厘米，上部小叶多少与总轴合生而有时下延，小叶5—7枚，椭圆状披针形，长8—10厘米，先端渐尖，幼时被疏柔毛，繖房花序，花白色，果卵形，直径3—4毫米，成熟时红色。

【药用部分与性味】根，味咸，性平，有猪屎臭。

【效用】祛风湿，舒筋活络，活血消肿，主治手足麻痹，软弱无力，风湿关节炎，周身骨痛，跌打损伤及疮疖，煎服或煎水外洗，浸酒服也可。

【用量】内服干用1—3两，与鸡脚，红枣同煲，治手足痠痛，软弱无力甚效。



走马箭
胡马箭

90. 走马箭

Sambucus javanica Reinw. (忍冬科)

91. 旱 莲 草

【别名】 墨菜(本草纲目)，鳢肠(唐本草) 黑墨草(德庆、封开、怀集、东莞、增城、罗定、阳江、阳春)，白花蓼草(潮安、潮阳)，来防草(澄迈、琼海)，黑草(临高)，白花蟋蟀菊、墨汁旱莲草(广州)，乌墨菜(惠阳)，白花蟋蟀草，土旱莲，白花蟋蟀草(潮汕)，白花棕草(汕头、潮阳、澄海、饶平、南沃)，白花蟋草(惠来、普宁、潮阳)，白花断血草(惠来、普宁)，白花墨草、墨草、乌墨草、执鼠草(潮安、潮州)，乌目菜(海丰)。

【植物形态】 一年生，披散或直立草本，高20—40厘米，茎稜柔弱，被疏粗毛，叶纸质，近无柄，长圆形或线状披针形，长2—6厘米，宽2—5厘米，两端均渐尖，全缘或上部有小波锯齿，上下面均被短粗毛，花白色，瘦果黑色，长椭圆形而略扁，具4棱。

【药用部分与性味】 全草，性寒，味甘酸。

【效用】 补肾阴，止血痢，乌须发，固齿。主治血痢，便血，须发早白，牙齿不固，外伤出血。广东民间用以治小儿疳积，肝热为滋补性收敛药。

【用量】 1.5—3钱，实泻者忌服。



91. 旱莲草

Eclipta alba (Linn) Hassk. (菊科)

92. 金 櫻 子 (广东通称)

【别名】大金英(河源、连平、潮阳、潮安、普宁、陆丰)，糖果子(五华)，唐墨勒(高要、高鹤、河源、连平)，金英藤(阳江)。

【植物形态】木质，攀援植物，无毛，有粗勾刺。叶通常3小叶3枚，革质，光亮而绿色，秃净，小叶卵形至椭圆形，顶端一枚长4—7厘米或过之，宽2.5—4厘米，侧生的叶较小，边缘有小而锐利的锯齿，叶柄和小叶的背脉上无刺或有疏刺，托叶中部以下与叶柄合生。花单生于侧枝之顶，花大，白色，直径5—8厘米，花序柄粗壮，与花萼管均具有刺，萼片大，被小毛。果近球形或椭圆形，长2—2.5厘米，宽约1.5厘米，有直刺。花期：春夏。

【药用部分与性味】果，根，叶。味涩，性平，果有酸味。

【效用】根性凉，能清热解毒，凉血通经，除痰火，止泻痢，治外伤积瘀。果能补精滋肾，活血养颜，止咳，健脾，治遗精。金樱根常作为凉茶配料，民间有用单味金樱根煎水外用薰洗痔疮者有一定效果。

【用量】干根5钱—2两，干果5钱—1两，煎服。



92. 金櫻子

Rosa laevigata Michx. (蔷薇科)

93. 金盞銀盞

【别名】三叶鬼针草，金盞銀盞（《广州植物志》），玉盞載銀杯，鬼针草，婆婆针，感暑草，盲腸草（广东中藥），石兰（阳江、高州、茂名），玉盞載金杯，蟹钳草，空针草（广州），黄花猛，猛兜头，虱圖仔，虾钳草，伤寒草，阿婆针，箭猛（新会），方骨苦楝，四方骨苦楝，四方枝苦楝（潮汕），方枝苦耐（惠来），虾尾草（潮安、普宁）三叶兰（普宁）。

【植物形态】一年生草本，高40—85厘米，茎直立，分枝，下部淡紫色，四棱形，无毛，或于上部的分枝上被微毛，中部和下部的叶对生，纸质而薄，羽状深裂或全裂，裂片顶端尖或渐尖，两面被微毛，边缘具不规则的细尖齿或钝齿，上部的叶互生，较小，羽状分裂，头状花序小，黄色，瘦果线形，黑色有棱。

【药用部分与性味】地上全草。味甘淡，性凉。

【效用】能透解暑热，消肿解毒，止痛，散瘀活血，清热去湿，治感冒发热，瘰疬大热，腹泻痢疾，跌打损伤，痈疽疮疖，外敷治蛇虫咬伤。

【用量】干用1—2两。

【说明】金盞銀盞还有另一种植物即 *Bidens biternata* (Lour) Merr et Sherif. (菊科)。

功用相同。



93. 金盞銀盤
Bidens pilosa Linn. (菊科)

94. 金 丝 草

【别名】 猫尾草（增城、东莞、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、潮阳、潮安、普宁），猫毛草，细竹叶（五华），牛尾草（徐闻、海康、遂溪、廉江、电白），金花草（连平），黄毛草，竹篙草，必子草（广州），搭壁竹（潮安、潮州、南沃、澄海），墙头竹（普宁、澄海），后坎草（揭阳南溪、澄海），狐狸尾（潮安、潮州），笔修草（饶平），马尾丝（揭阳）。

【植物形态】 多年生，簇生草本，高10—30厘米，须根黄白色，秆丛生，纤细直立，节明显，单叶互生排成2列，叶片扁平，线状披针形，顶端渐尖，两面和叶缘均多少被毛，叶鞘秃净，鞘口有毛。穗状花序单生于主秆和分枝的顶端，柔弱而微曲，小穗很小近圆柱形，成对着生，一具柄一无柄，花金黄色，颖果。

【药用部分与性味】 全草，味甘淡，性凉。

【效用】 能清热，祛湿，利水，通淋，治淋浊，肝热，痞积，小儿尿短，本草纲目记载治吐血，衄血，衄血，下血，血崩，瘴气，解诸药毒，疗痲痘疗毒恶疮，凉血散热。

【用量】 干草5钱—2两。

(草木部)
麥
屬



94. 金丝草

Pogonatherum crinitum (Thunb) Kunth.

(禾本科)

95. 金 花 草

【别名】 乌韭（本草经），石发（唐本草）
凤尾草（台山、新会、五华、高州、化州、茂
名、阳春），小叶凤尾草（澄迈、琼海），细叶凤
尾草（从化、罗定、增城、乐昌、电白、阳江），
金花草（清远、广州），金英拖西（新兴），石
百（河源），百叶（广宁、四会、德庆、封开、
怀集），假柏（高要），鸡骨露（增城、东莞），
铁路茶（信县），牙齿芒（广州），小凤尾草
（东莞），孔雀尾，雉鸡尾（广东中药）。

【植物形态】 多年生草本。根茎坚硬而短，
匍匐，密被褐色茸毛状的鳞片。叶柄疏生，坚
硬，光亮，秆黄色，裸净，直立，叶近革质，两
面均裸净，披针形或卵形，下部羽片卵形至三角
状披针形，广展；小羽片椭圆形或披针形，顶端
截头状，基部楔尖，全缘或有齿缺；叶脉叉状分
枝。孢子囊群圆形，生于裂片顶端，子囊群盖圆
杯状，宽过于长，向外开裂。

【药用部分与性味】 全草。味淡微苦，性
凉。

【效用】 能清热解毒，消肿止血，清湿热，
治实热痢疾，暑热斑疹，跌打肿痛，出血，疔神
疮毒。

【用量】 干用5钱—1两，外敷适量。



95. 金花草

Stenoloma chusana (L.) Ching (凤尾蕨科)

96. 金 沙 藤

【别名】竹园葵(本草纲目)，海金沙(产陆本草)，(南海、番禺、顺德、广宁、四会、德庆、封开、怀集、罗定、新兴、阳江、阳春、电白、定安)，金沙藤(广州、花县、从化、东莞、增城、博罗、清远)，土金沙(乐昌)，牛草纲(增城、博罗、东莞、阳春、阳江、电白、茂名、高州)，牛担网(新会、台山)，牛头丝(湛江、合浦、钦县)，罗网藤(连平、龙川、广州)，铁线网(徐闻、海康、廉江、遂溪)，铁线草(化州)，虾蟆藤(五华、高鹤)，望月藤(澄迈、琼海)，假蛙藤(五华)，牛儿林线草(番禺)，牛抄芒(电白、高州、茂名)，猛古藤(河源)。

【植物形态】多年生攀援草本，长1—4米，全体具有成节的毛，叶轴干时稍弯曲，扭转，茎面具白微毛，羽状复叶，羽片三角形，长10—20厘米；能育叶阔卵形，小羽片卵状披针形，长3—10厘米，宽2—4厘米，孢子卵形着生于裂片边缘，孢子囊在秋季成熟。

【药用部分与性味】全草，孢子，性寒，味甘。

【效用】利尿渗湿，清热通淋，消肿满，全草可作清凉饮料。

【用量】孢子2—4钱 全草0.5—2两。

【说明】1.本品孕妇忌用。 2.广州商品除本品外，又有用小叶海金沙 *Lygodium scandens* SW. 的干燥全草，功效二药相同。



96. 金砂藤

Lygodium japonicum (Thunb.) SW. (海金沙科)

97. 金 钱 草

【别名】金钱草（从化、番禺、南海、湛江、合浦、钦县、清远、乐昌、广宁、四会、德庆、封开、罗定、新兴、怀集、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、阳江、阳春、茂名、高州、化州、五华、潮阳、潮安、澄迈、琼海），落地金钱（广州、花县、南海），金钱落地环（顺德），牛琪草、圆鬃岭（东莞），铜钱草（东莞、博罗），金子草（琼中），月姑草（陆丰），奇蒿拐（增城），山地豆（普宁），锅铲（乐东），马蹄香（潮汕），假地豆（潮安、潮州），老虎耳（惠来）。

【植物形态】小灌木状草本，高30—90厘米，茎直立或平卧密被黄色短柔毛。叶互生，小叶1—3枚，近革质，厚，圆形，全缘，基部心形，上面绿色，无毛，背面被灰白色绒毛，叶柄长1—2厘米；托叶卵状披针形。花小，紫色，有香气。荚果长1—2厘米，被短柔毛。

【药用部分与性味】全草。甘、凉。

【效用】平肝火，利水，通淋，清湿热，祛黄疸，理肺热，止咳，可治肾结石，睾丸炎，劳苦伤，吐血，肝热黄疸，痰火核，耳痛，肺燥等。

【用量】1—4两煎服，治肾结石，有的病者可用至8两。



97. 金钱草

Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.

(蝶形花科)

98. 金 银 花

【别名】金银花（广州、花县、南海、番禺、顺德、东莞、新会、台山、高要、高鹤、广宁、四会、德庆、封开、怀集、高明、始兴、清远、徐闻、海康、廉江、遂溪、五华、潮安、潮阳、定安、屯昌、海口、文昌、澄迈、琼中、儋县），银花（河源、连平、阳江、阳春、高州、普宁），银花藤（罗定、增城、乐昌、阳江、阳春、电白），土忍冬、忍冬藤、山银花、假银花（广州），忍冬藤（清远），土银花、生银花（潮汕），金钱花（饶平），手巾花（海丰），山赵藤（潮安、潮州）。

【植物形态】藤本，有略柔软的本质部，被柔毛。单叶，对生，卵形，长约6厘米，宽约2厘米，先端钝或短尖，两面均被柔毛，下面较多，全缘，花芳香，初白毛后变金黄色，浆果，干时黑色。

【药用部分与性味】花蕾或藤叶。味甘，性寒。

【效用】功能清热解毒，主治温病初起，能消痈肿疗毒，止痛，洗疮疮，去皮肤血热。忍冬藤专用治痈肿疮毒。

【用量】花3—4钱；藤、叶5钱—1两。



98. 金银花

Lonicera confusa DC. (忍冬科)

99. 爬山虎

【别名】扒山虎、五眼子、爬山虎(广州)，小叶百眼藤(广东通称)，百眼藤(博罗、东莞、惠阳、广州)，坭藤(增城、电白、茂名)，坭藤草(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪)，坭秋草(乐昌)，土藤(普宁)，斗藤(湛江、合浦)，白蚊藤(湛江)，纪米草(广州、从化)，柯棉(澄迈、琼海)，鸡脚藤(阳山、新会、高要)，巴山虎、下山虎(广州常见草药)，山甘草(生草药手册)，五眼子头(新会)，小叶羊角藤(广州植物志)。

【植物形态】藤状灌木，嫩枝有棱，有时被柔毛。单叶，对生，薄革质，椭圆状长圆形或倒卵状椭圆形，端短急尖，基部狭楔形，边全缘而略外卷，表面深绿色，背面浅绿色，除背面脉腋被绒毛外两面无毛，侧脉在背面稍明显5—6对；具短叶柄，托叶合生，鞘状，膜质，草黄色，头状花序顶生，具短柄，5—6个复组成伞形花序式的排列，花白色或绿白色，浆果状聚花果，球形，成熟时红色。

【药用部分与性味】根、茎。味甘，性凉。

【效用】能散瘀止痛，解毒，清热去湿，润肠通便，清肺热，治湿热泄泻，大便秘结，消化不良，热咳，劳伤，苦伤，跌打。

【用量】1—2两。



99. 爬山虎

Morinda parvifolia Bartl. (茜草科)

100. 爬 墙 虎

【别名】 上树葛(合浦、湛江)，广东王不留行，凉粉果，馒头萝，文头罗(广州)，上树龙(钦县、兴宁)，上树蜈蚣(五华)，上壁蜈蚣(惠阳)，搭壁藤(潮阳、潮安、陆丰、惠来)，贴壁藤(揭安)，树头嘜(阳春)，小石斑树(河源、连平、龙川)，饭罗藤(从化)。


【植物形态】 攀援状或匍匐状灌木，分枝多。叶纸质，幼枝叶通常卵形，老株的叶通常卵状椭圆形。花托极大，具短柄腋生，梨形或倒卵形，成熟时稍带黄色。

【药用部分与性味】 药用果及叶枝。叶：酸平；果：甘涩平。

【效用】 果：固精壮肾，催乳。

叶及全株：凉血解毒。

【用量】 内服干用5钱—1两，外用适量。



100. 爬墙虎

图 100 — *Ficus pumila* Linn. (桑科)

101. 狗 贴 耳

【别名】鱼腥草（广东通称），蕺菜（名医别录），菹菜（唐本草），狗贴耳（梅县、惠阳），狗贴米（五华），臭溜（广宁），吉耳草、佛耳草、九帖耳（广东中药），猪母耳（揭阳、澄海），代刀草（潮阳、潮州、澄海），狗夹耳（潮阳），猪母耳、九节耳（普宁），狗嗒耳、蟑螂菜（惠来），吉耳菜、臭菜（广州）。


【植物形态】多年生草本，高30—60厘米。下部的茎匍匐地上，节上生须根，上部直立，无毛，或近茎上端有稀疏毛，紫色。叶互生，具柄，心形，先端渐尖至长渐尖，基部心形，边全缘，两面除叶脉稍被柔毛外，全部无毛，叶面暗绿色，叶背常现紫色，托叶宽而长，基部与叶柄合生抱节的全部，上部分离，有时全部叶柄合生，叶柄有稀疏毛或无毛，穗状花序生于茎梢，与叶对生；花小而密，蒴果近球形，顶端开裂，种子卵形，有条纹。

【药用部分与性味】地上全草。味淡稍腥，性平。

【效用】能去湿热，止咳，顺气，除痰散瘀，利小便解毒，化瘀，消肿，治病疾，内伤咳嗽，散痰火，小便刺痛，淋沥浑浊，恶疮乳痈，肺癰吐脓。

【用量】干用5钱—2两 鲜用1—2两
外用酌量。

葉形圖



101. 狗貼耳

Houttuynia cordata Thunb. (三白草科)

(以上一四八種) 兩十一之伊科 (雙武)

102. 狗 肝 菜

【别名】狗官菜、青蛇仔（增城、乐昌、兴宁），狗肝（增城、罗定、乐昌、电白），路边青（化州、湛江、阳江），臭草仔（海口、定安、屯昌），篱下青（合浦），梨根青（阳春），狗肝菜（阳春、阳江、高州、化州、茂名、广宁、四会、德庆、封开、怀集、陆丰、高鹤、新兴、罗定、从化、顺德、番禺、东莞、博罗、广州、花县、五华、惠阳），九曲草（琼中），鱼鳞草（澄迈），金龙棒（越南），金龙柄（广州植物志），野辣椒（曲江），九干菜、本地羚羊（广州），猪肝菜、乌面草（潮汕），乌面礼（潮安、潮州、潮阳、汕头），刷缸鸟、刷缸青（潮安、潮州），蚶壳菜（海丰）。

【植物形态】多年生草本，茎直立或被散多分枝，无毛或被微柔毛，茎青绿色稍被毛，节膨大，质坚韧纤维性，叶对生，薄纸质，卵形或卵状菱形，先端渐尖，基部阔楔形，叶面深绿色，叶背淡绿色；两面均被紧贴的疏柔毛，边全缘，叶柄长短不一，聚伞花序簇生或单生于叶腋内，花绿色或浅紫色，蒴果长椭圆状每室有种子二粒，种子坚硬。

【药用部分与性味】全草，味甘淡，性凉。

【效用】能清肝热，凉血，镇痉、除湿火骨痛，麻疹发热，治感冒高热，麻疹发热及肝火旺盛，尿血，目热。

【用量】鲜用2—4两（有谓8两—1斤）



2厘米

102. 狗肝菜

Dicliptera chinensis (Vahl) Nees.

(爵床科) — C

103. 虎耳草

【别名】 金线吊芙蓉（生草药性备要），金芙蓉、丝线吊芙蓉（广州），老虎耳（岭南采药录）。

【植物形态】 常绿多年生草本，匍茎紫红色呈丝状，蔓延地上甚长，着地后另生新株。叶簇生，肾圆形，基部心脏形，边缘具浅裂和整齐的钝锯齿，上面暗绿色，沿叶脉处常有白斑，下面暗紫红色，二面均散布平贴状白色长硬毛；肉质肥厚，有极长的柄，花茎从叶丛中抽出顶生，分枝密集呈圆锥花序，花轴密生红紫色腺毛及绒毛；基部具小苞片，呈卵状长椭圆形或线形顶端尖锐，花多数，白色，蒴果卵圆形，种子多数。

【药用部分与性味】 地上全草，味微苦辛，性寒，有小毒。

【效用】 能清血热，解热毒，治瘰疬，妇女血崩，鲜叶捣汁滴入耳内可治中耳炎，耳痛或耳内暴热红肿，流脓疼痛，外敷治痔疮，冻疮溃烂，痈肿及毒虫咬伤。

【用量】 3—5钱，外用酌量。



103. 虎耳草

Saxifraga stolonifera Merrb. (*Saxifraga sarmentosa* Linn. f.) (虎耳草科)

104. 知 羞 草


【别名】 知羞草，含羞草，呼喝草，怕丑草（广州植物志），怕丑草，怕夫草，怕羞草（岭南采药录），喝夫草（新会）。

【植物形态】 为一种被散的亚灌木状草本，茎分枝，高可达1米，有散生利刺及无数倒生刺毛。叶有敏感，羽片及小叶触之即闭合而下垂，羽片4枚，指状排列于总叶柄之顶，小叶多数，线状矩圆形，无柄，先端短尖，有散生刺毛。头状花序具长柄，单生或2—3个生于叶腋内，花淡红色，极多，荚果扁平，稍外弯，多数，由3—5个具1种子的荚节所成，成熟时荚节分离而脱落，只留下具刺毛的荚缘。

【药用部分与性味】 全草。味甘，性凉。

【效用】 能利水，清湿热，止痛消肿，治血淋，疝气，眼热肿痛。

【用量】 鲜用2—3两。



104. 知羞草
Mimosa pudica Linn. (豆科)

105. 使君子

【别名】冬均子、留求子、均子（广州）。

【植物形态】为落叶藤状灌木，高2—5米，幼枝密被锈色柔毛。叶对生，长圆状板针形，长7—12厘米，宽3—5厘米，先端渐尖，基部圆形，边全缘，上面淡绿色，无毛，叶柄短，被毛。花初为白色，后变红色。果狭圆锥形，长2.5—4厘米，熟时黑色，有5棱。

【药用部分与性味】果实。性温，味甘。

【效用】杀虫清积健脾。主治小儿疳积腹痛，驱蛔虫。

【用量】1.5—3钱。忌饮茶，犯之泻。



105. 使君子

Quisqualis indica Linn. (使君子科)

106. 青 蒿

【别名】 蒿叶，蒿青，萎叶，檳榔蒿。

【植物形态】 本品为一种攀援状藤本，茎枝圆柱形，无毛，有明显膨大的节，节上常生不定根。单叶，革质，互生，阔卵形，长8—18厘米，宽4.5—9厘米，先端短尖，基部心脏形，稍不对称，边全缘。叶柄长约2厘米，有托叶。花单性、异株、穗状花序，雄花序在开花时与叶片几等长，被柔毛。雌花序长约5厘米，直径约10毫米，被绒毛，雌花子房上位，花后结一囊果。

【药用部分与性味】 药用为茎叶。味辛微甘，性温。

【效用】 能祛风，治寒咳，理外感，外用敷疮毒，杀蛆止痒等。



106. 青蒟 (菱叶)
Piper betle Linn. (胡椒科)

107. 香花菜

【别名】留兰香、绿薄荷(广州常用草药)，青薄荷(中国植物图鉴)。

【植物形态】多年生草本，茎直立，深紫色或深绿色，高至1米，分枝极多，全株无毛，香气不同于薄荷，味不清凉。叶对生，深绿色，披针形或广椭圆形，无柄或有短柄，边缘锯齿尖锐，叶面平滑，网状叶脉，下面隆起，致使叶面成皱缩状，小花轮生，多数，聚集形成顶生的穗状花序，花白色，略带淡紫色。小坚果椭圆形，平滑。

【药用部分与性味】叶或全草。叶甘，性温，气芳香。

【效用】能祛风散寒，镇痉，治风寒咳嗽，肺劳咳嗽，胃白风。

【用量】鲜用2—4两。



107. 香花菜
Mentha viridis Linn. (唇形科)

108. 香 附

【别名】 莎草、香附子（名医别录），香头草、卷头香、丁香仔（广州），雷公头（惠阳、梅县），附子（惠阳），草尾济（琼山），草头香（陆丰、惠来、普宁），厚香草头、厚香头、土香附、生香附（潮汕），连头草（南沃），马钱葱（饶平）。

【植物形态】 多年生草本，高10—40厘米，根茎线形，末端膨大成坚硬的块茎（即药用香附）。茎常单生，上部三棱形，茎仅于基部具叶，长5—15厘米。花为3—8个合成短的穗状花序，坚果三棱形。

【药用部分与性味】 块状根茎。性平，味辛微苦。

【效用】 功能疏气，开郁，调经，治一切气痛，脚气，消腹满。

【用量】 1.5—3钱。



108. 香 附

Cyperus rotundus Linn. (莎草科)

109. 独脚乌柏

【别名】 独脚乌柏(广西陆川)，石琴薯(广西博白、桂平)，独脚古薄(广西藤县)，山乌龟(广西乐业)，华千金藤(广西)，华千斤藤(海南植物志)。

【植物形态】 草质藤本，长达数米，光滑无毛。叶为单叶，互生，膜质，阔三角状卵形或近于心脏形，长4—6厘米，宽4.5—6厘米，叶柄着生于叶背中间，为盾形叶。花小腋生，核果球形。

【药用部分与性味】 根。气清凉，味微苦，性凉。

【效用】 清热解毒，止痛，热毒阳疮，肿痛，无名肿毒，跌打损伤。鲜叶捣烂外敷可治疮疮，蛇头缠指，石硬等。

【说明】 独脚乌柏有两种，广州通用的独脚乌柏为防己科的 *Stephania sinica* Diels. 独脚乌柏即本手册记载者。另一种为白粉藤是葡萄科 *Cissus repens* Lamb. 别名亦称独脚乌柏，两者实为同名异物的草药。



109. 独脚乌柏

Stephania sinica Diels. (防己科)

110. 独脚球

【别名】山薄荷、石母草、猴子抱膝、石兰香（广东中药），兰香草、马蒿、段菊、走马天风（广州植物志），猴子草、石武草（广州）。

【植物形态】直立灌木，高25—60厘米。根较粗壮，圆柱形，外皮粗糙，黄棕色，有纵裂纹及纵皱纹，质坚硬。茎自根头丛生或单生，幼茎略呈钝方形，灰褐色或棕紫色密被灰色柔毛。叶对生，单叶，长卵形至阔披针形，其短柄，先端钝，基部浑圆，边缘有粗锯齿，两面均密被灰色短柔毛，背面更密。聚繖花序为具柄的花束，多花，蓝色，小坚果外面被粗毛。

【药用部分与性味】全草。味苦辛，微温，气香。

【效用】能祛风散瘀，止痛，行气消肿，祛风湿，理跌打，治月经不调腹痛，产后瘀血腹痛。

【用量】干药1—2两。



110. 独脚球

Caryopteris incana Miq. (马鞭草科)

111. 独 脚 金

【别名】 黄花甘，疳积草，小猴草(广州)。乾草(广州)，独脚疳(广西贵县)。


【植物形态】 一年生草本，直立，高8—15厘米，茎细，被灰色粉尘状糙毛。叶线形或生于下部的为披针形，下部的叶对生，上部的互生，长约1厘米或更短，开黄色，红色或白色的唇形花。蒴果近球形或长圆形。

【药用部分与性味】 全草，性平，味淡。

【效用】 除小儿黄气六腑虫积，为小儿疳积良药，治小儿消瘦，烦躁，夜睡不宁，磨牙咬指等，并清心火，解热毒。

【用量】 2—5钱，煎服或蒸鱼肉食。

111. 独脚金



111. 独脚金

Striga asiatica (L.) O. Ktze. (玄参科)

112. 茅 根

【别名】茅根（新会、台山、湛江、合浦、徐闻、海康、廉江、遂溪、钦县、电白、高州、化州、河源、连平、龙川、普宁、陆丰、翁县、琼海、琼中、乐东、澄迈、海口、定安、屯昌），茅根草（从化、花县、南海、番禺），白茅根（顺德、惠阳、高要），茅根须（增城、东莞），黄茅（高要、高鹤、广宁、四会、德庆、封开、怀集、罗定），黄茅根（南海、番禺），苏茅（惠阳），丝茅（徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、阳江、阳春、乐昌），丝茅草（五华），独脚丝茅（增城），黄茅草、黄茅（广东、广西），茅草（台湾），茅根花（广州）。

【植物形态】多年生草本，有匍匐状，密生鳞片的长根茎；秆直立，丛生，高30—90厘米，有2—3节，节上有长4—10毫米的柔毛。叶片扁平，多聚集于基部，长15—60厘米，宽6—9毫米，平行脉，主脉明显。圆锥状花序，长5—20厘米，有白色丝状毛。

【药用部分与性味】地下根、茎。甘、寒。

【效用】凉血、清热、利尿、止吐衄尿血。

【用量】3钱—1两。



112. 茅 根

Imperata cylindrica (L.) Beauv. (禾本科)

113. 柚树寄生

【别名】宿果榭寄生、莨当树寄生、鸡骨树寄生、椴柚寄生、油香藤寄生（海南植物志），东方榭寄生（广州常用草药），椴柚寄（广州）

【植物形态】 灌木，枝圆柱形，两叉分枝对生，干时灰褐色或黑色，有纤细的纵条纹，节膨大，节间的顶端略扁。叶多少肉质，干后为革质，对生，倒卵形或长椭圆形，一部分为长椭圆状线形，顶端圆形，基部渐狭，叶脉3出或5出，叶柄短或缺。聚繖花序腋生，通常1—3个簇生，每花序有花1—3朵，几无总花梗。果近球形或卵形，顶端截平，基部略收缩，熟时黄色，干时黑色，嫩果与成熟的果都有小窝体，最后光滑。

【药用部分与性味】 全株，味苦，性平。

【效用】 能清心肺热，行气，解麻疹毒，治麻疹气喘，麻疹咳嗽，小肠疝气，胃病，麻症肌肤痒。

【用量】 1—2两。



113. 柚树寄生

Viscum orientale Willd. (桑寄生科)

114. 枸 杞 根

【别名】 枸杞(神农本草), 枸杞菜(广州), 土地骨、土古片、土古(广州常用草药), 枸杞子、地骨皮(全国通称), 地骨子枸杞、头(中药志)。

【植物形态】 落叶灌木, 高可达3.5米, 树皮灰白色, 枝柔弱, 弯曲或下垂, 无刺或有短刺, 嫩枝浅绿色, 有线棱, 叶互生, 卵形, 斜方状卵形或卵状披针形, 纸质, 前端短尖或带钝形, 全缘基部楔尖; 叶面绿色, 背浅绿色, 侧脉4—6对, 不明显, 具叶柄, 花紫色, 1—4朵同生于一叶腋内, 具短柄, 果实卵圆形至短圆形, 大红色或橙红色浆果, 种子多枚。

【药用部分与性味】 果实(枸杞子)根皮,(地骨皮), 叶(枸杞菜)。果实(枸杞子)味甘, 性平, 根皮(地骨皮)味甘, 性寒, 叶(枸杞菜)味甘, 性凉。

【效用】 果实(枸杞子)能补肝益肾, 坚筋骨, 明目润燥, 治阴虚阳衰, 头晕, 目昏不明, 腰足痠软, 筋骨不利, 多泪, 贫血, 根皮(地骨皮)能凉血泻火, 清肝肾虚热, 清肺热, 除骨蒸, 治咳嗽, 吐血, 骨蒸, 劳热, 肺热喘咳, 烦热消渴, 劳热有汗, 骨蒸, 叶(枸杞菜)能清热, 明目, 去肝火。

【用量】 3—5钱



114. 枸杞根

Lycium chinense Mill. (茄科)

115. 星 色 草

【别名】 广白头翁（广州），白头康（海康），满天星草（海南），白鼓钉，满天星（广州植物志），声色草（广东中药）。

【植物形态】 一年生或多年生草本，被小茸毛或很少全秃净的，高15—35厘米。根细长瘦瘠而硬，土黄棕色，质脆易折。茎纤细而坚硬，灰褐色至棕褐色，被白柔毛，节明显，少有分枝。叶狭线形，至锥尖，灰褐色至茶褐色，扁长或边缘背卷，对生，下部较紧密，上部疏离。托叶长披针形，先端长尖，为叶之半或过之。花多数，为密集、顶生、繖房花序式的聚繖花序，有时密生于单茎的顶部。花白色。蒴果卵圆形或长椭圆形，棕红色。

【药用部分与性味】 全草。味淡，性凉，气微。

【效用】 治湿热痢疾有效。

【用量】 干用5钱—1两。



115. 星色草

Polycarpha corymbosa Lam. (石竹科)

116. 扁 豆

【别名】扁豆(名医别录), 藏皮豆(梅县), 南豆花、扁豆花、白扁豆花、白面豆花(广州), 白扁豆、娥眉豆(广东通称), 沿篱豆、鹊豆(本草纲目)。

【植物形态】一年生缠绕草本, 粗壮, 秃净, 长可达6米。茎常呈淡紫色, 无毛, 或疏被白色细柔毛。叶互生, 3出复叶, 具叶柄疏被白色细柔毛。托叶三角状卵形, 着生基部; 顶生小叶片菱状广卵形; 侧生小叶片斜菱状广卵形, 顶端短尖或渐尖, 基部宽楔形或近平截形, 上面暗绿色, 下面淡绿色, 两面均疏被白色短柔毛, 沿叶脉处较密, 主脉自基部3出, 全缘, 厚膜质; 顶生及侧生小叶具柄, 被灰白色柔毛; 小托叶线状披针形, 也被柔毛。花由多数排列成总状花序, 生于叶腋, 通常每一节上着生花2—5朵, 白色或红紫色。荚果镰形、扁平, 顶端稍宽, 上具一向下弯曲的喙, 边缘粗糙, 内含种子2—5粒, 种子长方状扁圆形, 两端均浑圆, 坚硬, 表面平滑而有光泽, 一端有白色隆起的珠柄, 种子白色或红褐色和黑色。

【药用部分与性味】种子(扁豆), 种子外皮(扁豆衣), 花(扁豆花)味甘, 性温。

【效用】种子(扁豆): 能消暑, 除湿, 养胃健脾和中化湿, 消暑, 解毒, 治暑湿呕吐、腹泻、霍乱转筋, 带浊, 烦渴, 解酒毒、河豚毒。花(扁豆花): 能和胃健脾, 清热解暑去湿, 治暑热神昏, 湿滞中焦, 下痢脓血, 夏日腹泻, 赤白带下, 发热口渴, 红白痢疾。种皮(扁豆衣): 应用同种子(豆扁)。

【用量】0.5—1两。



116. 扁豆
Dolichos lablab Linn. (豆科)

117. 红 丝 线


【别名】 红兰叶（广州），红蓝、枪刀药（广州植物志）。

【植物形态】 小灌木，高达1米。茎直立，稍木质，棱柱状，分枝多，外表灰褐色，被短柔毛。有稍凹下的纵直脊线约8条色较暗。节稍膨大。分枝对生，皮部菲薄，髓部疏松，木部粗软。叶对生，纸质，卵形至卵状披针形，短尖至渐尖，全缘，被柔毛或近秃净。穗状花序短而稍疏散，顶生或生于上部叶腋内，花紫色。蒴果。

【药用部分与性味】 地上全草。味甘淡，性微寒，气微。

【效用】 能清肺热，止咳散瘀，治内伤咯血，咳嗽痰火。

【用量】 干用5钱—1两，鲜2两。



117. 红丝线

Hypoestes purpurea (L.) Soland. (爵床科)

118.孩 儿 草


【别名】 白草，黄蜂草，兰色草(广州)。

【植物形态】 一年生披散，多枝草本，高约30厘米。茎细稍硬，暗绿褐色或黄白色，有纵皱纹，近基部的数节着生细根，节部稍膨大略呈蜿蜒状，质脆易折，髓部呈针孔状，木部质轻，白色。叶小，对生，生于下部的卵形，生于上部的狭披针形或倒披针形，先端钝尖，基部狭楔形，全缘，叶片青绿色或灰绿色疏被短毛。穗状花序顶生或腋生，花柄甚短，花偏于一侧，绿色或黄绿色。蒴果。

【药用部分与性味】 全草，味甘，性微凉，气微。

【效用】 清肝热，明目，消积滞，止痢，治小儿积滞，肝部，下痢，肝热，眼热，目赤肿痛。

【用量】 干用5钱—1两。



118. 孩儿草

Rungia pectinata (L.) Nees. (爵床科)

119. 珍珠草

【别名】叶下珠（兴宁、潮安），红珍珠草（海口、定安、屯昌、澄迈、文昌），油草伞（罗定、乐昌），姆仔金（电白、阳江、阳春），假油柑（五华），油柑子（普宁），下仔柑、应合村（广宁、四会、德庆、封开、怀集），多仔金（东莞、博罗、增城），头起珠（合浦），朝羞羞（梅县），日开夜闭、阴阳草、卑贝蛇、婴婴究、十字珍珠草（广州），珠仔草、假油柑（潮汕），龙珠草、企枝叶下珠（澄安、潮州），油柑草（普宁、澄海），小里草（揭阳、普宁），含羞草、午时合（揭阳），田油柑、田青仔、叶后珠（南沃）。

【植物形态】一年生草本，高10—40厘米。根状茎，长短不一，外表浅棕红色，有髓，主根不发达，须根多数，自根状茎及根部着生。浅灰棕色，老茎基部粗糙，灰褐色，茎部之分枝稍呈匍匐状，分枝着地生有细长须根，茎枝有纵纹，灰棕色，灰褐色或棕红色，质脆易折，中心髓部成空筒状，分枝多少不一，分枝有纵纹及不明显的膜翅状脊线。叶互生，单叶排成2列，形似羽状复叶，叶片薄而小，灰绿色，椭圆形或矩圆形，先端钝或小凸尖，叶基钝圆稍偏斜，叶面深绿色，叶背浅绿色而略被白粉，全缘而具极细的齿近无柄，托叶小，尖三角形。花细小腋生，蒴果球形，棕黄色，有小刺或小瘤体，种子细小，三角状卵形，浅棕色，具横生的槽纹。

【药用部分与性味】全草。味淡，性凉，气微香。

【效用】能平肝，明目，清热，治眼睛风火

赤痛，小儿疳积。外洗疮疖。

【用量】 干用5钱—1两，外用适量。



119. 珍珠草

Phyllanthus urinaria Linn. (大戟科)

120. 苦 楝 (广东通称)

【别名】 楝 (广州植物志)。森树 (广州)。

【植物形态】 落叶乔木，高可达10米，树干粗壮，枝条扩展，树皮暗褐色而有条纹，叶为复叶，小叶数多，小叶卵形，椭圆形至披针形，长3—7厘米，尖端长尖，基部多少偏斜，边缘有齿缺，叶面鲜绿色，背浅绿色。叶柄基部膨大，花为圆锥花序，腋生，下垂，有毛，花瓣5枚，紫色。果为核果，卵形或近球形，长1—1.5厘米。花期：夏季，果期：初秋。

【药用部分与性味】 根，根二层皮，叶，果实。气微腥臭，味苦，性寒有小毒。

【效用】 根皮清热祛湿，消肿痛，杀蠅。根二层皮为驱虫药，可驱蛔虫，条虫，蛲虫。煎水外洗可治疥，癣，瘡，及皮肤湿疹，恶疮等。

【用量】 干的根皮1—3钱煎服。

【说明】 根皮有小毒，如服苦楝根皮中毒者，有头晕、腹痛现象，可用黄糖或甘草煎水服，即可解毒。



120. 苦楝

Melia azedarach Linn. (楝科)

121. 盆上莞苗

【别名】野圆萋(本草纲目), 细种老公根(增城、罗定、乐昌、阳江、阳春、电白), 钱前草(阳江、阳春、茂名、高州、化州), 细样钱后茶(阳江、阳春), 铺地锦(普宁、陆丰、潮安、潮阳) 细种留公根, 芍草(合浦), 北京草(广宁、四会、德庆、封开、怀集), 钱箔菜(电白、徐闻、海康、廉江、遂溪) 老药根、崩口底(东莞、博罗), 鱼擦仔草(紫金、兴宁), 满天星、破铜钱(清远、始兴), 地垂(增城), 钱三草(海口、定安、屯昌), 拐仔草(澄迈、琼海), 拐仔草(高鹤), 五合子(五华), 铁画亭(海南), 细叶钱苗口(梅县), 马脚抽(临高), 天胡荽(千金方) 石胡荽(四声本草), 鹅不食草(食性本草), 假莞苗(广州), 铺地锦、遍地锦(潮安、普宁), 水莞苗(潮安、潮州), 鱼鳞(揭阳、南沃), 桂花草(汕头、南沃), 鱼鳞草(澄海、饶平), 血见愁(惠来)。


【植物形态】多年生草本, 具辛酸气味。茎柔弱纤细, 匍匐, 无毛或近无毛, 茎节上常有不定根, 单叶, 互生, 圆形或肾形, 直径量5—7毫米, 裂, 基部心形, 两面光滑无毛, 或背面被毛, 叶柄纤细; 伞形花序单生, 腋生, 或与叶对生, 花小, 白色, 果近心形, 侧向压扁。

【药用部分与性味】全草, 味辛, 性温, 无毒。

【效用】能通鼻气, 利九窍, 吐风痰, 清血解毒, 清热, 祛风, 止痒, 利水通淋, 去目翳。鲜草治齿缝出血, 无名肿毒, 肝硬变。

【用量】小儿干用1—2钱, 成人用量可酌量增加。

黃 堇 121



121. 盆上堇堇

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. (繖形花科)

122. 姜 黄

【别名】 黄姜（广东通称）。

【植物形态】 多年生宿根直立草本，高约1米。根茎横走，呈块状，其上生出多数圆柱状或指状的侧生根茎，呈深橙黄色，肉质而芳香；根粗状，自根茎丛生出，其末端往往膨大形成纺锤状。叶根出，互生两列，长椭圆形，有少数羽状的平行脉，由主脉向上斜伸，叶端渐尖，叶基渐狭，叶面绿色，叶背浅绿色，光滑无毛，叶柄长，下部呈鞘状。穗状花序为密花圆柱状，自内鞘抽出，顶上总苞片尖端红彩较淡，一苞内着生3或4花，渐次开放，每花又各有小苞，花黄色。蒴果球形，膜质，3瓣裂，种子卵状长圆形具假种皮。

【药用部分与性味】 根茎。味辛、苦，性温。

【效用】 能行气，破瘀，通经，止痛，治胸腹痛，癥瘕积聚，月经闭止，肩臂痹痛，腹中气胀，扑损瘀血肿痛，痲肿。

【用量】 8分—1.5钱。



122. 姜 黄
Curcuma longa Linn. (姜科)

123. 虾 钳 菜

【别名】 节节花（广州），白花仔（揭安、增城、东莞、海康、徐闻、廉江、遂溪、电白、五华、潮阳），白花蝴蝶草（新兴、广宁、四会、德庆、封开、怀集），珍珠菜（清远、从化），叶虾莲（乐昌），虾钳菜（顺德），鱼鲜菜（澄迈、琼海），白米仔草（罗定、阳江、阳春、乐昌、增城、电白），四季花（临高），莲子草、耐惊菜、满天星（广州植物志），菱钳草（广州）。

【植物形态】 广展或匍匐多枝草本，枝长达60厘米，茎四棱，节间有槽纹，其中有锈色短柔毛，节上有白色上柔毛。叶对生，无柄，椭圆状披针形至线状披针形，秃净或近秃净，先端短尖或钝，基部渐狭，边全缘。头状花序腋生、单生或成束，球形或长尖，花极小，白色。胞果阔倒心形、扁平，边缘有狭翅。种子1粒，倒生凸透镜状。

【药用部分与性味】 叶，全株，味淡，性凉。

【效用】 能散瘀去毒，清热润肠，退热消滞，利水。治大肠积热便秘，牙痛，肠风下血，外敷疮疡痈肿。

【用量】 1—2两



123. 虾钳菜

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. (苋科)

124. 乌 药

【别名】 鱗鱼胆、老贼骨（河源、连平、紫金、兴宁、（乌药（徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、阳江、阳春、茂名、高州、化州、湛江、合浦、钦县），开宝本草），樟贵树（阳江、阳春、茂名、高州、化州），千金树（五华），剑挂树（徐闻、海康、廉江、遂溪、电白），金狗仔（乐昌），白叶子树（始兴），台乌（广州、清远、高鹤、高要），大药（高鹤、高要），千打锤（清远、广州、从化、增城、博罗、东莞、台山、新会），山二女（乐东），土玉桂（兴宁、紫金），台药（清远、高鹤、高要），猫药、香叶子树、天台乌（广州），娑觥树、短樟（广州植物志）。

【植物形态】 常绿灌木或小乔木，高达5米。树皮灰绿色，小枝幼时密被锈色柔毛，老时毛渐少，最后秃净。叶互生，3出脉，革质，椭圆形至卵形，常近圆形，端渐尖或尾状渐尖，基部洋圆或短尖，表面除中脉外无毛而光亮，深绿色，背灰绿色，多少被栗色长毛或变无毛，两面均有小窝点。具叶柄，初被毛，后变无毛。伞形花序具短柄，柄被褐色柔毛。花多，花芽小，黄绿色。果球形，黑色，内有种子1粒。根长圆柱形或纺锤形，有的略弯曲，两端稍细，或中部膨大成球状，表面淡棕色至棕灰色，有细纵皱及根痕，质坚硬，不易折断，断面灰白色或淡棕色而微红，粉性。

【药用部分与性味】 根。味辛，性温。

【效用】 能祛风散寒，行气止痛，消肿散瘀，除膀胱冷气，治腹痛胀满，霍乱呕吐，气痛。

疝痛，跌打肿痛，积痰，小便频数，胃痉挛喘息，小儿腹中肠寄生虫，轻症脑溢血，夜尿症。
【本品对猫狗食滞呕吐有卓效。】

【用量】 1.5—3钱。



124. 乌药

Lindera strychnifolia F. Vill. (樟科)

125. 乌 柏

【别名】 乌柏木（唐本草），乌柏（南海、新会、台山、罗定、高鹤、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、茂名、高州、紫金），乌桕树（花县、清远、河源、龙川、连平、韶关、始兴、兴宁），白乌柏（电白、徐闻、海康、廉江、遂溪、湛江、阳春、合浦、钦县），百芷乌柏（广宁、四会、德庆、封开），乌桕强（顺德），楸白树（阳春），红心郎（潮阳、潮安），红心扶匀烟，扶匀树心（五华），虹仔树（普宁、陆丰），虹树（普宁），矮苓（东莞），乌桕根（广州）。

【植物形态】 乔木，高达15米，叶互生，具长柄，菱形至菱状卵形，长3.5—7厘米，宽3—5厘米，全缘，纸质；叶柄长2—5厘米，顶端具2个腺体，花绿黄色，蒴果还球形，熟时黑褐色。

【药用部分与性味】 根部，味苦、性寒。

【效用】 清热、泻火、利水、通便。

【用量】 5钱—1两煎服。



125. 乌 柏

Sapium sebiferum (L.) Roxb. (大戟科)

126. 穿 心 莲

【别名】 榄核莲、斩蛇剑（新会），竹节黄（生草药手册），蛇针草、印度草（汕头），日行千里，百药痢（惠阳），一见喜、苦赛黄连（福建），金香草（普宁），苦草、金鲤里草、牛母草、血压草（同安），事事备（揭阳），金耳钩（潮安），穿心莲（广州）。


【植物形态】 一年生草本，高0.5—1米，全体无毛。茎分枝多，且对生，茎枝均呈四方形，绿色。单叶，对生，纸质，矩圆状卵形至长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，边缘有线齿，叶面深绿色，背浅绿色。圆锥花序顶生和腋生有少数小花，小花直立，具柄，花冠白色。蒴果，长椭圆形。

【药用部分与性味】 全草，味苦，性寒，气无。

【效用】 能解蛇毒、止血、降血压、解热、消炎、治吐衄、肠热、发高热、高血压、喉痛、急性胃肠炎、痢疾、腮腺炎、扁桃腺炎、蛇咬、疮疖。

【用量】 1—5钱

【说明】 本草药味苦，性寒无毒，根据刘米达夫报导，在该植物中分离出一种结晶性苦味成分为 *Andrographolide* ($C_{20}H_{30}O_6$)。该植物初步分析含有以下成分：甙类（苦味甙、甾醇皂甙等）、酚类衍生物（缩合鞣质等）、醣类（戊聚糖、木聚糖等）、苦味质、色素等。此草药使用极为广泛，效果亦佳，有消炎、止痛、退热消肿、解疮毒、解蛇毒、降血压等作用，主治一切实热引起的疾病。



126. 穿心莲

Andrographis paniculata Nees. (爵床科)

127. 穿 破 石

【别名】 假荔枝(广州)，川破石(惠阳)，山荔枝(惠阳)，金蝉退壳、山枸杞、大力黄(化县)，猪肚筋(新兴)，黄蛇根、黄牛角、黄田鸡(普宁、陆丰、惠来)。

【植物形态】 常为灌木，树皮灰褐色，呈片状剥落，枝条细长密生，幼枝条有毛，茎节处有刺。叶互生，卵圆形，有的叶上端边缘凹入2—3裂者，叶缘平滑，花深入于萼下部，果球形，熟时橙红色。

【药用部分与性味】 根部。味淡、微苦，性凉。

【效用】 祛风湿，活血，壮筋骨，治筋骨酸痛，腰痛，四肢痠痛，跌打，劳苦伤咳嗽，近年来有用以配铁包金，甘草治肺结核者。

【用量】 1—2两煎服。

【说明】：广州市场穿破石有二种，另一种为 *Cudrania tateioidata* (Cav.) Bureau 的干根。
(附图127—1)



127. 穿破石 (葇芝)

Cudrania cochinchinensis (Lour.) Kudo. & Masam.

(桑科)

附：穿 破 石

【别名】 柘树（浙江天目）。

【植物形态】 落叶乔木，高10米左右。树皮淡灰色，通常有刺，长达5—30毫米。叶卵形至倒卵形，互生，长3—11厘米，宽2—7厘米，全缘或有三裂，钝尖，基部圆形或楔形；叶柄长5—20毫米。花单性，雌雄异株，均为腋生球形的头状花序。复果球形，肉质，桔红色或橙黄色，瘦果包裹在肉质的花被和苞的里面。

【药用部分与性味】 根部。性微温，味苦。

【效用】 清热凉血，治血虚痿痹，肺热，胃热，吐血。

【用量】 1至2两。



127—1 穿破石

Cudrania tricuspidata (Carr.) Bureau (桑科)

128. 倒扣草

【别名】倒扣草（从化、花县、博罗、增城、东莞、番禺、南海、新会、台山、罗定、清远、韶关），倒刺草（广宁、四会、德庆、封开、怀集），牛膝头（河源），大膝头（增城），倒钩草（新会），癩倒草、癩络草、倒梗草（广州），白花鸡撮鼻、鸡撮鼻、土牛膝、土牛七、白花土牛膝（潮汕），方骨相思（潮安、潮州、南沃）。

【植物形态】一年生或二年生直立或披散，分枝草本，高达1米，根细长圆锥形，或呈粗壮须根状，暗灰棕色，有纵纹及少数小的圆形泡状皮孔，须根细长，质坚韧，纤维性，茎四棱形而有小槽纹，绿色，常有暗红色条纹，被短柔毛，叶对生，单叶，倒卵形或椭圆形，先端渐尖，基部渐狭，全缘，叶面深绿色，叶背淡绿色，两面均被短柔毛，具叶柄，无托叶，穗形花序顶生延伸，花开后即下弯而紧贴花轴，淡绿色，胞果，极小。

【药用部分与性味】根、茎枝，味淡，性凉，气微。

【效用】能利尿、去湿、清湿热，通淋浊，治风湿骨痛，关节肿痛，小便不利，红白痢症，流行性感目、斑痧大热，久热不退，冷热不和，感冒发热，并治高血压。

【用量】干用1—2两。



128. 倒扣草

Achyranthes aspera Linn. (苋科)

129. 夏 枯 草

【别名】 枯草花，夏枯球（广东）。

【植物形态】 多年生草本，高约30厘米。全株被有向上的白色细毛。根茎匍匐，下生多数细根。茎方形，略有分枝，直立或上倾，表面呈暗红色或褐色。叶对生，近基部的叶有较长的叶柄，上部的叶无柄，叶片椭圆状披针形，全缘或有稀疏的锯齿。轮伞花序顶生，集成穗状花紫色或白色，唇形。小坚果褐色长椭圆形，具三棱，顶端有小突起。

【药用部分与性味】 花序。味辛苦，性寒。

【效用】 能清肝火，散郁结，利尿，杀菌。治寒热瘰疬，鼠瘻头疮，散瘰结气，脚肿湿痹，轻身，乳癆，目赤肿痛，高血压，淋巴结核。

【用量】 1—3钱。



129. 夏枯草
Brunella vulgaris L. (唇形科)

130. 桂 木 干

【别名】 狗果干。

【植物形态】 乔木，高达15米，秃净或幼枝略被柔毛。叶革质，椭圆形至矩圆状椭圆形或倒卵状圆形，长7—15厘米，宽3—7厘米，先端短渐尖而钝，基部楔尖，全缘，两面均秃净，上面榄绿色，光亮，背颜色略淡或同色或褐色。果单生于叶腋内，近球形，幼时被锈色小柔毛，熟时近秃净，肉质，平滑，黄色或红色。

【药用部分与性味】 药用干燥果实，味甘酸，性平。

【效用】 果实本可生食或饴以佐膳，药用可止咳除痰。

【用量】 5钱—1两。



130. 桂木干

Artocarpus lingnanensis Merr. (桑科)

131. 射 干


【别名】扁蓄，扁竹，射干苗。

【植物形态】多年生，丛生草本，直立，高达1.5米。有鲜黄色粗厚根茎。叶多数直立，二列，嵌叠状，扁平，剑形，长30—60厘米，宽2—4厘米，先端渐尖，基部鞘状，直出平行脉，花橙色，有红色斑点。蒴果三角状倒卵形，种子黑色。

【药用部分与性味】茎叶。味淡微辛苦，性平。

【效用】泻火、解毒、散血、消痰、利咽喉、散结核、止咳。

【用量】1—3钱。



131. 射 干

Belamcanda chinensis (Linn.) DC. (鸢尾科)

132. 益 母 草

【别名】 莠蔚（本草经），大叶艾、益母艾（增城、高鹤），蜂窠草（澄迈、琼海），益母艾（海口、儋县），当落尾（从化），白花艾（连平），野艾（五华），红花艾（广州），假夏枯草（惠来），山青麻（潮汕），山生麻、红花益母草、白花益母草（潮安、潮州），假青麻（海丰、陆丰）。

【植物形态】 一年生直立草本，茎方形，高达0.6—1.8米，分枝稀少，全株有细毛，叶对生，具柄，长4—10厘米，生于下部的叶卵形，有阔裂片数枚，其他的羽状深裂或掌状深裂，生于最上部的为线状叶，全缘。花淡红或白色。小坚果平滑。

【药用部分与性味】 全草。性微寒、味苦辛。

【效用】 去瘀生新，活血调经。主治月经不调，产后血晕，腹痛，崩漏带下，产后恶露不下，四肢浮肿，并治疗疮痈肿等。

【用量】 1.5—3钱。

【说明】 益母草的种子即中药莠蔚子，性微温，味辛甘，功能活血调经，明目，主治月经不调，经行腹痛，产后恶露不下，目疾等。用量1.5—3钱。



132. 益母草

Leonurus sibiricus Linn. (唇形科)

133. 鬼 羽 箭

【别名】 卫茅，黑骨草，羽箭草，羽箭，黑鬼草（广州）。

【植物形态】 直立一年生草本，高15—45厘米，干时黑色。根生叶，对生，卵形或倒卵形；茎生叶为互生，线形，最上面最小，全缘或有齿。花紫蓝色，四棱形的穗状花序。蒴果长圆形。

【药用部分与性味】 全草。性寒、味苦。

【效用】 清热、祛邪。主治疔疖。

【用量】 0.5—1两。



133. 鬼羽箭

Buchnera cruciata Ham (玄参科)

134. 草 决 明

【别名】草决明（佛山专区、合浦、怀集、新会），假花生（佛山专区、肇庆专区、钦县、高州），草结莲（台山、新会），岭豆（乐东），猪屎林（儋县），雪公豆（琼中），假绿豆（广州、钦县、河源、增城、电白），狗屎豆（广州），雷公青（澄迈、琼海），羊角豆（陆丰），猪屎豆（新兴、番禺、高要、高鹤），天上鹤（海口、定安、屯昌），石中明（五华）。

【植物形态】灌木状草木，茎高1—2米，有腐败的气味。叶互生，为偶数羽状复叶，叶轴在小叶间有线形的腺体，小叶6枚，膜质，倒卵形，长3—6厘米，宽1—3厘米，基部圆形，一侧偏斜，全缘，上面无毛，下面被柔毛。花鲜黄色。荚果线形而弯，种子菱形，横排，光亮。

【药用部分与性味】种子。性平、味咸。

【效用】清肝益肾，祛风，明目，润肠，通便。治青盲内障，目赤多泪，头风头痛，大便燥结等症。

【用量】1.5—3钱。

【说明】凡泄泻者忌用。



134. 草决明
Cassia tora Linn. (豆科)

135. 臭屎茉莉

【别名】茉莉头、大髻婆根、臭茉莉（广州、新会），臭屎茉莉头、臭屎茉莉根（广州）。

【植物形态】直立或分枝小灌木，高1~2米，叶具长柄，阔卵形，长11~15厘米，有粗齿，被毛，揉之有臭味。花密生如绣球花，花香，白色或淡粉红色。

【药用部分与性味】药用根及部分茎；味淡，性平。

【效用】祛风湿，壮筋骨，主治风湿关节炎。

【用量】1~2两。



135. 臭屎茉莉
Clerodendrum fragrans Vent. (马鞭草科)

136. 盐 霜 柏

【别名】 盐霜白（从化、花县、广州、增城、惠阳、乐昌、清远、罗定、阳江、阳春、紫金、兴宁、河源、连平、高要、高鹤），山漆树（始兴），盐公男（台浦、钦县），盐霜树（广宁、四会、德庆、封开、怀集），盐替双（罗定），盐风柏（韶关、化州、茂名、阳江、阳春），埔盐（普宁），埠盐（潮安），盐树（饶县、琼中、乐东），盐仔木（电白），盐公柏（五华），杨梅吊（东莞）。

【植物形态】 灌木，高2—8米；小枝、叶、及花序均密被柔毛。羽状复叶，有翅，小叶7—13枚，边缘有锯齿，叶背密被灰色毛茸。花白色，果近圆形，红色被柔毛。

【药用部分与性味】 根部或根皮。味咸微苦，性平。

【效用】 散瘀，消肿，解毒。

【用量】 干根1—2两，外用适量。



136. 盐霜柏

Rhus chinensis Mill. var. *roxburghii*

(DC.) Rehd. (漆树科)

137. 猪 笼 草


【别名】 猪仔笼。(广州)，猴子埕(南海)，

【植物形态】 商品以叶先端之瓶状体笼为主，长约10—15厘米，压扁，宽约2—3厘米，外表棕褐至棕黄色，顶端杯口有一圈蜜腺外反，有密集环纹，上连一盖，盖卵圆形或阔卵圆形，纸质而薄，外表面棕褐色，有脉纹，内表面红棕色，有窝点状腺体，瓶状体上半部纸质而薄，较皱缩，有脉纹，内表面红棕色，平滑，下半部近薄革质，脉纹凸出，内表面黄棕色，密布细小鱼鳞状腺点，底部常残存昆虫尸体碎片，基部连有卷须，粗壮，卷曲，长约10—20余厘米，上表面灰褐色而染有紫褐，叶脉清晰可见背面暗棕色，主脉粗壮凸出，侧脉不显著，全缘，基部渐狭成鞘状叶柄而稍抱茎。

【药用部分与性味】 茎叶，味淡，性平。

【效用】 能清肺部爆火，治咳血，百日咳，糖尿，高血压。

【用量】 干用6钱—1两。



137. 猪笼草

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce. (猪笼草科)

138. 猪 鬃 稔

【别名】毛稔(广州、南海、番禺、顺德)，猪鬃稔(广州、新会、从化、花县、增城、东莞、阳春、惠阳)，大叶猪鬃稔(高要、高鹤)，赤牙郎(高州、化州、阳江、阳春、茂名、合浦、湛江、钦县)，大牙郎、红心牙郎(合浦、湛江、钦县)，梢牙郎(电白、徐闻、海康、遂溪、廉江)，崩砂药、山勒腋(罗定、新兴)，茶拘舌(台山、新会)，鸡头(乐东、儋县)，牛鬃稔(番禺)，有毛板牙郎(清远)，毛密(澄迈、琼海)，南洋茶(海口、定安、屯昌)，山狗丹(琼中)，大海口菜(广宁、四会、德庆、封开、怀集)，木子(琼山)，红暗擦(化县)，野牡丹(新会)。

【植物形态】直立灌木，茎和枝均被散生，被密粗毛。叶大，阔卵形，长5—10厘米，宽3—6厘米，对生，具叶柄，有主脉5条，叶面密被紧贴的粗毛，叶背密被长柔毛。花极大，紫红色，1—3朵生于枝梢，直径可达7—8厘米，花期6月。

【药用部分与性味】全草。味涩，性平。

【效用】收斂，止血，治湿熱痢疾，水瀉腹痛，便血，血崩，急性腸胃炎，吐瀉腹痛，外用煎水薰洗痔瘡。

【用量】干用5钱—1两煎服。



138. 猪鬃稔

Melastoma sanguineum Sims. (野牡丹科)

139. 岗 稔

【别名】 山稔根（广州），当梨根（梅县），稔子根，岗稔，桃金娘，山稔（新会）。

【植物形态】 小灌木，高1~2米；幼枝密生柔毛，叶具短柄，近革质，椭圆形或倒卵形，长3~6厘米，宽1.5—3.5厘米，基部3脉，背密被茸毛，花玫瑰红色，浆果球形，熟时暗紫色。

【药用部分与性味】 根，味甘涩，性平。

【效用】 补肾，安胎，乌须发，活血，止血，治耳鸣，遗精，足膝软弱无力，小便频数，崩漏，下血，治慢性肝炎和急性肝炎巩固期。

【用量】 5钱—2两。



139. 岗 稔

Rhodomyrtus tomentosa (Ait) Hassk.

(桃金娘科)

140. 岗梅根

【别名】秤星树（增城、清远、阳江、阳春、高州、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、五花）；秤星根（广宁、四会、德庆、封开、怀集）；秤星木（合浦、惠阳）；点秤星（南海、番禺、高要、高鹤）；点秤树（阳江、新会、台山、罗定）；点秤木（湛江）；点秤藤（茂名）；青梅根（广州、从化、花县）；梅根、青梅叶（河源、连平、龙川）；岗梅树（南海）；岗梅（从化）；苦梅树（惠阳）；苦梅根（增城）；山梅（潮阳、潮安）；山梅根（新会、台山）；假青梅（东莞、博罗）；七星藤（清远）；土甘草、秤星木（广州、普宁、陆丰、惠来、海丰）；先苦后甜（花县）；点星根（英德）；点杆树（阳江）；点秤藤（花县）。

【植物形态】灌木，高约2米，全株无毛；根深，细长而密，枝圆柱状，紫色，具白色皮孔。单叶，互生，膜质，卵形或卵状长椭圆形，长3—8米，宽2—6厘米，边缘有整齐的小锯齿，表面亮绿色，叶柄长约5毫米，花小，白色，核果浆果状，球形，成熟时黑色。

【药用部分与性味】根，性凉，味苦后甘凉。

【效用】生津止渴、清热、散瘀，主治大热症、口渴、咽喉肿痛，劳苦伤，并为凉茶重要原料。

【用量】煎服干用1—2两。



140. 岗梅根

Ilex asprella Champ. (冬青科)

141. 猫 屎 草

【别名】 咸虾花(广州)，胜红蕖、臭炉草、霍管苜(广州植物志)，白花臭草、白花草、白咸虾花(新会)。

【植物形态】 一年生，直立，分枝草本，高约30—60厘米，被粗毛。叶对生，生于顶部的或互生，卵形，基部钝或浑圆边缘有钝齿，头状花序小，由多数头状花序组成稠密顶生的伞房花序，小花蓝色或白色。瘦果黑色，顶端有具芒的鳞片5枚，下部有锯齿。

【药用部分与性味】 地上部分全草。味微苦，性温气微香。

【效用】 外用为子宫脱垂配方原料，煎水外洗。治皮肤瘙痒，内服能祛风，消炎，止血渗湿，外伤出血，治瘰疾，小儿潮热。

【用量】 鲜用1—3两，外用适量。



141. 猫屎草

Ageratum conyzoides Linn. (菊科)

142. 崩大碗


【别名】积雪草(本草经)，崩大碗(广州、花县、从化、东莞、增城、南海、番禺、顺德、新会、台山、博罗、罗定、高要、高鹤、乐昌、阳江、阳春、徐闻、海康、廉江、遂溪)，崩口碗(清远)，雷公根(广州、高要、高鹤、化州、茂名、阳春、湛江、合浦、钦县、陆丰、广宁、四会、德庆、封开、怀集)；老公根(河源、连平、龙川、电白、紫金、惠阳)，两公根(普宁、陆丰、惠来)，止作草(琼中、琼海、乐东)，钱雷口(梅县、五华)，田药口(五华)，蛤拐帽(岭南草药草)，乞儿砵(广州)，莫蓬菜(广州植物志)，蚌壳草、煎盖草(潮汕)，藤脾草(肇庆)。

【植物形态】多年生草本，茎蔓长蜿蜒，匍匐状，绿色或微紫红色，节间甚长，节长常生不定根，无毛或稍被毛；单叶，互生，心状圆形或肾形边缘具钝齿；基部深心形，无毛或疏被毛；表面绿色，稍有光泽，叶背淡绿色，叶脉网状，在背面稍凸起；叶柄长，头状伞形花序腋生，花小紫红色，果扁圆形，紫红色，网纹隆起。

【药用部分与性味】全草，味微苦甘淡，性凉，气微。

【效用】能清热，解暑，利尿，消肿拔毒，祛风散寒治肺热咳嗽，消痲瘤，消食积饱胀，肝肿大，肋膜炎，肠胃炎，双单喉蛾，赤白痢疾。

【用量】鲜用3—8两 干用5钱—2两。



142. 崩大碗

Centella asiatica (L.) Urban. (繖形花科)

143. 梧 桐 根

【别名】梧桐根、梧桐叶、梧桐子(广州)、桐、檉桐、青桐(广州植物志)。

【植物形态】落叶乔木，高可达15米；树干通直，树冠卵圆形，树皮光滑，苍绿色，不剥落，枝条粗壮，单叶，互生，掌状3—5裂，心状圆形，裂片的前端渐尖，全缘基部心脏形，叶面深绿色无毛，背绿色有细茸毛，基出脉7条，均隆起，主肋的侧脉5—6对，叶柄与叶等长，圆锥花序顶生，具花梗，花黄绿色，果实为蓇葖状，成熟以前，开4裂膜质心皮，种子圆形有皱纹，着生于开裂的心皮边缘，有脐带，棕色。

【药用部分与性味】叶、花、种子、茎皮、根皮。叶：味苦，性寒。子：味甘，性平。

【效用】叶：能祛风，去湿，散毒，治劳伤咳血，湿火关节痛，皮肤毒症，除血病，小儿疳积。

根皮的功效与叶同。

茎皮：能乌须发，杀三虫，治肠痔脱肛，小儿丹毒，恶疮。

花：能治癫头，杖丹，火伤。

种子：能补肾，顺气和胃，治胃痛，除白发，小儿口疮。

【用量】种子一日量1—3钱。



143. 梧桐

Firmiana simplex (L.) Wight. (梧桐科)

144. 鱼 藤

【别名】 毒鱼藤（岭南草药志），白药根、雷公藤蹄（阳春），毛瓣鸡血藤（海南植物志）。

【植物形态】 攀援灌木，茎有纵条纹和皮孔，嫩枝黄褐色，被柔毛，叶互生，革质，奇数羽状复叶，小叶对生，9—11片，倒卵形，卵形或长椭圆形，顶端钝形，圆形或微凹，基部楔形或钝形，腹面无毛，背面被黄色或褐色柔毛，边缘背卷，侧脉约10对，平行，末端略弯拱，与中脉同于叶腹面凹入，小托叶锥状，宿存。总状花序腋生，或有时为顶生的圆锥花序，被黄褐色柔毛；花3—6朵簇生于总轴或分枝的短枝上；花梗被黄褐色柔毛，花粉红色，有香味，荚果膨胀，长椭圆形，嫩时密被黄色绒毛，后渐变为秃净，果瓣厚木质，老时有皮孔，种子近于肾形。

【药用部分与性味】 全株连根，味苦，有大毒。

【效用】 外用能杀虫，止痒，逐湿痹，切忌内服。

【用量】 外用酌量。



144. 鱼藤

Millettia lasiopetala (Hay) Merr. (豆科)

145. 贯 众


【别名】乌毛蕨、龙船蕨（广州植物志），凤尾基（东莞、增城），大风尾（海口、定安、儋州），雄鸡尾（高州、茂名），六叶雄鸡尾（五华），清华蕨（从化），赤蕨（高鹤），红蕨（罗定），凤尾毛（潮安），大号凤尾草（陆丰），灵眉毛（普宁），管仲、赤蕨头（广东中药），黑狗脊（岭南采药录），贯仲、赤决头（广州）。

【植物形态】多年生草本，根茎粗壮，木质，直立，密被暗褐色、线形、光亮的鳞片，叶柄簇生，坚硬，直立；基部密被鳞片；叶近革质，一回羽状复叶，阔披针形，羽片多数近互生，无柄，狭线形，先端渐尖成尾状，全缘或微波浪形，深绿色，两面均裸净；顶端羽片的基部下延，最末1枚羽片最长，叶脉明显，密集，平行，叶轴粗壮，秆黄色，裸净。孢子囊群紧贴于中肋两侧，各成一长线形而与中肋平行，子囊群盖与孢子囊群同形，向中肋开裂。

【药用部分与性味】根块茎，味微苦涩，性微寒。

【效用】能辟疫杀虫，止血崩，解水毒，治一切热毒，骨哽，肠寄生虫，麻疹，乙型脑炎。

【用量】5钱—1两。



145. 贯众

Blechnum orientale Linn. (乌毛蕨科)

146. 望 江 南

【别名】望江南(本草纲目,救荒本草),羊角豆(中国植物图鉴),野扁豆(广州植物志),狗屎豆(广州),鸭掌枫(新兴、高鹤、五华),双高藤(潮安、潮阳),生刺叶(乐昌),山绿豆(海南),望江南子(药材学)。

【植物形态】直立,略分枝,秃净亚灌木状草本或灌木,高1—2米,叶互生,偶数羽状复叶,总叶柄基部有腺体1枚,干时黑色;小叶4—5对,有腐败气味,纸质,卵形至椭圆状披针形,端渐尖基部圆形,除基部有刺毛外,余无毛,边缘有小睫毛,叶脉纤细,侧脉两面稍明显,托叶膜质,卵状披针形,早落。伞房花序腋生,或顶生,有花小朵;花黄色,荚果狭带形,厚,稍弯曲,外有稀疏柔毛,内有种子40粒,种子卵形,稍扁。

【药用部分与性味】叶、根、种子,种子:味苦,微甘性平。

【效用】种子:能健胃整肠,治下痢腹痛,慢性便秘,头胀,食伤,清热,散惊,气喘开窍,胃痛,哮喘,利湿,凉血。

根:为淋巴系统有效的刺激剂,有利尿之效。

叶:可退热,捣烂外敷,治蛇伤毒虫咬伤。

【用量】0.6—1两。



146. 望江南
Cassia occidentalis Linn. (豆科)

147. 细叶七星剑

【别名】 野香薷，七星剑。

【植物形态】 一年生草本，揉之有强烈香味。单叶，纸质，对生，具柄椭圆状披针形，先端渐尖，边缘有锯齿，两面有透明的腺点。夏季顶生或腋生总状花序，苞片叶状，长1.8—2.2厘米，宽3—6毫米，被毛，具透明的腺点，花为绯红色。由4个具1颗种子的小坚果组成，生于萼的基部。

【药用部分与性味】 药用全草，香气强烈，味辛、性温。

【效用】 能解蛇毒，祛瘀定痛，皮肤疮毒。

【用量】 干用全草，5钱至1两。

【说明】 细叶七星剑的品种较复杂，民间尚有以 *Mosla cavaleriei* Levl. 及 *Mosla fordii* Max. 两种混用，本手册记载细叶七星剑为正品。



147. 细叶七星剑

Orthodon lorail Maxim. (唇形科)

148. 紫 苏

【别名】 荏（诗经），白苏（名医别录），真紫苏（从化、花县），紫苏树（广州），红紫苏（湛江、合浦、钦县、茂名、高州、海口、定安、屯昌），红荚苏（惠阳），香荚（梅县）。

【植物形态】 一年生草本，有香味，茎绿色或紫色，直立，高达1.5米，四棱形，多分枝，被微细白毛或浅紫色毛，单叶对生，卵形，长3—9厘米，宽2—8厘米，表面淡绿色或两面紫红色，两面被毛；边有粗齿，叶柄长1—4.5厘米，花紫色，小坚果褐色或灰色。

【药用部分与性味】 叶，性温，味辛。

【效用】 发散风寒，理气宽胸，解郁化痰，安胎，解鱼蟹毒，主治：外感风寒，胸膈痞吐，胎气不安，脚气等。

【用量】 1.5—3钱。



148. 紫 苏

Perilla frutescens (L.) Britton. Var. *Crispa*

Decne. (唇形科)

149. 淡 竹 叶

【别名】淡竹（普宁、陆丰、潮阳、潮安、五华、惠来、阳春），山鸡谷（广宁、四会、德庆、封开、怀集、高州、化州、茂名、化县），生鸡米（连平、惠阳、雷县），山鸡屎（阳春），小竹草（海口、定安、屯昌、乐东），生鸡谷、红鸡谷、白鸡谷（化县）。

【植物形态】多年生，直立，草本，高50—100厘米。有肥厚的块状根。叶片广披针形，长5—22厘米，宽1—3.5厘米，现出方格状的脉纹，圆锥花序，小穗有花数朵，颖果深褐色。

【药用部分与性味】叶。性寒，味甘淡。

【效用】利小便，清心火，除烦热，主治心烦尿赤，小便不利。

【用量】2—4钱。孕妇慎用。



149. 淡竹叶

Lophatherum gracile Brongn. (禾本科)

150. 救 必 应

【别名】 白兰香皮、百日红皮、熊胆树皮、白兰香(广州)、白银树皮(潮汕)、山熊胆(潮安、潮州、揭阳、澄海、海丰)。

【植物形态】 乔木，高达十米；枝灰色，小枝多少有棱，红褐色。叶纸质，卵圆形，长4—10厘米，宽2—4厘米，全缘，叶柄1—1.2厘米；花白绿色，果球形直径约5毫米，熟时红色。

【药用部分与性味】 树皮，味苦，性寒。

【效用】 清大热，内服治斑痧大热，热滞肚痛，猪牛热病，民间凉茶配方多用。藤汤浓缩外用涂汤火伤。

【用量】 5钱—1两煎服。

干 部 . 121



150. 救必应(铁冬青)

Ilex rotunda Thunb. (冬青科)

151. 梔 子

【别名】黄枝子(从化、花县、增城、东莞、湛江、合浦、钦县、阳江、阳春、电白、罗定、乐昌、始兴、普宁、陆丰、云浮)，山枝子(南海、番禺、顺德、新会、台山、罗定、高要、高鹤、始兴、新兴、潮阳、潮安、徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、广宁、四会、德庆、封开、怀集、海口、定安、屯昌)，枝子(韶关、紫金、五华、阳江、阳春、高州、茂名、琼中)，黄果子(广州、增城、东莞、惠阳、河源、连平、龙川)，生枝子(花县、化县、高明、阳江)，水横枝、黄枝子、山梔、白梔、黄梔(广州)，山黄果(河源、连平、龙川、五华)，水黄枝(番禺)，横枝树(阳春)，黄枝子(英德)，黄果子(英德、乐昌、阳山)，山横枝树(从化)，黑枝、山枝、山黄枝、黄枝(潮汕)，水晶花、山蝉卜(潮安、潮州)。

【植物形态】常绿灌木，高0.5~2米；单叶，对生，革质，长椭圆形，长4—14厘米，宽1.5~5厘米，边全缘，表面光滑，花单生，白色，芳香。果长椭圆形，常有6条纵棱，成熟时黄色。

【药用部分与性味】根及茎，味微苦，性凉。

【效用】清热，祛湿，散瘀，治劳伤咳嗽；苏芳撞红，黄痘，实热牙痛。

【用量】5钱—1两煎服。

藤 康 菘. 521



151. 梔 子

(*Gardenia jasminoides* Ellis. (茜草科))

152. 蛇 泡 筋

【别名】狗屎泡（新会、台山），中叶蛇泡筋（从化、花县），小号水泡筋（阳江、阳春、茂名、高州、化州），水泡筋（湛江、钦县），大叶三月泡（河源、连平），小筋蓬（广宁、四会、德庆、封开、怀集），三月泡（紫金、兴宁），黄牛泡（高鹤、信县），蕁皮（普宁、陆丰），虎爬刺，上山虎（安定、屯昌），虎唔刺（潮阳、潮安），红冬筋（从化），小黄泡筋（清远），细种蛇泡筋（高鹤），芽莓（广州），虎姆根，蕁菠（潮汕），蛇菠、蕁杨梅（潮安、潮州），三月蕁（揭阳、陆丰），虎姆蕁（南沃），蕁蕁（饶平），蕁田蕁（潮汕）。

【植物形态】攀缘状灌木，长达3米。枝、复叶柄、花柄等均密被毛茸，并有小勾刺。羽状复叶，小叶3—5片，边缘具不规则齿缺，叶柄长2—5厘米，托叶线形一对。花玫瑰红色。聚合果扁球形。

【药用部分与性味】根部，味微苦，性凉。

【效用】清热，祛风湿，止痛。

【用量】干根5钱—1两5钱。



152. 蛇泡勒(茅莓)

Rubus parvifolius Linn. (蔷薇科)

153. 黄 花 菜

【别名】 豇瓜、金针菜（广州）、鹹菜（岭南采药录）。



【植物形态】 叶长30厘米以上，宽2.5厘米内外，花茎高于叶，有花6—10朵，花橙红色或黄红色，无香味，长7—12厘米。

【药用部分与性味】 根、花。味甘淡，性凉。

【效用】 清热，祛湿，利尿，通淋，治砂淋，白浊，小便刺痛，黄疽，大热衄血，实热牙痛。新鲜根捣烂外敷可治乳痈肿，乳疮。

【用量】 6钱—1两。



153. 黄花菜

Hemerocallis fulva L. (百合科)

154. 黄 瓜 仁 草

【别名】 瓜子金、金锁匙、通性草、小远志（中国药用植物图鉴），蛤蜊王（广州、从化），黄仙竹（南海）。

【植物形态】 多年生常绿草本，高约15厘米。根圆柱形，细而弯曲，表面褐色，有纵横皱纹和结节，支根纤细。茎多数由基部丛出，匍匐斜升或近直立，细柱形，绿褐或绿紫色，下部木质化，表面有灰褐色柔毛。单叶，互生，卵形至卵状披针形，端急尖，基部圆形或楔形，全缘，叶片幼时柔嫩，绿色或绿紫色老时近革质，中脉在叶面下陷，在叶背稍突起侧脉明显，网状，脉及叶缘均有柔毛，叶柄短，亦有柔毛。总状花序腋生，花柄纤细，表面有柔毛，基部着生处呈突起状并有脱落性的小苞片，花白色，带紫。蒴果广卵形而扁，端凹而有小尖头，边缘成膜质状宽翅，种子扁，上端有淡棕色膜质种阜，表面被灰白色绒毛。

【药用部分与性味】 全草。味稍辛辣而苦，性温，气微。

【效用】 能止血崩，散毒止痒，治肠风下血，淋病，小儿惊风，瘀伤咳嗽，跌打损伤，咽喉痛，麻疹不透，外治阴疽流注，半阴半阳疮，蛇咬伤。

【用量】 干用1—2钱。



154. 黄瓜仁草

Polygala japonica Houtt. (远志科)

155. 黄 花 母

【别名】白花黄花稔（广州植物志），黄花母（南海、番禺、花县、广州、连平、高州、化州、阳江、阳春、茂名、乐昌），黄花荫（从化、花县、广州），白花风母头（普宁、惠丰），黄花仔（兴宁），黄花槌子（五华），梅皮草（潮安、潮阳），金花仔（饶县、琼中），加必仔（澄迈、琼海），细叶黄花母、覆藪着、黄花稔、黄花猛（广州），枚母草（潮汕），硬枝枚肉草（汕头），皮肉草（潮安、潮州），生肌草（潮安、揭阳），虱母头、生毛英仔草（潮阳），小号虱母头仔（普宁），黄花虱母头（揭阳），英仔草、铁树仔、薄壳米仁草（澄海），倒地金网（惠来），吸血仔（海丰），白背黄花稔（潮汕）。

【植物形态】本品为直立，多枝小灌木，高0.5—1米。枝条暗绿色，被淡黄色星状柔毛，皮内含丰富纤维。单叶，互生，长椭圆形或菱形，端急尖或钝，基部钝，近缘具锯齿，有缘毛，叶面淡绿色，叶背灰白色而密被星状柔毛，基出脉5条，其叶柄，被星状柔毛，托叶刺毛状与叶柄等长。花单生于叶腋，花柄柔弱，中部以上有节，花冠黄色。果为分果，扁球形，果皮平滑，稍有皱纹，无芒或有芒，成熟时心皮与中轴分离而成8—10果片。

【药用部分与性味】全株。味甘淡，性凉，气微香。

【效用】能消肿解毒，除湿热，利水，解暑退热。治小便赤浊，感暑伏热，小肠疝气，大肠

结热，湿热肚痛，外感。
【用量】 5钱—1两。



155. 黄花母
Sida rhombifolia Linn. (锦葵科)

156. 蛤 蟆 草


【别名】 羹箕笃（从化、增城、东莞、新会、台山、高要、高鹤、罗定、乐昌、连平、兴宁、紫金、电白、徐闻、海康、廉江、遂溪、高州、化州、茂名、阳江、阳春、信县），七厘藤（广宁、四会、德庆、封开、怀集），蛤蟆藤（广州、花县、番禺），秤锤藤（澄迈、琼海），翠壁叶（海口、琼山、定安、屯昌），蛤蟆草叶（番禺），百解（化县），金不换（琼山），蓼笃、田鸡草（广东中药），蓼笃藤（新会），蓼笃草（广州），翠壁藤、翠头藤、方钉草（潮安、潮州），疔草（潮州），青蛙藤（潮阳），蛤仔藤，马力肚（海丰），蜆子藤（陆丰）。

【植物形态】 缠绕性草质藤本，茎柔弱，扭曲蔓延，棕褐色，有明显的深纵脊线，纤维质不易折断。叶互生，纸质，三角状卵形，端钝或具小突尖，基部近截形，全缘，叶面绿色，叶背淡绿色，或粉绿色，叶柄盾形着生，基出脉约10条，由叶柄着生处向周放射，在背面略突起。花绿色，皱缩成小球形。核果红色，内果皮骨质，扁平马蹄形，背有小瘤，面凹陷。种子近杯形。

【药用部分与性味】 地面藤叶，味淡，性平，气微。

【效用】 能清肝热，去疳积，解毒，凉血，止血生肌，清湿热，治小肠疝气痛，热泻，大肠结热，痢疾，疮疡刀伤，目赤肿痛。

【用量】 干用5钱—1两。



156. 蛤蚧草

Stephania longa Lour. (防己科)

157. 黑老虎

【别名】透地连珠、全不换、钻地风、酒饭团根（广州）、大叶南五味、大钻（广西）、大叶冷饭团（中国经济植物志）、臭饭团（海南）。

【植物形态】本品为攀援植物，灌木，高约2—3米。单叶，互生，卵圆状披针形，长约9—15厘米，宽3—7厘米，革质，先端渐短尖，全缘，上表面深绿色，下表面色浅。花小，红色。果为聚合浆果，果较大5—9厘米，熟时紫红色。

【药用部分与性味】地下根状茎。气芳香，味甘苦，性温。

【效用】驱风散寒，行气止痛，散瘀消肿，治跌打肿痛，风寒积滞，吐泻腹痛，月经痛，刀伤出血，浸酒内服，可舒筋活络；消痰喘，提精神。

【用量】5钱—2两。

【说明】黑老虎的商品，其植物来源，实际上有三种①黑老虎 *Kadsura coccinea* (Lem) A.C. Smith (南五味子科)。

②风沙藤 *K. longepedunculata* Finet et Gagnep (南五味子科)。

③海风藤 *K. heteroclita* Roxb Craib. (南五味子科)。

由于三者商品外形较难分辨，生长环境又大致相同药农采到后均做为黑老虎，实际上黑老虎的商品就有黑老虎、风沙藤、海风藤三种，由来已久，而三者效用也大致相同，故三者均可做为黑老虎用。



157. 黑老虎(江南五味子)

Kadsura coccinea (Lem) A. C. Smith

(南五味子科)

附：风 沙 藤

【别名】冷饭藤、饭团藤（海南），钻骨风、小钻骨风、壮骨风（广西），兰果南五味子（中国药用植物志）朔笏拳、朔笏饭团、黄牛藤（中国经济植物志），冷饭包、称蛇子、大活血、广福藤、红木香、紫金皮（浙江）。

【植物形态】常绿缠绕藤本，长2.5—4米，分枝较多，叶质较薄，长圆状披针形，叶缘有稀疏小锯齿，叶柄较短，花多白色（间有红色或黄色。）果为聚合果近球形，果小，2—3.5厘米，熟时暗红色。

【药用部分与性味】地下根状茎，性微温，味微甘，气香。

【效用】祛风散瘀，止痛。

【用量】5钱—1两。



157-1 风沙藤

Kadsura longepedunculata Finet. et Gagnep.

(南五味子科)

附：海 风 藤

【别名】 异形南五味子（海南）。

【植物形态】 蔓生藤本，长2—10米，有分枝。叶薄，革质，卵状椭圆形至阔椭圆形，叶全缘，或具疏小齿。花多红色或黄色，聚合果近球形，直径3—4.5厘米，熟时紫红色。

【药用部分与性味】 地下根状茎。性温，味微甘。

【效用】 祛风散寒，止痛。

【用量】 6钱—1两。



157-2. 海风藤

Kadsura heteroclita Roxb Craib. (南五味子科)

158. 犁头草

【别名】长萼莖菜（广州植物志），犁头草（河源、连平、兴宁、五华、韶关、清远、乐昌、新会、台山、番禺、湛江、合浦、钦县、高鹤、电白、徐闻、海康、廉江、遂溪、增城、东莞、南海、化州、茂名、高州、阳江、阳春、潮阳），长萼犁头草（罗定、增城），犁壁草（兴宁、五华），犁头菜（从化），南星（海口、定安、屯昌），奚尾草（南海），犁咀菜、剪刀菜、玉如意（广东中药），犁口草、紫花地丁（广州），耳钩草（潮汕），兰花耳钩草（潮安、潮州），耳钩花（潮阳、普宁），地丁草（揭阳），美笑笃（陆丰）。

【植物形态】一年生，簇生草本。茎极短，与根相垂直，粗厚。单生或成束。叶全部基生，具长叶柄，膜质，叶片长三角形，或近箭形，顶端钝或急尖至渐尖，基部心形或箭形，边缘有小锯齿，叶面亮绿色，叶背淡绿色，叶柄与托叶合生，其分离部分成狭披针形，有疏齿。花腋生，花柄长于叶，花青紫色，蒴果浅黄色，坚硬。

【药用部分与性味】全草，味甘淡，性凉，气微。

【效用】能清肝热，湿热，解毒凉血，止血，去腐生肌，治目赤眼刺，眼炎，眼多红筋，黄痘，恶疮，刀伤。

【用量】鲜用3钱—1两，干用2钱。



158. 犁头草

Viola inconspicua Bl. (堇菜科)

159. 番石榴叶


【别名】番石榴（从化、花县、广州、东莞、增城、惠阳、高要、高鹤、罗定、新兴、河源、连平、龙川、乐昌、高州、化州、阳江、阳春、茂名、五华、电白、徐闻、海康、廉江、遂溪），石榴（南海、番禺、顺德、清远、乐东、琼中、临高），番桃木（湛江、合浦、欽县），鸡屎果（南海、番禺、顺德），拔叶（河源、连平、龙川），扒仔（普宁、陆丰），拔子（梅县、惠阳），秋果叶（阳春），番稔叶（高要）。

【植物形态】灌木或小乔木，高可达10米，树皮黄褐色，光滑，小枝具四棱角，叶对生，革质，有短柄，长椭圆状椭圆形至卵形，长8—12厘米，端急尖或钝，基部通常圆形，背密被小柔毛，侧脉明显，上面凹入，背面凸起，花白色，芳香。浆果球形卵形，通常淡黄色，有白色、黄色或胭脂红的果肉。

【药用部分与性味】药用干或鲜的枝叶，味甘涩，性微温。

【效用】有收敛作用。

【用量】鲜叶用1—2两，干叶酌减，以鲜为佳。



159. 番石榴叶

Psidium guajava Linn. (桃金娘科)

160. 鸡 血 藤

【别名】大力牛（花县、普宁），蛤蜊藤（广宁、四会、德庆、封开、怀集），马上消（罗定），山葛藤（高要、高鹤），刷风藤（乐昌），牛粘大力（徐闻、海康、廉江、遂溪、电白、湛江、钦县），白牵牛（高州），牛大力（乐昌、阳江、阳春），马古力菇（化州、茂名、阳江、阳春），大活血、括血藤、血藤、红藤（广州）。

【植物形态】木质藤本；茎砍后有血红色乳汁液出，奇数羽状复叶，互生，小叶7—9片，叶柄茎部膨大；小叶长椭圆形或卵状长椭圆形，长3—6厘米，宽1.5—3厘米，两面无毛；小托叶小，钻状，圆锥花序顶生花多而密集，花紫色至玫瑰红色，荚果狭长椭圆形，种子3—6粒。

【药用部分与性味】根茎，味微甘涩、性温。

【效用】驱风湿，通经络，强筋骨，补血，活血，通经，治风湿痹痛，关节痠痛或手足麻木，闭经，月经不调。

【用量】5钱—2两，煎服或浸酒服。

【说明】广东市场尚有一种是大活血藤为大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (oliver.) Rehder et Willettal. (大血藤科) 的干茎，功效相同。见160—1图



160. 鸡血藤

Millettia reticulata Benth. (豆科)

附：大血藤


【别名】 千年健、活血藤、红藤、见血飞、大活血（中国药用植物图鉴），过山龙、血竭（中国药用植物志），熬心藤（广西）。

【植物形态】 落叶攀援灌木，长达10米。茎褐色，圆形，光滑无毛。叶互生，三出复叶，叶柄上有槽，基部圆形。两侧小叶较中间者大，斜卵形，无柄，顶端尖，基部两边不对称，外边较内边为大。花腋生，总状花序，单性，多数，有香气，黄色。浆果。

【药用部分与性味】 根、茎。味苦、性平。

【效用】 有祛风湿，强筋骨，活血。治风寒湿痹，肢节疼痛，麻木拘挛，水肿，蛔虫腹痛。

【用量】 干用5钱至1两，煎水服。



160—1 大血藤

Sargentodoxa cuneata (Oliver) Rehder et
Wilson (豆科)

161. 鸡屎藤

【别名】女青（本草纲目），皆治藤、毛葫芦（岭南采药录），红花鸡屎藤（潮阳、陆丰），凤凰长（紫金），青藤、扭肚藤（化县），臭鸡屎藤（潮安、潮州、普宁），小号鸡屎藤（普宁），乌肉鸡屎藤、风藤（潮安、潮州），天仙藤（惠来），臭屁藤（陆丰），青木香（根，潮汕），土木香（潮安、潮州）。

【植物形态】缠绕性草质藤本，长2—3米，茎之有鸡屎臭味。单叶，对生，近膜，叶形变异大，通常为卵形，长5—9厘米，托叶三角形，长3—5毫米，易脱落，花淡紫色，核果球形，直径5—7毫米。

【药用部分与性味】茎、叶，味甘涩，性平。

【效用】消食化气，去湿导滞，祛痰止咳，散瘀，消肿，解毒。

【用量】小儿鲜用1—2两，干用0.25—5钱，成人倍量。



161. 鸡屎藤

Paederia scandens (Lour.) Merr. (茜草科)

162. 鸡骨草

【别名】黄蚀草、细叶龙鳞草、猪腰草（广东中药），广州相思子（广州植物志），黄头草、黄仔藨、大黄草（岭南采药录）。


【植物形态】本品为披散灌木，高45—60厘米，小枝及叶柄被粗毛。小叶8—11对，膜质，矩圆形或倒卵形，先端钝而有小锐尖，上面被疏毛，背被紧贴的粗毛；小脉两面均凸起，小托叶极小。总状花序腋生，淡红色，聚生于沿花序总轴的棒状或球状的短枝上，荚果矩圆形，扁平，被疏毛，有种子4—5颗，种子矩圆形，扁平，褐黑色，种阜明显，蜡黄色，中间有孔，边缘为一矩圆状的胚脐带褐色，针刺状，紧靠着荚缘，根外表棕紫色至棕黑色，粗糙，有纵纹及横长突起纹理，侧根甚长，并再分枝，根质坚韧，纤维性断面淡黄白色，稍带粉性，平坦的横断面可见木部有多数棕色小点，射线明显，宽窄相间，粉白色。

【药用部分与性味】全草，味甘淡，性凉，气微。

【效用】能消解郁热，舒筋定痛，跌打伤痛，治黄疸，肺胃积水，胃气不舒，传染性肝炎。

【用量】干用2—3两。

【说明】本品种子有毒，切忌内服。



162. 鸡骨草

Abrus cantoniensis Hance. (豆科)

163. 铁 包 金

【别名】 乌龙根、乌口仔（广州、台山），假榄仔（广州），染布根、乌口鬼（台山），老鼠屎仔（粤北），鼠乳根、鼠啤根、老鼠乳（潮汕），老鼠乳头（饶平），老鼠乳藤根（普宁），老鼠鳞（海丰），乌鼠乳（潮安）。

【植物形态】 半藤状灌木，小枝被毛，单叶，互生，卵形，长5—10毫米，尖端有小凸点，侧脉五对，叶柄极短。花小，2至数朵簇生。果为核果，成熟时紫黑色。

【药用部分与性味】 根。味微甘涩，性平。

【效用】 润肺，止咳，散瘀。主治肺癆咳嗽，咯血，跌打伤症咳血。

【用量】 1—3两。

【说明】 商品习惯称本品为小叶铁包金，此外尚有一种大叶铁包金，原植物为同科植物牛鼻拳 *Berberia giraldiana* Schneid. 商品性状类似也广为使用，一般经验认为小叶为正品。



163. 铁包金

Berchemia lineata DC (鼠李科)

164. 铁 线 草

【别名】过坛龙（植物名实图考），铁线草（清远、始兴、惠阳），铁线网（电白、徐闻、海丰、廉江、遂溪），钱牌草（始兴），黑骨浪箕（增城、东莞、台山、新会），黑骨芒箕（广州），黑脚蕨（广宁、四会、德庆、封开、怀集），黑脚芒（高州、化州、茂名、化县），黑骨望（澄迈、琼海），黑脚差（新兴），黑骨全串草（高要），黑骨仔、铁骨仔（阳春），铁芦箕、乌脚芦箕（湛江、合浦、钦县），铁脚鲁箕（惠阳），鸡尾草（临高），乌脚枪、乌脚塔、乌骨箕（五华），乌脚芒（阳江），乌脚鲁箕（连平），铁芦根（乐昌），铁骨草（信县、琼中、乐东），骨浪箕草（从化），黑骨草、乌蝇翼、黑骨芒、铁鲁基、秧磨草（广东中药），乌枪炮（广州），小熊胆（岭南草药志），黑线蕨（广州植物志）。

【植物形态】多年生草本，根状茎短，直立，披锈色狭针形鳞片，叶簇生，叶柄圆柱形，茎被深褐色至紫黑色，光亮，基部具鳞片，上部裸净，叶革质，两面均裸净，呈不整齐的阔卵形，为2回或多回叉状分枝的羽状复叶状；中央羽片最大，线状披针形，端钝头；小羽片斜方状椭圆形至扇形，交错互生于叶轴两侧，具被毛的短柄，上缘及外缘圆形，且有细微锯齿，下缘成直角形，略呈复瓦状排列于叶轴上，也有疏生的，叶脉不明显，扇形；叶轴黑褐色，光亮，裸净的或上面略有细毛，孢子囊群椭圆形，生于小羽片的上缘，或外缘的叶脉顶端，通常连接，子囊群盖与孢子囊群同形，由叶缘锯齿，反摺所成。

（下转 512 页）

生药图志, 201

青蕨科, 是... 小羽小枝 (基...)
青蕨科, (基... 羽小枝... 羽小枝...)
(基... 羽小枝...)



164. 铁线草

Adiantum flabellulatum Linn. (铁线草科)

165. 枫香寄生

【别名】蟹爪寄生、螭髯寄生、路路通寄生、风饭寄生、节枝槲寄生（广州）、扁枝槲寄生（海南植物志）、百子痰梗（岭南采药录）。

【植物形态】寄生性植物较细弱的亚灌木，全体无毛，茎短时常为直立，较长则悬垂，枝圆柱形，灰褐色，节膨胀，小枝扁平2或3叉状分枝，节略扁，节下收缩，下部较长，上部的较短，每节上宽下狭。叶退化成鳞片状，位于花下，只见于最幼的节上。花细小簇生节上，每簇3朵，果椭圆形，顶端截平，熟时黄色，表面平滑，种子绿色。

【药用部分与性味】全株。味微苦、性平。

【效用】能祛风去湿；舒筋活络。治风湿脚气，四肢痛软，关节痛，虚损劳伤咳嗽，红崩白带，产后血气痛，小儿惊风。

【用量】1—2两。

（接上510页）

【药用部分与性味】全草。味淡微苦、性微凉。

【效用】能清热，祛湿，利水通淋，消肿止痛，泻火解毒，治肝炎，感冒，痢疾，筋骨肿痛，外治蛇虫咬伤，疮毒初起，跌打肿痛。

【用量】干用5钱—2两。



165. 枫香寄生

Viscum articulatum Burm. (桑寄生科)

166. 枫 香

【别名】枫树(广州植物志)，路路通、枫球子、枫果、风饭仔、风香仔(广州)，枫香树、三角枫、百日材、吗草(海南)，九孔子、枫树球、狼眼(药材学)，三角尖、香枫(岭南采药录)白胶香、枫香脂(广州)。

【植物形态】落叶大乔木，高20—40米，树干通直，树皮深绿色有不规则深裂，树冠多分枝，单叶互生，通常3裂，幼时或为5裂，裂片三角状，广卵形，顶端细长尖，基部心脏形或截形，边缘细锯齿，幼时表面有长毛，后即脱落，具柄，托叶线形，锈红色，附生于叶柄上，早落。总状花序，淡黄绿色。蓇葖果集生成球形果序，每果有宿存的花柱所变成的刺状物，成熟时变硬而木质，表面灰棕色或暗棕色，裂开后可见内藏多数排列紧密的小蓇葖果。

【药用部分与性味】果实，树脂，树根。果实(路路通)味苦微涩，性平。树脂(白胶香)味辛苦性平。树根(枫香根)味苦性平。

【效用】果实能镇痛，通经利水，祛湿除痹，治风湿周身痹痛，经络拘挛腰痛，肢节痛，四肢痛，月经不调，小便不利，乳汁不通。枫脂能活血止痛，生肌解毒，调气血，开窍化痰，止痛，祛痰，治吐衄，咯血，齿痛，金疮及一切痈疽疮疥。树根，民间用于治咳嗽。

【用量】根3—5钱。果实1—2钱。树脂0.5—1钱。



166. 枫 香

Liquidambar formosana Hance. (金缕梅科)

167. 狮子滚球

【别名】算盘子、野南瓜、柿子柳（广州植物志），算盘子（陆丰），算盘树（博罗、东莞），果合树（清远），果合仔（从化、东莞），假金瓜（广宁、四会、德庆、封开、怀集），糖瓜树（增城），炉边麻（潮安），红心柿舅（普宁），果合树（英德），番瓜仔（新会），古形树（东莞），涩仔叶（高要），馒头树（兴宁），馒头罗（五华），由甲树叶（花县），狮尾草，狮子球（岭南采药录），绍沙、山番瓜、假番瓜、周身松、山馒头（广州）。

【植物形态】常绿灌木，高达1米。根直立，茎多数分枝，小枝圆柱形，密被褐色茸毛。叶互生，卵状长椭圆形至倒卵状长椭圆形，端渐尖或钝，基部楔形，全缘，叶面深绿色，除中脉被毛外近于无毛。叶背浅绿色而粗糙，侧脉及网脉均明显隆起，被短柔毛，干时亦褐色。托叶三角形，顶端尖锐。花小，为腋生的花束，多数簇生，其细长的柄，蒴果扁球形，具10条浅而纵走的槽纹，外被茸毛。种子宽卵形而略压扁，熟时黑褐色。

【药用部分与性味】全草，味微甘涩、性凉。

【效用】能消滞，化湿，清热，舒筋活络，滑肠止泻，散瘀活血，祛痰，发表，利水，去湿，治痢疾，感冒，流涕，腹泻，跌打损伤，红肿热症，喉痛咳嗽，小便不利，瘰疬大热。

【用量】1—2两。



167. 獅子滾球

Glochidion puberum (L.) Hutch. (大戟科)

168. 闹 洋 花

【别名】曼陀罗(儋县、海南)，闹羊花(广宁、四会、德庆、封开、怀集、高鹤、增城、罗定、阳江、阳春、乐昌、电白)，目镜草(普宁)，瓠茄树(阳江、阳春、茂名、高州、化州)，麻大罗(琼中、乐东)，天茄，假塔花(东莞)。

【植物形态】直立，分枝，粗壮草本，高0.6—2米，秃净或稍皱毛，叶卵形至矩圆状卵形，长9—18厘米，先端渐尖，基部不等边，两面均秃净，边缘波浪形或不规则的浅裂。花板大，腋生，白色，长达15厘米，果球形，绿色，直径3—3.5厘米，有短而粗壮的刺。

【药用部分与性味】药用部分叶和花，气臭，味苦，性温，有剧毒。

【效用】解疮毒，止痛。

【说明】1. 有毒部位：花、茎、叶、果。2. 有毒成分：全株含生物硷，主要为莨菪硷，并含微量的东莨菪硷，种子中含量较其它部分高。3. 中毒症状：中毒后头晕，喉干，瞳孔散大，皮肤干燥，现猩红色，特别在面部，极为显著，有时体温升高，发生颈部肿胀，很口渴，声哑，小便困难，谵语，幻想，四肢不停地颤动，发展到抽搐，发狂，呼吸先兴奋后抑制，最后死亡。4. 解救方法：采用对症疗法：首先用0.5%鞣酸洗胃，内服1—2%鞣酸溶液，并可饮浓茶，注射生理盐水，也可注射匹罗卡品(毛果云香硷)，中枢神经兴奋症状，可用巴比妥类或水合氯醛抑制，但剂量不宜大，亦可用发酸的淘米水冷服或服甘

草水，或取生姜汁冲冷水吃，或用绿豆壳4两，金银花2两，连翘1两，甘草五钱，加水煎成200毫升，每隔1小时吃20毫升，严重者送医院。



168. 闹羊花

Datura metel Linn. (茄科)

169. 路 边 菊

【别名】野菊花，野黄菊（五华、河源、高州、广州、花县、从化、化州、阳江、阳春、茂名），黄菊（潮安、陆丰、惠来、海丰），假菊（广宁、四会、德庆、封开、怀集），山岗菊（顺德）。

【植物形态】直立，多年生草本，多分枝，被灰色柔毛或茸毛，有香气。叶具短柄，卵形，长5—15厘米，每边通常有2个裂片深达叶片的三分之一，裂片再行分裂，裂齿阔而钝或狭而短尖，头状花序，通常数个聚生，缘花（即舌状花）的颜色及形状变态极多。

【药用部分与性味】药用全株，花，性味：苦，辛，平。

【效用】有消炎解毒，杀菌的效力。治疮疡及各种急性化脓性炎症。

【用量】5钱—1两，煎服并可外洗。



169. 路边菊

Chrysanthemum indicum Linn. (菊科)

170. 葫 芦 茶

【别名】葫芦叶（新会、乐昌、连平、五华），蒲芦茶（东莞、番禺、高州、化州、茂名、阳江、阳春），蒲芦草（湛江、合浦、钦县、佛县、琼中），芦茶（澄迈、琼海），田刀柄（增城、东莞、博罗），剃刀柄（从化），蒲虫草（电白、海康、廉江、遂溪），三胎叶、千根梭（高州、化州、茂名、阳江、阳春），葫芦板（台山），双葡萄（东莞），长胫娘（化县），剑板茶（高要），奚须甫（五华），百劳刺（惠阳），黄超板（高明），咸鱼菜（连平），龙舌红，龙舌茶（潮安、潮州、澄海、饶平），金葫芦（澄海），鲑鱼草（海丰），百劳舌、咸鱼草（广州）。

【植物形态】直立，分枝小灌木，高0.5—1米，枝三棱形，棱角上疏被粗毛，后变无毛。叶为单叶状复叶，互生，革质，卵状长椭圆形，长6—12厘米，宽2—3厘米，边全缘，表面深绿色，无毛，背面浅绿色，叶柄长，两侧具翅。花淡紫色，荚果长2—5厘米，有毛。

【药用部分与性味】茎、叶，性平，味涩。

【效用】消食，杀虫，治五疳，作茶饮，又遇面黄色，痞久有虫，敷之即愈，又解热毒，去疳积，干置衣箱中可辟蠹去蛀虱。

【用量】0.5—1两。



170. 葫芦茶

Pteroloma triquetrum (Linn.) Desv.

171. 辣 蓼

【别名】水蓼（本草纲目），红辣蓼（广宁、四会、怀集、德庆、封开），红色竹菜（普宁），白花马了糞（潮安、潮阳），红马蓼（定安、屯昌），水流仙（钦县、湛江），辣蓼草、旱蓼（广州），马了糞、马蓼糞（海丰），红花马了糞，乌记草（潮安、潮州），红脚马了糞（南沃），旱辣蓼（揭阳）。

【植物形态】一年生草本，直立或下部伏地，高30—60厘米，分枝稍红色，节处常膨大。叶互生，全缘，无柄，披针形，中脉及边缘具粗毛，常有腺点，花淡红色，坚果小，三角形。

【药用部分与性味】全草，味辛，性温。

【效用】根，治痢疾有特效。枝叶用作神效茶原料，又可治跌打，煎洗外伤，杀虫止痛，又可作农业杀虫药。

【用量】根用量3—5钱，全草1—2两。

【说明】商品中常包括水辣蓼与旱辣蓼两种，旱辣蓼为同科属植物红辣蓼 *P. caespitosum* BL 也有人将生于较干燥的地方的水辣蓼作旱辣蓼的。



171. 辣蓼

Polygonum hydropiper Linn. (蓼科)

172. 宽筋藤

【别名】 大叶宽筋藤（增城、罗定、乐昌、广宁、四会、德庆、封开、怀集、电白、海南），山筋藤（徐闻、海康、廉江、遂溪），春筋藤（河源、海口、定安、屯昌），倒吊藤（湛江、合浦、钦县），吊天藤（电白），胡绵根（乐昌），大宽筋、大叶无爷藤（从化）。

【别名植物】 落叶木质藤本；老茎灰白色，多皮孔，嫩枝被短柔毛。叶互生，纸质，卵圆形至心形，长7—11厘米，宽6—11厘米，全缘，被短茸毛，基出脉5—7条，中侧脉2—3对，叶柄长4—7厘米，基部膨大，花小。果椭圆形，黄色。

【药用部分与性味】 茎。味微苦，性凉。

【效用】 舒筋活络，治急性风湿性关节炎，四肢筋络抽掣，跌打之后遗症，筋骨痛。

【用量】 干用5钱—1两。



172. 宽筋藤

Tinospora sineensis (Lour.) Merr. (防己科)

173. 酸 味 草

【别名】 酢浆草(唐本草), 酸味草(高鹤、高要), 酢浆草(乐昌), 老鸦酸, 白鸡酸(阳江、阳春、化州、高州、连平、龙川、茂名), 酸草, 班鸠酸(海康、徐闻、廉江、遂溪、电白), 细叶盐钩酸(五华), 盐鸠酸(连平), 鸠盐酸(河源), 盐酸鸡(普宁、陆丰、潮安), 卜鸠酸(兴宁、紫金、东莞、博罗、增城、清远), 黄鸽酸草(从化), 坡鸠酸(合浦、欽县), 钳酸果(台山、新会), 酸甜草(澄迈、琼海), 地酸菜(琼海、琼中、乐东), 架黄瓜、蛇拍仔(广宁、四会、德庆、封开、怀集), 仆鸠酸(惠阳), 擦花(临高), 金钱草(琼山), 亚公蕉(广东中药), 咸酸仔、咸酸藤、咸酸草(潮汕), 咸酸甜(潮安、潮州), 咸酸鸡(潮阳), 盐酸鸡仔(普宁), 小号盐酸鸡(惠来), 水盐酸(澄海), 味酸草、味酸仔(海丰), 鸚鸠酸(陆丰)。

【植物形态】 平卧, 多枝草本, 常于节上生根, 茎伏地长达50厘米, 疏被白色柔毛, 绿色, 近节处带紫红色, 叶互生或基生, 指状复叶, 有小叶3片, 叶柄被柔毛, 具关节, 小叶膜质, 倒心形, 无柄, 基部宽楔形, 全缘, 叶面草绿色, 背面浅绿色, 疏被白色柔毛, 花黄色, 单生于叶腋或集成繖形花序, 花柄细长, 约与叶柄相等, 其基部稍膨大, 蒴果圆柱形, 具6棱被白色柔毛, 种子多扁平棕色, 具横纹。

【药用部分与性味】 全草, 味酸, 性寒。

【效用】 能解热, 散瘀, 消肿止痛, 杀虫, 行气散血, 通月经, 利水去湿, 凉血, 消食健胃, 治跌打损伤, 淋病, 赤白带下, 小便短浊, 疥癣

痒疹，恶疮，小儿疳疾，大热伤寒，瘀血肿痛。

【用量】 3—5钱，外用适量。



173. 酸味草
Oxalis repens Thunb. (酢浆草科)

174. 蒲公英


【别名】 桃金英、洋蒲公英（广州常用草药），残飞坠（岭南采药录），耨耨草、金簪草、黄花地丁（本草纲目）。

【植物形态】 多年生草本，有乳汁，有一肥厚的直根，外面黑色有苦味。叶根生，花茎秃净或被绵毛，叶无柄，叶全缘，有齿缺或羽状深裂，裂片下向。头状花序单生，黄色，瘦果狭卵形，有棱，棱花中部以上有小刺，顶端急收缩而成一长喙约与成果等长或过之。

【药用部分与性味】 全草。味苦甘、性凉、无毒。

【效用】 能清热利水解毒，消炎散结，治乳痈乳瘤结核，疮毒，血淋，痰火核，疔疮恶毒及蜂窝疮肿，叶能催乳。

【用量】 鲜用 2—4 两，干用 1 两。



174. 蒲公英

Taraxacum officinale Wigg. (菊科)

175. 苍耳

【别名】 葇耳（本草经），苍耳子（阳江、阳春、高州、清远、连平、茂名、化州、广宁、四会、怀集、德庆、封开、乐昌、罗定），苍耳（阳江），羊大归（电白），痴头婆（广州），蒜麻头（梅县、英德），白孟（连平），阴菜规（普宁），盐菜规（潮安），肥猪草（英德），鸹头芒，痴头矮，苍耳草（广州），白花虱母头，虱母头，羊带归，阳菜归（潮汕），猪母带（潮州），胶东仔（潮州、潮阳），胶东只头（汕头、南澳），虱母球（惠来），狗脚迹（惠来、普宁）。

【植物形态】 一年生粗壮草本，高达1米，多分枝，粗糙或被毛，幼枝具条纹，叶纸质，粗糙，阔心形或三角状心形，3—5裂，两面均疏被短毛，边缘具不规则的粗齿，叶柄长短不等，被毛，头状花序顶生或腋生，簇生或成短的总状花序式排列，聚生于上部，呈球形。果（总苞），草质，外面有多数钩状小刺，端有2喙，内有瘦果2个，瘦果倒卵形，无冠生。种子椭圆形，扁平种仁含丰富油质。

【药用部分与性味】 果实，茎叶。果实味甘微辛，性温。茎叶味苦辛，性微寒。

【效用】 果实能祛风胜湿，发散解表，通鼻窍。治鼻渊头痛，风疹，恶疮，癩疾，肌肉风湿麻痹，四肢拘挛，关节疼痛癰疽，疮疥。茎叶能祛风散毒，治红云血癩（类似麻疯），痰火核，感冒鼻渊流浊涕，大肠热毒，疥疮，风头，痢疾。

【用量】 1—2两



175. 苍耳

Xanthium sibiricum Patr. (菊科)

176. 莞 荑

【别名】 葶苈（本草纲目），香荑（本草拾遗），胡荑（嘉佑本草），芫荑，莞荑（广州）。

【植物形态】 一年生草本，高达50—100厘米，直立，浅绿色，有纵细纹，全体有芳香气。叶初生为近根出作一束状，单叶，阔卵形或圆形，深裂，边缘具不整钝齿，基部耳廓状；叶面绿色，背浅绿色，柄长，柄基包茎，密节，节间渐出渐明显，在茎上部为互生叶，三出复叶至数回羽状复叶为细丝而成狭线形的裂片，茎上叶有鞘状苞茎；复伞形花序，顶生或近顶生，具花柄，花白色或微紫色，在小伞形花序的外边有扩大的瓣，朵近球形，表面具纵纹成棱，背主棱及其相邻的次棱较明显，侧的主棱及侧次棱不明显，油槽不明显，在次棱的下方，心皮的腹面稍凹陷。

【药用部分与性味】 全株，果实，味辛，性温。

【效用】 能透发痘疮，麻疹，健胃，治麻疹痘疮不透，虚寒胃痛，胃肠机能衰弱，间歇热。

【用量】 0.5—1两。



176. 芫 荽

Coriandrum sativum Linn. (繖形科)

177. 豨 豨 草

【别名】 感冒草、虾柑草（广东），槐角草（广州）。

【植物形态】 一年生分枝草本，被柔毛，高0.3—1.5米。叶对生，阔卵状三角形至披针形，边缘有锯齿，基部通常楔尖，叶柄长短不一。头状花序小，具柄，为1个2歧分枝具叶的圆锥花序，舌状花极短。瘦果稍膨胀而通常弯曲。

【药用部分与性味】 地上部全草，味苦，性凉。

【效用】 能散风热及表里风湿，利筋骨，除痹痛。治风湿痹痛，风湿麻木，筋骨疼痛，腰膝痠软，感冒寒热头痛，湿热肚痛，流感，痲疹，骨节冷痛，坐骨神经痛，并有平降血压作用。用于高血压症，中风不语，口眼喎邪不语，外用治毒疮，痔疮，蛇蜂咬刺伤。

【用量】 干用5钱至2两。

【说明】 广东各地有同名草药稀签草，实即唇形科防风草，见 177 附说明图。



177. 稀签草 (广州感冒草)
Siegesbeckia orientalis Linn. (菊科)



177. 防风草 (广州豨签草)
Anisomeles indica (L.) O. Ktze. (唇形科)

178. 蔓荆子

【别名】白背药（十万大山），白布荆（增城、东莞、罗定、乐昌），白木耳（新会、台山），白背木耳（广州），苏白背（茂名），倒埋树（罗浮山），蔓荆子（从化），白叶（海口），万京子，京子（广州）。

【植物形态】落叶灌木或小乔木，高约3米，有香气，幼枝四方形，密生细柔毛，老枝渐变圆形，毛渐脱落。单叶对生，叶片卵形，长2.5—3.5厘米，宽1.5—3厘米，全缘，上面绿色，背面白色。花淡紫白色。核果圆球形，黑色。

【药用部分与性味】果实。味苦辛，性微寒。

【效用】疏散风热，治头痛眩晕目痛等及湿痹拘挛。

【用量】1.5—3钱。



178. 蔓荆子

Vitex trifolia Linn. f. (马鞭草科)

179. 寮 刁 竹

【别名】 箭上高，山刁竹，英雄草(广州)。

【植物形态】 多年生直立草本，高达1米，表面有细纵条纹，单叶对生，线形或披针形，全缘，略反卷，有稀疏的缘毛。花小，淡黄绿色，蒴果。种子扁平，顶端着生多数银白色的细长绒毛。

【药用部分与性味】 全草。辛温无毒。

【效用】 祛寒，散瘀，止痛。主治疔积，水膨腹胀，皮肤痒，跌打，蛇咬伤。

【用量】 0.5—1两煎服，治蛇咬伤1—2两。



179. 寮刁竹

Pycnostelma paniculatum (Bge.) Schum.

(萝藦科)

180. 鴨 跖 草

【别名】 竹叶菜，水竹草，竹草（潮汕），细竹草（潮安、潮州），蛇竹草（潮安、潮州、南沃），蛇竹菜（汕头、惠来、普宁），竹仔草（南沃），竹仔菜（澄海、饶平、陆丰），尖叶竹草（南沃、惠来），竹筒菜（惠来），水竹菜（海丰、陆丰），竹菜，白竹菜，竹节草（海丰）

【植物形态】 一年生草本，披散，秃净。茎圆柱形，肉质，长30—60厘米，下部茎匍匐状，节常生根，节间较长，表面绿色或暗紫色，具纵细纹。叶互生，带肉质，卵状披针形，先端短尖，全缘，基部狭圆成膜质鞘。总状花序花3—4朵，深蓝色。蒴果椭圆形，压扁状，成熟时裂开，种子4枚，压扁，暗褐色有皱纹而具窝点。

【药用部分与性味】 全草。味苦，性大寒。

【效用】 能利小便，退热消肿、清凉解毒、治寒热瘧疾、发热狂癩、大腹宿满、身面气肿热痢、喉肿痛、喉痹、水气湿痹、五痔肿痛、脚气、心脏病、丹毒、疔瘡、蛇虫咬伤。

【用量】 1—2两。



180. 鸭跖草
Commelina communis Linn. (鸭跖草科)

181. 鸭舌草

【别名】鸭舌草，雨久花。

【植物形态】 草质，主茎小，往往分枝而短。叶丛生，有长柄，柄的基部成有膜质的鞘，叶身卵形或卵圆形。枝梢开紫色的花，结实时花梗向下曲。

【药用部分与性味】 全草。味苦，性寒。

【效用】 利小便，退热消肿，清凉解毒，喉肿痛，喉痹，蛇虫咬伤，疖疮等。

【用量】 1—2两。

【说明】 潮安有一种鸭舌草即菊科剪刀股 *Lactuca debilis* Maxim. 主治肺热喉痛，小儿口舌生疮，妇人乳痛。



181. 鴨舌草

Monochoria vaginalis Presl. (雨久花科)

182. 鴨脚木皮

【别名】 细叶鴨脚木（从化、增城、南海、河源、兴宁、乐昌），细种鴨脚（合浦、钦县），江补叶（澄迈、琼海），鴨脚掌（东莞），白腊苗（东莞），细叶鴨脚麻（惠阳），鴨脚树（阳春）。

【植物形态】 常绿乔木，具橄榄气味，高达10米。枝常具疏松的中髓。树皮灰白色，平滑。掌状复叶，互生，柄长8—30厘米，小叶6—8片，长卵形，长7—17厘米，宽3—6厘米，全缘。花白色，肉质。浆果球形，暗紫色。

【药用部分与性味】 树皮，味苦涩，性凉。

【效用】 解表，散热。主治外感发热，头痛，麻疹发热，夹色伤寒。煎水外洗治风疹，民间多作凉茶配料。



182. 鸭脚木

Schefflera octophylla (Lour.) Harms. (五加科)

183. 磨 盘 草

【别名】磨盘叶，金花草（生草药性论要），假茶仔、蚊仔（佛山区），磨谷子（台浦、湛江、电白、罗定、乐昌、增城），磨龙子（琼中），短龙糠（儋县），下龙被哺（陆丰、惠来、普宁），磨仔树（广州、惠阳），天槌草、磨谷藤（化县），磨谷根（广西），磨档草、耳响草、洪磨乙（新会），磨牙草、耳茸草（广东中药），磨仔草（广州），牛信仔麻、冬葵子、牛响草（海南）。

【植物形态】一年生或多年生，直立分枝，亚灌木状草本，高达2.5米（通常高1米），全体被灰色柔毛。叶互生，具长柄，圆卵形至椭圆形，端急尖，基部心形，边缘具不规则的锯齿，两面被灰色短柔毛。花单生叶腋，花柄长，近顶端有节。蒴果磨盘状，顶端截平，稍有毛，成熟时心皮开列与轴分离。

【药用部分与性味】枝叶、根、果。枝叶味甘淡，性凉。根、果、味甘淡，性平。

【效用】能清热补肾，散风清热，消滞去湿，祛痰火，治肾虚耳鸣，耳聩，骨蒸劳热，小便浑浊刺痛，腮腺炎，风热咳嗽，感冒，伤食腹泻，腹痛，痰火核，跌打损伤，五劳七伤。

【用量】1—3两。



183. 磨盘草

Abutilon indicum (L.) G. Don. (锦葵科)

184. 篱 栏

【别名】 篱栏网、过天猛、流篱网、龙头网、速篱仔（广州），连篱子、过天网（广州常用草药），紫棠藤（广州植物志）。


【植物形态】 一年生，柔弱，缠绕植物，秃净或近秃净，长1—3米。叶卵形，先端渐尖，基部心形，边近全缘或3裂，钝齿状或齿状。花序柄腋生，约与叶柄等长，有花3—5朵至多朵，花黄色。蒴果卵形，秃净，有棱。

【药用部分与性味】 全草，果。味甘淡，性凉。

【效用】 全草能清暑热，清肝热，治外感发热，白喉，喉痛，眼热。

果能治喉痛，眼热，肝热。

【用量】 1—2两。



184. 篱 栏

Merremia hederacea (Burm.) Hall. F. (旋花科)

185. 蕺菜

【别名】 假蕺菜，刺蕺菜（广州），白蕺菜，蕺菜（潮汕），野蕺菜（普宁），白骨蕺菜（南溪），野蕺（海丰），假蕺（潮阳）。

【植物形态】 一年生草本，高0.4—1米。每叶腋内有刺1—2枚，叶具长柄，矩圆形或椭圆状披针形，长4—10厘米，花小，腋生花束，绿色或白色，有刺。

【药用部分与性味】 根。甘淡，微寒。

【效用】 清热利湿，利大小肠，治痢疾，大便出血，湿热肚痛，小便刺痛，尿赤，全株煎水熏洗痔疮，捣烂外敷疮疡。

【用量】 1—2两煎服，鲜用加倍。

【说明】 禁忌虚痢日久，孕妇忌服。



185. 刺苋菜

Amaranthus spinosus Linn. (苋科)

186. 鱧 鱼 草

【别名】耳草（广州植物志），节节花（博罗、高要、乐昌、电白、茂名），鱧鱼胆草（广州区），鱧鱼草（海康、廉江、遂溪、徐闻），鱧鱼胆（高州），大样鸭坡草（信县），细叶亚婆潮（博罗），细叶婆潮（紫金），河婆草（陆丰），大凉藤（湛江、合浦），黑心草（琼中），苦草（普宁），细叶羊胆草（新会），羊胆草（高要），细样鱧鱼草（惠阳），鱧鱼龙胆草、苦胆草（广东中药），较剪草（岭南草药志），细叶龙胆草、熊胆草、龙胆草（广州），苦节节花、竹叶节节花（潮安、潮州），山节节花（汕头、揭阳），山龙胆草（揭阳），苦地胆（潮阳）。

【植物形态】多年生，直立或平卧草本，高0.3—1米，根粗壮坚硬，茎细长圆柱形，外表灰褐色或灰绿色，平滑而稍有纵纹，幼茎稍压扁而被短毛，节稍膨大，单叶对生，有短柄，叶片卵形或椭圆状披针形，近革质，端渐尖，基部楔形，边全缘，叶面绿色，粗糙，叶背色较浅，侧脉4—6对，托叶膜质连合而成一抱茎的短鞘，因伞花序几无柄，聚生于叶腋，花白色，几无柄，蒴果小，球形，略被粗毛。

【药用部分与性味】全草。味苦，性凉，气微。

【效用】能解毒，清火解热，凉血，消肿，止血，拔毒，治大热症，肝胆火旺，目赤肿，热毒疮肿，蛇虫咬伤，刀伤出血，大便出血。

【用量】5钱—1两，外用适量。



186. 鲫鱼草

Oldenlandia auricularia (L.) f. - Mueller.

(茜草科)

187. 韩 信 草

【别名】耳挖草、大力草（广州），印度黄芩（广东中药）。

【植物形态】多年生被毛草本，高10—25厘米。根须根状，土黄色，细根卷曲，甚多。茎基部伏地，上部直立，节处有根，向上即分枝。茎方形，被柔毛，灰褐色，质稍呈纤维性。单叶，对生，具柄，卵圆形，先端钝，基部截头形或近心形，边缘有钝齿，叶片灰绿色，两面被毛。总状花序顶生，稍稠密，花冠蓝色，小坚果有小凸点。

【药用部分与性味】全草。味苦辛，性平。

【效用】能祛风、散瘀、消肿、止痛、壮筋骨，治跌打损伤、蛇伤。

【用量】干用3钱—1两。



187. 韩信草
Scutellaria indica Linn. (唇形科)

188. 鵝不食草

【别名】石胡荽、珠子草、地胡椒(广州)，雾水沙、猫沙、小拳头、鵝仔唔食草(广东)，鵝仔不食草、珠子草(潮汕)，牛仔唔食草(海丰)鵝仔草(汕头)，鵝仔菜(澄海)，鵝仔香(惠来)，鵝仔辣(濠阳)，鵝喉香、一盘珠(潮安、潮州)。

【植物形态】矮小匍匐状草本，揉之有刺激气味，分枝极多，稍被绵毛。单叶，互生，叶片匙形，长约1厘米，缘有粗浅锯齿数个。花小，头状花序。瘦果，具四棱。

【药用部分与形态】全草，味辛，性温。

【效用】宣肺气，通窍，散瘀，解毒去瘀。主治疟疾，慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎，百日咳，小儿疳积，并清热，去痘后眼膜，跌打通脉。

【用量】1.5—3钱。



188. 鹅不食草

Centipeda minima (L.) A. Br. et. Aschers. (菊科)

189. 露 水 葛

【别名】 吸脓羔（岭南采药录）。

【植物形态】 多年生草本。茎拔散或多少匍匐状有时长达90厘米，秃净或多少被疏毛。叶具短柄，膜质，大部互生，或生于下部的有时对生，卵圆形或稍长，先端短尖，基部浑圆或钝，基出3脉，边全缘，两面均粗糙而薄被疏毛。花小，为腋生的花束，花淡绿色或染紫色，瘦果卵形而尖，黑色，有光泽。

【药用部分与性味】 全草。味淡，性凉，气微。

【效用】 能解毒去湿，敷疮有吸脓之功。治风火牙痛，眼热，吐血，疮疡。

【用量】 生用1—2两，干用减半。



189. 雾水葛

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. (荨麻科)

190. 鷹 不 泊

【别名】 藟槐树（河源、龙川、连平、紫金、增城、东莞、博罗、罗定、广宁、四会、德庆、封开、怀集、高要、高鹤），雉母黄（澄迈、琼海），牛群粉、麻米勒（从化），刺倒树（海口、定安、屯昌），风档树（花县），鸡碎木（电白、徐闻、海康、廉江、遂溪），菊葱（普宁），鸡咀木（儋县），蚊仔草（高州、茂名），刺倒叶（琼中、乐东），鸡蕊树（阳江），山芙蓉（高要），鸡嘜木（化县），杨档树（惠阳），狗花椒、画眉架（广州），画眉勒（宝安）。

【植物形态】 大灌木，高2—8米。皮刺在茎上的较粗大，三角形，红褐色，在枝上的较小。单数羽状复叶，具短柄，互生。小叶7—22片，近对生，有油点，斜刀状椭圆形，最顶端的一小叶呈长椭圆形，长3—7.5厘米，宽1.5—2.5厘米，叶全缘，基边略背卷，侧脉12—16对，叶轴具狭翼，疏生钩刺。花淡青色，果紫红色。

【药用部分与性味】 根，味苦，性微凉。

【效用】 清利湿热，化痰。治黄疸，肝炎，伤寒夹色，风寒感冒咳嗽，小儿百子痰症。

【用量】 1—2两。



190. 鷹不泊

Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. (芸香科)

中名、地方名索引检字表

一 画

一、

二 画

九、七、十、人、丁、入、了、刀、卜、

三 画

三、山、土、大、小、千、万、上、下、马、
川、广、飞、卫、乞、也、女、

四 画

水、火、木、五、六、月、日、天、牛、毛、
双、风、凤、井、方、文、有、无、瓦、尺、
牙、孔、斗、巴、止、丕、仆、中、手、

五 画

白、石、兰、田、半、生、龙、布、甘、叶、
四、玉、瓜、禾、仙、打、节、东、冬、长、

本、扒、左、片、平、北、加、古、目、皮、
代、且、由、台、头、必、

六 画

血、老、地、耳、艾、竹、羊、百、吊、多、
过、亚、如、奶、冰、当、言、印、灯、后、
交、自、安、孖、衣、羽、壮、江、冲、执、
吗、华、先、尖、企、有、异、

七 画

谷、车、沙、走、陶、扭、赤、旱、阳、阴、
杜、驳、豆、冷、豕、灵、疗、角、尾、吸、
吹、作、壳、牡、佛、秀、利、园、还、何、
伤、忍、声、应、灼、苟、扶、

八 画

金、青、狗、虎、乳、虱、披、雨、怕、油、
单、夜、盲、刺、披、花、味、泥、厕、美、
舍、爬、阿、顶、饭、苏、莞、杭、枚、步、
京、狐、刷、果、炉、周、芦、肥、奇、知、
呼、使、附、沿、姆、拐、岭、枝、接、板、

夏、罗、陈、昏、拉、卷、芮、来、空。

九 画

红、香、苦、咸、虾、胡、扁、南、构、茅、点、
重、芙、厚、首、毒、珍、姜、春、星、秋、虹、
顺、蚂、独、枯、莱、贴、降、段、砂、蛇、哈、
缸、指、姚、急、烂、纪、柯、树、面、孩、卑、
耐、胜、活、皆、剃、架、蚁、速、柿、袖、纤、
相、美、盆、洋、

十 画

乌、臭、盐、埔、倒、蚊、凉、粉、胶、草、
鬼、破、桂、秤、珠、酒、连、留、夏、海、桃、
笔、射、益、疔、穿、荆、牵、豹、能、饼、浪、
蛋、怒、积、茶、桐、究、浮、唐、赶、娘、消、
钉、哩、涂、蚌、流、秧、狼、涩、斑、荏、真、
称、染、骨、膏、荔、高、

十一 画

细、假、野、猪、蛇、猫、鱼、紫、甜、崩、壁、
梧、曼、贯、荷、猛、挨、梅、雀、鸟、藕、清、

淡、接、麻、殊、暖、蚶、斩、雪、梨、莎、婆、
软、匙、断、许、毫、粗、梢、救、梃、通、透、
剪、探、淋、球、菠、

十二画

黄、黑、痢、蛤、猴、丝、犁、番、朝、橡、褚、
画、斑、搭、瑚、美、短、硬、钩、络、散、谢、
渣、喝、酢、残、姪、遍、森、埠、蒜、菊、毕、

十三画

鸡、铁、枫、菊、路、杨、胡、雉、雷、落、矮、
辣、狮、蒲、蛭、感、痼、洞、钻、鼠、椽、璺、
葵、葡、新、暗、药、鬃、娥、蜂、毡、窠、钳、救、

十四画

酸、釜、满、银、算、纂、铜、翠、慢、绿、脾、
莫、舜、熊、蜡、蔗、董、管、蒯、枸、起、

十五画

墨、肭、糊、剑、铺、练、箭、莲、樟、横、森、
蔓、寮、鼎、鞋、醉、榴、

十六画

磨、鸭、钱、糖、笋、霍、境、蕞、精、薄。

十七画

筋、暮、钡、膨、娶、踏、蛙、蟋、蜂。

十八画

铜、拍、煎、登、轿、藤、勃、鎗、翻。

十九画

鹤、雾、磅。

二十画

栲、薪、棍、爆、舞。

二十一画

霸、鸫。

二十二画

警、鸱。

二十三画

教。

二十四画

瘵、螯、鳧。

中名、地方名索引

| 中名 | 顺序号 | 中名 | 顺序号 |
|-----|-----|-------|-----|
| | 一 | 画 | |
| 一支箭 | 1 | 一盘珠 | 181 |
| 一枝香 | 1 | 一畔莲 | 68 |
| 一柱香 | 1 | 一片莲 | 81 |
| 一点红 | 1 | 一枝黄花 | 1 |
| 一见喜 | 126 | | |
| | 二 | 画 | |
| 九里明 | 2 | 九节草 | 19 |
| 九里香 | 3 | 九节耳 | 101 |
| 九龙光 | 2 | 九干菜 | 102 |
| 九树香 | 3 | 九孔子 | 186 |
| 九结树 | 69 | 九节 | 19 |
| 九信药 | 7 | 九牛人城 | 3 |
| 九虎药 | 7 | 九死还魂草 | 83 |
| 九帖耳 | 101 | 七叶 | 52 |
| 九曲草 | 102 | 七里香 | 3 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 七叶莲 | 5 | 人字草 | 4 |
| 七枝莲 | 5 | 人字草 | 55 |
| 七指莲 | 5 | 丁伙草 | 4 |
| 七经通 | 3 | 丁贵草 | 4 |
| 七姊妹 | 75 | 丁香仔 | 109 |
| 七星藕 | 140 | 入地鸭 | 45 |
| 七星剑 | 90 | 入地金牛 | 6 |
| 七厘藤 | 156 | 了哥正 | 7 |
| 七叶星 | 90 | 了哥梨 | 13 |
| 七寸金 | 68 | 了哥头 | 70 |
| 七叶一枝花 | 5 | 刀斧枪 | 19 |
| 七叶枝花 | 5 | 刀背香 | 19 |
| 十八学士 | 50 | 卜鸠酸 | 172 |
| 十字珍珠草 | 119 | | |

三 画

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| 三 稔 | 8 | 三星草 | 9 |
| 三 敛 | 8 | 三荻草 | 9 |
| 三 奈 | 84 | 三叉草 | 52 |
| 三 藟 | 84 | 三脚马 | 20 |
| 三麻子 | 8 | 三枝香 | 51 |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 三月泡 | 152 | 山艾 | 42 |
| 三月菠 | 152 | 山枝 | 151 |
| 三角枫 | 166 | 山介菜 | 1 |
| 三角尖 | 166 | 山白菜 | 1 |
| 三胎叶 | 170 | 山胡椒 | 6 |
| 三叶兰 | 93 | 山黄皮 | 7 |
| 三叶鬼针草 | 93 | 山芝麻 | 14 |
| 山椒 | 6 | 山油麻 | 14 |
| 山橙 | 18 | 山白芷 | 15 |
| 山柑 | 20 | 山芷梅 | 15 |
| 山桔 | 20 | 山紫苏 | 16 |
| 山稔 | 139 | 山海螺 | 17 |
| 山梅 | 140 | 山大刀 | 19 |
| 山梔 | 151 | 山九节 | 19 |
| 山药 | 62 | 山大颞 | 19 |
| 山菱 | 62 | 山打劫 | 19 |
| 山桔 | 69 | 山橘叶 | 20 |
| 山柰 | 84 | 山桔树 | 20 |
| 山辣 | 84 | 山黄皮 | 20 |
| 山桂 | 85 | 山菩提 | 21 |
| 山苍 | 89 | 山大艾 | 24 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 山豆根 | 29 | 山芥兰 | 72 |
| 山薄荷 | 51 | 山玉桂 | 85 |
| 山甘草 | 57 | 山柃皮 | 85 |
| 山薄荷 | 110 | 山鸡椒 | 89 |
| 山葫芦 | 109 | 山苍树 | 89 |
| 山二女 | 124 | 山根花 | 98 |
| 山荔枝 | 127 | 山地豆 | 97 |
| 山枸杞 | 127 | 山甘草 | 99 |
| 山漆树 | 136 | 山葛藤 | 169 |
| 山勒贼 | 138 | 山苦瓜 | 167 |
| 山狗丹 | 138 | 山馒头 | 167 |
| 山稔根 | 139 | 山岗菊 | 169 |
| 山梅根 | 140 | 山煎藤 | 172 |
| 山绿豆 | 146 | 山刁竹 | 179 |
| 山鸡谷 | 149 | 山芙蓉 | 190 |
| 山鸡屎 | 149 | 山葡萄 | 21 |
| 山枝子 | 151 | 山浮桃 | 21 |
| 山黄果 | 151 | 山鹿茸 | 15 |
| 山柠檬 | 69 | 山埔姜 | 43 |
| 山桔仔 | 69 | 山甘茶 | 57 |
| 山地卷 | 71 | 山黄枝 | 151 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 山蝉卜 | 151 | 土三七 | 10 |
| 山熊胆 | 150 | 土荆芥 | 12 |
| 山清菜 | 68 | 土牛七 | 11 |
| 山鸡旦 | 109 | 土黄菊 | 11 |
| 山青麻 | 132 | 土加藤 | 13 |
| 山厚合 | 1 | 土洋参 | 17 |
| 山蒺藜 | 1 | 土元金 | 26 |
| 山起藤 | 98 | 土地丁 | 30 |
| 山胡桃架 | 6 | 土木贼 | 39 |
| 山打大刀 | 19 | 土木鼈 | 40 |
| 山辣蓼叶 | 27 | 土荆芥 | 51 |
| 山横枝树 | 151 | 土地骨 | 114 |
| 山苍子根 | 89 | 土古片 | 114 |
| 山芝麻根 | 14 | 土玉桂 | 124 |
| 山油麻甲 | 14 | 土常山 | 128 |
| 山金汤匙 | 1 | 土甘草 | 140 |
| 山节节花 | 186 | 土公英 | 70 |
| 山龙胆草 | 188 | 土桂枝 | 85 |
| 土古 | 114 | 土肉桂 | 85 |
| 土藤 | 99 | 土首乌 | 87 |
| 土细辛 | 1 | 土烟辛 | 89 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 土金沙 | 96 | 大叶婆 | 13 |
| 土忍冬 | 98 | 大凉藤 | 13 |
| 土牛膝 | 128 | 大力牛 | 15 |
| 土牛七 | 128 | 大舟叶 | 19 |
| 土银花 | 98 | 大口唇 | 19 |
| 土旱莲 | 91 | 大茶药 | 22 |
| 土黄莲 | 52 | 大柴药 | 22 |
| 土香附 | 108 | 大炮叶 | 22 |
| 土木香 | 161 | 大青叶 | 23 |
| 土红花 | 1 | 大风艾 | 24 |
| 土黄耆 | 28 | 大叶榕 | 35 |
| 土蒲公英 | 70 | 大力牛 | 45 |
| 土蔓荆子 | 43 | 大罗伞 | 48 |
| 大 钻 | 157 | 大凉伞 | 48 |
| 大 蓊 | 124 | 大力黄 | 127 |
| 大 艾 | 24 | 大藤头 | 128 |
| 大 艾 | 42 | 大叶艾 | 132 |
| 大 节 | 19 | 大牙郎 | 138 |
| 大 茶 | 22 | 大凤尾 | 145 |
| 大 青 | 23 | 大吊兰 | 63 |
| 大种鸭 | 13 | 大金英 | 92 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 大活血 | 157 | 大叶南五味 | 167 |
| 大力牛 | 160 | 大叶冷饭团 | 167 |
| 大活血 | 160 | 大叶宽筋藤 | 172 |
| 大黄草 | 162 | 大叶无爷藤 | 172 |
| 大宽筋 | 172 | 大叶龙胆草 | 173 |
| 大凉藤 | 186 | 大叶鲷鱼草 | 173 |
| 大力草 | 187 | 大神牛奶树 | 188 |
| 大叶芙蓉 | 41 | 大号凤尾草 | 145 |
| 大叶艾草 | 42 | 大祥鸭坡草 | 188 |
| 大馨菱根 | 135 | 小金 | 25 |
| 大海口朵 | 138 | 小飞扬 | 25 |
| 大芙蓉叶 | 41 | 小兰青 | 28 |
| 大叶七星剑 | 1 | 小凉伞 | 48 |
| 大叶山橘叶 | 20 | 小罗伞 | 48 |
| 大叶千斤拔 | 29 | 小凤尾 | 52 |
| 大叶水杨梅 | 32 | 小凉藤 | 67 |
| 大叶半枫荷 | 59 | 小猴草 | 111 |
| 大叶雉鸡尾 | 60 | 小竹草 | 149 |
| 大叶猪鬃砂 | 138 | 小栲莲 | 152 |
| 大叶雉鸡尾 | 145 | 小远志 | 154 |
| 大叶三月泡 | 152 | 小凤尾 | 160 |

| | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| 小熊胆 | 164 | 小号水泡糖 | 152 |
| 小拳头 | 188 | 小号鸡屎藤 | 161 |
| 小里草 | 119 | 千里光 | 2 |
| 小飞扬草 | 25 | 千里及 | 2 |
| 小金牛草 | 26 | 千里香 | 3 |
| 小金不换 | 26 | 千斤草 | 25 |
| 小花远志 | 26 | 千斤草 | 28 |
| 小石斑树 | 100 | 千斤拔 | 28 |
| 小黄泡勒 | 152 | 千斤拔 | 29 |
| 小叶下红 | 72 | 千斤红 | 29 |
| 小凤尾草 | 95 | 千斤黄 | 28 |
| 小叶双眼龙 | 27 | 千斤木 | 28 |
| 小叶百眼藤 | 99 | 千斤吨 | 28 |
| 小叶羊角藤 | 99 | 千斤拔 | 29 |
| 小钻坚骨风 | 157 | 千里锦 | 28 |
| 小米乳仔草 | 25 | 千根草 | 25 |
| 小号盐酸鸡 | 173 | 千年艾 | 58 |
| 小号乳汁草 | 25 | 千里行 | 48 |
| 小祥乳汁草 | 25 | 千金树 | 124 |
| 小号虱母头仔 | 155 | 千根旋 | 170 |
| 小叶凤尾草 | 95 | 千下植 | 68 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 千打糙 | 68 | 马 辛 | 80 |
| 千打糙 | 124 | 马鞭草 | 81 |
| 万 岁 | 83 | 马板草 | 81 |
| 万年松 | 83 | 马节草 | 81 |
| 万京子 | 178 | 马脚油 | 121 |
| 万里香 | 3 | 马屎苋 | 66 |
| 上山虎 | 6 | 马齿苋 | 66 |
| 上山虎 | 152 | 马排菜 | 68 |
| 上石虾 | 63 | 马蹄草 | 72 |
| 上树菊 | 100 | 马蹄香 | 72 |
| 上树龙 | 100 | 马蹄香 | 88 |
| 上壁蜈蚣 | 100 | 马缨丹 | 76 |
| 上树蜈蚣 | 100 | 马麩儿 | 80 |
| 上石仙桃 | 63 | 马肝石 | 87 |
| 下山虎 | 6 | 马上消 | 160 |
| 下山虎 | 27 | 马力肚 | 166 |
| 下仔甘 | 119 | 马尾丝 | 84 |
| 下山虎 | 99 | 马蹄香 | 97 |
| 下龙被哺 | 183 | 马钱葱 | 106 |
| 马 蒿 | 110 | 马了缢 | 171 |
| 马 苋 | 66 | 马蔘缢 | 171 |

| | | | |
|------|-----|--------|-----|
| 易古力菇 | 160 | 广东土牛七 | 11 |
| 易附细辛 | 88 | 广白头翁 | 115 |
| 易鬃藤果 | 18 | 广州相思子 | 162 |
| 州椒 | 6 | 广东王不留行 | 100 |
| 州麝香 | 51 | 飞扬草 | 25 |
| 州破石 | 127 | 卫茅 | 133 |
| 疔福藤 | 167 | 乞儿砵 | 142 |
| 疔九樟 | 89 | 也侧苗 | 62 |
| 疔地丁 | 30 | 女青 | 161 |

四 画

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 水央 | 32 | 水胡滴 | 33 |
| 水常 | 32 | 水孤闷 | 33 |
| 水斑 | 35 | 水芙满 | 33 |
| 水秧 | 35 | 水蓑衣 | 34 |
| 水茄 | 40 | 水箭草 | 34 |
| 水蓼 | 171 | 水剑草 | 34 |
| 水母子 | 19 | 水阻草 | 34 |
| 水杨梅 | 32 | 水翁花 | 35 |
| 水杨柳 | 32 | 水翁叶 | 35 |
| 水杨芦 | 32 | 水榕树 | 35 |

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 水翁树 | 35 | 火炭藤 | 36 |
| 水龙树 | 35 | 火炭草 | 36 |
| 水映木 | 35 | 火炭须 | 36 |
| 水灯笼 | 79 | 火炭星 | 36 |
| 水精子 | 81 | 火炭煤 | 36 |
| 水黄枝 | 151 | 火谭煤 | 36 |
| 水横枝 | 151 | 火炭药 | 36 |
| 水泡勒 | 152 | 火炭屎 | 36 |
| 水流仙 | 171 | 火炭毛 | 36 |
| 水芫荽 | 121 | 火秧藟 | 37 |
| 水甘茶 | 57 | 火炭只药 | 36 |
| 水竹草 | 180 | 木贼 | 39 |
| 水竹菜 | 180 | 木棉 | 36 |
| 水晶花 | 151 | 木子 | 136 |
| 水拖沙 | 36 | 木蟹 | 36 |
| 水盐酸 | 173 | 木棉树 | 36 |
| 水芙蓉 | 41 | 木贼草 | 39 |
| 水灯笼草 | 79 | 木簕子 | 40 |
| 臭艾 | 42 | 木别藤 | 36 |
| 臭黄树 | 19 | 木别子 | 36 |
| 火炭母 | 36 | 木芙蓉 | 36 |

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 木万年青 | 3 | 五义牛膝 | 44 |
| 五爪龙 | 17 | 五爪牛乳 | 44 |
| 五敛子 | 8 | 五指牛乳 | 44 |
| 五毒草 | 36 | 五义牛乳 | 44 |
| 五月艾 | 42 | 五花血龙 | 73 |
| 五指柑 | 43 | 五代同堂 | 75 |
| 五爪龙 | 44 | 五眼子头 | 99 |
| 五指香 | 44 | 五叶铺姜 | 43 |
| 五郎草 | 51 | 五爪埔姜 | 43 |
| 五行草 | 66 | 五指牛奶桐 | 44 |
| 五方菜 | 66 | 六月雪 | 11 |
| 五色梅 | 75 | 六月雪 | 1 |
| 五色花 | 75 | 六月雪 | 19 |
| 五眼子 | 99 | 六角英 | 34 |
| 五合子 | 121 | 月橘 | 8 |
| 五条根 | 86 | 月桂 | 85 |
| 五爪笔 | 52 | 月姑草 | 97 |
| 五时合 | 119 | 日开夜闭 | 119 |
| 五爪金龙 | 17 | 日行千里 | 126 |
| 五爪金龙 | 44 | 天茄 | 168 |
| 五指毛桃 | 37 | 天藤 | 67 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 天师印 | 38 | 牛舌草 | 70 |
| 天南星 | 49 | 牛尾草 | 94 |
| 天芥菜 | 70 | 牛草纲 | 96 |
| 天胡荽 | 121 | 牛坦纲 | 96 |
| 天台乌 | 124 | 牛头丝 | 96 |
| 天上鹤 | 134 | 牛儿林 | 96 |
| 天槿草 | 183 | 牛抄芒 | 96 |
| 天竺桂 | 65 | 牛螟草 | 97 |
| 天仙藤 | 161 | 牛膝头 | 128 |
| 牛心草 | 4 | 牛膝毯 | 138 |
| 牛奶藤 | 13 | 牛大力 | 160 |
| 牛白藤 | 13 | 牛响草 | 183 |
| 牛大艾 | 24 | 牛群勒 | 196 |
| 牛石角 | 28 | 牛耳风 | 16 |
| 牛大力 | 45 | 牛乳草 | 25 |
| 牛奶树 | 46 | 牛刀刺 | 28 |
| 牛奶毯 | 46 | 牛膝勒 | 28 |
| 牛奶麻 | 46 | 牛喫埔 | 70 |
| 牛筋子 | 65 | 牛牯大力 | 45 |
| 牛过埔 | 70 | 牛牯大力 | 100 |
| 牛食埔 | 70 | 牛牯仔麻 | 100 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 牛子头藤 | 109 | 风香仔 | 106 |
| 牛仔唔食草 | 188 | 风档树 | 190 |
| 毛 稔 | 138 | 风箱树 | 32 |
| 毛 密 | 138 | 风饭寄生 | 106 |
| 毛黄姜 | 10 | 风 藤 | 161 |
| 毛甘蔗 | 36 | 风 尾 | 60 |
| 毛蓬菜 | 70 | 风仙花 | 47 |
| 毛芹菜 | 74 | 凤凤肠 | 48 |
| 毛葫芦 | 161 | 凤凤长 | 161 |
| 毛将军 | 15 | 凤尾毛 | 80 |
| 毛果巴豆 | 27 | 凤尾草 | 80 |
| 毛麝香 | 51 | 凤尾草 | 52 |
| 毛瓣鸡毛藤 | 144 | 凤尾草 | 95 |
| 双眼龙 | 27 | 凤尾基 | 145 |
| 双高藤 | 146 | 凤尾毛 | 145 |
| 双葡萄 | 170 | 凤尾笔 | 52 |
| 双面刺 | 6 | 凤颈草 | 31 |
| 双雀照草 | 4 | 井 毛 | 60 |
| 风 樟 | 89 | 井栏茜 | 52 |
| 风沙藤 | 157 | 井边茜 | 52 |
| 槐饭仔 | 166 | 井口笔 | 52 |

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 井尾笔 | 52 | 尺荃叶根 | 90 |
| 方针草 | 166 | 牙齿芒 | 96 |
| 方骨相思 | 128 | 孔雀尾 | 95 |
| 方骨苦楝 | 93 | 斗藤 | 99 |
| 方枝苦耐 | 93 | 巴山虎 | 99 |
| 文珠兰 | 60 | 止作草 | 142 |
| 文珠兰 | 50 | 无头纲 | 184 |
| 文头罗 | 100 | 仆鸠酸 | 173 |
| 有皮芋 | 17 | 中叶蛇泡勒 | 162 |
| 无花里 | 47 | 手巾花 | 98 |
| 瓦松 | 83 | | |

五 画

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 白苏 | 18 | 白牛胆 | 16 |
| 自由苏 | 148 | 白面风 | 16 |
| 白芍 | 17 | 白面虎 | 16 |
| 白兰 | 64 | 白背风 | 16 |
| 白草 | 61 | 白背枫 | 16 |
| 白榆 | 151 | 白毛茶 | 16 |
| 白孟 | 175 | 白毛茶 | 17 |
| 白叶 | 178 | 白花茶 | 17 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 白花茶 | 132 | 白头康 | 115 |
| 白花茶 | 57 | 白鼓钉 | 115 |
| 白花仔 | 123 | 白扁豆 | 116 |
| 白花草 | 141 | 白鸡谷 | 149 |
| 白花丹 | 58 | 白胶香 | 166 |
| 白花藤 | 57 | 白鸡酸 | 173 |
| 白鹤藤 | 53 | 白背药 | 178 |
| 白灰藤 | 109 | 白布荆 | 178 |
| 白粉藤 | 109 | 白木耳 | 178 |
| 白粉丹 | 109 | 白腊苗 | 182 |
| 白玉兰 | 54 | 白竹菜 | 180 |
| 白兰花 | 54 | 白蕺菜 | 185 |
| 白兰香 | 150 | 白碎玉 | 13 |
| 白细花 | 54 | 白嘴玉 | 13 |
| 白云花 | 56 | 白蚊藤 | 99 |
| 白纸扇 | 57 | 白蝶藤 | 57 |
| 白叶仔 | 57 | 白牵牛 | 160 |
| 白救主 | 59 | 白牵牛 | 100 |
| 白冬瓜 | 100 | 白乌柏 | 125 |
| 白茅根 | 112 | 白饭草 | 86 |
| 白药根 | 144 | 白饭藤 | 86 |

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 白饭蕪 | 36 | 白雪花叶 | 56 |
| 白饭仔 | 36 | 白花螞蟥菊 | 91 |
| 白面将军 | 19 | 白花螞蟥草 | 123 |
| 白花旗草 | 91 | 白花黄花稔 | 155 |
| 白背冬瓜 | 109 | 白花风母头 | 155 |
| 白扁豆花 | 116 | 白花马丁榄 | 171 |
| 白面豆花 | 116 | 白花虱母头 | 175 |
| 白米仔草 | 123 | 白花土牛七 | 128 |
| 白叶子树 | 124 | 白花鸡潑鼻 | 128 |
| 白花臭草 | 141 | 白花螞蟥草 | 91 |
| 白咸虾花 | 141 | 白花磨其草 | 91 |
| 白银香皮 | 150 | 白花断血草 | 91 |
| 白背木耳 | 178 | 白花鸡屎藤 | 13 |
| 白银树皮 | 150 | 白花益母草 | 132 |
| 白花棕草 | 91 | 白背黄花稔 | 155 |
| 白花蠟草 | 91 | 石 榴 | 75 |
| 白花墨草 | 91 | 石 兰 | 93 |
| 白骨蕨萁 | 185 | 石 发 | 95 |
| 白米饭桃 | 36 | 石 苜 | 95 |
| 白背丝绸 | 53 | 石 榴 | 159 |
| 白玉兰花 | 54 | 石桂树 | 160 |

| | |
|------|-----|
| 石芥子 | 12 |
| 石青子 | 48 |
| 石楠藤 | 62 |
| 石仙桃 | 63 |
| 石榴皮 | 75 |
| 石榴花 | 75 |
| 石榴叶 | 75 |
| 石母草 | 110 |
| 石兰草 | 110 |
| 石武草 | 110 |
| 石胡荽 | 121 |
| 石中明 | 134 |
| 石胡荽 | 188 |
| 石榴树皮 | 75 |
| 石榴根皮 | 75 |
| 兰 草 | 11 |
| 兰肉姜 | 10 |
| 兰藜叶 | 23 |
| 藜香草 | 110 |
| 藜色草 | 110 |
| 藜花地丁 | 110 |

| | |
|--------|-----|
| 兰花耳钩草 | 158 |
| 兰桑南五味子 | 157 |
| 田 葛 | 39 |
| 田 桑 | 81 |
| 田 川 | 81 |
| 田基黄 | 68 |
| 田贯草 | 68 |
| 田药口 | 142 |
| 田鸡草 | 156 |
| 田刀柄 | 170 |
| 田油甘 | 179 |
| 田青仔 | 119 |
| 半天雷 | 3 |
| 半枫荷 | 108 |
| 半边旗 | 108 |
| 半边梳 | 108 |
| 半边莲 | 108 |
| 半边牙 | 108 |
| 半边厥 | 108 |
| 半群莲 | 108 |
| 半群花 | 108 |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 半边莲 | 128 | 龙舌红 | 170 |
| 生艾 | 42 | 龙舌茶 | 170 |
| 生南星 | 49 | 龙珠草 | 119 |
| 生长草 | 83 | 布惊 | 43 |
| 生刺叶 | 146 | 布荆 | 43 |
| 生鸡米 | 149 | 布芥草 | 72 |
| 生鸡谷 | 149 | 布渣叶 | 85 |
| 生枝子 | 151 | 布豆叶 | 85 |
| 生银花 | 98 | 布渣木 | 85 |
| 生香附 | 108 | 布包仔 | 85 |
| 生肌草 | 165 | 布荆叶 | 43 |
| 生毛茛仔草 | 155 | 甘尾 | 22 |
| 龙川草 | 4 | 甘晚树 | 22 |
| 龙芽草 | 31 | 叶芝麻 | 45 |
| 龙芽草 | 87 | 叶下红 | 72 |
| 龙煎叶 | 64 | 叶花红 | 72 |
| 龙舌叶 | 84 | 叶下珠 | 119 |
| 龙味叶 | 84 | 叶虾莲 | 123 |
| 龙须藤 | 73 | 叶下白 | 15 |
| 龙船藤 | 145 | 叶背红 | 72 |
| 龙胆草 | 188 | 叶后珠 | 119 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 四叶参 | 17 | 打鬃泡 | 79 |
| 四季花 | 123 | 打泡草 | 79 |
| 四稔槌 | 68 | 节节花 | 13 |
| 四方骨苦楝 | 93 | 节节花 | 123 |
| 四方枝苦楝 | 93 | 节节花 | 186 |
| 玉芙蓉 | 58 | 节枝槲寄生 | 165 |
| 玉如意 | 158 | 东风桔 | 69 |
| 玉叶金花 | 57 | 东风澄 | 69 |
| 玉盏栽银杯 | 93 | 东方槲寄生 | 113 |
| 玉盏栽金杯 | 93 | 冬均子 | 105 |
| 瓜仁草 | 4 | 冬葵子 | 183 |
| 瓜子菜 | 68 | 长命菜 | 66 |
| 瓜子金 | 154 | 长寿菜 | 66 |
| 禾下丝 | 68 | 长胫娘 | 170 |
| 禾震气 | 68 | 长萼堇菜 | 158 |
| 禾下屎 | 68 | 长萼翠头草 | 158 |
| 仙鹤草 | 67 | 长生不死草 | 83 |
| 仙甘藤 | 57 | 本土细辛 | 1 |
| 打蛇艾 | 24 | 本地羚羊 | 102 |
| 打卜草 | 79 | 扒仔 | 169 |
| 打头泡 | 79 | 扒山虎 | 99 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 左脑风 | 73 | 代刀草 | 161 |
| 左扭风 | 72 | 且蚊草 | 4 |
| 片江青 | 72 | 白甲草 | 118 |
| 平地木 | 48 | 白甲树叶 | 167 |
| 北京草 | 121 | 台 乌 | 124 |
| 加必仔 | 155 | 台 药 | 124 |
| 古形树 | 167 | 头晕花 | 75 |
| 目镜草 | 168 | 头妃珠 | 119 |
| 皮肉草 | 155 | 必子草 | 94 |

六 酒

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 血 藤 | 62 | 老鼠尾 | 20 |
| 血 龙 | 73 | 老鼠耳 | 69 |
| 血 藤 | 160 | 老鼠乳 | 163 |
| 血母姜 | 10 | 老鼠鳞 | 163 |
| 血压草 | 126 | 老虎耳 | 103 |
| 血见愁 | 121 | 老虎耳 | 97 |
| 老虎尿 | 1 | 老虎骨 | 85 |
| 老虎须 | 1 | 老虎根 | 121 |
| 老虎尿 | 38 | 老虎骨 | 124 |
| 耆鼠尾 | 28 | 老公根 | 142 |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 老鸦酸 | 172 | 地胡椒 | 188 |
| 老鼠屎仔 | 163 | 地斩头 | 70 |
| 老鼠乳头 | 163 | 地丁草 | 158 |
| 老鼠拉冬瓜 | 80 | 耳草 | 184 |
| 老鼠乳藤根 | 163 | 耳盘草 | 68 |
| 地精 | 87 | 耳背菜 | 72 |
| 地珍 | 71 | 耳盘草 | 183 |
| 地丁 | 90 | 耳响草 | 183 |
| 地蚕 | 121 | 耳挖草 | 187 |
| 地沙草 | 4 | 耳钩草 | 158 |
| 地锦根 | 7 | 耳钩花 | 158 |
| 地棉笠 | 7 | 艾 | 42 |
| 地耳草 | 68 | 艾草 | 42 |
| 地胆草 | 70 | 艾叶 | 42 |
| 地胆头 | 70 | 竹菜 | 180 |
| 地钻头 | 70 | 竹草 | 180 |
| 地甲草 | 71 | 竹蒿草 | 94 |
| 地珍藤 | 71 | 竹圆葵 | 96 |
| 地骨皮 | 114 | 竹节黄 | 128 |
| 地骨子 | 114 | 竹叶菜 | 180 |
| 地酸菜 | 172 | 竹仔草 | 180 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 竹仔菜 | 180 | 百日材 | 106 |
| 竹筒菜 | 180 | 百劳刺 | 170 |
| 竹节草 | 180 | 百劳舌 | 170 |
| 竹叶节节花 | 186 | 百蕊乌柏 | 125 |
| 羊乳 | 17 | 百日红皮 | 150 |
| 羊乌鸭 | 37 | 百子痰梗 | 185 |
| 羊蹄草 | 72 | 吊兰 | 78 |
| 羊蹄菜 | 72 | 吊兰子 | 78 |
| 羊角豆 | 134 | 吊天藤 | 172 |
| 羊角豆 | 146 | 多须公 | 11 |
| 羊大归 | 175 | 多仔金 | 119 |
| 羊胆草 | 186 | 过岗龙 | 78 |
| 羊带归 | 175 | 过江龙 | 73 |
| 羊耳草 | 15 | 过山香 | 89 |
| 羊耳草 | 70 | 过坛龙 | 184 |
| 百部 | 77 | 过天猛 | 184 |
| 百叶 | 95 | 过天纲 | 184 |
| 百解 | 156 | 亚婆巢 | 13 |
| 百部根 | 77 | 亚婆湖 | 13 |
| 百眼藤 | 99 | 望公蕉 | 112 |
| 百藤刺 | 128 | 娉意花草 | 128 |

| | | | |
|------|-----|--------|-----|
| 如意花 | 75 | 自如草 | 74 |
| 如意草 | 75 | 安石榴 | 76 |
| 奶·薯 | 17 | 孛带藤 | 61 |
| 奶·树 | 17 | 衣钮草 | 61 |
| 冰片艾 | 24 | 羽箭草 | 133 |
| 冰打草 | 34 | 壮骨凤 | 157 |
| 当落尾 | 132 | 江补草 | 182 |
| 当梨根 | 159 | 冲天白 | 16 |
| 宵耳草 | 101 | 扶鼠草 | 91 |
| 吉耳菜 | 101 | 吗·草 | 166 |
| 印度草 | 126 | 华南龙胆 | 30 |
| 印度黄岑 | 187 | 先苦后甜 | 148 |
| 灯盏花 | 47 | 尖叶竹草 | 180 |
| 灯笼草 | 79 | 企枝叶下珠 | 119 |
| 后红叶 | 72 | 有毛板牙郎 | 138 |
| 后坎草 | 94 | 异形南五味子 | 157 |
| 交·藤 | 87 | | |

七 画

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| 谷木 | 82 | 谷树 | 82 |
| 谷·精 | 81 | 谷毛菜 | 72 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 谷精草 | 81 | 岗油麻 | 14 |
| 谷丁草 | 81 | 扭肚藤 | 161 |
| 谷精珠 | 81 | 扭肚藤 | 56 |
| 车前 | 86 | 扭骨风 | 73 |
| 车前草 | 86 | 赤蕨 | 145 |
| 车前子 | 86 | 赤蕨头 | 145 |
| 车轮菜 | 86 | 赤决头 | 145 |
| 车茶草 | 86 | 赤地利 | 36 |
| 沙草 | 4 | 赤牙郎 | 138 |
| 沙姜 | 84 | 旱 蓼 | 171 |
| 沙甘葛 | 4 | 旱辣了 | 171 |
| 沙坝仔 | 36 | 旱莲草 | 91 |
| 走马箭 | 90 | 阳桃 | 8 |
| 走马风 | 90 | 阳菜妇 | 175 |
| 走粉藤 | 109 | 阴香 | 85 |
| 走马天红 | 72 | 阴阳草 | 119 |
| 走马天风 | 110 | 阴菜规 | 175 |
| 岗稔 | 139 | 杜衡 | 88 |
| 岗梅 | 140 | 杜藤 | 13 |
| 岗梅根 | 140 | 杜盘头 | 70 |
| 岗梅树 | 140 | 驳节兰 | 19 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 驳节草 | 39 | 作作草 | 39 |
| 驳骨草 | 39 | 壳木魁 | 40 |
| 驳节花 | 39 | 牡荆叶 | 43 |
| 驳子草 | 81 | 佛耳草 | 101 |
| 豆腐藤 | 13 | 佛掌榕 | 44 |
| 豆豉姜 | 89 | 秀英藤 | 55 |
| 豆蔻草 | 128 | 利洛藤 | 73 |
| 豆叶千斤拔 | 29 | 园龙 | 73 |
| 冷饭藤 | 157 | 还魂草 | 83 |
| 冷饭包 | 157 | 何首乌 | 87 |
| 委尾草 | 158 | 伤寒草 | 93 |
| 委颈甫 | 170 | 忍冬藤 | 96 |
| 灵眉毛 | 145 | 声色草 | 116 |
| 疔草 | 156 | 应合树 | 119 |
| 角蚁草 | 70 | 均子 | 105 |
| 尾蝶藤 | 57 | 芍草 | 121 |
| 吸血仔 | 155 | 扶匀树心 | 125 |
| 吹筒树 | 19 | | |

八

画

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| 金花草 | 94 | 金花草 | 105 |
|-----|----|-----|-----|

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 金花草 | 183 | 金不换 | 188 |
| 金花菜 | 1 | 金不换 | 187 |
| 金花仔 | 155 | 金钱草 | 233 |
| 金边菊 | 1 | 金簪草 | 234 |
| 金牛草 | 28 | 金葫芦 | 290 |
| 金牛尾 | 28 | 金鸳鸯 | 4 |
| 金牛根 | 48 | 金钱花 | 98 |
| 金鸡爪 | 48 | 金桃叶 | 90 |
| 金樱子 | 92 | 金汤匙 | 1 |
| 金芙蓉 | 92 | 金线重楼 | 5 |
| 金沙藤 | 96 | 金盞银盞 | 93 |
| 金子草 | 97 | 金盞银盞 | 93 |
| 金丝草 | 94 | 金英拖西 | 95 |
| 金钱草 | 97 | 金蝉退壳 | 127 |
| 金银花 | 98 | 金顶龙牙 | 1 |
| 金龙棒 | 102 | 金钱落地环 | 97 |
| 金龙柄 | 102 | 金线吊芙蓉 | 103 |
| 金笑梅 | 103 | 金崑凤尾笔 | 52 |
| 金狗仔 | 124 | 青藤 | 181 |
| 金针菜 | 163 | 青藤 | 55 |
| 金麒麟 | 164 | 青药 | 105 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 青桐叶 | 143 | 狗屎干 | 130 |
| 青藤仔 | 65 | 狗屎豆 | 134 |
| 青蛇仔 | 102 | 狗屎泡 | 148 |
| 青薄荷 | 107 | 狗屎泡 | 152 |
| 青梅根 | 140 | 狗花椒 | 190 |
| 青梅叶 | 140 | 狗脚迹 | 175 |
| 青茶草 | 36 | 狗塔耳 | 101 |
| 青蛙藤 | 156 | 狗夹耳 | 101 |
| 青木香 | 181 | 狗头藤 | 13 |
| 青脚凤尾毛 | 52 | 狗头藤草 | 66 |
| 青脚鸡爪笔 | 52 | 虎包藤 | 13 |
| 狗肝 | 102 | 虎狼草 | 22 |
| 狗屎麻 | 7 | 虎耳草 | 103 |
| 狗屎藤 | 27 | 虎爬刺 | 152 |
| 狗牙草 | 31 | 虎唔刺 | 152 |
| 狗毛树 | 32 | 虎姆根 | 152 |
| 狗骨筋 | 69 | 虎姆蕈 | 152 |
| 狗贴耳 | 101 | 乳树 | 17 |
| 狗贴米 | 101 | 乳汁草 | 25 |
| 狗肝菜 | 102 | 乳仔草 | 25 |
| 狗官菜 | 102 | 虱母草 | 155 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 虱母头 | 175 | 夜牵牛 | 6 |
| 虱母球 | 175 | 夜牵牛 | 109 |
| 虱艇仔 | 93 | 夜交藤 | 87 |
| 坡草 | 13 | 夜交藤根 | 87 |
| 坡雪麻 | 7 | 盲更蔗 | 36 |
| 坡艾菜 | 72 | 盲肠草 | 93 |
| 坡鳩酸 | 173 | 刺刀根 | 6 |
| 两面针 | 6 | 刺苋菜 | 185 |
| 两边刀 | 6 | 刺倒树 | 190 |
| 两公根 | 142 | 刺倒叶 | 190 |
| 怕丑草 | 104 | 披地风 | 4 |
| 怕丑草 | 104 | 披翅凤 | 26 |
| 怕夫草 | 104 | 花舌草 | 68 |
| 怕羞草 | 104 | 花椒根 | 6 |
| 油麻甲 | 14 | 味酸草 | 173 |
| 油柑子 | 119 | 味酸仔 | 173 |
| 油甘草 | 119 | 泥藤 | 99 |
| 油香藤寄生 | 113 | 泥藤草 | 99 |
| 单边旗 | 60 | 泥秋草 | 99 |
| 单片芽 | 61 | 厝缸乌 | 102 |
| 单片莲 | 1 | 厝缸膏 | 102 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 芙蓉菊 | 58 | 狐狸尾 | 94 |
| 芙蓉花叶 | 41 | 扇风藤 | 180 |
| 含羞草 | 119 | 果合树 | 187 |
| 含羞草 | 104 | 果合仔 | 187 |
| 爬山虎 | 99 | 炉边麻 | 187 |
| 爬墙虎 | 100 | 周身松 | 187 |
| 阿婆针 | 93 | 芦荟 | 170 |
| 阿婆草 | 188 | 肥猪草 | 175 |
| 顶根草 | 9 | 奇筒拐 | 97 |
| 顶子草 | 81 | 知羞草 | 184 |
| 饭罗藤 | 100 | 呼喝草 | 184 |
| 饭团藤 | 157 | 使君子 | 185 |
| 芥茅 | 112 | 附子 | 188 |
| 苏白背 | 178 | 沿篱豆 | 116 |
| 莞荃 | 176 | 姆仔金 | 119 |
| 莞茜 | 176 | 拐仔草 | 121 |
| 杭角草 | 177 | 岭豆 | 134 |
| 柳核莲 | 126 | 枝子 | 151 |
| 枚母草 | 155 | 枝花头 | 6 |
| 步步高 | 109 | 拔叶 | 188 |
| 象子 | 178 | 拔子 | 188 |

| | |
|-------|----|
| 蕨兰根 | 23 |
| 直立千斤拔 | 29 |
| 罗裙带 | 50 |
| 罗网藤 | 96 |
| 除刺葵 | 73 |
| 香花 | 75 |

| | |
|------|----|
| 拉屎冬瓜 | 89 |
| 卷柏 | 83 |
| 芮草 | 87 |
| 来防草 | 91 |
| 空针草 | 93 |

九 画

| | |
|-----|-----|
| 红蓝 | 117 |
| 红蕨 | 145 |
| 红藤 | 160 |
| 红药根 | 29 |
| 红尾草 | 52 |
| 红白背 | 59 |
| 红背叶 | 72 |
| 红背灯 | 72 |
| 红背果 | 72 |
| 红背草 | 72 |
| 红背菜 | 72 |
| 红丝线 | 117 |
| 红蓝叶 | 117 |

| | |
|-----|-----|
| 红兰叶 | 117 |
| 红心郎 | 126 |
| 红花艾 | 133 |
| 红暗擦 | 133 |
| 红芙苏 | 145 |
| 红紫苏 | 145 |
| 红鸡谷 | 149 |
| 红冬筋 | 152 |
| 红辣蓼 | 171 |
| 红马蓼 | 171 |
| 红下叶 | 72 |
| 红胶墙 | 96 |
| 红珠草 | 96 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 紅木香 | 157 | 香葵 | 176 |
| 紅梅仔叶 | 36 | 香花草 | 12 |
| 紅背紫苑 | 72 | 香胶叶 | 85 |
| 紅猪母菜 | 66 | 香胶仔 | 85 |
| 紅背紫檀 | 72 | 香花菜 | 107 |
| 紅心牙郎 | 136 | 香头草 | 108 |
| 紅心柿舅 | 167 | 香附子 | 108 |
| 紅色竹菜 | 171 | 香叶子树 | 124 |
| 紅馬齿苋 | 66 | 苦壘 | 33 |
| 紅心扶勾烟 | 125 | 苦卡 | 33 |
| 紅花鸡屎藤 | 161 | 苦楝 | 120 |
| 紅珍珠草 | 119 | 苦草 | 184 |
| 紅骨猪母菜 | 66 | 苦晚公 | 22 |
| 紅花益母草 | 132 | 苦棘三 | 33 |
| 紅脚馬了繳 | 171 | 苦地胆 | 70 |
| 紅花馬了繳 | 171 | 苦地胆 | 186 |
| 香菊 | 58 | 苦灯笼 | 79 |
| 香桂 | 85 | 苦梅树 | 140 |
| 香附 | 108 | 苦梅根 | 140 |
| 香枫 | 186 | 苦胆草 | 184 |
| 香葵 | 148 | 苦竹茶 | 19 |

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 苦灯笼草 | 79 | 胡满福 | 22 |
| 苦赛黄连 | 125 | 胡蔓藤 | 22 |
| 苦节节花 | 186 | 胡绵根 | 172 |
| 咸虾花 | 141 | 胡椒刺 | 6 |
| 咸鱼草 | 170 | 扁豆 | 116 |
| 咸鱼菜 | 170 | 扁蓄 | 131 |
| 咸酸仔 | 173 | 扁竹 | 131 |
| 咸酸藤 | 173 | 席替草 | 25 |
| 咸酸草 | 173 | 扁枝榭寄生 | 185 |
| 咸酸甜 | 173 | 南星 | 49 |
| 咸酸鸡 | 173 | 南星 | 158 |
| 虾公脚 | 39 | 南洋茶 | 138 |
| 虾膜藤 | 52 | 南细辛 | 88 |
| 虾力眼 | 69 | 枸杞 | 114 |
| 虾钳草 | 93 | 枸杞根 | 114 |
| 虾膜藤 | 96 | 枸杞菜 | 114 |
| 虾钳菜 | 123 | 枸杞头 | 114 |
| 虾钳草 | 177 | 枸杞子 | 114 |
| 虾尾草 | 93 | 茅根 | 112 |
| 胡葵 | 176 | 茅草 | 112 |
| 胡蔓草 | 22 | 茅莓 | 112 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 茅根草 | 112 | 首乌藤 | 87 |
| 茅根须 | 112 | 毒鱼藤 | 144 |
| 茅根花 | 112 | 毒辣藤 | 45 |
| 点秤星 | 140 | 珍珠草 | 119 |
| 点秤树 | 140 | 珍珠菜 | 123 |
| 点秤木 | 140 | 姜黄 | 122 |
| 点秤盟 | 140 | 姜树 | 89 |
| 点星根 | 140 | 春甘藤 | 57 |
| 点杆树 | 140 | 春筋藤 | 172 |
| 点秤根 | 140 | 星艳草 | 72 |
| 重楼 | 5 | 星色草 | 116 |
| 重楼草 | 5 | 秋芙蓉 | 41 |
| 重楼金线 | 5 | 秋果叶 | 169 |
| 英仔草 | 155 | 虹树 | 125 |
| 英雄草 | 179 | 虹仔树 | 125 |
| 英雄树 | 38 | 顺风旗 | 61 |
| 厚皮楠 | 19 | 顺将草 | 31 |
| 厚香头 | 108 | 蚂拐爪 | 63 |
| 厚香草头 | 108 | 蚂蚁草 | 4 |
| 首乌 | 87 | 独脚球 | 110 |
| 黛红 | 87 | 独脚金 | 111 |

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 独脚乌柏 | 109 | 柯棉 | 99 |
| 独脚丝茅 | 112 | 树头猛 | 100 |
| 枯草花 | 129 | 面粉藤 | 109 |
| 枯锥饭 | 36 | 孩儿草 | 118 |
| 茉莉头 | 135 | 卑风蛇 | 119 |
| 菜菜藤 | 184 | 耐惊菜 | 123 |
| 贴墙笔 | 52 | 胜红菊 | 141 |
| 贴壁藤 | 100 | 活血藤 | 166 |
| 贴地枇杷 | 70 | 曾治藤 | 161 |
| 萍树 | 109 | 剃刀柄 | 176 |
| 段菊 | 110 | 架黄瓜 | 172 |
| 砂甘草 | 4 | 蚊古草 | 4 |
| 蛇仔仁 | 27 | 速篙仔 | 164 |
| 哈仔草 | 7 | 柿子椒 | 167 |
| 瓦瓦霖 | 33 | 柚树寄生 | 133 |
| 指甲花 | 47 | 纤弱木贼 | 39 |
| 姚婆枫 | 59 | 相公担屎桶 | 35 |
| 急解索 | 61 | 美丽崖豆藤 | 45 |
| 烂耳洋 | 72 | 盆上莞茜 | 121 |
| 纪未草 | 99 | 洋葡公英 | 174 |

十 画

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 乌韭 | 95 | 乌脚枪 | 164 |
| 乌药 | 124 | 乌脚塔 | 164 |
| 乌柏 | 125 | 乌骨箕 | 164 |
| 乌龙草 | 4 | 乌脚芒 | 154 |
| 乌蝇羽 | 4 | 乌枪箔 | 164 |
| 乌鸡爪 | 40 | 乌蝇翼 | 164 |
| 乌甘刺 | 69 | 乌豆草 | 4 |
| 乌耳草 | 81 | 乌墨草 | 91 |
| 乌肝石 | 87 | 乌目菜 | 91 |
| 乌皮糖 | 89 | 乌脚笔 | 52 |
| 乌墨菜 | 91 | 乌面草 | 162 |
| 乌柏木 | 125 | 乌面礼 | 162 |
| 乌柏树 | 125 | 乌饭藤 | 36 |
| 乌柏腹 | 125 | 乌鼠孔 | 162 |
| 乌柏根 | 125 | 乌记草 | 162 |
| 乌毛蕨 | 145 | 乌脚芦箕 | 164 |
| 乌龙根 | 163 | 乌脚骨箕 | 164 |
| 乌甲仔 | 163 | 乌蝇翼草 | 4 |
| 乌口尾 | 163 | 乌脚鸡爪笔 | 52 |

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 乌肉鸡屎藤 | 161 | 盐霜白 | 13 |
| 臭菜 | 101 | 盐公男 | 136 |
| 臭溜 | 101 | 盐霜树 | 136 |
| 臭草 | 75 | 盐普双 | 136 |
| 臭花 | 75 | 盐风柏 | 136 |
| 臭饭团 | 157 | 盐仔木 | 136 |
| 臭草仔 | 102 | 盐公柏 | 136 |
| 臭茉莉 | 136 | 盐糖叶 | 20 |
| 臭炉草 | 141 | 盐酸鸡仔 | 173 |
| 臭金凤 | 75 | 埔葵 | 43 |
| 臭花草 | 75 | 埔羌 | 43 |
| 臭屁藤 | 161 | 埔杞 | 70 |
| 臭鸡屎藤 | 161 | 埔盐 | 136 |
| 臭屎茉莉 | 136 | 埔大菜 | 70 |
| 臭屎茉莉头 | 136 | 倒吊藤 | 172 |
| 臭屎茉莉根 | 136 | 倒埋树 | 172 |
| 盐树 | 136 | 倒扣草 | 172 |
| 盐埭酸 | 173 | 倒刺草 | 172 |
| 盐酸鸡 | 173 | 倒钩草 | 128 |
| 盐菜规 | 176 | 倒梗草 | 128 |
| 盐霜柏 | 136 | 倒地金网 | 136 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 蚊仔 | 183 | 胶东只头 | 175 |
| 蚊衬 | 21 | 草头香 | 108 |
| 蚊艾 | 42 | 草尾济 | 108 |
| 蚊仔草 | 190 | 草豆蔻 | 128 |
| 蚊同树 | 19 | 草决明 | 134 |
| 蚊螫叶 | 43 | 草结蓬 | 134 |
| 凉草 | 51 | 草鞋底 | 70 |
| 凉丸 | 57 | 草鞋刺 | 6 |
| 凉藤 | 57 | 鬼域薯 | 109 |
| 凉粉果 | 100 | 鬼羽箭 | 133 |
| 凉藤仔 | 57 | 鬼桔仔 | 89 |
| 凉口茶 | 57 | 鬼力登 | 89 |
| 粉藤 | 21 | 鬼桔栗 | 89 |
| 粉藤 | 109 | 鬼甘藷 | 89 |
| 粉藤苗 | 109 | 鬼灯笼 | 79 |
| 粉藤头 | 109 | 鬼针草 | 83 |
| 粉藤旦 | 109 | 破布藤 | 21 |
| 粉藤薯 | 109 | 破铜钱 | 121 |
| 胶东仔 | 175 | 破皮芋 | 17 |
| 胶墙菜 | 68 | 破布叶 | 65 |
| 胶狗只 | 29 | 破布树 | 65 |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 桂木 | 85 | 夏枯球 | 129 |
| 桂秧 | 85 | 海风藤 | 157 |
| 桂花草 | 121 | 海金沙 | 96 |
| 桂木干 | 130 | 桃金英 | 174 |
| 秤锤藤 | 156 | 桃金娘 | 139 |
| 秤星树 | 140 | 笔塔盐 | 39 |
| 秤星根 | 140 | 笔塔草 | 39 |
| 秤星木 | 140 | 笔修草 | 94 |
| 珠子草 | 188 | 射干 | 131 |
| 珠子草 | 119 | 射干苗 | 131 |
| 酒饼草 | 70 | 射香草 | 51 |
| 酒饼藤 | 62 | 益母草 | 132 |
| 酒饼藤 | 69 | 益母艾 | 132 |
| 酒饭团根 | 157 | 疔积草 | 34 |
| 酒饼山橘叶 | 20 | 疔积草 | 111 |
| 连头草 | 108 | 穿心莲 | 126 |
| 连篱子 | 184 | 穿破石 | 127 |
| 连地毡 | 71 | 荆芥 | 12 |
| 留球子 | 105 | 荆芥 | 51 |
| 留兰香 | 107 | 牵牛刺 | 6 |
| 夏枯草 | 129 | 鹧足 | 69 |

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 熊麻 | 46 | 涂藤头 | 13 |
| 饼草 | 61 | 蛛蝶藤 | 67 |
| 浪基 | 62 | 流篱网 | 184 |
| 蚕休 | 5 | 秧居草 | 164 |
| 恶家婆 | 6 | 狼眼 | 166 |
| 积雪草 | 142 | 涩仔叶 | 167 |
| 茶拘舌 | 138 | 斑吊藤 | 172 |
| 桐 | 143 | 荏 | 146 |
| 羌厨 | 132 | 真紫苏 | 148 |
| 浮石斜 | 63 | 称蛇子 | 157 |
| 唐嬰物 | 92 | 染布根 | 163 |
| 赶狗樟 | 89 | 骨浪窠草 | 164 |
| 娘伞树 | 48 | 赤缸仔草 | 72 |
| 消山虎 | 7 | 葛当树寄生 | 113 |
| 钉地根 | 28 | 高脚雄鸡尾 | 52 |
| 哩囉刺 | 55 | | |

十一画

| | | | |
|---|-----|-----|----|
| 艾 | 42 | 细竹叶 | 54 |
| 金 | 38 | 细飞扬 | 25 |
| 沙 | 107 | 细金草 | 28 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 细竹草 | 180 | 细金不换草 | 26 |
| 细种鸭脚 | 182 | 细种老公根 | 121 |
| 细叶芙蓉 | 58 | 细种银蚕茶 | 121 |
| 细叶红背叶 | 72 | 细种雷公根 | 121 |
| 细叶凤尾草 | 95 | 细种蛇泡勒 | 152 |
| 细叶钱蕾口 | 121 | 假 柏 | 95 |
| 细叶飞扬草 | 25 | 假 菊 | 109 |
| 细叶金不换 | 26 | 假 苋 | 185 |
| 细叶鲫鱼草 | 34 | 假芥兰 | 72 |
| 细叶凤尾草 | 52 | 假桂枝 | 85 |
| 细叶半边莲 | 61 | 假玉桂 | 85 |
| 细叶七星剑 | 147 | 假蛙藤 | 95 |
| 细叶黄花母 | 155 | 假银花 | 95 |
| 细叶龙鳞草 | 162 | 假番薯 | 109 |
| 细叶益钩酸 | 173 | 假油柑 | 119 |
| 细叶鸭脚麻 | 182 | 假芫茜 | 121 |
| 细叶亚婆湖 | 186 | 假荔枝 | 121 |
| 细叶龙胆草 | 186 | 假花生 | 134 |
| 细叶羊胆草 | 186 | 假绿豆 | 134 |
| 细叶婆蒿 | 186 | 假鱼香 | 12 |
| 细叶鲫鱼草 | 186 | 假芝麻 | 14 |

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 假油麻 | 14 | 野 苏 | 16 |
| 假葡萄 | 21 | 野 艾 | 132 |
| 假茉莉 | 33 | 野 葛 | 22 |
| 假杨梅 | 36 | 野桂树 | 85 |
| 假茉莉 | 56 | 野辣椒 | 102 |
| 假布渣 | 65 | 野圆莢 | 121 |
| 假公英 | 70 | 野麻甲 | 14 |
| 假青梅 | 140 | 野紫苏 | 16 |
| 假金瓜 | 167 | 野葡萄 | 21 |
| 假番瓜 | 167 | 野蓬草 | 60 |
| 假塔花 | 168 | 野牡丹 | 138 |
| 假茶仔 | 183 | 野扁豆 | 145 |
| 假苋菜 | 185 | 野香薷 | 147 |
| 假地豆 | 97 | 野南瓜 | 167 |
| 假青麻 | 132 | 野菊花 | 168 |
| 假柚甘 | 41 | 野黄菊 | 168 |
| 假槐仔 | 183 | 野蕺苳 | 168 |
| 假白番薯 | 109 | 野牵牛 | 168 |
| 假夏枯草 | 132 | 野甜菜 | 168 |
| 野 苋 | 165 | 野玉桂树 | 168 |
| 野 艾 | 165 | 野白纸扇 | 168 |

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 野苣荬子藤 | 21 | 蛇 草 | 85 |
| 猪椴麻 | 73 | 蛇针草 | 126 |
| 猪肚筋 | 127 | 蛇屎草 | 61 |
| 猪尿林 | 134 | 蛇舌草 | 61 |
| 猪尿豆 | 134 | 蛇泡勒 | 152 |
| 猪笼草 | 137 | 蛇拍仔 | 173 |
| 猪糠藤 | 13 | 蛇竹草 | 180 |
| 猪脚猫 | 28 | 蛇竹菜 | 180 |
| 猪脰怕 | 33 | 猪 药 | 124 |
| 猪母茶 | 46 | 猪 沙 | 188 |
| 猪奶树 | 46 | 猪尾草 | 84 |
| 猪母菜 | 66 | 猪毛草 | 84 |
| 猪肥菜 | 66 | 猪支筋 | 6 |
| 猪仔笼 | 137 | 猪屎草 | 141 |
| 猪脰衫 | 138 | 鱼 翅 | 121 |
| 猪腰草 | 162 | 鱼 藤 | 144 |
| 猪母带 | 175 | 鱼腥草 | 101 |
| 猪姆耳 | 101 | 鱼鳞草 | 102 |
| 猪母耳 | 101 | 鱼鲜菜 | 123 |
| 猪母酸 | 66 | 鱼骨草 | 84 |
| 猪肝菜 | 102 | 鱼鳞菜 | 86 |

| | | | |
|------|-----|------|-----|
| 鱼鳞草 | 121 | 崩口碗 | 142 |
| 鱼擦子草 | 121 | 翠月藤 | 98 |
| 紫 檀 | 72 | 望仔藤 | 60 |
| 紫 苏 | 148 | 望江南 | 146 |
| 紫苏树 | 148 | 望江南子 | 146 |
| 紫背草 | 72 | 梧 桐 | 143 |
| 紫背菜 | 72 | 梧桐根 | 143 |
| 紫花地丁 | 30 | 梧桐子 | 143 |
| 紫花地丁 | 158 | 曼头树 | 167 |
| 紫金皮 | 157 | 曼头罗 | 167 |
| 甜 菜 | 13 | 曼陀罗 | 168 |
| 甜 茶 | 57 | 贯 众 | 145 |
| 甜 橙 | 20 | 贯 仲 | 145 |
| 甜甘草 | 13 | 荷卜草 | 79 |
| 甜糖水 | 20 | 荷斑药 | 22 |
| 甜糖子 | 20 | 荷卜仔草 | 79 |
| 甜白碎玉 | 13 | 猛兜头 | 93 |
| 崩口碗 | 121 | 猛古藤 | 96 |
| 崩补叶 | 65 | 槟榔地 | 106 |
| 崩砂药 | 138 | 槟白树 | 125 |
| 崩大碗 | 142 | 梅 梗 | 140 |

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 梅皮草 | 166 | 暖膝羔 | 155 |
| 雀头香 | 108 | 蚶壳菜 | 102 |
| 雀舌草 | 68 | 蚶壳草 | 142 |
| 乌葡萄 | 21 | 斩蛇剑 | 126 |
| 乌葡萄 | 21 | 雷公豆 | 184 |
| 刺 薇 | 152 | 梨根青 | 102 |
| 刺 苋 | 185 | 莎 草 | 108 |
| 刺 皮 | 152 | 婆婆针 | 99 |
| 刺莓梅 | 162 | 软骨红背叶 | 72 |
| 清凉羔 | 41 | 匙羹菜 | 72 |
| 清半蕨 | 145 | 断肠草 | 22 |
| 淡 竹 | 149 | 许 树 | 33 |
| 淡竹叶 | 149 | 毫卡菜 | 34 |
| 接骨草 | 90 | 粗叶榕 | 44 |
| 接骨藤 | 109 | 楠牙郎 | 136 |
| 麻米勒 | 190 | 救必应 | 159 |
| 麻大罗 | 168 | 梔 子 | 151 |
| 麻梗蔗 | 36 | 通性草 | 154 |
| 砵砂根 | 48 | 透地连珠 | 157 |
| 砵兰叶 | 50 | 剪刀菜 | 158 |
| 攀藤羔 | 189 | 探 花 | 172 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 淋磨乙 | 183 | 菝 薊 | 152 |
| 球子草 | 188 | | |

十二画

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 黄 茅 | 112 | 黄枝子 | 151 |
| 黄 姜 | 122 | 黄菓子 | 151 |
| 黄 梔 | 151 | 黄菓仔 | 151 |
| 黄 菊 | 159 | 黄牛泡 | 152 |
| 黄 枝 | 151 | 黄花菜 | 153 |
| 黄花蚊 | 1 | 黄仙竹 | 154 |
| 黄花气 | 68 | 黄花母 | 155 |
| 黄花菜 | 68 | 黄花萌 | 155 |
| 黄花猛 | 93 | 黄花仔 | 155 |
| 黄毛草 | 94 | 黄花稔 | 155 |
| 黄花甘 | 111 | 黄花猛 | 155 |
| 黄茅根 | 112 | 黄牛藤 | 157 |
| 黄茅草 | 112 | 黄蚀草 | 162 |
| 黄蜂草 | 118 | 黄头草 | 162 |
| 黄蛇根 | 127 | 黄仔瓶 | 162 |
| 黄牛角 | 127 | 黄超板 | 170 |
| 黄田鸡 | 127 | 黄花仔 | 170 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 黄花草 | 88 | 黑骨芒 | 60 |
| 黄荆子叶 | 43 | 黑墨草 | 91 |
| 黄瓜仁草 | 154 | 黑骨草 | 133 |
| 黄花棉子 | 155 | 黑鬼草 | 133 |
| 黄葛酸草 | 173 | 黑狗脊 | 145 |
| 黄芩地丁 | 174 | 黑面先锋 | 13 |
| 黄花虱母头 | 155 | 黑骨浪箕 | 164 |
| 黄花老虎尿 | 1 | 黑骨芒箕 | 164 |
| 黑枝 | 151 | 黑骨全串草 | 164 |
| 黑草 | 91 | 黑叶水翁树 | 35 |
| 黑老虎 | 157 | 痢疾草 | 25 |
| 黑脚芒 | 164 | 痢子草 | 25 |
| 黑脚蕨 | 164 | 蛤仔头 | 70 |
| 黑骨望 | 164 | 蛤仔草 | 70 |
| 黑脚差 | 164 | 蛤拐帽 | 142 |
| 黑骨仔 | 164 | 蛤蜊王 | 164 |
| 黑骨草 | 164 | 蛤蜊草 | 166 |
| 黑线蕨 | 164 | 蛤蜊藤 | 156 |
| 黑骨芒 | 164 | 蛤蜊藤 | 160 |
| 黑心草 | 186 | 蛤婆草 | 86 |
| 黑心姜 | 10 | 蛤仔藤 | 156 |

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 猴子果 | 18 | 椽柚寄 | 113 |
| 猴子草 | 110 | 椽柚寄生 | 113 |
| 猴子抱膝 | 110 | 褚 树 | 82 |
| 丝 茅 | 112 | 褚实子树 | 82 |
| 丝茅草 | 112 | 画眉勒 | 190 |
| 丝线吊芙蓉 | 103 | 画眉架 | 190 |
| 犁腿叶 | 156 | 斑鸠饭 | 156 |
| 犁腿草 | 156 | 斑骨相思 | 11 |
| 犁头草 | 158 | 搭壁竹 | 94 |
| 犁头菜 | 158 | 搭壁藤 | 190 |
| 犁咀菜 | 158 | 糊孙拳 | 157 |
| 犁口草 | 158 | 糊孙饭团 | 157 |
| 犁壁竹 | 94 | 粪箕笃 | 156 |
| 犁头藤 | 156 | 粪箕笃 | 156 |
| 番石榴 | 159 | 短 樟 | 124 |
| 番桃木 | 159 | 短地毡 | 71 |
| 番稔叶 | 159 | 短龙糠 | 188 |
| 番瓜子 | 167 | 硬骨青 | 56 |
| 番石榴叶 | 159 | 硬叶吊兰 | 78 |
| 朝阳草 | 22 | 硬枝枚肉草 | 156 |
| 朝盘差 | 119 | 钩 吻 | 22 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 络 树 | 48 | 姪子藤 | 156 |
| 散血丹 | 48 | 遍地锦 | 121 |
| 谢三娘 | 55 | 森 树 | 120 |
| 渣布叶 | 65 | 埠 盐 | 136 |
| 喝夫草 | 104 | 藜 耳 | 175 |
| 酢浆草 | 173 | 菊 葱 | 190 |
| 残飞坠 | 174 | 毕澄茄根 | 89 |

十 三 画

| | | | |
|-----|-----|-------|-----|
| 鸡 头 | 138 | 鸡骨草 | 162 |
| 鸡爪莲 | 5 | 鸡毛草 | 164 |
| 鸡胡椒 | 6 | 鸡碎木 | 180 |
| 鸡仔麻 | 7 | 鸡嘴木 | 190 |
| 鸡仔艾 | 42 | 鸡蕊树 | 190 |
| 鸡爪蕨 | 52 | 鸡吸木 | 190 |
| 鸡骨香 | 68 | 鸡吸鼻 | 128 |
| 鸡骨露 | 95 | 鸡醉树寄生 | 113 |
| 鸡眼藤 | 98 | 铁戍草 | 4 |
| 鸡屎果 | 159 | 铁树仔 | 155 |
| 鸡血藤 | 160 | 铁包金 | 163 |
| 鸡屎藤 | 161 | 铁线草 | 164 |

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 铁线网 | 164 | 葱 叶 | 106 |
| 铁骨仔 | 164 | 葱 青 | 106 |
| 铁芦箕 | 164 | 葱 薹 | 62 |
| 铁芦根 | 164 | 路路通 | 166 |
| 铁骨草 | 164 | 路边菊 | 169 |
| 铁鲁基 | 164 | 路边清 | 33 |
| 铁画亭 | 121 | 路边青 | 102 |
| 铁丝草 | 96 | 路路通寄生 | 165 |
| 铁线莲 | 60 | 杨 桃 | 8 |
| 铁路茶 | 95 | 杨 了 | 37 |
| 铁线蕨 | 98 | 杨梅吊 | 136 |
| 铁马鞭 | 81 | 杨档树 | 190 |
| 铁脚鲁笑 | 184 | 葫芦草 | 46 |
| 枫 香 | 166 | 葫芦茶 | 170 |
| 枫 树 | 166 | 葫芦叶 | 170 |
| 枫 果 | 166 | 葫芦板 | 170 |
| 枫球子 | 166 | 雉鸡尾 | 62 |
| 枫香树 | 166 | 雉鸡尾 | 95 |
| 枫香脂 | 166 | 雉鸡尾 | 145 |
| 枫树球 | 166 | 雉母黄 | 190 |
| 枫香寄生 | 165 | 雷公異 | 60 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 雷公人 | 60 | 蜆壳菜 | 65 |
| 雷公头 | 108 | 感暑草 | 93 |
| 雷公青 | 134 | 感冒草 | 177 |
| 雷公根 | 142 | 痴头婆 | 175 |
| 雷公藤蹄 | 144 | 痴头娃 | 175 |
| 落地螞蚱 | 48 | 闹洋花 | 168 |
| 落地金钱 | 97 | 闹羊花 | 168 |
| 落地金牛 | 6 | 钻骨风 | 157 |
| 矮苓 | 125 | 钻地风 | 157 |
| 矮脚地毡 | 71 | 鼠乳根 | 163 |
| 矮樟 | 69 | 鼠啤根 | 163 |
| 矮蓼 | 171 | 椴 | 126 |
| 矮蓼草 | 171 | 蕹菜 | 101 |
| 狮尾草 | 167 | 葵叶 | 106 |
| 狮子毡 | 167 | 葡萄 | 21 |
| 狮子滚球 | 167 | 新杨桃 | 8 |
| 蒲公英 | 174 | 暗山公 | 19 |
| 蒲芦茶 | 170 | 药丸草 | 70 |
| 蒲芦草 | 170 | 团扇岭 | 97 |
| 蒲虫草 | 170 | 蛾眉豆 | 116 |
| 蜆肉菜 | 66 | 蜂窠草 | 132 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 稔子根 | 139 | 柑酸果 | 172 |
| 寬筋藤 | 172 | 絞剪草 | 186 |

十四画

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 酸藤 | 21 | 满天星草 | 116 |
| 酸菜 | 66 | 银花 | 98 |
| 酸草 | 173 | 银花藤 | 98 |
| 酸三稔 | 8 | 算盘子 | 167 |
| 酸甜菜 | 66 | 算盘树 | 167 |
| 酸味草 | 173 | 蓼马叶 | 156 |
| 酸甜草 | 173 | 蓼马藤 | 156 |
| 苍耳 | 175 | 蓼马草 | 156 |
| 苍耳子 | 175 | 铜鼓钟 | 81 |
| 苍耳草 | 175 | 铜钱草 | 97 |
| 苍蝇翼 | 4 | 翠云草 | 62 |
| 苍子树 | 89 | 馒头萝 | 100 |
| 桐山香 | 89 | 绿苕荷 | 107 |
| 桐山李 | 89 | 解巢蛇 | 109 |
| 满天星 | 121 | 莢蓬菜 | 142 |
| 满天星 | 121 | 碰歪草 | 177 |
| 满天星 | 121 | 蜻蜓翅 | 188 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 瓦 蓼 | 170 | 枸 树 | 82 |
| 蕞 草 | 163 | 熊胆 | 186 |
| 管 仲 | 145 | 熊胆树皮 | 150 |
| 荆 藿 | 90 | 猛犸寄生 | 165 |

十五画

| | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| 墨 菜 | 34 | 铺地藤 | 71 |
| 墨 菜 | 91 | 练总草 | 46 |
| 墨 草 | 91 | 练汁公 | 46 |
| 墨汁旱莲草 | 91 | 箭 猛 | 93 |
| 铺地锦 | 4 | 莲子草 | 123 |
| 铺地金 | 119 | 樟贵树 | 125 |
| 铺地锦 | 121 | 横枝树 | 151 |
| 蝴蝶藤 | 57 | 蚕麻头 | 175 |
| 蝴蝶草 | 86 | 蔓荆子 | 178 |
| 斜挂树 | 124 | 察刁竹 | 179 |
| 剑板茶 | 170 | 鼎盖草 | 142 |
| 剑叶凤尾草 | 52 | 鞋底刺 | 6 |
| 带地锦 | 121 | 醉酒芙蓉 | 41 |
| 铺地锦 | 71 | 瘤果槲寄生 | 113 |
| 铺地毡 | 71 | 横梗席 | 36 |

十六画

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 磨地胆 | 70 | 钱贯草 | 88 |
| 磨地稔 | 71 | 钱串草 | 88 |
| 磨盘草 | 183 | 钱线草 | 96 |
| 磨盆草 | 183 | 钱箔菜 | 121 |
| 磨谷子 | 183 | 钱苗草 | 121 |
| 磨龙子 | 183 | 钱苗口 | 142 |
| 磨仔树 | 183 | 钱三草 | 121 |
| 磨谷腹 | 183 | 钱牌草 | 184 |
| 磨盆根 | 183 | 糖果子 | 92 |
| 磨枱草 | 183 | 糖瓜树 | 107 |
| 磨牙草 | 183 | 筒 栏 | 184 |
| 磨仔草 | 183 | 筒兰网 | 184 |
| 鸭篦子 | 40 | 筒下青 | 102 |
| 鸭掌枫 | 146 | 筒香薷 | 141 |
| 鸭跖草 | 180 | 塘头竹 | 94 |
| 鸭舌草 | 181 | 蕺 菜 | 101 |
| 鸭翅掌 | 182 | 桐榔草 | 174 |
| 鸭脚树 | 182 | 箔壳米仁草 | 155 |
| 鸭脚木皮 | 182 | | |

十七画

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 药 羊 | 37 | 婆婆充 | 119 |
| 药苋菜 | 186 | 踏不死 | 86 |
| 药槐树 | 190 | 鲑鱼草 | 170 |
| 薯莨头 | 17 | 蟋蟀草 | 4 |
| 锅 铲 | 97 | 蟑螂菜 | 101 |
| 膨皮豆 | 110 | | |

十八画

| | | | |
|------|-----|-------|-----|
| 鲫鱼胆 | 13 | 鹅仔辣 | 188 |
| 鲫鱼胆 | 34 | 鹅喉香 | 188 |
| 鲫鱼胆 | 124 | 鹅不食草 | 188 |
| 鲫鱼胆 | 186 | 鹅不食草 | 121 |
| 鲫鱼草 | 186 | 鹅仔不食草 | 188 |
| 鲫鱼胆草 | 186 | 鹅仔唔食草 | 188 |
| 鹅掌枫 | 69 | 豇 豆 | 116 |
| 鹅仔草 | 121 | 豇豆花 | 116 |
| 鹅仔草 | 188 | 蟹钳草 | 93 |
| 鹅仔菜 | 188 | 蟹钳草 | 123 |
| 鹅仔香 | 188 | 蟹爪寄生 | 165 |

| | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 韩信草 | 187 | 镰刀药 | 117 |
| 藤脾草 | 142 | 翻白叶树 | 59 |
| 鸢尾酸 | 173 | | |

十九画

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 鸢豆 | 116 | 雾水葛 | 189 |
| 鸢糖梅 | 36 | 鸢殿树 | 124 |
| 雾水沙 | 188 | | |

二十画

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 糯米藤 | 13 | 爆仗草 | 112 |
| 藜艾 | 58 | 藜田蔗 | 152 |
| 樟桐 | 143 | | |

二十一画

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 霸王鞭 | 37 | 鸢老麻 | 24 |
| 霸王高 | 179 | | |

二十二

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| 管子草 | 81 | 鸢盐酸 | 173 |
|-----|----|-----|-----|

二十三

藜头芒 175

二十四

128 128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

128 128 188 128 190

学名索引

A

- | | |
|---|-----|
| <i>Abrus cantoniensis</i> Hance. 鸡骨草 | 162 |
| <i>Abutilon indicum</i> (L.) G. Don. 磨盘草 | 163 |
| <i>Achyranthes aspera</i> Linn. 倒扣草 | 128 |
| <i>Adenosma glutinosum</i> (L.) Druce. 毛麝香 | 61 |
| <i>Adiantum flabellulatum</i> Linn. 铁线草 | 164 |
| <i>Ageratum conyzoides</i> Linn. 猫屎草 | 141 |
| <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. 仙鹤草 | 87 |
| <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. 虾钳菜 | 123 |
| <i>Andrographis paniculata</i> Ness. 穿心莲 | 126 |
| <i>Ardisia crenata</i> Sims. 凤凰肠 | 48 |
| <i>Argyreia acuta</i> Lour. 白鹤藤 | 53 |
| <i>Arisaema petiophyllum</i> Bl. 天南星 | 49 |
| <i>Artemisia vulgaris</i> Linn. 五月艾 | 42 |
| <i>Artocarpus lingnanensis</i> Merr. 桂木干 | 130 |
| <i>Atalantia buxifolia</i> (Poir.) Oliv. 东风桔 | 69 |
| <i>Averrhoa carambola</i> Linn. 三棱 | 8 |
| <i>Asarum forbesii</i> Maxim. 杜衡 | 88 |

B

| | |
|---|-----|
| <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. | |
| O. Ktze. 大青 | 23 |
| <i>Bauhinia championi</i> Benth. 过岗龙 | 73 |
| <i>Belamcanda chinensis</i> (Linn.) DC. 射干 | 131 |
| <i>Berchemia lineata</i> DC. 铁包金 | 163 |
| <i>Bidens biternata</i> (Lour) Merr et Sherif | |
| 金盏银盘 | 93 |
| <i>Bidens pilosa</i> Linn. 金盏银盘 | 93 |
| <i>Blechnum orientale</i> Linn. 贯众 | 145 |
| <i>Stemona balsamifera</i> (L.) DC. 大风艾 | 24 |
| <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent. 谷木 | 82 |
| <i>Brunella vulgaris</i> Linn. 夏枯草 | 129 |
| <i>Buchnera cruciata</i> Ham. 鬼羽箭 | 133 |

C

| | |
|--|-----|
| <i>Caryopteris incana</i> Miq. 独脚球 | 110 |
| <i>Cassia tora</i> Linn. 草决明 | 134 |
| <i>Cassia occidentalis</i> Linn. 矮江南 | 146 |
| <i>Cestella asiatica</i> (L.) Urban. 崩大碗 | 142 |

| | |
|--|----------|
| <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et. Aschers. | |
| 鹅不食草 | 188 |
| <i>Cephalanthus occidentalis</i> Linn. | 水杨梅 32 |
| <i>Chrysanthemum indicum</i> Linn. | 路边菊 109 |
| <i>Cinnamomum burmanni</i> Bl. | 阴香 85 |
| <i>Cleistanthus operculatus</i> (Roxb) Merr & | |
| Perry. 水翁花 | 35 |
| <i>Clerodendrum fragrans</i> Vent. | 臭屎茉莉 135 |
| <i>Clerodendrum inerme</i> Gaertn. | 小水胡蔓 33 |
| <i>Codonopsis lanceolata</i> Benth et Hook. | |
| 山海螺 | 17 |
| <i>Commelina communis</i> Linn. | 鸭跖草 189 |
| <i>Conium maculatum</i> Linn. | 莨菪 176 |
| <i>Conium maculatum</i> L. Var. <i>Sticticum</i> | |
| Baker. 文殊兰 | 50 |
| <i>Crossostephium chinense</i> (L.) Mak. ex | |
| Cham & Schlecht. | 玉叶芙蓉 58 |
| <i>Croton lachnocarpus</i> Benth. | 小叶双眼龙 27 |
| <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour) Kudo, | |
| et Masam. | 穿破石 127 |
| <i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bureau. | 穿破石 127 |

| | |
|---|-----|
| <i>Curcuma longa</i> Linn. 姜黄 | 122 |
| <i>Curcuma zedoaria</i> Rosc. 土三七 | 10 |
| <i>Cymbidium pendulum</i> (Rorb) SW. 吊兰 | 78 |
| <i>Cyperus rotundus</i> Linn. 香附 | 108 |

D

| | |
|--|-----|
| <i>Datura metel</i> Linn. 闹羊花 | 168 |
| <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr. 金钱草 | 97 |

| | |
|---|-----|
| <i>Deliptera chinensis</i> (Vahl) Nees. 狗肝菜 | 102 |
| <i>Dolichos lablab</i> Linn. 扁豆 | 116 |

E

| | |
|--|----|
| <i>Eclipta alba</i> (Linn.) Hassk. 旱莲草 | 91 |
| <i>Elephantopus scaber</i> Linn. 地胆头 | 70 |
| <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. 羊蹄草 | 72 |
| <i>Eriocaulon wallichianum</i> Mart. 谷精草 | 81 |
| <i>Eupatorium chinensis</i> Linn. 土牛七 | 11 |
| <i>Euphorbia antiquorum</i> Linn. 火秧药 | 87 |
| <i>Euphorbia thymifolia</i> Linn. 小飞扬草 | 25 |

F

| | |
|---|-----|
| <i>Ficus simplicissima</i> Lour. Var. <i>hirta</i> Migo | |
| 五爪龙 | 44 |
| <i>Ficus hispida</i> Linn f. 牛奶树 | 46 |
| <i>Ficus pumila</i> Linn. 爬墙虎 | 100 |
| <i>Firmiana simplex</i> (L.) Wight. 栝桐 | 143 |

G

| | |
|---|-----|
| <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis. 梔子 | 151 |
| <i>Gelsemium elegans</i> Benth. 大茶药 | 22 |
| <i>Gentiana loureiri</i> Griseb. 广地丁 | 30 |
| <i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch. 狮子滚球 | 167 |
| <i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr. 木棉树 | 38 |
| <i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl. 山桔叶 | 6 |

H

| | |
|--|-----|
| <i>Helicteres angustifolia</i> Linn. 山芝麻 | 14 |
| <i>Hemerocallis fulva</i> Linn. 黄花菜 | 159 |
| <i>Hibiscus mutabilis</i> Linn. 木芙蓉 | 41 |
| <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 狗贴耳 | 101 |

| | | |
|---|------|-----|
| <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> , Lam | 盆上莞茜 | 121 |
| <i>Hygrophila salicifolia</i> (Vahl.) Nees. | 水蓑衣 | 34 |
| <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. | 田基黄 | 88 |
| <i>Hypoestes purpurea</i> (L.) Soland. | 红丝线 | 117 |

I

| | | |
|--|-----|-----|
| <i>Ilex asprella</i> Champ. | 岗梅根 | 140 |
| <i>Ilex rotunda</i> Thunb. | 救必应 | 150 |
| <i>Impatiens balsamina</i> Linn. | 凤仙花 | 47 |
| <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. | 茅根 | 112 |
| <i>Inula cappa</i> DCJ. | 山白芷 | 46 |

J

| | | |
|--|------|----|
| <i>Jasminum amplexicaule</i> Buch-Ham. | 白花茉莉 | 55 |
|--|------|----|

K

| | | |
|--|-----|-----|
| <i>Kadsura coccinea</i> (Lem) A. C. Smith. | 黑老虎 | 167 |
| <i>Kadsura longepedunculata</i> Finet et Gagnep. | 风沙藤 | 167 |
| <i>Kadsura heteroclita</i> Roxb Craib. | 海风藤 | 167 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| <i>Kaempferia galanga</i> Linn. 砂姜 | 84 |
| <i>Kyllinga brevifolia</i> Roth. 三稜草 | 89 |

L

| | |
|--|-----|
| <i>Lantana camara</i> Linn. 如意草 | 75 |
| <i>Leonurus sibiricus</i> Linn. 益母草 | 132 |
| <i>Lindera strychnifolia</i> F. Vahl. 烏药 | 124 |
| <i>Liquidambar formosana</i> Hance 枫香 | 168 |
| <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Persoon. 豆蔻姜 | 89 |
| <i>Lobelia chinensis</i> Lour. 半边莲 | 61 |
| <i>Lonicera confusa</i> DC. 金银花 | 98 |
| <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. 淡竹叶 | 149 |
| <i>Lycium chinense</i> Mill. 枸杞根 | 114 |
| <i>Lycopodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 金砂藤 | 96 |

M

| | |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Melastoma dodecandrum</i> Lour. 地稔 | 71 |
| <i>Melastoma sanguineum</i> Sims. 猪鬃捻 | 138 |
| <i>Melastoma azedarach</i> Linn. 苦楝 | 120 |
| <i>Melothria indica</i> Lour. 老鼠拉冬瓜 | 80 |
| <i>Melodinus suaveolens</i> Champ. 山橙 | 18 |

| | |
|---|-----|
| <i>Mentha viridis</i> Linn. 香花菜 | 107 |
| <i>Merremia hederacea</i> (Burm) Hall. F. 篱栏 | 184 |
| <i>Michelia alba</i> DC. 白玉兰 | 64 |
| <i>Micrdocos paniculata</i> Linn. 布渣叶 | 65 |
| <i>Millettia speciosa</i> Champ. 牛大力 | 45 |
| <i>Millettia lastopetala</i> (Hay) Merr. 鱼藤 | 144 |
| <i>Millettia reticulata</i> Benth. 鸡血藤 | 160 |
| <i>Mimosa pudica</i> Linn. 知羞草 | 109 |
| <i>Moghania prostrata</i> (Roxb) Wang et Tang. 千斤拔 | 28 |
| <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng. 木鳖子 | 40 |
| <i>Monochordia vaginalis</i> Presl. 鸭舌草 | 101 |
| <i>Morinda parvifolia</i> Bartl. 爬山虎 | 90 |
| <i>Moghania macrophylla</i> (Willd.) O. Ktze. 千金红 | 28 |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack. 九里香 | 3 |
| <i>Mussaenda pubescens</i> Ait. E. 玉叶金花 | 65 |

N

| | |
|---|-----|
| <i>Nepenthes mirabilis</i> (Lour.) Draca. 猪笼草 | 104 |
|---|-----|

○

| | |
|---|-----|
| <i>Orthodon lorati</i> Maxim. 细叶七星剑 | 147 |
| <i>Oldenlandia auricularis</i> (L.) F-Mueffler. | |
| 鲫鱼草 | 186 |
| <i>Oldenlandia hedyotidea</i> (DC) | |
| Hand-Mazz, 土加藤 | 13 |
| <i>Orthodon lanceolatum</i> (Benth) Kudo | |
| 土荆芥 | 12 |
| <i>Physalis repens</i> Thunb. 酸味草 | 173 |

P

| | |
|---|-----|
| <i>Paspalum scandens</i> (Lour) Merr. 鸡屎藤 | 164 |
| <i>Paspalum polyphyllum</i> Sm. 七叶一枝花 | 6 |
| <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 山紫苏 | 18 |
| <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. | |
| Crispa Deene. 紫苏 | 148 |
| <i>Pholidota chinensis</i> Lindl. 石仙桃 | 63 |
| <i>Phyllanthus urinaria</i> Linn. 珍珠草 | 119 |
| <i>Physalis peruviana</i> Linn. 灯笼草 | 79 |
| <i>Piper hancei</i> Maxim. 石楠藤 | 82 |

| | |
|--|-----|
| <i>Piper betle</i> Linn. 青蒿 | 100 |
| <i>Plantago major</i> Linn. 车前草 | 86 |
| <i>Plumbago zeylanica</i> Linn. 白花丹 | 59 |
| <i>Polycarpha corymbosa</i> Lam. 星色草 | 115 |
| <i>Polygala japonica</i> Houtt. 黄瓜仁草 | 154 |
| <i>Polygonum hydropiper</i> Linn. 辣蓼 | 171 |
| <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 何首乌 | 87 |
| <i>Polygala telephioides</i> Willd. 小金牛草 | 28 |
| <i>Polygonum chinense</i> Linn. 火炭母 | 33 |
| <i>Portulaca oleracea</i> Linn. 瓜子菜 | 65 |
| <i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth. | |
| 金丝草 | 94 |
| <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benth. 雾水葛 | 139 |
| <i>Paidium guajava</i> Linn. 番石榴叶 | 159 |
| <i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir. 山大刀 | 19 |
| <i>Pteris ensiformis</i> Burm. 井栏苦 | 52 |
| <i>Pteris semipinnata</i> Linn. 半边旗 | 80 |
| <i>Pteroloma triquetrum</i> (Linn) Desv. 葫芦茶 | 170 |
| <i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance | |
| 半枫荷 | 59 |
| <i>Punica granatum</i> Linn. 安石榴 | 73 |

Pyenostelma paniculatum (Rge) Schum.
寮刁竹 176

Q

Quisqualis indica Linn. 使君子 105

R

Ranunculus cantoniensis DC. 自扣草 74

Rhodomyrtus tomentosa (Ait) Hassk. 岗稔 139

Rhus chinensis Mill. var. *roxburghii* (DC.)
Rehd 盐霜柏 136

Rosa laevigata Michx. 金樱子 92

Rubus parvifolius Linn. 蛇泡藤 152

Rungia pectinata (L.) Nees. 孩儿草 119

S

Sambucus javanica Reinw. 走马箭 90

Sapium sebiferum (L.) Roxb. 乌柏 125

Sargentodoxa cuneata (Oliver) Rehd.
et Wilson 鸡血藤 (大血藤) 160

Sauropus rostratus Mig. 龙脷叶 64

| | |
|---|-----|
| <i>Saxifraga sarmentosa</i> Linn F. 虎耳草 | 103 |
| <i>Saxifraga stolonifera</i> Merrb. 虎耳草 | 103 |
| <i>Schefflera octophylla</i> (Lour) Harms. 鸭脚木皮 | 182 |
| <i>Scutellaria indica</i> Linn. 韩信草 | 187 |
| <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv) Spring. | |
| 还魂草 | 83 |
| <i>Senecis scandens</i> Buch-Hampl 九里明 | 2 |
| <i>Sida rhombifolia</i> Linn. 黄花母 | 155 |
| <i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn. 豨薟草 | 177 |
| <i>Solidago virgo-aurea</i> Linn. 一枝香 | 1 |
| <i>Stemona tuberosa</i> Lour. 百部 | 77 |
| <i>Stephanis longa</i> Lour. 蛤蜊草 | 154 |
| <i>Stenoloma chinensis</i> (L.) Ching. 金花草 | 96 |
| <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze. 独脚金 | 111 |
| <i>Stephanis sinica</i> Diels. 独脚乌柏 | 109 |

T

| | |
|--|-----|
| <i>Taraxacum officinale</i> Wigg. 蒲公英 | 174 |
| <i>Tinospora sinensis</i> (Lour) Merr. 宽筋藤 | 172 |

V

| | |
|--------------------------------------|-----|
| <i>Verbena officinalis</i> Linn. 马鞭草 | 31 |
| <i>Vitis balansana</i> Planch. 山菩提 | 21 |
| <i>Viola inconspicua</i> Bl. 犁头草 | 158 |
| <i>Viscum articulatum</i> Burm. 枫香寄生 | 165 |
| <i>Viscum orientale</i> Willd. 柚树寄生 | 113 |
| <i>Vite negundo</i> Linn. 五指柑 | 43 |
| <i>Vite trifolia</i> Linn F. 蔓荆子 | 178 |

W

| | |
|--|---|
| <i>Wickstroemia indica</i> C. A. Mey 了哥王 | 7 |
|--|---|

X

| | |
|------------------------------------|-----|
| <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 苍耳 | 175 |
|------------------------------------|-----|

Z

| | |
|---|-----|
| <i>Zanthoxylum avicennae</i> (Lam.) DC. 麝不泊 | 190 |
| <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Lam.) DC. 入地金牛 | 6 |
| <i>Zornia dipylla</i> Pers 丁癸草 | 4 |