

第一冊

古今名醫驗方類編

上海大東書局印行



# 序一

本草始自神農氏數應周天其後陶蘇李韓繼增唐慎微益至千五百經八百餘家皆注藥性治法而不載方書也李東璧又補遺三百七十四種列綱分目集爲大成并采新舊諸方計萬一千有奇散見於藥品之下卷帙浩繁倉猝不能繙閱意欲類輯之也有年矣後見山陰蔡繭齋先生集萬方鍼線查方頗易誠本草之功臣救世之良法也然一證中有一二方者有多至三四十方者求其對證合方仍須對鍼引線閱者不無厭煩因而疎略不經者有之何如以類相從遇病尋方瞭如指掌擇善而從之之爲愈也戊午夏按鍼線中方次第手錄重複者刪之遺漏者補之至庚申仲春集成列爲三十二卷分一百七門計四千三百七十九證得方一萬一千八百餘名曰古今名醫驗方類編質諸同人僉曰本草無鍼線不能顯其功有類編得以濟其用是可並行也梓之以公

諸世然此亦窮陬僻壤暴病垂危一時不得名醫者設簡易法耳若夫懸壺植  
橘之士傳十全三折之術必精求九道六微之訣然後能起廢蠲疴故治證者  
重切脈脈不同而治亦異焉雖用成方又不得據證而泥方也然猶賢於腹笥  
空空師心自用誣古人成方爲不適用者多多矣

新建曹繩彥謹識

# 序二

盈天地間氣也人呼吸而生猶魚之吞吐水而活也而氣有邪正中和者爲正寒熱燥濕過甚者爲邪乘人之虛而入謂之外感外感由於內傷內傷者太喜則心系緩神渾散而心傷大怒者血湧溢而肝傷大憂者氣鬱塞而肺傷大恐者膽汁消而腎傷多思者引系急寢食廢而心脾俱傷臟與腑相通生失所養制反受剋此之謂內傷又緣外感而發者也而飲食積滯肌骨毀折以及尸魅蟲蠱之毒人類可推已故聖於醫者顧表裏循次第先治外而後調內間有外內兼理者更有急調內傷者舍標從本峻補毒攻禍福影響間不容髮而謂可輕嘗試爲耶是書也略內傷而詳外感非略也人第知虛者補之爲調內傷耳不知十劑皆可以調內補特居其一況世之作勞縱欲虧損眞元陰陽離脫雖天產養精地產養形亦不能療也正心以養神凝神以養氣和其榮衛濟其水

火庶有豸於萬一乎卽書中煉服一門不過却疾延年非謂得不死之藥金丹可成而神仙可致也至於方術諸說登載一二者如是我聞存而不論云爾是書也方雖萬餘不列多品不貴異物而取效如神在李氏當日祇言某藥主治某病藥書也自輯爲方書任人自擇合宜而用無論富貴賤貧皆力能取辦剖臂臠子之慘吾知免矣且是書類聚羣分對證求方卽不甚解文義者亦能依方治病庸醫誤人與左道惑衆吾亦知其免矣其有功於人世豈淺鮮哉若無方之醫書吾願學醫者尤三致意焉

錢塘朱 鉅

# 凡例

一 本草綱目諸方按鍼線分門逐方手錄某證與某方吻合一覽可知精于脈絡者固可按證參究不諳醫學者亦可就證擇取證對方合無不神驗

一 近世刊方書者不無應驗然多不載出處是書諸方俱出古名家品定逐方載列名氏書目任人信從

一 近世諸方一門十餘證一證三四方足矣窮陬僻壤倉猝求方證對無藥藥就無方亦復不少是書諸方一門數十證至百十餘證一證三四方至數十餘方不等遇便即可治病須知平易之物救至危之證比比然矣

一 集內發明主治集解釋名正誤等類間列數方均按章節錄各從其類不致稍有簡略至諸附方照樣葫蘆不敢妄爲增減致後以訛傳訛耳

一 病門相類者列爲一門如下部懸癱只二證似覺太簡今列入男陰門內取其相類也病名相同者列爲一條如尿血不定與小便尿血旣入諸淋門又入白濁門今併入諸淋門內小便尿血類取其相同也非故更易以便查考之意云爾

一鍼線原一百五門今分一百七門以繁就簡便于翻閱如外科癰疽門內分諸般瘡毒門又小兒諸病分通病門之類門雖分而方仍以類聚不出範圍

一方內云一字者卽今二分半四字曰錢十分也等分之分非分兩之分謂斤兩多少皆同爾刀圭者十分方寸七之一準如梧子大也方寸七者作七卽匙也正方一寸抄散而不落爲度

一方內藥以升合分者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之古之一升卽今之二合半也量之所起爲圭四圭爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升十升爲斗五斗曰斛二斛曰石

一方內湯酒膏藥云咬咀者謂秤畢擣之如豆大又吹去細末藥有易碎難碎多末少末今皆細切如咬咀咬咀古制也古無鐵刀以口咬細令如麻豆煎之今人以刀剉細耳

一方內丸藥如細麻者卽胡麻也不必扁扁略相稱爾黍粟亦然云如大麻子者準三細麻也如胡豆者卽今青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也以三大麻子準之如豆大者以二小豆準之如梧子大以二大豆準之如彈丸及雞子黃者以四十梧子準之依古方分兩炮製取用其應

如

# 古今醫家方書目

- |         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 黃帝素問    | 唐元宗開元廣濟方 | 天寶單方圖    | 唐德宗貞元廣利方 |
| 太倉公方    | 宋太宗太平聖惠方 | 扁鵲方      | 張仲景金匱玉函方 |
| 華陀方     | 張仲景傷寒論   | 支太醫方     | 張文仲隨身備急方 |
| 徐文伯方    | 初虞世古今錄驗方 | 秦承祖方     | 王燾外臺祕要方  |
| 華陀中藏經   | 姚和衆延齡至寶方 | 范汪東陽方    | 孫真人千金備急方 |
| 孫真人食忌   | 孫真人千金翼方  | 孫真人枕中記   | 席延賞方     |
| 孫真人千金髓方 | 葉天師枕中記   | 篋中祕寶方    | 許孝宗篋中方   |
| 錢氏篋中方   | 劉禹錫傳信方   | 王紹顏續傳信方  | 延年祕錄     |
| 柳州救三死方  | 李絳兵部手集方  | 御藥院方     | 崔行功纂要方   |
| 劉涓子鬼遺方  | 乘間集效方    | 陳延之小品方   | 葛洪肘後百一方  |
| 服器精義方   | 崔元亮海上集驗方 | 胡洽居士百病方  | 姚僧坦集驗方   |
| 梅師集驗方   | 謝士秦刪繁方   | 深師脚氣論卽梅師 | 孫兆口訣     |

孫氏集驗方

孟詵必效方

平堯卿傷寒類要

斗門方

韋宙獨行方

王珉傷寒身驗方

勝金方

文潞公藥準

周應簡要濟衆方

塞上方

王袞博濟方

沈存中靈苑方

救急方

張路大效方

崔知悌勞療方

近效方

陳抃經驗方

陳氏經驗後方

蘇枕良方

十全博救方

魯殷食醫心鏡

必用方

張傑子母祕錄

楊氏產乳集驗方

魯殷寶產

譚氏小兒方

小兒宮氣方

萬全方

大清草木方

李翱何首烏傳

普救方

神仙服食方

嵩陽子威靈仙傳

寒食散方

賈相公牛經

賈誠馬經

已上舊本所引八十四家

靈樞經

王水元密

張杲醫說

黃帝書

褚氏遺書

李濂醫史

秦越人難經

聖濟總錄

劉氏病機賦

皇甫謐甲乙經

宋徽宗聖濟經

劉克用藥性賦

王叔和脈經

張仲景金匱要略

彭祖服食經

巢元方病原論

神農食忌

神仙服食經

宋俠經心錄

魏武帝食制

李氏食經

王執中資生經

婁居中食治通說

飲膳正要

劉河間原病式

太清靈寶方

元明粉方

劉河間宣明方

戴起宗脈訣刊誤

吳猛服椒訣

許洪本草指南

黃氏本草權度

陸氏證治本草

土宿真君造化指南

醫餘錄

月池人參傳

胡演升鍊丹藥祕訣

名醫錄

月池艾葉傳

張子和儒門事親

張潔古醫學啓原

菖蒲傳

醫鑑

活法機要

楊天惠附子傳

潔古家珍

李東垣醫學發明

東垣辦惑論

東垣脾胃論

東垣蘭室祕藏

東垣試效方

王海藏醫家大法

海藏醫壘元戎

海藏此事難知

海藏陰證發明

羅天益衛生寶鑑

丹溪格致餘論

丹溪局方發揮

盧和丹溪纂要

丹溪醫案

楊珣丹溪心法

方廣丹溪心法附餘

丹溪活套

程充丹溪心法

滑伯仁櫻寧心要

惠民和劑局方

陳言三因方

孫真人千金月令方

嚴用和濟生方

王氏易簡方

楊建子萬全護命方

繼洪澹寮方

是齋指迷方

楊士瀛仁齋直指方

余居士選奇方

黎居士易簡方

楊氏家藏方

濟生拔萃方

胡澹衛生易簡方

朱端章衛生家寶方

許學士本事方

鷄峯備急方

孫用和傳家祕寶方

王隱君養生王論

真西山衛生論

趙士衍九籥衛生方

王方慶嶺南方

嶺南衛生方

初虞世養生必用方

周憲王普濟方

虞搏醫學正傳

李仲南永類鈴方

周憲王袖珍方

傅滋醫學集成

薩謙齋瑞竹堂經驗方

王履浮泗集

葉氏醫學統旨

萬表積善堂經驗方

戴原禮證治要訣

醫學綱目

孫氏仁存堂經驗方

戴元禮金匱鉤方

醫學指南

楊氏頤真堂經驗方

劉純玉機微義

醫學切問

陸氏積德堂經驗方

劉純醫經小學

王璽醫林集要

德生堂經驗方

臞仙乾坤祕韜

饒氏醫林正宗

法生堂經驗方

臞仙乾坤生意

周良采醫方選要

劉松石保壽堂經驗方

窺元子法天生意

楊掛醫方摘要

陳日華經驗方

梁氏總要

醫方大成

王仲勉總驗方

吳球活人心統

方賢奇效良方

劉長春經驗方

吳球諸證辦疑

閻孝忠集效方

禹講師經驗方

趙氏儒醫集要

孫天仁集效方

戴古渝經驗方

瀕湖醫案

試效錄驗方

龔氏經驗方

瀕湖集簡方

經驗濟世方

蘭氏經驗方

楊起簡便方

孫一松試效方

阮氏經驗方

坦仙皆效方

董炳集驗方

趙氏經驗方

危氏得效方

朱端章集驗方

楊氏經驗方

居家必用方

經驗良方

唐瑤經驗方

鄧筆峯衛生雜興

救急易方

張氏經驗方

王英杏林摘要

急救良方

龔氏經驗方

白飛震韓氏醫通

白飛霞方外奇方

徐氏家傳方

張三丰仙傳方

溫隱居海上方

鄭氏家傳方

王氏奇效方

海上仙方

談莖翁試驗方

丘瓊山羣書日抄

海上名方

包會應驗方

何子元羣書續抄

十便良方

孟氏詵詵方

張氏瀟江切要

李樓怪證奇方

生生編

邵真人青囊雜纂

夏子益奇疾方

摘元方

趙宜真濟急仙方

纂要奇方

端效方

王求輔惠濟方

奚囊備急方

史堪指南方

王璆百一選方

臞仙壽域神方

陳直奉親養老書

世醫迪變要法

吳旻扶壽精方

李廷飛三元延壽書

何大英發明證治

王氏醫方捷徑

保慶集

保生餘錄

神醫普救方

楊炎南行方

彭用光體仁彙編

傳信適用方

王氏究源方

王節齋明醫雜著

攝生妙用方

艾元英如宜方

濟生祕覽

王氏手集

蕭靜觀方

錦囊祕覽

唐仲舉方

楊堯輔方

金匱名方

嚴月軒方

鄭師甫方

芝隱方

通妙真人方

三十六黃方

葛可久十藥神書

蘇適元感傳尸論

上清紫庭追勞方

朱肱南陽活人書

韓祗和傷寒書

龐安時傷寒總病論

成無己傷寒明理論

劉河間傷寒直格

陶華傷寒六書

李知先活人書括

陳自明婦人良方

郭稽中婦人方

熊氏婦人良方補遺

胡氏濟陰方

婦人明理論

婦人千金家藏方

便產須知

二難寶鑑

婦人經驗方

錢乙小兒真訣

劉昉幼幼新書

幼科類萃

陳文中小兒方

曾世榮活幼心書

徐用宣袖珍小兒方

張煥小兒方

吳綬傷寒蘊要

趙嗣真傷寒論

寇衡全幼心鑑

演山活幼口議

阮氏小兒方

魯伯嗣嬰童百問

活幼全書

鄭氏小兒方

湯衡嬰孩寶鑑

衛生總微論卽保幼大全

鮑氏小兒方

湯衡嬰孩妙訣

姚和衆童子祕訣

全嬰方

王日新小兒方

小兒宮氣集

魏直博愛心鑑

高武痘疹管見

李言聞痘疹證治

痘疹要訣

李實痘疹淵源

聞人規痘疹八十一論

張清川痘疹便覽

陳自明外科精要

薛已外科心法

外科通元論

齊德之外科精義

薛已外科發揮

薛已外科經驗方

楊清叟外科祕傳

李迅癰疽方論

周良采外科集驗方

眼科龍木論

飛鴻集

倪惟德原機啓微集

明目經驗方

宣明眼科

眼科針鉤方

咽喉口齒方

已上時珍所引二百七十六家

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and low contrast.

古今名醫驗方類編總目

卷一 通治部

瘡疾門

痢疾門

卷二 通治部

諸風門

卷三 通治部

霍亂門

傷寒門

傷風門

中寒門

中濕門

痼冷門

麻木門

卷四 通治部

諸火門

中暑門

發熱門

風熱門

煩躁門

臥寐門

諸汗門

消渴門

卷五 通治部

咳嗽門

嘔吐門

翻胃門

噎膈門

惡心門

吞酸嘈雜門

卷六 通治部

呃逆門

痞滿門

哮喘門

失血門

卷七 通治部

諸氣門

痰飲門

虛損門

癆瘵門

鬱症門

結核門

鼓脹門

卷八 通治部

水腫門

黃疸門

丹毒門

傷酒門

傷食門

積聚門

卷九 通治部

脾胃門

瘟疫門

癩痢門

健忘門

怔忡驚悸門

卷十 通治部

邪祟門

癥瘕門

聲音門

奇異門

卷十一 通治部

煉服門

卷十二 通治部

製造門

卷十三 外科

折傷跌撲門

卷十四 外科

湯火傷門

蟲獸傷門

附治蟲獸門

卷十五 外科

諸中毒門

卷十六 外科

諸骨鯁門

疹癩斑癬門

癰瘤門 瘰癧贅疣附

卷十七 外科

癰疽瘡瘍門

卷十八 外科

諸般瘡毒門

卷十九 婦科

調經門

崩漏門

帶下門

妊娠門

卷二十 婦科

胎產門

產後門

乳病門

女陰門

卷二十一 小兒科

小兒諸病門

卷二十二 小兒科

通病門

卷二十三 小兒科

驚癇門

諸疳門

痘疹門

卷二十四 上部

頭病門

面病門

卷二十五 上部

眼目門

卷二十六 上部

鼻病門

耳病門

口舌門

卷二十七 上部

牙齒門

頭髮鬚眉門

咽喉門

卷二十八 中部

心痛門

腋氣門

胸脇門

手臂門

卷二十九 中部

腰痛門

肩背門

腹痛門

諸蟲門

卷三十 下部

關格門

結燥門

腸風下血門

脫肛門

痔漏門

卷三十一 下部

不禁門

小閉門

諸淋門

赤白濁門

遺精門

癩疝門

卷三十二 下部

男陰門

脚氣門

足趾門

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷一 通治部

### 瘡疾門

|      |   |        |    |
|------|---|--------|----|
| 寒熱瘡疾 | 一 | 牡瘡獨熱   | 五  |
| 溫瘡不止 | 二 | 少陰瘡疾   | 五  |
| 鬼瘡去來 | 二 | 虛瘡自汗   | 五  |
| 脾寒虛瘡 | 三 | 厥陰肝瘡   | 六  |
| 久瘡不止 | 四 | 太陰肺瘡   | 六  |
| 三十年瘡 | 四 | 少陰腎瘡   | 六  |
| 老瘡不斷 | 五 | 瘡疾渴甚   | 六  |
| 老瘡勞瘡 | 五 | 瘡瘡     | 六  |
| 寒瘡積瘡 | 五 | 久年痰瘡   | 六  |
| 勞瘡積久 | 五 | 痰瘡寒熱   | 七  |
| 寒瘡冷痢 | 五 | 新久瘡疾   | 七  |
| 虛寒瘡疾 | 五 | 疥瘡疲瘵   | 七  |
| 牝瘡獨寒 | 五 | 男女瘡疾   | 七  |
| 虛瘡發熱 | 五 | 食瘡積瘡   | 七  |
|      |   | 諸瘡煩熱   | 七  |
|      |   | 瘡發無時   | 七  |
|      |   | 瘡後怪症   | 七  |
|      |   | 五種瘡疾   | 七  |
|      |   | 邪氣瘡疾   | 八  |
|      |   | 久瘡結癖   | 八  |
|      |   | 斷截瘡疾   | 八  |
|      |   | 繫臂截瘡   | 八  |
|      |   | 截瘡諸湯酒丸 | 八  |
|      |   | 截瘡諸酒   | 九  |
|      |   | 截瘡諸丸   | 九  |
|      |   | 紫雪     | 九  |
|      |   | 咒棗治瘡   | 九  |
|      |   | 佩禳瘡疾   | 九  |
|      |   | 狐膽丸    | 一〇 |
|      |   | 諸瘡論    | 一〇 |
|      |   | 痢疾門    |    |
|      |   | 赤白痢下   | 一〇 |
|      |   | 血痢不止   | 一三 |
|      |   | 下痢噤口   | 一四 |

久痢噤口……………一五  
 血痢噤口……………一五  
 久痢不止……………一五  
 久痢休息……………一六  
 熱毒下痢……………一七  
 熱痢裏急……………一八  
 裏急後重……………一八  
 水穀下痢……………一八  
 暑痢連月……………一八  
 脾虛泄痢……………一八  
 脾泄氣痢……………一八  
 氣痢後重……………一九  
 一切痢下……………一九  
 泄瀉下痢……………一九  
 下痢腹痛……………二〇  
 虛寒下痢……………二〇  
 冷滑下痢……………二〇  
 冷勞泄痢……………二〇  
 冷痢厥逆……………二〇  
 冷疝下痢……………二〇

下痢滯痛……………二〇  
 下痢水泄……………二〇  
 下痢咳逆……………二一  
 久冷下痢……………二一  
 下痢鮮血……………二一  
 下痢轉白……………二一  
 下痢口渴……………二一  
 暴作瀉痢……………二一  
 腸蠱下痢……………二一  
 傷寒下痢……………二一  
 水泄寒痢……………二一  
 諸痢脾泄……………二一  
 冷痢腹痛……………二一  
 寒瘧冷痢……………二一  
 餐泄滑痢……………二一  
 老人虛痢……………二一  
 一切積痢……………二一  
 赤痢熱燥……………二一  
 赤痢腹痛……………二一  
 便痢膿血……………二一

濕痢腸風……………二三  
 久痢成疝……………二三  
 老小白痢……………二三  
 水痢百病……………二三  
 五色諸痢……………二三  
 五疳八痢……………二四  
 痢及瀉血……………二四  
 赤痢經年……………二四  
 一切泄痢……………二四  
 久痢三十年……………二四  
 赤白重下……………二四  
 濕蠱下痢……………二四  
 酒痢便血……………二四  
 老少瘴痢……………二四  
 洞注下痢……………二四  
 老少下痢……………二五  
 順氣止痢……………二五  
 熱痢吐食……………二五  
 白頭翁湯……………二五  
 香連丸……………二五

|       |    |      |    |      |    |
|-------|----|------|----|------|----|
| 調氣飲   | 二五 | 五更腎泄 | 二八 | 勞冷腸泄 | 三〇 |
| 千金膠蠟湯 | 二五 | 久泄胃弱 | 二八 | 白朮膏  | 三〇 |
| 豬脬酒   | 二五 | 暑月暴瀉 | 二八 |      |    |
| 紫參湯   | 二五 | 老小滑瀉 | 二八 |      |    |
| 泄瀉門   |    | 腹脹忽瀉 | 二八 |      |    |
| 水泄不化  | 二六 | 驟然水瀉 | 二八 |      |    |
| 暑毒泄痢  | 二六 | 老人虛泄 | 二八 |      |    |
| 水瀉腹鳴  | 二六 | 水瀉不止 | 二八 |      |    |
| 脾虛泄瀉  | 二六 | 久瀉不止 | 二九 |      |    |
| 老人泄瀉  | 二六 | 或瀉或止 | 二九 |      |    |
| 大腸寒滑  | 二六 | 久瀉虛痢 | 二九 |      |    |
| 內寒暴瀉  | 二六 | 中寒水瀉 | 二九 |      |    |
| 伏暑水瀉  | 二七 | 中滿洞瀉 | 二九 |      |    |
| 久痢久泄  | 二七 | 餐瀉不化 | 二九 |      |    |
| 元臟冷泄  | 二七 | 風寒泄瀉 | 二九 |      |    |
| 氣虛暴泄  | 二七 | 伏暑泄瀉 | 二九 |      |    |
| 脾積食泄  | 二七 | 泄瀉不止 | 三〇 |      |    |
| 濕熱虛泄  | 二七 | 喫飯直出 | 三〇 |      |    |
| 多年脾泄  | 二七 | 肚腹痛瀉 | 三〇 |      |    |
| 冷氣洞泄  | 二七 | 久病滑泄 | 三〇 |      |    |



古今名醫驗方類編卷一

通治部

癰疾門

●寒熱瘡疾

【集元方】秋後霜一錢半熱酒服之

【本草方】體虛汗多者黃丹百草霜等分為末發

日空心米飲服三錢不過二服愈或糊丸或蒜

丸皆效

【肘后方】用飛炒黃丹一兩恆山末三兩蜜丸梧

子大每服五十九丸溫酒下平旦及未發將發時

各一服無不效

【普濟方】端午用黃丹炒二兩獨蒜一百個搗丸

梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效亦治痢疾

【三因方】用黃丹炒建茶等分為末溫酒服二錢又黃丹飛焙麵糊丸芡子大每棗子一枚去核包一丸紙裏煨熟食之

【集元方】一日一發或二三發或三日一發古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末飯丸皂子大每服一九五更無根水下即止

【孫真宗祕寶方】用信砒二兩研粉寒水石三兩別搗末用生鐵銚一個鋪石末後鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊紙條密封十餘條重炭火一觔煨之待紙條黑時取出候冷刮盡

上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每用

三四九小兒一二九發日早以臘茶清下一日

不得食吐物男人患女人着藥入口中女人患

男人着藥入口中

【本事方】用人言一錢綠豆末一兩為末無根井

水丸綠豆大黃丹為衣陰乾發日五更冷水下

五七丸

【衛生寶鑑】一剪金用人言醋煮硫黃綠豆等分

為末每一豆許用紅絹包之采絲紮定每剪下

一粒新汲水空心吞下治瘡聖藥也

【醫累元戎】九轉靈砂丹用砒霜黃丹紫河車各

一錢為末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和丸

梧子綠豆黍米三樣大每服一二十九發日五

更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒

也

【本草】權度不二散用砒一錢麵二兩和勻香油

一筋煎黃色以草紙壓去油入茶三兩為末每

服一錢發日早冷茶下

【本草方】白龍丹用明礬枯過為末飛羅麵醋打

糊丸梧子大每服二三十丸用東南桃心七個

煎湯下

【普濟方】礬紅獨蒜頭煨等分搗丸芡子大每白

湯嚼下一丸端午日合之

【聖濟總錄】赤脚馬蘭搗汁入水少許發日早服

或入少糖亦可

【肘后方】用青蒿一握水二升搗汁服之

【存仁方】用五月五日天未明時采青蒿陰乾四

兩桂心一兩為末未發前酒服二錢

【經驗方】用端午日采青蒿葉陰乾桂心等分爲末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物

【海上名方】齊頭蒿根滴滴金根各一把搗生酒一鍾未發前服以滓傅寸口男左女右二日便止

【千金方】馬鞭草搗汁五合酒二合分二服

【龐安常傷寒論】附子一枚重五錢者麵煨人參丹砂各一錢爲末煉蜜丸梧子大每服二十九未發前連進三服中病則吐或身體麻木未中病來日再服

【肘后方】煮豉湯飲數升得大吐卽愈

【肘后方】用獨頭蒜炭上燒之酒服方寸七

【簡便】用桃仁半片放內關穴上將獨頭蒜搗爛

卷之縛住男左女右卽止隣嫗用此治人屢效

【普濟方】端午日取獨頭蒜煨熟入礬紅等分搗丸芡子大每白湯嚼下一丸

【易簡方】脾胃聚痰發爲寒熱生薑四兩搗自然汁一酒盃露一夜於發日五更面北立飲卽止未止再服

【本草方】翻白草根五七個煎酒服之

【唐慎微本草方】桃仁一百枚去皮尖乳砵內研成膏不得犯生水入黃丹三錢丸梧子大每服三丸當發日面北溫酒吞下五月五日午時合之忌鷄犬婦人見

【聖惠方】青皮一兩燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服

【千金方】甜瓜蒂二枚水半盞浸一宿頓服取吐

愈

【聖惠方】猪膏丸治瘡疾發渴往來不定臘猪膏

二兩獨角仙一枚獨頭蒜一個摟葱一握五月

五日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭

赤脚舌柱上齧回面向北搗一千九皂子大每

以新綿裹一丸繫背上男左女右

【普濟方】牡蠣粉杜仲等分爲末蜜丸梧子大每

服五十九温水下

●温瘡不止

【仁存堂方】黃丹炒半兩青蒿童便浸二兩爲末

每服二錢寒多酒服熱多茶服

【聖濟總錄】當歸一兩水煎飲日一服

【仁存方】但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙

黃丹半兩爲末每服二錢白湯調下

【藥性論】恆山一錢小麥三錢淡竹葉二錢水煎

五更服甚良

●鬼瘡去來

【聖濟總錄】樹上自乾桃子二七枚爲末滴水丸

梧子大硃砂爲衣每服一丸侵晨面東井華水

下

【聖濟總錄】鬼箭羽鯪鯉甲燒灰二錢半爲末每

以一字發時噴鼻

又法鬼羽箭末一分砒霜一錢五靈脂一兩爲

末發時冷水服一錢

【聖濟錄方】畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂

各一皂子大爲末寒食麵和丸小豆大每服一

丸發時冷水下正月十五日五月初五日修合

【肘后方】用白驢蹄剉炒砒霜各二分大黃四兩

菘豆三分雄黃一分硃砂半分研丸梧子大末發平旦冷水服二丸卽止七日忌油

【聖惠方】生虎睛一枚臘月豬血少許硃砂阿魏各一分爲末端午日取粽尖七枚和丸黍米大每綿包一丸塞耳中男左女右

【聖惠方】或發或止野貓肝一具瓶盛熱豬血浸之封口懸乾去血取肝研末糊猴頭骨虎頭骨狗頭骨各一兩麝香一分爲末醋糊爲丸芡子大發時手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫中指上

【聖惠方】野狐肝膽一具新瓶內陰乾阿魏一分爲末醋糊丸芡子大發時男左女右把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指

【本草方】雄狐屎蝙蝠屎各一分爲末醋糊丸芡

子大發時男左女右手把一丸嗅之

【聖惠方】進退不定用糊猴頭骨一枚燒研空心溫酒服一錢臨發時再服

●脾寒虛瘧

【朱氏集驗方】寒多熱少飲食不思用高良姜麻油炒乾薑炮各一兩爲末每服五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽汁和丸每服四十九酒下亦佳吳升內翰致和丁酉居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發于膽用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以作效也

一方只用二薑半生半炮各半兩穿山甲炮三錢爲末每服二錢豬腎煮酒下

【濟生方】云五臟氣虛陰陽相勝發爲痲瘡寒多熱少或但寒不熱宜七棗湯主之用附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服水一碗生薑七片棗七枚煎七分露一夜發日空心溫服未久再進一服王璆百一選方云寒痲宜附子風痲宜烏頭若用烏頭則寒多者火炮七次熱多者湯炮七次去皮焙乾如上法用烏頭性熱炮多則熱散也

又果附湯用熟附子去皮草果仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日早溫服

【肘后方】臨發時以醋和附子塗于背上

【蘇東坡良方】先寒後熱名寒瘡但寒不熱面色黑者名厥瘡寒多熱少面黃腹痛名脾瘡三者並宜服此賈耘老用之二十年累試有效不蛀

草烏頭削去皮沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三十九薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一服絕勿飲湯便不發也

【集簡方】石胡荽一把杵汁半碗入酒半碗和服甚效

【外臺方】用乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一盞煎至七分服

又乾薑炒黑爲末臨發時以溫酒服三錢七

【適用方】不拘老少孕婦只兩服便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一指銀器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔年青州棗十個水一盞煎半盞發前服以棗下之

【本草方】黃狗肉煮臠入五味食之

●久瘧不止

【鮑氏方】用硫黃硃砂等分爲末每服二錢臘茶下發日五更服當日或大作或不作皆其效也寒多倍硫熱多倍砂

【朱氏方】用硫黃臘茶等分爲末發日早冷水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶

【朱氏集驗方】蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十九日二服生者搗汁服亦可

【斗門方】薊藿一大握炙令赤色以水濃煎一盞

欲發前服

【千金方】葇荂根燒灰水服一合量人強弱用

【普濟方】火麻葉不問榮枯鍋內文武火慢炒香撮起以紙蓋之令出汗盡爲末臨發前用茶或

酒下移病人原睡處其狀如醉醒卽愈

又方火麻葉如上法爲末一兩加縮砂丁香陳皮赤苓各半兩酒糊丸梧子大每酒茶任下五七丸能治諸瘧壯元氣

【梅師方】桃花爲末酒服方寸匕良

【發明】時珍曰按王璆百一選方云夔州潭遠病瘧半年故人竇藏叟授方用真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和丸皂子大每空心人參湯化服一丸卽愈世人治瘧惟用常山砒霜毒物多有所損此方平易人所不知草窗周蜜云此方治瘧以無根水下治痢以黃連木香湯下瘧痢亦多起于積滯故爾

【千金方】故鞋底去兩頭燒灰井華水服之

【聖惠方】不拘久近車軸垢水洗下麵和丸彈子

大作燒餅未發時食一枚發時又食一枚

【浣方】白僵蠶直者一個切作七段綿裹為丸硃

砂為衣作一服日未出時面向東用桃柳枝七

寸煎湯吞下

【肘后方】龍骨末方寸七先發一時酒一升半煮

三沸及熱服盡溫覆取汁即效

【海上名方】龜版燒存性研末酒服方寸七

【聖惠方】雄野雞屎熊膽五靈脂恆山等分為末

醋糊丸黑豆大正發時冷水下一丸

【范汪方】用蝙蝠七個去頭翅足搗千下丸梧子

大每服一丸清湯下雞鳴時一丸禺中一丸

【聖惠方】又伏翼丸用蝙蝠一枚炙蛇脫皮一條

燒蜘蛛一枚去足炙鼈甲一枚醋炙麝香半錢

為末五月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大

每溫酒下五丸

【海上名方】或一日二發或一日二三發或二三

日一發用五靈脂頭垢各一錢古城石灰二錢

研末砵丸皂子大每服一丸五更無根水下即

止神效方也

●三十年瘡

【肘后方】治三十年老瘡及積年久瘡常山黃連

各一兩酒三升漬一宿以瓦釜煮取一升半發

日早服五合發時再服熱當吐冷當利無不瘥

者

【張文仲備急方】用恆山一兩半龍骨五錢附子

炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸梧子大

未發時五丸將發時五丸白湯下支太醫云此

方神驗無不斷者

●老瘡不斷

【肘后方】牛膝莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止

●老瘡勞瘡

【肘后方】用鼈甲醋炙研末酒服方寸七隔夜一

服清早一服臨時一服無不斷者入雄黃少許

更佳

●寒瘡積癩

【肘后方】巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大

大棗去皮一枚搗成丸梧子大清旦先發時各

服一丸白湯下

●勞瘡積久

【發明】時珍曰按龐元英談藪云張知閣久病瘡

熱時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益甚召

醫官孫琳診之琳投小柴胡湯一帖熱減十之

九三服脫然琳曰此名勞瘡熱從髓出加以剛

劑氣血愈虧安得不瘦蓋熱有在皮膚在臟腑

在骨髓非柴胡湯不可若得銀柴胡只須一服

南方者力減故三服乃效也觀此則得用藥之

妙的矣寇氏之說可盡憑乎

【外臺祕要】不止者長牛膝一握生切以水六升

煮二升分三服清早一服未發前一服臨發時

一服

【圖經本草】烏梅十四枚豆豉二合桃柳枝各一

虎口甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎

一半溫服即止

●寒瘡冷痢

【普濟方】端午日以獨蒜頭十個黃丹二錢搗丸

梧子大每服九丸長流水下甚妙

●虛寒瘡疾

【集驗方】羊肉作臠餅飽食之更飲酒暖臥取汗

燕國公嘗見有效

●牝瘡獨寒

【仲景金匱方】雲母燒二日夜龍骨蜀漆燒去腥

等分爲散未發前漿水服半錢

【張仲景金匱要略】不熱者蜀漆散用蜀漆雲母

煨二日夜龍骨各二錢爲末每服半錢臨發日

旦一服發前一服酢漿水調下温瘡又加蜀漆

一錢

●虛瘡發熱

【丹溪纂要】人參二錢二分雄黃五錢爲末端午

日用糲尖搗丸梧子大發日侵晨井華水吞下

七丸發前再服忌諸般熱物立效一方加神曲

等分

●牡瘡獨熱

【王燾外臺祕要】不冷者蜀漆一錢半甘草一錢

麻黃二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆

去沫入藥再煎至一鍾未發前温服得吐則止

矣

【廣利方】翹搖杵汁服之

【楊氏家藏方】穿山甲一兩乾棗十個同燒存性

爲末每服二錢發日五更井華水服

●少陰瘡疾

【聖濟錄方】嘔吐綠礬二錢乾薑炮半夏薑製半

兩爲末每服半錢發日早以醋湯下

●虛瘡自汗

【經效濟世方】不用草果一枚麵裹煨熟連麵研入平胃散二錢水煎服

●厥陰肝瘡

【趙真人濟急方】治寒多熱少喘息如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄如神恆山一兩醋浸一夜瓦器煮乾每用二錢水一盞煎半盞五更冷服

●太陰肺瘡

【千金方】痰聚胸中病至令人心寒寒甚乃熱熱間善驚如有所見恆山三錢甘草半錢秫米三十五粒水二鍾煎一鍾發日早分三次服

●少陰腎瘡

【千金方】淒淒然寒手足寒腰脊痛大便難目陶陶然恆山二錢半豆豉半兩烏梅一錢竹葉一

錢半葱白三根水一升半煎一升發前分三服

●瘧疾渴甚

【簡便方】童便和蜜煎沸頓服

●瘰癧

【摘元方】食瘰蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內上以盞蓋六一泥固濟煨至藥升在盞刮下爲末米糕糊丸綠豆大雄黃爲衣每服一丸黑豆研水五更送下

【濟生方】熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒用草果仁熟附子等分水一盞薑七片棗一枚煎半盞服名果附湯

【劉長春經驗方】常山一寸草果一枚熱酒一盞浸一夜五更望東服之蓋臥酒醒卽愈

【談莖翁試驗方】用常山板榔甘草各二錢黑豆

一百粒水煎服之乃彭司寇所傳

【葛稚川肘后方】用常山黃連香豉各一兩附子

炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹飲服四九欲發

時三九至午後乃食

【嶺南衛生方】冷瘴寒熱往來頭痛身疼嘔痰或

汗多引飲或自利煩躁宜薑附湯主之大附子

一枚四破每以一片水一盞生薑十片煎七分

溫服李侍制云此方極妙

章傑云嶺南以啞瘴為危急不過一二日而死

醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得

非以熱攻熱而發散寒邪乎真起死回生之藥

也

【發明】時珍曰按聖惠方云治山瘴瘧有蝕角飲

九月九日取米糕角陰乾半兩寒食飯二百粒

豉一百粒獨蒜一枚恆山一兩以水二盞浸一

夜五更煎至一盞頓服當下利為度

【孫真人方】連背項者茴香子搗汁服之

【千金方】相思子十四枚水研服取吐立瘥

【聖惠方】久不愈用白狗糞燒灰發前冷水服二

錢

【聖惠方】野狐肝一具陰乾重五日五更初北斗

下受氣為末粳米作丸菽豆大每以一九緋帛

裹繫手中指男左女右

【聖惠方】無問新久童便一升入白蜜二匙攪去

白沫頓服取吐碧綠痰出為妙若不然終不除

也

●久年痰瘧

【發明】震亨曰一人作勞發瘧服瘧藥變為熱病

舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

【保命集方】不食欲吐不吐用藜蘆末半錢溫蠶水調下探吐

【肘后方】用藜蘆皂莢炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大每空心服一丸未發時

一丸臨發時又服一丸勿用飲食

●痰瘡寒熱

【聖惠方】冬葵子陰乾爲末酒服二錢午日取花授手亦去瘡

【蘇頌圖經本草方】蜀葵花白者陰乾爲末服之午日取花授手亦能去瘡

【聖濟總錄】阿魏臘脂各一豆大研勻以蒜膏和

覆虎口上男左女右

【發明】時珍曰太平御覽載葛洪瘡方用鼠負虫十四枚各以糟釀之丸十四丸凡發時水吞下便愈而葛洪肘后方治瘡疾寒熱用鼠負四枚糖裹爲丸水下便斷又用鼠負豆豉各十四枚搗丸芫子大未發前日湯服二丸將發時再服二丸便止

●新久瘡疾

【本草方】用葛薺草一握一名勒蔓去兩頭秋冬用乾者恆山末等分以淡漿水二大盞浸藥星月下露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈

【德生堂方】用三姓人家寒食麵各一合五月五日午時采青蒿搗自然汁和丸綠豆大臨發日早無根水下一丸一方加炒黃丹少許

● 疔瘡疲療

【發明】時珍曰野史云盧絳中病痞疾疲療忽夢

白衣婦人云食蔗可愈及且買蔗數挺食之翌

日疾愈此亦助脾和中之驗與

● 男女瘡疾

【本草方】馬齒莧搗紮手寸口男左女右

● 食瘡積瘡

【肘后方】巴豆去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗

丸綠豆大一服一丸冷湯下

● 諸瘡煩熱

【直指方】大燥取生地龍四條洗淨研如泥入生

薑汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服甚

效亦治瘡瘡

● 瘡發無時

【衛生家寶方】胡椒吳茱萸高良薑各二錢爲末

以猪脾一條作膾炒熟一半滾藥一半不滾以

墨記定並作餛飩煮熟有藥者吞之無藥者嚼

下一服效

● 瘡後怪症

【夏子益奇疾方】口鼻中氣出盤旋不散凝如黑

蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石無由

飲食煎澤瀉湯口飲三盞連服五日愈

● 五種瘡疾

【王隱君養生主論方】家寶通神丸用神桃即桃

奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻以冷水和

丸梧子大硃砂爲衣發日五更念藥王菩薩七

遍井華水下丸立瘥不過二次妙不可言

【聖惠方】用夜明砂末每冷茶服一錢立效

又方治瘧發作無時經久不瘥用蝙蝠糞五十粒硃砂半兩麝香一錢爲末糯米飯丸小豆大未發時白湯下十九

●邪氣瘧疾

【外臺方】用黑牛尾燒末酒服方寸七日三服

●久瘧結癖

【直指方】在腹脇堅痛芫花炒二兩硃砂五錢爲

末蜜丸梧子大每服十九棗湯下

【主治時珍方】久瘧成癖者以醉魚草釋名閩魚

花填鱗魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花

和海粉搗貼便消

【醫方摘要】有母木鼈子穿山甲炮等分爲末每

服三錢空心温酒下

【發明】時珍曰聖惠方逐邪丸用之其方治久瘧

發歇無時用百節蟲四十九枚濕生蟲四十九

枚砒霜三錢粽子角七枚五月五日日出時

于東南上尋取兩般蟲至午時向南研勻丸小

豆大每發日早男左女右手把一丸嗅之七遍

立效修時忌孝子婦人師尼雞犬見之亦合別

錄療寒熱之說大抵毒物止可外用不敢輕入

丸散中

●斷截瘧疾

【主治時珍方】燒尸場上土取帶黑者同葱搗作

丸塞耳或繫膊上卽止男左女右

【邵氏青囊方】用五月五日午時取蚯蚓糞以麵

和丸梧子大硃砂爲衣每服三丸無根水下忌

生冷卽止皆效或加菖蒲末獨頭蒜同丸

【唐慎微方】小蒜不拘多少研泥入黃丹少許丸

如芡子大每服一丸面東新汲水下至妙

【救急易方】紫葢一握搗爛絹包周身摩擦得睡

有汗卽愈臨發前一時作之

【葛洪方】用蜘蛛一枚同飯搗丸吞之

【楊氏家藏方】蜘蛛一枚着蘆管中蜜塞縮項上

勿令患人知之

【海上名方】用蜘蛛三五枚綿包繫寸口上

【宣明方】用大蜘蛛三枚信砒一錢雄黑豆四十

九粒爲末滴水爲丸碗豆大先夜以一九獻于

北斗下次早紙裹插耳內立見神效一九可醫

二人

【普濟方】五月五日取花蜘蛛晒乾絳囊盛之臨

期男左女右繫背上勿令知之

【藏器方】燕屎方寸七發日平旦和酒一升令病

人兩手捧住吸氣慎勿入口害人

●繫臂截瘡

【王執中資生經方】用旱蓮草搗爛男左女右置

小口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂

之天灸其瘡卽止甚效

●截瘡諸湯酒丸

【外臺祕要方】用常山三兩漿水三升浸一宿煎

取一升欲發前頓服取吐

【肘后方】用常山一兩秫米一百粒水六升煮三

升分三服先夜未發臨發時服盡

【養生主論】王隱者驅瘡湯云予用此四十年奇

效不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮

晒乾加知母貝母草果一錢半水一鍾半煎半

熟五更熱服渣以酒浸發前服

●截瘡諸酒

【肘后方】用常山一兩酒一升漬二三日分作三服平旦一服少頃再服臨發又服或加甘草煮服之

【宋俠經心錄】醇醪湯治間日瘧支太醫云乃桂廣州方也甚驗恆山一錢二分大黃二錢半炙甘草一錢二分水一盞半煎減半醉發日五更溫服再以水一盞煎減半日醺未發時溫服

【虞搏醫學正傳】治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香五分烏梅一個酒一盞浸一宿五更飲之一服便止永不再發如神

●截瘧諸丸

【千金方】恆山丸治數年不瘧者兩劑瘧一月以來者一劑瘧恆山三兩研末雞子白和丸梧子

大瓦器煮熟殺腥氣則取晒乾收之每服二十丸竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或吐或否即止

【肘后方】丹砂丸恆山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵百下丸梧子大先發時三丸少頃再服三丸臨發服三丸酒下無不斷者

【曾世榮活幻心書】黃丹丸治大小久瘧恆山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦焙一兩爲末糯米粉糊丸梧子大每服三五十九丸涼酒下隔一夜一服平旦一服午後方食

【葛洪肘后方】用恆山三兩知母一兩甘草半兩搗末爲丸梧子大先發時服十九次服七丸後服五六丸以瘧爲度

【和劑局方】瞻仰丸治一切瘧常山四兩炒存性

草果二兩炒存性爲末薄糊丸梧子大每臥時

冷酒服五十九五更再服忌鵝羊熱物

【勝金丸】治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山八

兩酒浸焙蒸板榔二兩生研末糊丸梧子大如

上法服

【集簡方】三聖丸治諸瘧不拘遠近大小雞骨恆

山雞心板榔各一兩生研饒鯉甲煨焦一兩半

爲末糯米粉丸菘豆大黃丹爲衣每服三五十

丸如上法服

●紫雪

【和劑局方】療傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫

走瘴疫毒癘卒死脚氣五尸五疰心腹諸疾疔

刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱

毒小兒驚癩百病黃金一百兩石膏寒水石滑

石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀

角屑羚羊角青木香沉香各五兩元參洗焙升

麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入前汁中煮

取一斗五升去渣入鍊朴消十斤消石三十二

兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲

盡傾水盆中待欲凝入麝香一兩二錢半硃砂

末三兩攪勻收之每服一二錢涼水服臨時加

減甚者一兩

●咒棗治瘧

【蚬螻神書】執棗一枚咒曰吾有棗一枚一心歸

大道優他或優降或劈火燒之唸七遍吹棗上

與病人食之即愈

●佩禳瘧疾

【楊氏家藏方】五月五日收大蝦蟆晒乾紙封絳

囊貯之繫背上男左女右勿令知之

●狐膽丸

【聖惠方】治邪瘧發作無時狐膽一個硃砂砒霜各半兩阿魏麝香黃丹菖豆粉各一分爲末五月五日午時粽子尖和丸梧子大空心及發前冷醋湯服二丸忌熱物

●諸瘧論

【發明】數曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切忌服之頌曰常山蜀漆爲治瘧之最要不可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩作一服殊味雷公老人久病切忌之戒時珍曰常山蜀漆有劫痰截瘧之功須在發散表邪及提出陽分之後用之得宜神效立見用失

其法真氣必傷夫瘧有六經瘧五臟瘧痰濕食積瘧疫鬼邪諸瘧須分陰陽虛實不可一概論也常山蜀漆生用則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅鯪鯉甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草果檳榔則入脾蓋無痰不作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指方云常山治瘧人皆薄之瘧家多苦痰涎黃水或停滯心下或結滯脇間乃生寒熱法當吐痰逐水常山豈容不用水在上焦則常山能吐之水在脇下則常山能破其滯而下其水但須行血藥品佐助之必收十全之功其有純熱發瘧或蘊熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄者須用

此大黃為佐泄利數行然後獲愈也又待制李  
燾云嶺南瘴氣寒熱所感邪氣多在營衛皮肉  
之間欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可  
但性吐人惟以七寶散冷服之即不吐且驗也

### 痢疾門

#### ●赤白痢下

【主治藏器方】赤白久熱痢取蚯蚓泥一升炒烟  
盡沃汁半升濾淨飲之

【肘后方】薑墨丸用乾薑好墨各五兩為末醋醬  
和丸梧子大每服三四十九丸米飲下日夜六七

服愈

【肘后方】頻數腸痛定粉一兩雞子清和炙焦為  
末冷水服一錢

【普濟方】黃丹炒紫黃連炒等分為末以糊丸麻  
子大每服五十九生薑甘草湯下

【聖惠方】蜜陀僧三兩燒黃色研粉每服一錢醋  
茶下日三服

【千金方】積年不愈飲調雲母粉方寸七服二服  
立見神效

【普濟方】赤石脂末飲服一錢

【生生方】白礬飛過為末好醋飛羅麵為丸梧子  
大赤痢甘草湯白痢乾薑湯下

【崔宣州衍所傳方】用甘草一尺炙劈破以淡漿  
水蘸水一升半煎取八合服之立效

【梅師方】用甘草一兩炙肉豆蔻七個煨剉以水  
三升煎一升分服

【崔元亮海上方】骨立者地榆一斤水三升煮一

升半去滓再煎如稠餈絞濾空腹服三合日再服

【楊子建護命方】並無寒熱只日久不止用黃連四十九個鹽梅七個入新瓶內燒烟盡熱研每服二錢鹽米湯下

【經驗方】如鵝鴨肝者痛不可忍用黃連黃芩各一兩水二升煎一升分三次熱服

【聖濟總錄】五月五日采青蒿艾葉等分同豆豉搗作餅日乾名蒿豉丹每用一餅以水一盞半煎服

【衛生家寶方】困重者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分爲末每服三錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯下名二靈散

【艾元英如宜方】陰陽交滯不問赤白劉季奴烏

梅白薑等分水煎服亦加梅白加薑

【集簡方】雞冠花煎酒服亦用紅白用白

【醫方摘元方】蒼耳草不拘多少洗淨用水煮爛去滓入蜜用武火熬成膏每服一二匙白湯下

【活幼全書】藍姑草卽淡竹葉菜煎湯日服之

【醫方摘要】龍牙草五錢陳茶一撮水煎服神效

【普濟方】腹痛腸滑後重大黃煨半兩葦蓉子炒

黑一撮爲末每服一錢米飲下

【衛生易簡方】金剛根蠟茶等分爲末白梅肉搗

丸芡子大每服五七丸小兒三丸白痢甘草湯

下赤痢烏梅湯下

【備急方】山豆根末蜜丸梧子大每服二十九空

腹白湯下三服卽止

【百一選方】罌粟子炒罌粟殼炙等分爲末煉蜜

丸梧子大每服三十九米飲下有人經驗

【本草方】鴉片木香黃連白朮各一分研末飯丸

小豆大壯者一分老者半分空心米飲下忌酸

物生冷油膩茶酒麵無不止者口渴略飲米湯

一方用罌粟花未開時外有兩片青葉包之花

開卽落收取爲末每米飲服一錢神效赤痢用

紅花白痢用白花

【傳信適用妙方】治營衛氣虛風邪襲入腸胃之

間便痢赤白臍腹疔痛裏急後重煩渴脹滿不

進飲食用乾蒸餅蜜拌炒二兩御米殼蜜炒四

兩爲末煉蜜丸芡子大每服一丸水一盞煎化

熱服

【肘后方】水穀不消以麴熬粟米粥服方寸七日

四五服

【食醫心鏡】葱白一握細切和米煮粥日日食之

【食醫心鏡】薤白一握同米煮粥日食之

【食療本草方】腹痛食不消化者用醋榴皮炙黃

爲末棗肉或粟米飯和丸梧子大每空腹米飲

服三十九日三服以知爲度如寒滑加附子赤

石脂各一倍

【肘后方】用皮燒存性爲末每米飲服方寸七日

三服效乃止

【本草方】不拘大人小兒用新櫛皮一斤去黑皮

切以水一斗煎取五升去滓煎膏和酒服

【普濟方】荔枝殼橡斗殼炒石榴皮炒甘草炙各

等分每以半兩水一盞半煎七分溫服日二服

【集簡方】胡椒菉豆各一歲一粒爲末糊丸梧子

大紅用生薑白用米湯下

【和劑局方】戊巳丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀

不化用吳茱萸黃連白芍藥各一兩同炒爲末

蒸餅爲丸梧子大每服二三十丸米飲下

【百一選方】變通丸治赤白痢日夜無度及腸風

下血用川黃連二兩吳茱萸二兩湯泡七次同

炒香揀出各自爲末粟米飯丸梧子大另收每

服三十九赤痢甘草湯下黃連丸白痢乾薑湯

下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙

西河山純老以傳蘇韜光者救人甚切

【鄧筆峯雜興方】二色丸治痢及水泄腸風用吳

茱萸二兩黃連二兩同炒香各自爲末以百草

霜末二兩同黃連作丸以白芍藥末二兩同茱

萸作丸各用飯丸梧子大各收每服五十九赤

痢烏梅湯下連霜丸白痢米飲下茱萸丸赤白

痢各半服之

【發明】楊士瀛曰薑茶治痢薑助陽茶助陰並能

消暑解酒食毒且一寒一熱調平陰陽不問赤

白冷熱用之皆涼生薑細切與真茶等分新水

濃煎服之蘇東坡以此治文潞公有效

【本草方】荷葉燒研每服二錢紅痢蜜白痢沙糖

湯下

【唐瑤經驗方】午日午時取完好葶藶洗淨拭乾

勿令損破於瓶內入好燒酒浸之黃泥密封收

貯遇有患者取二枚細嚼空心用原酒送下

【發明】時珍曰阿魏消肉積殺小蟲故能解毒辟

邪治瘡痢疳勞尸注冷痛諸證以黃連木香湯

下瘡痢亦多起于積滯故爾

【發明】頌曰訶黎主痢唐本草不載張仲景治氣

痢有方唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白痢下諸藥服遍久不瘳轉爲白膿令狐將軍傳此方用訶黎勒三枚兩炮一生並取皮末之以沸漿水一合服之若只水痢加一錢七甘草末若微有膿血加三七血多亦加三七

【趙原陽濟急方】訶子十二個六生六煨去核焙爲末赤痢生甘草湯下白痢炙甘草湯下不過再服

【外臺祕要】五六年者荆瀝每日服五合

【李延壽方】黑牛散治赤白痢噤口痢及泄瀉用黑牛兒卽蜣螂一名鐵甲將軍燒研每服半錢或一錢燒酒調服小兒以黃酒服立效

【心鏡方】白雄雞一隻如常作醃及餛飩空心食  
【葛氏方】雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存

性以酒服一錢七

【類澄方】生雞子一個取白攤連紙上日乾摺作四重包肥烏梅十個安熨斗中以白炭燒存性取出碗覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三服空心井華水調下如覺微利不須再服

【普濟方】臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚內餅固濟煨存性研末以好酒煮黃蠟百沸取蠟和丸梧子大每服一二十九紅痢甘草湯下白痢乾薑湯下

【食醫心鏡】腰痛用豬腎二枚研爛入陳皮椒醬作餛飩空心食之

【奇效方】十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許陰乾每用五七粒爲末生薑湯調服

【本草方】臘豬骨燒存性研末溫酒調服三錢

【奇效良方】臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿

麝香少許每服一枚亦以甘草湯白以乾薑湯

送下

【聖惠方】臘月狗頭骨一兩半燒灰爲末紫笋茶

末一兩爲末每服二錢米飲下

【肘后方】馬糞一丸燒灰水服

【和劑局方】黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調

下痢赤白裏急厚重腹痛小便不利用阿膠炒

過水化成膏一兩黃連三兩茯苓二兩爲末搗

丸梧子大每服五十九丸粟米湯下日三服

●血痢不止

【祕寶方】腹痛者膩粉五錢定粉三錢同研水浸

蒸餅心少許和丸棗豆大每服七丸或十九丸

一枚水一盞煎湯下

【崔知悌方】十年者石灰三升熬黃水一斗投之

澄清一服一升日三服

【普濟方】不止者蛇含石二枚火煨醋淬研末每

服三錢米飲下

【救急方】不止者白鹽紙包燒研調粥吃三四次

卽止也

【集簡方】不止者鳳尾草根卽貫衆五錢煎酒服

陳解元吉言所傳

【瀕湖集簡方】赤痢血痢三七三錢研末米泔水

調服卽愈

【千金方】有熱毒者宜黃連一兩水二升煮取半

升露一宿空腹熱服臥將息一二日卽止

【勝金方】累治不瘥黃連一兩雞子白和爲餅炙

紫為末以漿水三升慢火煎成膏每服半合温

水飲下

一方以雞子白和丸服

【普濟方】不止者胡黃連烏梅肉竈下土等分為

末臘茶青下

【仁存方】不止者苦參炒焦為末水丸梧子大每

服十五丸米飲下

【普濟方】不止者薄荷葉煎湯常服

【發明】時珍曰宋張叔潛秘書知劍州時其閣下

病血痢一醫用平胃散一兩入川續繼末二錢

半每服二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行

痢疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢服

之效

【聖惠方】木賊五錢水煎温服一日一服

【聖惠方】血痢產痢冬葵子為末每服二錢入臘

茶一錢沸湯調日三服

【聖惠方】地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末每

服方寸七温水調下

【聖惠方】熱毒血痢忍冬藤濃煎服

【乾坤生意方】地錦草晒研每服二錢空心米飲

下

【外臺方】用麻子仁汁煮菘豆空心食極效

【普濟方】秫米一把鯽魚鮓二瓣葱白一虎口煮

粥食之

【普濟方】熱痢便血粟殼醋炙一兩陳皮半兩為

末每服三錢烏梅湯下

【必效方】以大麻子水研濾汁煮菘豆食之極效

粥食亦可

【王氏博濟方】用豆豉大蒜等分杵丸梧子大每服三十九鹽湯下

【藥性論】血痢如刺以豉一升水漬相淹煎兩沸絞汁頓服不瘥再作

【陳藏器方】用雍同黃蘗煮汁服之

【聖惠方】腹痛日夜不止者以薑薑葉搗汁二合入蜜一合溫服

【姚氏集驗方】用乾薑燒黑存性放冷爲末每服一錢米飲下神效

【普濟方】血痢下血木耳炒研五錢酒服即可亦用井華水服或以水煮鹽醋食以汁送下

【發明】醫說載曾魯公痢血百餘日國醫不能療陳應之用鹽水梅肉一枚搗爛合臘茶入醋服之一啜而安

大丞梁莊肅公亦痢血應之用烏梅黃連灶下土等分爲末茶調服亦效蓋血得酸則斂得寒則止得苦則瀉故也

【直指方】赤痢腹痛用陳白梅同真茶蜜水各半煎飲之

【聖惠方】用烏梅肉炒黃連各四兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲服二十九日三服

【總錄】用胡桃仁枳殼各七個皂角不蛀者一挺新瓦上燒存性研爲細末分作八服每臨臥時一服二更一服五更一服荊芥茶下

【聖惠方】橡實二兩楮葉炙一兩縮砂仁半兩爲末每服一錢食前烏梅湯調下

【活濟方】荷葉蒂水煮汁服之

【普濟方】血痢瀉血烏藥燒存性研末陳米飯丸

梧子大每米飲下三十九

【普濟方】血痢下血臘月日未出時取背陰地北引椗根皮東流水洗淨掛風處陰乾爲末每二兩入寒食麵一兩新汲水丸梧子大陰乾每服三十九水煮滾傾出溫水送下忌見日則無效名如神丸

【千金方】血痢連年秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎取汁銅器重釜煎成丸如梧子大每服五六九日二服稍增以知爲度亦可煎飲

【普濟方】沒石子一兩爲末飯丸小豆大每食前米飲下五十九

【本草方】文蛤炒研末水浸烏梅肉和丸梧子大每服七十九烏梅湯下

【聖惠方】鱒魚鮮二瓣切穢米一把薤白一虎口

切合煮粥食之

【傳信】內熱者海蛤末蜜水調服二錢日二服

【救急方】脇熱者用猪大腸一條入芫荽在內煮食

食

【奇效方】用猪臟入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲三十九

又方猪臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗丸

如梧子大每服二十九溫酒下

【普濟方】乳腐一兩漿水一鍾煎服

●下痢噤口

【經驗良選方】人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎一盞細細呷之或加薑汁炒黃連三錢

【簡便方】獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盞和服

匙以白酒半盞和服

【邵真人經驗方】木鼈仁六個研泥分作二分川麪燒餅一個切作兩半只用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熱餅其痢卽止遂思飲食

【發明】楊士瀛曰下痢噤口雖是脾虛亦熱氣閉隔心胸所致俗用木香失之溫用山藥失之閉惟參苓白朮散加石菖蒲粳米飲調下或用參苓石蓮肉少入菖蒲服胸次一開自然思食

【坦仙方】蕎麥麪每服二錢砂糖水調下

【經驗良方】糯穀一升炒出白花去殼用薑汁拌濕再炒爲末每服一匙湯下三服卽止

【千金方】及小兒泄痢大蒜搗貼兩足心亦可貼臍中

【本草方】蘿蔔搗汁一小盞蜜一盞水一盞同煎

早一服午一服日晡米飲吞阿膠丸百粒如無蘿蔔以子搗汁亦可

一方加枯礬七分同煎

一方只用蘿蔔菜煎湯日日飲之

【普濟方】用蘿蔔片不拘新舊染蜜噙之嚙汁味淡再換覺思食以肉煮粥與食不可過多

【衛生易簡方】山藥半生半炒爲末每服二錢米飲下

【摘元方】沙糖半斤烏梅一個水二碗煎一碗時時飲之

【乾坤生意方】肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性爲末以少許入白米粥內食之卽效

【趙宜真濟急方】紅木槿花去蒂陰乾爲末先煎麵餅二個蘸末食之

【本草方】用水蛙一個并腸肚搗碎瓦焙熟入麝

香五分作餅貼臍上氣通即能進食也

【丹溪方】用大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅

烘熟貼臍間半日熱氣下行即思食矣甚效

【心鏡方】黃肥雌雞一隻如常爲臙作濕餛飩食

之空心服

【本草方】雞內金焙研乳汁服之

【李樓奇方】臘肉脯煨熟食之妙

●久痢噤口

【丹溪心法】用石蓮肉炒爲末每服二錢陳倉米

飲調下便覺思食甚妙加入香蓮丸尤妙

【楊拱醫方】病勢欲死用金絲鯉魚一尾重一二

斤者如常治淨用鹽醬葱必入胡椒末三四錢

煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病

即除根屢治有效

●血痢噤口

【直指方】用活鱒魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬

末二錢以椶包紙裏煨存性研末每服二錢米

飲下每日二服

●久痢不止

【普濟方】用當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸

不用爲末蜜丸梧子大每服三十九米飲下名

勝金丸

【聖濟總錄】艾葉陳皮等分煮湯服之亦可爲末

酒煮爛飯和丸每鹽湯下二三十丸

【聖惠方】變種種痢兼脫肛葇蓉丸用葇蓉子一

升淘去浮者煮令芽出晒乾炒黃黑色青州棗

一升去皮核醃醋二升同煮搗膏丸梧子大每

服二十九食前米飲下

【普濟方】水泄久痢川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟研丸菘豆大每服五丸黃連湯下

【聖濟總錄】久痢休息熟附子半兩研末雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下

【本草方】罌粟殼醋炙爲末蜜丸彈子大每服一丸水一盞薑三片煎八分溫服

又方罌粟殼十兩去膜分作三分一分醋炒一分蜜炒一分生用並爲末蜜爲丸芡子大每服三十九米湯下

【集要百中散】用粟殼蜜炙厚朴薑製各四兩爲細末每服一錢米飲下忌生冷

【集要方】阿芙蓉小豆少許空心溫水化下日一服忌葱蒜漿水若渴飲蜜水解之

【主治大明】薺花陰乾研末棗湯下日服二錢

【簡便單方】茄根燒灰石榴皮等分爲末以沙糖水服之

【肘后方】腸垢已出用烏梅肉二十個水一盞煎六分食前分二服

【袖珍】用烏梅肉白梅肉各七個搗爛入乳香末少許杵丸梧子大每服二三十丸茶湯下日三服

【普濟方】腸滑久痢黑神散用酸石榴一個煨烟盡出火毒一夜研末仍以酸榴一塊煎湯服神效無比

【經驗方】又用石榴一個劈破炭火簇燒存性出

火毒為末每服一錢別以酸石榴一瓣水一盞煎湯調服

【普濟方】久痢久瀉陳石榴皮酢者焙研細末每服二錢米飲下患二三年或二三月百方不效者服之便止不可輕忽之也

【普濟方】楊梅燒研每米飲服二錢日二服

【聖濟總錄】槲白皮薑汁炙五度一兩乾薑炮半兩為末每服二錢米飲酒下

【普濟方】滑痢不止倦怠減食吳茱萸湯泡過炒猪臟半條去脂洗淨裝滿扎定文火煮熟搗丸梧子大每服五十九丸米飲下日二服

【醫方摘要】諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色屢驗皂角子瓦焙為末米糊丸梧子大每服四五十丸陳茶下

【普濟方】嚴緊絕妙方罌粟殼醋炒金罌花葉及子等分為末蜜丸芡子大每服五七丸陳皮煎湯化下

【本草方】用五倍子一兩半生半燒為末糊丸梧子大每服三十九丸紅痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯下

【集靈】用五倍子末每米飲服一錢

【本草方】滑痢不止用五倍子醋炒七次為末米湯送下

【發明】時珍曰聖濟總錄治久痢不止有金星地鱧散用金星地鱧醋炙鉛丹白礬燒各五錢為末每服二錢米飲下日二服

●久痢休息

【和劑局方】經一二年不瘥羸瘦衰弱砒霜成塊

者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條攪焦則  
換至七條入起收之每旋丸梧子大冷水送下

小兒黍米大

【聖惠方】時止時作鼠尾草花搗末飲服一錢

【聖濟總錄】熟附子半兩研末雞子白二枚搗和

丸梧子大傾入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲

下

【普濟方】白豆腐醋煎食之卽愈

【本草方】日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛東垣

脾胃論用椿根白皮訶黎勒各半兩母丁香三

十個爲末醋糊丸梧子大每服五十九米飲下

【唐瑤經驗方】用椿根白皮東南行者長流水內

漂三日去黃皮焙爲末每一兩加木香二錢麪

米飯爲丸每服一錢二分空心服米飲下

【肘后方】龍骨四兩打碎水五升煮取二升半分

五服冷飲仍以米飲和丸每服十九

【千金方】獾豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋

內一重肝一重杏仁入童子小便二升文火煎

乾取食日一次

【外臺方】五十日以上一二年不瘥變成疔下如

泔淀者用生羊肝一具切絲入三年醋中吞之

心悶則止不悶更服一日勿食物或以薑薤同

食亦可不過二三具卽止

【張文仲方】經年不愈取大蟲骨炙黃焦搗末飲

服方寸七日三服卽效

【聖惠方】杏仁去皮麪炒研以豬肝一具切片水

洗血淨置淨鍋中一重肝一重杏仁鋪盡以童

便二升同煎乾放冷任意食之

●熱毒下痢

【聖惠方】挾熱下痢膿血竈突中墨黃連各一兩  
為末每酒下一錢日二服

【指南方】脇熱下痢赤白用硫黃蛤粉等分為末

糊丸梧子大每服十五丸米飲下

【鮮于樞鉤元】熱痢腹痛胡黃連末飯丸梧子大

每米湯下三十九

【濟急方】積熱下痢柴胡黃芩等分半酒半水煎

七分浸冷空心服之

【肘后方】熱病下痢困篤者大青湯用大青四兩

甘草赤石脂三兩膠二兩鼓八合水一斗煮三

升分三服不過二劑瘥

【聖惠方】熱痢不止車前葉搗汁入蜜一合煎溫

服

【聖濟總錄】蒲根二兩粟米二合水煎服日二次

【丹溪心法方】濕熱泄痢丹溪青六丸用六一散

加炒紅麴五錢為末蒸餅和丸梧子大每服五

七十九白湯下日三服

【海上名方】積熱瀉痢冬瓜葉嫩心拖麵煎餅食

之

【本草方】孟詵曰赤白下痢以好茶一斤炙搗末

濃煎一二盞服久患痢者亦宜服之

【直指方】用臘茶赤痢以蜜水煎服白痢以連皮

自然薑汁同水煎服二三服即愈

【經驗良方】用臘茶二錢湯點七分入麻油一蜆

殼和服須臾腹痛大下即止一少年用之有效

一方臘茶末以白梅肉和丸赤痢甘草湯下白

痢烏梅湯下各百丸

一方建茶合醋煎熱服卽止

【鄧筆峯雜興方】熱瀉下痢五倍子一兩枯礬五

錢爲末糊丸梧子大每服五十九米湯送下

【肘后方】熱病下痢欲死者龍骨半斤研末水一

斗煮取五升候極冷稍飲得汗卽愈效

●熱痢裏急

【集簡方】大黃一兩浸酒半日煎服取利

●裏急後重

【普濟方】不蛀皂角子米糠炒過枳殼炒等分爲

末飯丸梧子大每服米飲下三十九

【普濟方】下痢裏急穿山甲蛤粉等分同炒研末

每服一錢空心溫酒下

●水穀下痢

【必效方】小豆一合鎔蠟三兩頓服取效

【食醫心鏡】韭葉作羹粥煨炒任食之良

【聖惠方】日夜百餘行者橡實一兩楮葉炙一兩

爲末每服一錢食前烏梅湯調下

【梅師方】久不瘥者厚朴三兩黃連三兩水三升

煎一升空心細服

【劉禹錫傳信方】及每至立秋前後卽患痢兼腰

痛取樗根一大兩搗篩以好麵捻作餛飩如皂

子大水煮熟每日空心服十枚並無禁忌神良

【近效方】棕櫚皮燒研水服方寸七

【張文仲方】牛骨灰同六月六日麵炒等分爲末

飲服方寸七乃御傳方也

●暑痢連月

【發明】時珍曰按洪邁夷堅志云虞雍公允文感

暑痢連月不瘥忽夢至一處見一人如仙官延

之坐壁間有藥方其辭云暑毒在脾濕氣連脚  
不泄則痢不痢則瘡獨鍊雄黃蒸餅和藥別作  
治療醫家大錯公依方用雄黃水飛九度竹筒  
盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下  
七九日三服果愈太平廣記載成都劉無名服  
雄黃長生之說方士言爾不可信

●脾虛泄痢

【楊子建議命方】脾虛下白脾胃虛冷停水滯氣  
凝成白涕下出船上硫黃一兩研末麵炒一分  
同研滴冷熱水丸梧子大每米湯下五十九  
【養老書】青梁米半升神麴一合日日煮粥食即  
愈

【集靈方】五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細  
辛木香各三錢花椒五錢為末每服一錢蜜湯

下日二服忌生冷魚肉

【心鏡方】用黃雌雞一隻炙以鹽醋塗煮熟食之  
【本草方】脾虛滑泄烏骨母雞一隻治淨用豆寇  
一兩草果一枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟  
空心食之

【食醫心鏡】日夜不止野雞一隻如食法入橘皮  
葱椒五味和作餛飩煮空心食之

●脾泄氣痢

【養老方】老人氣痢虛冷赤石脂五兩水飛白麵  
六兩水煮熟入葱醬作臛空心食三四次即愈  
【續傳信方】肉豆蔻一顆米醋調麵裹煨令焦黃  
和麵研末更以攪子炒研末一兩相和又以陳  
廩米炒焦為末和勻每以二錢煎作飲調前二  
味三錢日暮各一服便瘥

【發明】時珍曰乳煎葦芡治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾因此疾卽具疏以乳煎葦芡方上服之立愈宣下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及爾耶卽命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤葦芡三錢同煎減半空腹頓服

●氣痢後重

【杜壬方】裏急或下泄薑連散用宜連一兩乾薑半兩各爲末收每用連一錢薑半錢和勻空心溫酒下或米飲下神妙

【濟生方】祕傳香連丸用黃連四兩木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盃煮焙研醋調倉米糊丸如常日服五次

【圖經本草】氣痢水瀉訶黎勒十枚麵裹煇火煨熟去核研末粥飲頓服亦可飯丸服一加木香

【又長服方】訶黎勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧子每日服二三十丸白湯下

【經驗方】久痢赤白巴豆一兩去皮心熬研以熟豬肝丸菘豆大空心米飲下三四丸量大用此乃鄭獬侍御所傳方也

【聖惠方】氣痢不止寒食一百五日采木蓼暴乾用時爲末粥飲服一錢

●一切痢下

【瀧江方】初起一服如神名鐵刷丸百草霜三錢

金墨一錢半夏七分巴豆煮十四粒研勻黃蠟三錢同香油化開和成劑量大小每服三五丸或四五十丸薑湯下

【普濟方】一切積痢砒霜黃丹等分蠟和收旋丸棗豆大每米飲下三丸

【孫兆祕寶方】不拘丈夫婦人小兒木香一塊方圓一寸黃連半兩二味用水半升同煎乾去黃連薄切木香焙乾爲末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米湯下三服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也

【集簡方】諸痢初起大黃煨熟當歸各二三錢壯人各一兩水煎服取利或加檳榔

【發明】頌曰崔元亮集驗方載勅賜薑茶治痢方

生薑切細和好茶一兩盃任意呷之便瘥若是熱痢留薑皮冷痢去皮大妙楊士瀛曰薑能助陽茶能助陰二物皆消散惡氣調和陰陽解濕熱及酒食暑氣之毒不問赤白通宜用之蘇東坡治文潞公有效

【劉河間宣明方】一切瀉痢脈浮洪者多日難已脈微小者服之立止名勝金膏巴豆皮楮葉同燒存性研化蠟丸棗豆大每甘草湯下五丸

【發明】頌曰治一切痢經霜桑葉微炙和桑衣煎服日三五次效

●泄瀉下痢

【摘元方】赤白用棗肉搗爛入黃丹白礬各皂子大粳米飯一團和丸彈子大鐵線穿於燈上燒過研末米飲服之

【經驗方】白龍丹用明礬枯過爲末飛羅麵醋打

糊丸梧子大每服二三十丸白痢薑湯下赤痢

甘草湯下泄瀉米湯下

【正要方】泄痢不固白麵一斤炒焦黃每日空心

溫水服一二匙

●下痢腹痛

【肘后方】赤白令人下部疼重故名重下日夜數

十行臍腹絞痛以黃連一升酒五升煮取一升

半分再服當止絞痛也

【發明】時珍曰華老年五十餘病下痢腹痛垂死

已備棺木予用元胡索三錢米飲服之痛卽減

十之五調理而安

【心鏡方】狗肝一具切入米一升煮粥合五味食

【千金方】羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食

之

●虛寒下痢

【仁存方】腸滑不禁鍼砂七錢半官桂一錢枯礬

一錢爲末以涼水調攤臍上下縛之當覺大熱

以水潤之可用三四次名玉胞肚

【仁存方】硫黃半兩蓖麻仁七個爲末填臍中以

衣隔熱湯熨之止乃已

【外臺方】羊肉一片萹荇子末一兩和以綿裹納

下部二度瘥

●冷滑下痢

【藥性論】不禁虛羸用縮砂仁熬爲末以羊子肝

薄切摻之瓦上焙乾爲末入乾薑末等分飯丸

梧子大每服四十九丸白湯下日二服

又方縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘皮等分爲

末飯九梧子大每服四十九米飲下日三服

【發明】時珍曰按趙潛養痾漫筆云宋孝忠患痢

衆醫不效高宗偶見一小藥肆召而問之其人

問得病之由乃食湖蟹所致遂診脈曰此冷痢

也乃用新采藕節搗爛熱酒調下數服即愈高

宗大喜就以搗藥金杵曰賜之人遂稱爲金杵

白嚴防禦家可謂不世之遇也大抵藕能消痰

血解熱開胃而又解蟹毒故也

●冷勞泄痢

【普濟方】食少諸藥不效白礬三兩燒羊肝一具

去脂醃醋三升煮爛搗泥和九梧子大每服二

十九米飲下早夜各一服

【聖濟總錄】漏盧一兩艾葉炒四兩爲末米醋三

升入藥末一半同熬成膏入後末和九梧子大

每溫水下三十九

●冷痢厥逆

【經驗方】六脈沉細人參大附子各一兩半每服

半兩生薑十斤丁香十五粒粳米一撮水二盞

煎七分空心溫服

【本草方】大腸冷痢準牛角鰓燒灰飲服二錢日

二次

●冷疝下痢

【孟詵必效方】葇荳子爲末臘豬脂和丸綿裹棗

許導下部因痢出更納新者不過三度瘥

●下痢滯痛

【聖惠方】春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩木

香二兩水五升煎一升半分三服

●下痢水泄

【聖惠方】吳茱萸炮炒黃連炒各二錢水煎服未  
止再服

●下痢咳逆

【本草方】脈沉陰寒者退陰散主之陳自明云一  
人病此不止服此二服而愈用川烏頭乾薑等  
分切炒放冷爲散每服一錢水一盞鹽一撮煎  
取半盞溫服得汗解

●久冷下痢

【千金方】或不痢腰腹若冷用蜀椒三升酢漬一  
宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升瘥

●下痢鮮血

【聖惠方】犀角地榆生地黃各一兩爲末煉蜜丸  
彈子大每服一丸水一升煎五合去滓溫服

【食療本草】梔子仁燒灰水服一錢七分

【經驗方】腹中刺痛椿根白皮洗刮晒研醋糊丸  
梧子大每空心米飲下三四十九  
一方加蒼朮枳殼減半

●下痢轉白

【普濟方】因脾胃虛冷停水滯氣凝成白涕下出  
訶子三個二炮一生爲末沸湯調服水痢加甘  
草末一錢

●下痢口渴

【必效方】引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二  
十個細剉以水一升煮取七合細細呷之

【扶壽精方】烏梅煎湯口飲代茶

【普濟方】羊肺一具入少肉和鹽豉作羹食不過  
三具愈

●暴作瀉痢

【續十全方】百草霜末米飲調下二錢

【發明】時珍曰歐陽公常得暴下病國醫不能治

夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車

前子一味為末米飲服二錢七分云此藥利水

道而不動氣水道利則清濁分而穀藏自止矣

●腸蠱下痢

【肘后方】凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸

蠱牛膝二兩搗碎以酒一升漬經一宿每服一

兩益日三服

【圖經】男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或濃

血如淀色柏葉焙乾為末與黃連同煎為汁服

之

●傷寒下痢

【仲景傷寒論要】心下痞斬利在下焦者赤石脂

禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各一斤並碎之

水六升煮取一升去滓分再服

【肘后方】不能食者黃連一升烏梅二十枚去核

炙燥為末蠟一基子大蜜一升合煎和九梧子

大每服二十九日三服

又方黃連二兩熟艾如鴨子大一團水三升煮

取一升頓服立止

【外臺方】傷寒八九日至十餘日大煩渴作熱三

焦有瘡蠱下痢或張口吐舌目爛口舌生瘡不

識人用此除熱毒止痢龍骨半斤水一斗煮四

升沉之井底冷服五合漸漸進之

●水泄寒痢

【十便良方】大草烏一兩以一半生研一半燒灰

醋糊丸菉豆大每服七丸井華水下忌生冷魚

肉

【肘后方】青色者用乾薑切大豆大每米飲下六七枚日三服夜一服累用得效

●諸痢脾泄

【直指方】臟毒下血雅州黃連半斤去毛切裝肥豬大腸內紮定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末搗腸和丸梧子大每服百丸米湯下極效

●冷痢腹痛

【和劑局方】有下白凍如魚腦桃花丸赤石脂煨乾薑炮等分為末蒸餅和丸量大小服日三服  
【聖惠方】不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和麪裹煨搗末每服一錢粥飲調下

【楊子建護命方】白凍五月五日采麻葉陰乾為末每服二錢冷水調下勿吃熱物令人悶倒只

吃冷物小兒半錢

【外臺方】白色者炒麪以方寸匕入粥中食之能療日瀉百回師不救者

【千金方】泄瀉暴痢大蒜搗貼肉足心亦可貼臍中

【食療】生薑煨研為末共乾薑末等分以醋和麪作餛飩先以水煮又以清飲煮過停冷吞二七枚以粥送下日一度

●寒瘡冷痢

【普濟方】端午日以獨頭蒜十個黃丹二錢搗丸梧子大每服九丸長流水下甚妙

●餐泄滑痢

【保命集】久痢椒朮丸用蒼朮二兩川椒一兩為末醋糊丸梧子大每服二十九食前溫水下惡

痢久者加桂

【百一選方】不止者白茯苓一兩木香煨半兩爲末紫蘇木瓜湯下二錢

●老人虛痢

【濟生方】虛痢危困因氣血衰弱者鹿茸酥炙一

兩爲末入麝香五分以燈心煮棗肉和丸梧子

大每空心米飲下三五十九

【十便良方】不能飲食上黨人參一兩鹿角去皮

炒研五錢爲末每服方寸七米湯調下日三服

●一切積痢

【本事方】靈砂丹用礪砂硃砂各二錢半爲末用

黃蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內重

湯煮一沸時候豆紫色爲度去二七粒止將一

七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸菉豆大或

三九五九淡薑湯下

【劉守真宣明方】積滯泄痢腹痛裏急杏仁去皮

尖巴豆去皮心各四十九個同燒存性研泥溶

蠟和丸菉豆大每服二三九煎大黃湯下間日

一服一加百草霜三錢

●赤痢熱燥

【普濟方】粳米半升水研取汁入油瓷瓶中蠟紙

封口沉井底一夜平旦服之吳內翰家乳母病

此服之有效

●赤痢腹痛

【經驗方】臍痛者用黑豆菉莢子二件搓摩吞嚥

之良

【直指方】用陳白梅同真茶蜜水各半煎飲之

【聖惠方】用烏梅肉炒黃連各四兩爲末煉蜜丸

梧子大每米飲服二十九日三服

【千金方】臍痛用茱萸合黑豆湯吞之

●便痢膿血

【聖濟總錄】烏梅一兩去核燒過爲末每服二錢

米飲下立止

【發明】奇效良方云昔有男子病膿血惡痢痛不可忍以水浸甜瓜食數枚卽止此亦消暑之驗

也

【楊子建護命方】毒痢膿血六脈微小並無寒熱宜以桑寄生二兩防風大芎二錢半炙甘草三錢爲末每服二錢水一盞煎八分和滓服

●濕痢腸風

【百一選方】或臟毒下血或下赤白日夜無度及腸風者變通丸用川黃連去毛吳茱萸湯炮過

各二兩同炒香揀出各爲末以粟米飯和丸梧

子大各收每服三十九丸赤痢甘草湯下黃連丸

白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯

下此乃浙西河山純老方救人甚效

【局方】戊己丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化

用二味加白芍藥同炒研蒸餅和丸服

●久痢成疳

【發明】藏器曰用胡粉和水及雞子白服以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也

【本草方】葛勒蔓末以管吹入肛門中不過數次如神

●老小白痢

【永類方】艾薑丸用陳北艾四兩乾薑炮三兩爲末醋煮倉米糊丸梧子大每服七十九空心米

飲下甚有奇效

●水痢百病

【張文仲備急方】用馬藹子以六月六日麴熬各等分爲末空心米飲服方寸七如無六月六日麴常麵亦可牛骨灰亦可

又方馬藹子乾薑黃連各等分爲散熱湯服二方寸七入腹卽斷也冷熱皆治常用神效不得輕之忌豬肉冷水

【普濟方】水泄久痢川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮熟研丸菘豆大每服五丸黃連湯

下

【指南方】水痢不止大豆一升炒白朮半兩爲末每服三錢米飲下

【普濟方】水痢百起六月六日麴炒黃馬藹子等

分爲末米飲服方寸七無馬藹子用牛骨灰代

之

【食醫心鏡】水痢不止林檎半熟者十枚水二升煎一升并林檎食之

【張文仲方】用朽骨灰六月六日麴炒等分爲末飲服方寸七乃御傳方也

●五色諸痢

【集簡方】返魂丹用零陵香草去根以鹽酒浸半月炒乾每兩入廣木香一錢半爲末裏急腹痛者用冷水服一錢半通下三四次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味

【本事方】用大熟瓜萐一個煨存性出火毒爲末作一服溫酒服之胡大卿一僕患痢半年杭州以道人傳此方面愈

【聖濟方】或膿或水冷熱不調酸石榴五枚連子

搗汁二升每服五合神妙

【壽域方】用猬皮燒灰酒服二錢

●五疳八痢

【韓氏醫通方】四治黃連丸用連珠黃連一斤分

作四分一分用酒浸炒一分用自然薑汁炒一

分用吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益

智研末白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四

兩廣木香二兩爲末蒸餅和丸菉豆大每服三

十九米飲食前下日三服忌猪肉冷水

●痢及瀉血

【普濟方】胡荽子一合炒搗末每服二錢赤痢沙

糖水下白痢薑湯下瀉血白湯下日二服

【普濟方】用烏龜肉以沙糖水拌椒和炙煮食之

多度卽愈

【羅天益衛生寶鑑方】一切惡痢雜下及休息痢

百歲丸用漏藍子一個大者阿膠木香黃連罌

粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許爲末糊

丸梧子大每一歲一丸米飲下

●赤痢經年

【主治時珍方】普濟用豆豉蒸熟隨意食之良

●一切泄痢

【和劑局方】泄痢注下三神丸治清濁不分泄瀉

注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重用草烏頭

三個去皮尖以一個火炮一個醋煮一個燒灰

爲末醋糊丸菉豆大每服二十九水瀉流水下

赤痢甘草湯下白痢薑湯下忌魚腥生冷

【必用食治方】白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾

湯淪過和小豬脊脂肉一條葱一根胡椒七粒  
將汁拌勻就以淪豆花汁和麪包作小餛飩炙  
熟食之

【御藥院方】乾木耳一兩炒鹿角膠二錢五分焙  
爲末每服三錢溫酒調下日二服

●久痢三十年

【聖惠方】赤松上蒼皮一斗爲末麵粥和服一升  
日三服不過一斗救人甚效

●赤白重下

【本草方】葛氏用豆豉熬小焦搗服一合日三服  
或炒焦以水溫汁服亦效

【外臺】用豆豉心炒爲末一升分四服酒下入口  
卽斷也

●濕蘆下痢

【拾遺方】不止乾嘔羸瘦多睡面赤者用豬膽汁  
和薑汁酸醋同灌下部捻令醋氣上至咽喉乃  
止當下五色惡物及蟲而愈

●酒痢便血

【經驗良方】如魚腦五色者乾絲瓜一枚連皮燒  
研空心酒服二錢

一方煨食之俗名魚鱗是也

【本事方】百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒  
糊丸梧子大每服五十九丸米飲送下

●老少瘡痢

【楊炎南行方】日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬  
搗爲末每服方寸七烏梅湯下日再服取羊肉  
裹末納肛中痢出卽止

●洞注下痢

【發明千金方】用炒陳倉米研末飲服日華子謂其澀腸胃寇氏謂其冷痢皆非中論

【千金方】羊骨燒灰水服方寸七

●老少下痢

【發明】食入卽吐華陀治用白蠟方寸七雞子黃一個石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可丸乃止二日服盡神效無比也此方用之屢經效驗乃知本經主下痢膿血之言深當服膺也

●順氣止痢

【嬰童百問】枳殼炒二兩四錢甘草六錢爲末每

沸湯服二錢

●熱痢吐食

【本草方】有因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗

淨晒乾爲末每服一錢米飲下

●白頭翁湯

【仲景金匱玉函方】治熱痢下重用白頭翁二兩黃連黃蘗秦皮各三兩水七升煮二升每服一升不愈更服婦人產後痢虛極者加甘草阿膠各二兩

●香連丸

【李絳兵部手集】治赤白諸痢裏急後重腹痛用宜黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二二十九空腹飲下日再服其效如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰兒皆效

【易簡方】黃連茶萸炒過四兩木香麪煨一兩粟米飯丸

【錢仲陽】香連丸治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉

又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻

又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖

【劉河間】治久痢加龍骨

【朱丹溪】治禁口痢加石連肉

【王氏】治痢渴加烏梅肉以阿膠化和為丸

●調氣飲

【金匱方】治赤白痢小腹痛不可忍下重或面青

手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入

黃連末五錢攪勻分三次熱服神效

●千金膠蠟湯

【千金方】治熱痢及婦人產後下痢用黃蠟三基

子大阿膠二錢當歸二錢半黃連三錢黃蘗一

錢陳廩米半升水三鍾煮米至一升去米入藥

煎至一鍾溫服神效

●豬脰酒

【崔元亮海上方】治冷痢久不瘥此是脾氣不足

暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小

腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸

成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂悶四肢無力

丈夫疥癬兩脅虛脹變為水氣服之皆效此法

出于傳尸方

取豬脰一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一

大升微火溫之藥熟納脰中使消盡又取桂心

末一小兩納酒中每日溫服一小盞午夜各再

一服甚驗忌麵油膩等食

●紫參湯

【張仲景金匱玉函】治痢下紫參半斤水五升煎

二升入甘草二兩煎取半升分三服

# 泄瀉門

## ●水泄不化

【普濟方】日夜不止白堊煨乾薑炮各一兩楮葉生研二兩爲末糊丸菘豆大每米飲下二十九  
【博濟方】水泄脾泄神聖香黃散宣連一兩生薑四兩同以文火炒至薑脆各自揀出爲末水泄用薑末脾泄用連末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾

【經驗方】罌粟殼一枚去蒂膜烏梅肉大棗肉各十枚水一盞煎七分溫服

【聖惠方】殺羊角一枚白礬末填滿燒存性爲末每新汲水服二錢

## ●暑毒泄痢

【發明】按洪邁夷堅志云虞雍公允文感暑痢連

月不寤忽夢至一處見一人如仙官延之坐壁間有藥方其詞云暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨鍊雄黃蒸餅和藥別作治療醫家大錯公依方用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服果愈

## ●水瀉腹鳴

【李樓奇方】石膏火煨倉米飯和丸梧子大黃丹爲衣米飲下二十九不二服效

## ●脾虛泄瀉

【丹溪心法】白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨爲末米飲丸梧子大每米飲下五十九日二服

【本草方】脾腎虛瀉二神丸用破故紙炒半斤肉

豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧子大

每空心米飲服五七十九

【本事方】加木香二兩名三神丸

【普濟方】臍寒泄瀉倦怠減食吳茱萸湯泡過炒

豬臟半條去脂洗淨裝滿紮定文火煮熟搗丸

梧子大每服五十九米飲下日二服

●老人泄瀉

【太平聖惠方】不止者用枯礬一兩訶黎勒煨七

錢半為末米飲服二錢取愈

【簡便方】白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五

錢泔浸炒茯苓一兩為末米糊丸梧子大每米

湯下七八十九

【簡便方】乾糕一兩薑湯化代飯

●大腸寒滑

【寇氏衍義】小便精出者赤石脂乾薑各一兩胡

椒半兩為末醋糊丸梧子大每空心米飲下五

七十九有人病此熱藥服至一斗二升不效或

教服此終四劑而息

【濟生方】不止者用鍾乳粉一兩肉豆蔻煨半兩

為末煑棗肉丸梧子大每服七十九空心米飲

下

●內寒暴瀉

【生生編】暴泄不止陳艾一把生薑一塊水煎熱

服

【發明】時珍曰粟於五果屬水水潦之年則粟不

熟類相應也有人內寒暴洩如注食煨粟二三

十枚頓愈

●伏暑水瀉

【普濟方】白龍丸滑石火煨過一兩硫黃四錢爲末麪和丸棗豆大每用淡薑湯隨大小服

【普濟方】及腸風下血或酒毒下血一服見效遠年者不過三服消石舶上硫黃各一兩白礬滑石半兩飛麪四兩爲末滴水丸梧子大每新汲水下三五十九名甘露丸

●久痢久泄

【斗門方】白石脂乾薑等分研百沸湯和麪爲稀糊搜之併手丸梧子大每米飲下二十九

【簡便方】久瀉滑腸白朮炒茯苓各一兩糯米炒二兩爲末棗肉拌食或丸服之

【瀕湖集簡方】猪腎一個批開摻骨碎補末煨熟食之神效

●元臟冷泄

【經驗方】腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽一兩細研以蒸餅丸棗豆大每服五九空心熱酒下以食壓之

【普濟方】腹痛虛極硫黃一兩黃蠟化丸梧子大每服五九新汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下

【本草方】及老人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢爲末粥丸梧子大每服八十九蓮肉煎湯下

【十便良方】治脾胃虛冷大腸滑泄米穀不化乏力用大附子十兩連皮同大棗二斤於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每個切作三片再同煮半日削去皮切焙爲末別以棗肉和

丸梧子大每空心米飲服三四十丸

●氣虛暴泄

【孫尙藥祕寶方】日夜三二十行腹痛不止夏月  
路行備急最妙朝真丹用硫黃二兩枯礬半兩  
研細水浸蒸餅丸梧子大硃砂爲衣每服十五  
丸至二十九溫水下或鹽湯任下

【和劑局】暴瀉身冷自汗甚則欲嘔小便清脈微  
弱宜已寒丸治之萆薢肉桂各二錢半高良薑  
乾薑各三錢半爲末糊丸梧子大每服三十九  
薑湯下

【百一選方】暴泄不止神麴炒二兩茱萸湯泡炒  
半兩爲末醋糊丸梧子大每服五十九米飲下

●脾積食泄

【活人心統】川黃連二兩爲末大蒜搗和丸梧子

大每服五十九白湯下

●濕熱虛泄

【瀕湖經驗方】山藥蒼朮等分飯丸米飲服大人  
小兒皆宜

●多年脾泄

【發明】時珍曰邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫  
以虛治不效霍翁曰風客于胃也飲以藁本湯  
而止蓋藁本能去風濕故耳

【孫氏仁存方】老人多此謂之水土同化吳茱萸  
三錢炮過入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱萸  
能暖膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能  
分解清濁也

●冷氣洞泄

【本事方】用生川烏頭一兩木香半兩爲末醋糊

丸梧子大每陳皮湯下二十九

【丹溪心法】脾泄腸滑石連肉炒爲末每服二錢

陳倉米調下便覺思食妙加入香蓮丸尤妙

【奇效良方】臍寒泄瀉體倦食減用猪大腸一條

去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟搗丸梧

子大每服五十九米飲下

●五更腎泄

【本草方】凡人每至五更卽澹泄一二次經年不

止名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困

困則不能消水水性下流則腎水不足用五味

子以強腎水養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自

止矣

●久泄胃弱

【松篁經驗方】久洩食減糯米一升水浸一宿瀝

乾慢炒熟磨篩入懷慶山藥一兩每日清晨用

半盞入砂糖二匙胡椒末少許以極滾湯調食

其味極佳大有滋補久服令人精暖有子祕方

也

【簡便方】久泄胃弱黃米炒爲粉每用數匙砂糖

拌食

●暑月暴瀉

【和劑局方】壯脾溫胃飲食所傷麴朮丸用神麴

炒蒼朮米泔浸一夜焙等分爲末糊丸梧子大

每服三五十九米飲下

【聖惠方】暴瀉引飲秦芄二兩甘草炙半兩每服

三錢水煎服

【本草方】夏月濕瀉川椒炒取紅肉豆蔻煨各一

兩爲末粳米飯爲丸梧子大每量人米飲服百

九

【衛生易簡方】冷瀉及霍亂用胡椒碾末飯丸梧

子大每米飲下四十九

●老小滑瀉

【瀕湖集簡方】白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒

爲末飯丸量人大小米湯下或加人參三錢

【譚氏方】小兒水瀉及人年五十歲以上患瀉用

川椒一兩醋二升煮醋盡慢火焙乾碾末瓷器

貯之每服二錢七酒及米飲下

【危氏得效方】小兒吐瀉巴豆一個針穿燈上燒

過黃蠟一豆大燈上燒滴入水中同杵丸黍米

大每用五七丸蓮子燈心湯下

●腹脹忽瀉

【危氏得效方】日夜不止諸藥不效此氣脫也益

智子仁二兩濃煎飲之立愈

●驟然水瀉

【楊子建議命方】不拘男婦用五月五日采麻葉

陰乾爲末每服二錢冷水調下勿吃熱物令人

悶倒只吃冷物小兒半錢

●老人虛泄

【瑞竹堂方】肉豆蔻三錢麪裹煨熟去麪研乳香

一兩爲末陳米粉糊丸梧子大每服五七十九

米飲下此乃常州侯教授所傳方

【楊氏家藏方】不禁熟附子一兩赤石脂一兩爲

末醋糊丸梧子大米飲下五十九

●水瀉不止

【集元方】水瀉不止風化石灰一兩白茯苓三兩

爲末糊丸梧子大每服二三十丸空心米飲下

【保命集】脾濕水瀉注下困弱無力水穀不化腹

痛甚者蒼朮二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡桂

二錢每服一兩水一盞半煎一盞溫服脈弦頭

微痛去芍藥加防風二兩

【聖惠方】青州乾棗十個去核入葇荂子填滿紮

定燒存性每粟飲服一錢

【吳曼扶壽精方】木鼈仁五個母丁香五個麝香

一分研末米湯調膏納臍中貼之外以膏藥護

住

【普濟方】用豮豬肚一枚入蒜煮爛搗膏丸梧子

大每米飲服三十九丁必卿云予次日五更必

水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩

丸服遂安

●久瀉不止

【並百一選方】肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末

棗肉和丸米飲服四五十丸

又方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米

飲服四五十丸

又方肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋糊丸米飲

服四五十丸

【普濟方】黑神散用酸石榴一個煨烟盡出火毒

一夜研末仍以酸石榴一塊煎湯服神效無比

●或瀉或止

【總微論】久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一

兩以豬膽煮熟和丸如棗豆大量兒大小每米

飲服之

●久瀉虛痢

【百一選方】水瀉久痢破故紙炒一兩粟殼炙四

兩爲末煉蜜丸彈子大每服一丸薑棗同水煎服

【普濟方】腹痛者欖子丸治之欖子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米一分同二味炒黃爲末一分生礬爲末粟米粥丸梧子大每陳米飲下五十九日三服

【聖惠方】水瀉下痢訶黎勒炮二分肉豆蔻一分爲末米飲每服二錢

●中寒水瀉

【千金方】乾薑炮研末粥飲服二錢卽效

●中滿洞瀉

【鮑氏方】厚樸乾薑等分爲末蜜丸梧子大每服五十九米飲下

●餐瀉不化

【普濟方】川椒一兩炒蒼朮二兩土炒礬末醋糊丸梧子大每米飲服五十九

●風寒泄瀉

【聖濟總錄】火欬丸治風氣行於腸胃泄瀉火欬草爲末醋糊丸梧子大每服三十九白湯下

【本草方】寒濕泄瀉小便清者以頭燒酒飲之卽止

●伏暑泄瀉

【經驗方】玉華丹白礬煨爲末醋糊爲丸量大小用木瓜湯下

【簡便方】濕瀉暑瀉白朮車前子等分炒爲末白湯下二三錢

【余居士選奇方】暑月水瀉五倍子末飯丸黃豆大每服二十九荷葉煎水下卽時見效

●泄瀉不止

【心鑑方】白龍骨白石脂等分爲末水丸梧子大

紫蘇木瓜湯下量大人小兒用

●喫飯直出

【怪證奇方】梔子二十個微炒去皮水煎服

●肚腹痛瀉

【發明】時珍曰蕎麥最降氣寬腸故能滌腸胃滓

滯而治濁帶洩痢腹痛上氣之疾氣盛有溼瀉

者宜之若腸胃虛寒人食之則大脫元氣而落

鬚眉非所宜矣孟詵云益氣力者殆未然也按

楊起簡便方云肚腹微微作痛出卽瀉瀉亦不

多日夜數行者用蕎麥麵一味作飯連食三四

次卽愈予壯年患此兩月瘦怯尤甚用消食化

氣藥俱不效一僧授此而愈轉用皆效此可徵

其鍊積滯之功矣

●久病滑泄

【發明】時珍曰按張從正儒門事親載一婦滑泄

數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時

以棘鍼刺取數十毒勿犯人手以麵和作餅煨

熟食之米飲送下不一二時瀉下如傾六七日

行至數百行昏困惟飲涼水而平觀此則桃花

之峻利可知矣

●冷勞腸泄

【聖惠方】神效太一丹禹餘糧四兩火煨醋淬烏

豆一兩冷水浸一夜去皮臍焙爲末醋糊丸梧

子大每食前溫水下五丸

●白朮膏

【千金方】服食滋補止久瀉痢悉煉服門

古今名醫驗方類編卷一終

此方治... 凡人患此症者... 宜服此方... 功效如神... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此方乃... 醫家之寶... 誠濟世之良藥也... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此方乃... 醫家之寶... 誠濟世之良藥也...

此方治... 凡人患此症者... 宜服此方... 功效如神... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此方乃... 醫家之寶... 誠濟世之良藥也... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此方乃... 醫家之寶... 誠濟世之良藥也...

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷二 通治部

### 諸風門

|        |   |
|--------|---|
| 中風不語   | 一 |
| 中風口噤   | 一 |
| 中風口目喎邪 | 二 |
| 中風舌強   | 三 |
| 中風牙噤   | 三 |
| 中風腹痛   | 三 |
| 中風痰壅   | 三 |
| 中風頭眩   | 四 |
| 中風身直   | 四 |
| 中風攣縮   | 四 |
| 中風虛弱   | 四 |
| 中風發熱   | 四 |
| 中風逆冷   | 四 |
| 中風失音   | 四 |

|      |   |
|------|---|
| 中風煩熱 | 四 |
| 中風痺疾 | 四 |
| 中風痰厥 | 四 |
| 中風氣厥 | 四 |
| 中風癱瘓 | 五 |
| 老人中風 | 五 |
| 女子中風 | 五 |
| 中風掣痛 | 五 |
| 偏風不遂 | 六 |
| 驚癇中風 | 六 |
| 二年中風 | 六 |
| 風濕難臥 | 七 |
| 熱風癱瘓 | 七 |
| 一切頑風 | 七 |
| 癱瘓頑風 | 七 |
| 一切虛風 | 七 |
| 暑濕癱瘓 | 七 |

|       |    |
|-------|----|
| 一切風疾  | 七  |
| 一切風毒  | 九  |
| 男子諸風  | 九  |
| 六十二種風 | 九  |
| 男女諸風  | 九  |
| 三十六風  | 九  |
| 諸風血風  | 一〇 |
| 大風癘疾  | 一〇 |
| 歷節風痛  | 一一 |
| 諸風痰飲  | 一一 |
| 白虎風痛  | 一一 |
| 身痒如蟲  | 一一 |
| 風毒攻心  | 一一 |
| 風毒不仁  | 一一 |
| 風毒骨痛  | 一三 |
| 風毒卒腫  | 一四 |
| 風毒膝攣  | 一四 |

走注風毒……………一四  
 鬼毒風氣……………一四  
 風濕身疼……………一四  
 風勞毒腫……………一四  
 暴風身冷……………一四  
 身膚浮風……………一四  
 皮膚作痛……………一四  
 風寒濕痺攣痛……………一四  
 頭項風強……………一五  
 風虛冷痺……………一五  
 風濕走痛……………一五  
 老人風痺……………一五  
 老人風濕……………一五  
 老人風眩……………一六  
 頭身俱痛……………一六  
 節骨風痛……………一六  
 腰脚拘攣轉筋……………一六  
 手足痛風……………一六  
 渾身拘痛……………一六  
 風涎暴作……………一六

賊風腫痺……………一七  
 暗風卒倒……………一七  
 虛損風疾……………一七  
 賊風口偏……………一七  
 諸風不遂……………一七  
 體虛有風……………一七  
 痰迷心竅……………一七  
 癱風鼻塌……………一七  
 骨軟風疾……………一八  
 骨風……………一八  
 風癢痒痺……………一八  
 風濕身痛……………一八  
 風水惡風……………一八  
 風疾恍惚……………一八  
 風病自汗……………一八  
 卒風不語……………一八  
 風入臟中……………一八  
 風痺緩急……………一八  
 旋風眩冒……………一九  
 一脾風痛……………一九

數年風疾……………一九  
 風痰眩悶……………一九  
 卒風偏急……………一九  
 風疾百病……………一九  
 活血治風……………一九  
 搜風順氣……………一九  
 祛風除濕……………一九  
 搜風化痰……………一九  
 宣吐風痰……………一九  
 搜風痛滯……………一九  
 祛風益顏……………一九  
 延年祛風……………一九  
 羌活治風……………一九  
 一粒金丹……………一九  
 大麻仁酒……………一九  
 薏苡仁粥……………一九  
 炒豆紫湯……………一九  
 豆淋酒……………一九  
 大豆藥散……………一九  
 天蓼酒……………一九

|       |       |    |
|-------|-------|----|
| 驅風膏   | ..... | 一一 |
| 白花蛇酒  | ..... | 一一 |
| 白花蛇膏  | ..... | 一一 |
| 白花蛇散  | ..... | 一一 |
| 蝮蛇酒   | ..... | 一一 |
| 神鍼雷火鍼 | ..... | 一一 |
| 蠟膽散   | ..... | 一一 |
| 火鍼    | ..... | 一一 |
| 三木節散  | ..... | 一一 |
| 熨風法   | ..... | 一一 |
| 三蛇愈風丹 | ..... | 一一 |
| 茵蔯酒   | ..... | 一一 |
| 茵芋丸   | ..... | 一一 |
| 長松酒   | ..... | 一一 |
| 天麻丸   | ..... | 一一 |
| 何首烏丸  | ..... | 一一 |



古今名醫驗方類編卷二

通治部

諸風門

●中風不語

【發明】宗奭曰防風黃耆世多相須而用唐許允宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脈沉而口噤允宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理週時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟霧其夕便得語也

【陳延之小品方】獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒有聲以藥酒熱投蓋之良久溫服三合未瘥再服

【發明】劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時避風以竹刀或荊刀刮去土生布拭淨搗絞取汁一大升和好蜜四大合溫分兩服得汗出便瘥此方得之岳鄂鄭中丞鄭因食熱肉一頓便中暴風外甥盧氏爲潁陽令有此方服當時便瘥

【宣明方】麻黃一秤去根以王相日乙卯日取東流水三石三斗以淨鑊盛五七斗先煮五沸掠去沫逐旋添水盡至三五斗灑去麻黃澄定瀘去滓取清再熬至一斗再澄再瀘取汁再熬至一升半爲度蜜封收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熬時要勤攪勿令着底恐焦

了仍忌雞犬陰人見之此劉守真祕方也

【簡要濟衆方】牙關緊急者藜蘆一兩去苗頭濃

煎防風湯浴過焙乾切炒微褐色爲末每服半

錢小兒減半溫水調灌以吐風涎爲效未吐再

服

【經驗方】喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分天

南星一個去浮皮于臍上剉一坑納入陳醋二

椀斗四面火逼黃色研爲末生麵丸小豆大每

服三丸溫酒下

【肘后方】大豆煮汁煎稠如飴含之并飲汁

【楊氏家藏方】涎潮口噤語言不出手足躡曳得

病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人柏

葉一握去枝葱白一握連根研如泥無灰酒一

升煎一二十沸溫服如不飲酒分作四五服方

進他藥

【壽域方】烏龜尿點少許於舌下神妙

【濟生方】麝香二錢研末入清油二兩和勻灌之

其人自甦也

【聖惠方】舌根強硬三年陳醬五合人乳汁五合

相和研以生布絞汁隨時少少與服良久當語

●中風口噤

【千金方】不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿

或時絕而復甦 龍肝末五升水八升攪澄清

灌之

【千金方】不知人事白朮四兩酒三升煮取一升

頓服

【千金方】通身冷不知人事獨活四兩好酒一升

煎半升服

【本草方】荆芥穗爲末酒服二錢立愈名荆芥散  
賈似道云此方出曾公談錄前後用之甚驗其  
子名順者病此已革服之立定真再生丹也

【千金方】熟艾灸承漿一穴頰車二穴各五壯

【經驗方】目瞑無門下藥者開關散用天南星爲  
末入白龍腦等分五月五日午時合之每用中  
指點末揩齒三二十遍揩大牙左右其口自開  
又名破棺散

【仁齋直指方】天南星炮剉大人三錢小兒三字  
生薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄豬膽汁少  
許溫服

【聖惠方】舌本縮者用芥菜子一升研入醋二升  
煎一升傳頰頰下效

【丹溪方】蘿蔔子牙皂莢各二錢以水煎服取吐

【簡要濟衆方】不開涎潮壅上皂角一挺去皮豬  
脂塗炙黃色爲末每服一錢溫酒調下氣壯者  
二錢以吐出風涎爲度

【范汪方】荆瀝每服一升

【千金方】竹瀝薑汁等分日日飲之

●中風口目喎邪

【寇氏衍義】新石灰醋炒調如泥塗之左塗右右  
塗左立便牽正

【主治范汪方】不正以空青豆許含嚙甚效

【勝金方】以葦筒長五寸一頭刺入耳內四面以  
麵密封不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左  
患左灸右

【發明】慎微曰按江陵節度使成訥進絳菴丸方  
表略云臣有弟訢年二十一中風伏枕五年百

醫不瘥有道人鍾針因覩此患曰可餌絳菘丸  
必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當夏  
五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水洗去  
泥土摘葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但以  
取足爲度仍熬搗爲末煉蜜丸梧子大空心溫  
酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患愈加  
不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得服至  
五千丸當復丁壯臣依法修合令訐服之果如  
其言服後須喫飯三五匙壓之五月五日采者  
佳奉勅宣付醫院詳錄又知益州張詠進絳菘  
丸表略云切以餐石飲水可作充腸之饌餌松  
含柏亦成救病之功是以療饑者不在於羞珍  
愈病者何煩於異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物  
之形不恥管窺輒干天聽臣因換龍興觀掘得

一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪  
問采覓其草頗有異金稜銀線素莖紫葍對節  
蜀號火杵莖葉頗同蒼耳不費登高歷險每常  
求少獲多急采非難廣收甚易倘勤久服旋見  
神功誰知至賤之中乃有殊常之效臣自服至  
百服眼目清明卽至千服鬚鬢烏黑筋力輕健  
效驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風  
墜馬失音不語臣與十服其病立瘥又和尚智  
嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣與  
十服亦便得痊今合一百劑差職貢史元奏進  
【本草方】蓖麻子仁搗膏左貼右貼左卽正  
【婦人良方】用蓖麻子仁七七粒研作餅右喎安  
在左手心左喎安在右手心却以銅盂盛熱水  
坐藥上冷卽換五六次卽正也 一方用蓖麻

子仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上  
用

【篋中祕寶方】生烏頭青礬各等分爲末每用一

字嚙入鼻中取涕吐涎立效無比名通關散

【楊氏家藏方】中風口喎半身不遂牽正散用白

附子白薑蠶全蝎並等分生研爲末每服二錢

熱酒調下

【仁存方】天南星生研末自然薑汁調之左貼右

右貼左

【聖惠方】用瓜蒌絞汁和大麥麵作餅炙熱熨之

正便止勿令太過

【千金方】豆淋酒日服一升

【千金方】青松葉一斤搗汁清酒一升浸二宿近

火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

【千金方】面目相引偏僻頰急舌不可轉桂心酒  
煮取汁故布蘸榻病上正即止左喎榻右右喎

榻左常用大效

【證治要訣】乳香燒煙薰之以順其血脈

【外臺祕要方】皂角五兩去皮爲末三年大醋和

之右喎塗左左喎塗右乾更上之

【聖惠方】巴豆七粒去皮研左喎塗右手心右喎

塗左手心仍以暖水一盞安藥上須臾即正洗

去

【千金方】向火取蜘蛛摩偏急頰上候正即止

【通變要法方】口內麻木者用蜈蚣三條一蜜炙

一酒浸一紙裹煨並去頭足天南星一個切作

四片一蜜炙一酒浸一紙裹煨一生用半夏白

芷各五錢通爲末入麝少許每服一錢熱調下

日一服主治用鮮魚尾上血同麝香少許左喎  
塗右右喎塗左即正洗去

【發明】時珍曰按千金方云目喎唇動口喎皆風  
入血脈急以小續命湯服之外用螫血或雞冠  
血調伏龍肝散即灶心土塗之乾則再上甚妙  
蓋螫血之性急縮走血故治口喎脫肛之病  
【肘后方】螫血調烏頭末塗之待正則即揭去

●中風舌強

【衛生寶鑑方】正舌散用雄黃荊芥穗等分為末  
豆淋酒服二錢

【飲膳正要方】目精不轉煩熱烏雌雞一隻治淨  
以酒五升煮取二升去滓分作三次連服之食  
葱薑粥暖臥取小汗

●中風牙噤

【本草方】無門下藥者用開關散措之五月五日  
午時用龍腦天南星等分為末每以一字措齒  
二三十遍其口自開

●中風腹痛

【肘后方】鹽半斤熬水乾着口中飲熱湯二斤得  
吐愈

●中風痰壅

【經驗方】風痰卒中碧林丹治痰涎潮盛卒中不  
語及一身風癱用生綠二兩乳細水化去石慢  
火熬乾取辰日辰時辰位上修合再研入麝香  
一分糯米粉糊丸彈子大陰乾卒中者每丸作  
二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出青碧  
涎瀉下惡物大效 治小兒用綠雲丹銅綠不  
計多少研粉醋麵糊丸芡子大每薄荷酒化服

一丸須臾吐涎如膠神效

【聖惠方】四肢不收昏憤吞醉砒霜如綠豆大以新汲水調下少許以熱水投之大吐卽愈未吐再服

【經驗方】中風壅滯旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十九

●中風頭眩

【心鏡方】心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫者用烏驪頭一枚如食法鼓汁煮食

●中風身直

【肘后方】不得屈伸反覆者取槐皮黃白切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之

●中風攣縮

【奇效良方】夜合枝酒夜合枝柏枝槐枝桑枝石

榴枝各五兩並生剉糯米五升黑豆五升羌活二兩防風五錢細麪七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麪與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也

【發明】聖濟錄松節散用伏神心中木一兩乳香一錢石器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒冷溼搏於筋骨是筋攣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛並主之

●中風虛弱

【正要方】羊肚一具粳米二合和椒薑鼓葱作羹食之

●中風發熱

【千金方】大戟苦參四兩白酢漿一斗煮熟洗之

寒乃止

●中風逆冷

【肘后方】吐清水宛轉啼呼桂一兩水一升半煎

半升冷服

●中風失音

【千金方】桂着舌下嚙汁

又方桂末三錢水二盞煎一盞服取汗

【危氏得效方】炒槐花三更後仰臥嚼嚙

●中風煩熱

【本草方】皮膚瘙痒者醃醐四兩每服半匙温酒

和服日三

●中風痺疾

【本草方】中風心肺風熱手足風痺不隨筋脈弛

緩恍惚煩躁熊肉一斤切入豉汁中和葱薑椒

鹽作腌腊空腹食之

●中風痰厥

【陳師古方】四肢不收氣閉膈塞者白礬一兩牙

皂角五錢為末每服一錢温水調下吐痰為度

【和劑局方】昏不知人口眼喎斜并體虛之人患

瘧疾寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去

皮臍各半兩生南星一兩生木香二錢五分每

服五錢生薑十片水二盞煎一盞温服

【奇效方】省風湯用半夏湯泡八兩甘草炙二兩

防風四兩每服半兩薑二十片水二盞煎服

【主治時珍方】氣厥中惡喉痺一切急病咽喉不

通牙關緊閉以研爛巴豆綿紙包壓取油作燃

點燈吹滅薰鼻中或用熱烟刺入喉內即時出

涎或惡血便甦又舌上無故出血以薰舌之上

下自止

●中風氣厥

【濟生方】痰壅昏不知人六脈沉伏者生附子去皮生南星去皮生木香半兩每服四錢薑九片水二盞煎七分溫服之

●中風癱瘓

【梅師方】手足蟬曳口眼喎斜語音蹇滯步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍五靈脂各五兩爲末入龍腦麝香五分滴水爲丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化暖酒調服一日二服至五七丸便覺手擡移得步十九可以梳頭也

【簡易方】手足顛掉言語蹇滯左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩乳香沒藥各

一兩爲末生烏頭一升以斑蝥三七個去頭翅同煮豆熟去蝥取豆焙乾爲末和勻以醋麵糊丸梧子大每服三十九溫酒下

【衛生寶鑑方】手足不舉用穿山甲左癱用右甲右癱用左甲炮熟大川烏頭炮熟紅梅蛤如碁子大者各二兩爲末每用半兩搗葱白汁和成厚餅徑寸半隨左右貼腳心縛定密室安坐以脚浸熱盪盆中待身麻汗出急去藥宜謹避風自然手足可舉半月再行一次除根忌口遠色諸養亦治調風疾

【本草方】用海甲川烏頭各一兩川山甲二兩爲末酒丸如彈子大捏扁置所患腳心下別擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中熱水浸脚至膝上水冷又添候遍身汗出爲度凡三日一作以知

為度

【廣濟方】癱緩偏風治癱緩風及諸風手足不遂  
腰脚無力者騾皮膠微炙熟先煮葱鼓粥一升  
別又以水一升煮香鼓二合去滓入膠更煮七  
沸膠烊如錫頓服之乃暖喫葱鼓粥如此三四  
劑即止若冷喫粥令人嘔逆

●老人中風

【壽親養老書】口目牽動煩悶不安牛蒡根切一  
升去皮晒乾杵為麵白米四合淘淨和作餠飴  
鼓汁中煮加葱椒五味空心食之恆服極效

【發明】今略其節要云菖蒲者水草之英精神仙  
之靈藥也其法采緊小似魚鱗者一斤以水及  
米泔浸各一宿括去皮切暴乾搗篩以糯米粥  
和勻更入熱蜜搜和丸如梧子大稀葛袋盛置

當風處令乾每旦酒飲任下三十九臨臥更服  
三十九服至一月消食二月痰除服至五年骨  
髓充顏色澤白髮黑落齒更生其藥以五德配  
五行葉青花赤節白心黃根黑能治一切諸風  
手足頑痺癱緩不遂五勞七傷填血補腦堅骨  
髓長精神潤五臟裨六腑開胃口和血脈益口  
齒明耳目澤皮膚去寒熱除三尸九蟲天行時  
疾瘴疫瘦病瀉痢痔漏婦人帶下產後血運並  
以酒服河內葉敬母中風服之一年而百病愈  
寇天師服之得道至今廟前猶生菖蒲鄭魚會  
原等皆以服此得道也

【養老書】煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱白一  
握煮臠下麻汁五味空心食之

●女子中風

【貞元廣利方】血熱煩渴以紅藍子五合熬搗旦日取半大匙以水一升煎取七合去渣細細嚙之

●中風掣痛

【肘后方】不仁不隨並以乾艾斛許揉團納瓦甌中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甌目而燒艾薰之一時卽知矣

●偏風不遂

【聖惠方】皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細剉生絹袋盛于不津器中用無灰酒二升浸之重封春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令醺然不得大醉酒盡再合無不效驗合時切忌雞犬婦人見

【經驗方】一切偏風口眼喎邪用青荊芥一斤青

薄荷一斤同入砂盆內研爛生絹絞汁於瓷器中煎成膏瀘去滓三分之一將二分日乾爲末以膏和丸梧子大每服三十九丸白湯下早暮各一服忌動風物

【發明】時珍曰蓖麻仁甘辛有毒熱氣味頗近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口眼喎斜頭風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋鷓鴣油能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂麝香鯁鯉甲等藥煎作摩膏日摩數次一月餘漸復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈

【外臺祕要方】半身不遂失音不語取蓖麻子油一斤酒一斗銅鍋盛油着酒中一日煮之令熟

細細服之

【王氏簡易方】羌活湯用生附子一個去皮臍羌

活烏藥各一兩每服四錢生薑三片水一盞煎

七分服

【延年祕錄】半身不遂遂令癱瘓用附子一兩以

無灰酒一升浸一七日隔日飲一合

【外臺祕要方】失音不語生吞杏仁七枚不去皮

尖逐日加至七七枚周而復始食後仍飲竹瀝

水以差爲度

【外臺祕要方】癱疾用桃仁二千七百枚去皮尖

雙仁以好酒一斗三升浸二十一日取出晒乾

杵細作丸如梧子大每服二十九丸以原酒吞之

【本草方】蠶沙二碩以二袋盛之蒸熟更互熨患

處仍以羊肚糲米煮粥日食一枚十日即止

【岫巖神書方】用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不

病一邊上下令遍但除七孔其病處不糊以竹

蠶焙爲末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調

服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭

汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將

息淡食十日手足如故也

●驚癇中風

【本草方】諸風癇疾生川烏頭去皮二錢半五靈

脂半兩爲末豬心血丸梧子大每薑湯化服一

丸

【東垣活法機要方】諸風諸癇諸風膈痰諸癇涎

涌用甜瓜蒂炒黃爲末量人以酸醃水一盞調

下取吐風癇加蠟稍半錢溼氣腫滿加赤小豆

末一錢有蝨加狗油五七點雄黃一錢甚則加

芫花半錢立吐蟲出

【普濟方】壯熱掣癰吐舌出沫用豚卵二雙細切當歸二分以醇酒三升煮一升分服

●二年中風

【千金方】松葉一斤細切以酒一斗煮取三升頓服汗出立瘥

●風溼癱臥

【主治藏器方】風溼頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脈斷絕六月取河沙烈日暴令極熱伏坐其中冷即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役

【吳曼扶壽精方】風溼臥床不起用金鳳花柏子仁樸硝木瓜煎湯洗浴每日二三次內服獨活寄生湯

●熱風癱瘓

【廣濟方】常舉發者羌活二斤構子一斤爲末每酒服方寸七日三服

●一切頑風

【乾坤祕韜】神應丹用生草烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁傾盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜則露之晒至成膏作成小錠子每一錠分作三服用葱薑自然汁和好酒熱服

●癱瘓頑風

【孫天仁集效方】草烏頭川烏頭兩頭尖各三錢硫黃麝香丁香各一錢木鱉子五個爲末以熟蘆艾揉軟合成一處用鈔紙包裹燒薰病處名雷丸

【坦仙皆效方】諸風癱瘓筋骨不收用白龍根鬚

皮一兩鬪羊花即老虎花七分好燒酒三斤封

固煮一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲

者一盃臥時服服至三五盃見效但知痛者可

治

●一切虛風

【孫用和祕寶方】不二散用膩粉一兩湯煎五度

如麻脚慢火焙乾麝香半兩細研每服一字温

水調下

●暑溼癱瘓

【陸氏積德堂方】自然銅燒紅酒浸一夜川烏頭

炮五靈脂蒼朮酒浸各一兩當歸二錢酒浸為

末酒糊丸梧子大每服七丸酒下覺四肢麻木

即止

【醫學正傳】癱瘓走痛用蝎虎即蜈蚣一枚炙廣

陳皮五分罌粟殼一錢甘草乳香沒藥各二錢

半為末每服三錢水煎服

●一切風疾

【發明】朱真人靈驗篇云有人患風疾數年掘坑

令坐坑內解衣以熱湯淋之良久以簞蓋之汗

出而愈此亦通經絡之法也時珍常推此意治

寒濕加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋

洗覺效更速

【外臺祕要方】十年二十年者牛蒡根一升生地

黃枸杞子牛膝各三升用袋盛藥浸無灰酒三

升內每任意飲之

【孟詵食療方】蒼耳嫩葉一石切和麥蘖五升作

塊於蒿艾中簪二十日成麴取米一斗炊作飯

看冷暖入麴三升釀之封二七日成熟每空心  
暖服神驗封此酒可兩重布不得令密密則溢  
出忌馬肉猪肉

【乾坤祕韜方】一切風證不問頭風痛風黃鴉吊  
脚風痺生淮烏頭一斤生川烏頭一枚生附子  
一枚並爲末葱一斤薑一斤搗如泥和作餅子  
以草鋪盤內加楮葉于上安餅于葉上又鋪草  
葉蓋之待出汗黃一日夜乃晒之春爲末以生  
薑取汁煮麪糊九梧子大初服三十九日二服  
服後身痺汗出卽愈避風

【發明】先時商州有人病手足不遂不履地者數  
十年良醫殫技莫能療所親置之道旁以求救  
者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不  
知此地有否因爲之入山求索果得乃威靈仙

也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之  
遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語手足不  
遂口眼喎邪言語蹇滯筋骨節風遶臍風胎風  
頭風暗風心風風狂大風皮膚風痒白癩風熱  
毒風瘡頭旋目眩手足頑痺腰膝疼痛久立不  
得曾經損墜暨腰痛腎臟風壅傷寒瘴氣憎寒  
壯熱頭痛流涕黃疸黑疸頭面浮腫腹內宿滯  
心頭痰水膀胱宿膿口中涎水冷熱氣壅肚腹  
脹滿好喫茶滓心痛注氣膈氣冷氣攻衝脾肺  
諸氣痰熱咳嗽氣急坐臥不安氣衝眼赤攻耳  
成膿陰汗盜汗大小腸祕服此立通氣痢痔疾  
瘰癧疥癬婦人月水不來動經多日氣血衝心  
產後祕塞孩子無辜並皆治之其法采得根陰  
乾月餘搗末温酒調一錢七空腹服之如人本

性殺藥可加及六錢利過兩行則減之病除乃  
停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘  
草卮子代飲可也又以一味洗焙爲末以好酒  
和令微潤入在竹筒內緊塞九蒸九晒如乾添  
酒潤之以白蜜和九梧子大每服二十至三十  
丸溫酒下崔元亮海上集驗方著其詳如此震  
亨曰威靈仙屬水治痛風之要藥也在上下者  
皆宜服之尤效其性好走亦可橫行故崔元亮  
言其去衆風通十二經脈朝服暮效凡未得聞  
流水聲者知其性好走也須不聞水聲者乃佳  
時珍曰威靈仙氣溫味微辛鹹辛泄氣鹹泄水  
故風濕痰飲之病氣壯者服之有捷效其性大  
抵陳利久服恐損真氣氣弱者亦不可服之

【集簡方】青藤膏用青藤出太平荻港上者二三

月采之不拘多少入釜內微火熬七日夜成膏  
收入瓷器內用時先備梳三五把量人虛實以  
酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身  
發痒不可當急以梳梳之要痒止卽飲冷水一  
口便解風病皆愈也避風數日良

【普濟方】不問遠近檉葉半斤切枝亦可荆芥半  
斤水五升煮二升澄清入白蜜五合竹瀝五合  
新瓶盛之油紙封入重湯煮一沸時每服一小  
盞日三服

【聖惠方】久服輕身明目黑髮駐顏用南燭樹春  
夏取枝葉秋冬取根皮細剉五斤水五斗慢火  
煎取二斗去滓淨鍋慢火煎如稀飴瓷瓶盛之  
每溫酒服一匙日三服一方入童子小便同煎

【發明】時珍曰牡荊苦能降辛溫能散降則化痰

散則祛風故風痰之病宜之其解肌發汗之功世無知者按王氏奇方云一人病風數年予以七葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分煎湯日服遂愈蓋得此意也 又時珍曰荆瀝氣平味甘化痰去風爲妙藥故孫思邈千金翼云凡患風入多熱常宜以竹瀝荆瀝薑汁合五合和勻熱服以瘥爲度陶元景亦云牡荊汁治心風爲第一延年祕錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝震亨曰二汁同功並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食者用荆瀝

●一切風毒

【本草方】并殺三蟲腸痔能進食若病胃脹滿心悶發熱卽宜服之五月五日午時附地刈取蒼耳葉洗暴搗下篩每服方寸七酒或漿水下日

二夜三若覺吐逆則以蜜丸服準計方寸七數也風輕者日二服若身體作栗或麻豆出此爲風毒出也可以針刺潰去黃汗乃止七月七月九月九亦可採用

【聖惠方】一切風痺不拘久近百靈藤五斤水三斗煎一斗濾汁再煎至三升入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各二兩爲末同煎別入白蜜五合熬如錫狀瓷瓶收之每服一匙溫酒下一日二服忌毒物滑物

●男子諸風

【普濟方】四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅去毛蘇木草薺川烏頭生用等分爲末米醋和丸梧子大每服二十九溫酒鹽湯下

●六十二種風

【圖經本草】張仲景治六十二種風兼腹內血氣痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服

●男女諸風

【滑伯仁櫻寧心要】產後風尤妙鐵線草根五錢五加皮一兩防風二錢爲末以烏骨雞一斤重者水內淹死去毛腸斫作肉生入藥剉勻下麻油些少炒黃色隨人量入酒煮熟先以排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗卽愈如不沐浴必發出風丹乃愈

【主治保壽堂方】男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏昏腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱痿不可服用白龍鬚研末每服一錢氣弱者七分無灰

酒下密室隨左右貼牀臥待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見風一方得疾淺者用末三錢瓷瓶煮酒一壺每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服

【寇氏衍義方】風涎暴作氣塞倒仆用甜瓜蒂爲末每用二錢膩粉一錢七以水半合調灌良久涎自出不出含沙糖一塊下咽卽涎出也

●三十六風

【夏禹神仙經】有不治者服之卽效菖蒲薄切片乾三斤盛以絹袋元水一斛卽清酒也懸浸之密封一百日視之如菜綠色以一斗熟黍米納中封十四日取出日飲

【發明】時珍曰浮萍其性輕浮入肺經達皮膚所以能發揚邪汗也世傳宋時東京開河掘得石

碑梵書大篆一詩無能曉者真人林靈素逐字  
辨譯乃是治中風方名去風丹也詩云天生靈  
草無根幹不在山間不在岸如因飛絮逐東風  
汎梗青青飄水面神仙一味去沉疴采時須在  
七月半選甚癱風與大風些小微風都不算豆  
淋酒化服三九鐵僕頭上也出汗其法以紫色  
浮萍晒乾爲細末煉蜜和丸彈子大每服一粒  
以豆淋酒化下治左癱右瘓三十六種風偏正  
頭風口眼喎斜大風癩風一切無名風及腳氣  
并打撲傷折及胎孕有傷服過百粒卽爲全人  
此方後人易名紫萍一粒丹

●諸風血風

【和劑局方】烏荊主治諸風縱緩言語蹇澁偏身  
麻痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸風臍

毒下血不止者服之尤效有痛風攣搐頤頷不  
收者服六七服卽瘥也川烏頭炮去皮臍一兩  
荊芥穗二兩爲末醋麪糊丸梧子大溫酒或熟  
水每服二十九

●大風癘疾

【聖惠方】眉髮脫落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬  
一斤青鹽一斤爲末罐子固濟炭火一秤煨之  
從辰至戌候冷研粉埋土中三日取出每一兩  
入九蒸九晒炒熟胡麻末三兩每服二錢荊芥  
穗茶下日二服

【直指方】癘風有蟲硫黃末酒調少許飲汁或加  
大風子油更好

【集解】張天覺文集云僧普明居五臺山患大風  
眉髮俱墮哀苦不堪忽遇異人教服長松示其

形狀明采服之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代間土人多以長松雜甘草山藥為湯煎甚佳

然本草及方書皆不載獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此韓悉醫通云長松產太行西北諸山根似獨活而香

【袖珍方】用嫩蒼耳荷葉等分為末每服二錢温

酒下日二服 乾坤生意用蒼耳葉為末以大

風子油和丸梧子大每服三四丸以茶湯下

日二服 又方五月五日或六月六日五更帶

露采蒼耳草搗取汁熬作錠子取半斤鯉魚一

尾剖開不去腸肚入藥一錠線縫以酒二盃慢

火煮熱令喫不過三五個魚即愈也忌鹽一百

日

【聖惠方】大風諸痺痰澀脹滿大附子半兩者二

枚炮折酒漬之春冬五日夏秋三日每服一合以瘥為度

【本草方】大風惡癩三月四月采天雄烏頭苗及

根去土勿洗搗汁漬細粒黑豆摩去皮不落者

一夜取出晒乾又浸如此七次初吞三枚漸加

至六七枚禁房室猪魚鷄蒜犯之即死

【聖惠方】癘風有蟲眉落聲變預知子膏用預知

子雄黃各二兩為末以乳香三兩同水一斗銀

鍋煮至五升入二末熬成膏瓶盛之每服一匙

温酒調下有蟲如尾隨大便而出

【本草方】潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶

炒全蠍炒各七個為末每服二錢温酒下先以

藥湯浴過服此出臭汗為效 儒門事親加蟬

蛻五品各九個作一服

【聖惠方】何首烏大而有花紋者一斤米泔水浸

一七九蒸九晒胡麻四兩九蒸九晒爲末每酒

服二錢日二服

【聖惠方】百靈藤四兩水一斗煮三升去滓入粳

米四合煮粥於密室中浴畢乃食暖臥取汗汗

後皮膚起而麩片每隔日一作五六十日後漸

愈毛髮卽生

【十便良方】浮萍草三月采淘三五次嘗三五日

焙爲末不得見日每服三錢食前溫酒下常持

觀音聖號忌猪魚鷄蒜 又方七月七日取紫

背浮萍日乾爲末半升入好消風散五兩每服

五錢水煎頻飲仍以煎湯洗浴之

【聖惠方】大麻仁三升淘晒以酒一斗浸一夜研

取白汁濾入瓶中重湯煮數沸收之每飲一小

盞兼服茄根散乳香丸取效

【聖惠方】眉髮不生側柏葉九蒸九晒爲末蜜丸

梧子大每服五丸至十九日三夜一服百日卽

生

【聖惠方】摩勒香一斤卽乳頭內光明者細研入

牛乳五升甘草末四兩瓷盒盛之安桌子上置

中庭安劍一口夜于北斗下祝禱去盒子蓋露

一夜次日入甑中蒸炊三斗米熟卽止夜間依

前祝露又蒸如此三次乃止每服一匙空心及

晚食前溫酒調服服後當有惡物出至三日三

夜乃愈也

【發明】時珍曰皂莢刺治風殺蟲功與莢同但其

銳利直達病所爲異耳神仙傳云左親騎軍崔

言一旦得大風惡疾雙目昏盲眉髮自落鼻梁

崩倒勢不可救遇異人傳方用皂角刺三斤燒

灰蒸一時久日乾爲末食後濃煎大黃湯調一

匕飲之一旬眉髮再生肌潤目明後入山修道

不知所終又劉守真保命集云癘風乃營氣熱

風寒客于脈而不去宜先用樺皮散服五七日

後灸承漿穴七壯三灸後每旦早服樺皮散午

以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服一聖散用

大黃末半兩煎湯調皂角刺灰三錢乃緩疎泄

血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見樺皮

下又追風再造散卽一聖散云服之便出黑蟲

爲驗數日再服直候蟲盡爲絕根也新蟲嘴赤

老蟲嘴黑

【普濟方】大風諸癩大風子油一兩苦參末三兩

入少酒糊丸梧子大每服五十九空心溫酒下

仍以苦參湯洗之

【嶺南衛生方】大風瘡裂大風子燒存性和麻油

輕粉研塗仍以殼煎湯洗之

【聖惠方】大風惡疾眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋

取汁洗頭面以大豆水研漿解澤灰味彌佳次

用熟水入綠豆麪濯之三日一洗頭一日一洗

面不過十度良

【活人心統】癘風痛痒白頸蚯蚓去土以棗肉同

搗丸梧子大每美酒下六十九忌薑蒜

【本草方】大風朝野僉載云商州有人患大風家

人惡之山中爲起茅屋有烏蛇墮酒罌時病人

不知飲酒漸瘥罌底見有蛇骨始知其由

【治例】治大風用烏蛇三條蒸熟取肉焙研末蒸

餅丸米粒大以喂烏雞待盡殺雞烹熟取肉焙

研末酒服一錢或蒸餅丸服不過三五雞卽愈

【祕韞】用大烏蛇一條打死盛之待爛以水二碗

浸七日去皮骨入糙米一升浸一日晒乾用白

雞一隻餓一日以米飼之待毛尾脫去殺雞煮

熟食以酒下之喫盡以熱湯一盆浸洗大半日

其病自愈

【王氏博濟方】大風龍膽膏治大風疾神效用冬

瓜一個截去五寸長去瓢掘地坑深三尺令淨

安瓜子內以烏蛇膽一個消黎一個置于瓜上

以土隔蓋之至三七日看一度瓜未甚壞候七

七日三物俱化爲水在瓜皮內取出每用一茶

匙脚以酒和服之三兩次卽愈小可風疾每服

一匙頭

【邵真人經驗方】大風癘瘡用新竹筒十個內裝

黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內煨之

候汁滴出以盞接承翎掃瘡上數日卽愈亦治

諸瘡

●歷節風痛

【外臺祕要方】獨活羌活松節等分用酒煮過每

日空心飲一盃

【聖濟總錄方】筋脈拘攣古聖散用漏蘆麩炒半

兩地龍去土炒半兩爲末生薑二兩取汁入蜜

三兩同煎三五沸入好酒五合盛之每以二盃

調水一錢溫服

【主治時珍方】百靈藤治一切風痛風瘡以五斤

剉水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服

【肘后方】關節疼痛蒲黃八兩熟附子一兩爲末

每服一錢涼水下日一服

【陳言三因方】白虎歷節風痛甚肉理枯虛生蟲

遊走痒痛兼治痺疾半身不遂用真川椒紅色

者去子及合口以黃草紙二重隔之炒出汗取

放地上以砂盆蓋定以火灰密遍四旁約一時

許爲細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大每

服四十九食前鹽湯下服至一斤其疾自愈此

藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛用茴香湯下

腎冷用鹽湯下昔有一人病此遇異人授是方

服至二斤吐出一蟲如蛇而安遂名神授丸

【外臺祕要方】百節酸痛不可忍松脂三十斤鍊

五十遍以鍊酥三升和脂三升攪令極稠每旦

空心酒服方寸七日三服數食麪粥爲佳慎血

腥生冷酢物果子一百日瘥

【外臺祕要方】四肢如解脫松節用二十斤酒五

斗浸三七日每服一合日五六服

【千金方】松葉搗汁一升以酒三升浸七日服一

合日三服

【圖經本草】歷節諸風骨節疼痛晝夜不止沒藥

末半兩虎脰骨酥炙爲末三兩每服二錢溫酒

調下

【聖惠方】用精豬肉四兩切片裹安息香二兩以

瓶盛灰大火上着一銅版片隔之安香于上燒

之以瓶口對痛處薰之令勿透氣

【總錄方】不可忍者壁虎丸用壁虎三枚生研蟬

糟三枚紙包煨研地龍五條生研草烏頭三枚

生研木香五錢乳香末二錢半麝香一錢龍腦

五分合研成膏入酒糊丸如梧子大每日空心

乳香酒服三十九取效

●諸風痰飲

【經驗方】藜蘆十分鬱金一分爲末每以一字溫漿水一盞和服探吐

●白虎風痛

【聖惠方】日夜走注百節如齧炭灰五升蚯蚓屎一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包二包更互熨痛處取效

【外臺祕要方】白虎風毒以三年醞醋五升煎五沸切葱白三升煎一沸漉出以布染乘熱裹之痛止乃止

【聖惠方】走注兩膝熱腫用麒麟竭硫黃末各一兩每溫酒服一錢

【本草方】洗日鋪飯於患處以丹雉鷄食之良久取熱糞封之取訖使伏于患人牀下

【本草方】藏器曰取鷄子措病處咒願送糞堆頭上不過三次瘥白虎是糞神愛喫鷄子也

【近效方】用猪肉二串以大麻子一合酒半盞相和口含嚼上將肉擘向病處咒曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出乃安肉於牀下瘥則送子路神驗

【聖惠方】寒熱發歇骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麪各二兩砒黃一錢爲末每以少許用汲水和作彈丸大于痛處摩之痛止卽取藥拋于熱油鑪中

【經驗良方】走注兩膝熱腫用虎脛骨塗酥炙黃黑附子炮製去皮各一兩爲末每服二錢服酒下日再服

【聖濟總錄】歷節痛風虎脛骨酒炙三兩沒藥七

兩為末每服二錢温酒下日三服

【聖濟總錄】大虎牙一副四個赤足蜈蚣十條酒

浸三日晒乾天麻二兩乳香沒藥各二兩麝香

半兩為末每服二錢温酒下日三服

●身痒如蟲

【千金方】成煉雄黃松脂等分研末蜜丸梧子大

每飲下十九日三服百日愈忌酒肉鹽豉

【醫學正傳】凌霄花為末酒服一錢

【千金方】身如蟲行大豆水漬絞漿旦旦洗之或

加少麪沐髮亦良

【本草方】風氣瘙痒及癰癧蜂房炙蟬蛻等分為

末酒服一錢日三服

【梅師方】用露蜂房煎汁入芒硝傅之日五次

●風毒攻心

【心鏡方】煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮

取七合食後服之

●風毒不仁

【發明】頌曰葛洪肘后方治風毒厥有大小金牙

酒但浸其汁飲之孫思邈千金方治風毒及鬼

疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是

也小金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩弱不仁

不能行步近人用之多效故著其法云金牙細

辛莽草防風地膚子地黃附子茵蘘續斷蜀椒

蒟醬根各四兩獨活一斤十二物金牙搗末別

盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四斗漬

之密器泥口四宿酒成温服二合日二次取效

●風毒骨痛

【經驗方】風在髓中也芍藥二分虎骨一兩炙為

末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

●風毒卒腫

【姚增坦集驗方】白酒煮楊柳白皮暖熨之有赤點處鑷去血妙凡諸卒腫急痛熨之皆卽止

●風毒膝攣

【食醫心鏡方】骨節痛用大豆豉三五升九蒸九晒以酒一斗浸經宿空心隨性溫服

●走注風毒

【醫學集成方】痛風走注黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞酒水各一盃徐徐服大吐大泄一服便能動也

【聖惠方】作痛用小芥子末和鷄子白塗之

●鬼毒風氣

【孟詵食療本草】獨頭蒜一枚和雄黃杏仁研爲

丸空腹飲下三九靜坐少時當下毛出卽安

●風濕身疼

【金匱要略方】日晡劇者張仲景麻黃杏仁薏苡仁湯主之麻黃三兩杏仁二十枚甘草薏苡仁各一兩以水四升煮取二升分再服

●風勞毒腫

【食醫心鏡方】攣痛或牽引小腹及腰痛桃仁一升去皮尖熬令黑烟出熱研如脂膏以酒三升攪和服暖臥取汗不過三度瘥

●暴風身冷

【經圖方】暴風通身水冷如癰瘵者劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗舊絹帛上隨患大小闊狹攤貼并裹手脚心

●身膚浮風

【發明】時珍曰蒼耳藥久服去風熱有效最忌猪肉及風邪患之則遍身發出赤丹也按蘇沈良方云蒼耳根苗葉實皆洗濯陰乾燒灰湯淋取濃汁泥連兩竈煉之灰汁耗即旋取傍釜中熱灰湯盆之一日夜不絕火乃旋得霜乾瓷瓶收之每日早晚酒服二錢補暖去風駐顏尤治皮膚風令人膚革清淨每澡沐浴入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥方也

【孟詵食療方】身上浮風芋煮汁浴之慎風半日

●皮膚作痛

【經驗方】不問何處用何首烏末薑汁調成膏塗之以帛裹住火炙鞋底熨之

●風寒濕痺攣痛

【聖惠方】風寒濕痺四肢攣急脚腫不可踐地用紫蘇子二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二合作粥和葱椒薑豉食之

【聖濟總錄方】風疾攣急茵陳蒿一斤粳米一石麴三斤和勻如常法釀酒服之

【食醫心鏡方】一切風氣蒼耳子三兩炒爲末以水一升半煎七合去滓呷之

【聖惠方】麻黃去根五兩桂心二兩爲末酒二升慢火熬如錫每服一匙熱酒調下至汗出爲度  
避風

【聖濟總錄】天仙子三錢炒大草烏頭甘草半兩五靈脂一兩爲末糊丸梧子大以螺青爲衣每服十九丸男子菖蒲酒下女子芫花湯下

【許學士本事方】麻木不仁或手足不遂生川烏

頭末每以香白米煮粥一盃入末四錢慢熬得  
所下薑汁一匙蜜三大匙空腹噉之或入薏苡  
仁末二錢左傳云風淫末病謂四末也脾主四  
肢風淫客肝則浸脾而四肢病也此湯極有力  
予每授人良驗

【發明】楊清叟曰凡風寒濕痺骨肉冷痛及損傷  
入骨年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭  
南星等分少加肉桂爲末薑汁熱酒調塗未破  
者能內消久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能  
破惡塊逐寒熱遇冷卽消遇熱卽潰

【本事方】風濕痺木黑神丸草烏頭連皮生研五  
靈脂等分爲末六月六日滴水丸彈子大四十  
歲以下分六服病甚一九作二丸薄荷湯化下  
覺微麻爲度

【聖惠方】手足身體收攝不遂肢節疼痛言語蹇  
澀躑躅花酒拌蒸一炊久晒乾爲末每以牛乳  
一合酒二合調服五分

【千金方】風痺筋急腫痛屈轉易常處白斂二分  
熟附子一分爲末每酒服半刀圭日二服以身  
中熱行爲候十日便覺忌猪肉冷水

【普濟方】青藤根二兩防己一兩咬咀入酒一瓶  
煮飲

【直指方】手足不舉筋節攣痛先與通關次以全  
蝎七個瓦炒入麝香一字研勻酒三盞空心調  
服如覺已透則止未透再服如病未盡除自後  
專以婆蒿根洗淨酒煎日三服

【發明】德生堂經驗方云凡風濕冷痺之證因水  
濕所致渾身上下強直不能屈伸痛不可忍者

于五積散加穿山甲七片看病在左右手足或  
臂脇疼痛處即于鯪鯉身上取甲炮熟同全蝎  
炒十一個葱薑同水煎入無灰酒一匙熱服取  
汗避風甚良

【心鏡方】風虛濕痺醜醜二兩温酒每服一匙效

●頭項風強

【千金方】八月後取荆芥穗作枕及鋪牀下立春

日去之

【千金方】頸項強硬不能顧視大豆一升蒸變色

囊裹枕之

【千金方】穿地作坑煨赤以水洒之令冷鋪生桃

葉於內臥席上以項着坑上蒸至汗出良久即

瘥

●風虛冷痺

【千金翼方】諸陽不足及腎虛耳聾益精保神白

石英三兩坩鍋內火煨酒淬三次入瓶中密封

勿洩氣每早温服一鍾以少飯壓之 一法磁

石火煨醋淬五次白石英各五兩絹袋盛浸一

升酒中五六日温服將盡更添酒

●風濕走痛

【鄧筆峯方】牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏攤

紙上熱貼之冷即易甚效一加乳香沒藥一錢

●老人風痺

【肘后方】大麻子煮粥下葱椒鹽豉空心食之

●老人風濕

【集驗方】久痺筋攣骨痛服此壯腎潤皮毛益氣

力牛蒡根一升切生地黃一斤切大豆二升炒

以絹袋盛浸一斗酒中五六日任性空心温服

一二三蓋日二服

●老人風眩

【本草方】用白羊頭一具如常治食之

●頭身俱痛

【肘后方】煩悶者頭垢豆許水服囊盛蒸豆熨之

●節骨風痛

【纂要奇方】猩紅三錢枯礬四錢爲末作三紙撚

每旦以一撚蘸油點火薰臍被覆臥之取汗

【筆峯雜興】石膏三錢飛羅麪七錢爲末水和煨

紅冷定滾酒化服被蓋取汗連服三日即除根

【經驗方】人參四兩酒浸三日晒乾土茯苓一斤

山慈姑一兩爲末煉蜜丸梧子大每服四百丸

食前米湯下

【集簡方】馬鬣兒子炒開口爲末酒服一錢日二

服

【本草方】洗曰用秫米一石麴三斗地黃一斤茵

陳蒿炙黃半斤一依釀酒法服之良

【海上名方】不拘風濕氣楊梅瘡及女人月家病

先用此藥止疼然後調理乾馬齒莧一斤濕馬

齒莧二斤五加皮半斤蒼朮四兩春碎以水煎

湯洗澡急用葱薑搗爛沖熱湯三碗服之暖處

取汗立時痛止

【本草方】用羊脛骨酒浸服之

●腰脚拘攣轉筋

【圖經本草】腰脚風血積冷筋急拘攣疼痛者取

茄子五十斤切洗以水五斗煮取濃汁濾去滓

更入小鑊中煎至一升以來即入生粟粉同煎

令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂末同丸

如梧子大每日用秫米酒送下三十九近暮再服一月乃瘥男子女人通用皆驗

【孫用和祕寶方】松節一兩剉如米大乳香一錢銀石器慢火炒焦存一二分性出火毒研末每服一二錢熱木瓜酒調下一應筋病皆治之

●手足痛風

【虞博醫學正傳】手足風痛冷痛如虎咬者用樟木屑一斗急流水一石煎滾泡之乘熱安足于桶上薰之以草薦圍住勿令湯氣入目其功甚捷此家傳經驗方也

【發明】頌曰桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時采葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即采取與前葉同陰乾搗末丸散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋

灑手足去風痺殊勝又微炙和桑衣煎服治痢及金瘡諸損傷止血

●渾身拘痛

【發明】珣曰按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云腳氣藥悉不效周離亨言是氣血凝滯所致用元胡索當歸桂心等分為末溫酒服三四錢隨量頻進以止為度遂痛止蓋元胡索能活血化氣第一品藥也

【蘇頌圖經本草方】山龍膽根細切用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗末水煎一錢七分溫服之此與龍膽同類別種經霜不凋

【救急方】破草鞋燒灰香油和貼痛處即止

●風涎暴作

【崔氏纂要方】四肢攣縮不能行取大豆三升淘淨濕蒸以醋二升傾入瓶中鋪于地上設席豆上令病人臥之仍重蓋五六層衣豆冷漸漸却衣仍令一人於被內引挽攣急處更蒸豆再作餅飲荆瀝湯如此三日三夜卽休

【經驗方】大人風涎用蝸一個薄荷葉包炙要頭尾全者薄荷葉四葉裹定火上炙焦同研爲末作一服白湯下

●賊風腫痺

【肘后方】風入五藏恍惚莽草膏主之莽草一斤烏頭附子躑躅各二兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手卽瘥若耳鼻疾可以綿裹塞之疥癬雜瘡並宜摩之

●暗風卒倒

【危氏得效方】不省人事細辛末吹入鼻中卽甦

●虛損風疾

【攝生衆妙方】接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之證又治中風不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進諸證用人乳二盃香甜白者爲佳以好梨汁一盃和勻銀石器內燉滾每日五更一服能消痰補虛生血延壽此乃以人補人其妙無加

●賊風口偏

【孟詵食療方】茱萸一升薑汁三升清酒五升和煎五沸待冷服半升一日三服得少汗卽瘥

【外臺祕要方】偏風口喎取白魚摩耳左喎摩右右喎摩左正乃已

【主治】鹿肉補中益氣力強五藏生者療中風口

僻割片薄之別錄華佗云中風口偏者以生鹿

肉同生椒搗貼正即除之

●諸風不遂

【宋氏集驗方】用生草烏頭晚蠶沙等分為末取

生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每服四五丸

白湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂渚小金丹

【經驗濟世方】用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽

一兩同以沙瓶煮三沸時去豆將烏豆入木臼

搗三百杵作餅焙乾為末酒糊丸梧子大每空

心鹽湯下十九名至寶丹

●體虛有風

【本事方】外受寒濕身如在空中生附子生天南

星各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服予曾

病此醫傳張子發授此方二服愈

●痰迷心竅

【和劑局方】壽星九天南星一斤先掘土坑一尺

以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星

在內盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出為

末琥珀一兩硃砂二兩為末生薑汁打麪糊丸

梧子大每服三十九至五十九煎人參湯石菖

蒲湯下一日三服

●癘風鼻塌

【杜任方】有手指彎曲節間痛不可忍漸至斷落

者蓖麻子一兩去皮黃連一兩剉豆大以小瓶

子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖

麻子一枚劈開面東以浸藥水吞之漸加至四

五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後吃大蒜

猪肉試之如不發是效也若發動再服直候至不發乃止

●骨軟風疾

【經驗方】腰膝疼行步不得遍身癢痒用何首烏大而有花紋者同牛膝各一斤以好酒一斤浸七宿曝乾木臼杵末棗肉和丸梧子大每服三五十丸空心酒下

●骨風

【發明】凡男婦無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風不宜針灸服藥每日取水英草五斤以水一石煮三斗及熱浸并淋膝上日夜三四度不經五日即瘥數用神驗其藥春取苗夏採葉及花冬用根腫甚者加生椒目三升水二斗用畢即摩粉避風忌油膩生菜猪魚等物

●風癢痒痺

【孟詵食療方】茱萸一升酒五升煮取一升半溫洗之立止

●風濕身痛

【丹溪心法】生葱搗爛入香油數點水煎調川芎藭鬱金末一錢服取吐

●風水惡風

【仲景方】汗出身腫脈浮黃芪防己湯主之防己一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢半炙甘草半兩剉散每服五錢生薑四片棗一枚水一盞半煎八分溫服良久再服腹痛加芍藥

●風疾恍惚

【聖惠方】心煩腹痛或時悶絕復甦青殺角屑微炒爲末無時溫酒服一錢

●風病自汗

【發明】時珍曰麤衝乃素問所用治風病自汗藥而後世不知用之誠缺略也素問黃帝曰有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風治之以澤瀉朮各三五分麤衝五分合以三指撮為後飯後飯者先服藥也

●卒風不語

【唐瑤經驗方】卒然中風防風荆芥各一兩升麻半兩薑三片水一盞煎半盞以絲瓜子研取漿半盞和勻灌之如手足麻痒以羌活煎湯洗之  
【發明】孫用和家傳祕寶方云凡人卒中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸痺氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥實不蛀

者四挺去黑皮白礬光明者一兩為末每用半錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便大吐之恐過劑傷人累效不能盡述

【肘后方】穀枝葉剉細酒煮沫出隨多少日日飲之

●風入臟中

【千金翼方】大豆一斗水五斗煮取一斗二升去滓入美酒斗半煎取九升旦服取汗神驗

●風痺緩急

【張仲景方】薏苡仁十五兩大附子十枚炮為末每服方寸七日三

【聖濟方】周痺野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服

●旋風眩冒

【聖惠方】鷓頭丸用鷓頭一枚炒黃真藺茹白朮各一兩川椒半兩炒去汁爲末蜜丸梧子大每酒下二十九

●一髀風痛

【發明】按范汪方云宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾一髀偏痛一人令穿地作坑取雞屎葉荆然之安脛入坑中薰之有長蟲出遂愈也

●數年風疾

【發明】傷寒傷酒食等症已列一切風疾中

●風痰眩悶

【發明】頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者石綠研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒

溫調服之偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速于他藥今人用之比皆效故著之

●卒風偏急

【發明】時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉爲之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脈也手足陽明之經絡於口會太陽之筋絡於口寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脈

用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

●風疾百病

【發明】經效方云青賊山丈人觀主康道豐治百病雲母粉方用雲母一斤折開揉入大瓶內築實上澆水銀一兩封固以十斤頂火煨赤取出却拌香葱紫連翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛于大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗取粉以木盤一面于灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內候乾焙之以麵和九梧子大遇有病者服之無不效成都府辛諫議曾患大風衆醫不愈道豐進此服之神驗

●活血治風

【發明】其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼爲末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十九亦可末服

●搜風順氣

【澹寮方】烏附丸用川烏頭二十個香附子半斤薑汁淹一宿炒焙爲末酒糊丸梧子大每溫酒下十九肌體肥壯有風疾者宜常服之

●祛風除濕

【集簡方】脾胃虛弱久積冷氣飲食減少草烏頭一斤蒼朮一斤以去白陳皮半斤生甘草四兩黑豆三升水一石同煮乾只揀烏朮晒焙爲末酒糊丸梧子大焙乾收之每空心溫酒下二三十九覺麻即漸減之名烏朮丸

●搜風化痰

【和劑局方】定志安神利頭目辰砂化痰丸用半

夏麴三兩天南星炮一兩辰砂枯礬各半兩爲

末薑汁糊丸梧子大每服三十九食後薑湯下

●宜吐風痰

【勝金方】用蘿蔔子末溫水調服三錢良久吐出

涎沫如是攤緩風者以此吐後用緊疎藥疎後

服和氣散取瘥

【丹溪吐法】用蘿蔔子半升搗細以水一碗濃取

汁入香油及蜜些須溫服後以桐油浸過晒乾

鵝翎探吐

●搜風通滯

【斗門方】用牽牛子以童便浸一宿長流水上洗

半日生絹袋盛掛風處令乾每日鹽湯下三十

粒極能搜風亦消虛腫久服令人體清瘦

●祛風益顏

【奇效方】真乳香二斤白蜜三斤瓷器合煎如餲

每日服二匙

●延年祛風

【千金翼方】用桃仁五合去皮用粳米飯漿同研

絞汁令盡溫溫洗面極妙

●羌活治風

【發明】時珍曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關利

節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而

去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能

引氣上升通達周身而散風勝濕按文系曰唐

劉師正之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸

酒服便愈師正訪問皆不曉復夢其母曰胡王

使者即羌活也求而用之兄疾遂愈嘉謨曰羌

活本手足太陽表裏引經之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔儒之主小無不入大無不通故能散肌表八風之邪利周身百節之痛

●一粒金丹

【襲雲林醫鑑】真阿芙蓉一分粳米飯搗作三丸每服一丸未效再進一丸不可多服忌醋令人腸斷風癱熱酒下口目喎邪羌活湯下百節痛獨活湯下正頭風羌活湯下偏頭風川芎湯下眩暈防風湯下久嗽乾薑阿膠湯下陰毒豆淋酒下瘡疾桃柳枝湯下痰喘葶藶湯下勞嗽款冬花湯下吐泄霍香湯下赤痢黃連湯下白痢薑湯下噤口痢白朮湯下諸氣痛木香酒下熱痛卮子湯下臍下痛燈心湯下小腸氣川棟茴

香湯下血氣痛乳香湯下脇痛熱酒下噎食生薑丁香湯下女人血崩五靈脂湯下小兒慢脾風砂仁湯下

●大麻仁酒

【篋中方】治骨髓風毒疼痛不可運動用大麻仁水浸用沉香一大升曝乾於銀器中旋旋慢炒香熟入木臼搗至萬杵待細如白粉即止平分爲十帖每用一帖取家釀無灰酒一大碗同麻粉用柳槌蘸入砂盆中搗之瀘去殼煎至減半空腹溫服一帖輕者四五帖見效甚者不出十帖必失所苦效不可言

●薏苡仁粥

【本草方】治久風濕痺補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈拘攣薏苡仁爲末同粳米煮

粥日日食之良

●炒豆紫湯

【本草方】頌曰古方有紫湯破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服之用烏豆五升清酒一斗炒令烟絕投酒中待酒紫赤色去豆量性服之可日夜三盞神驗中風口噤加雞屎白二升和炒投之

●豆淋酒

【本草方】宗奭曰治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱癱瘓口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭眩眼眩此皆虛熱中風也用大豆三升熬熟至微煙出入瓶中以酒五升沃之經一日以上服酒一升溫覆令少汗出身潤即愈口噤加

獨活半斤微微搗破同沃之產後宜常服以防風氣又消結血

●大豆蘗散

【宣明方】治周痺邪在血脈之中水痺不痛上下周身故名此藥注五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣用大豆蘗一斤炒香爲末每服半錢溫酒調下日三服

●天蓼酒

【聖惠方】治風立有奇效木天蓼一斤去皮細剉以生絹盛入好酒三斗浸之春夏一七秋冬二七每空心日午下晚各溫服一盞飲若常服只飲一次老幼臨時加減

●驅風膏

【醫壘元戎方】治風癱癘風遍身疥癬用白花蛇

肉四兩酒炙天麻七錢半薄荷荊芥各二錢半  
為末好酒二升蜜四兩石器熬成膏每服一盞  
溫湯服日三服急于暖處出汗十日效

●白花蛇酒

【瀕湖集簡方】治諸風無新久手足緩弱口眼喎

斜語言蹇滯或筋脈攣急肌肉頑痺皮膚燥痒

骨節疼痛或生惡瘡疥癩等疾用白花蛇一條

溫水洗淨頭尾各去三寸酒浸去骨刺取淨肉

一兩入全蝎炒當歸防風羌活各一錢獨活白

芷天麻赤芍藥甘草升麻各五錢剉碎以絹袋

盛貯用糯米二斗蒸熟如常造酒以袋置缸中

待成取酒同袋密封煮熟置陰地七日出毒每

溫飲數盃常令相續此方乃斬人板印以侑蛇

饋送者不知所始也

●白花蛇膏

【三因方】白花蛇五寸酒浸去皮骨炙乾雄黃一

兩水飛研勻以白沙蜜一斤杏仁一斤去皮研

爛同煉為膏每服一錢溫酒化下日三須先服

通天再造散 去蟲物乃服此除根

●白花蛇散

【家珍方】治大風病白花蛇烏梢蛇各取淨肉二

錢酒炙雄黃二錢大黃五錢為末每服二錢白

湯下三日一服

●蚺蛇酒

【集簡方】治諸風癱瘓筋攣骨痛痺木瘰痒殺蟲

辟瘴及癘風疥癬惡瘡用蚺蛇肉一斤羌活一

兩絹袋盛之用糯米二斗蒸熟安麴于缸底置

蛇于麴上乃下飯密蓋待熟取酒以蛇焙研和

藥其酒每隨量溫飲數盃忌風及慾事亦可袋盛浸酒飲

●神鍼雷火鍼

【發明】時珍曰神鍼火者五月五日取東引桃枝削爲木針如雞子大長五六寸乾之用時以綿紙三五層襯于患處將鍼蘸麻油點着吹滅乘熱針之又有雷火神鍼法用熟蘄艾末二兩乳香沒藥穿山甲硫黃雄黃草烏頭川烏頭桃樹皮末各一錢麝香五分爲末拌艾以厚紙裁成條鋪藥艾于內緊卷如指大長三四寸收貯瓶內埋地中七七日取出用時于燈上點着吹滅隔紙十層乘熱鍼于患處熱氣直入病處其效更速並忌冷水

●鱉膽散

【聖濟總錄方】治大風癩疾用鱉魚膽生白礬生綠礬膩粉水銀麝香各半兩研不見星每服一錢井華水下取下五色涎爲妙

●火鍼

【釋名方】時珍曰火鍼者素問所謂燔鍼焮鍼也張仲景謂之燒鍼川蜀人謂之煨鍼其法麻油滿盞以燈草二七莖點燈將鍼頻塗麻油燈上燒令通赤用之不赤或冷則反損人且不能去病也其鍼須用火筋鐵造之爲佳點穴墨記要明白差則無功

●三木節散

【聖惠方】治風勞面色青白肢節沉重脊間痛或寒或熱或燥或真思食不能食被蟲侵蝕證狀多端天靈蓋酥炙研二兩牛黃人中白焙各半

兩麝香二錢爲末別以樟木瘤節皂莢木瘤節槐木瘤節各爲末五兩每以二錢水一盞煎半盞去滓調前末一錢五更頓服取下蟲物爲最妙

● 熨風法

【發明】宏景曰蠶沙多入諸方不但熨風而已宗奭曰蠶屎飼牛可以代穀用三升醇酒拌蠶沙五斗甑蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣痺及近感癱風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取汗若虛人須防大熱昏悶令露頭面若未全愈間日再作時珍曰蠶屬火其性燥燥能勝風去濕故蠶沙主療風濕之病有人病風痺用此熨法得效按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風眼以真麻油浸蠶沙二三宿研細以篋子塗患處不

問新舊隔宿卽愈表兄盧少樊患此用之而愈親筆于冊也時珍家一婢病此十餘年試用之二三次頓瘳其功亦在去風收濕也又同桑柴灰淋汁煮鰾肉作丸治腹中癥結見鰾條李九華云蠶沙煮酒色味清美又能療疾

● 三蛇愈風丹

【本草方】治瘋風手足麻木眉毛脫落皮膚癢痒及一切風瘡白花蛇烏梢蛇土蝮蛇各一條並酒浸取肉晒乾苦參頭末四兩爲末以皂角一斤切酒浸去酒以水一碗按取濃汁石器熬膏和九梧子大每服七十九煎通聖散下以粥飯壓之日三服三日一浴取汗避風 治例無蝮蛇有大風子肉二兩

● 茵蘘酒

【圖經本草方】治賊風手足苦痺拘攣用茵蘘附子天雄烏頭秦芫女萎防風防己石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥成每服一合日二服以微痺爲度方出湖洽居士百病方

●茵芋丸

【本事方】治風氣積滯成脚氣發則痛者茵芋葉炒薏苡仁各半兩郁李仁一兩牽牛子三兩生研末半兩右爲末煉蜜丸梧子大每服二十九五更薑棗湯下取利未利再服取快

●長松酒

【韓氏醫通】滋補一切風虛乃廬山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香乃酒中勝藥也熟地黃八錢生地黃黃芪蜜炙陳皮各七錢當

歸厚樸黃蘗各五錢白芍藥煨人參枳殼各四錢蒼朮米泔製半夏製天門冬麥冬砂仁黃連各三錢木香蜀椒胡桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一料分十劑絹袋盛之米五升造酒一尊煮一袋嘗久乃飲

●天麻丸

【普濟方】消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭暈欲倒項急肩背拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻斃面目虛浮並宜服之天麻半兩芎藭二兩爲末煉蜜丸如芡子大每食後嚼一丸茶酒任下

●何首烏丸

【發明】宋懷州知州李治與一武臣同官怪其年

七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃傳其方後治得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹體其活血治風之功大有補益其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼爲末煉蜜丸梧子大每空心溫酒服下五十丸亦可末服

# 古今名醫驗方類編目錄

## 卷三 通治部

### 霍亂門

|        |   |        |   |      |   |
|--------|---|--------|---|------|---|
| 霍亂吐瀉   | 一 | 霍亂困篤   | 五 | 傷寒無汗 | 六 |
| 乾霍亂    | 二 | 吐瀉不止   | 五 | 傷寒發狂 | 七 |
| 霍亂轉筋   | 二 | 霍亂煩脹   | 五 | 傷寒衄血 | 七 |
| 轉筋入腹   | 三 | 霍亂吐逆   | 五 | 傷寒頭痛 | 七 |
| 霍亂須吐   | 三 | 霍亂大渴   | 五 | 傷寒咽痛 | 七 |
| 霍亂欲死   | 三 | 霍亂不通   | 五 | 傷寒煩渴 | 七 |
| 霍亂煩悶躁渴 | 三 | 乾濕霍亂   | 五 | 傷寒心悸 | 七 |
| 伏暑霍亂   | 四 | 中惡霍亂   | 五 | 夾驚傷寒 | 七 |
| 霍亂脹痛   | 四 | 風痰霍亂   | 五 | 傷寒腹脹 | 七 |
| 霍亂腹痛   | 四 | 霍亂不進藥食 | 五 | 傷寒目翳 | 七 |
| 霍亂嘔惡   | 五 | 傷寒門    |   | 乾嘔脇痛 | 八 |
| 霍亂厥逆   | 五 | 傷寒初起   | 五 | 傷寒肢痛 | 八 |
| 霍亂成痢   | 五 | 傷寒譫語   | 六 | 傷寒舌出 | 八 |
| 吐痢卒死   | 五 | 傷寒咳逆   | 六 | 傷寒胸痛 | 八 |
|        |   | 傷寒狐惑   | 六 | 傷寒熱結 | 八 |
|        |   | 傷案陽毒   | 六 | 傷寒結胸 | 八 |
|        |   | 傷寒發汗   | 六 | 傷寒血結 | 八 |

傷寒餘熱.....八

傷寒時疫.....八

傷寒氣喘.....九

傷寒乾嘔.....九

傷寒厥逆.....九

傷寒搐搦.....九

傷寒懊憹.....九

傷寒呃噫.....九

下早成痞.....九

傷寒尿瀉.....九

傷寒赤斑.....九

傷寒下痢.....九

傷寒下蠱.....一〇

傷寒動氣.....一〇

傷寒脫陽.....一〇

傷寒毒攻.....一〇

傷寒痞滿.....一〇

傷寒發躁.....一〇

陰症傷寒.....一〇

陰毒傷寒.....一〇

夾陰傷寒.....一一

陰盛格陽.....一一

陰症呃逆.....一一

少陰傷寒.....一一

少陰下痢.....一一

傷寒勞復.....一一

傷寒食復.....一一

傷寒不解.....一一

傷寒發黃疽.....一一

傷寒黃疸.....一一

四肢傷寒.....一一

急傷寒病.....一一

熱病吐下.....一一

傷寒時疫.....一一

預防勞復.....一一

百合病.....一一

百合變渴.....一一

百合變熱.....一一

百合腹痛.....一一

一切傷寒.....一一

桃葉發汗.....一四

風熱驚狂.....一五

橘皮湯.....一五

文蛤散.....一五

正陽丹.....一五

茵陳羹.....一六

傷寒雪煎.....一六

紫雪.....一六

傷風門.....一六

風寒流涕.....一六

偶感風寒.....一六

感冒風寒.....一六

風祕氣祕.....一六

惡風入腹.....一六

傷風下痢.....一六

風寒無汗.....一六

初感風寒.....一六

風濕發汗.....一六

中寒昏困.....一六

中寒門.....一六

感寒上氣.....一六

感寒無汗.....一六

腹中痞硬.....一六

發散邪寒.....一六

冬月感寒.....一六

內傷寒中.....一六

寒澀宿食.....一七

虛寒積滯.....一七

陰痺熨法.....一七

三建湯.....一七

中濕門

中濕骨痛.....一七

濕氣作痛.....一七

濕熱水病.....一七

濕熱眩暈.....一七

濕熱氣.....一七

風濕冷痺.....一七

濕氣中滿.....一七

渾身拘痛.....一七

蒼朮散.....一八

痢冷門

久冷反胃.....一八

一切冷氣.....一八

元藏久冷.....一八

元藏冷泄.....一八

元藏腹冷.....一八

腹中冷癖.....一八

諸冷極病.....一九

冷勞久病.....一九

大腸積冷.....一九

冷症伏火.....一九

腎藏虛冷.....一九

積冷痲癖.....二〇

虛冷短氣.....二〇

心腹冷痛.....二〇

宿冷惡病.....二〇

下焦冷氣.....二〇

薤苳仁飯.....二〇

快膈湯.....二〇

烏沉湯.....二〇

麻木門

麻木疼痛.....二〇

麻痺疼痛.....二〇

十指疼痛.....二〇

年久麻痺.....二〇

手足麻痺.....二〇

項強身急.....二一

腹皮麻痺.....二一

身體麻木.....二一

風痰麻木.....二一

風病麻木.....二一

面上木痺.....二一

三蛇愈風丹.....二一



古今名醫驗方類編卷三

通治部

霍亂門

●霍亂吐瀉

【救急良方】勿食熱物飲井華水一碗仍以水一

盆浸兩足立止

【主治】霍亂及中暈卒死者用地漿一升飲之妙

取時掘黃土三尺以新汲水沃之入攪濁少頃

取清用之故曰地漿亦曰土漿

【兵部手集方】酸漿水煎乾薑屑呷之一嘉謨曰

漿酢也炊粟米熟投冷水中浸五六日味酢生

白花色類漿故名若浸至敗者害人

【發明】凡脾胃濕多吐瀉霍亂者以東壁土新汲

水攪化澄清服之即止蓋脾主土喜燥而惡濕

故取太陽真火所照之士引真火生發之氣補

土而勝濕則吐瀉自止

【經驗方】鍋底墨煤半錢灶額上墨半錢百沸湯

一盞急攪數千下以盃覆之通口服一二口立

止

【衛生易簡方】屋下倒掛塵滾湯泡澄清服即止

【指南方】冷熱霍亂分利陰陽元精石半夏各一

兩硫黃三錢爲末麪糊丸梧子大每米飲服三

十九

【聖濟錄】硫黃一兩胡椒五錢爲末黃蠟一兩化

九梧子大每涼水下一丸

【華陀危病方】枯白礬末一錢百沸湯調下

【聖濟總錄】煩躁不止人參二兩橘皮三兩生薑

一兩水六升煮三升分三服

【外臺方】火炙高良薑令焦香每用五兩以酒一

升煮三四沸頓服亦治腹痛中惡

【普濟方】肉豆蔻為末薑湯服一錢

【百一選方】垂死者服之回生用藿香葉陳皮各

半兩水二盞煎一盞溫服

【外臺祕要方】不止以艾一把水三升煮一升頓

服

【食醫心鏡方】篇竹入豉汁中下五味煮羹食

【孫兆祕寶方】不止用附子重七錢者炮去皮臍

為末每服四錢水二盞鹽半錢煎一盞溫服立

止

【本草方】山豆根末橘皮湯下三錢

【聖惠方】防己白芷等分為末新汲水服二錢

【普濟方】煩渴欲絕用硬米二合研粉入水二盞

研汁和淡竹瀝一合頓服

【外臺方】霍亂煩躁黃梁米粉半升水升半和攪

如白粉頓服

【生生編】綠豆粉白糖各二兩新汲水調服即愈

【聖惠方】豌豆三合香葉三兩為末水三盞煎一

盞分二服

【千金方】扁豆香薷各一升水六升煮二升分服

【如宜方】鹽醋煎服甚良

【聖濟總錄】芥子搗細水和敷臍上

【如宜方】鹽梅煎湯細細飲之

【聖惠方】梨枝煮汁飲

【百一選方】不拘男女但有一點胃氣存者服之

再生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎

一盞時時溫服

【聖惠方】用陳皮末二錢湯點服不省者灌之仍

燒磚沃醋布裹磚安心下熨之便活

【孫真人方】用胡椒三十粒以飲吞之

【直指方】用胡椒四十九粒綠豆一百四十九粒

研勻木瓜湯下一錢

【聖惠方】生藕搗汁服之

【集元方】儉本人頭繒以百沸湯泡汁服一呷勿

令知之

【事海文山方】出路在家應急方用路旁破草鞋

去兩頭洗三四次水煎湯一盃滾服之即愈

【肘后方】蠟一彈丸熱酒一升化服即止

【劉涓子鬼遺方】用烏牛鬚草一團人參生薑各

三兩甜漿水一升半煮汁五合服

【外臺方】四肢逆冷用黃牛屎半升水二升煮三

沸服半升止

【聖惠方】用烏牛糞絞汁一合以百日兒乳汁一

合和溫服

●乾霍亂

【千金方】不吐不利脹痛欲死地漿三五盞服即

愈大忌米湯

【摘元方】千年石灰沙糖水調服二錢或醋湯亦

可名落盞湯

【發明】頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一

年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三

大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃色用童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈

【小品方】心腹脹痛蘆蓬茸一把水煮濃汁頓服一升

【韋宙獨行方】以雍一虎口以水三升煮取一半頓服不過三作即已

【聖濟總錄】心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末五錢童子小便半盞水一盞煎服

【聖濟總錄】吳茱萸炮炒乾薑炮等分水煎服之  
【孫思邈千金方】丁香十四枚研末以沸湯一升和之頓服不瘥更作

【本草方】巴豆一枚去皮心熱水研服得吐利即定也

【發明】劉義慶幽明錄云張甲與司徒蔡謨有親謨晝寢夢甲忽暴病心腹痛脹滿不得吐下名乾霍亂惟用蜘蛛生斷脚吞之即愈但人不知甲某時死矣謨覺使人驗之果死矣後用此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔逆霍亂之文當亦不謬蓋蜘蛛服之能令人利也  
【十便良方】脹滿煩躁亂髮一團燒灰鹽湯一升和服取吐

●霍亂轉筋

【嘉祐本草方】以器盛湯熨之仍令蹋器使足底熱徹冷則易

【聖濟錄方】青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二盞煎分溫服

【外臺祕要方】身冷心下微溫者硃砂研二兩或

三兩和丸著火籠中薰之周圍厚覆之勿令煙洩兼牀下著火令腹微煖良久當汗出而甦

【救急方】欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯卽甦

【聖濟總錄方】腹痛木香末一錢木瓜汁一盞入熱酒調服

【聖惠方】肝虛轉筋吐瀉赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合分三服

【藥性論方】蓼葉一升水三升煮取汁二升入香豉一升更煮一升半分三服

【普濟方】白蔞豆爲末醋和服

【聖濟錄】入腹殺人以小蒜鹽各一兩搗傅臍中灸七壯立止

【外臺祕要方】入腹欲死生薑三兩搗酒一升煮

三兩沸服仍以薑搗貼痛處

【聖惠方】木瓜一兩酒一升煎服不飲酒者煮湯服仍煎湯浸青布裹其足

【聖惠方】柏葉搗爛裹脚上及煎汁淋之

【經驗方】以煖物裹脚後以柏木片煎湯淋之

【深師方】皂角末吹豆許入鼻取嚏卽安

【聖惠方】入腹煩悶桑葉一握煎飲一二服立定

【肘后方】心腹脹滿未得吐下卮子二七枚燒研

熱酒服之立愈

【千金方】入腹無可奈何者以酢煮青布搽之冷則易

【聖惠方】腹痛以苦酒煮綿絮裹之

【陳藏器本草方】故麻鞋底燒赤投酒煮取汁服

【千金方】入腹痛用敗小木梳一枚燒灰酒服永

瘧

【聖惠方】垂死者敗蒲蓆一握切漿水一盞煮汁

温服

【千金方】入腹痛車轂中脂塗足心

●轉筋入腹

【肘后方】釜底墨末和酒服一錢

【聖濟錄方】茱萸炒二兩酒二盞煎一盞分二服

得下即安

【張仲景方】其人臂脚直其脈上下微弦用雞屎

爲末水六合和方寸七温服合

●霍亂須吐

【發明】時珍曰霍亂及乾霍亂須吐者以樟木屑

煎濃汁吐之甚良

●霍亂欲死

【梅師方】生薑五兩牛兒屎一升水四升煎二升

分再服即止

●霍亂煩悶躁渴

【聖濟總錄】向陽壁土煮汁服

【聖濟總錄】霍亂煩滿氣逆腹脹手足厥冷不灰

木陽起石煨阿魏半兩巴豆去心杏仁去皮各

二十五個爲末粟飯丸櫻桃大穿一孔每服一

丸燈上燒煙盡研末薑湯下以利爲度

【聖惠方】人參五錢桂心半錢水二盞煎服

【聖濟總錄方】草豆蔻黃連各一錢半烏豆五十

粒生薑三片水煎服之

【千金方】蘆根三錢麥門冬一錢水煎服

【聖惠方】蘆葉二握水煎服 又方蘆葉五錢糯

米二錢半竹茹一錢水煎入薑汁蜜各半合煎

兩沸時時呷之

【聖惠方】麥子一兩香薷二兩每服二錢水煎服

【聖惠方】蘆根炙一兩半水萍焙人參枇杷葉炙

各一兩每服五錢入薤白四寸酒煎溫服

【楊氏產乳方】糯米三合水五升蜜一合研汁分

服或煮汁服

【外臺方】黃梁米粉半升水升半和攪如白粉頓

服

【深師方】坐臥不安葱白二十莖大棗二十枚水

三升煎二升分服

【主治時珍】聖惠方每嚼木瓜核七粒溫水嚥服

之

【聖濟總錄方】茶葉末一錢煎水調乾薑末一錢

服之即安

【聖濟總錄】藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲

【聖惠方】槐葉桑葉各一錢炙甘草三分水煎服

●伏暑霍亂

【鄭氏小兒方】伏熱吐瀉陰陽丸用硫黃半兩水

銀一錢研墨薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水

下大人三四十九

【普濟方】或吐或瀉或瘧小便赤煩渴玉液散用

桂府滑石燒四兩藿香一錢丁香一錢爲末米

湯服二錢

【禹講師經驗方】滑石炒二兩藿香二錢半丁香

五分爲末每服一二錢浙米泔調服

【本草方】小便不利頭暈引飲三白散用澤瀉白

朮白茯苓各三錢水一盞薑五片燈心十莖煎

八分溫服

【本草方】陳倉米二升麥芽四兩黃連四兩切同

蒸熟焙研為末水丸梧子大每服百丸白湯送

下

【和劑局方】傷冷吐利煩濕水浸丹用巴豆二十

五個去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃

蠟和丸綠豆大每服五七丸水浸少頃別以新

汲水吞下

●霍亂脹痛

【肘后方】未得吐下用生紫蘇搗汁飲之佳乾蘇

煮汁亦可

【太平聖惠方】蘆根一升生薑一升橘皮五兩水

八升煎三升分溫服

【肘后方】半夏桂等分為末水服方寸七

【聖惠方】生苧蒲剉四兩水和搗汁分溫四服

【普濟方】大豆生研水服方寸七

【肘后方】不得吐下名乾霍亂小蒜一升水三升

煮一升頓服

【瀕湖集簡方】蕪菁子水煮汁飲之

【肘后方】用生薑一斤水七升煮二升分三服

●霍亂腹痛

【救急方】炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包

熨其背

【聖惠方】高良薑一兩剉以水三大盞煎二盞半

去渣入粳米一合煮粥食之便止

【外臺方】桃葉三升切水五升煮一升分二服

【聖惠方】木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服

之

【本草方】用厚朴炙四兩桂心二兩枳實五枚生

薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱居方

也 唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟治

霍亂凡諸病皆治 聖惠方用厚朴薑汁炙研

末新汲水服二錢如神

●霍亂嘔惡

【衛生家寶方】人參二兩水一盞半煎汁一盞入

雞子白一枚再煎溫服一加丁香

【普濟方】用高良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷

服立定名冰壺湯

●霍亂厥逆

【千金方】服烏牛尿二升

●霍亂成痢

【聖濟總錄】劉寄奴草煎汁飲

●吐痢卒死

【子母祕錄】及大人小兒卒腹皮青黑赤不能喘

息卽急用女青末納口中酒送下

●霍亂困篤

【聖惠方】雞蘇三兩水二升煎一升分三服

【千金方】童女月經衣和血燒灰酒服方寸七百

方不瘥者用之

●吐瀉不止

【普濟方】或四肢厥逆虛風不省人事服此則陽

回用天南星爲末每服三錢京棗三枚水二鍾

煎八分溫服未省再服名回陽散 又方醋調

南星末貼足心

●霍亂煩脹

【千金方】未得吐下用好苦酒三升飲之

●霍亂吐逆

【錢氏小兒方】不問虛實冷熱用水銀硫磺等分

研不見星每服一字至半錢生薑湯調下一氣

散一名青金丹

●霍亂大渴

【肘后方】不止多飲則殺人用黃梁米五升水一

斗煮三升稍稍飲之

【永類鈴方】以黃倉米三升水一升煮汁澄清飲

良

●霍亂不通

【總錄方】脹悶欲死因傷飽取涼者用雄雀糞二

十一粒研末温酒服未效再服

●乾濕霍亂

【永類鈴方】當分利陰陽轉筋用大蒜搗塗足心

立愈

●中惡霍亂

【聖濟總錄】海桐皮煮汁服之

【聖惠方】麝香一錢醋半盞調服

●風痰霍亂

【外臺祕要】食不消大便瀼用訶黎三枚取皮為

末和酒頓服三五次妙

●霍亂不進藥食

【主治】陰陽水調中消食凡痰瘡及宿食毒惡之

物臚脹欲作霍亂者即以鹽投中進一二升令

吐盡痰食便愈藏器方 凡霍亂及嘔吐不能

納食及藥危甚者先飲數口即定時珍方

傷寒門

●傷寒初起

【發明】張從正曰凡傷寒傷風傷食傷酒初起無藥便飲太和湯芎藭或酸薑汁亦可以手揉肚

覺恍惚再飲再揉至無所容探吐汗出則已

【陳藏器本草】取熱湯飲之候吐則止

【千金方】傷寒初得不問陰陽以皂角一挺肥者燒赤爲末以水五合和頓服之陰病極效

●傷寒謔語

【簡便方】奔走似顛如見鬼神久不得汗不知人

事者用蚯蚓屎涼水調服

【聖惠方】傷寒發黃用大黃五兩剉炒微赤爲散

用臘雪水五升煎如膏每服半匙冷水下

【傷寒類要】氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平

且煎汁一升入芒硝一兩緩服須臾當利下

●傷寒咳逆

【活人方】服藥無效雄黃二錢酒一盞煎七分乘熱嗅其氣卽止

【醫林集要】聲聞四隣四花青皮全者研末每服

一二錢白湯下

【聖惠方】日夜不止寒氣攻胃也胡椒三十粒打

碎麝香半錢酒一鍾煎半鍾熱服

【蘇頌圖經】用畢澄茄高良薑各等分爲末每服

一二錢水六分煎十沸入酢少許服之

【簡要濟衆方】丁香一兩乾柿蒂焙一兩爲末每

服一錢煎人參湯下

●傷寒狐惑

【聖惠方】蟲蝕下部痛痒不止雄黃半兩燒於瓶

中薰其下部

【小品方】食肛者薰草黃連各四兩咬咀以白酸

漿一斗漬一宿煮取二升分三服

【金匱要略】張仲景曰狐惑病脈數無熱微煩默

默但欲臥汗出初得三四日目赤如鳩七八日

目四眦黃黑若能食者膿已成也赤小豆當歸

散主之赤小豆三升水浸令芽出當歸三兩為

末漿水服方寸七日三服

●傷寒陽毒

【全幼心鑑】狂言妄語亂走毒氣在臟也鐵粉二

兩龍膽草一兩為末磨刀水調服一錢小兒五

分

【易簡方】陽毒發狂奔走不定宜黃連寒水石等

分為末每服三錢濃煎甘草湯下

【活人書】青布一尺浸冷水貼其胸前

●傷寒發汗

【外臺祕要】治傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始

得一二日者取真丹一兩水一斗煮一升頓服

覆被取汗忌生血物 肘后方用真丹末酒調

遍身塗之向火坐得汗愈

【葛洪肘后方】云傷寒原有數種庸人卒不能分

別者今取一藥兼療之凡初覺頭痛身熱脈洪

一二日者便以葱豉湯治之用葱白一虎口豉

一升綿裹水三升煮一升頓服取汗更作加葛

根三兩再不汗加麻黃三兩 肘后方又法用

葱湯煮米粥入鹽豉食之取汗 又法用豉一

升小男溺三升煎一升分服取汗

●傷寒無汗

【傷寒蘊要】代赭石乾薑等分為末熱醋調塗兩

手心合掌握定夾于大腿內側溫覆汗出乃愈

●傷寒發狂

【本事方】踰垣上屋寒水石二錢黃連一錢爲末煎甘草湯冷服名鵠石散

【傷寒蘊要】元明粉二錢朱砂一錢爲末冷水服

【傷寒蘊要】草龍膽爲末入雞子清白蜜化涼水

服三錢

【醫林集要】驚怖恍惚用撒法卽二分水一盞浸

一夕服之天方國人所傳玉璽

【肘后方】六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削

去黑擘斷四寸一束以酒五合水一升煮半升

去滓頓服當吐下青黃汁數升卽瘥

【食鑑方】煩躁熱極吞生雞子一枚效

●傷寒衄血

【本事方】滑石末飯丸梧子大每服十九丸微嚼破

新水嚥下立止湯晦叔云鼻衄乃當汗不汗所

致其血紫黑時不以多少不可止之且服溫和

藥調其營衛待血鮮時急服此藥止之也

●傷寒頭痛

【梅師方】三二日發熱者葛根五兩香豉一升以

童子小便八升煎取二升分三服食葱粥取汁

卽愈

【活人書】如破者連髮葱白半斤生薑二兩水煮

溫服

【梅師方】肚熱胸中煩痛四五日不解烏梅十四

枚鹽五合水一升煎半升溫服取吐吐後避風

良

●傷寒咽痛

【張仲景傷寒論】少陰證甘草湯主之用甘草二

兩蜜水炙水二升煮一升半服五合日二服

【張文仲備急方】毒攻作腫用茵茹瓜甲大納口中嚼汁嚙之當微覺為佳

中嚼汁嚙之當微覺為佳

【龐安常傷寒論】咽閉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦去滓每噉棗許取瘥

兩合煎令焦去滓每噉棗許取瘥

●傷寒煩渴

【太平聖惠方】心神躁熱用秦苧一兩牛乳一大盞煎六分分作二服

盞煎六分分作二服

【外臺祕要】思飲栝樓根三兩水五升煎一升分二服先以淡竹瀝一斗水二升煮好銀二兩半冷飲汁然後服此

二服先以淡竹瀝一斗水二升煮好銀二兩半

冷飲汁然後服此

【龐安常傷寒論】口乾生藕汁生地黃汁童子小便各半盞煎溫服之

便各半盞煎溫服之

【張仲景方】口渴邪在臟也猪苓湯主之猪苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮取二升每服七合日三服嘔而思水者亦主之

茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮取二升

每服七合日三服嘔而思水者亦主之

●傷寒心悸

【傷寒類要】脈結代赭甘草二兩水三升煮一半服七合日一服

服七合日一服

●夾驚傷寒

【聖濟錄】紫背浮萍一錢犀角屑半錢鈎藤鈎三七個為末每服半錢蜜水調連進三服出汗為度

七個為末每服半錢蜜水調連進三服出汗為度

度

●傷寒腹脹

【南陽活人書】陰陽不和也桔梗半夏湯主之桔梗半夏陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服

梗半夏陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服

●傷寒目翳

【肘后方】燒鼓二七枚研末吹之

【肘后方】燒鼓二七枚研末吹之

●乾嘔脇痛

【仲景傷寒論】傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之芫花熬甘遂大戟各等分爲散以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人服一錢贏人半錢平旦服之當下利病除如不除明旦更服

●傷寒肢痛

【外臺】手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之瘥乃止或和豬膏塗之亦佳

●傷寒舌出

【洪邁夷堅志】過寸者梅花片腦半分爲末摻之隨手即愈

【普濟方】巴豆一粒去油取霜以紙捲卷內入鼻

中舌即收上

●傷寒胸痛

【嚴子北濟生方】傷寒後卒胸膈閉痛枳實麩炒爲末米飲服二錢日二服

●傷寒熱結

【肘后方】六七日狂亂見鬼欲走以大蜩半斤去泥用人溺煮汁飲或生絞汁亦可

●傷寒結胸

【外臺祕要方】天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參一兩以醋三升煮取一升二合飲之取吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗良  
【仲景傷寒論】正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連一兩栝樓實大者一個水六升先煮栝樓至三升去滓內二味煮

取二升分三服

【鄭氏家傳方】心腹硬痛用牽牛頭末一錢白糖

化湯調下

【龐安常傷寒論】已經汗下後者檳榔二兩酒二

盞煎一盞分二服

【傷寒蘊要】按之極痛或通而復結喘促大躁狂

亂取生地龍四條洗淨研如泥入生薑汁少許

蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服若熱熾者加

片腦少許卽與揉心下片時自然汗出而解不

應再服一次神效

●傷寒血結

【朱肱活人書】胸脹痛不可近仲景無方宜海蛤

散主之并刺期門穴用海蛤滑石甘草各一兩

芒硝半兩爲末每服二錢雞子清調服更服桂

枝紅花湯發其汗則愈蓋臚中血聚則小腸壅

小腸壅則血不行服此則小腸通則血流行而

胸膈利矣

●傷寒餘熱

【許學士本事方】傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱

推陳致新解利傷寒時氣伏暑倉卒並治不論

長幼柴胡四兩甘草一兩每用三錢水一盞煎

服

【千金方】傷寒熱病後口乾咽痛喜睡大棗二十

枚烏梅十枚搗入蜜丸含一杏仁咽汁甚效

●傷寒時疫

【王璆百一選方】凡傷寒時疫不問陰陽老幼姪

婦誤服藥餌困重垂死脈沈伏不省人事七日

以後皆可服之百不失一此名奪命散又名復

脈湯人參一兩水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁汗出脈復立瘥蘇韜光侍郎云用此救數十人予作清流宰縣倅中屠行輔之子婦患時疫三十餘日已成壞病令服此藥而安

●傷寒氣喘

【肘后方】不止用赤蘇一把水三升煮一升稍稍飲之

【本草方】喘急防己人參等分爲末桑白湯服二錢不拘老少

●傷寒乾嘔

【梅師方】半夏熟洗研末生薑湯服一錢七分

●傷寒厥逆

【三因方】身有餘熱煩躁六脈沈細微弱此陰極

發躁也無憂散用人參半兩水一鍾煎七分調牛膽南星末二錢熱服立甦

●傷寒搐搦

【朱肱活人書】汗後覆蓋不密致腰背手足搐搦者牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南星各六錢剉于盆內研細好酒一升同研以新布絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服一錢溫酒下日三服

【本草方】寇宗奭曰傷寒出汗不徹手脚搐者用海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩爲末酒丸彈子大捏扁置所患足心下別擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中熱水浸足至膝上水冷又添候遍身汗出爲度凡三日一作以知爲度

●傷寒懷懷

【傷寒論】吐下後心中懷懷大下後身熱不去心

中痛者並用梔子豆豉湯吐之肥梔子十四枚

水二盞煮一盞入豉半兩同煮至七分去滓服

得吐止後服

●傷寒呃噦

【發明】張仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭噦氣

不深者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭

石一兩人參三兩生薑五兩甘草五兩半夏半

斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升

溫服一升日三服

【本事方】枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一

錢不止再服

●下早成痞

【宣明方】傷寒陰證心下滿而不痛按之虛軟枳

殼檳榔等分為末每服三錢黃連湯調下

●傷寒尿瀉

【聖惠方】小腹脹滿石燕為末葱白湯調半錢服

通為度

●傷寒赤斑

【活人書】青黛二錢水研服

【張文仲方】豬膽雞子湯用豬膽汁苦酒各三合

雞子一個合煎三沸分服汗出即愈

●傷寒下痢

【仲景方】便膿血不止桃花湯主之赤石脂一斤

一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升水七

升煮未熟去滓每服七合納末方寸七日三服

愈乃止

【仲景傷寒論要】下痢不止心下痞，斬痢在下焦者，赤石脂禹餘糧湯主之。赤石脂禹餘糧各一升，並碎之，水六升，煮取一升，去滓，分再服。

【並肘后方】不能食者，黃連一升，烏梅二十枚，去核，炙燥爲末，蠟一碁子，大蜜一升，合煎，和丸，梧子大一服，二十九日三服。又方：黃連二兩，熟艾如鴨子大一團，水三升，煮取一升，頓服立止。

【范汪方】蕙草湯用蕙草當歸各二兩，黃連四兩，水六升，煮二升，服日三服。

【本草方】藥性論曰：以豉一升，薤白一握，水三升，煮薤熟，納豉更煮，色黑去豉，分爲二服。

●傷寒下蠱

【肘后方】生瘡以蛇莓汁服，二合，日三服，仍水漬烏梅，令濃入崖蜜飲之。

【千金方】四肢煩疼，不食多睡，羊桃十斤，搗熟浸熱湯三斗，日正午時入坐，一炊久，不過三次愈。

【聖惠方】生下部者，烏梅肉三兩，炒爲末，煉蜜丸，梧子大，以石榴根皮煎湯食前下，三十九。

●傷寒動氣

【雲歧子保命集】傷寒汗下後，臍左有動氣，防葵散用防葵一兩，木香黃芩柴胡各半兩，每服半兩水一盞，半煎八分，溫服。

●傷寒脫陽

【摘元方】小便不通，用茴香末以生薑自然汁調，傅腹上，外用茴香末入益元散服之。

●傷寒毒攻

【肘后方】手足腫痛，羊桃煮汁入少鹽漬之。

【簡要濟衆】傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫，用

鼓五合微炒以酒一升半同煎至七沸任性飲

之

【肘后方】手足腫痛欲斷黃蘗五斤水三升煮漬

之

●傷寒痞滿

【仲景傷寒論】病發於陰而反下之心下滿而不

痛按之濡此為痞也大黃黃連瀉心湯主之大

黃二兩黃連一兩以麻沸湯二升漬之須臾絞

汁分作二次溫服

●傷寒發躁

【傷寒論】傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠

夜不安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱

者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚去

皮破作八片水三升煮取一升頓服

●陰症傷寒

【本事方】極冷厥逆煩躁腹痛無脈微極甚者舶

上硫黃為末艾湯服三錢就得睡汗出而愈

【生生編】腹痛厥逆芥菜子研末水調貼臍上

●陰毒傷寒

【本草方】孫兆口訣云房後受寒少腹疼痛頭疼

腰重手足厥逆脈息沉細或作呃逆並宜退陰

散用川烏頭乾薑等分切炒放冷為散每服一

錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解 本

事方玉女散治陰毒心腹痛厥逆惡候川烏頭

去皮臍冷水浸七日切晒紙裏收之遇有患者

取為末一錢入鹽八分水一盞煎八分服壓下

陰毒如猪血相似再進一服 濟生回陽散治

陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣

大附子三枚炮製去皮臍爲末每服三錢薑汁

半盞冷酒半盞調服良久臍下如火煖爲度

續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶急者用半兩

重附子一個生破作四片生薑一大塊作三片

用米一撮以水一升煎六合溫服煖臥令汗出

或不出候心定則以水解散之類解之不得與

冷水如渴更煎滓服屢用多效

【王海藏陰證略例】生草烏頭爲末以葱頭醃藥

納穀道中名提益散

【居家必用】危篤者用黑豆炒乾投酒熱飲或灌

之吐則復飲汗出爲度

【孫真人食忌】百合煮濃汁服一升良

【聖惠方】四肢逆冷用茱萸一升酒拌濕絹袋二

個包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦卽止累

有效

【主治斗門方】腹痛欲死取烏藥子一合燒起黑

烟投水中煎三五沸服一大盞汗出陽回卽瘥

【仁齋直指方】心絳按之極痛大小便閉但出氣

稍暖者急取巴豆十粒研入麪一錢捻作餅安

臍內以小艾炷灸五壯氣達卽通此太師陳比

山方也

●夾陰傷寒

【吳綬傷寒蘊要】先因慾事後感寒邪陽衰陰盛

六脈沈伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假

此藥無以回陽人參乾薑炮各一兩生附子一

枚破作八片水四升半煎一升頓服脈出身溫

卽愈

●陰盛格陽

【孫兆口訣】其人必燥熱而不飲水脈沈手足厥

逆是此證也霹靂散用大附子一枚燒存性為

末蜜水調服散逼寒氣然後熱氣上行而汗出

乃愈

●陰症呃逆

【傷寒蘊要】乳香同硫黃燒煙嗅之

●少陰傷寒

【張仲景傷寒論】初得二三日脈微細但欲寐小

便白色者麻黃附子甘草湯微發其汗麻黃去

節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升

先煮麻黃去沫納二味煮取三升分作三服取

微汗

又少陰病始得反發熱脈沈者麻黃附子細辛

湯發其汗麻黃去節二兩附子炮去皮一枚細

辛二兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二味同煮

三升分三服

●少陰下利

【張仲景傷寒論】少陰病下利清穀裏寒外熱手

足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或

腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四

逆湯用大附子一個去皮生破八片甘草炙二

兩乾薑三兩水三升煮一升分溫再服其脈即

出者愈面赤加葱九莖腹痛加芍藥二兩嘔加

生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脈不出加人

參二兩

【仲景傷寒論】不止厥逆無脈乾嘔者以白通湯

加豬膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生附子一

枚水三升煮一升入人尿五合豬膽汁一合分

服

【發明】張仲景曰少陰下利咽痛胸滿心煩者猪

膚湯主之用猪膚一斤水一斗煮五升取汁入

白蜜一斤白粉五合熬香分六服 成無已曰

猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以

潤燥除煩白粉以益氣斷利也

【發明】成無已云傷寒少陰症下痢不止厥逆無

脈乾嘔欲飲水者加人尿猪膽汁鹹苦寒物于

白通湯薑附藥中其氣相從可去格拒之患也

●傷寒勞復

【肘后方】欲死者水服胡粉少許

【蘇頌圖經本草】身熱大小便赤如血色用胡黃

連一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩拌和炒令

微焦爲末用猪膽汁和九梧子大每服十九用

生薑二片烏梅一個童子小便三合浸半日去

滓食後暖小便令溫吞之臥時再服甚效

【肘后方】勞復食復欲死者蘇葉煮汁二升飲之

亦可入生薑豆豉同煮飲

【肘后方】以蘆根煮濃汁飲

【聖惠方】葵子二升梁米一升煮粥食取汗立安

【南陽活人書】用猥鼠屎湯主之用猥鼠屎十四

枚韭根一大把水二盞煮七分去滓再煎一沸

溫服得汗愈未汗再服

【肘后方】勞復因交後卵腫或縮入腹痛蓼子一

把水按汁飲一升

【千金方】勞復因交接者腹痛卵腫用葱白搗爛

苦酒一盞和服之

【發明】頌曰張仲景治大病後勞復皆用卮子鼠

屎等湯利小便而愈其方極多不可悉載

【朱肱南陽活人書】勞復傷寒後交接勞復卵腫

股痛竹皮一升水三升煮五沸服汁

【肘后方】勞復食復篤病初起受勞傷食致復欲

死者鼈甲燒研水服方寸七

【聖惠方】勞復馬屎燒末冷酒服方寸七便驗

【外臺方】用雄鼠屎二十枚豉五合水二升煮一

升頓服 活人書鼠屎豉湯治勞復發熱用雄

鼠屎二七枚梔子十四枚枳殼三枚為粗末水

一盞葱白二寸豉三十粒煎一盞分三服

【千金方】人屎燒灰酒服方寸七

●傷寒食復

【類要方】麴一餅煮汁飲之良

【主治時珍方】傷寒飲食勞復者濃煎橘皮汁服

●傷寒不解

【梅師方】傷寒不止不解已三四日胸中悶惡用

豉一升鹽一合水四升煮一升半分服取吐此

祕法

●傷寒發黃疸

【發明】張仲景治傷寒熱甚發黃身面悉黃者用

之極效一僧因傷寒後發汗不徹有留熱而身

皆黃多熱期年不愈醫作食治不對而食不減

予與此藥服五日病減三分之一十日減三分

之二二十日病悉去方用山茵陳山梔子各三

分秦艽升麻各四錢為散每用三錢水四合煎

二合去滓食後服溫以知為度此藥以山茵陳

為本故書之

●傷寒黃疸

【千金方】表熱者麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹美酒五升煮取半升頓服取小汗春月

水煮

【傷寒類要】傷寒黃病髮髮燒研水服方寸七日

三

【外臺方】生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和

攪服盡

●四肢傷寒

【衛生易簡方】不正之氣用水香薷為末熱酒調

服一二錢取汁

●急傷寒病

【胡洽居十百病方】半夏四錢生薑七片酒一盞

煎服

●熱病吐下

【經驗方】及下利身冷脈微發躁不止者附子炮一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半

升溫服立效

●傷寒時疫

【肘后方】溫病初得頭痛壯熱脈盛者用生囊荷

根葉合搗絞汁服三四升

【黎居士簡易方】已發未發用梨木皮大甘草各

一兩黃稊穀一合為末鍋底煤一錢每服三錢

白湯下日二服取愈此蔡醫博方也

【肘后方】豬膏如彈丸溫水化服日三次

【肘后方】溫疫頭痛壯熱脈盛以乾艾葉三升水

一斗煮一升頓服取汁

●預防勞復

【肘后方】令病不復取女中下裳帶一尺燒研米

飲服即免勞復

【外臺祕要】傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒研

水丸梧子大飲服一丸

●百合病

【傷寒蘊要】已汗下復發者百合七個擘破泉水

浸一宿赭石一兩滑石三兩泉水二鍾煎一鍾

入百合汁再煎一鍾溫服

【張仲景金匱要略】百合知母湯治傷寒後百合

病行住坐臥不定如有鬼神狀已發汗者用百

合七枚以泉水浸一宿明旦更以泉水煮取一

升却以知母三兩用泉水二升煮取一升同百

合汁再煮取一升半分服 百合雞子湯治百

合病已經吐後者用百合七枚泉水浸一宿明

旦更以泉水二升煮取一升入雞子黃一個分

再服 百合代赭湯治百合病已經下後者用

百合七枚泉水浸一宿明旦更以泉水二升煮

取一升却以代赭石一兩滑石三兩水二升煮

取一升同百合汁再煮取一升半分再服 百

合地黃湯治百合病未經汗吐下者用百合七

枚泉水浸一宿明旦更以泉水二升煮取一升

入生地黃汁一升同煎取一升半分再服

●百合變渴

【陳延之小品方】病已經月變成消渴者百合一

升水一斗漬一宿取汁溫浴病人浴畢食白湯

餅

【張仲景金匱玉函方】傷寒轉成百合病如寒無

寒如熱無熱欲臥不臥欲行不行欲食不食口

苦小便赤色得藥則吐利變成渴疾久不瘥者

用牡蠣熬二兩栝樓根二兩爲細末每服方寸  
匕用米飲調下日三服取效

●百合變熱

【小品方】用百合一兩滑石三兩爲末飲服方寸

匕微利乃良

●百合腹痛

【小品方】作痛者用百合炒爲末每服方寸七日

二服

●一切傷寒

【衛生家寶方】神白散又名聖僧散治時行一切  
傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服之  
用白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗  
一枚鼓五十粒水二碗煎服取汁不汗再服病  
至十一日未得汗者皆可服之此藥可卜人之

好惡也如煎得黑色或誤打撥卽難愈如煎得  
黃色無不愈者煎時要至誠忌婦人見并雞犬  
見

【傷寒要類】數種傷寒庸人不能分別今取一藥  
兼治天行時氣初覺頭痛內熱脈洪者葛根四  
兩水二升入豉一升煮取半升服生薑汁尤佳

●桃葉發汗

【發明】頌曰桃葉蒸汗法張文仲備急方治天行  
病有支太醫桃葉湯薰法用水二石煮桃葉取  
七斗安床簣下厚被蓋臥床上乘熱薰之少時  
當雨汗汗遍去湯速粉之并灸大推穴則愈又  
陳廩北小品方有阮河南桃葉蒸法云連發汗  
汗不出者死可蒸之如中風法燒地令熱去火  
以少水洒之布乾桃葉于上厚二三寸安席葉

上臥之溫覆得大汗被中傅粉極燥便瘥也凡柏葉麥麩蠶沙皆可如此法用張苗言曾有人疲極汗出臥簟受冷但苦寒倦四日凡人發汗汗不出用此法而瘥也

時珍曰按許叔微本事方云傷寒病醫者須顧表裏循次第昔范雲為梁武帝屬官得時疫熱疾召徐文伯診之是時武帝有九錫之命期在旦夕雲恐不預求速愈文伯曰此甚易政恐二年後不坐起爾雲曰朝聞道夕死可矣況二年乎文伯乃以火煨地布桃柏葉于上令雲臥之少頃汗出粉之翌日遂愈後二年雲果卒取汗先期尚能促壽況不顧表裏時日更欲速愈者乎夫桃葉發汗妙法也猶有此戒可不慎與

●風熱驚狂

【宣明方】神白丹治傷寒積熱及風生驚搐或如

狂病諸藥不效粉霜一兩以白麪六錢和作餅

子炙熟同研輕粉半兩鉛白霜二錢半為末滴

水丸梧子大每服十九至十五丸米飲下

【肘后方】傷寒時氣溫病六七日熱極發狂見鬼

欲走取白狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去

之此治垂危者亦活無白犬但純色者亦可

●橘皮湯

【仲景方】治男女傷寒并一切雜病嘔噦手足逆

冷者用橘皮四兩生薑一片水二升煎一升徐

徐呷之即止

●文蛤散

【張仲景方】病在陽當以汗解反以冷水噀之或

灌之更益煩熱欲水不渴者此散主之文蛤五

兩爲末每服方寸匕沸湯下甚效

●正陽丹

【圖經本草】治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰元精石硝石硫黃各二兩礪砂二兩細研入甕瓶固濟以炭半斤周一寸煖之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪拌勻入罐子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研麪糊丸雞頭子大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出爲瘥

●茵陳羹

【食醫心鏡】除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便以茵陳細切煮羹食生食亦宜

●傷寒雪煎

【千金方】麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃

一斤十二兩先以雪水五石四斗漬麻黃於東

向灶釜中三宿後納大黃攪勻桑薪煮至二石

去滓納杏仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中

更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如

彈子大有病者以沸白湯五合研一丸服之立

汗出不愈再服一丸封藥勿令洩氣

●紫雪

【和劑局方】療傷寒等症悉瘥疾門

傷風門

●風寒流涕

【百一選方】香白芷一兩荊芥穗一錢爲末蠟茶

點服二錢

●偶感風寒

【本草方】脂麻炒焦乘熱搗酒飲之煖臥取微汗

出良

●感冒風寒

【瀕湖集簡方】初起即用葱白一握淡豆豉半合

泡湯服之取汗

●風祕氣祕

【壽域神方】蘿菔子炒一合燂水和皂莢末二錢

服立通

●惡風入腹

【外方臺】久腫惡風入腹及女人新產風入產門

內如馬鞭噓吸短氣咳嗽者用鯉魚長一尺五

寸以尿浸一宿平旦以木篋從頭貫至尾文火

炙熟去皮空心頓食勿用鹽醋

●傷風下痢

【袖珍方】風傷久不已而下痢膿血日數十度用

皂角刺枳實麩炒槐花生用各半兩為末煉蜜

丸梧子大每服三十九米湯下日二服

●風寒無汗

【談楚翁方】發熱頭痛核桃肉葱白細茶生薑等

分搗爛水一鍾煎七分熱服覆衣取汗

●初感風寒

【陳藏器本草】宗奭曰熱湯能通經絡患風冷氣

痺人以湯淋足至膝上厚覆取汗周身然別有

藥亦假陽氣而行爾

【傷寒蘊要】頭痛憎寒用水七盃燒鍋令赤投水

於內取起再燒再投如此七次名沸湯乘熱飲

一盃以衣被覆頭取汗神效

●風濕發汗

【發明】時珍曰張仲景治心下痞按之濡關上脈

浮大黃黃連瀉心湯用麻沸湯煎之取其氣薄而洩虛熱也朱真人靈驗篇云有人患風疾數年掘坑令坐內解衣以熱湯淋之良久以簞蓋之汗出而愈此亦通經絡之法也時珍常推此意治寒濕加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗覺效更速也

### 中寒門

#### ●中寒昏困

【和劑局方】薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒之病生附子一兩去皮臍乾薑炮一兩每服三錢水二鍾煎一鍾溫服

#### ●感寒上氣

【肘后方】蘇葉三兩橘皮四兩酒四升煮一升半分再服

#### ●感寒無汗

【楊起簡便草方】水調芥子末填臍內以熱物隔衣熨之取汗出妙

#### ●腹中痞硬

【經驗方】夏秋之交露坐夜久腹中痞如羣石在腹用大豆半升生薑八分水三升煎一升已來頓服瘥

#### ●發散邪寒

【傷寒蘊要】胡椒丁香各七粒碾細以葱白搗膏和塗兩手心合掌握定夾於大腿內側溫覆取汗則愈

●冬月感寒

【本草方】吳茱萸五錢煎湯服之取汗

●內傷寒中

【發明】時珍曰升麻引陽明清氣上行柴胡引少陽清氣上行此乃稟賦素弱元氣虛餒及勞役饑飽生冷內傷脾胃引經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病時行赤眼每有殊效神而明之方可執泥乎一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水兼懷怫鬱因病右腰一部脹痛牽引右脅上至胸口則必欲臥發則大病裏急後重頻欲登圜小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱稍止但受寒食

寒或勞役或入房或怒或餓即時舉發一止則諸證泯然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃饑飽勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯合四君子湯加柴胡蒼朮黃芪煎服後仍飲酒一二盃助之其藥入腹則覺清氣上行胸膈爽快手足和煖頭目清明神采迅發諸證如掃每發一服即止神驗無比若減升麻葛根或不飲酒則效更遲大抵人年五十以後其氣消者多長者少降者多升者少秋冬之令多而春夏之令少若稟受弱而有前諸症者並宜此藥活法治之素問云陰精所奉其人壽陽精所降其人夭千古之下窺其奧而闡其微者張潔古李東垣二人而已此外則著

參同契悟真篇者旨與此同也

●寒癖宿食

【千金方】宿食不消大便閉塞巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研熟合酒微火煎令可丸如豌豆大每服一九水下欲吐者二九

●虛寒積癖

【濟生方】在背膜之外流于兩脅氣逆喘急久則營衛凝滯潰爲癰疽多致不救用胡椒二百五十粒蝎尾四個生木香二錢半爲末粟米飯丸綠豆大每服二十九橘皮湯下名磨積丸

●陰痺熨法

【靈樞經】寒痺者流而不去時痛而皮不仁刺布衣者以火碎之刺大人者以藥熨之熨法用醇酒二十斤蜀椒一斤乾薑一斤桂心一斤凡四

物咬咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并納酒中置馬矢燼中封塗勿使泄氣五日五夜出布絮暴乾復漬以盡其汁每漬必捫其日乃出乾之并用滓與絮復布爲複巾長六七尺爲六七斤每用一巾生桑炭火炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至病所寒則復炙巾以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必熨如此病已矣

●三建湯

【肘后方】治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脈沈微除固冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄並炮裂去皮臍等分咬咀每服四錢水二盞薑十五片煎八分溫服

### 中濕門

●中濕骨痛

【三因良方】白朮一兩酒三盞煎一盞頓服不飲

酒以水煎之

●濕氣作痛

【集簡方】白朮切片煎汁熬膏白湯點服

【簡便方】蒼朮泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點

服

●濕熱水病

【范汪方】黃連末蜜丸梧子大每服二九至四五

丸飲下日三四服

●濕熱眩運

【丹溪纂要】不可當者酒炒大黃爲末茶清服二

錢急則治其標也

●濕熱氣

【壽域神方】旱芹菜日乾爲末糊丸梧子大每服

四十九空心溫酒下大殺百蟲毒

●風濕冷痺

【外臺祕要方】蒴藿葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於

上冷復易之冬月取根舂碎熬熟用

●濕氣中滿

【普濟方】足脛微腫小便不利氣急欬嗽黑牽牛

末一兩厚朴製半兩爲末每服二錢薑湯下或

臨時水丸每棗湯下三十九

●渾身拘痛

【蘇頌圖經本草】山龍膽根細切用生薑自然汁

浸一宿去其性焙乾搗末水煎一錢七溫服之

此與龍膽同類別種經霜不凋

【救急方】破草鞋燒灰香油和貼痛處卽愈

●蒼朮散

【本草方】治風濕常服壯筋骨明目悉煉服門

癩冷門

●久冷反胃

【經驗方】用大附子一個生薑一兩剉細同煮研

如麵糊每米飲化服一錢

【衛生家寶方】用薑汁打糊和附子末爲丸大黃

爲衣每溫水服十九

【斗門方】用長大附子一個坐于磚上四面着火

漸逼以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑

汁盡半碗乃止研末每服一錢粟米飲下不過

三服瘥或以猪腰子切片炙熟蘸食

【方便集】用大附子一個切下頭子剉一竅安丁

香四十九個在內仍合定線紮入砂銚內以薑

汁浸過文火熬乾爲末每挑少許置掌心舐喫

日十數次忌毒物生冷

●一切冷氣

【鮑氏方】積塊作痛硫磺焰硝各四兩結砂青皮

陳皮各四兩爲末糊丸梧子大每空心米飲下

三十九

【衛生家寶方】搶心切痛發卽欲死久患心腹痛

時發者此可絕根蓬莖朮二兩醋煮木香一兩

煨爲末每服半錢淡醋湯下

【經驗方】去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精

益髓令人少病川烏頭一斤用五升大甕鉢子

盛以童子小便浸七日逐日添令溢出揀去壞

者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次乃

浸之日日換水日足取焙為末酒煮麵糊丸綠

豆大每服十九空心鹽湯下少粥飲壓之

【主治御藥院方】心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀

不消用丁香枝杖七斤肉豆蔻麵煨八斤白麵

炒六斤甘草炒十一斤炒鹽中三斤為末日日

點服

●元藏久冷

【經驗方】腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩

青鹽一兩細研以蒸餅為丸綠豆大每服五丸

空心熱酒下以食壓之

●元藏冷泄

【普濟方】腹痛虛極硫黃一兩黃蠟化丸梧子大

每服五丸新汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸

酒下

●元藏腹冷

【普濟方】及開胃香附子炒為末每用二錢薑鹽

同煎服

【經驗方】用附子炮去皮臍為末以水二盞入藥

二錢鹽葱薑棗同煎取一盞空心服去積冷暖

下元肥腸益氣酒食無礙 梅師方二虎丸補

元臟進飲食壯筋骨川烏頭附子合四兩醃醋

浸三宿切作片子掘一小坑炭火燒赤以醋三

升同藥傾入坑內用盆合之一宿取出去砂土

入青鹽四兩同炒赤黃色為末醋打麵糊為丸

如梧子大空心冷酒下十五丸婦人亦宜

●腹中冷癖

【肘后方】水穀癥結心下停痰兩脅痞滿按之鳴轉逆害飲食大蟾蜍一枚去皮腸支解之芒硝強人一升中人七合弱人五合水七升煮四升頓服得下爲度

【肘后方】食輒不消羸瘦弱乏困生百病大麥蘖五升小麥麵半斤豉五合杏仁二升熬黃香搗篩糊丸彈子大每服一九白湯下

●諸冷極病

【千金方】醫所不治者馬蘭子九升洗淨空腹服一合酒下日三服

●冷勞久病

【聖濟總錄】茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大初以蛇牀子湯下二十九至三十丸微吐不妨後用棗湯下立效

【聖惠方】減食漸至黑瘦用桃仁五百顆吳茱萸三兩同入鐵鑊中微火炒一炊久將桃仁去皮微黃色卽漸加火待微烟出卽乘熱收入新瓶內厚紙封勿令洩氣每日空心取桃仁二十粒去皮嚼之以溫酒下至重者服五百粒愈

●大腸積冷

【經驗良方】威靈仙末蜜丸梧子大一更時生薑湯下十九至二十九

●冷症伏火

【發明】時珍曰按後漢書云有婦人病經年世謂寒熱注病十一月華陀令坐石槽中平旦用冷水灌云當至百始灌七十冷顫欲死灌者懼欲止陀不許灌至八十熱氣乃蒸出露巽然高二三尺滿百灌乃使燃火溫牀厚覆而臥良久冷

汗出以粉撲之而愈又南史云將軍房伯玉服五石散十許劑更患冷疾夏月常復衣徐嗣伯診之曰乃伏熱也須以水發之非冬月不可十一月冰雪大盛時令伯玉解衣坐石上取新汲冷水從頭澆之盡二十斛口噤氣絕家人啼哭請止嗣伯執搗諫者又盡水百斛伯玉始能動背上彭彭有氣俄而起坐云熱不可忍乞冷飲嗣伯以冷水一升飲之疾遂愈自爾常發熱冬月猶單衫體更肥壯時珍竊謂二人所病皆伏火之證素問所謂諸噤鼓慄皆屬於火也治法火鬱則發之而二子乃於冬月平旦澆以冷水者冬至後陽氣在內也平旦亦陽氣方盛時也折之以寒使熱氣鬱遏至極激發而汗解乃物不極不反是亦發之之意素問所謂正者正治

反者反治逆而從之從而逆之疏通道路令氣調和者也春月則陽氣已洩夏秋則陰氣在內故必於十一月至後乃可行之二子知醫可謂神矣

●腎藏虛冷

【聖濟總錄】腹脅脹滿胡盧巴炒二兩熟附子硫黃各七錢五分為末酒煮麴糊丸梧桐子大每鹽湯下三四十丸

【聖濟總錄】氣攻腹脅脹滿疼痛用大木瓜三十枚去皮核剝空以甘菊花末青鹽末各一斤填滿置籠內蒸熟搗成膏入新艾茸二斤搜和丸如梧子大每米飲下三十九日二服

【聖惠定痛丸】腎臟虛冷氣攻臍腹疼痛不可忍及兩脅疼痛用乾蝎七錢半焙為末以酒及童

便各三升煎如稠膏丸梧子大每酒下二十九

又蚘蚘散用蚘蚘三十枚頭足全者掘一地

坑深濶各五寸用炭火五斤燒赤去大淋醋一

升入內待滲乾排蚘蚘於坑內碗蓋一夜取出

木香蘿蔔子炒各一分胡椒三十粒檳榔肉豆

蔻一個爲末每服一錢熱酒下

●積冷瘕癖

【聖濟錄】不思飲食羸困者葇蓉子三分水淘去

浮者大棗四十九個水三升煮乾只取棗去皮

核每空心食一個米飲下覺熱卽止

●虛冷短氣

【本草方】川椒三兩去目并合口者以生絹袋盛

浸無灰酒五升中三日隨性飲之

●心腹冷痛

【孫真人方】以布裹椒安痛處用熨斗熨令椒出汗卽止

●宿冷惡病

【聖惠方】苦參二斤童子小便一斗二升煎取六

升和糯米及麴如常法作酒服但腹中諸疾皆

治酒放二三年不壞多作救人神效

●下焦冷氣

【食療本草】乾陳橘皮一斤爲末蜜丸梧子大每

食前溫酒下三十九

【心鏡方】脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮熟

和米粉六兩鍊成乳粉空心食之妙

●薏苡仁飯

【廣濟方】治冷氣用薏苡仁春熟炊爲飯食氣味

欲如麥飯乃佳或煮亦好

●快膈湯

【本草方】治冷隔氣及酒食後飽滿用青橘皮一斤作四分四兩用鹽湯浸四兩用白沸湯浸四兩用醋浸四兩用酒浸各三日取出去白切絲以鹽一兩炒微焦研末每用二錢以茶末五分水煎湯服亦可點服

●烏沈湯

【和劑局方】治一切氣一切冷悉諸氣門

麻木門

●麻木疼痛

【摘元方】萬靈膏用甘遂二兩蓖麻子仁四兩樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯

●麻痺疼痛

【普濟方】仙桃丸治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷損閃肭痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩威靈仙五兩洗焙爲末酒糊丸梧子大每服七丸至十九丸鹽湯下忌茶此藥常服神效

●十指疼痛

【王氏簡易方】麻木不仁生附子去皮臍木香各等分生薑五片水煎溫服

●年久麻痺

【活人心統】或歷節走氣疼痛不仁不拘男女神授散用草烏頭半斤去皮爲末以袋一個盛豆腐半袋入烏末在內再將豆腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出晒乾爲末每服五分冷風濕氣以生薑湯下麻木不仁以葱白

湯下之

●手足麻痺

【普濟方】時發疼痛或打撲傷損痛不可忍或癱

瘓等證威靈仙炒五兩生川烏頭五靈脂各四

兩爲末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌

茶

【救急方】不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗

【本草衍義】寇曰風冷氣血閉手足身體疼痛冷

麻五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一

兩半炮去皮爲末滴水丸如彈子大每用一丸

生薑溫酒磨服

●項強身急

【本草方】取活鼠去五臟乘熱貼之卽瘥也

●腹皮麻痺

【危氏方】不仁者多煮葱白食卽自愈

●身體麻木

【濟生祕覽】芥菜子末醋調塗之

●風痰麻木

【摘元方】凡手及十指麻木大風麻木皆是濕痰

死血用橘紅一斤逆流水五碗煮爛去渣再煮

至一盃頓服取吐乃吐痰聖藥也不吐加瓜蒂

末

●風病麻木

【本草方】麻花四兩草烏一兩炒存性爲末煉蜜

調成膏每服三分白湯調下

●面上木痺

【葉氏摘元方】牛皮膠化和桂末厚塗一二分良

●三蛇愈風丹

【本草方】治癩風手足麻木眉毛脫落皮膚痒搔  
及一切風瘡白花蛇烏梢蛇土蝮蛇各一條並  
酒浸取肉晒乾苦參頭末四兩爲末以皂角一  
斤切酒浸去酒以水一碗按取濃汁石器熬膏  
和丸梧子大每服七十九煎通聖散下以粥飯  
壓之日三服三日一浴取汗避風 治例無蝮  
蛇有大風子肉二兩