

善

510.87

12-1

24

24



63295

孫真人備急千金要方卷之二十一 丁腫

孫真人備急千金要方

丁腫第一論一首 方二十九首

論十五條 灸法一首

論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時
代謝陰陽遞興此一氣更相擊怒當是時也必有暴氣夫
暴氣者每月之中必有卒然大風大霧大寒大熱若不時
而遇人勿之遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脈遂使腠
理壅隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣泄變成癰疽丁毒惡
瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不逮辰若著訖乃欲
求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡
瘻無所逃矣

凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血
傳藥藥氣得入針孔中佳若未達瘡內療不得力

又其腫好著口中頰邊舌上見赤黑如珠子硃痛應心是也。是秋冬寒毒久結皮中變作此疾。不即療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身。捉人不得動搖。若不慎口味房室死。不旋踵。經五六日不瘥。眼中見火光。神昏口乾心煩。即死也。

一曰麻子丁。其狀肉上起頭大如黍米色。稍黑四邊微赤。多癢。忌食麻子及衣布并入麻田中行。

二曰石丁。其狀皮肉相連。色烏黑如黑口。甚硬刺之不入。肉內陰陰微疼。忌瓦礫磚石之屬。

三曰雄丁。其狀炮頭黑。鱗四畔仰。瘡炮漿起。有水出色黃。大如錢孔。形高。忌房事。

四曰雌丁。其狀瘡頭稍黃。向裏鱗亦似。灸瘡四畔。炮漿起。

心凹色赤大如錢孔忌房事

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑黯四邊有疱漿起如赤粟米忌火炙爍

六曰爛丁其狀色稍黑有白癩瘡中潰潰則有膿水流出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物

七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起太赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治如未滿三十六者可治俗名黑炮忌嗔怒畜積愁恨

八曰蛇眼可其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬已心惡眼看并嫉妬人見之及毒藥

九曰鹽膚丁其狀大如匙面四畔皆赤亦有黑粟粒起忌食

鹹物

十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑驚
汗出中硬已心飲漿水水洗渡河

十一曰刀鎌丁其狀瘡闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑
如燒爍已心刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治

十二曰浮漚丁其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉
大內黃外黑黑處刺不痛內黃處刺之則痛

十三曰牛拘丁其狀肉胞起掐不破

右十三種瘡初起必先癢後痛先寒後熱熱定則寒多
四肢沈重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難
治其麻子丁一種始末惟癢所錄已心者不得犯觸犯觸
者即難療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁已心縱不癢亦
不能殺只其狀寒熱與諸丁同皆以此方療之萬不

一欲知犯觸之狀但看其強瘡痛極甚不可忍者是也

治十二種疔方

用枸杞其藥有四名春名天精夏名枸杞秋名却老
冬名地骨春二月上建日採葉夏二月上建日採枝
秋二月上建日採子冬二月上建日採根凡四時初
逢建日取枝葉子根等四味並曝乾若得五月五日
午時合和大良如不得依法採者但得一種亦得用
緋繒一片以裹藥取匝為限亂髮雞子大牛黃梧子
大反鈎棘針一十七枚末赤小豆七粒末先於緋上
薄布亂髮以牛黃末等布上曝即捲緋繒作團以髮
作繩十字縛之熨斗中急火熬令沸沸定後自乾即
刮取搗作末絹篩以一方寸匕取枸杞四味合搗絹

篩取二匕和合前一匕共為二匕令相得入分為一
分早朝空腹酒服一分日二

齊州榮燒方 凡是丁腫皆用治之

牡蠣致兩爛者 鍾乳

枸杞根皮各貳兩

白石英壹兩 桔梗壹兩半

白薑石壹斤軟黃者

右六味各擣絹篩合和令調先取伏龍肝九升為末以
清酒一斗一升攪令渾澄清取一升和藥捻作餅子大
六分厚二分其濁滓仍置盆中布餅子於籠上以一幅
紙藉分下以泥酒氣蒸之仍數攪令氣散發經半日藥
餅子乾乃內瓦堦中每一重紙一重藥遍布勿令相著
以泥密封三七日乾以紙袋貯置乾處舉之用法以針
刺瘡中心深至瘡根并刺四畔令血出以刀刮取藥

大豆許內瘡。上若病重困。日夜三四度。輕者一二度。
重者一日。根爛始出。輕者半日。一日爛出。當首瘡浮起。
是根出之候。苦根出已爛者。勿停藥。仍著之藥。甚安穩。
令生肌。身其病在口咽及胃腹中者。必外有腫異相也。
寒熱不快。疑是此病。即以飲或清水和藥。如一杏人許。
服之。日夜三四服。自然消爛。或以物剔吐根出。即瘥。若
根不出。亦瘥。當看精神自覺。醒悟合藥。以五月五日為
上時。七月七日。次之。九月九日。臘月臘日。皆可。若急須
藥。他日亦得要之。不及良日也。修合須清淨。燒香不得
觸穢。毋令孝子不具足。人產婦六畜雞犬等。見之。凡有
此病。忌房室。猪牛雞魚。生韭葱蒜。薑薑。胡荽。葵酒醋麪
等。若犯諸忌。而發動者。取狗祀根湯和藥服。並如後方。

其一方本是一家智者評論以後方最是真本

趙煥方

薑石 貳拾伍兩

牡蠣 拾兩 崔氏作茶兩

茯苓 叁兩

枸杞根皮 肆兩

右四味各搗篩合和先取新枸杞根合皮切六升水一斗半煎取五升去滓內狗屎崔氏一升攪令調澄取清和前藥執搗捻作餅子陰乾病者以兩刃針當頭直刺瘡痛徹後針出刮取藥末著急內瘡孔中勿令歇氣并遍封瘡頭上即脹起針挑根即出重者半日已上或已消爛挑根不出亦自瘥勿憂其病在內者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞刮取藥如桐子大五枚和服之日夜二服即自消也若須根出服藥經

一日以雞羽剔吐即隨吐根出若不出根亦自消爛在
外者亦日夜三度傳藥根出後當傳勿住即生肉易瘡
若犯諸忌而發動者取枸杞根合皮骨切三升以水五
升煎取一升去滓研藥末一錢匕和枸杞汁一盞服之
日二三服并單飲枸杞汁彌佳又以枸杞汁攪白狗屎
取汁服之更良合訖即用不待乾所言白狗屎是狗食
骨其屎色如石灰故直言狗白屎也如預造取五月五
日七月七日九月九日臘月臘日者尤良神驗或有人
忽喉中痛乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之無
故而痛惡寒發熱者亦是此病但依前服之立瘥前後
二方同是一法其用一同亦主癰疽甚效

治下腫病忌見麻勃見之即死者方

胡麻

燭燼

針沙 各等分

右二味為末以醋和傅之

又方 石灰

二分

馬齒菜

貳分

右二味擣以雞子白和傅之

又方

針刺四邊及中心塗雄黃末立愈神驗

一二分塗黃土

又方

鼠新至土以小兒尿和傅之

又方

鐵衣末以人乳汁和傅之立可

又方

小豆花為末傅之瘡

又方

以人屎尖傅之立瘡

又方

以四神丹一枚當頭上安經宿根即出

方見第十一卷

治一切丁腫方

蒼耳根莖苗子但取一色燒為灰醋泔淀和如泥塗

上乾即易不過十度根即拔神良余以下止觀四年忽

口角上生丁腫造甘子振家母為帖藥經十日不瘥
余以此藥塗之得愈已後常作此藥以救人無有不
瘥者故特論之以傳後嗣丁腫方殆有千百不及
此鉗齊州榮姥方亦不能勝此物造次易得也

又方

取鐵漿每飲一升立瘥

又方

茨藜子一升燒灰醞醋和封上經宿便瘥

又方

皂莢子取人作末傅之五日內瘥

玉山韓光方

韓光治丁腫人也正觀初衢州徐使君訪得

此方

艾蒿一擔燒作灰於竹筒中淋取汁以一二合和石

灰如麩漿以針刺瘡中至痛即點之點二遍其根自

落亦大神驗正觀中用治二十餘人得瘥故錄之

魚臍丁瘡似新火針瘡四邊赤中央黑可針刺之若不
痛即殺人治之方

以臘月魚頭灰和髮灰等分以雞溲屎和傳上此瘡
見之甚可即能殺人外甚不用髮灰以雞子清和塗

又方以寒食餠傳之良硬者燒灰塗貼即瘥

治魚臍瘡頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡四畔作孔擣白菅取汁滴著瘡孔內

又方傳水獺屎六良

治赤根丁方

燻白粉令黑蜜和傳之良

又方以新分鼠壤水和塗之熱則易

又方馬牙齒擣末臘月猪脂和傳之根即拔燒灰用亦可

犯丁瘡方

蕪菁根

鐵生衣 各等分

右一味和擣以大針刺作孔復削蕪菁根如針大以前
鐵生衣塗下刺孔中文塗所擣者封丁仍以方寸匕紙
帛塗貼之有膿出即易須更拔根出立瘥忌油膩生冷
醋滑五辛陳臭粘食

又方刺瘡頭及四畔令汁極出擣生栗黃傅上以麩圍之
勿令黃出從日正午根即拔矣

又方以麩圍瘡如前法以針亂刺瘡銅器置黃醋令沸瀉着
麩圍中令容一盞冷則易之一度根即出

又方取蛇蛻皮如雞子大以水四升煮二四沸去滓頓服
立瘥

又方 燒蛇蛻皮灰以雞子清和塗瘡

又方 取蒼耳葉苗搗取汁 一升飲之 澤傳上方瘡

又方 灸掌後橫文後五指男左女右七壯即瘡已 用得效

丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也

癰疽第一 脈七首 論一首 方八十七首 禁法一首

脈數身無熱即內有癰

諸浮數脈當發熱而反洗洗惡寒若有痛處當結為癰

脈微而遲必發熱脈弱而數此為振寒當發癰腫

脈浮而數自體無熱其形默默胃中微燥不知痛處其人

當發癰腫

脈滑而數滑則為實數則為熱滑即為榮數即為衛榮衛

相逢即結為癰熱之所過即為癰膿身體有痛處時時苦

有瘡

問曰寸口脈微而澀法當亡血若汗出設不汗者當留之何
答曰若身有瘡被刀器所傷亡血故也

跌陽脈滑而數法當留之重少陰脈滑而數婦人陰中生瘡
論曰夫癰疽初發至微人皆不以為急此實奇患惟宜速
治稍遲緩乃即病成以此致禍者不一但發背外皮薄為
難以及皮厚為疽宜其急治之

凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或復小痛或發如米粒
大自膿子此皆微候宜善察之見有小異即須大驚忙急
須攻治及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥處即灸
鼠頭百壯其大重者灸四面及中央一二三百壯數灸不必
多也復薄以冷藥種種救療必速痊也

凡用藥帖法皆當瘡頭處其藥開孔令洩熱氣亦當頭以
火針針入四分即瘥

凡癰疽瘤石癰結筋癰癰瘰瘰皆不可就針角針角者少有不
及禍也

凡癰無問大小已覺即取膠如手掌大暖水浸令軟納納
然稱大小當頭上開一孔如錢孔大帖腫上令相當須臾

乾急若未有膿者即定不長已作膿者當自出若以鋒針
當孔上刺至膿大好至瘥乃洗去膠

凡腫根廣一寸已下名瘡一寸已上名小癰如豆粒大者
名孢子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取瘥乃止

凡癰高而光大者不夫熱其肉正平無尖而紫者不須攻
之但以竹葉黃耆湯申其氣其肉正平為無膿也癰平痛

以八味黃耆散傳之大癰七日小癰五日其自有堅彊者
寧生破發乳若執手下不可得近者先內服王不留行散外
摩發背膏若背生破無若在乳宜令極熟候手按之隨手
即起者瘡熟也須針之針法要得著膿以意消息背脊不
過一寸斟量不得膿即與食肉膏散著充頭內癰口中如
體氣執歇即服木上占斯散五日後癰欲著者即服排膿
內塞散

凡癰破之後便綿憊欲死內寒外熱膿腫自有似癰而非
者當以手按腫上無所連乃是風毒耳勿針之宜服升麻
湯外摩膏破離口當令上留二分近下一分針之務令極
熱熱便不痛破後敗壞不差者作猪蹄湯洗之日一度夏
用一冬用六七日用湯半劑亦可夫癰壞後有惡肉者

宜猪蹄湯洗去穢次傳食肉膏散惡肉盡後傳生肉膏散
及摩四邊令好肉速生當斷絕旁室忌風冷勿自勞煩待
筋脉平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則裏潰潰則重發
發即難救慎之慎之白痴最忌

凡諸暴腫一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺去血
小巨疔末傳之其間數數以針刺去血若失療已潰爛者猶

服五香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之外以升麻

湯搨洗熨之方見丹毒篇摩升麻膏方見丹毒篇若生息肉者以白

朮如散傳之青黑肉去盡即停止好肉生傳升麻膏如肌

不生傳一物黃耆散若傳白朮如散青黑惡肉不盡者可以

搽頭朮如散半錢和白朮如散二錢稍稍傳之其散各取

當色單擣下篩首爾成散用之此數法集驗用治緩疽

或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛痛不可忍遊
走不住發作有時痛則小執痛定則寒此皆由冬時受溫
氣至春春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛宜先服五香
連翹湯麻子升參膏又以白酒煎楊柳皮及暖熨之有赤氣
點點者即刺出血也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數
劑勿以一劑未瘥便住藥以謂無效即禍至矣中間將白
微散任又有氣腫痛其狀如癰腫無頭虛腫色不變但皮
急痛不得手近亦須服此五香湯次白針寫之次與茯苓
散傳之

胃中痛短氣者當入閤室中以手中指捺左眼視若見光
者胃中有結癰若不見見光者是癰疽內發出也

經云氣宿於經絡中血氣俱澁不行擁結爲癰疽也不言

熱之所作其後成癱又陽氣湊集寒化為熱熱盛則肉腐
為膿也由人體有熱被寒冷搏之而脈凝結不行執氣擁
結成癰疽方有灸法亦有溫治法以其中冷未成熱之時
其用冷藥帖薄之治熱已成以消熱冷不成膿也赤色腫
有尖頭者藜蘆膏傳之一云醋和蚌蛤灰塗乾則易之
余平生數病癰疽得效者皆即記之考其病源多是藥氣
所作或有上世服石遂令子孫多有此疾食中尤不宜食
麪及酒蒜及慎溫牀厚被能慎之者可得終身無他此皆
躬自驗之故特論之也

五香連翹湯治一切惡核瘰癧癰疽惡腫忌背方

青木香

沈香

丁香

薰陸香

麝香

射干

升麻

獨活

寄生

連翹

通草各一兩 大黃各二兩

右十二味以水九升煮取四升內竹瀝一升更煮

取三升分二服取快利附後方有紫葛甘草無通草治

籍喻義有黃耆甘草亡消各六分千金翼二全不

黃耆山藥湯治癰疽發背方

黃耆

甘草

黃芩

芍藥

麥門冬各二兩

當歸

人參

石膏

芫蕪

半夏各一兩

生薑五兩

生地黄兩

大棗各三枚

淡竹葉壹握

右十四味以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓

內藥煮取三升分四服相去如行二十里又日三夜一

八味黃耆散方

黃耆

芍藥

大黃

黃連

芍藥

莽草

黃芩

梔子人各等分

右八味治下篩雞子白和如泥塗故帛上隨腫大小傳之乾則易若已開口封瘡上須開頭令散氣

王不留行散治癰腫不能潰困苦無聊賴方

王不留行子

冬入合子金翼

龍骨

當歸各二兩

野葛皮

半斤乾薑

桂心

各二兩枯婁根陸分

右七味治下篩食後溫酒服方寸匕日三以四肢習習

為度不知稍加之令人安穩不覺膿自潰即著瘡痂平

復神良此浩仲堪方隋濟醫黎所名為神散癰腫即消

千金翼云治癰疽及諸雜腫已潰者服之

內補散治癰疽發背如人乳癰諸節未潰者便消不消者

令速潰疾愈方

木占斯

人參

乾薑

黃芩

桂心

細辛

厚朴

敗醬

防風

桔萎根

桔梗

甘草

白豆

兩

右十一味治下篩酒服方寸匕藥入咽覺流入瘡中若

癰疽灸之不能發壞者可服之未壞者去敗醬已發膿

者內敗醬服藥日七八服夜二三服以多為善若病在

下當膿血出此為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其

力痛者即不痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便早愈醫

人不知用此藥發背無有治者若始覺背上有不好處

而渴者翻服之若藥力行覺渴止便消散若雖已壞但

日夜服之勿住藥腫自消散不覺去時欲長服者當去

敗醬婦人乳癰且速服之一方無桂心一名木占斯散

主癰腫堅結若已壞者速愈未壞者使不成癰便消疔

神無桂心劉涓子云此是華佗方

排膿內寒散 治大瘡熱浪膿血不止瘡中肉虛疼痛方

防風 茯苓 白芷 桔梗 遠志

甘草 人參 芍藥 當歸 黃耆各壹

厚朴貳兩 桂心貳分 附子貳枚 赤小豆五合 酒浸熟之

右十四味治下諸酒服方寸匕日三夜

猪蹄湯 治癰疽發背方

猪蹄壹具治如食法 黃耆 黃連 芍藥各叁兩

黃芩貳兩 薔薇根 狼牙根各捌兩

右七味以水二斗煮猪蹄令熟澄清取一斗下諸

藥煮取一斗去滓洗瘡一食頃以帛拭乾貼生肉膏日

一 如痛加當歸甘草各二兩

又方 治癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉者方

猪蹄如食法當歸

大黃

芫蕪

芍藥

黃芩

獨活

莽草又名豈豆兩

右八味以水三斗煮猪蹄取八升去之內諸藥煮取四升去滓漬瘡兩食頃洗之拭令乾傅麝香膏

麝香膏 治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉方

麝香

蘭如一作真珠

雄黃

礬石各壹兩

右四味治下篩以猪膏調如泥塗之惡肉盡止却傅生

肉膏

食惡肉膏方

大黃

芫蕪

莽草

真珠

雌黃

附子

生用各壹兩

白欵

礬石

黃芩

藺如

各貳兩

雄黃

半兩

右十一味以猪脂一升半煎五六沸去滓內藺如

礬石末攪調傅之瘡中惡肉盡乃止

治癰腫惡肉不盡者方

萌蘆灰

一作蘆灰

石灰

肘後作白炭灰

右二味各淋取汁合煎如膏膏成傅之食惡肉亦去

子此藥過十日後不中用

又方

生地黄汁煎如膠作餅子帖之日四五度

食惡肉散方

硫黃

丹砂

麝香

棗頭藺如

馬齒礬

雄黃

雌黃

白礬

各壹兩

右八味治下篩以粉之吮食惡肉

千金翼方以粉也無白

膏和傅之又處瘡癰疽痛滿無用砂黃濟方瘡癰腫

又方 藺茹

礬石

雄黃

硫黃 各貳分

右四味治下篩內瘡中惡肉盡即止不得過好肉也

生肉膏治癰疽發背壞後生肉方

生地黃

壹斤 辛夷 貳兩

獨活

當歸

大黃

黃耆

芎藭

白芷

芍藥

黃芩

續斷

各壹兩

薤白

伍兩

右十一味以臘月猪脂四升煎取白芷黃下之去

滓傅之立瘥

又方 甘草

當歸

白芷

茯苓

蜀椒

細辛 各貳兩

烏喙

陸分 蛇齒

壹兩

薤白

貳拾

乾地黄 兩

右十味咬咀以醋半升漬一宿次日猪膏二斤煎令沸
三上三下膏成塗之立瘥

蛇疔生肉膏治癰疽金瘡敗壞者方

蛇疔

當歸

乾地黄

黃連

黃耆

黃芩

大黃

續斷

蜀椒

芍藥

白芨

芎藭

莽草

白芷

附子

甘草

細辛

薤白

右十八味咬咀酢漬再宿臘月猪脂七升煎三上三下

酢盡下之二滓取傅日一夜

崔氏有大戟獨活各白壹兩無地黄黃連黃耆續

斷白芨及芎藭

五香湯

治執毒氣卒疔痛結作核或似癰癤而非使人頭

痛寒熱氣急者數日不除殺人

青木香 藿香 薰陸香 沈香 丁香

右五味以咀以水一升煮取一升分二服不瘳更服并
以滓薄腫上千金翼以麝香代藿香

漏蘆湯下之之方

漏蘆 白芫 黃芩 麻黃 白薇

枳實 升麻 芍藥 甘草各貳兩 大黃冬三兩

右十味以咀以水一斗煮取二升分二服快下之無藥

處單用大黃亦得肘後云治癰疽丹軫毒腫惡肉千金

時行熱毒變赤色癰疽丹軫毒腫及眼赤痛生瘡醫
若熱盛者可加芒消貳兩此方與小兒
芒消各貳兩此方與小兒
篇初方相重分兩服法異

丹參膏方

丹參 胡蘆 莽草 蜀椒

躑躅各貳兩 秦艽

獨活

白芨

牛膝 菊花

烏頭

防己各壹兩

右十二味咬咀以醋二升浸一宿夏半日如急要便煎

取猪脂四升煎令醋氣歇慢火煎去滓用傅患處日五

六度肘後用防風不用防己治惡肉惡核瘰癧風結諸腫云此膏亦可服

小兒瘰癧湯 治氣痛方

淡竹瀝射干

杏仁

獨活

枳實

白朮 防己

防風

秦艽

芍藥

甘草 茵芋

茯苓

黃芩

麻黃各貳兩

右十五味以咀以水九升煮取半下瀝煮取二升分服四

白薇散方

白薇

防風

射干

白朮

陸分 麻黃

秦艽伍分當歸

防己

烏頭

青木香

天門冬 枳實

獨活

姜藜

山茱萸肆分

柴胡

白芷

叁分

莽草

蜀椒

貳分

右十九味治下篩以漿水服方寸匕日三加至一二七

疾利散治氣腫痛方

疾利梨子一升熬令黃為末以麻油和如泥炒令焦黑

以傅故熟布上如腫大小勿開孔帖之無疾梨用小

豆末和雞子如前乾易之妙

初起膏治赤色腫有尖頭者方

藜蘆貳分

黃連

礬石

雄黃

松脂

黃芩

各捌分

右六味為末猪脂二升一合煎令烊調和以傅主癩癬

頭瘡極效又治淺瘡經年抓搔癢處成孔者

瞿麥散 治癰排膿止痛利小便方

瞿麥 壹兩 芍藥 桂心 赤小豆 酒浸炙

麥門冬 芎藭 黃耆 當歸 白斂 各貳兩

右九味治下篩先食酒下方寸匕日三

川桂心 麥門冬 白斂 治諸癰潰及未潰者 中夜痛膿血不絕不可忍者

薏苡人散 治癰腫令自潰長肉方

薏苡人 桂心 白斂

當歸 從蓉 乾薑 各貳兩

右六味治下篩先食溫酒服方寸匕日二夜一

黃耆茯苓湯 治癰疽後膿太多虛熱方

黃耆 麥門冬 各貳兩 生薑 肆兩 五味子 貳兩

芎藭

茯苓

桂心

各二兩

大棗

貳拾枚

右八味以水一斗半煮取四升分六服

遠志當歸

人參各二兩
甘草陸兩

內消散 治凡是癰疽疔毒宜服之方

赤小豆

醃青并浸炙 人參

甘草

瞿麥

當歸

猪苓

黃芩

各二兩

白斂

薏苡仁

黃耆 各二兩

防風

壹兩

升麻 肆兩

右十二味治下篩以酒服方寸匕日二夜一長服取瘥

獨皮散 治癰疽膿血內漏諸漏壞敗男發背女乳房及五

痔方

獨皮

蜂房

各壹兩

地榆

附子

桂心

當歸

續斷

各伍分

乾薑

蜀椒

藁本 各四分 厚朴 陸分

右十一味治下節空腹以酒服方寸匕日二取瘥加斑

猫七枚益良

凡患腫皆因宿熱所致須服冷藥瘥後有患冷利不止者

人參

龍骨

赤石膏

甘草

乾薑 各貳兩

附子 壹枚

右六味以水八升煮取一升半分三服每服八合

泄瀉湯治表裏俱熱二焦不實身體生瘡及發癰癤大小

便不利方

梔子人

貳柒枚 苦酒 貳兩

黃芩

甘草

知母 各壹兩

大黃 肆兩

右六味以水五升煮減半下大黃取一升八合去

滓內芒消分二服

五利湯治年四十已後強壯常大患熱發癰疽無定處大

小便不通方劉涓子名大黃湯

芒消壹兩升麻

黃芩各貳兩大黃各三兩梔子人

方五味以水五升煮取二升四合去滓下芒消分

四服快利即止

劉涓子方凡壯熱人能長服之終身不患癰疽令人肥悅

耐勞苦方

乾地黄伍兩芍藥

甘草

桂心

黃耆

黃芩

遠志各貳兩石斛

當歸

大黃各三兩

巴戟天

枯薑根

人參各壹兩

天門冬

茯苓各貳兩

右十二味為末蜜丸如梧子酒服十九日一加至二十九

又方治虛熱消瘡癰方

乾地黄肆兩 大黃陸分 芍藥 王不留行

茯苓 甘草 遠志 麥門冬

人參 升麻 黃芩各參三兩 桂心陸兩

右十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十九丸日三加至

二十丸久服令人肥健一方有枳實二兩外黃芩甘草

人參升麻黃芩

又方治虛勞客熱數發癰腫瘡癤經年不除方

乾地黄肆兩 黃耆 黃芩 大黃 黃連

澤瀉 細辛各參三兩 甘草 桂心 芍藥

茯苓 乾棗兩 人參壹兩 天門冬伍兩

右十四味為末蜜丸如梧子大酒服十九丸日三夜一

至二十九日服延年終身不發癰疽凡方中用七

切五升米下蒸熟曝乾用之熱多倍大黃要籍喻義無澤瀉

地黃煎補虛除熱散乳石去癰瘡痔疾悉宜服之方

生地黃隨多少二搗二壓取汁令盡銅器中湯上煮

勿蓋覆令泄氣得減半出之布絞去粗滓結濁滓

再煎令如餒丸如彈丸許酒服日三勿加之百日癰

疽永不發

杜仲治虛勞輕力益氣令人有力一切癰疽永不發方

枸杞二十斤剉葉生至未落可用莖葉落至未生可

用根以水一石煮取五斗去滓淀將滓更入釜與水

依前煮取五斗并前為一斛澄清去淀釜中煎取二

斗許更入小銅鍋子煎令連連如餒止或器盛重湯

煮更好每白早朝服一合半日再初服一合漸加

治風濕體痛不能飲食兼癰疽後補虛羸方

薔薇根

枸杞根各一斤食蜜

生地黄各一斤

右四味咬咀先以水煮二根令味濃取一斛去涎次內地黃煮令爛絞去滓微火煎令如粥次內蜜耗令相得每食後服如彈丸許

搗腫方

大黃

黃芩

白欬

芒消各五分

右四味以咀以水六升煮取三升故帛四重蘸汁中以搗腫處乾即易之無度數晝夜為之

又方

治癰疽始作腫亦燃熱長其甚速方

青木香

犀角

大黃

...

紫檀香

升麻

黃芩

羚羊角

黃連

甘草

芒消

射干

黃蘗

白欵

各取一分

地黃汁

五合

麝香研入

右十六味咬咀以水五升煮取二升小冷故帛兩重蘸

湯中搗腫處乾即易之日夜數百度

又方

治頸項及背脊有大腫赤發即封之令不成膿方

朴消伍兩

香豉

生地黃汁各半斤

右三味合搗煮令地黃爛熟傅腫處厚一分日三四易

至瘡止此兼治一切腫

又方

治癰腫痛煩悶方

生楸葉十重帖之以帛裹令緩急得所日一易止痛

兼消腫蝕膿甚良勝於他物如冬月先收乾者臨用

以鹽潤之亦可薄削椒皮用之

又方 治大人小兒癰腫方

生豬腦傅紙上帖之乾則易日三四度

又方 芥子為末湯和傅紙上帖之千金翼以豬膽和塗之

又方 白薑石末蒜和擣傅上 又方 擣馬鞭草傅上即頭出

又方 灸兩足大拇趾竒中方瘥仍隨病左右

治癰始覺腫令消方

大黃 通草 葶藶 莽草

右四味各等分為末以水和傅上乾則易之

又方 以葶藶末二指撮水和服之日二神良

治癰方

芫花為末膠和如粥傅之

瘰癧疔發腹背陰匿處通身有數十癰者方

取乾牛糞燒灰治下篩以雞子白調塗之乾復易

若已結膿估聚長者方

括青葙根為末苦酒和傅之燥復易赤小豆亦佳

治癰有膿今潰方

雞羽二十七枚燒末服之即潰

又方人乳和麩傅上比曉膿血盡出不用近手

又方箔經繩燒末臘月猪脂和傅下畔即潰不須針灸

治癰腫發背初作及經十日已上腫赤焮熱毒氣盛日夜

疼痛百藥不效方

嫩雞子

新出狗屎如雞子大

右一味攪調和微火熬令稀稠得所捻作餅子於腫頭

堅處帖之。以紙帖上。以帛抹之時。時看視覺餅子熱。即
易勿令轉動。及歇氣經一宿。定如多日患者。二日帖之。
日一。易至瘥。止此方。穢惡不可施之。貴勝然其愈。瘥
切諸方。皆不可及。自外諸方。還復備。自設儀注而已。
學者。當曉此方。以備諸急爾。

治諸漏惡瘡。一。二。般。丁。腫。五。色。遊。腫。癰。癩。毒。熱。
狐。刺。蛇。毒。狂。犬。蟲。狼。六。畜。所。傷。不。可。識。者。一。十。年。漏。余。瘡。
中。風。皆。以。此。膏。帖。之。惡。膿。盡。即。瘥。止。痛。生。肌。一。帖。不。換。藥。
惟。一。日。一。度。拭。去。膏。上。膿。再。帖。至。瘥。止。

生烏麻油膏斤黃丹肆兩

蠟肆分皆大兩大斤

右二味以臘日所一日從午內油銅器中微火煎至可
日看油減一分下黃丹消盡下蠟令沫消藥成至午時

出惟男子令母令小兒女人六畜等見

治諸腫帖方

紫葛於分

大黃每分

青木香壹分 玄參

白鯁

黃芩

黃連

榆白皮

升麻

由跋各參分 赤小豆

壹分

右十一味治下篩以生地黄汁和如泥傅腫上乾則易
無地黄汁與米醋和之

治癰腫方

松脂壹斤

猪脂壹斤

黃芩

黃耆

黃連

當歸

大黃

芍藥

芎藭

蠟各壹斤

右十味其八味以咀合旦脂微火煎二上三下綿及布
絞去滓火炙傅紙上隨腫大小帖之日一易即瘥

又方

秋脂 壹斤 猪脂 半斤 大黃 壹兩 白蠟 肆兩 細辛

防風

黃芩

芍藥

白斂

當歸

芍藥

莽草

黃蘗

白芷

黃連 各半

右十五味 以咀先煎一脂白蠟令烊 次內諸藥 三上三

下 以綿及布絞著水中 為餅取少許 炙之 傅油紙上

帖瘡處

千金翼有黃耆壹兩

治癰疽痔漏 疔瘡 婦人妬乳 漆瘡方

野葛

芍藥

薤白

當歸

通草 各壹分

附子 壹分

一右六味 以咀醋浸半日 先煎猪脂 令其令煙出 內諸藥

三分 令消盡 下之 行冷 又內松脂 八分 蠟 五分 更煮

一止 和次內諸藥 煎令沸 三上三下 去滓 以紙帛傅

腫上乾即易如春月去附子其髮須淨洗去垢不爾
入瘡痛

自龍牙生膏治癰疽疔漏與癰膿血出皆以此方導之

生栲栳白皮

生桑白皮

生青竹茹

生栢白皮

生龍膽各伍兩

蜂房

獨皮

蛇蛻皮

雄黃

雌黃各壹兩蜀椒

附子

芎藭各伍分

右十二味咬咀以三年苦酒一斗浸一宿於炭火上炙
乾擣下細篩以猪脂一升半微火煎攪令相得如飴著
末水中新白瓷器中盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒
服如棗核大日一

秋癩膏治諸色癰腫惡瘡瘰癧後有癩痕方

安息香 一作女萎

礬石

狼毒

羊躑躅

烏頭 附子

野葛

白芷

烏賊骨

皂莢 天雄

芍藥

芍藥

赤石脂

大黃 當歸

莽草

石膏

乾地黃

地榆 白朮

續斷

鬼臼

蜀椒

巴豆 各等分

細辛

各等分

右二十六味搗末用成煎猪脂四斤和以此為準煎二
上三下以好鹽一大匙下之膏成須服者與服須摩者
與摩摩之忌近眼服之忌妊娠人若滅癩者以布揩令
傷傳之鼻中息肉者取如大豆內鼻中如痰血者酒服
如棗核大痔漏者以綿裹如梅子大內下部中風者摩
患上取瘥崩中者亦內其滅癩取少許和麩為菜白傳之

取臘日合神效
千金要方有白蜜心膏兩

治膿潰後瘡不合方

燒鼠皮一枚為末傅瘡孔中

又方熟嚙大豆以傅之
又方炒烏麻令黑熟搗以傅之

又方牛屎傳之乾即易
又方燒破蒲席灰臘月猪脂和傅

治癰久不瘥方

馬齒菜搗汁煎以傅之

治癰癰潰後膿不斷及為諸物刺傷瘡不瘥方

石硫黃粉貳分

右一味取筋一片碓碎頭少濕內硫黃中以刺瘡孔瘡

瘡為度

治癰肉中如眼諸藥所不效者方

取附子削令如棊子安腫上以噀帖以火灸之令附子欲焦復唾濕復以火灸之如是二度令附子熟氣微內即瘥此法極妙

治癰有堅如石核者復大色不變或作石癰方

麝香理黃石壹斤 鹿角 別兩燒 白斂 叁兩

右二味以醋伍升先燒石令赤內醋中不限數醋減半止總擣末以餘醋和如泥厚傅之乾則易取消止盡更合諸漏及癰癰其藥悉皆用之仍火針針頭破傅藥又單磨鹿角半夏末和傅之不如前方佳也

治石癰堅如石不作膿者方

生商陸根熟擣傅之乾即易取軟為度又治濕漏諸

癰癰

○蜀桑根白皮陰乾搗末煑膠以酒和藥作腫按
○又方良姜子為末醋和以傳瘡頭根即拔

○又方蛇蛻皮帖之經宿便瘡

○又方樸子一枚以醋於青石上磨之以塗腫上乾更塗亦
過七度即愈

○又方梁上塵 葵根並去灰各等分

右一味醋和傳之即瘥

○又方當歸炙百壯石厚當碎出如不出其益壯乃佳

此者名曰香藤

○禁腫法

凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲止乃止後
七日勿洗手此後有一切腫及蠍螫惡注腫瘡摩之

隨于即消

書腫方

天乙甲一不生未乙一不成十癸死

右以丹書閉氣書腫上立瘥

治惡毒腫或著陰如或著一邊疼痛攣急引入小腹不可

忍毒一宿殺人方

取茵香草搗汁飲一升日三四服滓傳腫上冬月關

生者根亦可用此是外國神方於永嘉年未用之起死回生神驗

治風勞毒腫疼痛攣急或牽引小腹及腰髀痛方

挑人一升研如常法以酒二升攪和頓服之厚衣被

蓋令汗不過二升瘥

治脚腫向上至腰即殺人者方

赤小豆一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至腰
每日一度瘥止若已入腹不須浸但煮豆食之是鹽
菜米麩等渴飲汁瘥乃止

凡一切毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩
悶者此是毒氣深重所致方

麻子

赤小豆 各伍升 生商陸 貳升

附子 貳兩

射干 叁兩 升麻 肆兩

右六味咬咀以水四斗先煮四味取一斗半去滓次研
麻子碎和汁煮一沸瀲去滓取汁爛煮豆其汁每服五
合日一夜一當利小便為度腫退即瘥并食豆

治一切毒腫疼痛不可忍者方

取單麻子熟搗傅之即瘥

治諸瘡者白加復發方

大蒜

鼠象

書墨

右二味各等分為末傳之旦二

治癩子方

凡癩無頭者吞葵子一枚不得多服

又方生椒末

釜下土

右二味各等分醋和塗之千金翼有麩末為二味

又方狗頭骨

芸薹子

右二味各等分為末醋和傳之

又方燒葛蔓灰封之自消牛糞灰封之亦佳

又方鼠粘根葉貼之

又方水和雀巢傳之

醫書卷二 方十五首

論曰凡發背皆因服食五石寒食車生散所致亦有單服
鍾乳而發者又有此平不服而自發者此是上代有服之
者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作
赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至於死其
臨困之時已潤二寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔
中皆膿出尋時失音所以養生者小覺背上癢痛有異即
火急取淨土水和爲泥捻作餅子厚一分濶一寸半以粗
艾大俵炷灸泥餅上帖著瘡上灸之一炷一易餅子若粟
米大時可灸七餅子即差如榆莢大灸七七餅炷即差如
錢大可日夜灸之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸
藥攻之乃愈又法諸發背未作大膿可以冷水射之浸石
令公疑之日夜莫住差乃止此病忌麪酒五辛等亦有當

兩肩以上發者

凡服石人皆須勞役四體無令自安如其不爾者多有發動亦不得逐便次意取暖稱已適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益終無發動之慮耳

凡腫起背脾間頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂即之發背也禁房室酒肉蒜麪若不久灸治即入內殺人若灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方

香豉三升少與水和熟搗成強泥依腫作餅子厚二寸已上有孔勿覆孔上布鼓餅以艾列其上灸之使

血溢而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出即差

治癰疽發背已潰未潰及諸毒腫方

枯蘖根

榆白皮

胡燕窠

鼠屎土

右四味各等分為末以女人月經衣水洗取汁和如泥封腫上乾即易潰者四面封之已覺即封從一日至五日令瘡

治發背背上一初欲結腫方

大黃

升麻

黃芩

甘草

酪參

梔子參

茶

右五味以水九升煮取三升分二服取快利便止不利更進

內補散治癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸

桂心

人參

芎藭

厚朴

防風

甘草

白芷

桔梗

各壹兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三夜一未差重服勿絕

外臺無防風
甘草白芷

又方治癰疽發背方

蜀椒

乾薑

黃芩

人參

桂心

小豆

白欬

甘草

附子

防風

芍藥

右十一味治下篩酒服方寸匕日三夜三

李根皮散治癰疽發背及小小瘰癧方

李根皮

桔萎根

半夏

通草

桔梗

厚朴

黃芩

附子

當歸

葛根

桂心

芍藥

右十五味治下篩酒服方寸匕日三瘡大閉者夜再服

之曾有人患骨從瘡中出兼有二十餘癰疽服此散瘡
大肉盡則膿散治發背癰腫經年瘳後復發此因大風或
結氣在內經脈閉塞至夏自巳來出攻於背久不治積聚
作膿血出瘡內漏方

山茱萸 五味子 茯苓 乾薑各陸 甘草

石斛 人參 桂心 芍藥各伍 巴戟天

麥門冬 乾地黄 茯苓 遠志各捌 當歸

石韋 芎藭各肆 附子貳分 地膽 菟絲子叁

右二十味治下篩酒服方寸匕日二夜一稍加之長服

終身不患癰疽

治發背方

亂髮灰酒服方寸匕亦治癰疽

又方

猪脂傳上日四五度亦治發乳

救急方云取猪羊脂切作片冷水浸帖上

暖易之伍陸拾片瘥若初帖少許即寒寒定好眠甚妙

又方

三年醋滓微火煎令稠和牛脂傳上

又方

猪狗牙燒灰醋和傳上日三四易

又方

燒古蚌灰雞子白和傳之日三易

又方

飲鐵漿二升取利

又方

蛇頭灰醋和傳之日三易

又方

燒鹿角交醋和傳之日四五易

丹每第四論一首 方三十八首

論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手

掌甚者徧身有癢有腫無定色有白丹者肉中腫起癢而

復痛微虛腫如吹狀隱軫起也有雞冠丹者赤色而起大

者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如雞冠肌理也一

名菜更丹有水丹考由漏體熱起遇水濕搏之結丹是
黃赤色如有水在在支中喜著股及陰處此雖小疾不治合
入至死治之皆用

升麻膏

升麻 白薇射後漏蘆 連翹 芒消

黃芩略蛇疔 枳實略胡蘿蔔 梔子枝

右十味微擣碎以水三升浸半日以猪膏五升煎令水
氣盡去浮膏成傅上諸丹皆用之及熱瘡腫上日三

治無初實以

升麻治丹毒方

升麻 漏蘆 芒消各貳兩

黃芩參兩 胡蘿蔔伍兩 梔子貳拾枚

右六味以水一斗液良火煮取七升冷以故帛染
汁搗諸丹毒上常令濕搗後須服飲子并漏蘆湯方並
見前癰腫條中服之立瘥小品用治丹乾諸毒腫

單方

水苔

生蛇疔

生地黃

生苾菜

葫蘆葉

慎火草

五葉藤

豆葉

浮萍

已上取一味單搗塗之

大黃

梔子

黃芩

芒消

已上取一味下水和用

右十二味或搗或末單用一味立瘥

又方

凡天下極冷無過藻菜最冷但有患熱毒腫并丹毒

取渠中藻菜細切熟搗傅之厚三分乾即易

治癩卅神驗方

以苦葶藶菜孰熨厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但
三日內封之使醒醒時瘡止縱乾亦封之勿歇以絕
本余以正觀七年二月八日於內江縣食多至夜睡
中覺四體骨肉疼痛比至曉頭痛目眩額左角上如
彈丸大腫痛不得至近至午時至於右角至夜諸處
皆到其眼遂閉合不得開幾至殞斃縣令周公以種
種藥治不瘥經七日余自處此方其驗如神故疏之
以傳來世云耳

治五色油丹方

俗名油腫

若犯者多致死不可輕之

縛母猪枕頭臥甚良

又方

牛屎塗之乾即易

治赤流腫母毒方

取榆根白皮為末雞子白和傳之千金翼又用雞子白和蒲葦衣傳

又方擣大麻子水和傳之

又方以前煎羊脂摩之得青生脂最良集驗方云公治人面曰身體卒赤黑丹起如

疥狀不治白劇漏身即殺人

治小兒丹毒方

擣馬齒莧一握取汁飲之以滓薄其上

又方擣赤小豆九合水和取汁飲一合良以滓塗五心

又方濃煮大豆汁塗之良瘡後亦無癢痕

又方臘月猪脂和釜下土傳之乾則易

治小兒五色丹方

猪槽下爛泥傳之乾則易集驗方治卒赤黑丹

治小兒疳積藥傳之

又方服善龍湯二合良并傳患下在

治小兒白丹方

燒猪屎灰雞子白和傳之良

治小兒赤丹方

擣芒葶藶葉汁服二合良并傳患下在

治小兒赤丹斑駁者方

唾和胡粉從外向內傳之

又方鍛鐵屎以猪脂和傳之 **又方**屋塵以臘月猪脂和傳

治小兒火丹赤如朱走皮巾方

以醋和豉研傳之

又方鯉魚血傳之良

又方擣荏苒子傳之良

又方猪屎水和絞取汁服少許良

治小兒天火毒肉中有赤如丹色大者如手甚者徧身或
痛或癢或腫方

赤小豆一升為末雞子白和如薄泥傅之乾則易便
瘡一切丹並用此方皆瘡

又方生麻油塗之

治小兒骨火丹其瘡見此方

搗大小蒜厚封之甚足踝者是

治小兒殃火丹毒著兩肋及腋下者方

伏龍肝為末油和油守之乾則易若入腹及陰以慎火

草取汁服之

治小兒疔竈丹初從兩胎起及臍間走入陰頭皆赤色者

切桑白皮一升以水一升煮取汁治之良

又方 爛李根為灰以田中流水和傅之良

治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至徧身如棗大正赤色者方

濃艾葉根汁洗之已成瘡者赤小豆末傅之未成瘡者雞子白和小豆末以傅凡方中用雞子者皆取先破者用之完者無力

治小兒天竈火丹病從髀間起小兒未滿百日犯行路竈君若執流下令陰頭赤腫血出方

伏龍肝搗末雞子白和傅之日二良

又方 鯽魚肉對伍合赤小豆末參合

右二味和搗少水和傅之良

治小兒野火丹病徧身皆赤者方

用油塗之

治小兒茱萸丹病初從背起徧身如細鱗一宿成瘡者方
赤小豆爲末以粉之如未成瘡者雞子白和以傅之

治小兒廢驚火丹初從足趺起正赤色者方
以棗根煮汁沐浴五六度

隱軫第五 論一首 灸法一首

方二十九首

論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏
皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則爲癢也所以有風
軫搔癢皆由於此又有赤軫者忽起如蚊蚋啄煩癢極者
重沓壘起搔之逐手起又有白軫者亦如此赤軫熱時即
發冷即止白軫天陰冷即發白軫宜煮礬石汁拭之或煮
葫蘆和少酒以浴之良 或煮石南汁拭之良或水

黃雞菜汁或者煮枳實汁拭之良餘一切如治丹方法俗呼為風菜亦名風尸

治六十四種風淫液走人皮中如蟲行腰脊強直

五緩六急手足拘攣隱軫搔之作瘡風尸身癢卒面目腫

起手不得上頭口噤不能言方此方但是隱軫宜服

治風瘙隱軫心迷悶亂方

天雄 牛膝 桂心 知母各肆分 括婁根

白朮各伍分 防風陸分 人參貳分 乾薑 細辛各叁分

右十味治下篩酒服半錢匕加至一匕為度

又方巴豆二兩以水七升煮取二升故帛染汁拭之大人

小兒以意加減

又方礬石二兩為末酒二升漬令消帛染拭病上

又方 吳茱萸一升酒五升煮取一升半帛染拭病上

治搔癢及中風虛方

枳實參升 松葉切青豆升 獨活 菘蓉

黃耆 秦艽各肆兩 丹參 胡蘆各伍兩

右八味以咀以酒一斗浸六宿每服一合日一稍加之

治風痿隱軫方

白木參兩 戎鹽 礬石各半兩 黃連

黃芩 細辛 芎藭 茵芋各壹兩

右八味以咀以水一斗煮取三升洗之日三良

又方 馬蘭子 胡蘆 礬石 羌藟子

蒺藜子 茵芋 羊桃 菴竹各壹兩

一右八味以咀以漿水一斗煮取一斗一升內礬石洗之

日三

又方 葫蘆

防風

羊桃

石南

茵芋

羌花

疾藜

礬石各壹兩

右八味以漿水一斗煮取五升去滓內礬石令小沸溫浴之

又方 蛇牀子六升

防風貳兩

生蒺藜貳斤

右二味以水一斗煮取五升拭病上日三五遍

又方 酪和鹽煎煮摩之隨手即消良

又方 石灰淋取汁洗之良 又方 白芷根葉煮汁洗之

又方 大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞日三

又方 牛膝為末酒下方寸匕日二并治骨疽癩病及痔漏

又方 芥子末漿服方寸匕日三 又方 白朮末酒服方寸匕日三

治隱軫癢痛方

大黃

升麻

黃蘗

當歸

防風

芍藥

黃芩

青木香

甘草

各貳兩

楓香

伍兩

芒消

壹兩

地黃汁

壹升

右十一味咬咀以水一斗煮取二升半去滓下芒消令

消帛染搨病上一炊又日四五度

治與體癢痛如蟲嚙癢而搔之皮便脫落作瘡方

蒺藜子

叁升

蛇牀子

羌蔚子

各貳升

防風

伍兩

大戟

壹斤

大黃

貳兩

礬石

叁兩

右七味咬咀酒四升水十升煮取四升去滓內礬石以

帛染拭之

又方灸曲池一穴小兒隨年壯發即灸之神良

治風癢腫癢癢在頭面搨洗方

大黃

芒消各肆分

莽草真分二
打草冬二兩

黃連陸分

黃芩別分

疾藜子伍合

右六味以咀以水七升煮取三升去滓下消以帛染搨洗日一度勿近目

治身體赤隱軫而癢搔之隨手腫起方

莽草貳分

當歸

芍藥

大戟

細辛

芍藥

芫花

蜀椒

附子

躑躅各肆分

猪膏貳升半

右取十味以酒漬一宿猪膏煎之候附子色黃膏成去滓以傅病上日二

治風熱赤軫搔之逐手作瘡方

青羊脂各二兩 甘草

芍藥各三兩 寒水石

白芷

白芨

黃芩

防風

黃耆

升麻各四分 竹葉切

石膏各五升

右上一味咬咀先以水八升煮石膏竹葉取四升去滓

浸諸藥以不中水猪脂二升合煎膏成傅病上良

治隱軫白瘰不瘥者方

景天一斤一名慎火草細擣取汁傅上熱灸手摩之

再二度瘥

又方 芒消八兩水一斗煮取四升適寒溫綿染拭之

又方 黃連切

芒消各伍兩

右一味以水六升煮取半去滓洗之日四五度

治暴氣在表攻皮上隱軫作瘡方

煮槐枝葉洗之

治小兒患隱軫入腹腫強而舌乾方

蕪菁子為末酒服方寸匕日三

又方蠶沙一升水一升煮去滓洗之良

又方車前子為末粉之良又方鹽湯洗了以麥子按傳之

癰疽第六論一首方十五條

論曰癰疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟極者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經又便四面悉腫飽黯紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐脉入臟殺人南人名為搨著毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治

專去其熱取瘥其病喜著十指故與代指相似人不識之
呼作代指不急治之亦透脉上入臟殺人南方人得之皆
斬去其指初指頭先作黯疱後始腫赤黑黯疼痛入心是
也

代指者先腫痂熱痛色不黯緣瓜甲邊結膿刺者瓜皆脫
落此謂之代指病也但得一物冷藥汁搨漬之佳若執盛
服漏蘆湯及塌漬之傳升麻膏亦可針去血不妨洗漬塗

膏也

復有惡肉疔者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如
牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛癢此由春
冬時受惡風入肌腠中變成此疾治之宜服漏蘆湯外燒
鐵烙之日日爲之令焦盡即以升麻膏傅上積日乃瘥

又有赤脉病者身上忽有赤脉絡起隴聳如死蚯蚓之狀
視之如有水在脉中長短皆逐脉所處此由春夏受惡風
入絡脉中其血肉痰所作也宜五香連翹湯及竹瀝等治
之刺去其血仍傅丹參膏亦用白雞屎塗之良
惡核病者肉中忽有核累累如梅李核小者如豆粒皮肉
疼痛壯熱瘰癧寒是也與諸瘡瘰癧結筋相似其瘡
根瘰癧因瘡而生是緩無毒惡核病卒然而起有毒若不
治入腹煩悶殺人皆由冬月受溫風至春夏有暴寒相搏
氣結成此毒也但服五香湯主之又以小豆末傅之亦效
湯漬時時洗之消後以丹參膏傅之令餘核盡消凡惡核
初似被射之毒無常定處多惻惻然痛或時不痛人不痛
者便不覺不覺則救遲救遲即殺人是宜早防之尤忌

魚雞猪牛馬驢等肉其疾初如粟米或似麻子在肉裏而
堅似蛇長甚速初得多惡寒須臾即短氣取吳茱萸五合
作末水一升和之絞取汁頓服以滓傳上須臾服汁令毒
散止即不入腹也入腹則致禍矣切慎之

凡痛病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯熱其發於
脚喜從膺起至踝亦如編繩故云痛病也發於腎喜著脛
之下皆由久勞執氣盛為濕涼所折氣結筋中成此病也
若不即治其久消膿亦令人筋攣縮也若不消潰其熱氣
不散多作疔病灌薑湯主之瀉後鋒針數針去惡血氣針
瀉其根核上傳小豆末取消為度又用治丹法治之亦用
治癰三味甘草散傳之若潰傳膏散如癰法

惡核痛病癰疽等名起癰表中之毒有南方人所食雜類

變多感病亦復不一任人往彼深須預防之無法必遭
其毒惟須五香湯小良散吳茱萸皆其要藥

凡附骨疽者以其無破外臺附骨成膿故名附骨疽喜著

大節解中主夫產婦喜著腔中小兒亦著脊背大人急著

者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪

腫如肥狀是也小兒纒手近便六腑呼即是肢節有痛候

比大人緩著者先覺肌烘烘然經日便覺痛痺不隨小兒

四肢不能動搖亦如不隨狀看肢節解中若有崩烘烘處

不知是附骨疽今徧身成腫不至潰體皆有青黯大人亦

有不別呼為賊風風腫不知是疽也凡人身體患熱當風

取涼風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沈重

忽忽耳鳴又秋夏露臥為冷所折風熱伏結而作此疾急

者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何故而
此疾由其血盛肌嫩爲風折之即使凝結故也凡初得附
骨疽即須急服漏蘆湯下之傳小豆散得消可服五香連
翹湯方見癰疽條中

凡賊風其人體平無熱中暴風冷即骨解深痛不廢轉動
按之應骨痛久即結痛或結癰癰其附骨疽久即腫而結
膿以此爲異宜若治附骨作賊風則增益病深膿膿多若治
賊風作附骨即加風冷遂成癰癰偏枯攣曲之疾也療之
之效皆在善始且此非天下至精其孰能與於此若候附
骨與賊風爲異者附骨之始不腫但痛而已其賊風但痛
不熱附骨則其上壯熱四體乍寒乍熱小便赤大便澀而
無汗若得下却熱并開發腠理便得消也縱下消盡亦得

浮淺近外凡賊風但夜痛骨不可按抑不得回轉痛處不
壯熱亦不下寒乍熱多覺身體索索然冷欲得熱熨痛處
即小實時復有汗出此爲賊風證也宜針灸熨焯諸服治
風藥即愈方見風條中

又有風熱毒相搏爲腫其狀先腫上生癩漿如火灼麴名
曰風熱毒治之一如丹法

又有洪燭瘡身上忽生癩漿如沸湯灑刺者徧頭面亦有
背脇腰腹腫緩通體如火湯灼癩起者是也治之法急服
漏蘆湯下之外以升麻膏傳之其間傳升麻膏若無效一
依傳丹方

凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起即淺淺但出黃汁名肥瘡

浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止搔癢者初如疥搔之轉生

相連者是也

腐瘡者初作亦如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛
癢并裂春夏秋冬隨瘡劇者是也

有父癰餘瘡敗為深疽者在臑脛間喜生瘡中水惡露寒
凍不瘥經年成骨疽亦名筋瘡深爛青黑四邊堅彊中央
膿血汁出百藥不瘥汁潰好肉處皆虛腫亦有碎骨出者
可溫亦龍皮湯漬方見下卷夏月月日日洗冬月月日日洗

青肉多可傅白蘭茹散食去惡肉可三日傅之止後長傅

家猪屎散得瘥止取猪屎燒灰作末如粉致瘡中令滿白

汁出吮去隨更傅之瘥止若更青肉復著白蘭茹散如前

法家猪散取平復凡骨疽百瘡不瘥者可瘡上以次灸之

二三日二夜便瘥如瘡不瘥瘥而復發骨從孔中出者名為

骨疽取死烏雌雞一隻土肉取骨焚焦如灰取一家半
梧桐刮取屑一家煎簡各一兩皆燒成炭合道導瘡中碎骨
當出數片瘥

治癰疽秘方

射干

寸草

枳實

升麻

乾地黃

黃芩

各司

麝香

貳分

前胡

參分

犀角

陸分

大黃

右十味咬咀以水九升煮取二升下大黃一沸去滓內
麝分二服瘥止不限劑數此方世所不傳神良無比

無名氏大云云下翼深師加黃芩
麻黃白微枳實升麻松葉

治癰疽諸疽十指頭爛赤痛瘻方千金翼方夕口猪蹄湯

白芷

大黃

芎藭

黃芩

黃連

甘草

細辛

藁本

當歸

藜蘆

莽草 各二兩

右十一味咬咀以水一斗先煮猪蹄一具取一斗煮藥

取五升浸瘡即瘥

治癰疽浸淫多汁日漸大方

黃連 貳兩

胡粉

甘草

藺如 各二兩

右四味治下篩以粉瘡上日三四度

治癰疽著手足有背累累如米起色白刮之汁出瘥後復

發方

黃耆 陸分

升麻 肆分

欬久花 貳分

附子

苦參 范汪無

赤小豆 各二兩

右六味泔下篩酒服方寸匕稍加日二服

又方虎屎白者以馬屎和曝乾燒為灰粉之良

又方青木香 滑石

龍骨 各二兩 胡粉 壹兩 米粉 壹升

右五味為末稍以粉病上日三

又方竈屋塵

竈突墨

釜下土 各壹升

右二味合研令勻以水一斗煮二沸取汁洗日三四度

治癩疽著手足有背忽發累累如赤豆剝之汁出者方

鯽魚 長叁寸者 雞子大

猪脂 壹升

右二味煎為膏傳之

又方熬蕪菁子擣碎帛裹展轉傳上良

又方以麻子熬作末摩上良

又方酒和麩傳之

又方以猪膽傳之良

又方剝去瘡痂溫醋泔清洗之以胡燕窠和百日男兒象

如膏傳之

又方 亂髮灰服方寸匕日三亦治發背

又方 蒼生薑菜取汁一升服之并食乾熟豆羹數頓少與

晒薑夏月研子水和服之

又方 枸杞根并葵根葉煮汁煎令如糖隨意服之

又方 臘月糖晝夜連浸數日乃愈

治疔潰後方

以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良

又方 以牛耳中垢傅之良 又方 梁上塵和車軋中脂傅

又方 以牛麻油淋綿裹布瘡上蟲出

又方 以沸湯濯瘡中一二四徧湯一作錫

治疽似癰而小有界膿如小豆汁今日去明日滿者方

去其熱搗濕布袋盛之埋熱灰中更互熨之不過

二度各文瘡冬用乾者

又方皂莢煎湯洗瘡拭乾以麝皮及為末傳之勿令作痂
治疽卒著土指筋急不得死伸者方

灸跡背中央數十壯或至百壯

治風疽方凡脚脰及曲腋中癢極則黃汁出是

以青竹筒一枚徑一寸半長二尺當中著大豆一升
以糠馬屎一物燒為火當竹筒中燒之以器承兩頭
取汁先以泔清和鹽熱洗瘡了即塗豆汁不過二度
極效

又方嚼胡麻傳以綿裹之日一易神良

治石疽狀如座墮而皮厚方

搗穀子傳之亦治金瘡

治久癰瘡敗壞成骨疽方

末龍骨粉瘡四面厚二分以膏著瘡中日一二易蟲出

如髮盡愈膏方如左

大蝦蟆瘡枝自死亂髮膏塊雞子大猪脂壹斤

右三味取二味內脂中煎略消盡下待冷更內鹽一合

攪和充前用

治瘡久不瘥瘻而復發骨從孔中出名為骨疽方

以猪膽和楸葉搗封之

又方搗白楊葉末傅之 **又方**搗蕪菁子傅之帛裹之一易

又方穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎一斗以艾及

荆華搗碎和雞屎令可燃火坑中燒之令煙出內疽

於坑中熏之以衣擁坑口勿洩氣半日見虫有蟲出其

效

治附骨疽方

槲皮燒末飲服方寸匕

又方

新剥鼠皮如錢孔大帖腫上即膿出已潰者取猪脊上脂帖之

又方

灸間使後一寸隨年壯立瘥

治又疽方

鯽魚破腹勿損內白鹽於腹中以針縫之於銅器中火上煎令乾作末傅疽瘡中無膿者以猪脂和傅上小疼痛無怪也十日瘥

治浸淫瘡方

瘡表裏相當名浸淫瘡

苦瓠

蜂房

蛇蛻

羊脂

大豆半合梁上塵

右五味治下節以粉為粥和傅紙上帖之日三點於時

又方 以前餅乘熱搗之亦治細癬

又方 猪牙車骨年久者槌破燒令脂出熱塗之

又方 取苦楝皮若荔枝燒作灰傅上乾者猪脂和塗并治小

兒秃瘡及諸惡瘡

治疔瘡方

醋一升温令沸以生蘇一把內中封瘡上瘰癧為度

又方 擣桃葉和鯉魚鮓糗封之亦可以鮓薄上

又方 炒蠟月糖薄之

又方 燒故履系為末傅之

又方 燒松根取脂塗之

治癰癤方

醋和灰塗之

以山煎汁菜塗之

治濕癩方

燒乾蝦蟆猪脂和傅之

治癩疥去燥茅不瘥方

棟實厚其力

挑皮

苦參

地榆根各伍兩

右四味以水一斗煮取五升稍温洗之日一度

治癩疥濕瘡浸淫日廣癢不可堪搔之黃汁出瘥後復

發方

羊蹄根淨去土細切熟熬以醋和熟搗淨洗瘡傅上

一時間以冷水洗之日一度又陰乾作末瘡時搔則

汁出以粉之又以生葱根搗之

千金書其無葱字

治一切癩瘡

凡脚癩及曲脚中癢搔則黃汁出是各風毒

灸足大趾竒間一二壯又灸大趾頭亦佳

疔諸瘡因風致腫方

燒白茅灰溫湯和厚二分傅瘡上乾即易五六度瘳
又方 標根皮二三十斤剉以水三斛煮令熱下鹽一把令的
的然熱以浸瘡當出膿血日日為之瘳止

心露瘡方

搗蘇菜傅瘡口以大艾炷灸藥上令熱入內即瘳

治惡瘡方

礬石 松脂 亂髮 蠟各貳分 猪膏 肆兩

右五味煎髮候消內礬石次內松脂次內蠟去滓先刮

洗瘡令淨然後用藥塗之日再二三不痛久瘳時愈新瘳

遲愈則飛飛瘳頭禿皆即愈生髮勝飛黃膏

又方燒蒿竹灰和褚白汁塗之

又方羊朶蒜根燒煙斷膏和封上有汁者乾傅之

又方麩一升作餅大小以覆瘡灸上令熱汁出盡瘡

治惡瘡似火爛洗湯

白馬屎曝乾以河水和煮十沸絞取汁洗之

治惡瘡其大如錢各白馬疥方

以水漬自死蛇一頭令爛去骨以汁塗之隨手瘡

治惡瘡十年不差似癩者方

蛇蛻皮一枚燒為末下篩猪脂和傅之醋和亦得

又方苦瓠一枚咬咀煮取汁洗之日二度又煎以塗癬甚

良當先以泔淨洗乃塗三日瘡

又方燒椒猪屎傅之

又方鹽湯洗擣地黃葉帖之

又方燒鮑魚灰和醬清傳之

治惡瘡方

雄黃

雌黃

芎藭

升麻

烏頭

防已

竹葉

黃連

黃蘗

水銀

胡粉

蠟

杏仁

巴豆

松脂

亂髮子

右十六味以咀以猪膏三升急煎令髮消去滓停小冷

入真朱二錢攪令相得以傳之凡用膏先淨洗瘡拭

乾乃傳上傳訖以赤石脂黃連散粉之千金書異無竹

又方治種種諸瘡不愈者方

水銀

黃連

經墨

右三味治下篩以水猪膏和傳上不可過薄一

神良若欲多作任人水銀大須熟研其藥惟不治余未

治反花瘡并治積年諸瘡方

取牛蒡根熟搗和臘月猪脂封上瘡止并治久不瘥

諸疔惡瘡漏瘡等皆日瘥

又方取馬齒菜搗封上瘡止

又方取蜘蛛膜帖上數易之瘡止

治身瘡及頭瘡不止方

取葛蒲為末傅上日二夜二

治瘡久不瘥方

蕪荑 藜蘆 薑黃 青礬

雄黃 苦參 沙參 附子

右八味治下篩先以藍汁洗瘡土去加乾拭傅上小兒一

炊父剥去之大人半日纔剥再傳不過三四度愈
心諸瘡父不瘥并治六畜方

棗膏二升水三斗煮取一斗半數洗取愈

治代指方

甘草二兩咬咀水五升煮取一升半漬之若無用

又方以唾和白礪砂先搜麩作梳子盛唾次着礪砂

許以爪指着中一日瘥

又方以毛雜黃土作泥泥指上厚五分許內糖灰中煨之

令熱可忍泥乾即易不過數度瘥

又方刺指熱飯中一二七遍 又方以麻沸湯漬之即愈

又方單煮地榆湯漬之半日 又方取萎黃葱葉煮沸漬之

又方以蜀椒四合水一升煮二沸漬之

又方先刺去膿血炙魚鱗皮令溫以纏裹周匝痛止復愈
治指痛欲脫方

猪脂和鹽煮令消熱內指中一食久住千金翼和乾薑
治手足拮据痛不可忍方

醬消和蜜以塗之

又方灸指端七壯立瘥

治王定指逆腫方此緣刺上搔頭所致

還坐廁上以指到村一七下即瘥

又方青珠壹分

乾薑貳分

右二味擣以粉瘡上日三

治手足皴裂逆腫代指方

酒搗猪脂洗之慎風冷

治冬月冒涉凍凌面目手足皴瘃及始熱痛欲瘃者方
取麥稟煮令濃熱洗之

治凍指瘃欲墮方

馬屎二三升以水煮令沸漬半日愈

治手足皴裂勞破裂血出疼痛方

猪脂著熱酒中洗之

治手足皴痛方

蒼朮加子根洗之

又方 芍藥 芍藥 芍藥

白芷

防風

鹽 各壹

右五味 以水

以水四升煎取濃塗之或猪脂煎更良

治口脚方

脚無 長常折裂者是

雞屎一升水二升煮數沸停小冷清半日瘡止亦用

馬屎心踏酒吐及婦人穢血

又方 烱膠膠乾故帛帖上

治割甲侵肉不瘥方

以礪砂礬石為末裹之以瘥為候

又方 搗鬼針草出田汁鼠黏草根和臘月猪脂傅之

重刊孫真人備急千金要方卷之二十一

善
 510.87
 12-1
 書 號碼
 著 譯 者 孫思邈
 書 名 (甄別孫真人) 備急千金要方 V.24

號數	借期	還期	號數	借期	還期
----	----	----	----	----	----

出借得不

出借得不

借閱者注意

- (一) 加意愛護勿失原有形狀
- (二) 損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四) 逾期不歸還者應照章納金

圖書號數 善 510.87 V.24
 圖書冊數 12-1
 登記號數 63295

