

醫方類聚卷之一百四十一

諸痢門五

聖濟總錄

白帶痢

白帶痢者冷痢之類蓋腸虛受冷

與津液相搏結滯如膿或如凝脂腹痛而下

故為白帶痢

治白帶痢及小便白人參湯方

人參 龍骨 當歸 乾薑 白茯苓



皮各炙到甘草炙到厚朴去麤皮塗生薑汁炙熟一兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至壹盞去滓空心服日晩再服如小兒患

量大小以意加減

治白滯痢及食不消化黃蘗丸方

黃蘗去麤皮蜜炙三分烏梅肉炒乾一兩熟艾微炒一兩甘

草炙到

右四味搗羅為末鍊蜜和凡如梧桐子大

每服一十五丸空心米飲下日午再服

治白膿痢赤石脂散方

赤石脂碎一兩乾薑焙三分

右二味搗羅為末每服兩錢匕空心米飲

調下日晩再服

治白膿及諸痢當歸丸方

當歸切焙黃連去須炒烏梅肉乾炒阿膠炙燥

兩

右四味搗羅為末鎔蠟和丸梧桐子大每

服空心溫粥飲下二十九日午再服

治白滯痢及腹痛不止陳麴湯方

陳麴炒黃黃連去須厚朴去麤皮塗薑汁

附子炮裂去乾薑炮各

右五味判如麻豆每服五錢匕水壹盞半

煎至八分去滓空心服日晚再服

治白滯痢心腹脹滿不下食豆蔻湯方

肉豆蔻去殼甘草炙到各厚朴去麤皮塗生

一兩乾薑炮半

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓空心溫服日午再服

治白滯痢及水痢日夜一二十行心下痛白

木湯方

白朮三分甘草炙到厚朴去麤皮塗生薑汁

黃蘗去麤皮炙龍骨各半

右五味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半生

薑三片同煎至八分去滓空心溫服日晚

再服

治冷白滯痢及腹痛附子湯方

附子炮裂去皮臍一兩半赤石脂一兩乾薑炮一兩半芍藥

甘草炙到各半兩當歸切焙竜骨各一兩半白朮二兩

參三分牡蠣熬一兩半

右壹十味剉如麻豆每服五錢匕水壹盞

半煎至八分去滓空心温服日晚再服有

膿加厚朴壹兩去麤皮薑汁塗炙紫色若

嘔加陳橘皮壹兩湯浸去白焙

治白滯痢竜骨丸方一三

竜骨一兩半乾薑炮半兩附子炮裂去皮臍一兩半

右三味搗羅爲末醋煮麴糊和丸如梧桐

子大食前米飲下十五丸

治脾胃氣虛滑泄下痢白膿厚朴湯方厚朴

厚朴四兩薑汁炙去及塗乾薑炮二兩

右二味搗篩每服三錢匕漿水壹盞煎

至六分去滓温服食前

治丈夫婦人久患白滯痢如魚腦阿魏丸方

阿魏別研分桂去蘆皮爲半兩木香爲半兩安息香

壹分酒浸別研獨頭蒜土裏煨熟以此收

右五味再同研極細溫酒和凡如梧桐子
大每服三十凡空心陳米飲下日食再服

治白滯痢腹藏撮痛豆蔻凡方

肉豆蔻 麩裏煨 熟為末 豆蔻 麩裏煨 熟為末 縮沙人

母丁香 各壹兩 木香 沉香 剉 墨 燒紅為末 各半兩

地榆 二兩 枇杷葉 大毛炙 壹兩

右九味搗羅為末燒粟米飯和凡如櫻桃

大每服二九米飲化下食前服

治白痢多膿腹中疔痛黃芩凡方

黃芩 去黑心 黃連 去須 黃蘗 去麩皮各壹兩半 吳茱萸

湯洗焙乾 訶梨勒皮 炒二兩

右五味搗羅為末鍊蜜和凡如梧桐子大

每服四九食前橘皮湯下日再服

治藏寒下痢白膿心腹疔痛薑附散方

乾薑 剉 附子 剉裂去皮 訶梨勒皮 煨取壹 龍骨 各壹

右四味搗羅為散每服三錢匕煎烏梅湯

空沁調下不送黃芩散

命空沁調下不送黃芩散

治白滯痢久不差黃連湯方

黃連法須炒厚朴去蘆皮生薑汁炙各二兩

右二味羅縹篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓食前服

冷痢

下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒即成久冷痢

有膿也

治冷痢肉豆蔻湯方

肉豆蔻去殼甘草炙別各壹兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至八分去滓空心日午溫服

治久冷痢枳殼湯方

枳殼去瓢炒甘草炙別各半兩厚朴去蘆皮薑汁炙宜兩半

乾薑作赤茯苓去黑皮各皆兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓温服空心日午二服

治冷痢不調水痢不止黃連散方

黃連去須炒無食子燒令煙盡存性黃蘗去蘘皮炙醋石

榴皮炒乾薑炮各壹兩

右五味擣羅為散每服三錢匕空心日午

米飲調服

治冷痢及赤白滯下附子湯方

附子炮裂去皮臍半兩黃連去須炒壹兩阿膠炙令燥三分

甘草炙到乾薑炮各半兩赤石脂厚朴去蘘皮炙

各壹兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞

半煎至八分去滓温服空心食前日三

治冷痢疔痛腸滑不差黃連湯方

黃連去須炒半兩阿膠炙令燥鼠尾草洗淨慢火焙乾當

歸焙切乾薑炮各三分

右五味籠擣篩每服四錢匕若冷甚白多

以酒壹盞半煎至八分去滓空心温服日

午再服若熱及不痛即去乾薑當歸用水

煎依前服

治冷痢熟艾湯方

熟艾炒附子炮裂去皮黃連去須炒阿膠

炙令燥甘草炙乾薑炮赤石脂各半

右七味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞煎

至七分去滓空心食前溫服日三

治冷痢厚朴飲方

厚朴去麤皮薑肉豆蔻去殼龍骨白朮

各三分

右四味剉如麻豆每服四錢匕水壹大盞

入生薑三片同煎至七分去滓空心食前

溫服日三

治冷痢下色白食不消甘草湯方

甘草炙黃連去須炒附子炮裂去皮阿膠

炙令燥

右四味剉如麻豆每服五錢匕水壹盞半

煎至八分去滓空心日午溫服日三

治冷痢訶黎勒湯方

訶黎勒白朮

訶梨勒炮去核三分 高良薑 白芍藥 枳殼

去瓢白茯苓去黑皮厚朴去蘊皮薑汁炙三分

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水壹盞

半入生薑三片煎至八分去滓空心食前

溫服日三如腹脹加入參半兩甘草半兩

治

一切冷痢附子丸方

附子炮裂入水少時去皮臍乾薑炮熟艾各一兩

右三味搗羅為末以新汲水調麴拌和為

丸如彈子大每服二丸用麴一錢匕以水

壹盞半化開煎三五沸空心服之服後覺

熱以飯壓之或患冷病丸如梧桐子太空

心米飲下三十九至五十九

治大腸積冷下痢不止裏急後重疼痛五神

散方

附子炮裂去皮臍乾薑炮訶梨勒炮去核延胡

索各一兩烏梅去核

右五味為麴散和白麵裹慢火內燻令麴

熟為度去麩焙乾壽羅為細散每服一錢
匕空心食前米飲調下

治冷極泄瀉久作腸滑不禁不欲飲食玉粉
散方

附子炮裂去皮臍 紅豆 乾薑炮各一兩三味

礞石研如粉

右四味再同研令極細每服壹錢匕稀粟
米粥調候溫冷得所服之
治大腸虛滑冷痢日夜不止火輪散方

附子炮裂去皮臍 肉豆蔻去殼 薑乾炮壹

右三味搗羅為散每服一錢匕陳粟米飲

調下空心食前服

治脾胃虛冷下痢滑泄不思飲食和一切冷

氣訶梨勒湯方

訶梨勒炮去核 厚朴去蘊皮 草薢炙 白朮

草豆蔻去皮 陳橘皮湯浸去白

右六味搗篩每服三錢匕水一盞入生

薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓食

前溫服

治脾藏冷滑不止腹痛疝刺和陰氣進食烏

頭湯方

烏頭生去皮臍四益智去皮三兩乾薑生青橘

皮湯浸去白藁香子炒壹兩

右五味剉如麻豆每服二錢匕水壹盞入

鹽少許煎至六分去滓溫服如小腸氣攻

刺急煎一兩服熱服刺粟米為

治冷痢久不差乾薑丸方

乾薑炮附子生去皮臍赤石脂去須各黃連壹兩

右四味搗羅為末麩糊和左如梧桐子大

米飲下二十九加至三十九日三服

治冷痢不消化食已腹中脹痛氣滿地榆丸

方

地榆兩赤石脂各壹兩厚朴去須各

薑汁烏梅肉炒乾薑兩黃連壹兩

白朮常歸艾葉炒各壹兩甘草壹兩

右壹十味搗羅為末鍊蜜和左如梧桐

子大每服三十九米飲下空心食前日二服

治冷痢久不差臍腹疼痛時下白膿食物不

消菜萸人參丸方

食菜萸炒人參 芎藭 桔梗炒枳實炒

常甘草炙到各 乾薑炮陳麴炒各附子炮裂

臍二下二十八粒至三十九粒日三服

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大

每服三十九米飲下空心食前

治冷痢下膿血臍腹疼痛脹滿食不消化吳

菜萸丸方吳菜萸湯洗焙乾薑炮各壹

其吳菜萸乾炒去薑皮生當歸切焙各

麴炒各厚朴去薑汁炙

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每

服三十九米飲下空心食前日二服

治冷膿痢腹痛不止黃連散方

黃連去須厚朴去薑皮生薑乾薑炮木香

膏牛生甘草炙阿膠炙陳麴炒各訶黎勒

皮壹半生壹
半煨壹兩

右八味搗羅為散每服三錢匕米飲調下

治冷痢四白散方

竜骨 白石脂 胡粉熬令白 礬燒成灰

右四味搗研為散每服二錢匕米飲調下

熱痢

凡痢色黃色赤並熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪熱之氣乘虛入客於腸間故其證下痢黃赤或血雜下腹間熱痛小便赤澀身

熱煩渴故謂之熱痢

治熱痢不止生地黄黃湯方煎生四合去滓空

生地黄兩半 甘草一分 地榆三分

右三味咬咀如麻豆大水二盞煎至一盞

去滓分溫二服空心日晚再服

治熱痢無度黃連散方

黃連須雞子 雞子二枚

右二味搗羅黃連為散取雞子白和藥為

餅子燒令黑再搗羅為細散每服三錢匕

空心粥飲調下日晚再服

治挾熱痢多下赤膿黃連散方

黃連去須竈突中黑塵各壹兩

右二味擣羅爲細末每服二錢匕溫酒調

空心服日再

治夏月暴下熱痢甘草湯方

甘草炙生薑切生蜜壹合

右三味用漿水五合同煎至四合去滓空

心溫分二服

治熱痢腹內疝痛日夜百行氣欲絕黃連湯

方

黃連去須附子炮裂去皮龍骨白米

兩阿膠炙乾薑炮當歸焙赤石脂各三兩

中右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水壹

斗盞半煎至八分去滓溫服溫心參人

治熱痢蒲根湯方水由蒲根炙白米

蒲根兩粟米淘二合

右二味以水三盞煎取壹盞半去滓分溫

類聚百病

十三

類聚百病

二服空心日午再服

赤痢

熱痢之甚者為赤痢本由腸虛為風邪所傷
又挾邪熱血得熱而妄行乘虛必湊滲入腸
中與痢相雜其色純赤名為赤痢若腸虛不
復則為久赤痢變成嘔噦疳蠱之候矣

治痢下黃赤水或黃赤膿四肢煩皮膚赤者

黃蘗丸方

黃蘗

去蘆皮

黃連

去須炒

熟艾

半斤

黃芩

去黑

心言兩
壹分

右四味擣羅為末用白蜜三兩鍊熟入蠟
一兩鎔化入前藥末和擣在如梧桐子大
每服三十九空心米飲下日晚再服

治諸熱毒痢下黃汁及如赤爛豆汁如赤帶

狀又如魚腦壯熱牡蠣湯方

牡蠣

煨過

白頭翁

焙

當歸

切

犀角

鎔

艾葉

炒甘草

炙

桑寄生

剉各半兩

黃蘗

去蘆皮

黃連

剉各

去須黃芩

去心

升麻

剉各

酸石榴皮

剉各

三分

蓋

右壹十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至壹盞去滓空心溫服日午再服

治赤痢腹痛四肢羸困伏竜肝丸方

伏竜肝 艾葉炒 木香 地榆 阿膠炙

當歸切炒 黃連去須炒 赤芍藥 黃芩去黑心

壹兩炒 三十八炒 赤芍藥 黃芩去黑心

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九溫粥飲下不拘時

治暴赤痢如鵝鴨肝其痛不可忍黃連湯方

黃連去須炒 黃芩去黑心

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓熱服不拘時

治赤痢腹內疼痛無食子丸方

無食子 地榆各半 黃連去須炒 黃蘗去

皮蜜炙 酸石榴皮壹兩 下赤白痢吐瀉末

右五味搗羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子

大每服十五丸食前溫米飲下

治赤痢及赤白等痢茯苓丸方

赤茯苓去麤皮 當歸 黃連去須炒 黃蘗去麤皮各

壹兩 右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九空心米飲下赤白痢加阿膠末

壹兩

治諸痢久不差黃連丸方

黃連去須炒 烏梅肉炒乾壹兩半 亂髮灰汁去淨燒灰

三兩 右三味搗羅為末用蜜二兩半鍊熟入蠟

壹兩醋二合羊脂壹兩煎令蠟化入前藥

末於銅器中重湯熬令可丸即丸如梧桐

子大每服三十丸空心米飲下日再

治一切痢二黃丸方

黃蘗去麤皮壹兩 黃連去須炒壹兩半 羚羊角鎊 赤茯

苓去黑皮各半兩 右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心米飲下日再薑湯亦得

治赤痢兼大腸下血黃連散方

黃連去須炒壹兩 黃蘗去麤皮壹兩 赤芍

藥去須炒壹兩 右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心米飲下日再薑湯亦得

治赤痢兼大腸下血黃連散方

黃連去須炒壹兩 黃蘗去麤皮壹兩 赤芍

藥去須炒壹兩 右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心米飲下日再薑湯亦得

藥類

十七

黃連去須炒 黃蘗去蠱皮蜜炙 厚朴去蠱皮生薑汁炙 木

香各壹兩

右四味搗羅為散每服三錢七空心粥飲調下日午再服

治一切痢疾地榆湯方

地榆去須炒 檇皮去蠱皮炙 黃連去須炒 當歸切陳

橘皮湯浸去白炒 枳殼去瓢炒 桂皮去蠱 桔梗炒各

大腹皮一兩半 甘草炙到半兩

右壹十味麤搗篩每服五錢匕水煎蓋半

生薑五片煎至壹盞去滓空心溫服

治赤痢不止枳殼散方

枳殼 胡桃各七枚 皂莢不炒者壹挺

右三味就新尾上以草火燒令煙盡取研

極細分為八服每臨臥及二更五更時各

壹服荆芥茶調下

治赤痢腹痛紫蔘散方

紫蔘三分 肉豆蔻一分 烏賊魚骨二兩

右三味為細散每服壹錢匕食前溫米飲

調下

治因冷飲食變成赤痢黃連湯方二

黃連去須 桂去蘆皮 白芷一兩 赤石脂一兩

半肉豆蔻一枚煨 地榆壹兩 訶勒梨皮煨壹兩

黃芩去黑心 附子炮裂 皮當歸煨壹兩 黃

耆一兩 吳茱萸洗炒 一兩

右壹十二味剉如麻豆每加五錢匕水壹

盞半入生薑五片煎至壹盞去滓空腹溫

服日三

治赤痢腹痛或下純血六神湯方藥水壹

黃連去須 車前子各二 地榆 山梔子人

黃連炙 陳橘皮湯浸去白

右六味籠擣篩每服五錢匕以漿水壹

半煎至八分去滓空心服六分去滓不

治赤痢血痢

邪熱客於血脈之中腸胃虛弱血隨熱行流

滲腸間因便血下故名血痢其脈見虛小者

生身熱痰數者難治

治痢下鮮血茜根湯方

參茜根四黃連去須地榆各一兩山梔子入十洲

犀角屑壹分

右五味麤搗篩每服五錢匕入薤白香豉

各少許以水膏蒸半煎至六分去滓不拘

時溫服日再

治血痢腹痛芍藥湯方

赤芍藥黃藥去麤皮炙地榆各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以漿水壹

煎至七分去滓不拘時溫服

治血痢晝夜不止黃藥湯方

黃藥去麤皮炙黃連去須各二兩木香壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以水壹盞煎

至七分去滓食前溫服日三

治血痢茜根散方

茜根貫衆槐花陳者椿根剉甘草炙

右五味等分搗羅為散每服壹錢匕米飲

調下食前日再服

治一切血痢腹痛人參散方

人參三分肉豆蔻炮烏賊魚骨去甲各二兩

右三味搗羅為散每服壹錢匕溫米飲調

下食前

治熱血痢不定日夜頻滑地榆散方

地榆半兩酸石榴皮三分黃芩半兩枳殼去穢

麩炒赤石脂半兩牡草言兩

右六味搗羅為散每服二錢匕以米飲調

下食前

治血痢不止枳殼散方

枳殼七枚胡桃七枚皂莢半挺不

右三味都盛一新瓦上炭火燒令煙盡研

每服壹錢匕臨臥時用荆芥茶下二更三

更各壹服

治血痢腹中疔刺日夜無度通聖散方

大棗各七枚烏梅各七枚乾薑三兩如甘草壹尺

右四味搗篩為散每服壹錢匕水壹盞生

薑半棗大拍破同煎至六分去滓溫服

治血痢久不差臍腹刺痛肉豆蔻丸方

肉豆蔻壹兩 陳米壹兩 檳子壹兩

右三味先二味搗篩為麤散同米拌令勻

同炒黃色去米一分單炒壹分生用同焙

搗為末研粟米粥和搗為丸如梧桐子大

每服五十丸空心溫陳米飲下二服效

治血痢及婦人產後血痢葵子散方

冬葵子不以多少

右一味搗羅為散每服二錢匕入臘茶末

壹錢以沸湯七分壹蒸調服併三兩服差

治瀉血而痢烏金丸方

烏藥不以多少炭

右壹味搗羅為末陳粟米飯丸如梧桐子

大每服三十九米飲下

治丈夫婦人便血下痢地榆散方

地榆焙乾 礬石燒汁盡細

右二味搗羅為散用生猪肉二兩批開摻

藥一錢匕在肉上用炭火炙熟細嚼米飲下併兩服立効

治血痢不止方

木耳半兩燒作灰研細

右壹味以井華水壹盞調空腹頓服之

治腸胃虛熱血痢地榆散方

地榆酸石榴皮木賊各壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕煎訶梨勒

湯調下食前服

治久虛撮痛後重下血不止烏頭力方

烏頭生用去皮臍蛤粉各半兩

右二味搗為細末用麩糊為丸梧桐子大

用鹽豉湯下十五丸食前

治血痢腹中疝痛犀角丸方

犀角鎊地榆黃芩黃蘗去蘆甘草

一兩半茜根二兩栢葉炙三

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十九米飲下食前服

治藏毒下血藏府疔痛日夜五七十行及血痢甚者黃連飲方

黃連去須阿膠炙當歸切赤石脂各四兩附子

炮裂去皮龍骨白木各二兩煎至膏

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎至膏

煎至膏去滓溫服空心食前

治血痢黃連丸方

黃連去須龍骨炙禹餘糧炙醋伏龍肝各二兩

代赭碎乾薑各壹兩

右六味持羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十丸米飲下空心食前日二服

治血痢不止少腹疔痛艾葉飲方

艾葉焙當歸切黃連去須龍骨炙訶梨勒皮

右五味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服

治久患血痢訶梨勒散方

訶梨勒去核乾薑炮高良薑壹指節

去核炮乾薑炮壹指節

甘草炙壹寸白礬一塊燒灰如良薑一半大

右五味搗羅為散先喫好茶壹盞後用烏梅壹枚椎破以水一盞煎至六分調藥二錢匕微利即差

治血痢不止及積毒瀉血地榆湯方

地榆剉焙各壹兩醋石榴皮乾者半兩

右三味麤擣篩每服三錢匕漿小壹盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治血痢方右取榆水梅除核研壹枚合臘茶

急救仙方合好春茶末衛生易簡方和好茶末一二錢加醋湯沃服之壹服差

治血痢三物散方木下調藥取效不宜

胡黃連烏梅肉結竈派各等

右三味持羅為散每服二錢匕臘茶清調

下空腹服

治血痢日夜數十行葛粉飲方

葛粉各壹兩白蜜各壹兩

右二味相和新汲水四合調空腹服之

類聚百
三

治痢下膿血裏急後重腸中疼痛磨化虛積

丹砂礞石丸方

丹砂研末四錢青礞石研末二錢砒霜研末二錢

黃連三錢肉豆蔻二錢烏頭炮裂去皮臍

羅為末壹錢巴豆霜壹錢

右七味同研勻煮糯米粥和丸如麻子大

每服半丸溫熱水下臨寢服妊婦不宜服

治血痢不止蛇含散方

蛇含兩枚

右壹味煨醋淬十數度研如麵每服三錢

匕陳米飲調下兼止腸風瀉血婦人血傷

等

膿血痢

春傷於風邪氣留連夏為洞泄若遇熱氣乘

之則血隨熱行滲入腸中又與腸中津液相

搏積熱蘊結血化為膿膿血相雜故成膿血

痢秋冬診脾脉微瀼者是也其脉滑大或微

小沉細虛遲者皆生若懸絕或實急或數大

身熱者皆死

治下痢膿血羸瘦黃連丸方

黃連去須 龍骨 苦參 厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

熟艾葉炒 白礬熬令汁枯 甘草炙 陳麴炒 赤石

脂 乾薑炮各半兩

右一十味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大

每服三十丸空心米飲下

治膿血諸痢及痢後腹痛阿膠散方

阿膠炙令燥 龍骨 無食子各三兩 桃葉炒 栝

葉去梗焙 甘草炙 肉豆蔻去殼各

右七味擣羅為細散每服三錢匕米飲調

下不拘時

治下痢膿血腸胃虛滑米穀完出黃連湯方

黃連去須 乾薑炮 熟艾炒 附子炮裂去 阿

膠炙令燥 蜀椒去目并閉口炒

右六味剉如麻豆大每服五錢匕水壹盞

半煎至一盞去滓食前溫服

治久痢膿血木香散方

木香炮半兩 阿膠炙令燥壹兩半 訶梨勒炮去核壹兩 黃連去須各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢七空心用冷

粥飲調服

治伏熱下痢膿血貫衆丸方

貫衆剉一兩 黃連去須壹兩 板藍根 木香各半兩

黃連壹分 訶梨勒皮 肉豆蔻去殼各三分

右七味搗羅為末煮麴糊丸如梧椰子大每服十五丸煎甘草湯下不拘時

調藏氣止便泄下痢膿血臍腹疔痛虛氣痞

滿腸鳴裏急香連丸方

黃連去須三兩 地榆剉 赤石脂各二兩 鼈骨 阿

膠炙令燥 木香 赤芍藥 艾葉炒 黃芩去

心各壹兩 肉豆蔻去殼壹兩半 無食子三分

右一十一味搗羅為末煮麴糊丸如梧桐

子大每服三十丸米飲下不拘時

治膿血久痢腹內疼痛栢葉丸方

栢葉去梗 黃連去須 阿膠炙令燥 地榆剉 當歸各

兩半

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫米飲下不拘時

治膿血痢茱萸湯方

吳茱萸

湯浸焙

訶梨勒皮

當歸

切炒黃連

去須各

乾薑

炮半

右五味釐搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓食前溫服

治膿血痢食入即注下不安烏梅丸方

烏梅肉

炒

黃連

去須各

附子

炮裂去

皮乾

薑

炮二

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九食前米飲下

治膿血痢日久不差乾薑丸方

乾薑

炮

黃連

去須各

黃蘗

去須各

熟艾

炒

附子

炮裂去

烏梅肉

炒各

甘草

炙半

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九食前米飲下

治膿血下痢不禁女萎丸方

女萎湯洗七遍半夏焙各附子炮裂去皮藜

蘆去蘆頭

右四味搗羅為末陳醋煮沸和藥末為丸

如梧桐子大每服三丸陳米飲下日午再

服未止加至五丸

治久痢膿血日夜不止白礬丸方

白礬研鈆丹研礶砂研硫黃研各一分

右四味先入礬於瓷合子內次入硫黃礶

砂鈆丹覆之用瓦片蓋面文武火煨赤傾

地上候火氣絕再為末蒸餅丸如梧桐子

大每服十九米飲下

治下痢膿血不止茱萸丸方

吳茱萸湯浸乾薑炮訶梨勒皮各半胡

粉各一分白礬各一分

右五味搗初為末醋煮麩糊丸如梧桐子

大每服十九食前米飲下

治新久膿痢痢橡實散方

橡實二枚滿殼入蜜隨僧末灰火煨赤為末訶梨勒皮為末與前

等分分

右二味共研細分作五服每服用溫米飲調下空心食前服

治痢下膿血黃連湯方

黃連去須厚朴去籠皮生薑

右二味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半生薑二片煎至八分去滓溫服不拘時

治膿血痢二宜散方

黃連去須吳茱萸湯浸焙炒

右二味各搗羅為末每赤痢多用茱萸末

壹錢匕黃連末倍之白痢多即黃連末一

錢匕茱萸末倍之空心食前米飲調下

治膿血痢借氣散方

黃連去須生薑並細剉

右二味同用銀石器炒焦赤色去薑取黃連為細散每服二錢匕空心食前陳米飲

命下

治膿血痢困極木香散方

木香壹寸 壹塊方 黃連去須細 小食前刺米焙

右二味先將木香壹塊置銀石器中次下

黃連蓋之以水二盞同熬水盡取木香切

焙為散分三服第壹服甘草湯下第二服

陳米飲下第三服臘茶清下並食前服大

妙其黃連別搗末專治赤痢每服二錢七

陳米飲下

治膿血痢通神丸方

沒藥研 五靈脂研 乳香研各一錢 巴豆去皮心膜研出

右四味合研令勻滴水丸如粟米大每服

壹生木瓜湯下不拘時

治膿血痢腹痛滑泄胡粉丸方

胡粉令 阿膠令 烏賊魚骨去甲各 龍膏

白礬各壹兩 蜜隨僧 分林

右六味搗研為細末粟米粥丸如梧桐子

大每服二十丸空心食前粟米飲下

治膿血痢後重裏急日夜頻併赤石脂湯方

赤石脂炮裂去白芷去天雄皮黃連去厚朴去生薑汁

歸切焙各兩半肉豆蔻去桂去訶梨勒取木

到地榆白冰桂黃茶去黑心各半兩

赤石脂兩吳茱萸湯洗炒黃茶去黑心各半兩

右壹十五味剉如麻豆每服五錢匕水一

盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服空

心食前

赤石脂兩黃連去厚朴去生薑汁

赤白痢者由腸胃虛弱冷熱相乘客於腸間

變而為痢也蓋熱乘於血流滲腸內則赤冷

氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至

圓而不能便膿血相雜故謂之赤白痢重者

狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤麻薄

血狀如魚脂膿世謂之魚腦痢也

治赤白痢日夜不絕赤石脂散方

赤石脂兩龜骨煮阿膠煮地榆兩

厚朴一兩牛薑一兩香熟皮訶梨勒用皮煨當

歸壹兩剉乾薑壹兩炮裂剉黃連壹兩去須微炒

右九味搗羅為細末每服二錢匕以粥飲

常調下不計時日

治赤白痢及水穀冷熱氣痢白木丸方

白木三分赤石脂三分犀角屑三分乾薑半兩炮裂剉

厚朴壹兩去龜皮塗令香熟龍骨三分黃連壹兩去須剉炒

過烏梅肉三分當歸三分剉微炒甘草半兩炙微赤剉

右壹十味搗羅為細末鍊蜜和搗五百杵

未丸如梧桐子大每於食前粥飲下三十丸

治赤白痢冷熱相攻腹中疴刺疼痛龍骨阿

膠散方肉桂剉碎以水煎取汁當歸微炒

龍骨壹兩赤石脂壹兩厚朴去龜皮薑汁炙楮皮炙地

榆炙阿膠炙令燥中乾薑炙血銀耳炙

右六味搗羅為散每服二錢匕陳米飲調

下日三服

治氣虛冷熱不調臍腹疼痛下痢膿血日夜

頻滑四肢少力裏急後重不進飲食赤石脂

丸方

赤石脂 龍骨 白礬灰各二兩 胡粉研

蜜陀僧研 阿膠炙 烏賊魚骨炙

右七味搗研為末再同研勻以粟米飯和

左如梧桐子大每服二十九至三十九溫

米飲下食前服

治赤白痢久不止腹中疴痛及下血脫肛烏

梅散方

烏梅肉焙 樗根皮炙 赤石脂 當歸切地

榆炙 黃連炒 乾薑炮 甘草炙

右八味搗羅為散每服二錢北溫米飲調

下心食前服

治一切赤白冷熱下痢腹內疼痛赤地利塊

方

赤地利 阿膠炙 赤石脂各二兩 當歸切

乾薑炮 地榆炙 苦根炙 沐香炙

連炙 須炒 吳茱萸炙 胡椒炙 蘇合炙 燕麥炙

右九味搗羅為末以米醋二升入藥末壹

兩同熬成膏和丸如梧桐子大每服二十

丸食前温米飲下

治赤白痢訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核附子切作片用生薑汁煮令汁盡燕蕒人

瓦上炒熟黃連吳茱萸少許同炒陳橘皮湯洗去白

米醋浸右五味等分搗羅為末用漿水煮粟米飯

和為丸如梧桐子大每服三十九粒空心生

薑湯下日二

治冷熱赤白痢瀉血加減薑黃丸方

乾薑炮黃連炒參末瓜東肉為式或黍米

右二味等分各搗羅為末各用米煮麩糊

和丸如梧桐子大陰乾兩處收貯白痢冷

瀉每服乾薑三十九黃連十五丸同用温

米飲下赤痢瀉血黃連三十九乾薑十五

丸亦用米飲下赤白相雜者黃連乾薑各

二十九共服同用米飲下空心食前服未

愈加丸數取差為度

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

綠礬 白礬 石灰 鉛丹 四末同人鑊

放冷 龍骨 赤石脂 縮沙人 各半

右七味搗研為散更合研勻每服一錢匕

小兒半錢匕或壹字匕並米飲調下治腸

滑極有效作丸服亦得

治赤白痢久不差臍腹痛丹硫丸方

丹砂 硫黃 研各二錢 烏頭末 炒半錢 巴豆 一錢

皮心膜 砒霜 研半錢 麝香 研小許 蛤粉 二錢

右七味合研為細末用棗肉為丸如黍米

大米飲下壹丸

治赤白痢腸胃虛滑龍骨散方

龍骨 半兩 黃連 須去 牡蠣 煨各一兩 烏梅肉 焙乾三分

右四味搗雜為散每服二錢匕溫米飲調

下食前服

治赤白痢腹痛不止鉛丹丸方

鉛丹 半錢 丹砂 研二錢 巴豆 七枚去皮 杏仁 七枚

湯退去皮 乳香 研一錢 砒霜 半錢 如秋後不

火雙入研 錢半

右六味合研令勻細鎔黃蠟和丸如黃米
大每服三丸至五丸煎乾薑甘草湯下食
前臨卧

治赤白痢臍腹疼痛腸滑後重妙功散方

大黃濕紙裏煨半兩 芫荽子炒令黑官掬許

右二味搗羅為散每服壹錢匕米飲調下

治赤白瀉痢腹藏疼痛裏急後重并治痢氣

萬靈湯方

瞿子粟炒赤 甘草炙剉壹兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓臨卧腹空温服

治赤白痢橡實湯方

橡實殼炒 甘草炙 荔枝殼 石榴皮

右四味等分細剉每服半兩水壹盞半煎

至八分去滓温服

治赤白痢止瀉烏金丸方

巴豆二十一枚去皮 大棗青州者二枚去核

右二味每一枚棗入巴豆壹枚燒令煙出

絕以器覆之後搗研為細末更入輕粉二錢黃連末三錢燒陳粟米飯光如菜豆大每服五丸前獨掃湯下

治赤白痢礬石丸方

白礬四兩消石一兩君二味搗為末米醋拌和入罐子內埽頭閣起罐底將瓦片蓋口慢火燒熟置冷地上出火毒一夜研細用米醋浸炊餅心丸如梧桐子大每三十九空心米飲下夜起

類聚酒下

治赤白痢赤石脂丸方

赤石脂桑根白波制桔梗炒訶梨勒皮煨天雄皮龍骨各一白芷黃連地榆當歸焙桂皮厚朴生薑肉豆蔻香各一黃芩心乾薑各兩去兩右一十六味搗羅為末麵糊和丸如梧桐子大每服三十九米飲下

治赤白痢阿膠丸方

阿膠炙枳殼去穢梨勒煨甘草炙

乾薑炮芍藥地黃連去須木香壹半

當歸切地榆到各宜肉豆蔻對

右一十味持維為末用陳苦酒和丸如梧

桐子大每服二十丸米飲下食前

治赤白痢疼痛不止當歸湯方

當歸切厚朴去麤皮生阿膠炙芍藥炒

甘草炙黑豆炒草薷炮赤茯苓皮

三烏梅去核分九味細剉每服三錢匕水壹盞煎取七

帝分去滓溫服

治赤白膿血痢黃連散方

黃連去須龍骨各半赤石脂一兩厚朴去

薑汁人參三分乾薑炮地榆心黃芩去

右八味持羅為散空心粥飲下二錢匕日

再服

治赤白痢久不差取虛積輒紅丸方

丹砂

研半兩

粉霜

研半兩

砒霜

研半兩

硫黃

研細砂

消石

研各錢

輕粉

二錢

龍腦

研半錢

在入珠再同研勻細入去微心膜巴豆半

兩研勻用黃蠟半兩鎔作汁同和旋丸如

菘豆大每服三五丸至五丸溫漿水下

治赤白痢裏急後重黃連丸方

黃連

去須炒

龍骨

地榆

剉

訶梨勒

煨法

赤

石脂

各半兩

草豆蔻

去皮

一分

右六味搗羅為末水浸炊餅為丸如梧桐

子大每服二十九米飲下空心食前日三

服

治赤白痢臍腹痛及久水瀉白濁如米泔

馬蘭子散方

馬蘭子三錢地榆末艾葉炒各研赤石脂干當

歸

切焙各

龍膽

研

白茯苓

去

果

各

右七味搗持篩每服五錢化冰壺蓋茶煎

余塞八分去滓常服溫服

治赤白痢血多痛不可忍艾葉丸方

艾葉炒黃連去須木香壹半生肉豆蔻去

各三地榆阿膠炙當歸切各

右龍珠搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十九米飲下

治赤白痢疼痛不止甘草湯方白散米散

甘草炙地榆炙當歸切黃連去須芍藥炒

半大廿次米煨下空小食日三

右五味細剉每服三錢水漿水壹盞煎取

六分去滓溫服末煨米煨下空小食日三

治赤白痢龍骨黃連丸方龍骨炙黃連去須白石脂各一胡粉炒白礬炒

龍骨炙黃連去須白石脂各一胡粉炒白礬炒

熬令汁枯各二兩米煨下空小食日三

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九米飲下日三

治赤白痢香連散方香連去須木香壹丁香壹乾薑炮訶梨

黃連去須木香壹丁香壹乾薑炮訶梨

勒皮炒各壹米煨下空小食日三

右五味搗羅為散每服三錢匕陳米飲調

下日再木香

治赤白痢腹痛不止阿膠丸方

阿膠炒三兩黃連去須二兩當歸切焙胡粉研各壹兩

右四味搗研為末稀糊丸如梧桐子大每

服三十九食前米飲下

治赤白痢無問遠近黃連丸方赤茯苓

黃連去須黃蘗去皮當歸切焙赤茯苓去黑皮等分

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服四十九空腹飲下以差為度

治赤白痢萬全茯苓散方

赤茯苓去黑皮黃連去須阿膠炙黃蘗去皮等分

右四味搗羅為散每服二錢匕空腹甘草

湯下日再以差為度如三歲以下小兒每

服半錢匕五歲至十歲每服壹錢匕

治下痢赤白木香散方

木香 肉豆蔻去殼檳榔壹半生壹半乾薑

炮半兩

右四味搗羅爲散每服二錢半匕米飲調

下

治冷熱赤白痢疾吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙黃連去須赤芍藥各壹兩

右三味籠擣篩每服三錢匕水壹盞煎至

八分去滓溫服食前

治冷熱痢腹痛裏急和中散方

附子物七度水泮黃連去須各壹兩乳香壹兩

分

右三味如患冷熱痢取黃連附子各半錢

乳香一字以陳米飲調下未止再服以青

橘皮湯調下如患赤痢附子末半錢黃連

末一錢乳香一字如患白痢黃連末半錢

附子末一錢乳香一字米飲調下未止以

黑豆七粒煎湯止之

治冷熱痢甘草飲方

甘草大者二寸許烏梅五枚訶梨勒皮

五枚

右三味細剉用水壹盞煎取五分去滓壹
半冷服壹半熟服

治赤白痢并血痢梔子人湯方

山梔子人四七枚剉

右壹味以漿水壹升半煎至五合去滓空

心食前分溫二服

治赤白痢橘皮散方

陳橘皮湯浸去白焙冬瓜汁一合生薑汁一合

右三味合調令勻每服壹匙如赤多增瓜

煎汁白多增薑汁和白湯調下

治赤白等痢巴豆丹砂丸方

巴豆五粒去皮杏仁七粒去皮

右二味入丹砂壹錢同研極細以蒸餅為

先如菜豆大每服壹丸至二丸空心陳米

飲下

治赤白痢服諸藥不差者黑豆湯方

黑豆半升炒去皮揀甘草一兩半炙

右二味絲裹以漿水三升煎至壹升去滓

空心分溫二服

治赤白痢香連丸方

黃連去須木香各二

右二味搗羅為末以麵糊和丸如梧桐子

大每服五十丸空心陳米飲下日再服

氣痢人...

氣痢者由冷氣停於腸胃間致冷熱不調脾

胃不和腹脅虛滿腸鳴腹痛便痢赤白名為

氣痢治法宜厚腸胃調冷熱補脾氣則痢當

自愈

治氣痢久不止氣力困弱赤石脂散方

赤石脂三分乾薑一分厚朴一分龍

骨三分黃連一分白茯苓一分無食子二

右八味搗羅為散每服三錢匕空心米飲

調下日晚再服

治氣痢胃與大腸虛不能制晝夜無度漸令

人黃瘦食不為肌肉困重無力眼目多澀十

年不愈縮沙蜜丸方

縮沙蜜去皮肉豆蔻去殼黃連去須當歸二兩

切赤石脂去白陳橘皮酒浸宿

木六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大

每服二十丸空心溫漿水下日晚再服老

人及妊娠人並可服

治久氣痢不止或差或劇黃連丸方

黃連去須當歸切烏梅肉下訶梨勒炮

兩一

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十丸空心用薑製過厚朴煎湯下

而日晚再服

治氣痢久不止木香丸方

木香炮訶梨勒二兩

白二味搗羅為末用粥飲和此如梧桐子

大每服二十丸空心溫漿水下日再服

治氣痢久不差桃人丸方

桃人去皮尖雙人妙令安息香半兩別木

香兩訶梨勒煆去核

煆去核

艾息香

木

右四味將木香訶梨勒搗羅為末與二味

研了藥相和重細研入少許米飲為丸如

辟桐子大每服三十丸空心用煖漿水下

日晩再服

治積年冷痢日三五行脹悶腸鳴食不消化

面黃漸瘦厚朴丸方

厚朴

去蘆皮生薑

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去

訶梨勒

煆去核

白茯苓

去黑皮

蕪荑

微炒

阿膠

炙令熟艾

煆炒

胡粉

炒

黃石脂

赤白

烏

梅

去核

當歸

煆

蜀椒

去目并閉口炒

右壹十三味除膠艾二味外搗羅為末先

以米醋一升半於無風處煮艾水減約八

分絞去艾次下阿膠候消盡乘熱入藥末

和勻杵千百下併手丸如梧桐子大暴乾

每服空心用溫漿水下五十丸日午再服

治氣痢年深不差陳橘皮丸方

陳橘皮

酒浸去白

白茯苓

去黑

陟釐

微炒

麥蘖三分 熟白石脂四分 赤石脂三分 無食子三枚

燒令煙出 龍骨壹兩 酸石榴皮多黃

右九味搗羅為末用麩糊和丸梧桐子大每服二十五丸空心以溫漿水下日午再服

治冷勞氣痢久不差豬肝丸方

獾豬肝一具 去筋膜切作柳葉大蒜 煮令

熟大 穀二兩 烏梅肉一兩 桂一兩 皮厚朴去蘆皮 炙令乾 薑一兩 陳橘皮湯浸 梨一兩

勒去核 黃連去須炒 當歸切磨

右壹十味除豬肝蒜外搗羅為末將豬肝與蒜細研如麵糊入藥末和勻搗數百下丸如梧桐子大每服二十丸空心用熱麵

湯下日午再服

治氣止瀉痢霍亂厚朴散方

厚朴去蘆皮生薑汁 甘草炮 白芷下 乾薑

陳橘皮去白焙 吳茱萸

湯浸焙乾

右七味搗羅為散每服二錢匕凡氣不和
 鹽湯調下霍亂吐瀉煎木瓜紫蘇湯調下
 泄瀉米飲調下赤白痢甘草豆湯調下並食
 前

治氣痢泄瀉心腹疴痛木香散方

木香各壹沉香各壹桂皮各壹沒藥各壹胡椒各壹

肉荳蔻人枚當歸切焙壹分竜骨兩半赤石脂兩半

乾薑炮壹分附子炮裂頭皮壹分甘草多對壹分蜜壹分

僧分一

右壹十二味搗羅為散每服壹錢匕米飲
 調下食前服

治諸積瀉痢及暴氣瀉紅蠟壹分去去燕燕

丹砂極細粉霜各壹分硫黃各壹分巴豆去

取半兩兩不破者微用油炒熟湯洗去油拭乾

右四味同研如膏鎔黃蠟一兩半劑勻旋

丸黍米大米飲下二三暴瀉冰下赤痢

甘草湯下白痢乾薑湯下赤白甘草乾薑

湯下婦人血氣紅花酒下

治氣瀉不止木香丸方

木香湯浸去白丁香湯浸去白縮沙人肉豆蔻去殼各

訶梨勒皮湯浸去白木藿香葉各半赤石脂兩

右七味搗羅為末用麩糊和丸梧桐子大

空心食前米飲下十五丸

治冷勞氣痢腹脇疼痛水穀不消神驗丸方

陳麩炒吳茱萸湯浸焙乾黃連去須蕪荑

各一分

右四味搗羅為末薑汁和丸梧桐子大每

服十五丸溫米飲下食前

治諸氣痢不止木香丸方

木香湯浸去白肉豆蔻去殼縮沙人肉赤石脂各

右四味搗羅為末以棗肉和丸梧桐子大

每服二十丸溫米飲下食前服

治氣痢腹痛睡臥不安香艾丸方

艾葉湯浸去白陳橘皮湯浸去白

右二味搗羅為末酒煮爛飯和丸如梧桐

于天每服二十丸空心鹽湯下

治氣痢腹內虛鳴日久不差龍骨散方

龍骨黃連去黃蘗皮乾薑炮阿膠炙

人參二厚朴土產皮牛薑

右七味搗羅為散每服二錢匕空腹粥飲

下日再

治脾毒氣痢下血如鵝鴨肝腹痛不止地榆

湯方煎取汁地榆各半

地榆各半訶梨勒皮各一甘草炙歸切焙

兩栢葉 茜根 芍藥 赤茯苓去黑皮

右八味剉剉每服三錢匕水壹盞煎取六

分去滓溫服食前

又方胡黃連末用雞子白調作餅子炙令黃

用蜜塗炙令黃右壹味不拘多少搗羅為散米飲調下二

錢匕

治氣痢瘦弱諸療不損者蒼朮丸方

蒼朮去麩皮生黃連去當歸訶

厚朴去麩皮生

梨勒皮炒 乾薑炮各壹兩半 吳茱萸湯洗炒乾

艾葉炒三 龍骨炮裂去皮 附子各二兩

右壹十味搗羅為末米飲和衆手丸如梧

桐子大每服三十丸食前生薑湯下日卽

治氣痢不差疲劣變成冷勞痢烏梅丸方

又烏梅肉炒 豬肝令人葉以醋煮 荳蔻

皮厚朴去麤皮生薑 甘草炙 肉荳蔻法

當歸切焙 乾薑炮 葶藶切 訶梨勒皮炒各桂

去麤皮半兩 荳蔻法 荳蔻法

右壹十壹味搗羅十味為末用猪肝煎和

丸如梧桐子大每服二十丸米飲下陳麴

湯亦得

治氣痢腹脅虛滿腸鳴腹痛便下赤白地榆

飲方

地榆 樗皮 當歸切炒 黃連去須炒 陳橘皮

湯浸去白炒 枳殼去穢炒 桔梗 桂皮去麤 大腹皮

到甘草炙 各

右壹十味麴搗篩每服五錢匕水壹盞半

生薑壹兩大拍碎煎至八分去滓空心服
治氣瀉腹脹腹中虛鳴木香縮沙散方

木香二兩縮沙人壹兩枳殼去穢訶梨勒

皮各三兩右四味搗羅為細散每服壹錢匕空心以

陳米飲調下良久以食壓之不米飲調下

治脾胃虛冷兼腸間泄瀉變成氣瀉葦撥丸

方葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

葦撥十檳榔剉薑兩附子炮裂去

治氣痢并休息痢人參湯方

人參湯浸去黃連去須赤茯苓

去黑檉皮地榆當歸切五味子去黃

芩去黑皮枳殼去穰白木炒甘草炙桂皮去麩

大腹剉各壹兩右膏干四味麤擣篩每服五錢匕水壹盞

半入生薑一棗大拍碎煎至八分去滓空

心頓服十次治氣痢腹脹不下食肉荳蔻散方

肉荳蔻壹半生訶梨勒皮壹半生木香壹

生壹兩白木三分甘草壹半炙生菓撥

乾薑炮各半兩各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕米飲調下

治氣痢赤白不止下冷上熱橘皮丸方

陳橘皮湯浸去白乾薑木香枳殼去穰

麩芍藥各三兩桂皮去麩大黃各壹兩

右七味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九丸空腹煎生薑湯下日再

休息痢

腸中宿挾痼滯每遇飲食不節停飲不消即

乍差乍發故取名為休息痢治療當加之以

五十五

五十五

五十五

五十五

五十五

五十五

治飲消削陳寒痼積之劑則愈

治休息痢阿膠湯方

阿膠炙令燥黃連去須竜骨各一兩艾葉炒

倉米二合

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半

煎至八分去滓空心溫服日午再服

治休息氣痢久不差肉荳蔻丸方

肉荳蔻去殼訶梨勒煨去核烏梅肉炒乾各黃

連去須白礬熬令汁

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二十九空心用粥飲下或煎白梅生

薑湯下亦得更加丸數服

治休息痢不能食及羸瘦麥蘖丸方

大麥蘖炒附子炮裂去皮臍陳麴炒桂 烏梅

肉沙人參 白茯苓已上各

右七味搗羅細末鍊蜜為丸如梧桐子大

每服三十丸煮棗粥飲下不計時候

治休息痢諸藥無效黃丹散方

黃丹三兩炒棗肉三十枚擣為膏塊用紙

取枳殼半兩黃連半兩須改炒

右四味擣羅為末每服一錢空心粥飲調

下忌油膩冷物

治休息痢立效

栝樓一枚白礬壹兩白石英兩

右二味入栝樓中濕紙裏燒赤為度後冷

擣細杵為散每服一錢匕食前粥飲調下

治休息痢日夜頻併白茯苓五兩

白茯苓半兩黃連半兩黃蘗半兩羚羊角各壹兩

右四味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服空心以米飲下三十九日午再服

治休息痢縮沙丸水煎

縮沙去皮肉荳蔻去殼羊肝去筋

右三味具細切拌和令勻用麩和作餅子裏又以

常濕紙重裏於塘灰火內煨令香熟去焦

麩紙研細為丸如梧桐子大每服三十九

空心用米飲下日再服下大許里三十八

治休息痢及赤白痢附子丸方今許里三十八

附子炮裂去皮雞子兩枚去黃取白

右二味先將附子搗羅為末以雞子白和

為丸如梧桐子大一時頃入沸湯內煮數

沸漉出分作兩服米飲下空心日午各一

服別本小以米為下三十八日午再服

治休息痢黃連湯方驗審味或取許里大

黃連去須炒竜骨各半艾葉一握阿膠炙令

兩息痢別本以米為下三十八日午再服

右四味細剉三味以水三盞先煎黃連等

三味至壹盞半去滓次下阿膠再煎至一

盞分為二服空心一服如人行十里再壹

服每服藥後濃煎乾艾葉湯飲之亦佳

治休息痢玉液丹方大棗二兩黃芩七兩

白礬二兩熬硫黃消石

右三味於乳鉢內相和研作末却入砂瓶

子內以炭火鎔成汁取出候冷更研令細

用麵糊爲丸如菘豆大每服半丸空心米
飲下兼治腸風痔漏諸疾

治休息痢紫金散方

定粉研 鈆丹各一兩 大棗二兩去核 葇荑子一兩

訶梨勒炮去核

右五味相和搗成一團以麵重裹於火中

燒令煙盡取出去灰土令淨搗羅爲散每

服三錢七空心米飲調下早晚再服

治休息痢脾胃氣虛冷大腸轉泄或發或止

飲食減少四肢無力沒石子散方

沒石子半兩 肉豆蔻半兩 桂心半兩 訶梨勒一兩

皮厚朴一兩 薑汁炙令香熟 龍骨壹兩 麝香一分

右七味搗羅爲末每服壹錢匕粥飲半盞

調下食前服之

治休息痢發歇不定經久不差硫黃丸方

硫黃一兩 砒黃壹兩 何首烏壹兩 白礬壹兩

右四味相和研令勻入薤子中五月五

日取不食井冰和六一泥固濟封頭候乾
安甌子向火中燒令通赤候冷取藥細研
以麵糊和丸如菉豆大患近者黃連湯下
久老橘皮湯下壹丸

治休息痢久不差四霜丸方

巴豆霜半錢 百草霜二錢 粉霜一錢 砒霜

半錢 乳香末二錢

右五味再研細令勻用黃蠟半兩銕汁和
為丸如菉豆大每服一丸新汲水下食前

治一切休息痢日夜不止四體倦怠黃芩丸

方

黃芩去黑心 砒霜三錢 烏梅肉乾 黃蘗各

右四味搗研為末鍊蜜和丸如菉豆大每

服五丸冷水下

治冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫

暖脾胃及治冷滑下痢不禁虛羸縮沙丸方

縮沙蜜去附子皮炮裂去乾薑炮厚朴

薑湯浸陳橘皮白燒肉荳蔻去殼

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服三十丸米飲下食前服或茶豆大研

治下痢乍差乍發病名休息丹粉丸方

丹祿粉霜膩粉白粉白礬

灰三消石研砒霜研伏火者二錢

右七味再研研勻用水浸軟餅心為丸如

蠶豆大每服三丸冷麪湯下看虛實加減

治多年休息痢疾四神丸方

當歸切焙烏梅七枚黃連去須龍骨半

右四味搗羅為細末以薤白細研和丸如

梧桐子大每日空心以溫漿水下十五丸

至二十丸

治休息痢當歸丸方

當歸炒黃連去須烏梅去核各等

右三味搗羅為細末以生蒜汁和眾手丸

如梧桐子大焙乾每服三十丸空心煎厚

朴湯下加至五十九

治休息痢金石散方

石灰

鉛丹

各一分

糯米

壹合炒黑

右三味將前二味慢火炒一炊久入糯米

同研令細每服二錢匕空心陳米飲調下

治

凡下痢膿血間雜瘀黑有片如雞鴨肝與血

皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之

氣襲人經脉漸至藏府毒氣挾熱與血相搏

客於腸間如病蠱注之狀故名蠱痢也

治蠱痢下血如雞鴨肝片腹痛煩悶地榆湯

方

地榆

剉

犀角

鎊

黃連

去須微炒

柏葉

微炒

黃蘗

皮炙

當歸

剉

黃芩

去黑心

生乾地黃

焙

赤

地利

右九味蠱痔節每服三錢匕以水壹盞煎

取七分去滓溫服不拘時候

治蠱痢下血如雞肝疼痛桔梗散方

桔梗

去蘆頭

犀角

鎊等

右二味搗羅為散酒服一錢七日三不能

自服者即灌之藥下心中當煩須臾自靜

七日乃止可食豬脾以補養之

治時疫蠱毒下痢黃連散方

黃連

去須

白礬

燒令

乾薑

炮裂去

附子

皮臍各

三分

右四味搗羅為細散每服一錢半匕溫酒

調下空心日午服

治蠱痢下血如雞肝腹中疔痛難忍茜根飲

方亦二和

茜根

升麻

犀角

鎊

桔梗

去蘆頭

黃芩

去蘆頭

黃蘗

去蘆皮

地榆

各三分

白蘘荷

各壹

兩

各壹

煎至七分去滓空心日午服

治藏府傷動腸胃虛弱血滲腸間風冷相乘

大便下血瘀黑有片或五痔腫痛久下膿血

者蝟皮丸方

蝟皮一具切當歸續斷黃耆 連翹

大槐實乾薑附子炮裂快白礬飛生

乾地黄五右一十味同搗羅為末鍊蜜和凡如梧桐

子大每服五十九空心食前米飲下

治歲時蠱痢黃蘗丸方

黃蘗去餘皮黃連去須各黃芩

右二味搗羅為末飯飲為丸如梧桐子大

每服三十丸空心米飲下日午再服

治蠱毒痢如鵝鴨肝腹痛不可忍黃芩湯方

黃芩去心黃連去須各黃芩

右二味細剉以水二盞煎取壹盞去滓空

心日晚乘熱服冷即凝

治蠱毒痢下血片臍下痢刺痛升麻湯方

升麻去心地榆去心黃芩去心犀

角兩山梔子二七枚黃芩壹兩犀

右六味籠搗篩每服五錢匕水一盞半入

生地黃壹分切薤白三莖切豉三七粒同

煎服

類聚

卷之

六十七

煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治中蠱下痢日數十行方寸匕一匙半入

巴豆十四枚去皮藜蘆去蘆頭芫青去翅附

子炮裂去白礬熬令枯黃芩去黑心

右五味搗羅為末和勻以絲裏藥置大瓦

許內下部中日三四次

久痢水二盞煎取壹盞去滓空

久痢不差則穀氣日耗腸胃損傷濕氣散溢

肌肉浮腫以胃土至虛故也蟲因虛動吐蝕

於膈則嘔逆煩悶下蝕腸中則肛門瘡爛久

而不差變成疳蠱或下赤汁水血相半腥不

可近是謂五藏俱損而五液雜下此為難治

治久痢經年不差雲母散方

雲母粉 白伏苓去黑皮附子炮裂去皮龍

骨赤石脂各半

右五味搗羅為細散每服壹錢匕溫酒或

米飲調服日三夜壹

治痢積年不差厚朴湯方

厚朴去蘆皮生薑汁炙 乾薑炮 酸石榴皮炒 阿膠

炒 黃連須去 艾葉炒各

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治久痢不止地榆丸方

地榆膏 龍骨去 赤石脂去 無食子炮 熟艾

微炒各 黃蘗去蘆皮三分 橡實殼炒

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下不拘時

治積年痢困篤腸極滑醫所難療乾薑湯方

乾薑炮 黃蘗去蘆皮 阿膠炒 酸石榴皮炒

兩 薑切 甘草炙

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時

治下痢數年不止桂附丸方

桂去 附子炮裂去皮 黃蘗去蘆皮 黃蘗去 陳

麴黃 乾薑炮 麥蘗炒各 吳茱萸湯洗焙 蜀

椒去目取閉口 烏梅肉炒

右壹十味詩羅為末鍊蜜和光如梧桐子

大每服二十丸米飲下

治久痢不止脾胃虛弱食飲不消化腹鳴疝

痛茯苓丸方

白伏苓去黑皮陳麴炒一兩赤石脂三分黃連

去須附子炮裂去皮人參半斤黃蘗皮乾

薑炮當歸切龍骨各三分甘草炙

右壹十壹味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二十丸米飲下不拘時

治久痢密陀僧丸方

蜜陀僧白礬陽起石伏火砒伏

龍肝赤石脂各半

右六味搗令細入瓶瓶中鹽泥固濟以文

火養三日後煨令通赤候冷重研極細水

浸蒸餅和丸如梧桐子大每服三丸煨生

薑湯下空心日午夜臥服

治久下痢赤白不止吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾薑炮黃連去須訶梨勒皮

白礬灰 各半

右五味搗羅為末醋煮麵糊和凡如梧桐

子大每服十九粟米飲下食前服

治久痢金星鱗散方

金星鱗 醋 白礬 各半 鈎丹 兩

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲調下

食前

治腸虛久痢天仙散方

天仙子 兩 鈎丹 各二 大棗 三十枚去核三

味同搗作餅子

炭火燒通赤入地坑出火毒為末 訶梨勒皮 壹兩 赤石脂

半兩燒過細研

右五味為細散和令勻每服二錢匕米飲

調下食前服

治腸滑久痢神效無比黑神散方

醋石榴 一枚劈破炭火簇燒令煙盡急取

毒○永類鈐方

右壹味搗為散每服用醋石榴一瓣以水

一盞煎湯調下二錢匕 壽域神方衛久漁生易簡方同

亦治

治一切赤白痢久不差乾薑散方

乾薑

槲白皮

薑汁炙五度膏兩

右二味搗羅為散每服二錢匕空心食前

溫米飲調下

治久患滑泄下痢龍骨丸方

龍骨

壹兩煨醋淬三五度

白礬灰

兩

鉛丹

炒黑

米泔

右三味搗羅為末麩糊為丸梧桐子大每

服十九丸臘茶清下不拘時服

治諸般痢多年不差日夜百十行不止抵聖

丸方

木香

黃散

此散

名

丹砂

兩 硃砂

半錢

右二味以巴豆二七粒和殼用黃蠟半兩

煎候黑煙起良久取出把豆殼內揀取一

七粒好者去殼先將丹砂硃砂於乳鉢內

同研令細後方入剝了巴豆共研令勻用

煎者蠟一小塊更同熬令勻作一劑如有

患者旋丸如黍米大先用艾湯下三丸取

出積聚澹轉一兩衍並不搜攪疼痛後以

冷水空心下三九即差合口一續服

治泄痢久不止方人陳丁巴豆共研合口

生薑切沙糖各壹兩以酒醃過紙內

布二味以三重濕紙裏煨五更初都作一

服以臘茶嚼下二十餘味連服數日

治久痢不沉困急墮訶梨勒散方

訶梨勒地取木香去地黃連須地榆各半吳

茱萸湯浸焙不蓋日百十不止淋坐

右五味搗羅為散每服三錢匕沸湯調下
食前服

治久痢不差將變疳蠱虛積丸方

硫黃 水銀二味同巴豆去皮心不去油

兩壹礞石搗碎硃砂研各

右五味再同研勻以好醋和令得所先作

一地坑如茶盞大深四指淨火煨通赤去

灰火用醋紙襯攤藥在內椀蓋土焙一宿

取出候乾麵糊為丸如小豆大每服二丸

或三凡生薑棗湯下

治久痢不止或赤或白煨薑莧方

馬齒莧細切生薑二兩

右二味和勻用濕紙裏煨熟不拘多少細

嚼米飲嚥下

治新久瀉痢龍骨湯方

龍骨不桑根白皮赤石脂天雄炮裂

臍厚朴去麤皮生薑汁炙麻黃去節根各壹兩半白芷

黃連去須地榆桂皮當歸切木香白

朮去殼訶梨勒皮煨各壹兩黃芩去黑心半兩肉荳蔻

右壹十六味剉如麻豆每服三錢匕水一

盞入生薑一棗大切煎至六分去滓溫服

下痢裏急後重

下痢裏急後重者有痕聚也經所謂大瘕泄

者裏急後重數至圜而不能便莖中痛是矣

法當和冷而祛蘊滯則脾胃和平飲食腐化

其膿血自消大腸自固也

治裏急後重下赤白痢及下部疔痛當歸散

方

當歸切焙黃連去須炒乾薑炮黃蘗去蘆皮蜜

下右四味搗羅為散每服三錢匕濃煎烏梅

汁調下空心食前日二服若腹中疔痛加

當歸下赤加黃連下白加乾薑

治後重下痢赤白滯下腹內結痛當歸黃連

湯方

當歸切焙黃連去須炒赤茯苓去黑皮地

榆雨犀角屑三甘草炙厚朴去蘆皮生

右七味麤搗篩每服五錢匕水壹盞半人

生薑脣棗大拍碎同煎至八分去滓空心

常溫服日再下服未白痢煎至八分去滓空心

治大病後重下赤白痢腹中疔痛石鍾乳湯

石鍾乳別研黃連去須炒防風去附子炮

黃蘗去蘆皮當歸切焙乾薑炮蜀椒

去皮

去皮

去目并閉口者
炒出汗半兩

右八味除鍾乳外剉如麻豆再同和勻每

服四錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服

空心食前廿二服

治冷熱不和下痢赤白臍腹作痛裏急後重

聖功散方

乾薑炮 五倍子各一兩 訶梨勒煨去核 甘草炙

各半

右四味搗羅為細散每服二錢匕食前米

飲調下

治腸虛冷熱不和赤白下痢裏急後重訶梨

勒湯方

訶梨勒煨去核 草豆蔻去皮炒 延胡索各半乾

薑炮壹分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓食前溫服

治後重下膿血如聖散方

臭橘 革薺各壹兩

右二味同搗碎炒令煙出放冷搗羅為細末每服二錢至三錢匕茶清調下

治藏氣不調裏急後重勻氣湯方

蒼朮米泔浸一宿去皮切暴乾厚朴去籠皮生薑汁炙各四兩甘草

生剉乾薑三分

右四味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

六分去滓食前溫服夏末秋初最宜服

治冷痢裏急後重當歸丸方

當歸切焙胡椒炒壹兩黃連去須厚朴去麤皮

炙各二兩阿膠炙燥管兩乾薑炮壹兩半

右六味除阿膠搗羅為末用好醋調阿膠為膏和劑丸如梧桐子大每服十五丸食前橘皮湯下加至二十九

治腹痛虛滑裏急後重心脅痞悶逆滿或傷

冷暴瀉手足厥冷脉息沉伏訶梨勒丸方

訶梨勒炮去核肉豆蔻去殼白礬熬令汁

木香半兩龍骨兩烏頭炮裂去縮沙人

右七味搗羅為末粟米粥和為丸如梧桐

子大每服二十九食前粟米飲下

治藏寒下痢臍腹撮痛腸鳴脹滿裏急後重

不思飲食日漸羸瘦勝金丸方

黃連去須龍骨四兩草豆蔻去皮赤芍藥當

歸切乾薑地榆橡實各三乾桑葉

木香各二赤石脂代赭煨赤研

右壹十二味搗羅為細末醋煮麵糊和丸

如枳桐子大每服二十九至三十九煎艾

醋湯下空心食前服

治洞泄殄泄裏急後重薑桂散方

乾薑地三甘草一兩二味用沙糖二桂

去篩皮一分兩水微化開同炒乾

右三味搗羅為散每服二錢匕白湯調下

兼治腹痛止虛渴

治膿血雜痢後重疼痛日久不差通神丸方

沒藥 五靈脂 乳香各一巴豆霜半

右四味各研細再同研勻滴水丸如黃米

大每服七丸煎生木瓜湯下小兒三丸隨

歲數加減空心食前服

治下痢赤白日久不差裏急後重取冷積玉

粉丸方

白丁香

直者研粉霜

研三分

硫黃

研膩粉

硃砂

研各半兩

乳香

露過研膏分

右六味再同研勻用生薑自然汁煮棗肉

研和作劑每服旋丸如豌豆大臨卧煎生

姜棗湯下七丸未動次夜服十九老少以

意加減

治下痢赤白裏急後重大腸虛滑丹砂丸方

丹砂

研

草烏頭

末

乳香

研各壹錢

巴豆

大者去皮

心研七枚

右四味再同研令勻細用醋煮麵糊和丸

如梧桐子大每服一丸冷乳香湯下不拘

時候

治下痢腹脹裏急後重木瓜飲方

乾木瓜

焙

白芷

厚朴

去麤皮生薑汁炙

白朮

炒

木香

各一兩

桂皮

去麤

黃連

去須

當歸

炙縮沙蜜

去龍骨一兩訶梨勒皮兩半陳橘皮去白

分杏仁去皮尖雙入赤石脂兩

右一十四味籠擣篩每服五錢匕以水一

盞半煎取八分去滓溫服

痢兼渴入消渴一水

痢不差則腸胃虛弱津液減耗不能止潤於

咽嗑故口舌焦乾而內煩使人引飲飲多則

濕氣滯溢肌肉虛浮而痢亦不差也

治下痢冷熱相衝藏府氣不和順本求下虛

津液耗少口乾咽燥常思飲水人初不許飲

水毒氣更增煩躁轉甚宜急與湯飲救之不

得令至過度止渴栝樓根湯方

栝樓根剉甘草炙白茯苓去黑皮

右三味籠擣篩每服五錢匕水壹盞半麥

門冬壹分去心棗二枚擘破同煎至七分

去滓不拘時溫服

治久痢食即嘔吐煩渴不可忍烏梅湯方

烏梅肉兩炒半黃連去須炒白茯苓去黑皮黃

芩去黑龍骨各半訶梨勒炮去核厚朴去

皮生薑汁阿膠炙令燥右八味麤擣篩每服五錢匕漿水壹盞生

薑三片同煎至七分去滓空心溫服日午

再服

治痢後渴不止石膏丸方各半

石膏別研麥門冬去心栝樓根去茯苓去

知母焙黃連去須枸杞根皮與白茯苓去

壹胡粉炒黃色

兩

右九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下晚食前再服或作散冷熱水調二錢匕服亦得

治泄痢藏府虛燥煩渴不止黃芩湯方

黃芩三分石膏碎甘草炙枳殼去穢黃

藥去麤女萎剉栝樓根剉白茯苓去黑皮

檉皮去麤淡竹葉各三分

右壹十味麤擣篩每服五錢匕水壹盞半

煎至壹盞去滓空心溫服未止再服小兒

量大小服之

治泄痢上膈虛熱煩渴引飲口瘡不下食困
劣人參湯方

人參

白茯苓

去黑皮

木香

麥門冬

去心焙

葛根

剉前胡頭去蘆

梔子人

黃耆

剉陳橘

皮

湯浸去焙

訶梨勒

炮去核各一兩

半夏

湯洗七遍

甘草

炙剉

右壹十二味麤搗篩每服四錢匕水壹盞
半生薑三片陳米壹合同煎至七分去滓

空心溫服且晚再服

治下痢煩渴黃連丸方

黃連

去須炒

當歸

切焙

烏梅肉

炒半

右三味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每
服三十丸空心米飲下且晚再服痢甚者

鎔蠟為丸服

治熱痢黃膿發渴四肢煩悶黃連丸方

黃連

去須一兩半

黃芩

去黑心

黃蘗

去麤皮各二兩熟艾

葉

炒壹兩

在四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大
每服二十九空心飯飲下日晚再服蒸艾

治痢兼渴麥門冬湯方取四兩煎取半升

麥門冬去心一兩半烏梅七枚

右二味用水二盞煎取壹盞去滓煖溫二

服空心晚食前服煎取八分餘隨下水

治吐痢後大渴飲水不止陳米湯方

陳廩米二合水淘淨

右壹味用水二盞煎至壹盞去滓空心溫

服晚食前再煎服

治痢後渴糯米汁方元符盛羅下外皆息正

糯米二合

右壹味以水壹盞半同研絞取汁空心頓

服之林野青木香

下痢兼腫芡菜黃蒸艾

下痢身體浮腫者久痢所致也痢久則胃氣

弱而腸虛胃者土也所以化水穀而充肌肉

若胃土氣衰不能勝濕則水氣妄行流溢皮

膚故癩而兼腫也得小便利者乃愈
 治夏月暴冷忽壯熱泄痢引飲變而身滋腫
 脉沉細小數澤漆湯方
 澤漆炒壹兩半 吳茱萸湯洗焙乾炒 赤茯苓去黑皮
 木之桔梗炒 當歸切焙 犀角鎊 青木香 海藻洗去鹹 大黃炒 空
 右半十一味剉如麻豆每服以水二盞煎
 藥五錢匕取八分去滓溫服下後消息五
 六日可與女麴散

治利後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫

亦消女麴散方

女麴二兩 乾薑炮 剉辛去苗 椒目微炒 附子炮裂

去皮桂各青兩

右六味搗羅為散酒服一錢匕不知加至

三錢匕日三若婦人產後虛滿服此大良

治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血澤漆湯方

澤漆葉微炒五兩 桑根白皮炙令黃 郁李人湯

去皮尖炒 杏人湯浸去皮尖及 人參各一

白木剉陳橘皮湯浸去白

右七味麤擣篩每服五錢匕水二盞入生

薑三片煎取八分去滓溫服後半時辰再

服取下黃水數升或小便利為度

治下痢後脾胃虛弱不能制輸水氣致身腫

脹滿桑白皮湯方

桑根白皮炙黃赤炙苓炙黑都炙棗炙

去皮尖炙陳橘皮湯浸去白海藻洗去鹹

研各二兩赤小豆升炒澤炒芩炒小炒野炒麻炒五炒甄

右六味麤擣篩每服五錢匕用水一盞半

煎取八分去滓溫服日三

治痢後徧身浮腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮白木剉防已剉黃芩去黑

心射干剉澤瀉各三兩桑根白皮炙澤

漆葉切微炒一兩

右八味麤擣篩每用五錢匕先以小三盞

煮大豆膏合取二盞去滓內藥煎取壹盞

分為二服未差頻服兩料

治下痢體腫香菽散方兩味

大豆炒熟撻去黑皮用一合

右一味搗羅為散用粥清調一錢匕服日

二

治虛勞下痢心胃壅悶喘促四肢腫滿細辛

飲方

細辛去苗葉防己去皮桂去皮當歸切炒各半兩枳

殼去穢炒白木去皮赤茯苓去黑皮赤芍藥各三分

黃耆剉一兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治痢後四肢浮腫喘息促急坐臥不安小便不利防已湯方

防己去皮豬苓去皮桑根白皮剉赤茯苓去皮

皮各三分海蛤湯浸去殼陳橘皮白焙檳榔煨紫蘇

用莖木通剉各兩木香剉各兩白木各半兩

右一十壹味麤搗篩每服三錢匕以水壹

盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不拘

時

治下痢後虛損臍下痛四肢浮腫木香湯方

木香湯浸去皮尖五加皮湯浸去皮尖桑根白皮剉檳榔煨桃

人湯浸去皮尖郁李人湯去皮尖松節剉

薏苡人湯浸去白陳橘皮湯浸去白

右九味麤擣節每服三錢匕以小壹盞煎

至六分去滓不拘時候稍熱服

治痢後四肢浮腫麻人湯方剉附子炮裂去陳

大麻人剉商陸剉防風去附子皮

橘皮湯浸去防已各一

右六味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞

半入赤小豆一百粒同煎至八分去滓食

前服

痢後脫肛

下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣壅滯至圍不

能便極力於下肛門脫出故謂之脫肛溫其

藏則愈古方有坐湯溫熨之療皆良法也

治肛門不收裏急後重磁石散方

磁石

火煨醋淬 去麤皮 蝟皮 一枚炙

燕右三味搗羅為末每服二錢匕米飲調下

治瘰癧後脫肛蝟牛散方

蝟牛 三七枚 燒 磁石 火煨醋淬 一兩 細研

蝟牛

三七枚 燒 磁石 火煨醋淬 一兩 細研

右二味重合研如粉每服二錢匕空心米

飲調下白午再服

治痢後脫肛菘菔散方

菘菔子

炒黃 鼈頭 一枚 鐵精 半兩

調下日晚再服仍將藥末少許裏肛上炙

故麻履底按入即不出

治瀉痢日久脫肛疼痛黑聖散方

大蜘蛛

一枚用瓠子葉兩重裹以線繫 定合子內燒令黑色勿太過

右壹味細研入黃丹少許研勻每先用白

礬葱椒煎湯洗浴拭乾後將藥摻在輭帛

子上將手掌按托上肛頭即不下

治冷熱不和下部痛裏急後重虛滑或結澀

腸頭脫出 礶砂丸方

礶砂

飛壹兩

硫黃

研

白礬

研各壹分

研各壹分

研各壹分

已上三味同研勻用萊菔壹枚重五兩者

割開留元蓋子剝作坑子填土作末在內

將瓦蓋用竹簽定以麩劑十五兩裹了開

地坑子一枚方一尺鋪馬糞厚三寸安麩

毯在上更以馬糞蓋之上發火燒候麩黑

即止去麩將萊菔藥爛搗如膏更入後藥

肉豆蔻

去殼

葫蘆巴

各半兩

訶梨勒皮

一分

附子

炮裂以

補骨脂

炒各壹兩

茯苓子

一分

右六味搗羅為末通前藥膏同搗滴少好

酒和納令勻丸如梧桐子大每服十五丸

至二十丸空心食前溫米飲下

治洞泄肛門脫出豬肝散方

豬肝

一片切慢

黃連

去須

阿膠

炒令

芎藭

各一兩

烏梅

取肉二兩

艾葉

半兩

醋炒

二兩

二兩

二兩

右六味搗羅為散每服二錢七溫酒調下

白米飲亦可食前日再服

治肛門脫出壁土散方再照

故屋東壁上土五合皂莢三枚各長四指不

右二味搗羅土為細末傅肛頭取皂莢炙

暖更互熨入則止此方同前

治脫肛不收蒲黃傅方右用蒲黃壹味以豬

脂和傅肛上手按抑令入日二三愈

治積冷下痢脫肛枳實熨方枳實壹枚石上

磨令滑澤鑽安柄子密塗炙令煖熨之於

更易之肛縮入即止

疔瘻

疔有五種久變為蟲蠶一曰白疔令人皮膚

乾燥而無潤澤之氣二曰赤疔令人毛髮焦

枯三日蟻疔令人腰脊強重四曰疔蠶令人

下部攣急背強不能俯仰五曰黑疔患者必

死令人五藏俱損或下瘀血此蓋腸胃虛弱

嗜甘味過度致脾氣緩弱穀氣衰微榮衛虛

損腸間諸蟲因虛而動蟲蝕於上則手足煩

疼心中懊懣嘿嘿不欲飲食腰脊無力食不

知味精神恍惚夜夢顛倒喉咽生瘡齒斷黯
 黑損爛膿血俱出胃氣逆則變嘔噦下蝕腸
 胃便痢膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開
 漸至危殆
 治久患疳痢不差元子礬散方
 元子礬燒研黃連去須各白礬燒研龍骨研雲
 母粉研各一桂皮去龍麝香研各無食子七
 右八味搗研為散空心生薑汁調下三錢
 匕日再服

治積疔疳痢羸瘦面色萎黃方

硫黃研黃連去須艾各煮蜜壹合

式右四味以水二升先煮黃連艾取半升後
 內硫黃末更煮三五沸絞去滓又內蜜更
 煮三五沸分三服

治疳痢久不差羸瘦欲死方

新出羊糞升

右壹味以水壹升漬經宿明且絞汁頓服
 之至日午唯食煮飯極重者不過三服差

治久痢赤白并濕諸疾五皮湯方

槐皮剉桃皮剉樗根剉白皮剉柳皮剉棗皮剉

各以患人手把外截實握

右五味細剉用米二盞煎至一盞去滓空

治急溫服米全再服

治久痢變疳下部生惡瘡惡寒壯熱白湯

方六和以水二升大煮取艾二升代

桃白皮剉槐白皮剉各切苦參切熟艾三

五合者大棗十枚

右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽壹棗許大攪令勻取二升灌下部餘分三服

治久痢成疳灌洗方

樗根白皮壹握檉絞取汁三合大麻油熬

取時勿令見風日車酢二合及四合出汁二

右五味以水五升先取椒鼓煎絞取汁二

升和樗汁麻油酢淀等三味分爲兩分用

壹分灌下部隔一日更取餘者復灌其藥

溫川唯得食煮飯葱白爛煮蔓菁芥等五
六十日外以鹿脯下飯

治丈夫婦人小兒久痢成疴百方不瘳方

丁香 麝香 研黃連 去須各一分

右三味搗研為散每以一錢匕取竹筒吹
入下部小兒量度減之不過三四止差

治疴痢不止方

苦參 甘草 剉雄黃 各二兩

右三味搗羅為細末先以水五升煮葱白

五寸豉壹合蜀椒三十粒至三升入藥末

三撮於汁中候冷熱得所先飲少許豉汁

則食壹日飯乃側卧徐徐灌下部訖多時卧

其不出為佳大急乃出之於淨地常有疴濕

蟲如白馬尾頭黑是其效也若重者肛大

難差當取桃枝條裹頭浸煎作藥汁適寒

溫烙之近脊點烙壹上三十度乃差

治久痢成疴便下白色食不為痢膚石榴丸

方

石榴^子 橡實 附子^{地裂去皮} 無食子^{瘡各二兩}

四厚朴^{去蘆皮生薑汁炙} 乾薑^{炮各壹斤} 附子^洗

右六味博羅為米飲和衆手如煎梧桐

子大每服三升丸食前生薑湯下日再服

濕蠶^{以風乾其皮}

凡下痢不止或時氣之餘為水濕所乘客於腸胃令九蟲皆動侵蝕府藏故為濕蠶之病所謂蠶者蟲動於匿而難知故也謂其蟲因濕而動故名濕蠶其證上則蝕唇口下則蝕

肛門生瘡注瘡是蠶蝕五藏令人煩懊懷

下瘡生瘡是蠶蝕下部谷入肛門傷爛若胃

虛氣逆則變為嘔噦甚即府藏被傷齒上下

斷皆生瘡齒色黯黑是其候也下痢出瘀血

者不可治

治濕蠶痢不止蕪夷此方

蕪夷人^散 吳茱萸^{湯洗} 乾薑^{炮各} 枳殼^去

麩^炒 黃連^{各三}

若五味搗羅為末煮漿水飯和丸如梧桐

予大每服立升九空心中米飲下

治濕蠱痢蕪黃連丸方

蕪黃人微炒黃連去須炒薑半兩冰凍

治右聖味搗羅菴末鍊蜜和九如梧桐子大

每服五九空心食前煖米飲下加至七九

治疳蠱蝕下部苦參湯方

苦參四兩青箱子各壹兩甘草炙熊膽各半兩

右四味除熊膽外羅搗篩每服四錢匕水

煎至八分去滓入膽米分攪和空

心頓服日午再煎服之

治濕蠱痢蝕下部參連湯方

苦參壹兩黃連去須炒阿膠炙令燥

右三味羅搗篩每服五錢匕水壹盞半煎

至八分去滓空心溫服日晩再服

治疳濕蠱蝕口齒及下部青箱子散方

青箱子壹兩苦參壹兩甘草生剉各壹兩

右三味搗羅為散每服壹錢匕食前煖生

地黃汁調下

治痢濕膿下部瘡爛黃連湯方

黃連去須四兩熟艾炒二兩苦參各三槐白皮各三

右四味細剉如麻豆大每服五錢匕水二

盞煎至八分去滓溫服重者不過三劑

治疳蝕人下部通見五藏痢下膿血舉體

不安徧身疼痛面無顏色手足虛腫苦參散

方

苦參各半礬石熬令汁盡青箱子各半藜蘆壹分

右四味搗羅為散每用二錢匕置竹筒中

吹下部日三二度小兒只壹錢匕

治疳蝕下部上攻移熱殺蟲豬膽煎方

豬膽壹枚米醋五合

煎右二味煎醋令百沸入膽汁更三五沸滿

飲之蟲死即差取門蟲隨衣眼日晝水

治疳蝕無問所在皆治之方右取死蝦蟆燒

灰研末以油和塗瘡上

治疳蝕人諸處但是赤血痢久不差用之即

差方

蝦蟆

壹枚五月五日採燒灰研

金銀土鍋

人屎灰

方一

云髮灰麝香

研銀末

小豆不

右五味搗研為末每用少許傅瘡上即差

治痢者吹下部

治疔濕墜下赤黑血肛門蟲蝕赤爛日夜疼

痛熏黃散方

雄黃

研丹砂

食塩

研青黛

丁香

礬

石

熬令汁鐵衣

梔子

人參

麝香

研各

砒子

細辛

去土瓜根

乾薑

炮

甜葶

麤

紙上

葛蒲

蝦蟆

蜀椒

去目及閉

故靴底

燒灰研

天靈蓋

枯腐者

右壹十九味搗研為散每用壹錢匕以絲

裏內下部中日再易有瘡即傅其上

治疔濕墜洗熨下部丁香散方

丁香

壹分麝香

犀角

錫

甘草

到各

右四味搗研為散以鹽椒各三合豉二合

水三升都煎至壹升去滓乘熱用絲蘸洗

熨下部冷即再煖用

治疔濕蟻殺蟲青箱子散方

青箱子 雄黃研 硫黃研 蕪荑人 雷丸

各半 苦參各三 狼牙分 藜蘆分 蘆頭

右八味搗研為散以絲裏膏錢七內下部

中日再易之

治下部疔蟻瘡經年不差丁香散方

丁香 青黛研 黃連須 木香 石灰研 蚌

蛇膽各半 麝香細研

右七味搗研為散每用半錢匕傅瘡上日

三兩易

必用全書

瀉痢證

通草散錢宅治因伏暑下血如久痢方其原

云余崇寧二年自太府出為發運由夏及秋

患痢兩月一日一夜三四十次然血多白少

名醫皆曰此痢也聞泗州青陽鎮李中和助

教善醫即遣人召之中和至看脈即曰此非

痢也始甚怒之徐叩之李曰血多白少小便

澁少即非痢其言中余之病心已神之乃是
 舊因伏暑小便傳導入大腑由心經而過遂
 化為血由大腑而下故其狀似痢而非痢也
 相冷大小便各歸本臟四十六
 木通通草各半澤瀉分茯苓二錢少用
 右件剉如大米粒或為細末既到時即每
 服釋三錢水一盞煎至七分溫服若細末
 即每服抄二錢依前法煎食後口中夜臥
 一服便佳必用之
書同

三神圓澤宜以煎林外

光圓草烏頭不光并尖長者不用以三箇

介火炮裂為一料內一箇火燒存性一

味右並為細末麵糊丸如梧子大人服十

丸或十五丸小兒三丸或五丸白瀉冷水

下赤痢煎甘草湯候冷下白痢煎乾薑湯

候冷下赤白相間煎乾薑甘草湯下並空

心食前服忌熱物熱湯須候冷方可食仍

忌魚鮓雞肉腥膩等物必用之
書同

拔粹方檢... 瀉痢證... 如病瀉而惡風增寒是太陰傳少陰也若用
 除濕白朮茯苓安脾芍藥加官桂被血黃連
 也大腸經氣不宜通宜加檳榔木香上焦不
 和治以生姜橘皮中焦不和治以芍藥當歸
 茯苓官桂下焦不和寒微以輕熱藥熱甚以
 重寒藥如大便虛滑久不愈以陰傳少陰為
 痢為賊邪宜以厚朴枳實湯治之

白朮散治四肢懶倦小便不利大便走沉困
 飲食減少

白朮芍藥 茯苓 各等分

右為末水煎 如發熱或惡熱或腹不痛

而脉疾加黃芩為主 如未見膿血而惡

寒乃太陰而傳少陰加黃連為主桂枝佐

之 如腹痛甚者加當歸倍芍藥 如見

白膿加黃芩為主 如見血加黃連為主

桂枝當歸佐之

肉荳蔻丸治腎洩久不愈脉沉細無力者效

破故紙炒肉荳蔻麩裏煨血瓜黃散各等分生

右為末棗肉為丸桐子大米飲茶空心服

槐花散治血痢久不愈腹中牙痛不裏急後

重而利寒厥背脊冷生肌散各等分未具顯血而惡

青皮木槐花各等分荆芥穗各等分蘇合香丸各等分

右為末水煎空心熱服南北經驗方

常歸導氣湯治膿血痢無度小便不通腹中

痛木通各等分四逆散各等分小蘇不寐火動去式因

當歸錢一甘草錢半芍藥錢一青皮錢七槐花錢七

生地黃錢一酒浸陰乾一兩水煎○麻子錢一

右為末水煎食前溫服如後重加木香

檳榔各三分澤瀉半錢如小便利去澤

瀉瀉

泄痢證

黃芩芍藥湯方見衛生寶鑑

大黃湯治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重

日夜無度久不愈者方見衛生寶鑑

芍藥湯

方見衛
生寶鑑

白朮黃耆湯服前藥痢疾雖除更宜此和之

黃白朮

黃耆

甘草

三錢一方無黃耆用黃耆半兩

右咬咀均作三服水煎服清

防風芍藥湯治泄痢殮泄身熱脉弦腹痛而

渴及頭痛微汗

防風木芍藥黃耆黃芩已上各壹兩木香

右咬咀每服半兩或一兩水煎○袖珍方

右咬咀每服壹兩水二盞煎至清盡去滓

通和服食前

白朮芍藥湯治太陰脾經受濕水泄注下體

重微滿困弱無力不欲飲食暴洩無數水穀

不化宜此和之

白朮

芍藥

各一兩

甘草

五錢

右剉每服壹兩水煎

蒼朮芍藥湯治痢疾痛甚者

蒼朮

芍藥

各二兩

黃芩

袖珍方

桂

各五錢

右剉每服一兩水煎○袖珍方右咬咀每

服壹兩水三盞煎至一盞去滓通日服食

前

柯子散如腹痛漸已泄下微少宜止之

阿子皮青熟各半木香半兩黃連三錢炙甘草三錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下

如止之不已宜歸而送之也阿子散內加

厚朴一兩竭其邪氣也玉機微義同

黃連湯治大便後下血腹中不痛者謂之濕

毒下血

黃連各半當歸各半炙甘草二錢

右咬咀每服五錢水煎○袖珍方右咬咀

每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

食前

芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之

熱毒下血

芍藥 黃連 當歸各半 大黃一錢 淡味佳

半錢○袖珍方二錢炙甘草二錢

藥方

右咬咀每服五錢水煎袖珍方每服壹兩水二盞煎至壹盞

去滓通口如痛甚者調木香檳榔末壹錢

服之

導氣湯治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥兩壹錢當歸五錢大黃二錢半○袖珍方壹錢黃連壹錢

黃芩二錢半○袖珍方木香各壹錢檳榔各壹錢

右為末每服五錢水煎○袖珍方右咬咀

每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓通口服

食前

加減平胃散方見衛生寶鑑

地榆芍藥湯治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮八兩地榆二兩卷柏三兩芍藥三兩

右咬咀每服一兩水煎病退止○袖珍方

每服一兩水二錢煎至壹盞去滓通口服

食前

五泄之病胃小腸大瘦三證皆以清涼飲子

主之其泄自止厥陰證加甘草以緩之少

陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明

二證當進退大承氣湯主之太陰證不能食也當先補而後泄之乃進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎一三服泄又未已如稍進食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未止為腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利過泄

未止去芒硝後稍熱退減大黃壹半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃與枳實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

對金飲子治濡泄

平胃散錢五五苓散二錢半草豆蔻麩裏煨熟半兩右相和勻作四服生姜三片棗二枚水煎