

醫方類聚卷之九十

諸疝門二

聖惠方

治七疝諸方

夫七疝者痲疝癥疝寒疝氣疝盤疝附疝狼  
疝若痲逆心痛足冷飲食吐逆不下名曰痲  
疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癥  
疝因寒飲食卽脇下腹中盡痛名曰寒疝腹  
中乍滿乍減而痛名曰氣疝腹中痛在臍傍



名曰盤疝腹中痛在臍下有積聚名曰附疝  
小腸與陰相引而痛大便艱名狼疝此皆由  
血氣虛弱飲食寒温不調之所生也

治七疝忽心腹氣逆不得息痛引背脊或臍  
下堅痛遇冷即極若小腹虛滿引膀胱裏急  
宜服川椒丸方

川椒一兩去目及閉口者微炒去汗桔梗半兩去蘆頭細辛半兩

厚朴一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟赤芍藥半兩乾薑半兩

炮裂附子半兩炮裂去皮臍川烏頭半兩炮裂去皮臍檳榔

榔壹兩

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸  
如梧桐子大每於食前以生薑橘皮湯下  
二十九

治七疝諸寒臍傍痛上攻胃中滿悶少氣烏  
喙丸方

烏喙半兩炮裂去皮臍乾薑一兩炮裂木香一兩細辛

厚朴一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟木香一兩細辛

赤芍藥壹兩桂心壹兩川椒壹兩去目及閉口者微炒去汗柴



胡壹兩赤茯苓兩半檳榔兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵凡

如梧桐子大每於食前以溫酒下十五丸

治七疝氣臍腹堅痛宜服烏頭丸方

川烏頭一兩炮裂去皮臍蓬莪茂一兩木香一兩川大

黃壹兩剉當歸微炒芎藭壹兩京三稜一

炮川椒壹兩去目及閉桂心一兩桃人一兩

去皮尖雙人肉荳蔻半兩乾漆壹兩擣碎

麩炒微黃右件藥擣羅為末先以醞醋一升入藥末

四兩熬令減半又漸入醋壹升熬成膏次

入餘末和擣三二百杵丸如梧桐子大每

於食前以生薑湯或煖酒下二十九

治七疝四肢寒冷臍下妨痛不欲飲食宜服

草荳蔻丸方

草荳蔻壹兩厚朴壹兩去麤皮塗生附子

壹兩炮裂藁香子壹兩白朮壹兩桂心壹兩乾

薑壹兩剉青橘皮壹兩湯浸芎藭壹兩川烏

頭壹兩炮裂木香壹兩吳茱萸壹兩湯浸七

去皮臍木香壹兩吳茱萸壹兩湯浸七

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每於食前以熱酒下二十九

治七疝氣心腹結聚疼痛宜服吳茱萸丸方

吳茱萸

壹兩湯浸七遍焙乾微炒

木香

壹兩檳榔

壹兩訶梨

勸

壹兩煨川大黃

一兩剉碎微炒

赤茯苓

壹兩烏喙

壹兩

炮裂當歸

壹兩剉微炒

赤芍藥

壹兩枳殼

去皮

微炒

桂心

壹兩

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每於食前以熱酒下二十九

治七疝臍腹堅硬時有疼痛宜服芫花丸方

芫花

壹兩醋拌炒令乾

川烏頭

壹兩炮裂去皮臍

青橘皮

壹兩

湯浸附子

壹兩炮裂去皮臍

乾薑

半兩炮裂剉

去白

瓢焙附子

壹兩炮裂去皮臍

乾薑

半兩炮裂剉

右件藥擣羅為末入巴豆膏都研令勻以

醋煮麴糊和丸如菜豆大每服食前以温

酒下三九

治寒疝諸方

夫寒疝者由陰氣積於內則衛氣不行衛氣



不行則寒氣盛也故令惡寒不欲飲食手足厥冷繞臍痛白汗出遇寒即發故云寒疝也其脉弦緊者是也

治寒疝腰痛胃中冷氣上搶心脇支滿不得卧面目痛風寒悸悼多驚不能食食已即嘔寒熱往來宜服吳茱萸丸方

吳茱萸三分湯浸七半夏七分湯洗細辛  
壹兩紫苑壹兩去甘草半兩炙附子壹兩炮  
兩旋復花半兩前胡壹兩去乾薑三分炮  
兩蘆頭去乾薑三分炮人

參三分去熟乾地黄壹兩赤茯苓壹兩當歸三分  
剉碎赤芍藥三分白朮壹兩桂心壹兩訶梨勒壹兩  
半用木香壹兩  
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時候以生薑湯下二十丸

治寒疝腹中痛手足逆冷身體疼痛針灸諸藥所不能任者宜服烏頭散方

川烏頭大者十枚炮桂枝二兩芍藥四兩甘草二兩附子壹兩炮

右件藥擣細羅為散每服二錢以水壹大盞入生薑半分煎至五分次入蜜半合更煎三兩沸令熟每於食前和滓溫服之

治寒疝亦名陰疝亦治飛尸走馬散方

巴豆二枚去皮膜 杏仁二枚去皮

右件藥以絲纏輕搥令碎用熱酒一中盞

浸良久服之聖濟總錄投熱湯二須臾即合絞取白汁服之

差如未差即更服有尸病者宜稽此藥用

必大効

治寒疝腹痛飲食不下喉中噎塞宜服此方

立効

川椒半兩去目及閉口者 乾薑半兩炮裂剉 桂心半兩

右件藥以水三大盞煮取二錢去滓內牛

蒡子末一兩又煎一盞三分去滓分溫三

服

治寒疝來去每發腹中疝痛方

吳茱萸一分湯浸七分 生薑半兩切 豉半兩

右件藥以酒壹大盞煎至六分去滓分溫



二服○肘後方吳茱萸三兩生薑四兩豉  
二合酒四升煮取二升分爲二服

又方吳茱萸半兩湯浸七桂心壹兩

右件藥擣篩爲散每服二錢以水壹中盞

煎至六分去滓食前溫服○肘後方肉桂

壹斤吳茱萸半升水五升煮取壹升半分

再服

治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死方

丹參壹兩

右擣細羅爲散每服以熱酒調下二錢肘後

同方

治寒疝心痛諸方

夫寒疝心痛者由陰氣積結所生也陰氣不  
散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣  
上衝於心故令心痛也

治寒疝心痛悶絕宜服木香散方

木香壹兩高良薑半兩赤芍藥半兩赤茯苓半兩

芎藭三分乾薑半兩炮陳橘皮半兩湯浸訶

梨勒半兩煨 草荳蔻三分 枳殼半兩 微炒

牽牛子三分 微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治寒疝心痛及諸虛冷氣滿悶宜服當歸散

當歸壹兩 乾薑一兩 炮甘草半兩 炙赤

芍藥一兩 厚朴二兩 去麤皮塗生黃耆一兩

川椒壹兩 去目及閉半夏壹兩 湯洗

一兩去 枳心兩 青橘皮一兩 湯浸

炮裂去皮 附子一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治寒疝心痛如刺繞臍腹中盡痛白汗出氣欲絕方

川椒一分 去目及閉附子一兩 炮裂乾薑



半兩炮裂判兩半夏半兩湯洗甘草半兩炙桂心微赤判

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入粳米半合生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食宜服此方

蓬莪茂壹兩胡椒半兩附子壹兩炮裂芎藭三分

桂心一分白朮三分

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下一錢

又方高良薑一兩當歸壹兩判桂心壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下壹錢

又方桂心二兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下壹

錢衛生易簡方同

治寒疝心腹痛諸方

夫寒疝心腹痛者此由腑藏虛弱風邪客於

其間與真氣相擊故痛其痛隨氣上下或上衝於心或在於腹皆由寒氣所作所以謂之寒疝心腹痛也

治寒疝心腹痛四肢不和面色青冷不欲飲食氣漸羸弱宜服白朮丸方

白朮壹兩 乾薑半兩 炮青橘皮壹兩 湯浸當歸半兩 剉芎藭半兩 木香半兩 山薑三分 厚朴一兩 去麤皮裂 薑汁炙令香熟 桂心兩 附子一兩 去皮臍裂 草薺一兩 去皮

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二杵百丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸

治寒疝心腹痛不下飲食痛甚引脇肋間及腹裏急者宜服當歸散方

當歸壹兩 剉乾薑半兩 炮羊肉半斤 陳橘皮壹兩 湯浸白朮一兩 葶芩兩

右件藥除羊肉外搗篩為散以水五大盞合煮取兩大盞半去滓不計時候稍熱服



壹小蓋

治寒疝心腹痛脅支滿不能下食木香散方

木香三分 檳榔壹兩 赤茯苓壹兩 人參壹兩 去壹兩 當

歸壹兩 桂心壹兩 前胡壹兩 去壹兩 青橘皮壹兩

湯去 白瓢焙

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中蒸入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服聖濟總錄每服三錢匕水一蓋煎七分去滓溫服不拘時

治寒疝心腹痛如刺不下飲食白汗出氣欲絕椒附散方

川椒半兩 去目及閉附子壹兩 炮裂檳榔

一兩 葛壹兩 裂到白木壹兩 青橘皮壹兩 湯浸

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中蒸

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治寒疝心腹痛及脇肋裏急不下飲食宜服

高良薑羊肉湯方

高良薑

壹兩 剉

赤芍藥

壹兩 剉

當歸

壹兩 剉 微炒

羊肉

壹斤半

肉

剉

桂心

兩

存什藥除羊肉外搗碎以水五大盞都煮

取兩盞半去滓不計時候稍熱服壹小盞

治寒疝心腹痛胃脇支滿食食不下宜服芎

藭丸方

芎藭

壹兩

川椒

壹兩半 去目及閉

防葵

壹兩

白

薇

壹兩

桂心

兩

白朮

壹兩

吳茱萸

壹兩 湯浸七

乾薑

壹兩 剉

川烏頭

壹兩 炮裂

去皮臍

裂

裂

裂

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服生薑橘皮湯下三十九

日四五服

治寒疝心腹痛面目青黃不下飲食縱食嘔

逆肌體羸瘦宜服吳茱萸丸方

吳茱萸

半兩

湯浸七

赤茯苓

半兩

乾薑

半兩

剉白朮

兩

桂心

兩

甘草

半兩

半夏

壹兩

七編赤芍藥

壹兩

前胡

壹兩

蘆頭

去

川椒

壹兩

口者微

常歸

壹兩

陳橘皮

壹兩

湯浸

附

附



類聚方

子一兩炮裂 人參壹兩去 木香壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服以生薑湯下二十九日四五服

治寒疝胷脇支滿食飲不下寒中心腹痛及吐利背項強急不得俛仰甜瓜子散方

甜瓜子壹兩 桂心一兩 白芷壹兩 白薇半兩 川椒半兩 去目及閉半兩 乾薑半兩炮 吳茱萸半兩 芎藭壹兩 川烏頭壹兩炮裂 防葵半兩 乾微炒

當歸壹兩到 木香壹兩

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服以生薑湯下二十九日四五服

不治心疝諸方

夫疝者痛也由陰氣積於內寒氣不散上衝心故使心痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或陰陰而疼或四肢逆冷或唇口變青皆其候也

治心疝心腹痛如錐刀所刺宜服木香散方

木香壹兩羌活壹兩檳榔壹兩桂心壹兩青橘皮壹兩

湯浸去白瓢焙蓬莪茂壹兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調

下二錢

治心疝心腹中疴刺疼痛脇下滿脹宜服赤

芍藥丸方

赤芍藥壹兩桔梗壹兩去壹兩細辛壹兩桂心壹兩川

椒壹兩去壹兩及壹兩汗壹兩乾薑壹兩裂壹兩附子壹兩裂

去皮壹兩木香壹兩檳榔壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服以熱酒下三十九日四

五服

治三二十年心疝神驗方

射干壹兩吳茱萸二兩湯壹兩七

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每

服以粥飲下五丸日三服藥勢欲盡乃可

喫熱食良



治心疝心腹痛宜服牡丹丸方

牡丹壹兩 桂心一兩 川烏頭一兩炮裂 木香一兩

吳茱萸一兩湯浸七 檳榔一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如菜豆大每服以溫酒服十九日四五服

治心疝心腹中疔刺疼痛不可忍朱砂丸方

朱砂半兩 桂心半兩 附子一兩炮裂 麝香半兩

細研桃人皮半兩湯浸去雙 巴豆二十一粒

紙裏壓去油

右件藥擣羅為末以麪糊和丸如梧桐大  
大每服以醋湯下二丸

治心疝心腹痛四肢逆冷面色青黑宜服桃

人丸方

桃人湯浸去皮尖雙 沒藥 安息香 乳

香 麝香細研 木香 桂心 吳茱萸湯浸

焙乾微炒已上各壹分

右件藥搗羅為末都研令勻用蒸餅和丸

如小豆大不計時候以煖酒嚼下二十九

治心疝心腹中如錐刀所刺疼痛方

巴豆半兩附子壹兩去皮臍川烏頭壹兩去皮臍

乾漆三分擣碎桃人三分湯浸去皮尖木

香兩檳榔半蓬莪茂三分

右件藥先以巴豆附子烏頭等三味以水

煮一日久取出各去皮巴豆去心膜一處

擣如泥諸藥別擣羅為末相和巴豆等入

醋麩糊和丸如棗豆大不計時候以醋湯

下五丸

治心疝心腹內攻刺疼痛腹脇虛脹宿食不

消或時吐逆少思飲食方

朱砂言兩細研半夏壹兩湯洗川烏頭半

去皮臍生用

右件藥擣羅為末醋煮麩糊和丸如小豆

大不計時候以生薑橘皮湯下五丸

治寒疝積聚諸方

夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風

邪搏於腑藏寒多則氣澁氣澁則生積聚也

類聚方

十一



積者陰氣也五藏所生始發不離其部故上  
 下有窮也聚者陽氣六腑所成也故無根本  
 上下無所留止但諸藏腑受邪初未能為積  
 聚邪氣留滯不去乃成積聚其為病也或左  
 右脇下如覆杯或臍上下如臂或胃管間覆  
 大如杯羸瘦少氣或洒淅寒熱四肢不收飲  
 食不為肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄遇  
 寒即痛故云寒疝積聚也其脉駛而緊積聚  
 也浮而牢者積聚也牢強急者生虛弱急者

死

治寒疝積聚動搖大者如鼈小者如杯乍來  
 乍去在於胃管大腸不通風寒則腸鳴心下  
 寒氣上搶胃脇支滿宜服芫花丸方

芫花 二兩醋拌炒令乾 椒目 壹兩 半夏 半兩易洗川

大黃 壹兩剉碎微炒 細辛 兩壹 桔梗 半兩去 川烏頭

壹兩炮裂 赤芍藥 兩壹 赤茯苓 兩壹 桂心 兩壹 吳

茱萸 半兩湯浸去 木香 兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

類聚丸  
廿七

如梧桐子大每服以温酒下七九日三服  
當下如泥其病即愈

治心腹牢强寒疝邪氣往來堅固積聚苦寒  
煩悶不得眠卧夜苦汗出大便堅小便不利  
食不生肌宜服桔梗丸方

桔梗壹兩去甜葶蘆壹兩去藜蘆壹兩去  
炙朴心兩一厚朴壹兩去麤皮塗生附子兩一  
炮裂去杏人五十枚湯浸去皮當歸兩一  
皮臍炒鼈甲一兩塗醋炙川大黃一兩剉  
微真去裙襖

軟搜和作劑旋丸如小豆大每服壹丸新  
水送下小兒丸如黍米大量虛實用之  
九仙丹治一切積氣

京三稜煨大戟五靈脂酒研淘杏仁皮  
硃別巴豆膜右等藥為細末用豆豉為丸如梧桐子大  
每服七丸空心温水下看病大小加減丸  
數活人書名黑神丸治傷寒食積  
三稜丸治五積六聚七癥八瘕破一切血下



一切氣

大黃紙裏 硃砂 三稜煨乘乾漆炒至巴

豆去皮油 各壹兩

右為末醋煮麪糊丸如菜豆丸每服三丸

或五七丸隨人虛實加減服餌並空心米

飲湯下

玉抱肚治停寒痼冷心腹刺痛選百一

針砂四兩鐵錘內炒用竹木棒不 白礬膏

硃砂錢 粉霜錢

間濕痒抓成瘡

醫方大成集成南北經驗方 袖珍方永類鈐方衛生易簡

方瘡

吳茱萸去枝硬壹斤四兩用酒浸四兩用

便浸各浸醋浸四兩用湯浸四兩用童子小

右為末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服五

拾圓空心食前塩湯或酒瑞竹堂方簡吞

下玉機微 ○是齋方又云馮仲柔云頃年

某倉使家傳因令局中合賣紹熙壬子冬

余親曾得效時苦奔狔寒氣攻衝小腹引

類聚方十

十八

痛四日只壹服臟腑微動痛若失去遂安  
 壹方名星斗元湯浸者用塩小浸澤瀉用  
 四兩切作麤片酒浸一宿澹寮方同施圓端效  
 方治膀胱小腸疝氣硬痛不可忍陳君澤  
 瀉壹兩吳茱萸壹斤酒浸四兩水浸四兩醋  
 乾兩右為細末酒糊為丸如梧子人每服二  
 十九溫酒送下空心服痛發時壹併三服  
 茱萸內消圓治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏  
 結成寒疝陰癰偏大土攻臍腹疔痛膚囊腫

張永類鈐方此下有小腸或上瘡瘍時出黃  
 水腰腿沉重足脛腫滿行步難辛服之內消  
 不動臟腑一方此下云方無枳實陳皮  
 白蒺藜炒去刺川烏炮去皮尖山茱  
 萸搗去核取食茱萸壹兩肉桂去麤皮  
 方桂心壹兩吳茱萸湯洗七次焙乾炒青  
 橘皮去白茴香船上者為淨妙桔梗水浸壹  
 出慢火炒令乾各貳兩醫方大成集成  
 南北經驗方袖珍方鈐方水浸壹兩成集成  
 大腹皮酒浸海藻洗淨五味子揀玄胡索



類聚九十

各貳川練子剉炒木香宣兩桃仁去皮尖  
兩半者麩陳橘皮去白○得枳實去穢炒各  
方二兩半得效方無

右為末酒糊圓如梧桐子大温酒下叁十  
圓食前服鈐方又云壹本○得效方又云  
木脊流氣飲兼服效

三白散治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大  
小便不利

白牽牛貳兩○朱氏木通去節陳皮白桑白

皮微白朮各半

右為細末每服貳錢薑湯調下醫方大成

經驗方袖珍方空心服玉機微未覺再進

永類鈐方同常服導利留滯不損藏氣○集驗

衛生寶鑑同方云此藥不損臟氣只導利留滯疝方大

率多用熱藥此方唯壅熱證宜服之三因

效方

葫蘆巴圓治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚  
氣疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下來去

類聚方

三

痛不可忍或絞結遶臍攻刺嘔惡悶亂並皆治之

葫蘆巴炒一斤 茴香淘淨炒拾貳兩 ○玉吳

茱萸湯洗七次 大巴戟去心 川烏炮去皮

川練子炒壹斤貳兩 ○南北經

右為末酒煮麵糊為圓如梧桐子大每服

拾五圓微義每服十 空心溫酒下衛生寶鑑同

小兒茴香湯下五圓得効方同又方加牽

類鈞 ○直指方治腎經虛冷膀胱氣痛或方同

陰腫偏墜或小腹有物如卵上下走痛葫

蘆巴炒 川練子蒸去皮核 川烏炮去皮 大巴

戟去心各兩 茴香炒叁兩 吳茱萸半酒半醋浸

兩牽牛炒取末 右為末酒麵稀糊圓桐子

大每貳拾圓空心溫酒送下

三因方

諸疝證治

疝之為病隨臟氣虛實感傷外邪寒泣風散

暑鬱濕著絞刺擊搏無有定處倉卒之際痛



類聚方十

三十一

不堪忍世人稱為橫弦豎弦膀胱小腸氣賊風入腹等名義不同證狀則一寒則溫之風則散之暑則利之濕則燥之各有成法

大烏頭桂枝湯嚴氏濟生方名烏頭桂枝湯治

風寒疝腹中痛醫方大成逆冷手足不仁身體

疼痛灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五

臟拘急不得轉側發作叫呼陰縮悉主之

大烏頭五枚實者去皮尖蜜壹大盞煎減

者桂心得効方肉芍藥各三錢三字○大

錢廿餘一分壹錢

右為判散每服四大錢水壹盞半薑五片

大棗三箇入前煎烏頭蜜半合大成半呷

匙半同煎至七分盞去滓食前服一法用附

子一箇不使烏頭為蜜附湯醫方集成南

珍方鈴方與大成同微義○濟生方大烏

頭貳兩半桂心不見白芍藥各叁甘草貳

兩右段阻每服四大錢水二盞生薑七片

棗一枚入蜜半匙煎至七分去滓食前溫

類聚九十

二十三

服

倉卒散治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣絞刺脾腎氣攻擊急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子四十九箇燒半過。附子二枚炮

方一

右為末得效方每服二錢水壹盞酒半盞

煎至七分入塩一捻温服即愈得效方又云暑證香

薤散加瞿麥木通每服四錢食塩少許煎服

葱白散治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻刺疼痛及治婦人產前產後腹痛胎不安或血刺者兼能治血藏宿冷百骨節倦疼腹瘦怯弱傷勞帶癖久服盡除但婦人一切疾病最宜服之

川芎當歸枳殼麩炒厚朴薑製官桂

去青皮永類鈐乾薑炮茴香炒川練鈐方

肉神麴炒麥蘖炒三稜炮蓬朮醋浸一人

參 茯苓 芍藥 木香炮 乾地黃各壹



右爲末

醫方大成集成袖珍方  
鈴方玉機微義吹咀

每服三錢

水一盞葱白二寸煎七分入塩少許熱服

大便秘澁加大黃煎大便秘利加訶子煎

食前服

失笑散治小腸氣痛及婦人血痛心腹絞痛

欲死十餘日百藥不驗

五靈脂

蒲黃

炒等分○得效方隔紙  
微炒直指方加延胡索

右末每服二錢先用醞醋壹合衛生易簡方壹盞

熬藥成膏水一盞煎至七分熱呷服永類鈴方

玉機微義同

○得効方右剉散每服貳錢酒半

煮水半盞煎至七分食前服血痛臨熟入

真米醋少許直指方同未效加玄胡索各等分

神應散治諸疝心腹絞痛不可忍○急救仙

方小腸氣痛

玄胡索 胡椒等分

右爲末仙方粗末每服二大錢酒半盞水半盞

煎七分食前溫服衛生易簡方同澹菜方

乘熱頓服

牡丹圓治寒疝心腹刺痛休作無時及治婦人月病血刺疼痛○直指方治風寒疝痛及諸血滯作痛

川烏頭炮令焦黑去皮尖 牡丹皮四桂心

五兩○直指方 桃仁炒去皮尖

指方 右末煉蜜丸梧子大每服五十圓溫酒下

婦人直指方 醋湯下

小茴香圓治小腸氣腹痛

茴香 胡椒等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十圓空

心溫酒下

苦練圓治肝腎氣虛風冷相搏心腹絞痛攻

刺腰背不能禁受下注陰器腫痒疼痛久服

養腎活血駐顏輕身柰老進美飲食

川練壹十壹箇剉碎分三去一用巴豆十粒去皮同炒焦黑色去巴豆不用又

用斑貓七箇同炒焦去斑貓又用海

沙七錢重同炒去海金沙不用 破故紙 葫蘆巴 木香炮各 烏藥二

右為末酒糊丸如梧子大每服三五圓湯



酒任下

補腎湯治寒疝入腹上實下虛小腹疝痛時復泄瀉腎膈痞滿不進飲食常服溫脾補腎

人參 茯苓 白朮 黃芪

附子炮去皮劑沉香四錢木瓜壹兩羌活半兩

甘草炙芎藭各壹分○玉機微義紫蘇三分

○微義 三錢

右為剉散每服三錢水壹盞薑三片棗壹枚煎七分去滓食前服唯加半夏半兩添

水作蒸半姜七片煎醫方大成集成南止

鈴方同微義右咬咀每三四錢入姜棗煎

瑣碎錄

小腸氣方脬轉小便不得用曾經煨金銀甘

鍋子槌碎碾了研令極細每服二錢熱酒

調下是齊醫方同

文是齊醫方至危殆海水團用炭火燒存性

者灌下藥即愈 灰酒論下烏賊腸亦可

疝氣以吳茱萸為末每用壹錢匕醎醋調紙

花子攤貼臍下三日壹換

治小腸氣膀胱氣以手痛磨兩脇心令熱徹自差

是齋醫方

小腸疝氣

治疝氣澹寮方此下有陰囊二字腫硬方徐都承叔至傳云是錢參政方

防風去蘆牡丹皮去心

右等分為細末食前酒服方寸七日三見

千金癩病門亦見聖惠方治癩卵偏墜又一方加黃蘗桂心二味等分治氣上下腫

脹

治小腸氣蔡邦度傳

香附子毛擦法

右為細末濃煎海藻酒或湯調下若以海藻為細末以熱酒同調尤妙甚者灌之○

急救仙方小腸膀胱腫腹衛生易簡方治疝氣亦治膀胱

腫香附子末易簡方每服三錢海藻煎湯調下



治疝氣小腸偏墜等疾已驗神効先服五苓散用酒半盞燈心棗煎下青木香元二十元次服煨薑煎澹寮方煨薑鹽酒煎五積散候平復再服沉香草澄茄散太學朱端嘗病疝氣親服神効後傳之數人無不驗者四藥皆太醫局方澹寮方云太醫局方內沉香草澄茄散或以酒糊為圓鹽酒吞

三茱元治小腸氣外腎腫疼唐仲舉告腎癰服此藥得効病自泄氣中出

山茱萸得効方去核 吳茱萸得効方去梗 石茱萸各

兩○得効方去梗 川鍊子壹兩用班貓十

炒赤色 破故紙壹兩七錢 青皮參兩○得

青塩參兩 黑牽牛壹兩 茴香參兩

右為細末醋煮麩糊元如梧桐子大每服三五十元先喫炒桃仁十五箇以溫酒或搥湯下藥空心食前炒茴香酒下亦得

治小腸氣得効方 奪命散前峽州教授王執中既效方玄胡索不以多少搥炒過乾蝎

半之貳味爲細末每服半錢或一錢溫酒調下此疾北人多患京師有賣此藥者其門如市若心痛醋湯調下經驗良方同○朱氏集驗方玄胡索散治小腸氣痛絕妙玄胡索鹽炒乾蝎石等分細末溫酒下朱仁卿方一捻金散治奔狇小腸諸氣痛不可忍趙彭老知軍方詹武子傳

玄胡索 川練子炒 舶上茴香炒 全蝎炒  
壹附子半兩去皮 兩臍生用

右爲細末每服貳錢痛作時用熱酒調下甚者不過再服神効朱氏集驗方同

治陰腎腫大得效方名荆芥散 凌醫云胡偉

節傳曾以治人有効荆芥穗不以多少新

尾上炒乾爲細末每服貳錢熱酒調下即

散經驗良方此下云荆芥治風痲有七種皆屬風故效

治寒濕氣小腹疼外腎偏大腫痛軍頭司何押番傳與陳端遇發時只壹兩服立定何云等子輩常服此藥故無下部之疾



茴香 柿楂子 本草名 糖棗

右二味等分爲細末每服壹錢或二錢隨酒調空心熱服本草云糠棗子唯滁州者入藥

淋瀝藥方

蛇床子 川椒 木通 石茺萸 藁本

陳橘皮 各壹兩

右爲麤末每用連根葱白七枚水叁碗藥兩匙煎五七沸先噓候通手淋洗

七疝湯治男子七種疝氣攻疰小腸急痛牽墮不可忍

川烏頭 壹箇重叁錢者炮去皮尖 乾全蝎 十四箇去毒

毒 炒 搥 三錢 炒

右件咬咀水壹碗煎至七分蓋去滓放溫只作壹服空心食前

三茺元下五方漢陽洪簽判名价傳復州史君親服得効

山茺萸 石茺萸 炒 吳茺萸 炒 金鈴子 去核

炒青皮去白舶上茴香炒馬藺花炒小兒

胎髮煨存性

右各壹兩為細末酒糊為元如梧桐子大每服三五十元用塩酒下

木香散

木香去白玄胡索去白土茴香炒馬撲

兒新瓦上焙乾

右等分為細末每服抄貳錢空心温酒調服忌滯氣食物如豆腐雞鴨子濕麪蒸菜

等病愈任意食無害

又方桃仁三十粒炒細嚼熱酒吞下茴香元食前

又方肥皂子獨腎者四十箇

右燒過存性為細末再研如粉用陳米飯爛研如膏子元如梧桐子大每服四十元茴香煎湯下六兒方治疝氣細末熱酒調下

又方茱萸揀四桃仁壹伯貳



右貳味同炒香熟去茱萸不用止將桃仁  
去皮尖葱白拾寸細剉沙盆內爛研銀鈔  
內炒香熟用酒貳盞浸作壹服熱喫有汗  
便解

去鈴元

得効方  
治疝氣

一名資政元王吉老傳北茴

香一斤以老生薑二斤取自然汁浸茴香  
一夜約薑汁盡入茴香內以好青塩二兩  
同炒赤取出焙燥碾羅爲末無灰酒煮糊  
爲元如梧桐子大每日空心食前服三十

元或五十元温酒米飲任下此藥專實脾  
胃以其有青塩引入下部遂大治小腸疝  
氣服之累有効尋常治疝氣藥多是踈導  
久而未有不爲害者此藥用薑汁專一發  
散而無踈導之害經驗良方此所以爲妙也  
澹寮方同

三增茴香元治腎與膀胱俱虛爲邪氣搏結  
遂成寒疝伏留不散臍腹撮痛陰核偏大膚  
囊擁腫重墜滋長有妨行步瘙痒不止時行

黃水浸成瘡瘍或長性得効方肉累治不痊  
致令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如  
石漸漸醜大皆由頓服熱藥內攻或因撓取  
以至如此此藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消  
疝煖養腎經能使復元應小腸氣寒疝之疾  
久新病不過三料必有神功唐仲舉傳第一  
料

茴香舶上者用海鹽半兩同炒焦黃和鹽秤川練子炮去核  
沙參洗木香洗各一兩

右為細末以水煮米粉稠糊為元如梧桐  
子大每服二十元溫酒或塩湯下空心食  
前日進三服小病此一料可安才盡便可

服第二料林可等小劑服藥效二十  
第二料加下項藥之賦汁三十元

革撥一檳榔半  
右入前件藥共陸味重五兩半細末依前  
法糊元湯使元數服之若病大未愈便服  
第三料得効方同



第三料又加下項藥

白茯苓四兩緊小實者去黑皮黑附子半兩炮去皮

一兩右通前件藥共搗味重拾兩並依前法糊

元湯使元數服之加至三十元新久大病

不過此三料可愈小腸氣發頻及三十年

者寒疝漸至栲栳大者皆可消散神効得

同方

透經散治下部諸疾夏宮醫三方

川練子

二兩剉炒入巴豆二十粒吳茱萸

茴香

一兩同炒焦赤色去巴豆菜萸

貳兩連皮用沉香

半兩胡椒同全蝎半兩縮砂

右為細末每服二錢食前酒調服

消堅元

牡丹皮

得効方桂心各貳兩川烏炮去桃仁

各壹兩麩炒黃

右為細末酒糊為元如梧桐子大每服三

十元溫酒下

類聚九十

三十五

川練子元 治疝氣 凡一切下部之疾悉皆治之 腫痛縮小雖多年服此永去根本

川練子 一斤淨肉四兩用麩一合班貓四十九箇同炒麩黃色為度大麩班

貓不用四兩用麩一合巴豆四十九粒同炒麩黃色為度去麩巴豆不用四兩用麩

一合巴戟兩同炒麩黃色為度去麩巴

戟不用四兩用鹽壹兩苗香一兩同炒

色為度去麩苗香不用

苗香不用 木香壹兩○得効 破故紙兩

炒香 為度

右為細末酒糊為元如梧桐子大每服五

十元煎湯下甚者日進叁兩服空心食前

### 服

居家必用

茱萸內消丸治一切小腸疝氣

山茱萸 食茱萸 吳茱萸 茴香 炒 川

練子 去核 青皮 去穢 馬蘭花 各一兩 黑牽牛 頭末

右為細末酒糊為丸如桐子大每服三五

十丸鹽湯送下久年不差者五七服可除

根子親服之有効

### 直指方

類聚九十

三十六



腎氣證治

養正丹 方見痢冷門 治奔豚氣痛嘔吐身冷調氣

散下

沉附湯治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外

腎時冷兼治濕證

附子 生壹錢 沉香 粹桂 萆澄茄 甘草

炙各半錢 香附 壹錢

右剉為壹服薑七片空心煎服

桂薑湯治無陽瘠冷疝氣兼治濕證

吳茱萸 半兩半酒醋川白薑 生粹桂 各半

良薑 萆澄茄 尚香 炒 縮砂仁 益智

仁 木香 茯苓 甘草 各參錢

右剉每服叁錢水煎調蘇合香圓食前服

薑桂圓治腎冷寒疝

良薑 碎片半兩 巴豆肉 貳十壹粒截斷 桂心 兩

右並末醋麪糊圓桐子大每叁拾圓温酒

食前服

茴香雀酒治腎冷疝氣偏墜急痛

舶上茴香參錢胡椒壹錢縮砂仁 粹桂各二錢

右麝末以生雀燎毛去腸拭淨不洗用參

箇入藥於其腹中麻繩繫定濕紙數重裹

煨香熟空心嚼食溫酒送下

川椒散治疝氣外腎腫痛

正川椒去目并合口者微炒出汗官桂各半兩川芎 當

歸 青皮 陳皮製枳殼 檳榔 赤茯苓

苓 青木香 南木香 葶澄茄 白豆

蔻仁 甘草炙各壹分

右麝末每參錢薑棗煎食前服

梔子散治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱

熱大小便不通

梔子仁製枳殼各半兩北梗 北前胡 青

木香 赤茯苓 車前子 甘草各壹分

右剉每參錢新水煎服壯熱加柴胡大便

秘加大黃

甘豆湯治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆參合甘草貳錢薑片七



右作一劑新水煎取清汁服

海浮石散治腎氣熱證小便秘澀黃色

海浮石

右細末每二錢煎麥門冬赤茯苓湯調下

金蓮散治膀胱氣痛

巴豆參拾粒去殼截斷川練子貳拾四箇湯浸去皮薄切片

右件用麩貳合同炒令黃赤去麩與巴豆

只將川練為末每貳錢溫酒調空心服

五苓散方見水腫門用生車前子竹園尿赤茯苓

麥門冬去心燈心烏梅煎湯調下治腎氣

小便不通兼致水結不散暑證通用

柴胡桂枝湯治腎氣冷熱不調證

柴胡參一兩人參 桂枝 白芍藥 生薑

冬半兩半夏製四錢黃芩 甘草炙各錢

右剉散每服肆錢棗一枚水大盞煎柒分

溫服

解毒雄黃圓方見積熱門溫白圓見水腫門以枳殼散

送下方見脚氣門治腎氣大便不通酌量輕重

用

二物湯治奔豚疝氣攻刺走痛

粹桂壹兩半牽牛兩炒壹

右麤末每服貳錢薑棗煎溫服

青木香圓治膀胱疝氣每五拾圓以醇酒入

葱白煎五苓散送下方並見又方青木香

圓貳伯粒班貓七箇去頭足翅為末同於

文武火上慢慢炒令圓子微香以磁碟蓋

銚上頓在冷處少頃去班貓末取圓子每

服五拾圓茴香酒下

金鈴散治膀胱小腸氣外腎腫痛

大川練子參十箇湯浸去薄皮每箇作陸

作兩參段夾炒候巴色焦去巴

右以舶上茴香與川練等秤并木香壹分

為末每貳錢水酒各半盞連根葱白貳寸

煎取汁食前調下

煨棗方治小腸氣痛不可忍班貓一箇去頭

足翅入大棗中線繫濕紙包置慢火中煨



令香熟去猫空腹食棗以桂心葦澄茄煎湯送下

蝎麝散治膀胱小腸氣痛全蝎緊實而全者不拘多少焙乾為末每迎病發時用蝎末壹錢入麝半字分作貳服温酒調下人行拾里又進後服神效

證 塩煎散治小腸氣弔腹中成陣刺痛兼治風

益智仁 白花 白乾薑 炮 茴香 炒 甘草

炙 天台烏藥 心 香附 淨各壹兩 青皮 壹兩 檳榔

麻黃 去節 川芎 枳殼 製各半兩

右末每服貳錢塩少許水煎食前服

全蝎延胡散治小腸氣痛最良

延胡索 用塩炒 全蝎 用日乾 壹兩 一分

右細末每服壹錢食前温酒調下亦治心痛不飢飽醋湯調下

葫盧巴散治小腸氣攻刺

葫盧巴 炒膏 兩

右末每服貳錢茴香炒紫用熱酒沃蓋定  
取酒調下

葱白散治腎氣刺痛七氣通用

當歸 川芎 枳殼製 官桂 青皮 川

白薑生 茴香炒 川練肉 陳皮 紫蘇

三稜煨 蓬朮醋浸壹宿焙 白芍藥 伏苓 木

香各壹兩 人參 沉香 甘草炙各半兩

右麓末每服叁錢葱白貳寸搗少許煎服  
大便秘加人黃

寸金圓治奔豚諸疝作痛

當歸 延胡索 舶上茴香炒 葫蘆巴炒

壹兩 桃仁浸去皮焙 桑螵蛸酒蒸 川五靈脂別白

芍藥 川練肉各半兩 葶澄茄 木香二錢

全蝎十箇

右末米醋打麪糊圓桐子大每服五拾圓  
少搗入酒送下有熱小便秘車前子赤伏  
苓煎湯下

生料調氣散治寒疝作痛方見諸氣門 每服貳錢



入生薑紫蘇少鹽煎服若是藥末用茴香  
煆酒調下

秘傳茱萸內消圓治腎虛為邪所襲留伏作  
痛陰癩偏大或生瘡出黃水

吳茱萸半酒半醋浸山茱萸蒸去核馬蘭花

醋浸一宿焙乾川練子蒸去核官桂黑牽牛炒取舶

上茴香用鹽炒延胡索略炒橘紅青皮去白海

藻浸洗去鹹桃仁浸去皮炒白蒺藜炒去刺木香

各半  
兩

右細末酒麴稀糊圓桐子大每肆拾圓食  
前溫酒塩湯恁下

蠲痛圓治小腸膀胱氣痛

延胡索略炒川練蒸去核舶上茴香炒各牽

牛炒取末當歸良薑青皮去白木香天

台烏藥各壹分全蝎七個

右末生薑自然汁浸糕為糊圓桐子大每  
服叁拾圓燒絲灰存性調酒送下

腰子散治腎氣作痛

黑牽牛炒熟 白牽牛炒熟 等分

右為末每服挑參錢七猪腰壹副背切開  
縫入川椒五拾粒茴香壹伯粒以牽牛末  
徧摻入腎中線繫濕紙數重裏煨香熟出  
火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少頃就枕  
天明取下惡物即愈

伏苓桂湯治臍下悸動欲作奔豚

伏苓貳兩 甘草炙半兩 桂枝壹兩

右剉細每服肆錢棗一箇用甘泉水壹盞

半煎一盞溫服

敵金圓治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃  
水其痛遶腹寒熱往來

京三稜 蓬莪朮 木猪苓 白附子

蘿蔔子 赤芍藥 黑牽牛 川練肉

山茵陳 青木香 陳橘皮 五靈脂

薑黃 茴香各壹兩 南木香牛兩 丁香壹分 澤瀉

壹兩半巳 海藻酒浸壹宿焙乾 海浮石米醋浸火

上並生用 又煨淬如此 川山甲熱火灰煨 青皮去白



壹兩生用壹兩截碎以班猫五十箇香附  
尖頭足翅同炒黄色去在猫不用  
杵淨貳兩壹兩生用一兩以巴豆五  
十粒去殼同炒色焦去巴豆不用

右件截碎夾和微炒並為末酒麵稀糊圓  
桐子大每服叁拾圓温酒送下此藥能泄  
斟酌用之

川練散治膀胱小腸氣木腎諸疝通用方見後

金山老艾瓜圓治腎氣攻刺及脚氣酸疼通

用皆得效

葫盧巴慢火炒牛膝酒浸舶上茴香酒浸炒肉

菴蓉酒浸川續斷揀淨厚杜仲去蘆皮薑

斷天麻各貳兩當歸酒浸沒藥別研各壹兩

右為末以艾去枝梗貳兩大木瓜貳枚切

蓋去穰入艾塞滿蓋定竹針插麻線繫蒸

爛研細和藥為圓桐子大每服七拾圓温

酒搥湯恁下

腎氣方大七氣湯加炒牽牛煎服

又生薑母多開小孔納以川椒濕紙煨透

老酒嚼下

### 木腎證治

川練散治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣  
偏墜諸證

川練子 不蛀者四拾九箇先切七箇取肉以苗香貳錢半慢火同炒併留苗

香 又切七箇以破紙紙貳錢半同炒併留故紙又切七箇以黑牽牛貳錢半同炒併留

留牽牛 又切七箇以藍壹錢同炒併留又切七箇以班貓拾四箇去翅同炒去班

貓 不川又切七箇以巴豆肉拾四箇作兩斷同炒去巴豆不用又切七箇以藍苗子

子 不用外更別入 苧桂 南木香 各貳錢

苧桂 南木香 各貳錢 苧香 炒 青木香 各半

右並為末酒調稀麵糊圓梧子大每服叁拾圓食前搥酒下積日計功打墜瘀血證本方加延胡索半兩略炒入藥以沒藥研為末調酒下

金鈴散煨棗方治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎 方見前

四神圓治腎冷疝氣脹痛

吳茱萸 揀淨壹兩一半用老酒浸壹宿 大

香附 枰淨兩 草澄茄 青木香 各半



右為末米糊圓桐子大每服七拾圓食前

搥湯下或乳香葱白煎湯下醫方大成集

方袖珍方永類鈐方同

### 朱氏集驗方

諸疝

### 復元圓治釣腸病

川練子貳拾五介剉肉作五分壹分茴香

炒一錢壹分陳皮炒貳錢一分黑牽牛炒貳錢一分神麩炒貳錢壹分巴豆五粒炒除去巴豆破故紙貳錢代用

右為細末煮少麴糊為元取江水井水塘

水田水圳小合煮湯吞下空心服

木香飲治小腸氣痛黃槐鄉方詩訣曰小腸氣痛

腰先曲無淚料啼空眼哭口乾脚冷上唇乾

額上汗珠濕漉漉

川練子拾介巴豆七粒炒令上玄胡索兩

南木香錢二史君子

右為末米飲調下大人小兒皆用

各半散治小腸氣撮痛

室女髮燒荷香

右等分細末無灰酒調熱服不拘時候海出

吳茱萸丸治膀胱氣痛

吳茱萸不拘多少作四分壹分酒浸壹分童子小便浸壹分醋浸壹分水浸

合蒸焙乾

右為末水煮麵糊元空心酒下淥江石信甫方甚驗

金鈴子丸治膀胱小腸疝氣臍腹苦痛

茴香 川練子半兩每箇作四片用巴豆四拾九粒炒焦為度不用

巴破故紙 葫蘆巴炒各二兩

右細末酒糊元每服三十九細嚼胡桃仁

叁个熱葱酒送下常服塩酒吞下亦可

金鈴子散治膀胱疝氣小腸偏墜小腹撮痛

發則欲死諸趙府雷制所不治妙方屬凝冲方

川練子壹兩淨班猫拾四介去巴豆拾四箇去殼并

心擘開作兩片

右二味同川練肉於銀石瓦器內慢火炒

令川練肉帶黃焦色取去班猫巴豆二

藥不用只將川練子肉別安之一處外用



茴香叁錢重和前川練子肉川塩合炒令香并前川練子碾為細末每服二錢匕空心温酒調下若臟府微痲痛即愈病久而甚病者不過三服病退即止不可過劑服後仍用安腎元沉香輩沉茄散吞服以補其虛則其疾永不作矣

治膀胱氣痛

本事方

歙縣尉宋荀甫膀胱氣作

痛不可忍醫者以剛劑與之痛與甚洩瀉不通三日許學士診其脉曰投熱藥太過

適有五苓散壹兩分作三易其名用連鬚葱一莖茴香及塩少許水一盞半煎七分連服之中夜卜小便如黑豆汁一二升臍下寬得睡明日脉已平續用硃砂元數此疾往來皆因腎虛聖惠云腎氣虛風冷所侵流入于腎不能宣散而然也卵脹腸癩難治獨氣癩水癩治之易愈又有寒疝之氣注入癩中名曰狐疝亦屬癩病嚴氏云四癩治法橘核丸主之謾錄于后

橘核丸治四種癩病卵核腫脹偏有大小或腎硬如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則成癰潰爛

橘核炒海藻洗昆布洗海帶洗川練子取肉

桃仁炒厚朴去皮薑汁製炒木通炒枳實炒

玄胡索炒去桂心火木香不見火

右為末酒糊為丸梧子大每服七十九得效

方六上九空心塩酒塩湯任下虛寒甚者加炮

川烏壹兩堅脹腎得效方久不消者加礪砂

貳錢醋煮旋入醫方大成集成南北經驗方袖珍方永類鈐方同得效方此下云有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩

茴香酒治膀胱偏墜久不愈者燈籠草根酒却將茴香炒碾用此酒調下

茴香飲治膀胱偏墜疝氣

八角茴香 白牽牛炒

右二味各等分為細末空心酒調下

嚴氏濟生方

聚香飲子治七情所傷遂成七疝心腹脹痛



痛引腰脇連背不可俛仰

檀香 木香 乳香 沉香 丁香 並不見火

藿香葉 各壹兩○得効方去 玄胡索 炒去

片子薑黃 洗 川烏 炮去 桔梗 夫薑 桂心 不見

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗

一枚煎至七分去滓溫服 醫方大成集成一枚煎至七分去滓溫服南北經驗方袖

珍方永類不拘時候

益智仁湯治疝痛連小腹攣搐叫呼不已診

其脉沉緊是腎經有積冷所致

益智仁 乾薑 炮 甘草 炙 茴香 炒各 烏頭

炮去 生薑 各半兩 青皮 去白二錢

右咬咀每服四錢水二盞 醫方大成一盞 入搥少

許煎至七分去滓空心食前溫服 大成熱服醫方

集成南北經驗方袖珍方永類鈐方與大成同

玄附湯治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自

汗大腑 得効方大腑滑泄

玄胡索 炒去 附子 炮去皮臍各壹兩○衛

木香 不見火半兩 ○

右咬咀每服四錢水壹盞半 得效方 生薑

七片煎至七分去滓溫服不拘時候 大成方

集成南北經驗方袖珍方永類鈐方易簡方與得效方同

金鈴子散治七疝寒注下焦少腹引外腎疼

痛大便多閉

川練子 去皮核取肉一兩用巴豆七枚去殼同炒令黃色去巴豆

右為細末每服二錢 醫方大成三錢 熱塩酒調服

醫方集成永類鈐方同 空心食前

狼毒圓治七疝久而不愈發作無時臍腹堅

硬疼痛 醫方大成刺痛不已

狼毒 剉兩 芫花 醋炒 川烏 炮去皮尖 椒紅 炒

乾薑 炮 乾漆 炒煙 三稜 醋煮 沒藥 各

兩 全蝎 去毒九枚

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服四

十圓空心薑湯溫酒任下熨法塩半斤炒

極熱以故帛包熨痛處 醫方集成南北經驗方袖珍方永類

鈐方與大成同



修月魯般經後錄

七疝丹治一切腎氣冲心危篤口土冷沫熱極氣喘甚者牙關緊閉不識人者此藥下咽即通立効

胡椒煉三十粒黑牽牛煉三十粒班猫二十一介去頭

足巴豆二十一介去心盡去油木香二錢丁香二錢

已上五味除巴豆共為細末別研細巴豆

和諸藥共乳勻用生葱自然汁和菜豆大

每服十五丸量病人肥瘦加減溫擦湯酒

下臨發時服減作十二丸或十四丸

宣明論

厥疝證主腹痛

脉至太陰積氣腹中隱而難見陰沉使脾弱寒於肢膜氣厥逆也吳茱萸加減湯主之治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜

吳茱萸二兩湯洗炒川烏頭炮去臍皮細辛去苗各

聖濟總錄已上良薑總錄高良薑判炒當歸總錄切焙

乾薑炮官桂各壹兩○總錄去籬皮

右為末每服二錢水壹盞同煎至七分去滓温服日三〇總錄右七味剉如麻豆大每服五錢匕以水二盞煎取一盞去滓温服日二

控睪證 主小腸

甲乙經云小腸病結於臍上而不下痛衝心胃經所系也茴香練實丸 衛生寶鑑名 主之治小腸病結上而不下痛衝心臍

茴香 炒 練實 去核 石茱萸 陳皮 馬練

花 醋炒各壹兩 芫花 醋半

右為末醋麪糊為丸如桐子大每服十九至二十凡温酒下空心食前 玉機微義同

陰疝證 主男病

足厥陰之脉環器底 衛生寶鑑 小腹腫或痛腎虛寒水涸渴瀉邪補脉為治蒺藜湯主之治陰疝牽引少腹痛諸厥疝即陰疝也嘻慾勞痛不可忍之

蒺藜 去角炒 附子 炮去臍 梔子 已上各



右為末每服叁錢水壹盞半煎至六分資鑑  
分七夫滓食前溫服玉機微義同控畢證茴香練  
實丸亦治此證

心疝證主心痛

心脉急小腹有形心不受邪必傳於腑故小  
腹有形心氣逆不順當痛不已當兼必氣治  
不止為有寒邪所中木香散主之治心疝小  
腹痛悶絕不已者

木香 陳皮各壹兩 良薑 乾薑 呵子皮

赤芍藥 枳實各半兩 草豆蔻 下川芎 人黑

牽牛各叁分

右為末每服貳錢水壹盞煎至七分去滓

溫服

全聖散治小腸膀胱氣痛不忍者

地膽半兩去翅足頭微炒 滑石壹兩 朱砂半錢

右為末每服貳錢用苦杖酒調下食前

東垣試效方

丁香疝氣圓治臍下撮急疼痛并臍已下周

身皆急痛小便頻清其五脉急濁腎按之不  
急皆虛無力名曰腎疝

常歸 茴香各壹錢 甘草各壹錢 木香各半錢 全蝎各壹錢

十三 羌活三錢 防已三分 麻黃根節 玄胡各壹錢

丁香半錢 肉桂壹錢 川烏頭半錢

右件為細末酒煮麵糊圓如雞頭仁大每  
服五十圓溫酒送下淡鹽湯亦得空心

疝瘕同法治驗

丁香練實圓治男子七疝痛不可忍婦人瘕

聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治

法同歸於一

常歸去蘆剉碎 附子炮裂去皮臍剉 川練子剉 茴香衛

寶鑑有北經驗方抄

右件四味各壹兩剉碎以好酒三升經驗方二

升同煎酒盡為度焙乾作細末每秤藥味

壹兩冉入下項藥

丁香半錢 木香半錢 全蝎十三箇

方壹方 玄胡五錢 拔粹方經驗方



右四味同為細末人在前項當歸等藥末  
秤和勻酒糊為圓如桐子大每服三十圓  
至百圓溫酒送下空心玉機微義同袖珍方與經驗方同  
凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥  
茴香川練子皆入小腸經當歸玄胡和血  
止痛疝氣帶下皆積寒邪於小腸之間故  
以附子佐之以丁香木香引導也韓提控  
病疝氣每發痛甚不可忍則於榻兩末各  
置其枕往來伏之以受如是者三年不已服

此藥三劑良愈

得効方

諸疝

風寒證烏頭桂枝湯

寒證倉卒散

方並見三方

生料木香勻氣散治寒疝作痛和氣

丁香

檀香

木香

各壹兩

甘草

燈四兩

縮砂

去殼白豆蔻仁

沉香

各壹兩

藿香

去十兩

右劉散每服貳錢水壹盞半生薑參片紫

蘇葉五皮食塩少許煎熱服不拘時候或為末炒茴香塩酒調亦可

七情聚香飲子 方見嚴氏濟生方

熱證加味通心飲治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗 木通 去皮節 梔子 去殼 黃芩 連翹

甘草 枳殼 去穰 川練子 去核各等分

右剉散每服五錢水壹盞斗燈心貳拾莖車前草五莖同煎空心温服

八正散治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門

俱熱大小便不利作痛每服肆錢燈心貳

拾莖枳殼半片去穰煎食前温服熱盛加

淡竹葉貳拾皮 方見大便門

虛冷五積散治體虛膀胱小腸氣作痛不可

忍每服五錢生薑三片塩炒茱萸五粒茴

香一撮葱白五寸煎空心熱服 方見傷寒門

蟠葱散治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻

刺心腹痛連胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血



氣刺痛並皆治療

蒼朮

消浸宿切焙

甘草

炙各四兩

延胡索

壹兩

官桂

去皮乾薑

壹兩

縮砂

去殼

丁皮

檳榔

各貳兩

蓬

朮

煨

三稜

煨

白茯苓

去皮

青皮

去白各

壹兩

右到散每服五錢水壹盞半入連根葱白

一莖煎至七分空心熱服

通治荆芥散

方見是齋醫方

礪砂圓治諸疝作痛大效

木香

沉香

巴豆肉

全者各壹兩

青皮

不去皮貳

兩銅青

半兩

礪砂

貳錢半水飛煎如塩研

右以二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒

令紫色為度去巴為末入青砂二味研勻

蒸餅和圓如梧子大每服七圓至十圓塩

湯吞下空心日進二三服

奪命散

方見是齋醫方

五苓散治撮聚疝氣連根葱白二寸燈心十

莖搗炒茴香一撮川練子叁箇去核煎湯

調下大效傷暑濕作疝亦效就吞青木香

圓亦可方見諸暑門

青木香圓治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛陸兩炒香補骨脂炒香葶澄茄 檳榔

椰酸粟米飯各二兩中煨紙焦去飯各二兩 青木香壹兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為圓

如桐子大每服五十圓溫熟水吞下

又法用貳伯粒斑猫七箇去頭足翅為末同

於文武火上慢沙令圓子微香以磁碟蓋銚上頓在冷處少頃去斑猫末取圓子手服五拾圓茴香酒下

三棗圓方見是失笑散方見三葫蘆巴圓方見

和劑方見嚴氏玄附湯方見嚴氏

立効散治疝氣

川芎 川練子 青皮白茴香舶上 桃仁

黑牽牛炒各壹兩

右剉散醫方大成集成南北經驗方補每珍方永精鈴方玉機微義為末



服貳錢無灰酒壹盞煎至八分溫服微義食前

金鈴圓治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛

開水出

金鈴圓肉五 茴香炒 馬蘭花炒 海蛤 破

故紙 兔絲子 海帶承類鈐方已上 木

香 丁香各一兩

右為末麵糊圓如梧子大每服叁拾圓溫

酒盪湯任下

去鈴圓三增茴圓香 第二料 第三料

消堅圓川練子圓方並見是齋醫方

海藻圓治偏墜小腸氣效

海藻 海帶各壹兩○經驗 班猫貳十八

翅○良方 巴豆貳拾捌箇去殼完全

右班猫巴豆二味壹處生絹袋盛用好醋

壹碗以瓦銚盛四味同煮將乾去班猫巴

豆不用只將海帶二味細切為末以淡豆

豉壹伯粒良方小粒以煮藥餘醋略浸蒸

研為膏和末藥為圓如梧子大每服用麝

香少許朱砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以新瓦瓶收之每初服七粒二服拾粒三服拾五粒若未愈再進三兩服皆用拾五粒仍用煎炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病三五服效此藥貴新合効速若合下稍久多服為佳

數法治腎囊偏墜

牡礪

一兩煨○經良薑壹  
驗良方二兩

右為水津唾

良方此下有  
或水二字

調傅大偏處須

更如火熟著

良方痛即安  
作略

陰腫方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者以馬鞭草搗爛塗之

澹寮方同

衛生寶鑑

茴香練實丸治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練實

炒茴香

山茱萸

食茱萸

吳

茱萸

拔粹方湯洗

青皮

去白

馬蘭花

拔粹方醋炒

芫花

醋陳皮

去白各等分



右為末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸温

酒送下食前玉機微義同按粹方云量人虛實加減丸數以利為度南

北經驗方袖珍方與粹按方同

沉香鹿茸丸大補益脾胃強壯筋骨辟除一

切惡氣令人內實五臟外充肌膚補益陽氣

和暢榮衛

沉香壹兩另為末麝香壹兩鹿茸壹兩先用草火燒去毛為末

右參味同研勻小糊丸如桐子大每服叁

拾丸至五拾丸暖酒送下空心食前

川苦練散治小腸氣痛玉機微義痛不可忍

木香一兩另為末茴香一兩鹽炒黃去鹽○按

香黃色去不用川練子壹兩川碎與川練炒黃去鹽○按

右為末每服貳錢瑞竹堂方三錢温酒壹觥調下

空心食前許學士云大抵此疾因虛得之

不可以虛驟補經云邪之所湊其氣必虛

留而不去其病則實故必先滌所蓄之熱

然後補之是以諸方多借巴豆氣者蓋謂

此也○衛生易簡方用木香茴香搯炒川  
練子切片搯炒等分爲末每服二錢温酒  
調服

疝氣治驗

癸丑歲奉詔至六盤山上命台火兒赤紐隣  
久疝疝氣復因七月間飢飽勞役遇飲潼乳  
所發甚如初面色青黃不澤臍腹陣痛搖撮  
不可忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脉得細  
小而急予思難經云任之爲病男子內結七

疝皆積寒於小腸之間所致也非大熱之劑  
卽不能愈遂制一方名之曰

沉香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不  
美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼  
痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥冷  
便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小  
腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩方

沉香

附子

炮去皮臍

川烏

炮去皮臍切作小塊

乾薑

炮

良薑

炒

茴香

炒

官桂

吳茱萸

各壹兩湯浸去苦



右爲末醋糊丸如桐子大每服五拾丸至

七捌拾丸熟米飲湯送下玉機微温酒吞

下亦得空心食前日貳服忌冷物間服

天合烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥 木杏 茴香 炒良薑 炒青皮去白

檳榔剉貳箇川練拾箇巴豆七拾箇微打破同

麩黑色去麩不用只用川練

右爲末每服壹錢温酒調下痛甚者炒生

薑熟酒調下亦得拔粹方玉服此二藥旬

日良愈明秋王征班師遂遠迎拜精神如

故上大悅輒錄於此

肘後方

治心疝發作有時激痛難忍方真射茛吳茱

萸分等擣末蜜和丸如麻子服二九日三

服勿喫熟食

治卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗

出欲死方擣沙參末節衛生易簡服方寸

匕立差備預百要方服一錢

此本在雜治中謂之寒疝亦名陰疝此治不差可服諸利丸下之作走馬湯亦佳

治寒疝腹痛飲食下喉不覺其流行方椒二

合乾薑四兩小四升煮取二升去滓內飴

一斤又煎取半分再服數數服之

又方半夏一升桂八兩生薑一升水六升煮

取二升分為三服

治寒疝來去每發絞痛方附子一枚椒二百

粒乾薑半兩半夏十枚大棗三十枚粳米

一升水七升煮米熟去滓一服一升令盡

又方牡蠣甘草桂各二兩水五升煮取一升

半再服

又方宿烏雞壹頭治如食法生地黃七斤合

細剉之著甌蔽中蒸銅器承須取汁清且

大服至日晡令盡其間當下諸寒癖訖作白

粥漸食之久疝者下三劑

澹寮方

氣疝



治虛人老人寒疝作疼不可攻擊右以木香調氣散煎炒茴香鹽酒調下一法咬咀每服二錢水壹大盞生姜紫蘇搥煎服尤妙去鈴圓治奔豚疝氣或陰囊腫大

川烏尖七個巴豆七枚去皮只

右細末糕糊為圓如梧子大用朱砂麝香

為衣每服貳圓同青木香圓參拾粒空心

冷搥酒或冷搥水下三兩日壹服不可多

醫方大成集成南北經驗方袖珍方永輝鈴方同介軒徐制使方

宜包圓治膀胱疝氣及奔豚木腎其大如斗者

豬包介黑牽牛四兩入包內好醋澤瀉

木香不見木豬苓夫續隨子淡豆豉

三稜煨川練肉煨去核馬蘭花炒等茴香分

右水煮糊圓梧子大每五十圓搥湯下第

貳服車前子湯下小便實秘不通加土狗

拾箇海金沙壹兩

膀胱氣外腎腫人

破故紙 黑牽牛 貳味瓦器內炒大半留小半生

右末別取大蒜入巴濕紙裏煨軟熟去巴不用以蒜研入藥作劑可圓為度圓如梧子大每服參拾圓茶清吞下

金鈴子圓治腎氣膀胱偏墜疼痛釣腎

川練五兩剉作五分製壹分用班猫一分去頭足同炒去班猫壹分用苗香三錢鹽半錢炒熟去鹽留苗香入藥壹分用黑牽牛三錢同炒大半壹分用蘿蔔子一錢炒去蘿蔔子壹分用破故紙三錢同炒留故紙入藥  
右將練子去核同破故紙茴香焙乾為細

末酒糊圓如梧子大每服參拾圓温酒食前吞下 承類鈐方同

治小腸氣久年痼疾壹服見效右用蘿蔔子壹升以班猫大者七枚去頭翅足入蘿蔔子內同炒令香熟以紙裹定候冷去班猫為細末酒糊為圓梧子大每服拾圓炒姜酒食前吞下

治膀胱疝氣發作痛不可忍者真料五苓散壹貼連根葱白壹莖 醫方大成集成南北經驗方袖珍方承類



鈴方燈心七莖煎湯吞下青木香圓五十  
 粒立効文法尤奇用青木香圓貳百粒斑  
 猫七枚去頭翅鈴方一方此下云猫最利小便為粗末用  
 瓦銚於文武火上同炒令木香圓微香却  
 以磁碟蓋藥移銚放冷處少時去班猫取  
 木香圓分二服空心茴香酒吞下一服當  
 効

治脇肋間痛如有物以插然乃氣疾也右濃  
 煎葱白湯調枳殼散最效揀枳殼白合尤

妙

疝氣陰囊腫大方胡新恩云會於夏間陰囊  
 腫大妨礙起居醫藥未及偶僕者持湯一  
 杯至謾飲之似覺疾寬呼問之乃曰香薷  
 湯也遂再啜壹盞疾頓減及夫醫至亦只  
 用五苓散青木香丸奏效乃知夏月此疾  
 作者多由虛中反坐臥暑氣而至也又一  
 新恩云會因氣不順而疝疾作醫用稍大  
 莪朮壹枚劈作兩邊就中剗一窠曰入去

穀巴豆青粒濕紙裹煨熟空心口水嚼喫  
 一服病減三服頓安是亦可知當隨病源  
 而用藥也要之去巴爲末鹽湯點服亦可  
 小腸氣攻刺痛楚小便少右以五苓散四錢  
 燈心貳拾壹莖連鬚葱叁頭酒二盞煎至  
 壹盞溫服或浸水煎

陰腫方

檳榔 赤茯苓 各壹兩 川木香 半兩 澤瀉 三分 牡  
 丹皮 三分 防風 兩半

右末二錢溫酒空心下

小兒陰囊忽虛腫痛右以生甘草汁調地龍  
 糞輕輕塗之

聖濟總錄

寒疝

寒疝爲病陰冷內積衛氣不行結 內故  
 遇寒則發其狀惡寒不欲食手足逆冷繞臍  
 痛白汗出

治寒疝四肢逆冷氣弱汗出蓬莪茂湯方



蓬莪茂

壹兩炮

乾姜

半兩炮

附子

炮裂去皮

壹兩

芡

三分壹兩

去麤皮

白朮

三分

檳榔

壹兩

芍藥

右八味判如麻豆每服三錢匕水壹盞煎

七分去滓溫服不拘時

治寒疝來去疼痛冷汗出牡丹丸方

牡丹皮

桂

去麤皮

烏頭

炮裂去皮

各貳兩

右三味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九溫酒下空心日午卧時服

治寒疝胃脇支滿食飲不化臍腹疔痛桂心

丸方

桂

去麤皮

吳茱萸

湯洗

焙乾

白薇

壹兩

乾薑

兩壹

烏頭

炮裂去皮

蜀椒

去目并閉口

者炒叁分

芎

藟

防葵

半兩

白芷

三分

右九味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服十九溫酒下食前

治寒疝滿逆手足不溫徧身疼痛烏頭湯方

烏頭

實大者五枚

去皮臍生切

白蜜

壹斤

桂

去麤皮

右三味先以慢火煎蜜及烏頭候蜜減半

濾去烏頭別就一處以水三盞煮桂候減半濾去桂將桂汁并前蜜汁共和別煎取二盞許每服半盞溫服未知再服其知如醉狀得吐為中病也

治寒疝繞臍痛結鞭不消木香丸方

木香 附子 炮裂去皮臍 礪砂 飛研各壹兩

右三味擣羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心食前

治寒疝卒痛積聚不散上衝心腹與陰相引

痛則汗出高良薑湯方

高良薑 炒 檳榔 生剉 木香 當歸 切焙各吳

茱萸 湯浸焙乾炒壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服

心疝

內經謂診得心脉而急病名心疝少腹當有形也心為牡藏小腸為之使故曰少腹當有形也夫藏病必傳於府今心不受邪病傳於



府故小腸受之為疝而痛少腹當有形也世之醫者以疝為寒濕之疾不知心氣之厥亦能為疝心疝者當兼心氣以治之

治心疝心痛悶絕木香散方

木香炮 陳橘皮湯浸去白 高良薑 乾薑

炮訶梨勒皮 赤芍藥 枳殼去瓢 赤茯苓

苓去黑皮 草豆蔻去皮 芎藭 牽牛子炒各

右壹十壹味搗羅為散每服二錢匕水壹盞煎至七分溫服不拘時

治心疝心痛虛冷煩悶當歸湯方

當歸切炒 乾薑炮 赤芍藥 黃耆 蜀椒去

并閉口為末薑汁 人參 青橘皮湯

炒出汗作餅暴乾 附子炮裂去 甘草炙到各 厚朴去

薑汁炙 桂去 薑皮生 右壹十二味咬咀如麻豆每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服不拘時

治心疝心痛如錐所刺牡丹丸方

牡丹皮 桂去 芍藥 烏頭炮裂去 細

辛去苗甘草炙木香 吳茱萸湯浸檳榔

各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時

治心疝心痛不可忍木香散方

木香 羌活去蘆檳榔生牡丹皮 當歸

切桂皮去麤青橘皮湯浸去白切炒蓬莪茂煨各壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯或溫酒調下不拘時

治心疝心脇痛及繞臍痛芍藥丸方

芍藥 桔梗去蘆細辛去苗蜀椒去目并

出桂皮去麤乾薑炮各參分附子炮裂去皮

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒或米飲下不拘時

治心疝心痛肢體虛冷蓬莪茂煮散方

蓬莪茂煨檳榔生附子炮裂去甘草炙桂

去蘆皮胡椒半芍藥 白朮各參分

右八味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎



至七分溫服不拘時

治痼冷在內陰氣交攻心痛如刺橘皮益智

湯方

青橘皮

湯浸去白焙

益智皮

去烏頭

炮裂去皮臍

威靈

仙

去土名壹兩

右四味剉如麻豆每服三錢匕水壹盞生

薑三片鹽少許煎至六分去滓食前溫服

日三

治陰冷交攻心痛疼痛紫桂丸方

桂

去籬皮半兩

當歸

焙叁分

吳茱萸

湯浸焙炒壹兩

右三味為細末醋煮麵糊丸如梧桐子大

每服二十九炒生薑鹽酒下米飲亦得日

三

治心疝冷痛不可忍三溫散方

附子

炮裂去皮臍

蓬莪茂

煨剉各一兩

胡椒

半兩

右三味為細散每服壹錢匕熱酒調下不

拘時婦人醋湯下

厥疝

內經謂黃脈之至也大而虛有積氣在腹中  
有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢  
汗出當風夫疝藏疾言隱而難見陰沉而伏  
也今脾虛風寒客於腹膜之間不能與胃通  
行水穀之氣結而成積使氣道厥逆而痛故  
謂之厥疝

治厥疝上攻腹痛無時懷香丸方

- 懷香子 炒 吳茱萸 湯洗焙 桂 去麤 胡椒 入
- 棟實 剉碎炒 延胡索 各半 木香 各半 寅蟲 去翅足炒

海蛤 芫花 醋炒 礪砂 研 木通 各壹分

右一十二味搗羅為細末酒煮麵糊和丸  
如梧桐子大每服十九鹽酒下食前服

治厥疝上搶心腹冷痛山茱萸丸方

- 山茱萸 吳茱萸 湯洗焙 食茱萸 棟實
  - 剉碎 馬蘭花 懷香子 炒 青橘皮 湯去 陳
  - 橘皮 湯去 乾薑 炮 京三稜 炮各分 附子 重一枚
  - 兩者炮裂 去皮臍
- 右一十一味搗羅為細末醋煮麵糊和丸



如梧桐子大每服二十九酒或塩湯下空  
心服

治厥疝腹中冷痛當歸乾薑湯方

當歸炮切乾薑炮附子炮裂去皮臍人參 甘草

炙細辛去苗葉芍藥各壹兩

右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞

煎七分去滓温服不拘時

治厥疝逆上攻腹冷痛木香湯方

木香 檳榔生剉烏頭炮裂去皮臍細辛去苗葉當

歸炮切吳茱萸湯洗焙乾炒枳殼去瓢炒甘草炙各

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞

煎七分去滓温服不拘時

治厥疝冷逆攻心腹痛細辛丸方

細辛去苗葉芍藥 吳茱萸湯洗焙乾炒人參

白朮去皮桂皮去麤皮乾薑炮甘草炙當歸炮切附

子炮裂去皮臍各壹兩

右一十味擣羅爲細末稀麩糊丸如梧桐

子大空心米飲下三十九日三

寒疝心腹痛

疝者痛也本由寒氣內積陽衰陰盛不得散  
釋寒邪因得攻擊或上搶心或腹內疝刺發  
即俱痛故名寒疝心腹痛也

治寒疝心腹痛胃脇支滿不下食汗出嘔逆  
人參湯方

人參 白茯苓 去黑 檳榔 剉 木香 芍藥

芎藭 當歸 切 桂 去 麤 青橘皮 湯浸去白

右九味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服不拘時

治寒疝心腹痛芫胡湯方

芫胡 去苗 大棗 去核 焙 黃芩 去 人參 甘

草 炙 半夏 湯洗去滑 桂 去 麤 芍藥 各壹

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半薑

黃棗大切煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝心腹痛或逆搶心煩滿不得卧惡風

驚惕不食變發寒熱吳茱萸丸方

吳茱萸 湯洗焙 細辛 去苗 芍藥 芫胡 去



旋復花 黃芩去黑皮 紫苑去苗土 人參 白

木 白茯苓去黑皮 乾薑炮 桂去皮 附子炮裂

去皮 甘草炙 半夏湯洗七遍去滑 當歸切焙各

右一十六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十九至三十九溫酒下不拘時

治寒痲心腹痛不可忍汗出悶絕椒附湯方

蜀椒去目并開口炒 附子炮裂去皮 粳米

出汁 乾薑炮 半夏湯洗七遍去 甘草炙

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞

半入半薑半分切棗二枚擘破煎至一盞  
去滓溫服空心食前

治寒痲心腹痛附子丸方

附子炮裂去皮 桃人去皮尖雙人 蒺藜子

炒去角 壹升

右三味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每

服二十九溫酒下不拘時

治寒痲心腹痛汗出厥冷地黃湯方

牛乾地黃焙 甘草炙 白茯苓去黑皮 人參

當歸 切焙各二兩 羊肉 去脂切叁斤

右六味前五味細剉將羊肉用水二斗煮取汁一斗去羊肉入諸藥煮取七升人葱白一把切棗十四枚擘破再煮取六升絞去滓每溫服一盞不拘時

治寒疝心腹痛裏急當歸湯方

當歸 切叁兩 生薑 切五兩 羊肉 去脂膜切作片一斤

右三味以水壹斗煮取五升去滓每溫服壹盞不拘時日三夜二

寒疝積聚

氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚蓋積者陰也陰沉而伏發則不離其部聚者陽也陽浮而動上下無所留止其痛無定處令人洒淅惡寒飲食不為肌膚或吐利脹滿或心下如覆杯腹中如中臂所橫皆寒疝積聚之證也

治寒疝邪氣往來堅固積聚不散多寒不得卧苦汁出大小便不利桔梗九方



桔梗 到炒 葶藶子 紙上熬壹兩壹分 藜蘆 去蘆頭

厚朴 去麤皮生薑汁塗 杏仁 去皮尖雙入

附子 炮裂去皮臍 桂皮 去麤皮 人參 沙參 各壹兩壹分

特生礬石 壹兩燒半日許

右壹十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服五丸或七丸米飲或溫酒下日三

治寒疝積聚大如臈形小如杯狀乍來乍去

腸胃脹滿寒則腸鳴心下寒氣上搶胃脇支

滿芫花丸方

芫花 醋炒 蜀椒 去目并閉口炒 大黃 到炒壹

細辛 去苗葉 桔梗 炒壹分 烏頭 炮裂去皮

吳茱萸 湯洗焙 芍藥 白茯苓 去黑皮 龍

膽 半兩湯洗七分

右壹十壹味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服一丸米飲或溫酒下日三利下

毒物為効

治寒疝積聚邪氣往來厥逆搶心痛羸瘦少

氣胃脇滿不嗜食續命丸方

食茱萸

貳兩半炒

芍藥

細辛

去苗葉

前胡

去頭各

一分 乾薑

烏頭

炮裂去皮臍

紫苑

去苗

黃芩

去黑心

白朮

白薇

芍藥

人參

生薑

地黃

焙各一分

蜀椒

去目并閉

桂皮

去各

貳兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜和凡如梧桐

子大每服七丸米飲或溫酒下食前服

治寒疝積聚來去攻擊疼痛不欲飲食木香

湯方

木香

訶梨勒皮

炮

檳榔

判

厚朴

去麤皮

汁炙

青橘皮

湯浸去白

白朮

焙各半兩

人參

桂

去麤皮

赤茯苓

去黑皮

右九味麤擣篩每服三錢匕水壹盞生薑

三片煎七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚胃腹堅急脹滿不食檳榔湯方

檳榔

生

桃人

去皮尖

郁李人

炒去

木香

京三稜

炮各兩

桂皮

青橘皮

湯浸去白

焙各半兩

右七味鑊擣篩每服三錢匕水壹盞生薑



三片煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚心腹結痛飲食不下鼈甲湯方

鼈甲醋炙去京三稜炮大黃剉炒各當歸

切桂皮去麤赤芍藥 木香 枳殼去瓢炒訶

梨勒炮取檳榔剉各

右壹十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生

薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝凝結積聚不散攻注腹內疼痛不下

飲食白朮湯方

白朮二兩赤茯苓去黑枳殼去瓢炒人參 桔

梗剉桂皮去麤京三稜炮檳榔剉各

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚結塊攻注心腹脹滿檳榔湯方

檳榔生剉芎藭 桔梗剉當歸切桂皮去麤赤

芍藥 白朮 木香各半大黃剉碎微

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至

六分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚心腹疼痛結塊不消桂心湯方

桂去麩皮大黃略地桔梗剉附子炮裂去木香

白朮當歸切檳榔赤芍藥各壹高良

薑剉芎藭枳實各半兩炒各壹兩

右一十二味咬咀如麻豆每服三錢匕水

一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚臍腹疼痛兩脇脹滿藁香干散

方

藁香干炒檳榔炮京三稜炮青橘皮湯白

鹽炒黃木香各半兩分一

右五味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許

沸湯點服不計時候

七疝

疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥

疝腹中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝

寒飲則脅下腹中盡痛者名寒疝腹中乍滿

乍減而痛者名氣疝腹中痛在臍傍者名盤

疝腹中痛在臍下有積聚者名臍疝少腹與



陰相引而痛大便難者名狼疝凡此七疝皆由寒氣內積血氣凝澀不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難經曰任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚蓋明此也  
 治七疝諸寒在臍傍痛上又胷中滿少氣椒薑丸方

蜀椒 去目及閉口炒 乾薑 炮 厚朴 去麤皮  
出汗壹兩壹分 細辛 去苗 芍藥 去麤皮 桂 各壹兩  
炙 真琴心 去黑 烏喙 炮裂去皮 芫胡 去苗 白茯苓 兩  
炒 桔梗 兩

去黑牡丹皮 各一分

右壹十二味搗羅和末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下日三服

治諸疝桃人湯方

桃人 去皮尖 吳茱萸 湯洗焙 陳橘皮 湯浸  
雙八炒 海藻 洗去鹹 白茯苓 去黑皮 羌活 去頭 蒺藜  
炒 子 各叁兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑壹棗大切煎至七分去滓溫服不拘時

治七疝或心腹厥逆不得氣息痛達背脊或  
心下堅痛手不可近或臍下堅痛得寒冷食  
輒劇或脅下堅痛大如手或少腹脹滿引膀  
腕急痛或女子月事不時椒附丸方

蜀椒

去目及閉口者  
炒出汗膏兩

桔梗

判炒

芍藥

乾薑

炮麻朴

去麤皮生薑汁炙

細辛

去苗葉

附子

炮裂去皮臍各

半烏頭

炮裂去皮臍各分

右八味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲或溫酒下日三服

治七疝臍腹堅痛蓬莪茂丸方

蓬莪茂

判炮

木香

大黃

判炒

當歸

判炒

芎藭

京三稜

判炮

草豆蔻

去皮

桃人

去皮尖

雙人炒

各二兩

肉豆蔻

炮半

乾漆

炒令煙出壹兩

右壹十壹味擣羅為末醋麵糊為丸梧桐子大每服二十九溫酒或生薑湯下不拘時

治七疝肢體寒臍腹堅痛滿悶厚朴丸方

厚朴

去麤皮生薑汁炙

附子

炮裂去皮臍

藁杏子

炒白



木剉炒桂皮去麤乾薑炮枳殼去瓢炒青橘皮易

去白芎藭烏頭炮裂去木香炮常歸切

各壹兩

右壹十二味搗羅為丸鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下半薑湯亦得不拘時

蠱病

內經謂脾風傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱而痛出白一名曰蠱夫脾受風邪傳於腎經

邪熱內爍故其證少腹寬熱而痛真精不守故其證溲出白液病名曰蠱以邪熱內爍真精不守久而弗治適以喪志也水之精為志志喪則精從之左傳謂惑以喪志為蠱者如此

治蠱病少腹急痛便溺失精大建中湯方

黃耆剉遠志去心當歸去頭澤瀉各壹兩芍藥

人參 龍骨 甘草各二兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水二盞生

薑三片棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服不拘時候

治蠱病少腹冤熱而痛精氣不守洩便出白澤瀉丸方

澤瀉剉補骨脂炒巴戟天去心五味子石

斛去根芍藥人參甘草炙各一兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒或鹽湯下空心日午臨臥各一

治蠱病少腹冤熱而痛便溺出白肉菘蓉丸方

肉菘蓉去皴皮酒浸切焙白茯苓去黑皮黃耆剉澤

瀉牡蠣火煨研五味子龍骨當歸切

各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下空心日午臨臥各一

治蠱病少腹熱痛精液出白磁石丸方

磁石火煨醋淬七遍龍骨各壹兩白茯苓去黑皮牡蠣



火煨各  
貳兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每  
服三十九鹽湯下空心日午臨臥各一

治蠱病精氣不守便溺出白少腹寃熱而痛

乾地黄丸方

熟乾地黄

焙貳兩

鍾乳粉

半兩

龍骨

菟絲子

酒浸壹宿別搗

磁石

火煨醋芍藥

黃芩

去黑心各壹兩

右七味搗羅為末酒煮麩糊丸如梧桐子  
大每服二十九溫酒或鹽湯下空心日晚

拔粹方

痢證

治奔豚及小腹痛不可忍者苦練丸

苦練

茴香

各一兩

黑附子

一兩炮去皮臍

右川酒二升煮酒盡為度曝乾或陰乾搗  
為極細末每壹兩藥末入

全蝎

拾捌介

玄胡

五錢

丁香

十五介

右共為細末酒糊為丸桐子大每服百丸  
空心酒下如痛甚煎當歸入酒下火効

瑞竹堂方

小腸疝氣

香蝎散治小腸疝氣陰囊腫痛

乳香錢一 蝎梢錢二 川烏頭去皮生用三錢

右為細末每服壹錢水壹盞煎至七分入

搯少許空心連滓熱服立見效

玉蟾禪

三歲嬰孩性不調休教二子放踈嬌一張  
衲被蒙頭了自有神仙路一條

煮禪藥

山茱萸 吳茱萸 蛇床子 牡礪 川

椒 葱白帶髮

右各等分為咬咀每用三錢熬水熏洗

神効九治疝氣奔豚嬰孩秘訣 疝氣因何

得邪風在腎經流傳并血聚如此漸成形冷  
氣結在臟因茲小腹疼本經無補法踈利藥

通靈

芫花半兩醋浸炒 木香 檳榔 三稜各半兩炒 茯苓



芩 青皮 全蝎 附子 炮 礪砂 桂 各

半錢

右將礪砂用水浸磁盞內沉去泥土留湯  
瓶頭頓成膏子糠醋打糊為丸如菜豆子  
每服三十丸空心溫酒送下

喝起丸治小腸氣及腰痛

革薺 杜仲 酥炒 葫蘆巴 生芝 破故紙 炒

小茴香 已巳各壹兩 胡桃仁 貳兩湯

右將胡桃為末同前五味藥末為丸如梧

桐子大每服三五丸空心塩酒送下或  
塩湯亦可

飛黃丹治小腸疝氣疼痛 彭文恕外郎傳川

帶毛雀兒取去腸肚將金絲礬細研裝於

雀兒肚內滿縫合用桑柴火緩緩煨燒成

灰研為細末空心用無灰酒調下恐惡心

入塩少許年遠者每服二枚近者一枚累

有效驗

木香練子散治小腸疝氣膀胱偏墜久患藥

不効者服此藥其効如神燕同知秘傳

川練子三十介為末未碾前先用巴豆不用

用革薺兩半石菖蒲兩青木香兩荔枝

核二十介炒

右為細末每服二錢重入麝香少許空心

炒茴香鹽酒調下

通氣散治小腸疝氣腰腹牽引疼痛及感風寒或因勞動腰痛并治婦人吹妳心氣脾痛瘡癤已潰未潰悉治有功

穿山甲

割碎用蛤粉炒白牽牛壹兩玄明

索

夫皮壹兩陳皮壹兩白淨木香壹兩舶上硫

黃

二兩厚朴壹兩甘草壹兩黑牽牛半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下病在

上者食後

木賊散治小腸疝氣

木賊

不以多少去節先將錮子燒熟取离火炒

右碾為細末空心熱酒調下衛生易簡方湯調二錢

四聖散治小腸膀胱疝氣疼不可忍者



川練子炒黃胡椒 茴香炒全蝎炒已上各半兩

右為細末每服二錢空心熱酒調下

香妙丸脫烈平章服得效

茴香鹽炒香去新蠶沙晒乾

右等分為細末煉蜜為丸如彈子大空心

細嚼溫酒送下甚者日進二服方同

安息香丸治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬

如石痛不能忍者

玄胡索微炒海藻洗昆布洗青皮去白茴香

炒川練子核馬蘭花已上各木香半兩不

大戟酒浸三宿切片焙乾秤三錢半

右為細末另將礪砂真阿魏真安息香三

味各二錢半用酒膏盞醋一盞將礪砂阿

魏安息香淘去沙石用酒醋各一盞熬成

膏子再入麝香壹錢沒藥二錢半俱各另

研細入前藥壹同和丸如菉豆大每服一

十丸至十五丸空心用繇子灰調酒送下

醫方大成

和劑方茱萸內消圓治腎與膀胱經虛為邪  
氣所搏結成寒疝陰囊偏墜痛連臍腹小腸  
氣刺奔豚瘕癖前皆治之

馬蘭花醋山茱萸去核陳皮去白吳茱萸湯洗

青皮去白肉桂去皮山藥焙川練子去蒸

皮各木香一兩不一

右為末酒糊圓如梧桐子每服五十圓空

心溫酒搯湯任下醫方集成南北經驗方

百一選方十補圓小腸寒疝膀胱伏梁奔豚

疝氣並皆治之

附子壹兩用防風壹兩如黑豆大鹽四

附子去胡蘆巴 木香 巴戟去心川練子

炮取官桂 延胡索 葶澄茄去舶上茴

香炒破故紙炒各壹兩

右為末用糯粉酒打糊圓如梧桐子辰砂

為衣每服五十圓空心酒下玉機微婦人

醋湯下若人益智子亦可醫方集成南北

方類鈔



南北經驗方

和劑方異香散治腎氣不和腹脇膨脹飲食  
難化噫氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛此  
藥最能治之

石蓮肉去皮壹兩蓬莪術煨益智仁炒去殼京三

凌包甘草炙各六兩青皮夫陳皮夫厚朴

去皮姜炙二兩

右為末每服三錢水壹盞姜三片棗壹枚  
煎壹捻同煎熱服

永類鈴方

諸疝

治膀胱腫痛及小腸氣陰囊腫毛閉水出

烏藥剉舊酒良姜 舶上茴各乙青皮淨

兩○南生易簡方一兩六白

右為末每二錢遇發熱酒調

又方杏仁乙舶茴乙葱白焙乾

右同為末酒調嚼胡桃下衛生易簡方同

葵子湯治膀胱實熱腹痛小便不通口舌乾

燥咽膈不利

赤茯苓 朱苓 葵子 枳實炒 瞿麥

木通 黃芩 車前子炒 滑石 甘草各

分

右咬咀每四錢水蒸半姜五片煎八分溫

服無時玉機微義每半兩

直指四神元治腎冷疝氣脹痛不已方見本方

活人事證方香殼散治同前

黑牽牛三錢 茴香乙兩 玄胡索半兩 枳殼炒

半或加檳榔

右為末每三錢熱酒調下

經驗秘方

膀胱疝氣

玄應凡治奔豚疝氣應下部之疾並治

沉香 木香 山茱萸去核 石茱萸 吳

茱萸 香附白鹽炒 破故紙 橘皮 赤

芍藥各半 桃仁麥麩炒去皮 茴香生薑

炒川練子去核 蒼朮米泔浸 川椒去目閉



用牛青塩壹兩以甜酸草揉成團糯米合

兩斑猫七十介夫類足翅巴豆七粒去殼設同炒以米黃色為度去豆猫不用

右細末以米醋煮米粉糊丸如桐子大如

見發以燈草煎湯調四苓散送下二十九

空心塩湯温酒任意送下者乃常服之法

也服此能忌羊雞麵食必可除根

治小腸氣大效

伏肉豆豉壹抄獨蒜壹乾

右二味一處搗爛用無灰酒空心熱調服

治陰證小腸氣以好熟艾半兩用磁碗二隻

壹隻放艾在內用火點著上川壹隻盖定

燒作灰勿令出烟為細末分作三服將二

服為壹服以熱酒調服汗出為度如一頓

飯時無汗再將余壹服依前以酒調服汗

必出

椒朴元治偏墜木腎囊腫

川椒 厚朴 青塩 小茴香 木香

右各二兩咬阻於砂鍋內用水浸藥過一

指高文武火煮乾日晒乾為末酒糊丸如桐子大每服三四十九空心塩湯下

丁香疝氣丸治臍下撮急疼痛并臍下周身皆急痛小便頻清其五脉急洪緩澁沉按之

虛獨腎脉按之不急皆虛無力名曰腎疝

當歸 茴香 玄胡 各半兩 麻黃 根節 肉桂 各一

錢甘草 丁香 木香 川烏 各半兩 羌活

三錢防已 三錢 全蝎 三介

右細末酒糊丸如雞頭仁大每服五十九

空心温酒塩湯任下

香砂丸治小腸疝氣 脫烈平章經效

茴香 塩炒香去塩 新蠶沙 晒乾

右等分為末煉蜜丸如彈子大空心細嚼

温酒送下日進三服

又方小腸氣疼痛之甚每用斑猫不以多少

炒熟以絲裹外又用絲裹熨疼處如使紅每

用帶根葱新瓦上焙焦黃為末酒調服大效

經驗良方



疝氣膀胱

治膀胱氣痛不可忍醫者投剛劑其痛尤甚  
 小便三日不通陰陽痞塞惟有待死適遇明  
 醫投五苓散壹兩分而為三各用葱鬚三根  
 茴香及塩少許連服中夜下小便如黑汁者  
 壹二升臍下寬得睡續服硃砂圓數日而安  
 盖此疾本因虛而得不宜驟補邪之所湊其  
 氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄  
 之邪然後補之五苓散方見傷寒門

治疝氣

川練子二拾一介內七介用海金沙二錢  
 炒去砂七介用斑猫虫二錢炒去  
 虫七介巴豆船上茴香木香黑牽牛  
 二錢炒去豆頭破故紙胡蘆巴炒烏藥去心玄胡索各  
 末兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五  
 拾丸空心鹽湯下

桃仁膏治疝氣膀胱小腸氣痛不可忍

桃仁去皮茴香各一  
 尖炒

右為細末每服二錢先以葱白三寸煨熟  
搗藥細嚼空心熱酒調下

又方荔枝核冬橘核等分二味燒存性為細  
末溫酒調下一錢

治小腸氣出黃帝  
素籥論

全蝎梢七介於懷中頃  
時候暖為末 玄胡索五川練子  
錢

五箇燒  
存性

右為末以酒調下半飢飽服之即愈

治膀胱腎腫去斗圓

局方紅圓子 連翹圓 青木香圓各一  
貼

右用班猫二拾壹箇同藥用磁銚慢火炒  
令班猫黃黑色連藥傾在地上去火毒壹  
伏時去班猫却將藥於布袋中掣去班猫  
屑分作拾服空心酒吞服不飲酒溫塩湯  
下其病雖大如斗亦安

治陰痛腫滿欲死右取生椒令淨略炒以布  
帛裹著腎囊令厚半寸須臾熱氣自通冷  
則再易可消



治外腎腫硬右以鶴虱又名拈衣草為末川  
津唾勻於手內握揉溫熱烱腫處即安

治小腸膀胱腎大外腎腫大下閉塞不通

川練子拾个每个作四片舶上茴香炒與川練子木香各等分

巴豆五粒連殼打破同川練子微火炒川練子紫色去巴豆不用木香

右為細末每服二錢用好酒壹盞連根葱

一寸同煎令葱熟去葱調藥末頓服空心

下三服見效下泄過立安

煎散治小腸久積寒氣築痛

青皮去凹○吳氏集驗方去白肉桂皮去乾姜炮各乙茴

香沙南木香 益智仁 川烏炮各半錢甘草

炙少許

右咬咀每服肆錢水一大盞煎壹捻煎七

分空心服集驗方吹咀作壹服水二盞煎一分空心

香附子圓治膀胱氣腫痛

香附子去毛淨洗用米醋煮乾為末醋糊為丸

右用木饅頭壹箇生薑一小片連皮雷爛

同炒入塩少許將水壹大盞煎兩三沸去

淬嚙下二拾丸

神聖代針散治一切厥心痛小腸疝氣痛不可忍及心驚欲死及小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛婦人血迷血癖血刺血衝心但一切痛楚服之大有神效孕婦勿服

乳香別研沒藥別研當歸 白芷 川芎各半

元青乙卯即班茅虫用糯米一處微火炒米

黃色去元青將糯米掣去屑為木

右各為極細末和勻每服壹字甚者二字藥如小錢壹字上多先點好茶壹盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之

川練散治小腸氣膀胱氣疼痛不可忍

川練子乙卯每介青皮湯浸去白切舶上

茴香乙卯木通二巴豆五拾个去散不出油

右件五味壹處炒令黃色去巴豆不用再入海金沙壹錢桂府滑石壹錢半同杵細末每服壹錢煎葱白酒熱調下



化生圓治小腸疝氣痛上引腰脊身不能直

木香二錢半 檳榔生用 三棱煨 莪術煨 川練

子肉煨 陳皮 芫花醃 青皮各半 巴豆粒拾

去殼

右陳皮青皮同巴豆炒黃色去巴豆不用

為細末麵糊丸梧桐子大空心溫酒鹽湯

任下三拾丸

茴香散治寒濕氣入小腹疼痛或外腎腫痛

茴香一兩 川練肉炒 破故紙炒 香附子 猴

查子各半兩  
去核

右為末每服二錢空心溫酒鹽湯任意調

下日叁服初生小兒女皆可服如樂冷將

盞盛藥於熱湯內坐熱塗母乳與喫男子

是小腸氣女兒是盤腸氣

又方高良姜 山梔子 鬱金各半

右為細末空心葱湯調下服二錢

又方新嫩槐枝一握水二盞煎一盞分作二

次熱服

煙霞聖効方

立効方治男子小腸氣膀胱氣痛或小便不通  
婦人亦治

搯鼓合一蒜顆

右同搗極爛如泥用好酒半椀溫熱得所  
調下立止多年困篤者不過二服

治小腸氣疼痛不可忍者臨滯張先生傳此方

蛇床子 荆芥穗各一兩

右為麤末每川半兩水二椀砂鍋內熬沸

就熱於臍上下淋洗輕者三兩次重者五  
七遍即愈

醫方類聚卷之九十