

19103/2955(11)

古今醫統大全卷之十五目錄

中寒門

病機

中寒敘論

中寒與傷寒不同

脉候

治法

中寒誤作中風治必死

温中要知温血

藥方

中寒本元氣大虛

中寒候絕無發熱證

寒中三陰治法各異

韓祗和温中深得中寒之旨

哈佛大學
哈佛燕京
圖書館
珍藏印

附子理中湯

韓氏溫中湯

姜桂散

沉附湯

附子散

參薑湯

茱萸四逆湯

木附湯

養正丹

人參養胃湯

治中湯

生料五積散

沉香桂附丸

易簡方

熨法

灸法

心惡寒候

病機

治法

卷之十六目錄

心暑證門

病機敘論

暑傷五臟為證不同

暑有中傷感之分

中暑中熱之異

傷暑有八證

脉候

治法

治暑宜補元氣為主清利次之

辨夏月伏陰在內用大順湯二者之疑

藥方

三才圖會卷之十六目錄

清暑益氣諸劑

清暑益氣湯

人參益氣湯

人參白虎湯

十味香薷飲

生脉散

竹葉石膏湯

清暑諸方

香薷飲

黃連香薷飲

白虎湯

香連丸

五物香薷飲

消暑導濕諸方

益元散

五苓散

通苓散

桂苓甘露飲

温中理脾諸方

縮脾飲

冷香飲子

大順散

二氣丹

因消暑丸

雜著香薷湯

薑朴湯

易簡方

卷之十七目錄

向濕證明

病機

內經敘論

濕證多為脾虛所致

濕病要分表裏上下四證

脈候

治法

治濕以理脾清熱分利小便為主

治濕不宜大汗及熱藥 濕不可作中風治

因證裁方

藥方

通治濕劑

二朮四苓湯

防己黃蘗湯

除濕湯

大橘皮湯

平胃散

清利之劑

五苓散

茵陳五苓散

加味五苓散

葶藶木香散

桂苓甘露飲

清燥湯

表散升上劑

羌活勝濕湯

麻黃白朮湯

升陽除濕湯

升陽除濕防風湯

除風濕羌活湯

溫散諸方

三才圖會卷之二十一 濕病

桂枝附子湯

甘草附子湯

溲濕湯

濟生附子湯

羌附湯

生附湯

踈裏攻下諸方

神祐丸

舟車丸

導水丸

濬川散

易簡方

△附身重證

病機敘論

治法

治身重除濕為本

藥方

參朮湯

甘薑苓朮湯

防已黃耆湯

五積散

鍼灸法

卷之十八目錄

△疸證門

病機敘論

黃疸有五種

疸證以濕熱為源

內傷發黃

脈候

治法

治黃疸用張子和三法分表裏極効

治疸證利小水為捷徑 不治證

藥方

通治疸證諸方

加味五苓散

茯苓滲濕湯

茵陳散

必効散

柴苓梔子湯

黃汗

黃耆散

杜枝加黃耆湯

黃疸

茵陳瓜萹散

小半夏湯

梔子硝石湯

搐鼻方

酒疸

葛根湯

白朮散

酒蒸黃連丸

如神散

穀疸

穀芽枳實小柴胡湯

穀疸丸

茵陳蒿湯

女勞疸

滑石散

黃連散

食勞疸

膽礬丸

康礬丸

小建中湯

養榮湯

附黃腫證

粉餐平胃丸

紫金丸

卷之十九目錄

燥證明

病機敘論

燥以風熱為源

燥因血少腎水不足

脉候

治法

治燥以滋陰養血為本

治燥用風熱藥不可太過

藥方

養血潤燥諸方

潤劑生血潤膚飲

導滯通幽湯

桃仁四物湯

六味地黃丸

大補陰丸

清氣化痰甘露丸

瓊脂膏

瓊玉膏

天門冬膏

地仙煎

活血潤燥生津飲

風燥諸方

潤腸丸

麻仁丸

秦艽丸

脾約丸

生津甘露飲

和血益氣湯

辛潤緩炕湯

活血潤燥丸

卷之二十目錄

火證門

病機敘論

火有君相五志之異

相火動為諸證

脈候

治法

火有微甚治有逆從

治熱不寒當求其屬
火有虛實治有補瀉

火有君相藏府分治之宜

藥方

寫心湯

導赤散

茯苓散

寫青丸

左金丸

寫白散

清金丸

麥門冬湯

朱砂涼膈丸

橘皮湯

生薑馬腸湯

寫黃散

瀉熱湯

石膏丸

滋胃丸

大補丸

補陰丸

六味地黃丸

涼膈散

三補丸

升陽散火湯

寫陰火升陽湯

黃連解毒湯

梔子仁湯

防風通聖散

防風當歸飲子

滋陰降火湯

黃芩湯

桂苓甘露飲

紫雪

大金花丸

神芳丸

當歸龍薈丸

瓜蒂散

三聖散

調胃承氣湯

卷之二十一目錄

積熱門

病機敘論

內熱外熱之異

孰有在氣在血之分

孰證病機不出三家之旨

積熱由漸

脈候

治法

治熱有表裏之分

治熱有補血補氣之宜

虛熱發汗之誤

丹溪治義

藥方

通治諸經積熱之劑

三黃湯

黃連解毒湯

涼膈散

金花丸

三黃丸

神芩丸

黃芩湯

瀉心湯

茯苓散

瀉白散

瀉青丸

天門冬散

人參瀉肺湯

赤茯苓湯

半夏湯

利耳散

龍腦雞蘇丸

瀉黃散

既濟清神散

地黃煎

清明粉

香連丸

碧雪

消毒犀角飲

鮮表執諸方

人參敗毒散

參蘓飲

乾葛解肌湯

九味羌活湯

六神通聖散

攷裏執諸方

大金花丸

調胃承氣湯

三一承氣湯

當歸承氣湯

三十一承氣湯

十一

積熱金花丸

八正散

蕪退表裏熱方

雙解散

小柴胡湯

大柴胡湯

防風通聖散

柴胡飲子

防風當歸飲子

清氣分熱方

人參白虎湯

清心蓮子飲

清氣散

涼血分熱方

四物二連湯

四順清涼飲子

清鎮安神方

朱砂安神丸

牛黃膏

至寶丹

內傷虛熱方

補中益氣湯

升陽益胃湯

十全大補湯

滋陰退熱方

滋腎丸

補陰丸

六味地黃丸

治暑黃連香薷飲

火鬱湯

易簡方

痢冷門

病機敘論

痢冷為陽氣衰脾胃虛

痢冷證多吐瀉飲食不化

脈候

內經治法

陽虛生外寒者治從丹溪

痢冷者貴乎溫補不可太剛

藥方

附子理中湯

薑附湯

沉附湯

真武湯

十全大補湯

八味丸

附子茴香散

沉香薑澄茄散

三建湯

樹附丸

復陽丹

麝香鹿茸丸

著附湯

參附湯

茸附湯

黑錫丹

養正丹

金瑣正元丹

來復丹

安腎丸

接陽丹

雄朱花

兜肚方

保真膏

三十五卷之二十二目錄

洗浴法

灸法

易簡方

古今醫統大全卷之十五

新安東臯徐春甫編集
太倉改齋支秉中校正

命門

病機敘論

經曰冬三月此謂閉藏水冰地圻無擾乎陽早卧晚起必待日光
使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣
奪此冬氣之應藏養之道也逆之即傷腎春為痿厥奉生者少
又曰陽虛生外寒者陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣
在外上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄

陰盛生內寒者因厥氣上逆寒氣積於胃中而不泄不泄則溫氣去寒獨留則血凝血凝則脈不通其脈盛大以澁故中寒又曰寒氣入經而稽遲泣而不行客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛因重中於寒則痛久矣
寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮蹇縮蹇則脈絀急絀急則外引小絡故卒然而痛得熱則痛立止
寒氣上及小腹血泣在下相引故腹痛引陰股寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經與氣稽留不得行故宿昔而成積

寒氣客於五藏厥逆上出陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人

氣復反則生矣○寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也○寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛○

原滿式曰諸病上下所出水液澄澈清冷下利清白吐利腥穢食已不饑堅痞腹滿急痛癢癢癩疝屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒

中寒本元氣大虛

中寒候世俗所謂陰證傷寒悉以房中受寒傷冷而歸患家患家本無房事堅不肯認陰證中寒之劑固拒不肯服惟任他證處治則樂從之嗚呼每每誤死者不可勝紀殊不知中寒之候先由五臟不足元氣大虛寒邪冒中直入陰經而為中寒之候即為陰證是也拘於房室豈不誤哉

中寒與傷寒不同

玉機微義云中寒則倉卒受病邪氣直入於三陰急痛拘牽戰慄強直昏迷厥冷口禁失音此中寒也以溫中散寒為主傷寒之人因其舊有鬱熱風寒外來肌腠自密鬱而為熱寒邪客於經絡先頭痛身熱惡寒此傷寒也當以仲景例治之

中寒候絕無發熱之證

中寒候因寒邪乘其膚腠踈豁直入腎經不循經絡無熱可發故卒暴厥冷口禁腹痛唇青昏危如中風之狀若治稍緩則必死矣

脉候

咏經曰遲緊為寒○遲澁沉細為寒○脉堅絃或沉細皆中寒也

中寒脉散者死○尺脉遲滯其在下焦

治法

中寒誤作中風治者必死

寒中三陰一時暴卒昏不知人口禁失音四肢強直掣急夜痛亦似中風若以風藥治之即死急以附子理中湯若厥逆唇青囊縮無脉者用葱熨法仍灸氣海關元二三十壯脉漸出手足漸溫乃可生也

寒中三陰治法各異

寒中太陰則中脘疼痛治宜理中湯○寒中少陰則臍腹疼痛治宜五積散加茱萸○寒中厥陰則少腹疼痛治宜四逆湯加茱萸

倍加附子

温中要兼温血

温腎禦寒如乾薑附子川烏天雄葶左之以養正靈砂丹然寒傷榮血徒知温腎不知温血恐未必有十全之功是則官桂當歸為温血之上藥也

韓祗和温中深得中寒之旨

韓氏著三陰經方立温中例雖不言中寒而深得中寒之旨所以有急用薑附温中救裏之法大有見焉

藥方

附子理中湯 治五藏中寒口噤強直失音不語手足厥冷

熟附子

人參

乾薑炮

白朮

炙甘草各一錢

右咀水盞半煎八分口噤者灌之

韓氏温中湯

凡病人兩手脉沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脉

短少及力少於關尺者此陰盛陽虛也或胃膈滿悶腹中脹滿

身體拘急手足厥冷急宜温之

丁香

丁香各五分

厚朴

乾薑

陳皮

白朮各一錢

右水盞半葱白荆芥穗同煎

良薑桂散 温中散寒

乾薑

良薑各錢半

辣桂

木香

半夏麩

甘草各一錢

右水二盞薑五片棗二枚煎八分不拘時服

沉附湯 治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子

乾薑炮各一錢

沉香五分

白朮

甘草各錢半

水盞半姜五片煎八分食前服

附子散 治中寒陰證唇青面黑身背強直四肢厥冷諸虛沉寒

熟附子三錢

官桂

當歸

白朮

乾薑炮

半夏麩各一錢

右咀每服五錢水盞半姜五片棗二枚煎八分食前服

明發參薑湯 治氣血兩虛而中寒者

人參錢半

乾薑一錢

當歸五分

薄荷二分

炙甘草二分 右水一盞姜三片棗一枚煎七分執服

茱萸四逆湯 治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸炮

附子炮

乾姜各二錢

炙甘草錢半

右水盞半煎七分執服

木附湯 治中寒中氣四肢逆冷口噤牙關緊急痰盛脈弱

白朮一錢

附子炮二錢

甘草二錢

右作二服每服姜三片煎七分化蘓合香丸并連進三服有功

或氣短頭暈手足厥逆未退者可進養正丹三十粒至百粒効

養正丹 方見頭暈門

人參養胃湯 治外感內傷諸寒虛證

人參

蒼朮

厚朴姜製

半夏炮各二錢

陳皮

茯苓

藿香

草果各三分

炙甘草三分

右水二盞姜七片烏梅一箇煎七分不拘時服

生料五積散 治感冒寒邪頭疼身痛項重拘急惡寒嘔吐肚腹

疼痛外感風寒及寒濕客於經絡腰脚痠隨並皆治之

白芷七分

陳皮一錢

厚朴製八分

桔梗五分

枳殼八分

川芎

炙甘草

茯苓各五分

蒼朮

當歸

麻黃各一錢

肉桂三分

芍藥

乾薑炮各八分

半夏炮一分

右水二盞姜三片葱白三莖煎一盞不拘時服

出濕門脚氣脚跟痛

治中湯 治脾胃虛寒嘔逆霍亂痞滿方見脾胃門

沉香桂附丸 治中寒心腹疼痛霍亂轉筋等證

沉香

附子炮

乾薑炮

良薑炒

桂去粗皮

茴香炒

川烏炮

吳茱萸湯洗炒

右各一兩為細末用好醋煮麩糊丸梧桐子大每服五七十丸米飲送下空心食前日進二服忌生冷硬物

一方用黑豆二合炒熟以酒烹入滾數沸去豆取酒服二碗即愈

一方以胡榭搗用滾酒泡服外用葱鹽熨法

一方用活雄雞一隻以刀破腹乘熱合臍上効

熨法 用食鹽一斤炒乾大熟用布二層盛裹熨臍冷即易執者
上陽回即已○一法用吳茱萸二升酒畧炒煮濕以絹袋盛之
蒸極執熨心腹及手足之心候氣通暢則止屢効○一法治中寒
不省人事氣虛陽脫腹痛唇青以葱一握束縛如餅切去根葉
惟存白二寸許先以火烙一遍令通執勿灼着病人臍上下似
熨斗熨之令葱執氣透入腹內更作三四餅一餅壞不堪熨又
易之候患人手足温有汗乃止更作葱湯一盃服良

灸法

氣海

一穴在臍下一寸五分
厥陰脉微絕灸二十壯

石關

一穴在臍
下二寸

關元

一穴在臍下三寸治藏結不可攻者及陰汗
不止腹脹腸鳴面黑指手青者宜灸百餘日

惡寒候

病機

經曰陽虛生外寒蓋陽氣不能外衛所以惡寒宜用參芪之類甚
者加附子

病久而惡寒者亦宜解鬱丹溪云惡寒非寒明是執證亦有久服
執藥而得者河間謂火極似水執甚而反覺自冷實非寒也有用
執劑而少愈者蓋辛能散鬱火暫開耳

丹溪醫案治一壯年惡寒自用附子藥多用吐痰法及養血清執
而愈

又治一飲酒人惡寒顫慄濕執內鬱以黃芪二兩乾葛一兩煎飲

之大汗而愈

古今醫統大全卷之十六

暑證門

病機

暑證敘論

內經曰夏至後病熱為暑暑當與汗皆出不止又曰因於暑汗煩喘靜則多言體若燔炭汗出而散

又曰脈虛身熱得之傷暑

難經云何以知之暑得之然當臭惡何以言之心主臭自入為焦臭入肝為臊臭入肺為腥臭故知心病傷暑得之當臭惡其病身熱而煩心痛其脈浮大而散

戴氏曰夏月卒倒不省人事名曰暑風

暑證有中傷感之分

戴氏曰暑乃夏月炎暑也有中有傷有感冒三者輕重之分咳嗽而發寒熱汗出不止為元氣內虛肺氣不固暑邪直入內乘金土名曰**中暑**東垣謂避暑執于深堂大廈之中得之為中暑身執頭疼煩躁不寧或身如針刺為**傷暑**腹痛泄瀉或惡心有痰為**冒暑**有傷暑邪舍於榮衛至秋涼後遇風寒閉固不出發而為瘧○有傷暑而即病者則以暑劑雖為霍亂吐瀉之證作亦只治暑者為本以人參白虎六和等湯之類是也

暑傷五臟證治異同

陳無擇云暑執首病歸心使人嗜悶昏不知人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痿痺入腎則消渴雖有五藏之殊大抵審虛實加減補益兼以清解二法為治則同也

傷暑有八證

脉虛自汗身熱背寒面垢煩渴手足微冷體重是也

有中暑中熱之異

繫古老云靜而得之為中暑亦深堂避暑得之之意同其病多頭痛惡寒身體拘急肢節疼痛而煩肌膚大熱而無汗為房室之陰寒所遏使周身陽氣不得通越故也以大順散主之動而得之為中熱則是農天行人於日中勞役太過而得之者其病必苦頭痛

發躁熱惡執捫之肌膚大熱大渴引飲或大瀉無力以動者是也
以白虎湯主之

脉候

脉虛身執得之傷暑脉盛身寒得之傷寒蓋寒傷形而不傷氣所
以脉盛熱傷氣而不傷形所以脉虛

中暑與執證相似但執證脉盛中暑心脉虛以此別之耳

脉浮自汗或浮大而散或洪大無力或虛而遲中得洪緩皆為傷
暑之脉也

治法

大陽中喝者發執惡寒身重疼痛其脉絃細乳遲小便利西

毛脊手足逆冷少有勞身即執口開口板齒燥者發汗則惡寒甚

加溫針刺發熱甚數下之則淋其

喝即暑也

太陽中執者喝是也其人汗出身執而喝白虎加人參湯主之

書謂自汗惡寒身熱而昂面垢手足冷脉微弱無力者中喝也宜人參白虎湯

太陽中喝者身執疾重而脉微弱此亦夏月傷冷水水行皮中所
致也一物瓜蒂散湯主之

治暑宜補元氣為主清利次之

丹溪云夏火大執損傷肺金壯火食氣病暑者多是不足之證所
以用清暑益氣湯人參白虎湯孫真人生脉散之類是以前
聖立方之古矣

辨夏月伏陰在內用大順散二者之疑

丹溪有夏月伏陰在內之論謂人與天地同一橐籥天地之氣升亦升降亦降浮亦浮沉亦沉子月一陽生寅月二陽生此氣之升也人之氣亦升也巳月六陽生陽盡出于地上矣此氣之浮也人之腹屬地氣於此時亦浮于肌表散于皮毛腹中之陽亦虛矣故夏至後六陽外洩伏陰在內此陰字有虛之美若作虛冷者其誤甚矣前人治暑用大順散桂苓丸等劑蓋因涼亭水閣冰泉瓜果之傷故不曰病熱而曰病暑不用辛熱病何由安非為伏陰在內而用之也火令之時流金爍石何陰冷之有世人不察妄謂伏陰而用溫熱為世通弊若謂夏月伏陰在內宜服溫熱則冬月陽在

內宜服寒涼然則夏季冬日飲湯夏日飲水亦不足信歟

藥方

東清暑益氣湯 治夏月暑熱蒸人人感之四肢倦怠胃滿氣促肢節疼或氣高而喘身熱而煩心下痞脹小便黃數大便溏瀉或痢或渴不思飲食自汗體重

人參

黃芪

升麻

蒼朮 一錢

白朮

神麴 各五分

陳皮

炙甘草

黃蘗

麥門冬

當歸

乾葛

五味子

澤瀉

青皮 各三分

右水煎溫服

內經曰陽氣者衛外而為固也 是則氣泄今暑却傷衛故身熱自汗以黃蘗人參甘草補中益氣為君 陳皮歸身甘辛微溫養

胃氣和血脈為臣蒼朮白朮澤瀉滲利除濕升麻葛根苦平善
解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麩甘辛
青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃柏苦辛寒
借其味瀉熱補水虛者資其化源以五味子麥門冬酸甘微寒
救天暑之傷庚金為佐也此病皆因飲食失節勞倦所傷損其
脾胃乘暑天而作也汗大泄者津脫也加五味子十粒炒栝五
分知母三分溫熱乘腎肝則痿弱無力加酒相知母大泄秘
澁血中伏火也加當歸身生地黃桃仁麻仁各一錢以潤之

選十味香薷飲治伏暑身體倦怠神昏頭重吐利

香薷 二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

白扁豆

炒去殼

陳皮

厚朴

姜炒各一錢

木瓜

炙甘草

各五分

右水二盞煎八分不拘時溫服

局方人參白扁湯治脈虛暑熱發渴

人參 錢半

知母 二錢

石膏 五錢

甘草 一錢

右水二盞粳米一合同煎

東人參益氣湯治暑熱傷氣四肢倦怠嗜臥手指麻木

人參 二錢

黃芪 二錢

白芍藥 七分

甘草 一錢

五味子

三十粒

柴胡 六分

升麻 五分

右水煎服

生脈散治暑脈微而渴汗

人參

麥門冬

五味子

各等分

右水煎服

竹葉石膏湯治暑熱煩躁

石膏 一兩

半夏 二錢

人參

麥門冬 各二錢

甘草 二錢

竹葉 二十箇

右姜三片水煎服

清暑諸劑

香薷飲 治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

香薷 一斤 厚朴 梨 白扁豆 炒各半斤

每服五錢水盞半煎八分不拘時溫服

黃連香薷飲

黃連 四兩 香薷 一斤 厚朴 半斤

每服四錢如前服

香連丸 方見痢疾門 治暑熱泄瀉腹痛後重

白虎湯 治暑渴

石膏 五錢 知母 二錢 甘草 一錢 粳米 一握

右作一服水煎加八參名人參白虎湯

五物香薷飲 驅暑和中

香薷 三錢 厚朴 姜製 白扁豆 炒各一錢 白茯苓

甘草 炙各七分 右水煎不拘時服

消暑真溫劑

益元散 五苓散 並見瀉泄門 辰砂五苓散 本方加辰砂

通苓散 治傷暑潮熱煩渴小便不利

麥門冬 淡竹葉 車前穗 燈心

右等分水煎服

和桂苓甘露飲 治伏暑發渴脉虛水道滯

桂 一錢 茯苓 人參 澤瀉

白木

甘草

乾葛

石膏

寒水石各一兩

消石二兩

藿香

木香各一錢

右為末每服三錢白湯調下

宣桂苓甘露飲

茯苓

澤瀉各一兩

白木

石膏

寒水石各二兩

滑石飛四兩

猪苓

桂各五錢

右為末每服三錢溫湯調下

溫中理脾劑

縮脾飲 解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆炒

乾葛

甘草各四兩

烏梅肉

砂仁

草果各二兩

右每服四錢水煎冷服

冷香飲子

治傷暑暈霍亂腹痛煩躁脉沉微或伏

附子炮

陳皮各一錢

草果

甘草各半錢

右水盞半薑十片煎八分去渣并水頓冷服

大順散

治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干

陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

乾薑

甘草

杏仁去皮尖

桂去粗皮

右先將甘草用沙炒次入薑却下杏仁炒過篩去沙淨合桂為

末每服二三錢湯點服

二氣丹 治伏暑傷寒二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心

硫黃

硝石

右等分於銀石器內文武火炒令鷲黃色再研細用糯米糊丸
梧桐子大每服四十丸不拘時新汲水下

消暑丸 治伏暑引飲脾胃不和

半夏一兩 醋煮

甘草

茯苓各二兩

右為末薑汁糊丸梧桐子大每服五十丸食遠白湯下

集薑朴湯 治夏秋暑熱過食冷物茶水以傷其內過乘涼風以傷

其外致惡寒發熱骨膈飽悶飲食不進或吐瀉此內外俱寒也

乾薑炮

厚朴

人參

白朮

白茯苓各一錢

陳皮

枳實

羌活

炙甘草各五分

右水二盞薑三片煎服

易簡諸方

一方 以新胡麻一升炒黑取攤冷碾為細末以新汲水調三錢
凡着熱不得外以冷物逼得冷即死

一方 治中暑發昏以新汲水滴入鼻孔用扇扇之重者地漿水
灌則醒若與冷水飲即死

一方 治暑月傷熱用車輪土五錢冷水調澄清服之

一方 治旅途中暑者移步至陰處急就道上搗熟土於臍上作窩
令人尿其中冷用生薑大蒜細嚼熟湯送下

一方 治中暑用小青葉先以井水浸去滓控乾入砂糖搗汁灌

之立効

一方治中暑熱暈渴不省用路上熟土大蒜等分研爛水調去滓用清汁飲之即活

古今醫統大全卷之十七

心濕證門

病機

內經敘論

經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕熱傷脾諸頸項強皆屬於濕○因於濕首如裹濕熱不攘大筋奕短小筋弛長奕短為拘弛長為痿○因於氣為腫四維相代陽氣乃竭○風寒濕三氣雜至合而為痺○又曰地之濕氣感則害人皮膚筋脉○濕勝則濡泄○濕義甚者為著痺○聲如從空中言此中氣之濕也

原病或曰諸勁強直積飲痞脹中滿下體重肘腫肉如泥而按之

古今醫統大全卷之十七 三

不起皆屬於濕

要畧曰太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名中濕亦曰濕痺其候小便不利大便反快當利其小便

一身盡痛發熱首暈所劇者此名風濕此病傷於汗當風或久傷冷所致也風濕脈浮身重汗出惡風○風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔不渴脈浮虛而澹風濕相搏骨節疼痛掣痛不能屈伸近之則痛據汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫也○濕家之為病一身盡痛發熱身色如薰黃也○濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞其脈大自能飲食腹中和病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈

濕病多為脾虛所致

陳無擇云脾虛多病濕內因酒麪積多過飲湯液停滯膩物燒炙膏粱過度氣執薰蒸濁液不行湧溢于中此濕從內作外因坐卧濕地霧露陰雨所客澡浴為風所閑涉水為濕所鬱鬱於表腠則發黃故經云地之濕氣感則害人皮膚筋脈此濕從外生可見內外所感皆由脾氣虛弱而濕邪乘而襲之故曰壯者氣行則愈怯者著而為病

濕證要分表裏上下四證

濕邪自外而感者為表邪鬱熱故發寒熱身如薰黃皮膚著痺清氣龍虛而上為頭重鼻塞而煩入骨節為重痛之狀浮腫脈浮緩

濕邪由內而作者為裏結滯故霍亂吐利重則發痙強直輕則痞
焉中滿怠惰嗜卧沉重無力流濫關節則煩痛注于經絡屈伸不
得氣不能統則發腫肉如泥按之不起其脉多沉

經曰因於濕首如裹聲如從室中言濕熱不已薰蒸於上則頭重
目黃而鼻塞也故東垣云濕淫所勝助風以平之為濕邪之襲于
上者也

經曰傷于濕者下先受之故足胫腫而膝重無力以行腿脚麻痺
腰腿為之不利也又曰腰重如帶五千錢皆濕邪之著于下者也

脉候

脉經曰沉而緩沉而細微緩者皆中濕 脉浮為風濕 浮而緩

濕在表也 沉而緩濕在裏也 脉沉細遲微為寒濕為濕痺

脉滑疾身熱煩喘胃滿口燥發黃者為濕熱洪而緩者皆濕熱自
甚而痛也

治法

治濕以理脾清熱分利小便為主

經云諸濕腫滿皆屬脾土濕病本不自生因脾熱內虛怫鬱不能
宣行故停滯而生濕也况脾氣虛弱之人易於感冒豈但水不流
而後為濕哉人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎暄感人于冥冥
之中也故治濕之法宜理脾清熱利小便為上故曰治濕不利小
便非其治也經曰濕淫于內以苦燥之以淡泄之宜桂苓甘露木

香葶薤木通治之又云葶薤木香散下神芎丸下水濕消腫脹利
小便理脾胃無出乎此也

治濕不宜大汗及熱藥

經曰因於濕首為裹又云濕熱不攘此蓋濕鬱為熱故身體疼痛
而煩肢節強直而腫或脈浮者名曰風濕當微發汗使風濕俱
從汗出若大發汗則風去而濕尚存兩脛逆冷背腹滿頭目痛多
汗妄言脈陽濡弱陰急小是名濕溫因傷濕而復傷暑也濕熱相
搏而成此疾不可發汗汗則必不能言及耳聾不知痛痒乃是重
喝濕證雖有寒熱然濕熱證多濕寒證少故不宜聚用姜附大熱
之藥戴人論濕證而以濕熱為原風寒為兼深得內經之旨也丹

溪亦云六氣之中濕熱為病十居八九

濕證不可作中風治

有脾胃素弱內蓄痰飲外冒風露相搏上衝心膈令人涎潮壅塞
口眼喎斜半身不遂昏不知人與中風相似但脈沉澁或沉而細
不可作中風治謂其脾土好乾要濕而被濕熱相干則有是疾若
作中風治之脾元愈虛痰濕愈甚必致危篤

因證裁方

濕從外入者宜汗散 濕在上者亦宜汗散 濕從中起者宜疎
利二便分輕重用之

在下者宜淡滲以利小便腹脹脚腫甚者舟車丸下之

濕熱內深發黃茵陳湯下之或佐以防已黃芪

一身盡腫痛或無汗是濕流關節邪氣在表宜五苓散加桂蒼朮

微汗之不可大汗若自汗出多熱燥津液少內水不利切勿利之

重損津液也宜防風白木甘草湯主之

濕鬱者越麴丸主之

肥人多濕二陳湯加酒炒黃芩羌活散風行濕最妙

蒼朮治濕為必用之藥上下部皆可用

身如被杖濕傷熱血分也

蜀方用燥劑為散濕鬱也濕得燥則豁然而收燥濕宜羌活勝濕

湯平胃散

濕勝氣實者宜神祐丸舟車丸虛者桑白皮茯苓人參葶藶木香

白木之類○去濕與熱須用黃芩梔子為主

下焦濕腫及痛膀胱有火邪者酒防已黃柏知母梔子草龍胆蒼

朮之類○濕病外不熱內不渴小便自利者木附湯主之

濕病脈緩弱昏迷腫痛身重自汗失音下痢不禁用白虎湯芩白

乾薑附子白木

肥白人沉困怠惰者多虛宜參芪二木二陳厚朴之類

黑瘦人多熱宜參連白木茵陳

濕氣勝者為著痺

詳見風痺門

○濕勝則濡泄

見瀉門

○濕注生痰

見痰飲門

濕為痰瘧

見瘧門

○濕鬱為疸

見疸門

○濕熱成痿

見痿門

○濕為脚

見脚門

○濕為脚

氣見脚
氣門

藥方

通治濕劑

二朮四苓湯 治諸濕腫滿一身盡痛發熱煩悶二便不利

白朮

蒼朮

茯苓

猪苓

澤瀉

黃芩

羌活

芍藥

梔子仁

甘草各等分

水二盞姜三片燈心一撮煎服

金防已黃芪湯 治風濕脉浮身重汗出惡風或痛

防已

黃芪各二錢

白朮一錢

甘草五分

石水二盞姜三片棗二枚煎八分胃氣不和加芍藥喘加麻黃

出麻果痛門

右水冲加桂枝下寒加細辛

除濕湯 治中濕身體重著腰腿痠疼大便溏小便或澀或利

半夏麩

蒼朮

厚朴

茯苓各錢半

陳皮七分

藿香

炙甘草各五分

右水二盞姜七片棗二枚煎八分食遠服

大橘皮湯 濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮五分

木香磨汁

滑石二錢

檳榔五枚

茯苓

猪苓

澤瀉

白朮各二錢

官桂

甘草各三分

水二盞姜三片煎八分食前服

平胃散 治脾胃不和濕氣停滯

蒼朮

厚朴

陳皮

各等分

甘草

各等分

右為末每服二錢

清利諸劑

局方五苓散 治濕邪鬱滯小便不利

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

各一錢

肉桂

右為末湯調服

茵陳五苓散

治濕熱發黃本方加茵陳一倍煎

元加味五苓散

治濕熱身痛

葶藶木香散

葶藶

木香

茯苓

猪苓

各一兩

澤瀉

白朮

各五錢

木通

三錢

滑石

二兩

桂枝

甘草

各三錢

右為細末每服三錢白湯調下

宣明桂苓甘露飲

治濕熱內甚煩渴瀉利小便澀大便急霍亂吐下

頭痛口乾

方見暑門

東垣清燥湯

治濕熱太甚肺金受邪寒水生化之源絕則腎虧痿厥

之證作腰以下痿弱不能行走或踝膝皆腫口乾瀉利

方見春門

裏散升上劑

羌活勝濕湯 治脊痛項強腰如折項如拔上冲頭痛此是太陽

經不行此藥主之

羌活

獨活

各錢

藁本

防風

各錢

荆子 川芎 炙甘草各四分

右水二盞煎八分食後溫服

麻黃白朮湯 治濕勝身煩痛

麻黃二錢 白朮 桂枝各一錢 杏仁七枚

炙甘草五分 水煎服金匱戒桂加意法名麻黃杏仁薏苡湯

方五積散 治濕外傷或冒風寒鬱為濕執身體重痛方見中

東垣升陽除濕湯 治感濕作瀉小便不利身有有

升陽除濕防風湯 治風濕相搏一身痛二方並見瀉泄門

除風濕羌活湯 治同前

羌活五分 防風 升麻 柴胡

藁本 蒼朮各一錢 水二盞煎服

越麴丸 治濕鬱方見鬱門

溫散之劑

金匱桂枝附子湯 治風濕相搏身痛不能轉側煩而不渴不嘔脉虛

浮而澹

桂枝 生薑各二錢 附子一錢 甘草炙錢半

右水煎服小便自利去桂加白朮服後其人如冒狀勿驚恠

和滲濕湯 治坐卧濕地雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒

小便不利大便溏泄

人參 白朮 茯苓 甘草

附子炮

乾薑炮

桂枝

芍藥等分

右水二盞姜三片棗一枚煎八分不拘時服

羌活附子炮 治風濕相搏身微腫手足掣痛不能屈伸

羌活

附子炮

白木

甘草等分

右水煎不拘時服

生附湯 治受濕腰痛

附子生

乾薑

厚朴

白木

蒼木酒浸

茯苓各一錢

牛膝

杜仲製各一錢半

炙甘草五分

水二盞姜三片棗一枚煎八分食遠服

疎裏攻下劑

神祐丸

方見痰飲明

治濕鬱喘悶二便秘澀

舟車丸

治諸濕腫滿

導水丸

二方並見水腫門

和子濟川散

治濕痰留注二便不利身腫氣高

大黃煨

郁李仁各二兩

芒硝

甘遂各半兩

黑丑取頭末四兩

右為末姜湯調下五分空心臨卧服

易簡方

白木酒

治中風口噤不知人

白木一兩

酒二盞煎一盞服不飲酒者水煎

搐鼻法

治傷濕鼻塞煩痛黃腫八葉一味為末口含水吹一字

入鼻中鼻流出黃水効

一方治一切風濕痺四肢拘攣疼痛用**蒼耳子**去刺為末三兩水二盞半煮一盞去渣呷服無時

一方治風濕用樺木皮屑煎水洗浸効

一方白檳榔為末每服二錢蜜湯調下日三服

一方治濕入腎經腰痛不能伸以鮮五加皮同三白草根搗爛煎酒空心服三次而愈

一方治濕熱小便不利茵陳蒿同木通煎服

一方治濕者赤小豆食一日禁飲食服豆與湯即通利而濕去一方治寒濕氣疼痛不已用姜汁半碗米醋一盞水膠四兩熬稠入肉桂末花樹末皂角末各一兩攪成膏以絹攤貼患處

○附身重

病機

內經曰肝虛腎虛脾虛皆令體重煩寃

運氣身重一曰濕制腎虛而重又云太陽所至為身重又云太陰之從體重中滿又云歲土太過濕氣流行民病體重煩寃又云土鬱之發民病身重是也二曰濕熱少陽司天之政四之氣炎暑間化其間民病滿身重是三曰寒濕太陽司天之政三之氣感於寒溫民病身重是也四曰風木制脾虛而腫歲木太過風氣流行民病體重煩寃又云厥陰在木風淫所勝病身體皆重是也五曰金燥肝虛而重歲金太過

燥氣流行民病體重煩寃是也

治法

治身重除濕為本

仲景云夏月中風濕身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥

治之又云風濕脉浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之又云腎

著之病其人身體重腹中冷如在水中形如冰狀反側不得小便

自行飲食如故病屬下焦身勞汗出不裏冷濕久始得之腰已下

如戴五千錢甘薑朮湯主之

東垣云身重者濕也補中益氣湯加去桂五苓散主之

夜卧不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芪芍藥湯主之

藥方

東垣參朮湯 治脾腎虛弱元氣不能充暢四肢沉重食後昏悶

黃耆 二錢

人參

炙甘草

陳皮

青皮 各五

當歸

酒黃柏

升麻

柴胡 各三

神麩 七分

右水二盞燈心十根棗一枚煎八分食前熱服

甘薑朮湯 治腎冷濕腰重不能起

甘草

乾薑 各五

白朮

茯苓 各一

右咀以水五盞煎至三盞作三服

防已黃芪湯 小柴胡湯 黃耆芍藥湯

並見傷寒門

方五積散

治濕勝身重

方見濕門

鍼灸法

經云脾病者身重肉痿取其經太陰陽明少陰血者

又云脾病者身重寢汗出憎風取其短少陽太陰血者盜汗也

古今醫統大全卷之十八

疸證門

病機敘論

內經云溺黃赤安卧者疸病

巢氏病源云黃疸之病此由酒食過度藏府不和水穀相併移於脾胃復為風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身體面目及爪甲小便盡黃而欲安卧若身體多赤黑多青皆見者必寒熱身疼而色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也

渴而疸者其病難治疸而不渴其病可治發于陰部其人必嘔發于陽部其人振寒而微熱

又云黃疸者一身盡痛發熱面色洞黃七八日壯熱口裏有血當下之法如臍肝狀其人少腹內急若其人眼睛澀痛鼻骨痛兩膊及項強腰背急即其患黃多大便澀但令得小便快即不慮死不用大便多多則心腹脹不食此由寒濕在表則熱蓄於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏煩鬱不得消則大小便不得通故身體面目皆變黃色

黃疸病大法有五

一曰黃疸二曰黃汗三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸

黃汗疸為病身體俱腫汗出而渴其汗能染衣黃如柏汁此由脾胃有出入水或風所閉熱結而成黃汗也

黃疸即前酒食過度藏府不和水穀相併積於脾胃風濕相搏熱

氣薰蒸云云而成黃疸

穀疸之證食畢即頭眩心中怫鬱不安遍身發黃此脾胃有熱因饑過食所傷胃氣所致也

酒疸之證身目發黃心中懊痛之脛滿小便黃面發赤班此由饑中飲酒大醉當風入水所致其證心中懊懣面黃不能食時欲嘔吐者是也

女勞疸身目俱黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過於勞傷極於房室大熱大勞而交接所致也

疸證以濕熱為源

丹溪云疸證不必分五種同是濕熱如會醬相似

內傷發黃

畧例云內傷勞役飲食失節生黃只用建中理中是矣不必用茵陳新病必須消導久病從穀疸治之

傷寒陰陽證發黃 詳見本門

脈候

脈經曰脈沉渴欲飲水小便不利皆發黃也○脈浮者宜汗之吐之○脈沉者宜下之利之○要畧曰寸口脈浮而緩則為風緩則為脾痺非中風四肢苦煩脾色必黃痰熱不行尺脈浮為傷腎○跌陽脈緊為傷脾○寸口近掌無脈口鼻黑色不治

治法

治黃疸用子和三法分表裏極効

一身盡痛而黃者濕邪勝在表也傷寒當汗不汗則生黃邪在表也並宜汗之不痛乾燥執勝而黃脈沉弦者邪在表也宜先下之上膈煩悶其脈浮或欲嘔者宜先吐之原發黃證皆其濕執鬱結必表裏分消疎利之立愈矣

治黃疸必立小水為捷徑

黃疸多為脾濕不流并積熱而成此病目睛皮膚小水皆黃必須利小水乃為捷徑小水一清而黃即退

疸證須有五種總為濕熱不散身熱身痛發黃小便澁當滲利之

以五苓散茵陳黃連之類

輕者小温中丸重者大温中丸熱多加黃連濕多加茵陳五苓散
加食積藥

不治證

疸而渴者難治疸而不渴者易治

疸病以十八日為期治之十日已上為瘥劇者為難治

寸口無脉鼻出冷汗腹膨形如烟薰搖頭直視為難治環口黎黑

油汗發黃為脾絕死不治凡五疸久久變黑者皆難治

疸證服解利之藥久而不愈及口淡怔忡耳鳴脚突增寒發熱小

便濁皆為虛甚宜四君子湯吞八味丸不可強服涼藥通利以救

脾氣虛弱腎水枯涸必至危篤

額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞

疸腹如水狀不治腹滿者多難治硝石礬石散主之

藥方

五苓散

加味五苓散 治濕熱鬱滯為疸煩渴引飲小便不利

山茵陳

山梔子 各一錢

白朮

赤茯苓

猪苓

澤瀉

黃連 各七分

甘草 三分

右水二盞燈草十根煎八分食遠温服

活人茯苓滲濕湯 治黃疸寒熱嘔吐而渴身目俱黃小便不利食少

白茯苓

澤瀉

茵陳各五分

梔子仁

黃芩各八分

青皮

陳皮

防已各五分

白朮

蒼朮各一錢

枳實

黃連各二分

右水煎服

茵陳湯 治疸證發熱大小便澀

茵陳

梔子仁各二分

赤茯苓

葶藶各錢半

枳實

甘草各五分

水二盞薑三片煎八分食前服

秦朮散 治五疔口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁

秦朮

當歸酒洗

芍藥

白朮

官桂

赤茯苓

陳皮

熟地黃

小草

川芎各一錢

半夏七錢

炙甘草五分

右分二帖每帖水二盞姜三片煎八分不拘時服

小温中丸 治黃疸與食積又可制肝燥脾脾虛須用白朮湯使

針砂十兩醋炒七次

苦參夏加冬減

白朮五兩

山查各二兩

吳茱萸一兩冬減

蒼朮半斤

川芎夏減

神麴各半斤

香附米一斤童便浸一宿炒

右為細末醋糊丸梧桐子大每服七八十丸食前鹽湯下

大温中托

針砂十兩製如前

陳皮

蒼朮

青皮

厚朴姜製

三稜醋煮

莪朮醋煮

黃連

苦參

白木各五兩

生甘草二兩

香附子一斤製如前

右為細末醋糊丸梧桐子大每服七八十丸食遠鹽湯下

必効散 治黃疸通用

葶藶吊紙少

草龍膽

山梔子

茵陳

枳實

甘草各五分

水二盞姜三片煎八分食前服

柴苓梔子湯 治黃疸清解之劑

柴胡

黃芩

人參

半夏各八分

陳皮

炙甘草

白朮

茯苓各一錢

猪苓

澤瀉

山梔各七分

右水二盞姜三片棗一枚煎一盞食遠服

叔和硝石礬石散

二味等分煨為末每服二錢大麥粥汁和服日三服取汗愈若

小腸滿急小便不利用滑石石膏各二錢入粳米一撮同煎服

黃汗

桂枝加黃芪湯 治黃汗身腫汗出出已輒輕久久必身爛背脊中

痛腰已下無汗不能食煩燥小便不利

桂枝

蒼朮各一錢

甘草五分

黃芪二錢

水煎加薑棗食粥以助藥力

黃芪散 治汗黃身腫發熱不渴汗出染衣色黃

黃芪密炙

麥門冬

茵陳

赤芍藥各一錢

石膏 二錢

豆豉 一撮

甘草 炙五

水二盞薑三片煎八分温服

芪芍桂酒湯 治汗出入水從汗孔入而成黃汗

黃芪 五兩

芍藥 三兩

桂 二兩

右三味以苦酒一斗水七升煎三升温服一升空心服至六七

日乃解苦心煩不止者以苦酒阻故也

曹

茵陳括萎散 治黃疸

茵陳 二錢

木通

山梔 各錢

大黃 炮一

石膏 二錢

括萎殼 一錢

右水二盞薑三片葱一莖煎八分食前温服

金小半夏湯 治黃疸小便色不異欲利腹滿而喘

半夏

炮七次
姜汁拌

每服二錢入姜十片水煎服

梔子滑石湯 治黃疸腹滿小便不利面赤自汗為裏實當下之

大黃

黃栢 各二

梔子 十五

滑石 四兩

右水六升煮四升去渣澄清更取一升頓服

一曰病黃疸發熱煩滿胃滿口燥者以病發火劫其汗兩執所得

然黃家所得從濕得之一劫大發而黃壯熱在裏當下之

黃連散 治黃疸大小便秘澀壅熱累効

黃連

酒炒各

黃芩 酒炒

炙甘草 各一

右為極細末每服二錢食後溫水調下日三服先用瓜蒂散嚙
鼻所下黃水即服黃連散

搗鼻瓜蒂散 治黃疸小便身如金色兼治酒疸

瓜蒂 二錢
母丁香 一錢
黍米 四十九粒
赤小豆 五分

右為細末每用夜卧先含水一口却於兩鼻孔中畜入半字至
明日取下黃水便服黃連散病輕者五日効重者半月効

酒疸

葛根湯 治酒疸

葛根 六錢
枳實 麩炒
山梔子
豆豉 各三錢

甘草 五分
右咀作二劑每劑水二盞煎八分食遠服

白木湯 治酒疸因下後變成黑疸目青面黑心中如啖韭狀大

皮膚不仁其脉微而數

桂心 白木 炒各三兩
豆豉 葛根

杏仁 去皮尖 炙甘草 錢半
枳殼 麩炒三錢

右咀作二服每服水二盞姜三片煎八分食遠服

酒蒸黃連丸 治酒疸發黃小便不利

川黃連 去鬚淨好酒 五升

右將黃連以酒煮乾為度研為細末煮麩糊丸梧桐子大每服
三十丸食後煎二陳湯加葛根茵陳煎湯送下又療傷酒過度
熱毒下血大便泄瀉溫米飲下

如神散 治酒疸積毒不散發黃久積流入清氣道中用此吹鼻

苦葫蘆子 苦瓜子各七粒 黃黍米三百粒 安息香半斤

右為細末以一字吹入鼻內滴出黃水一升吹勿過多或過多者即以黍米穰燒灰麝香少許吹鼻內立止

穀疸

穀芽枳實小柴胡湯

治穀疸食已即飢而頭眩心中鬱悒不安飢飽所致蒸鬱而黃

穀芽 枳實 厚朴各一錢 山梔

大黃 柴胡 黃芩各六分 陳皮

半夏 人參 炙甘草各五分

右水二盞姜三片棗一枚煎八分不拘時服

茵陳蒿湯 治穀疸寒熱不食食即頭眩久久黃色為穀疸

茵陳九錢 大黃四錢半 山梔錢半

右作二服每服水二盞煎八分食遠服

穀疸丸 治饑飽失宜蘊熱發黃

苦參二兩 龍膽草一兩 牛膽一枚

右二味為末以牛胆汁入煉蜜丸梧桐子大每服五十九空心

白湯下 一方不用牛膽用猪膽加山梔五錢 人參七錢 大麥飲下

女勞疸

滑石散 治女勞疸病

滑石 兩半
枯礬 五錢

右為末每服二錢大麥粥湯食前調下以小便出黃水為度

食勞瘡黃疸

膽礬丸 治男婦食勞黃疸瘡癰

膽礬 三錢
黃蠟 一兩
肥棗 五十枚

右用磁石器內先下米醋次下礬棗慢火熬半日取棗去核次下蠟再慢火熬一二時成膏入臈茶末二兩和丸菉豆大每服三十丸食後茶清送下

棗礬丸 治食癆瘡身目皆黃色

皂礬 不拘多少沙鍋煨令通紅醋點赤紅用
紅棗 煮爛

無擇 養勞湯 治五疸虛弱脚炙心悸口淡耳鳴微發寒熱氣急小便

白濁當作虛勞治之

黃芪 當歸 桂心 甘草 炙

橘皮 白朮 人參 炙 白芍藥 三兩

生地黃 五味子 茯苓 各二錢 遠志 五錢

右咀每服四錢水盞半姜三片棗三枚煎七分空心服

小建中湯 治虛人疸證 方見虛損門

疸證久為寒變治驗

羅謙甫云六月時雨淋漓人多病瘟疫一人因勞役過度渴飲涼

茶及食冷物遂令腹痛肢節亦疼身體沉重腹滿不食以為外感傷重通聖散服添身體困甚醫治之以百解散發其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩燥抵六日以三一承氣湯下之煩躁又甚又投白虎加人參湯柴胡飲子之類病愈增又易醫用黃連解毒湯朱砂膏服至十七日後病勢稍增傳變身目似黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之而痛眼澁不欲開目睛不了了語語自汗小便利大便秘面不赤命予治之診其脈緊細按之虛定兩寸脈短不及本位此證得之因熱而飲冷加以寒藥過度助水秉心及木侮土先因其母凌傷于子經云傳所不勝乘其所勝也時復林兩乃寒溫相合此證陰證發黃明也予以茵陳附子乾薑湯

主之經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所勝治以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散黃治寒故以為主半夏草豆蔻辛熱白朮陳皮甘溫健脾燥濕故以為臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實微苦寒瀉其痞閉茵陳微苦寒其氣輕浮佐以薑附能去膚膜間之寒濕而退其黃故為佐使也前服一劑前證減半再服悉去又以理中湯服之數日氣得平復或者難曰發黃皆以為熱今暑隆盛又以熱藥治之何也予曰理所當然熱因寒用非為時也始雖陽證過用寒涼如為濕熱終為寒濕非急反者不能治也

茵陳附子乾薑甘草湯 因服寒藥過度身目俱黃皮冷心下痞

眼流不開自汗小便利

熟附子 三錢

乾姜 炮二

茵陳 錢半

草豆蔻 一錢 麩色煨

茯苓 五分

枳實

澤瀉 五分

白朮 五分

半夏 製

陳皮 三錢

水盞半姜五片煎八分服

黑疸

黃疸久久變為黑疸身黃額黑或身面俱黑是也酒疸下之久為黑疸目青面黑心中如噉蒜韭狀大便黑皮膚不仁雖有白朮湯治法多難愈

易簡諸方

一方 治黃疸變成黑疸醫所不治者用土瓜根不拘多少搗取

汁一盞空心作一服不愈再服

集療方 治黃疸用生茅根一握細切以猪肉一斤同煮以熟為

度食肉飲汁愈

又方 用好蘿紋秦艽一兩咀作二貼用好酒一盞煎至半盞空心服得利止

又方 用蘿蔔子炒為末白飲調下方寸七日三服

一方 治黑疸多死急用瓜萹根搗汁六合頓服當有黃水從小便中出如未出更服之

一方 治黃疸以絲瓜連子燒灰存性為末因麩病麩湯下酒病酒調下數服愈

一方 以梅樹根酒煎服効

一方 治疸用麻黃一把去節以綿裹用醇酒五盞煎取半盞去

查不拘時溫服之又治傷寒證發黃疸宜汗之則愈冬月酒煎

春夏用水

一方 治急心黃疸以百合蒸和蜜食之効一種紅花者名山丹

不可食白花者即百合也

一方 治疸皮膚眼目如金色小便赤取青小麥搗汁每服一盞

空心服或取青麥苗搗汁不拘時多服良

一方 以野苧根煎湯服多服止渴解熱極好

一方 用葛根一味加白豆蔻五粒酒煎空心服効

外臺秘要 取楊枝一握細搗水一鍾煎半鍾不拘時服

一方 取東引桃枝煎服忌女人雞犬見之

黃腫病

黃腫病即世俗所謂黃胖起於食積濕鬱而成由脾濕不行積滯

所致丹溪用大小溫中丸俱効大溫中丸小溫中丸二方並見前疸證門

粉礬平胃丸 治脾胃積滯濕鬱黃胖而似浮腫

蒼朮米泔浸

白朮各二兩

厚朴姜汁炒

陳皮兩

甘草

砂仁各五錢

皂礬二兩用粉製

右為末除皂礬另製用紅朮米粉一升先將皂礬砂鍋內炒去烟盡再下粉炒香熟為度取起和前平胃末一處醋煮糊丸梧

中綱見綠礬下
皂礬礬 即綠礬也
紅朮米 本綱和下有赤白二色

桐子大每服五十九日二服姜湯吞下忌麩食生冷

紫金丹 治黃胖理脾胃進飲食

紫金皮

針沙

陳皮

青皮

香附子

蒼朮

厚朴姜汁炒

三稜

砂仁各一兩

右為末神麩糊丸梧桐子大每服二十九食前白湯下或酒與

川樹湯下俱可忌牛肉魚麩

一方用平胃散加神麩麥芽砂仁皂礬製如前服

綱目綠礬丸 治黃胖

綠礬

六兩以米醋鉄杓內炒七次乾為度放地上出火氣

南星

一兩咀炒黃色

麩一兩炒黃色

大皂角

一斤鉄鍋水煮爛操出滾膠瀝去查淨汁入鍋加棗肉再熬成濃膠和前藥用

紅棗

六兩熬去皮核入皂角膠內用

右前三味為細末和入皂角及棗膠內搗勻丸梧桐子大每服

五丸清晨下床每用薑湯下夜卧上床再服忌油膩煎炒如身

上發紅斑急煎棗湯解之自愈

棗礬丸 治黃胖

皂礬五兩

棗肉三兩

乾蒸餅三兩

右為末用生姜自然汁丸梧桐子大每服二十九食前米飲下

日二服右礬味酸以瀉肝棗味甘以補脾也

古今醫統大全卷之十八 終



古今醫統大全卷之十九

燥證門

病機敘論

經曰諸澁枯涸乾勁揭皺皆屬於燥

又曰燥勝則乾

又曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳

為息貫者死不治

原病式曰澁物濕則滑澤乾則濕滯燥濕相反故也如人身中外

清澁皆屬燥金之化也故秋脉清澁燥也或麻者亦由澁也枯不

榮旺也涸無水液也乾不滋潤也勁不柔和也春秋相反燥濕不

同故也

燥以風熱為原

經曰風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕小異也然燥金雖屬秋陰而異於寒濕故反同其風熱也故火熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而為燥也凡人風病多因熱甚而風燥者為其無化以熱為主也然陽實陰虛而風熱太甚以勝水濕金受火制因而成燥

燥因血少腎水不足

燥乃二陽陽明燔金肺與大腸之氣而為病也夫金為陰之主為水之源因受火熱則為燥氣之化寒水生化之源竭絕於上而不

能下滋腎水灌溉周身充榮血脈則內外燥氣之化而為病皆由此也有因火病克伐太過有因吐利而忘津液或預防養生誤食金石或房勞致虛補塞燥劑有食味過厚辛熱太多醇酒炙肉皆助火而損真陰日漸煎熬血液衰耗使燥氣轉深而燥病偏作在外則皮膚皴揭在上則咽鼻焦乾在中則水液衰少而煩躁在下則腸胃枯澀津不潤而便難在手足則為痿弱無力在脉則澀而微此皆陰血為火熱所傷而腎水失生化之源也

劉河間分大便秘結或消渴之類為燥病之衰證身熱皮膚燥澀乾疥疥枯之類為燥病之表證而於陽結陰結氣盛血少痰鬱風熱可得而悉

大法身表熱為燥在表渴飲水為熱在裏

肝氣自甚則風勝加之燥熱則病筋脉勁強緊急而口噤也

燥熱太甚而脾胃乾涸則成消渴

詳見本方

風熱燥并鬱甚於裏故煩滿而或秘結

詳見秘結

風熱燥甚而筋緩不收為痿痺

詳見本門

脉候

脉緊而澁為燥○或浮而絃為風燥○或芤而虛為血少而燥

治法

治燥以滋陰養血為本

經曰子得血而能握子得血而能步夫燥之為病皆由血液衰少

腎水不充故諸黃鬱病痿皆屬肺金燥氣之化也夫秋深火熱火
行物燥甚則木葉痿落故治法當以甘寒滋潤之劑能生血勝熱
陰得滋而火得制液能潤而燥能除源泉下降精血上榮如是則
氣液宣通內神茂而外色澤矣經云燥者潤之非滋陰血之謂欵
經曰東方實西方虛瀉南方補北方則滋陰養血治燥之意也
治燥用風熱藥不可太過

燥病雖為風熱之化施治當審輕重之分以養血潤燥為主加佐
辛涼可也若或純用辛涼驅風苦寒泄熱不無逐末而忘本世多
此弊而燥愈增

丹溪云皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚燥痒皆火燥肺金燥之

甚也宜以四物湯去川芎加麥門冬人參天花粉黃蘗五味子之類治之

藥方

養血潤燥劑

氏生血潤膚飲 治燥證皮膚折裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚十指甲厚反而莫能搔痒又或歲金太過或秋深燥金用事久晴不雨皆為燥病患燥病服悉愈

川當歸 酒洗

生地黃 同上

熟地黃

黃芩 一錢

天門冬 錢半

麥門冬 一錢

五味子 九粒

黃耆 一錢

括蕒杏仁 五分

桃仁泥 五分

酒紅花 一分

升麻 二分

右水二盞煎一盞食後溫服如大便結燥加麻仁郁李仁錢一竦道滯通幽湯 治大便結燥幽門不通上衝吸門不開噎塞不便

氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸

生地黃

桃仁 各一錢

紅花 三分

升麻

熟地黃 各五分

炙甘草 三分

右水煎調檳榔末五分服加大黃名當歸潤燥湯

元桃仁四物湯 治血虛秘結不通

桃仁

當歸

川芎

生地黃

白芍藥

大黃 各等分

右水煎或丸服俱可

援六味地黃丸 治下焦燥熱小便短數陰虛火旺燥熱勞瘵並治

丹大補陰丸 治燥熱二方並見火門

清氣化痰生津甘露丸 治咽乾燥渴多痰而咬

天門冬 去心 麥門冬 同上

橘皮 鹽水

天花粉 各二兩

人參 一兩

知母 鹽水炒一兩二錢

桔梗 一兩

粉草 五錢

仙瓊脂膏 治血虛皮膚枯燥消渴等證

生地黄

鮮者二十斤洗淨細為取真汁去查

鹿角膠

真酥油 各一斤

白砂蜜

二斤煎一二沸撈去而上沫

生薑

二兩為取真汁

先以文火熬地黄汁數沸以絹濾取淨汁又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎良久候稠如錫以磁器取貯每服二三匙空心溫酒調下

瓊玉膏 治證同前及肺熱咳嗽燥甚方見咳

天門冬膏 治血虛肺燥皮膚折裂及肺痿咳血

天門冬

鮮者不拘多少

右淨洗去皮心細搗絞取汁澄清以布濾去查用砂鍋慢火熬

成膏每用一二匙空心溫酒調下

地仙煎 治諸燥證

山藥 一斤為末

杏仁 一斤去皮尖

牛乳 二升

右以杏仁搗細入牛乳山藥拌勻絞汁用新磁瓶密封重湯煮一日每服一二匙空心溫酒或湯下

證活血潤燥生津飲

麥門冬 天門冬 生地黃 熟地黃

天花粉 當歸 瓜蒌仁 麻仁泥

粉草各等分 右咀水煎溫服

治風燥劑

陳潤腸丸 治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥不通全不思食乃風

燥血秘以此潤燥和血疎風自然通矣

麻子仁 莢仁各一兩去皮尖另研 羌活 當歸尾

大黃煨 皂角仁 秦艽各半兩

右為細末煉蜜和勻丸梧桐子大每服四十九空心白湯下

麻仁丸

郁李仁 麻子仁各六兩 大黃二兩各半炒 山藥

防風 枳殼炒各七錢半 檳榔 羌活

木香各半兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服三四十九溫白湯下

秦艽丸 治血弱筋燥陰虛不能養榮手足不能潤動爪甲乾燥

風熱甚方見風門

和脾約丸 治風燥秘結方見本門

東垣生液甘露飲一名清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾燥自汗大便結燥

小便頻數

和血益氣湯 治口燥便秘舌上赤脈此藥生津除燥長肌

辛潤緩肌湯 治肌裂皮膚諸燥澁不潤澤三方並見消渴門

活血潤燥丸 治風秘血秘常常結燥

潤腸丸 治結燥二方並見秘結門

古今醫統大全卷之二十

火證門

病機敘論

經曰諸執者瘵皆屬於火諸痛瘡痒皆屬於心諸禁鼓慄如散神守皆屬於火諸逆衝上皆屬於火諸腹脹大皆屬於熱諸燥狂越皆屬於火諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病肘腫疼痿驚駭皆屬於火諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

又曰諸執者瘵暴瘡冒昧躁擾狂越罵詈驚駭肘腫疼痿氣逆衝上禁慄如喪神守嘔嘔瘡痒喉痺耳鳴及龍嘔涌溢食不下目昧

不明暴注瞶瘵暴病暴死皆屬於火

原病或曰**昏**昏也**瘵**動也執甚則神氣昏心惕跳肉瞶動皆火

然也**暴瘖**無聲也金受火邪濁而不鳴也金清則美鳴火盛則

金濁雖鳴而瘖也**冒**昏冒也**昧**暗昧也火氣悶熱則神昏暗而

不清爽也**躁**躁動煩悶也**擾**擾亂也凡火甚則煩心不眠坐卧

不寧神志不定是也**狂越**狂乱而乖越言語錯乱行止失常也

罵詈西聲以辱人也**驚駭**聞聲則驚惕然而恐駭皆火邪盛正

氣無主也**肘腫疼痲**足肘近筋有肉處熱勝則腫風勝則動疼

痛之輕淺痛則疼之甚也**痲**似疼非疼其間側側然痲髓而似

疼痛之意也乃肝木之火故似痲也如醉甚之甚手足股腕皆

為之痲髓者是也**火氣炎上也****戰慄**

搖動而形體喪失保守之神也**鼻中氣痒而作聲也**火燥

肺金而邪氣出鼻竅故痒礙而噴嚏也**瘡瘍**為心火之熾於皮

膚也**喉痺**執客上焦咽喉腫痛吞津有礙而不仁之謂也**目鳴**

腎水不滋火炎上竅而有聲如聞鍾鼓蟬鳴之類是也

火氣炎上胃膈熱甚則傳化失常故嘔溢而上

也**目赤不明**為熱氣鬱障也平白目無牙見皆執氣鬱之甚也

暴注卒然而瀉也熱甚則流通而卒成水瀉之類**瞶**

瘵動跳也**暴病暴死**火性疾速如執氣鬱拂之久則一時心神

昏悶筋骨不用卒然僵仆倒地而死皆火之為也

經曰壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少
火生氣壯火食氣故氣得壯火則耗散氣食少火故氣得少火則
長生猶言少火滋養其氣也

原病式曰五藏之志過度則勞傷本志凡五志所傷皆熱也所謂
陽動陰靜故形神勞則燥不寧靜則清平也是故上善若水下愚
若火如卒暴僵仆多因五志七情過度而卒病也故喜為心火之
志病笑者火之甚也五志過極皆為火也

火有君相五志之異

玉機微義曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚
暴何者蓋能燔灼焚燎飛走狂越消爍於物莫能禦之遊行乎三

焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不
妄動能不違於道常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫人在
氣交之中多動少靜欲不妄動豈可得乎故凡動者皆屬火化火
一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之
極也病則死矣經所謂一水不勝二火夫火出於天造君相之外
又有厥陰藏府之火根於五志之內六欲七情激之其火隨起蓋
大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中
則火起於肺心為君主自焚則死矣

相火動為諸證

丹溪曰太極動而生陽靜而生陰陽動而變陰靜而合而生水火

木金土各一其性惟火有二曰君火人火也曰相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因動而見故謂之相入主生物故恒於動人有此生亦恒於動其所以恒於動者皆相火助之為也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具于入者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀脫者腎之腑心胞絡者腎之配三焦以位言而下焦同肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生天之火雖出于木水而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而為火者也腎肝之陰悉其

相火人而同乎天也或曰相火天火所動何東垣謂元氣之賊又曰火與元氣不相兩立一勝則一負然則如之何則可使之無勝負乎周子曰神發知矣五性感動而萬事出五者之性為所所感不能不動謂之動者即內經五火也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與熱言之相火之氣經以火言之蓋表其暴悍酷烈有甚於君火者也故曰相火元氣之賊周子又曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常為一身之主而人心每聽命焉此善美乎火者人心聽命於道心而又能主之以靜彼五火將寂然不作而相火者惟有裨補造化而為生生

三才圖會卷之二十一
二四
不息之運用耳何賊之有或曰內經相火注言少陰少陽矣未曾
言及厥陰太陽而吾子言之何也曰是太陽少陰東垣常言之矣
治以炒栢取其味辛能瀉水中之火是也戴入亦言膽與三焦尋
火治肝和胞絡都無異此歷指龍雷之火也子亦備述天人之火
皆生於動如上文所云者實推廣二公之意或曰內經言火者不
一往往於六氣中見之言藏府者未之見也二公豈他有所據耶
子欲為我言之乎經曰百病皆生於風寒暑濕燥火之動而為變
者岐伯歷舉病機一十九條而屬火者五此非相火為病之出於
藏府者乎考諸內經少陽病為瘕瘕太陽病時眩仆少陰病瞽暴
瘖鬱冒不知人非諸熱腎瘕之屬火者乎少陽病惡寒腎瘕瘖病

振寒少陰病洒淅惡寒振慄厥陰病洒淅振寒非諸振或慄如喪
神守之屬火者乎少陰嘔逆厥氣上行膀胱病衝頭痛太陽病厥
氣上衝胃少腹控臑引腰脊上衝心少陰病氣上衝胃嘔逆非諸
逆衝上之屬火者乎少陽病譫妄膀胱病狂顛疾非諸躁狂越之
屬火者乎少陽病肘腫善驚少陰病腎熱以疲肘腫不能久立非
諸病肘腫疼痠驚駭之屬火者乎原病式曰諸風掉眩屬於肝火
之動也諸氣憤鬱屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也
諸痛瘡痒屬於心火之用也是皆火之為病出於藏府者然也註
文未之發耳以陳無擇之通達且以煖熾論君火日用之火言相
火而又不曾深及宜乎後人之不無龍耳瞽也悲夫

病濕熱相火者多諸病尋痰火痰火生異證

因心火為之心者君火也火旺則金燥水虧為火獨存

氣有餘便是火非真氣之有餘乃火邪之為氣氣從左邊起者肝火也氣從臍起

者陰火也

熱從脚下起入腹者虛之極也蓋相火起於九泉之下此病十不

救一治法以四物加降火藥服之以附子末津調貼湧泉穴引火

下行若壯實人有此證是濕鬱成熟之候或有冒兩途行受濕而

得此證者不可誤作陰虛治宜蒼朮黃柏牛膝防已丸之屬

陰虛火動者難治治脉數無力者是也

飲酒人發熱者難治不飲酒人因酒發熱者亦難治

煩躁者氣隨火升也

東垣云有元氣虛損而熱有五藏熱有內中外而熱輕手捫之熱

在皮毛血脉也重手按之筋骨熱甚者熱在筋骨也不輕不重而

熱熱在肌肉也又云晝則發熱夜則安靜是陽氣自熱於陽分也

晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室

晝夜不分是重陽無陰也亟瀉其陽峻補其陰

兩手大熱為骨厥如在火中灸湧泉穴五壯立愈

脉候

脉浮大而虛為虛火○沉而實大者為實火○洪數見於左寸為

心火○見於右寸為肺火○見於左關為肝心火○見於右關為

脾胃火○見於兩尺為腎經相火○男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也○凡病痰火脉沉細而數者難治○病熱有火者可治脉洪是也無火者難治沉細是也○無故而脉洪大者必病進也○平人脉數者必有瘡瘍作也

治法

治熱不衰當求其屬

經曰有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復起治之奈何曰諸寒之而熱者取之陰諸熱之而寒者取之陽所謂求其屬也王註取之陰陽則壯水之主益火之原是也求其屬者則求水火以取心腎之陰陽是也火有微甚治有逆從

經曰微者逆之甚者從之又曰鬱發之

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以天之甚熱之氣汗而發之發之不盡則逆取之

火有虛實治有補瀉

虛火可補參朮生甘草之類

謂之虛者正氣虛也

實火可瀉黃連解毒之類

謂之實者邪氣實也

人火正治龍火反治鬱火可發當着在何經

風寒外束可發輕者可降重則從其性而升之

人壯氣實火盛顛狂者可用正治

藥用硝黃水水之類是也

人虛火盛狂者以生姜湯與之若殺以冰水之類正治立死

凡火盛者不可驟用涼藥必須溫散

火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可

補陰則火自降炒黃柏熟地黃之類

輕手按之熱甚而烙手重手按之不覺熱此病在肌肉之下宜發之東垣升陽散火湯火鬱湯之類

火有君相藏府分治之宜

君火者心火也可以溫伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水溫漸從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不

兩之陽虛之病以甘劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日以前熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實為陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃和硝之屬若腎水受傷真陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎衰為陽脫之病以溫乾之劑補之如附子乾姜之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明者此而求火之施治何所依據

子和汗吐下三法治積火

崇溪李濟之常病目及居省掾每服補肝散以致睛脹但見臆檻

橫排幾至喪明令湧泄五七次繼服涼藥方始如故

丹霞朱僧氏張宗出家病三陽畜熱常居靜室不敢見明明則頭
痛如錐每置冰於頭上不能解其熱歷諸醫莫能辨其病後治之
七日而愈用汗吐下三法而已後用涼物清鎮之平復如故
一人素嗜飲酒得病醫用酒癥丸熱藥後日覩天但見紅色遂成
龍火卒不能救

治暴熱病在心肺 積熱病在腎肝 虛熱不能食自汗氣短屬
脾虛以甘寒溫而行之

實熱能食口乾舌燥便難屬胃實以辛苦大寒之劑下之
火鬱為熱乃心火下陷脾土抑而不伸宜用火鬱湯

心熱汗之心神煩亂血中伏火蒸蒸然不安宜鎮心火

以朱砂安神丸

骨蒸勞熱乃五臟齊損病人憔悴發熱盜汗下血宜養陰血

肺熱者輕按之瞥瞥見於皮毛日西甚其證喘咳洒淅寒熱輕者

瀉白散重者涼膈白虎地骨皮散

心熱者微按之熱見於血脉日中甚其證煩心痛掌中熱而死黃

連瀉心湯導赤散朱砂安神丸

肝熱脇下骨上熱寅卯間熱甚脉絃四肢困熱便難轉筋筋痠瀉

青丸柴胡飲子

胷中煩熱實者用梔子黃連虛熱用參芪麥門冬茯苓藥竹葉
竹茹若脉堅實而數者神芩丸下之

陰虛發熱四物湯加炒栢知母乃降火補陰之妙劑甚者加龜板
兼氣虛加參芪白朮手心熱屬熱鬱宜用火鬱湯或梔子川芎香
附神麩丸服

平旦潮熱熱在行陽之分肝氣主之白虎湯加黃芩白朮潮熱熱
在行陰之分腎氣主之地骨皮牡丹皮知母黃栢潮熱用芩連生
甘草辰戌時發熱加羌活午時加連未時加石膏申時加柴胡升
麻夜加當歸身有寒加參朮黃芪

上焦濕熱須用酒芩瀉肺火如虛熱加知母當歸天冬保肺
中焦實熱與痛須黃連以瀉心火中氣脾虛不能轉運有鬱熱者
黃芩葛根白朮以代之如胸中煩熱須用梔子實熱者切當若虛

煩須用補藥為主人參白朮黃芩芍藥麥門冬大棗之類
下焦濕熱及膀胱經有火邪者須用漢防己草龍膽黃栢知母或
八正散

肥白人火藥中必兼痰火藥如白朮茯苓星半滑石之類
瘦黑人有熱必兼血藥當歸桃仁牛膝之類

藥方

黃連瀉心火梔子佐之**柴胡**瀉肝火川芎佐之**黃芩**瀉肺火須用

片苓芍藥白皮佐之蒼朮尾條苓止能瀉大腸之火**石膏**瀉脾中

之實火虛者忌之**芍藥**瀉脾火冬月必須酒炒制其性之寒酸也**木通**下行瀉小

腸火黃芩黃連以猪膽汁炒瀉肝膽之火**黃芩**瀉腎火又退

勞骨蒸之火 **連翹** 瀉六經之邪火 **玄參** 瀉無根之遊火 **貝鱗** 瀉

五臟之鬱火 **人中白** 瀉肝火 **黃柏** 加鬱金大能瀉膀胱之火小便

降火極速 **山梔仁** 能降火從小便出其性能曲屈下行人所不知

局方瀉心湯 治心火心經蘊熱

川黃連 為末 或湯或散任服

導赤散 治心火并小腸火

生地黄 木通 生甘草 各等分 入竹葉水煎服

茯苓散 治心經實熱口乾煩渴眠卧不安

茯苓 麥明冬 通草 升麻 各八分

紫苑 知母 各一錢 桂心 四分 赤石脂

淡竹葉 十片 大棗 二枚 水二盞煎分溫服

瀉青丸 治肝火

當歸 龍膽草 川芎 山梔

防風 大黃 羌活 各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸

左金花 治肝火

黃連 吳茱萸 各一兩泡浸半時焙乾用

右為細末粥丸煎白木陳皮湯下

瀉白散 治肺火大腸火

桑白皮 地骨皮 各一兩 甘草 半兩 右為末水調服

清金丸 治肺火

黃芩炒 為末滴水丸白湯下

正傳 麥門冬湯 治病後火熱乘肺咳唾有血胃脇脹滿上氣喘急五

心煩熱渴而煩悶

麥門冬 天門冬 桑白皮各七 五味子九粒

紫苑茸 貝母各六 桔梗 甘草各五

生地黄 淡竹葉各一 水盞半姜三片棗一枚煎服

集 未砂涼馬丸 治上焦虛熱咽膈有氣如烟搶上

黃連 梔子各 人參 茯苓各五

朱砂三錢 片腦三分 右為末蒸餅丸朱砂為衣下

醫林 橘皮湯 治肺熱氣喘息賁

橘皮 麻黃 紫蘇各七 款胡五分

母薑 杏仁各一 石膏二錢 水煎服

生薑瀉腸湯 治大腸實熱腹脹不通口舌生瘡

生薑 橘皮 竹茹各五 生地黄錢半

白朮 茯苓 黃芩 梔子各一

朴硝二錢 桂心五分 水二盞棗一枚煎八分服

瀉黃散 治脾火

山梔一兩 藿香七錢 石膏五錢 防風四錢

甘草三錢 右為末蜜酒拌畧炒服

瀉熱湯 治脾火面黃目赤季脇痛滿

半夏

母薑各一錢

白木

枳實炒

茯苓

梔子各七

杏仁

細辛

芒硝

生地黄

淡竹葉各八

水煎加姜服

石膏丸 瀉胃火併食積痰火

石膏煨

右為細末醋糊丸菜豆大清米飲送下

東垣滋腎丸 降腎火

黃柏二兩酒拌陰乾

知母同上

肉桂一錢去粗皮

上二味氣味俱

陰故能補腎以瀉下焦之火桂與火邪同體故以寒因熟用凡諸病在下焦皆不渴也右為細末熟水為丸百沸湯溫下

大補丸 治陰火補腎水

黃檗益酒炒

為細末粥丸血虛四物湯送下氣虛四君子湯

補陰丸 治消渴骨熱補腎水真陰不足

六味地黃丸

治腎虛惟悴盜汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸

下血二方並見虛損門

河涼膈散 瀉三焦六經諸火 加黃連名清心湯

大黃

朴硝

甘草各一錢

連翹各半

梔子

黃芩

薄荷各五分

右水盞半煎入蜜一匙和勻服

三補丸 瀉三焦火加大黃去黃連名三黃丸

黃芩 黃檗 黃連 為末滴水丸服

東垣升陽散火湯 治男婦四肢筋骨肌表俱熱如火捫之烙手此因

血虛或胃虛食冷物鬱遏陽氣於脾土之中火鬱即發之

升麻 葛根 獨活 羌活

芍藥 人參各六分 炙甘草一分 柴胡三分

防風三分 生甘草二分 水盞半姜三片煎熟服忌生冷

瀉陰火升陽湯

治肌膚煩熱面赤食少喘咳痰盛右關脉緩弱或絃或浮而數

羌活 炙甘草 黃芪 蒼朮各五分

升麻八分 柴胡錢半 人參 黃芩各七分

黃連酒炒 石膏五分 右水煎服

黃連解毒湯 治一切火熱毒狂躁煩心口燥舌乾熱勢之甚者

及吐下後熱不解而脉洪喘急鄭聲目赤睛痛

黃連 黃檗 黃芩 梔子各等分

右咀每服五錢水二盞煎八分溫服

梔子仁湯 治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子 赤芍藥 大青 知母各一錢

升麻 柴胡 黃芩 石膏

杏仁 甘草各二錢 豆豉百粒 右水煎溫服

宣明防風通聖散 治表裏俱熱壅滯躁悶方見風門

防風當歸飲子 治煩渴發熱虛煩火證

紫胡

人參

黃芩

甘草 各一兩

滑石 三兩

大黃

當歸

芍藥

防風 各五錢

右咀每服一兩水二盞姜三片煎一盞通口服

如有痰嗽加半夏若瀉減大黃

滋陰降火湯 養血降火之聖藥也

當歸

地黃 涼血用生 補血用熟

天門冬 去心

白芍藥 薄荷湯炒

白朮 各一錢

麥門冬 去心

炙甘草 各三錢

知母

黃芩 蜜炙

遠志 去心

陳皮 洗

川芎 各六分

右咀姜三片水煎服○氣血虛加人參黃芪○嗽加五味阿膠

痰加瓜蒌貝母○吐血加丹皮藕節○骨蒸熱加地骨皮

直指黃芩湯 治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

澤瀉

梔子仁

黃芩

麥門冬 去心

木通

生地黄

黃連

甘草 各等分

右每服一兩水二盞姜三片煎一盞食前溫服

桂苓甘露飲 方見雷龍門 治胃受濕熱頭痛身熱煩渴吐瀉口乾

紫雪 治內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走解諸熱毒藥毒邪

熱小兒驚癇百病

黃金 百兩

寒水石

磁石

石膏

滑石 各二斤

已上五味用水一石煮至四斗去渣入下項藥

炙甘草 半斤

羚羊角 屑

犀角 屑

青木香

沉香 各五錢

丁香 一兩

升麻

玄參 並剉細各一斤

已上再煮至一斗五升入下項藥

硝石 四升芒硝亦得每升得七兩七錢半

朴硝 提淨者十斤

已上入前藥汁

中微火熬柳枝不住手攪候有七升投放水盆中半日欲凝入

下項藥攪令勻朱砂 研三兩

射香 當門子一兩二錢

右藥成霜雪紫色每服一錢或二錢冷水調下大人小兒臨時

以意加減並食後服

大金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋秘欬血衄

血瘦弱頭痛骨蒸肺痿勞嗽去大黃加梔子名梔子金花丸

黃連

黃柏

黃芩

大黃

梔子 等分

右為細末滴水丸小豆大每服三十丸涼水下

御神芎丸 治一切熱證常服除痰消飲清頭自利咽膈能令遍身

結滯宣通氣利而愈神強体健省病

大黃

黃芩 各二兩

牽牛

滑石 各四兩

黃連

薄荷

川芎 各半兩

右為末滴水丸小豆大溫水下二十丸

當歸龍會丸 治腎水陰氣風熱濕積時發驚悸筋惕搖溺神

志不能榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞶癢咽嗝胃膈不利腸胃燥

澁操擾狂越罵豎言驚駭火熱等證

當歸

龍膽草

大梔子

黃連

黃栢各一兩

青黛五錢

木香一錢

麝香五分

黃芩一兩

大黃

蘆會各五錢

右為細末煉蜜為丸小豆大每服二十九姜湯送下

瓜蒂散

當歸玄明兩主
二聖散二方並
見風門

右治一切風執積熱或火熾者寸口脉滑而有力胃中實滿煩
冤氣上而不化面赤痰驚言驚駭並宜吐之

調胃承氣湯

瀉胃火

當歸承氣湯

瀉脾胃肝火二
方並見傷寒門

古今醫統大全卷之二十一

古今醫統大全卷之二十一

積熱

病機敘論

至真要大論篇帝曰願聞病機岐伯對曰諸嘔吐酸暴註下迫皆
屬於熱諸病喘逆轉筋反戾小便渾濁諸腹脹大諸病有聲鼓之
如鼓癰疽瘍疹瘡氣結核吐下霍亂脊鬱腫脹鼻塞顛衄血溢血
世淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑語妄衄蟻血汗皆屬於熱

嘔吐

者肝之味也由火盛制金金不能平木則肝氣自甚故

為酸也如飲食熱則易於酸矣

卒暴注泄也腸胃熱甚而
傳化失常火性疾速故如是也

下迫

後重裏急迫迫急痛也火

性急速而能燥物故也**逆**火氣逆上也病熱則氣甚而息亂

熱火為陽主乎急數熱則息數氣亂而為喘也**轉筋及疔**由熱

氣燥燦于筋則牽痠轉縮而痛火主燔灼燥動故也或以為寒

客於筋者誤也大抵內熱甚而外被風寒禁固則內熱愈鬱不

得踈散而反轉戾者有矣故轉筋以帛包裹得煖即止甚則以

熱湯漬之而使腠理開泄陽氣踈散則愈而俗反疑為寒者此

也夫筋骨多因熱甚霍亂吐瀉所以致脾胃土衰則肝木自甚

而熱燥於筋故轉戾也**小便渾濁**天氣熱水渾濁寒則水清水

體清而火濁故也又如清水以火煎之自然濁也**諸脹大有**

聲鼓之如鼓熱為陽氣發動充脹如鼓寒主收斂陽氣熱盛故

如是也**癰**淺而大也**疽**深惡也**瘍**頭小瘡也**疹**浮癢點也皆熱

勝血鬱於膚腠者然也**癰氣**赤瘤丹毒熱勝氣也**結核**冷氣熱

甚則鬱結堅硬如果核不必潰發但令熱氣散則自消也

霍亂三焦為水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而致霍亂

吐瀉火性燥動故也或云吐瀉屬寒若寒者不渴而脉沉遲熱

者必渴而脉急數故犯暑熱而作吐瀉者多也**昏**昏也熱氣甚

則濁亂昏昧也**鬱**鬱也結滯壅塞而氣不通暢所謂熱甚則

膚腠閉密而鬱結也**癰脹**熱勝於內則氣鬱而為腫也陽熱氣

勝則腫脹也**窒塞**窒塞而不通利也火主臍臄腫脹故熱客陽

明而鼻中臄脹則窒塞也或謂寒主閉藏而鼻塞為傷風寒而

然也殊不知由內熱甚外受風寒則熱鬱結不通故為窒塞而
流清涕火熱亢極則反兼水化制之故也**鼻**鼻出清涕也蓋金
熱極反化水液如心熱極而反汗出也**衄**為陽熱拂鬱於足陽
明而上熱盛則血妄行為鼻衄也**血溢**血上出也心養於血故
熱甚則血涌而妄行**血泄**為熱客下焦而大小便血出也**淋**
便澀痛也熱客膀胱鬱結不能滲泄故也**閉**大便澀滯也熱翹
其液則壅堅結而大腸燥澀故也**身熱惡寒**此熱在表也邪熱
在表而淺邪畏其正故病熱而反惡寒也如熱甚生癰腫瘡瘍
而惡寒者亦由邪熱在於表也**戰慄**搖動也火之象也或言戰
慄亦有寒者蓋寒慄亦由火甚似水實非寒也**驚**心卒動而不

能也火主於動故心火熱甚也**惑**疑惑猶豫濁亂而志不一也
象火參差而惑亂也志者腎水之神也**悲**肺金之志也金本燥
神也**悲**肺金之志也金本燥今燥者火也所以悲哭而五液俱
出者火激動而兼水化也**笑**為心之志也喜極而笑者猶燔灼
火喜而鳴笑之象也故病笑者火之甚也**語**多言也言為心之
聲猶火燔而聲鳴也故心熱則多言而不自知也**妄**虛妄也火
為陽故外清明而內濁昧其手動亂故心火熱甚則腎水衰而
志不精一虛妄見聞而自為問答則神志失常如見鬼神是也
衄血汗血出而汗濁也熱氣上甚則血溢亢極則燥而汗濁
害承乃制則色黑而為紫也

經曰陽勝則熱熱勝則腫

陽勝則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲冷也

陽盛則身熱腠理閉喘麤為之俛仰汗不出而熱齒乾以煩寃腹滿死能冬不能夏

有四肢熱逢風寒如炙於火者是人陰氣虛陽氣盛當內燔也又

曰人身非常熱熱而煩滿者陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也

三陽之病發寒熱病熱而有所痛者是三陽之動也

人數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散熱氣與穀氣相搏或熱

盛於中故熱遍於身內熱而溺赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰

陽氣獨勝故手足為之熱也

証熱論曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小水黃者少腹中有熱也

經有內熱外熱之異

內經曰陰虛生內熱者因有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不

行下脘不通胃氣熱熱氣薰膏中**故內熱**陽盛則外熱者因上焦

不通利則皮膚窒密腠理閉塞玄府不通衛氣不泄**故外熱**

熱有在氣在血之分

東垣曰晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也晝則安靜夜

則發熱煩躁是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝則發熱煩

躁夜亦然其重陽而無陰也當亟瀉其陽峻補其陰

執證病機不外三家之旨

卒病發熱而惡寒者發于陽也其脉浮緊而濇為風寒客於榮衛
六經傳變之異此皆自外而入故張仲景主於內經所言人之傷
於寒也則為病熱此傷寒論之所由作也自外而入內熱者然也
有所勞倦谷氣衰少脾氣下陷頭痛發熱其或發熱惡寒寒熱間
作或蒸蒸燥熱發於肌肉之間始得之氣高而喘身熱而煩其脉
洪大而頭痛或渴不止皮膚不仁風寒而生寒熱亦與傷寒相似
此李明之主於內經勞倦形氣不足脾胃論之所由作也自內而
之外熱者然也

陽氣沸鬱為諸熱經云喘嘔吐酸暴注下迫轉筋及戾水液渾濁

腹脹有聲鼓之如鼓鬱結轉甚而惡寒如戰慄驚駭之類此劉守
真主於內經病機著為原病式非內非外專為鬱結積熱者然也

積熱有漸

董氏曰積熱者熱毒蘊內非一朝一夕之故也夫人之生也陰平
陽秘神氣以宣而自無熱之可積蓋昧者徇情縱欲因致積熱皆
出於心熱甚則傷血或有體氣素實一時惑觸熱毒之氣鬱積藏
府之間或在心肺之內令人口苦咽乾涎唾稠粘眼流多眵心氣
通於舌脾氣通於口熱燥相合故口舌生瘡小便秘澀此積聚之
熱非傷寒傷風之熱證也有嗜酒麪煎炙雜附峻補皆能有熱謂
之積熱有積溫成熱遂成前證不可不察

王安道曰人之所賴以生者氣也氣者何陰陽是也夫陰與陽可
以和而平可以乖而否善攝與否吉凶於是乎分不能善攝者故
偏寒偏熱之病莫逃乎乖否之餘雖然寒也熱也釐工為之而拂
難設積熱沉寒良工猶不能以為計且以積熱言之始而涼和次
而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則技窮矣故王太僕
曰益火之原以消陰翳壯水之主以制陽光又曰取心者不必齊
以熱取腎者不必齊以寒此治積熱之本之論也○**內經**曰身熱
脉數或燥而不惡寒者瘧瘧也瘧○一身盡痛發熱日晡所據者
此名風濕中濕○汗出而身熱者風也傷風○要畧曰發熱身痛
而身如薰黃者濕也痘証○發熱惡寒脉來浮數者瘟疫也身熱

頭痛自汗多眠陽脉浮清陰脉弱風濕也傷寒○脉虛身熱得之
傷暑暑○四肢發熱者或口舌燥而身熱咽乾蓋心生火大小腸
主熱火熱來乘土位乃濕熱相合故煩躁悶亂也四肢者脾土也
火乘之故四肢發熱也○或身熱體重走注疼痛蓋濕熱相搏風
熱鬱而不得伸也

脉候

內經曰龐大者陰不足陽有餘為熱中也○諸浮不躁者在陽則
為熱其有躁者在手○**岐伯**曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然

王註云病熱而脉數按之不鼓乃寒盛陽而致之非熱也○
形證是寒按之而脉氣鼓擊於指下盛者是為熱盛拒陰而生
病非
寒也

平人氣象篇曰病熱而脈靜泄而脈大脫血而脈實病在中脈虛
病在外脈濇堅者皆難治○大奇論曰脈至而搏血衄身熱者死
推而內之外而不內身有熱也

脈經曰大熱病氣熱脈滿是謂重實○尺寸脈俱虛是謂重虛

脈經陰數多熱數為執極數脈為虛為熱數洪熱煩脈來如懸釣
浮為執滑數心下結執盛緊而數寒熱俱作沉細滑疾者執

脈數盛滑緊者病在外執脈沉而緊上焦有熱下寒

寸口脈浮大而病者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中執
寸口脈實執在脾肺數為吐為執在胃口關脈滑數胃中有食執
緩而滑為執中○難經曰病熱之脈陰陽俱浮浮之滑沉之散滑

發熱惡寒脈浮數者溫病也身熱頭痛自汗多眠陽脈浮滑陰脈
濡弱者風溫也○活人書云中脘有痰令人增寒壯執惡風自汗
寸口脈浮骨疼滿有類傷寒但頭不疼項不強為異○熱病已得
汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死○熱病不得汗而脈躁盛者此
陽脈之極也死○脈浮而濇濇而身有熱者死

治法

治執有表裏之分

病機機要曰有表而執者謂之表執無表而執者謂之裏執有表
熱而為執者乃久不宣通而致也有脈溫熱而為執者有惡寒戰
慄執者及其治也小熱之氣涼以取之大熱之氣寒以取之甚熱

之氣以汗發之發之不盡則逆制之制之不盡求其屬以衰之苦者治藏藏屬陰而居內辛者治府府屬陽而在外故內者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈

治熱有補血補氣之宜

東垣曰發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱者如不能食而熱自汗氣短者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣非如能食而熱口舌乾燥大便難者以辛苦大寒之劑下之非瀉熱補水之比當細分之不可槩論如言煩燥虛煩亦與實煩不同如傷寒煩者為直陽內鬱陰中伏陽之證

與陰虛燥熱病本亦異

虛熱發汗之戒

東垣曰仲景論內外不足發熱自汗之證大禁發汗若飲食勞倦雜病發熱身汗表虛之證認作有餘便用發汗則表益虛也

五臟熱治

心熱者微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下熱少加力按之則全不熱是熱在血脉也其證心煩心痛掌中熱而喘以黃連瀉心湯實則瀉心湯虛則朱砂安神丸

肺熱者輕手乃得微按全無日西熱甚乃皮毛之熱其證必見喘咳寒熱輕者傷風散實則涼膈散虛則人參白虎湯

肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅卯間尤甚其脉
絃四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋痿不能起于床者

瀉青丸 實則禁胡飲子

脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕手重
手之間熱在肌肉過夜尤甚其證必怠惰嗜卧四肢不收無氣以

動瀉黃散 實則調胃承氣湯 虛則人參黃芪散

腎熱者輕手重手俱不熱如重手按至骨分其蒸熱手如火其人
骨蕪蕪如虫蝕其骨困熱不任亦不能起于床實則滋腎丸本滋
陰法也無實不可瀉○氣實脉盛身熱煩擾宜三一承氣湯涼膈
等藥下之熱在中四順清涼飲在下八正之類○夜熱多有汗

或鼻衄身熱而便難四物去芩加黃連生地骨皮之類○日熱

多熱在氣分柴胡飲子白虎湯○有輕手按之熱甚重手取之不

甚熱此熱在肌表宜清之竹茹竹葉地骨皮麥門冬之類○有神

氣拂鬱而熱宜清神散○熱在上而陰水不升陰火騰沸宜升陽

湯之類○有食傷太陰而熱或停食而下之痰液不散鬱結成熱

宜道開之○因積滯而蓄熱當先損積而熱自退○有丹毒熱腫

氣鬱結滯並可解散隨證用藥此候欲發瘡毒分六淫治○墜浮

溜之火須苦寒

溜之類○陰虛精滑元氣脫者用滋

陰藥燥者潤之方法見燥門○有芫血證者宜下之○汗下後元氣虛

而下陷陰陽之氣揭薄而不起為虛執宜與來復丹靈砂丹之類
汗下後脉燥身熱大渴飲水不已者先掘井泉取水飲之○有鬱
冒諸風為執宜**防風通聖散**川芎石膏之類○有肺燥鬱執或火
乘之者宜清之**白虎湯**加地骨皮○元氣不足胃氣下陷為執宜
補中益氣湯血虛者加血藥○從治藥使酒煎或濕執為佐使○
反治蜜煎烏頭之類○其候欲發斑疹身執者**升麻湯**之類發之

丹治義

陰虛發執者難治○飲酒人發執難治○手足心執屬執火鬱湯
脉數而無力者便是陰虛也**四物湯**加炒黃柏黃芩龜板無氣虛
加人參黃芪黃芩白朮

藥方

通治諸經積熱之劑

涼膈散 治三焦六經積熱加黃連名清心湯

黃連解毒湯 治熱毒煩悶口燥呻吟畜熱內甚諸不能退

大金花丸 治一切熱證中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋

秘制血瘦弱頭痛骨蒸肺痿咳嗽去大黃加梔子名**梔子金花丸**

神芩丸 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫咽馬不利大小便閉

澁一切風執之證並宜服此

黃芩湯 治心肺蘊熱口瘡咽瘡馬悶小便不利

瀉心湯 治心經蘊熱

茯苓散 治心經實熱口乾煩渴眠卧不安

瀉白散 治肺熱

瀉青丸 治脾經鬱熱

瀉黃散 治脾經熱口臭咽乾上方並見火門

人參瀉肺湯 治肺經積熱上喘咳嗽骨蒸脹滿痰多大便澀

人參 黃芩 梔子仁 枳殼炒

薄荷 甘草 連翹 杏仁去皮

桑白皮 大黃 桔梗各等分

每服七錢水二盞煎八分食後通服

天門冬散 治肺壅腦熱鼻乾煩躁大便秘澀

天門冬去心 桑白皮 升麻 大黃

枳殼炒 甘草各八分 荆芥一錢

水二盞煎八分食後溫服

半夏湯 治膽腑實熱精神不守熱泄病

半夏麴 黃芩 軍姜炮 遠志去心

茯苓 生地黄各八分 黍米一合 酸棗仁微炒研

長流水二盞煎八分食後溫服

赤茯苓湯 治膀胱實熱小便不通口苦乾咽腫不利

赤茯苓 猪苓 葵子 枳實

瞿麥 木通 黃芩 車前子

滑石

甘草各等

水二盞姜三片煎八分食前服

三黃湯 治積熱結滯大便秘澁心曠煩燥

黃連

黃芩

大黃煨各十兩

右咀每服四錢水盞半煎八分空心服

龍腦雞蘓丸 除煩熱鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻衄血崩下血熱脉

消渴驚悸解酒毒腸熱口臭口瘡清心明目

薄荷葉一兩六錢

生地黄六錢

麥門冬四錢

蒲黃炒

阿膠炒各二錢

黃芪一錢

人參

木通各二錢

銀柴胡同木通浸二日取汁入膏

甘草錢半

右為末用蜜三兩煉過後下地黄汁等藥熬成膏丸如梧桐子

大每服二十九嚙湯送下

利膈散 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘓葉

荊芥穗

防風

桔梗

牛旁子炒

人參

甘草各一兩

右為末每服一錢不拘時沸湯點服咽喉痛口瘡甚加僵蚕一兩

三黃丸 治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤澁大便秘結

黃連

黃芩

大黃各十兩

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服四十九丸熱水送下

既濟清神散 益腎水降心火清上實下

桔梗

黃芩

川芎

山梔

當歸 羌活 白朮 茯苓 各七

知母 甘草 薄荷 各五

右水盞半煎七分入蜜二匙調勻服

地黃煎 治積熱

地黃汁 四升 茯苓 知母 各四 姜豕 四兩

瓜蒌根 生姜汁 生地骨皮 生麥門冬汁

白蜜 各二升 石膏 八兩 竹瀝 三合

右咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去渣下竹瀝地黃麥門冬汁慢火煎四五沸下蜜姜汁微火煎至出六升初服四合日三服夜一服加至五七合四五月作散服之

玄明粉 治三焦邪熱藏府秘澁 方見製法

香連丸 治腸熱并大腸熱解酒毒厚腸胃 方見痢疾門

根珀雪 治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嚙物妨悶或咽閉

壅塞及天行時熱發強昏憤

芒硝 朴硝 硝石 馬牙硝

青黛 石膏 煨飛 寒水石 水研 甘草 各等

右將甘草煎湯二升去渣却入諸藥再煎用柳木篋不住手攪令消溶得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研為細末每用少許含化津嚙不拘時候如覺喉壅閉塞不能吞物者即以小竹筒吹藥入喉中即愈頻吹之

消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅盛腮項結核口舌
生瘡遍生瘡癰已潰未潰並宜服之

犀角 磨汁

防風 各一錢

鼠粘子 炒二錢

荆芥穗 一錢

甘草 炙錢半

水二盞煎一盞食後溫服

解表藥劑

人參敗毒散

參蘓飲

葛根解肌湯

九味羊活湯

上方通治傷風傷

寒發熱解肌方見傷寒門

河間六神通解散

治發熱頭痛身熱脈洪無汗

麻黃 一錢

甘草 一錢

黃芩

蒼朮 各錢

石膏

滑石 各錢半

水二盞姜葱同煎一盞溫服

攻裏藥劑

大金花丸

方見火門

調胃承氣湯

三一承氣湯

方見傷寒門

當歸承氣湯

治燥熱裏熱鬱熱為病或皮膚枯燥咽乾鼻乾或

便溺結秘俱効

當歸

大黃 各三錢

芒硝

甘草 各一錢

水二盞姜一片煎服

暄四生丸

治一切積熱痰熱風秘積熱常服順肌膚奈老

大黃

牽牛 各一兩

芒硝 五錢

皂角 六錢

右為末丸梧桐子大每服三十丸食後白湯下

袖積熱金花丸

治三焦積熱煩躁藏府秘結

大黃 一兩
牽牛 五錢

右為末薄荷湯丸梧桐子大每服五十九食後白湯下

八正散 治熱藏府膀胱熱痛淋瀝不通
方見淋濁門

無退表裏執諸劑

宣雙解散 小柴胡湯 大柴胡湯 防風通聖散
方並見湯寒門

柴胡飲子 治一切積熱肌骨蒸熱往來寒熱及傷寒發熱汗不

解骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾經水不通皆治

柴胡 人參 黃芩 甘草

當歸 芍藥 大黃
各等分

右咀每服七錢水二盞煎一盞食後服

防風當歸飲子 治脾腎真陰虛損肝心風執鬱甚陽盛陰衰二

切虛熱壅滯悉能宣通氣血調順飲食

防風 當歸 柴胡 大黃
各一錢

人參 黃芩 芍藥 滑石

甘草 各七 水二盞姜二片煎八分食後服

洗心散 治風熱痰滯心經積熱口苦唇燥眼澀大便澀小便赤

當歸 芍藥 白朮 防風
各一錢

荆芥 麻黃 大黃 甘草
各十

水二盞姜二片煎八分不拘時溫服

清氣分熱劑

古今圖書集成醫部全錄 卷之二十一

人參白虎湯 方見傷寒門

清心蓮子飲 方見淋症門

良方清氣散 治風熱壅盛上高煩悶

川芎

羌活

柴胡

前胡

茯苓 各八分

人參

獨活

青皮

白朮

枳殼

甘草 各七分

右水二盞姜三片煎八分溫服

涼血分熱劑

元戎四物二連湯 治血虛虛勞發熱五心煩熱晝則了明夜則發熱

當歸

生地黃

白芍藥 各一錢

川芎

黃連

胡黃連 各八分

水盞半加姜煎

宣明四順清涼飲子 治血熱壅實面赤蘊結煩悶

大黃 蒸

赤芍藥

當歸

甘草 各一錢

水盞半煎八分食後通口服

清鎮

硃砂安神丸 方見驚悸門 至寶丹 方見十風門

牛黃膏 治熱入血室發狂心熱不認人者

牛黃 一錢

朱砂

鬱金 各三錢

腦子 五分

甘草

牡丹皮 各二錢

右為末煉蜜丸皂角子大新汲水化下

內傷虛熱劑

東垣補中益氣湯方見內傷門治內虛脾胃下陷食不知味五心煩熱

升陽益胃湯同上十全大補湯方見虛門

滋陰退熱劑

東垣滋腎丸方見火門補陰丸 六味地黃丸治腎虛發熱新久憔悴骨蒸盜汗五藏不足黃瘦脫血一

方並見虛損門

黃連香茹飲治暑熱方見暑門

七情鬱結而熱者**火鬱湯**方見鬱門

衛生易簡方

聖惠方 治熱煩滿悶不能食用**稀茶草**生搗汁服三四合効

一方 治心經留執煩躁用**梨汁**頓服一碗即止

一方 治發熱口乾小便澀用**甘蔗**搗汁飲之

一方 治熱毒用雞棹清三箇蜜二合和服之愈

一方 治五藏伏執如火煩滿而煩用凝水石為末極細每服挑

一錢水調下橫理者為凝水石順理者為寒水石

食醫心鏡 治執攻心煩躁恍惚牛旁根搗汁一升食後分三服

一方 治時熱毒心神煩躁用藍靛是以新汲水一盞調服

一方 治胃中燥熱或渴而躁用葛粉四兩先以粟米半升水浸

一宿漚去濕拌勻煮粥食之

一方 治諸熱用六月雪煎湯日三服

手者或心與背相引而痛者或脇肋與少腹相引痛者或腹痛引陰股者或痛夙昔而成積者或卒然痛死不知人少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後泄者或痛而悶不通者凡此諸痛各不同形別之奈何

岐伯曰寒氣客於脉外則脉寒脉寒則縮蹇縮蹇則脉絀急絀急則引小絡故卒然而痛得熱則痛立止因重中於寒則痛久矣○寒氣客於經脉之中與炁相搏則脉滿滿則痛甚不休也○寒氣稽留熱氣從上則脉充大而血氣亂故痛甚不可按也○寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之而痛止○寒氣客於俠脊之脉則深按之不能故按之

無益也○寒氣客於衝脉起於關元隨腹直上寒氣客則脉不通脉不通則氣因之故喘動應手矣○寒氣客於背俞之脉則血脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

按之則熱氣至即按而摩之而使之熱則熱氣至也導引是矣

寒氣客於厥陰之脉厥陰之脉者絡陰器繫于肝寒氣客於脉中則血泣脉急故脇肋與少腹相引痛矣厥氣客於陰股寒氣上及少腹血泣在下相引故腹痛引陰股○寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注于大經血氣稽留不得行故夙昔而成積矣○寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣○寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也○

寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣

原病或曰諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癩疝堅痞腹滿急

痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒

水液澄澈清冷吐利水液清冷而不渾濁此為病寒則水穀不化

故吐利清冷也

癥為腹硬堅按之應手謂之瘕也寒則血氣凝故也故削堅積非

辛熱藥不能除**瘕**為腹中雖硬忽聚忽散無有常准以其病瘕未

成瘕也血不流而寒搏故成瘕也**癩疝**少腹控卵腫急絞痛也寒

主拘縮故也寒極而土化制之故腫滿也經言丈夫癩疝謂陰氣

連少腹急痛也故言婦人少腹腫脹肝經足厥陰之脉也經註曰

寒氣聚而為疝也

堅痞腹滿急痛寒主拘縮故急痛也寒極則血凝泣而反煎土化

制之故堅痞而腹滿也有執腹滿堅痞者當從執治之也

下利有白水寒則清淨也**食已不飢**胃熱則消穀善飢故病寒者

食雖已而不飢也胃膈潤澤而無燥熱故也

吐利腥穢腸胃大寒而傳化失常金寒則水冷故吐利腥穢也熱

則酸臭寒則腥穢理之常也

屈伸不便厥逆禁固陰水主於清淨故病寒則四肢逆冷而禁止

堅固舒卷不便利也

痼冷為陽氣衰弱而脾胃虛

人身貴乎陰陽和平而無偏勝則無偏疾沉寒痼冷之證乃是具
陽耗散脾胃虛弱失於調理以致胃寒又啖生冷粘膩難化之物
經年累月積久而成痼冷漸傷脾胃因而積滯藏府以成痼疾但
有寒冷觸犯速然而作以致手足厥冷畏冷增寒飲食不化或嘔
吐涎沫或大便洞泄米穀不消或小便頻數或肚腹絞痛或逢寒
咳嗽或癩疔大作皆其證也

痼冷證多吐瀉而飲食不化

東垣云脾胃不足勞役形體中焦不能營運傳為寒中故吐利清
穀宜附子理中湯之類以葱白煎羊肉湯服之愈凡真氣衰微胃
氣不實不可食生冷寒涼若食寒涼愈至腸胃虛寒嘔吐涎沫水

谷不化腸胃常痛腹冷如冰皆陽虛陰盛之所為也張仲景有陰
毒雖不曰痛冷即寒冷所傷手足冷臍腹痛嘔吐下利身如被杖
脉微欲絕此由腎氣虛寒脾家傷冷內外皆陰陽氣不守遂成陰
毒至于唇口手足俱青寒氣冲心煩躁悶亂精神如失脉沉而伏
匿多不治也

脉候

脉沉而遲者為藏寒痼冷 微而濇者為血虛 寸脉微遲者陽
乏久而不起必成痼冷 尺脉沉遲者腎氣虛寒主腰足清冷如
冰 痼冷病脉絕不至者死 痼冷病脉微遲心中煩躁者死

治法

古今圖書集成醫部全錄卷之二十二
寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以酸瀉之以辛潤之以苦堅之
寒淫所勝平以辛熱佐以苦甘以酸瀉之反治之法寒者熱之
陽虛生外寒者從丹溪治法

丹溪云陽虛則惡寒用參芪之類甚者加附子以行參芪之功
虛勞冬月惡寒之甚氣實者宜利宜解表柴胡乾葛之類腎經
積冷下元虛憊者宜安腎丸之類

痼冷者貴乎溫補不可太剛

任齋直指曰苟得其養無物不長苟失其養無物不消人之處世
飲食為上湯藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以藏中停寒而
成沉痾男子流精女人下帶骨寒腦冷氣乏血衰嘔吐惡心久泄

注一皆其證耳治療之法惟貴乎溫補不宜大剛養氣血之劑佐
以姜桂甚加附子為愈若夫熱剛烈之劑急欲回陽五恐腎水易
涸虛火獨炎難保其往知者審之

藥方

附子理中湯 姜附湯 沉附湯 真武湯 並治涸冷陰虛腹

痛吐利寒戰

方並見傷寒門

十全大補湯 治諸虛百損

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

芍藥

地黃

黃芪

肉桂各五分

右水二盞姜三片棗二枚煎八分空心服空甚者加附子五分
八味丸 治下元冷憊腰脚痠重虛勞消渴

熟地黄 四兩

山藥

山茱萸 各二兩

肉桂

熟附子 各一兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓 各兩半

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三四十九食前鹽湯下

澹寮附子茴香散 治氣虛積冷心腹絞痛泄瀉食少

人參

白朮

白茯苓

炙甘草 各七

乾薑 炮

附子 製各五分

肉豆蔻

茴香 各四分

木香 三分

丁香 五粒

水盞半盞少許煎七分空心服

利沉香菓澄茄散 治內挾積冷臍急痛引腰背面色痿黃藏府自

利小便滑數小腸氣痛並治之

附子 製

菓澄茄

茴香

葫蘆巴

木香

補骨脂

肉桂

巴戟天

川烏

桃仁

川練子

沉香 各等分

利劑三建湯 除痼冷接元氣

椒附丸

治積冷臍腹引痛時有盜汗

二方見諸虛門

濟生復陽丹 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰證

川烏 製

附子 炮

天雄 製

鍾乳粉 各一兩

陽起石 煨四兩

朱砂 另研一兩

右為末酒煮神麩糊丸梧桐子大每服五十九空心鹽湯下

麝香鹿茸丸 治真元虛憊精血耗少

熟地黃

山藥 各三兩

杜仲 炒

鹿茸 酒炙各兩半

五味子

肉苁蓉

牛膝 酒洗

沉香 半兩

麝香 五分

右為末煉蜜丸梧桐子大食前鹽湯下四十九

著附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃芪 蜜炙半兩

附子 製三錢

水二盞薑十片煎一盞服

附參湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短眩暈但是陽虛

氣弱之證並宜服之

人參 三錢

附子 製各二錢

水二盞姜十片煎一盞無時服

茸附湯 治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦乏

鹿茸 去毛酒名

附子 製各二錢

水二盞姜十片煎八分食前服

黑鉛丹 治真元虛憊陽氣不固三焦不和冷氣刺痛飲食無味

腰背沉重膀胱久冷夜多小便女人血海久冷赤白帶下及陰

證陰毒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞二百粒即便回陽此

藥大能升降陰陽補虛益元墜痰除濕破癖 方見頭痛明

養正丹 升降水火接助元陽治咳逆翻胃痰結頭眩腹痛腰疼

霍亂吐瀉 方見頭暈明

金鎖正元丹 治真氣不足元陽虛冷遺精白濁嘔吐腹痛足膝

無力酸疼拘急面黃神倦一切虛弱並宜治之 方見瀉泄明

來復丹 此藥合一儀配陰陽奪天地冲和之氣乃水火既濟之

方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交滋養心腎能升能降上
實下虛氣閉痰逆心腹冷痛藏府虛滑不問男婦老幼危急之
證但有胃氣無不獲安補損扶衰救陰助陽神功不可盡述

舶上硫黃透明者佳 太陰玄精石一兩研細水飛 青皮二錢

硝石一兩同硫黃為末入碟內以微火溫炒用柳木篦子不住手攪令陰陽氣相入不可太過恐傷藥耳研極細方入藥

陳皮去白 五靈脂研細水飛各二錢

右五靈脂為末入青皮陳皮末和勻又次入玄精硝黃和勻好
酒醋煮糊丸菀豆大每服三十九空心酒送下○小兒驚風欲
絕研碎米湯調下○大人伏暑悶亂紫蘓湯下○婦人產後血
暈惡露不止醋湯下赤白帶小腹痛男子疝氣諸痛不辨陰陽

之證悉宜服之

安腎丸 治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢無力夜夢遺精
小便頻數常服壯元陽益腎水

桃仁去皮炒四兩 肉桂去粗皮十六兩 白蒺藜炒 巴戟天去心

肉苁蓉酒浸 破故布炒 茯苓 白朮

石斛 萆薢各四兩 川烏製十兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九空心溫酒鹽湯任下
接真湯 治陰病手足厥冷腰腹疼痛真氣不之衰憊欲絕

沉香二錢 丁香一錢 麝香五分 附子製三錢

水二盞姜七片棗一枚煎七分去查空心溫服

靈砂 治諸虛痼冷厥冷神効

水銀 三兩

硫黃 一兩

鍊朱砂作水銀即此砂也就於市肆贖之研為末糯米糊丸麻子大每服五七丸加至十五丸空心人參蜜湯下或鹽湯下疝氣偏墜木腎腫疼炒茴香入酒煎溫下 虛勞咳嗽入姜烏梅紫蘓煎湯下 盜汗小便多牡蠣入鹽湯下嘔逆翻胃丁香木香湯下 瘰癧不已桃柳枝煎湯下 腹滿腰痛莪朮湯下 遺精白濁茯苓湯下 走注遍身風嚼葱白酒下 婦人血氣痛延胡索煎湯下 小兒驚風人參薄荷湯下

白雄朱丹 治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變為勞瘵

作黃

朱砂 各二兩

用磁盒一箇先以牡丹皮二兩燒煙內外薰黃入雄砂於內以醞醋和臈茶作餅封合口以赤石脂固濟合縫又用赤石脂和泥又固一重外用鹽泥紙筋又固一層用糠火慢煨令乾次以炭火煨通紅為度退火埋土地中過宿去火毒取研入後藥

丁香

萹撥

赤石脂

胡椒

附子

白木 各一兩

乳香 與石脂同研

官桂

木香 各五錢

右為細末和前藥又研勻以清酒二升二分熬去一分入附子末煮糊丸梧桐子大每服十九空心溫酒或鹽湯送下

秘兜肚方 治腹中寒積固冷不散用之神效無丹田神關令人有子男婦皆可用有孕勿用

檀香

排草各一兩

沉香

丁香各五錢

丁皮

廣零稜

馬蹄辛

白芷各六錢

甘松

附子

乳香各二錢

射香九分

右十二味為末和揉艾鋪綿中用帛做成兜肚以線釘定勿令移動外又紬夾裹肚及小腹初裹一夜日去之漸漸至二夜一去又漸五夜一去方可常裹

保真膏 治一切虛冷證及無子腎衰陽事不舉不固貼丹田及

腎命門穴久久貼之大有功效方見秘驗門

穰落洗法 治下元虛寒一切冷病腰腹冷痛崩漏帶下

楸目

川烏

細辛

乾薑

官桂 右等分為粗末煎湯執洗下部為妙

灸法 治腎與膀胱俱虛瀉冷灸百壯愈妙

腎俞 二穴在命門穴對臍各門一寸五分是穴

三陰交 二穴在足內踝上四指當是胛中是穴

氣海 一穴在臍下

易簡方

一方 治一切冷氣胡椒三七粒搗酒服之

一方 治下元虛冷以胡椒破故紙等分為末蜜丸如梧桐子大

每服三十九丸空心温酒下

古今醫統大全卷之二十二終
一方 治心腹冷氣痛用大菖蒲二三寸槌碎同吳茱萸煎湯下之或細嚼菖蒲三寸熟酒下亦効

一方 治冷氣少腹常痛以艾葉乾薑等分為末蜜丸菟豆大每服三十九酒吞下

一方 治冷疝少腹寒痛引入陰囊漸腫用花柳炒砂碎承以帛裹囊一寸厚須臾熱氣通而愈不熱易之

一方 治婦人少腹寒痛用烏為末好醋調攤絹上貼之

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE

AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 5 1952