

T 7103/2955(20)

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
DEC 5 1952

古今醫統大全卷之五十一目錄

自汗門

病機

內經自汗論

汗為心腎俱虛陰陽偏勝

自汗陽虛

自汗屬氣虛濕熱

脈候

治法

治自汗當清心火和胃氣實腠理三法兼施

治自汗與盜汗不同

不治證

藥方

壽集

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

古今醫統大全卷之五十一目錄

桂枝湯

黃芪建中湯

紫胡桂枝湯

大補黃芪湯

牡蠣散

芪附湯

辰砂五苓散

三建湯

建中湯

桂枝附子湯

黃芪湯

玉屏風散

調衛湯

涼膈散

朱砂安神丸

正元散

頭汗

紫胡桂薑湯

心液汗

參歸湯

撲粉止汗法

飲食汗

安胃湯

撫芎湯

艾湯煎

止汗紅粉

牡蠣白朮散

易簡方

盜汗門

病機

盜汗敘論

脈候

盜汗陰虛

治法

治盜汗東垣有法有方

小兒盜汗不治自愈

藥方

當歸六黃湯

黃芪六一湯

黃芪湯

神效麥麩湯

長砂妙香散

大補陰丸

玉屏風

白苓湯

麥煎散

石斛散

生地黃煎

木茯湯

參茯苓散

龍膽散

防風散

正氣散

四白散

椒目散

白朮散

治盜汗歌

陰汗

青娥丸

珍珠散

脚汗

清脾散

牡蠣散

卷之五十二目錄

消渴門

病機敘論

古今醫統卷之五十二目錄

內消候

消渴有三焦受病之異

三消之疾為燥熱太過

消渴因膏梁肥甘之變

消渴由於脾不舒精而肺燥

諸經皆有燥熱為渴惟三焦甚

有消中熱中強中除中之異

脉候

治法

治消渴養血降火生血為主

消渴屬熱有內外虛實之分

張潔古分治消渴例

藥方

治消渴通治劑

麥門冬湯

當歸潤燥湯

地黃飲子

大黃甘草飲子

和血益氣湯

瓊玉膏

清心蓮子飲

黃芪六一湯

麥門冬飲子

梅花聚香湯

神仙戒水法

梅蘊丸

玉泉丸

川黃連丸

茯苓丸

四汁膏

三和甘露飲

三消丸

朱砂黃連丸

六神湯

黃芪湯

天花散

烏梅五味子湯

參芪湯

栝藹散

玉壺丸

降心湯

天王補心丹

加減三黃丸

天花粉丸

酒蒸黃連丸

猪肚丸

醍醐膏

珍珠龍腦丸

上消諸方

白虎湯

人參石膏湯

絳雪散

中消諸方

人參散

加減腎氣丸

加減八味丸

平補丸

葛根丸

枸杞子丸

鹿茸丸

菴蓉丸

珍珠粉丸

補腎地黃丸

酣飲消渴證

烏梅木瓜湯

白豆蔻湯

大建中湯

二石薺苳湯

薺苳丸

紫蘊湯

瞿麥湯

藍葉散

忍冬丸

養生道引法

葶藶丸

玄參散

易簡方

卷之五十三目錄

頭痛門

病机

頭痛敘論

頭痛病多屬三陽之經

頭痛屬火為病

東垣論頭痛甚詳

頭痛屬外感傷寒者多

頭痛大法屬內外因

脉候

治法

治頭痛分內外為要

丹溪治法

分經用藥治頭痛法

治頭痛用發散之訣

藥方

發散風寒諸劑

川芎茶調散

羌活附子湯

芎半散

川芎神功散

麻黃附子細辛湯

如聖餅子

小芎細辛湯

麻黃湯

桂枝湯

加減三五七散

川芎香附湯

天香散

藿香散

大芎湯

必勝散

都梁丸

川芎散

九龍丸

川芎丸

香芎散

芎芷散

牙皂散

痰火頭痛諸方

清上瀉火湯

溉濟解毒湯

飛虎散

石膏鼠粘子散

清空膏

菊花散

上清散

安神湯

川芎石膏湯

芎犀丸

神芎丸

茶酒調散

風熱頭痛諸方

石膏散

川芎散

通天散

靈砂丹

青火金鍼

赤火金鍼

痰厥頭痛諸方

半夏白朮天麻湯

三生丸

氣虛頭痛諸方

升氣和中湯

加味調中益氣湯

活人人參順氣湯

葱附丸

血虛頭痛諸方

四物湯

當歸酒

搐鼻諸方

珍珠散

神芎散

本事方

玄胡餅

三因方

瓜蒂散

敷貼頭痛頭風諸方

急風散

止痛太陽丹

乳香餅

決明散

烏麥餅子

枕頭方

顏思退方

熨法

經驗方

灸法

眩暈門

病機敘論

眩暈證乃風火之象

眩暈之病當分內外所因

眩暈之病三虛宜審

尋常眩暈屬痰火者多

脈候

治法

頭風痰飲眩暈宜用子和吐法

鎮墜藥治眩暈須識標本 丹溪治法

藥方

半夏白朮天麻湯

加味二陳湯

風眩頭暈

愈風餅子

川芎散

白附子丸

芎藭散

天麻羌活丸

人參前胡湯

風寒挾虛眩暈諸方

三五七散

人參湯

白朮散

蔓荊子散

痰火眩暈諸方

滾痰丸

芎犀丸

加味二陳湯

玉液湯

氣血虛眩諸方

香橘飲

十全大補湯

鎮墜諸方

黑錫丹

養正丹

濕鬱眩暈諸方

古今醫統卷之五十三目錄

芎木湯

除眩湯

丹溪頭運方

加味六君子湯

六合湯

易簡方

△頸項強痛

病機項強有痰熱客經

藥方

木瓜煎

枳附散

養神湯

鍼灸法

卷之五十四目錄

△身體痛

病機敘論

飲酒濕痰身痛者多

治法

威靈仙丸

麻黃湯

舒筋湯

沉香蠶甲散

聖散子

當歸拈痛湯

麒麟竭散

諸風應効酒

△肩背痛

病機敘論

脈候

治法

羌活勝濕湯

防風通聖散

通氣散

蒼木復煎散

消飲丸

烏藥順氣散

消痰茯苓丸

天仙散

瓜拘急候

病機敘論

治法

小續命湯

仲景三黃湯

卷之五十五目錄

瓜皮膚候

病機敘論

皮膚痛屬心火剋金

皮膚索澤為肺燥

生血潤膚飲

升麻澤膚膏

瓜皮風搔癢

玄參升麻湯

防風通聖散

消風散

加味補中益氣湯

洗澡湯

應効酒

瓜風痺癢疹

加味羌活散

胡麻散

天麻散

大胡麻散

僵蠶散

玄參升麻湯

消風散

犀角消毒飲

瓜斑丹火毒

防風通聖散

解毒防風湯

陽毒梔子湯

犀角消毒散

玄參升麻湯

人參白虎湯

消毒飲

藍葉散

瓜風癰候

除癰湯

除濕湯

苦參丸

一掃散

八寶散

獨聖散

瓜汗斑候

防風通聖散

玄參升麻湯

古今醫統大全卷之五十五目錄終

古今醫統大全卷之五十一

新安徐春甫編集

四明朱法校正

瓜自汗門

病機敘論

內經曰汗者心之液陽加於陰謂之汗○又云勞則氣耗喘且汗出飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重行遠汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾○原病式曰心熱則汗出○東垣曰西南坤土也在人則為脾胃夫人之汗猶天地之雨

陰滋其濕則為霧露為雨也。心為君火主熱脾胃屬土主溫濕熱相搏為汗明矣。○經云衛氣者所以溫分肉充皮毛肥腠理司開闔者也。又曰陽氣者衛外而為固者也是以體虛之人或為風暑濕邪所干遂使分肉不溫皮毛不充腠理不密開闔不固則陽氣外泄而汗為之出也。又曰氣虛則多寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中表虛亡陽不任外寒中傳寒中多成痺寒矣。
汗為心腎俱虛陰陽偏勝所致

心之所藏在內者為血發外為汗蓋汗乃心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得之故陰虛陽必湊發熱而自汗陽虛陰必乘發厥而自汗皆陰陽偏勝所致也

自汗陽虛

自汗者無時而漉漉然出動則為甚屬陽虛腠理不固胃氣之所司也故經云陽氣有餘為身熱無汗人以衛氣固其表衛氣不固則表虛自汗而津液為之發泄也

自汗屬氣虛濕熱

汗為心液心火不蒸則液不出脾濕下流何汗之有惟火鬱蒸津液上騰如霧衛氣不固則泄出而為汗也所以治汗專務固表之劑而弗効者殊不知心火不靜脾濕不降如之何其過也智者審

脈候

脈來微而濡濡而虛而弱者皆主自汗也。○脈大而虛浮而軟者

自汗也。傷寒陰陽俱緊當無汗。若自汗者曰亡陽不治。

治法

治自汗當清心火和胃氣實腠理三者兼之。

汗出於心熱之所致。汗出於脾濕氣上騰。汗泄於膚衛氣不固。所以清心則液榮於內而為血。和胃液周流而不騰。實腠理則衛氣充而液不泄。知斯三者治汗畢矣。

治自汗與盜汗不司。

自汗陽虛治當補氣以衛外。盜汗陰虛治當滋陰以榮內。衛者陽氣榮者陰血。治陽者人參黃芪防風桂枝之類是也。治陰者當歸地黃黃蘗黃精之類是也。

治自汗用人參黃芪。佐桂枝防風達表。故云黃芪得防風而愈。大陽虛者亦可少加附子以行參芪之功。火氣上蒸胃中濕氣亦能作汗。宜涼禹散。心火不寧煩躁出汗者安神丸清心湯之類。痰飲留而亦能作汗。宜加二陳湯朱砂痰丸之類。

不治證

汗出髮潤一不治也。汗出如油二不治也。汗出如珠三不治也。君子見機辯之不可不早。

藥方

仲桂枝湯 治病入發熱自汗此胃氣不和或傷風惡風脈浮自汗

桂枝一錢 芍藥二錢 甘草一錢

右水二盞姜三片棗一枚煎八分食前温服

建中湯 治表虛自汗

官桂 五分 芍藥 二錢 甘草 一錢

右水二盞姜三片棗一枚煎八分服

黃芪建中湯 治虛勞自汗 即建中湯加黃芪血虛者加當歸名當歸建中湯

桂枝附子湯 治婦人血虛自汗不止 當歸建中湯加桂枝附子各五分空心服

柴胡桂枝湯 治發熱自汗或寒熱自汗

柴胡 一錢 桂枝 人參 各五 甘草 二

芍藥 八分 半夏 生薑 各六 黃芩 五分

右水盞半棗二枚煎七分食前温服

黃芪湯 治喜怒驚恐房勞致陰陽偏虛者或自汗盜汗不止

黃芪 一錢 白茯苓 熟地黃 酒浸 肉桂

天門冬 去心 麻黃根 龍骨 各錢 五味子

浮小麥 炒 防風 各八分 當歸 酒洗 甘草 炙 各

右水二盞姜三片煎一盞食遠服發厥自汗加熟附子二片發

熱自汗加石斛一錢

大補黃芪湯 治自汗虛弱之人可服

黃芪 防風 山茱萸肉 當歸

白朮 炒 各 肉桂 甘草 炙 各 五味子 十

人參 白茯苓 熟地黃 肉蓯蓉 各一

右水盞半姜三片棗一枚煎七分不拘時服

玉屏風散 治表虛自汗

防風

黃芪

蜜炙各一錢

白朮

炒二錢

右水盞半姜三片煎七分服

和牡蠣散 治諸虛不足及大病後體虛津液不固常常自汗

黃芪

蜜炙

麻黃根

牡蠣

煨淬醋中各五錢

右作二服每服水盞半加小麥百粒煎至八分食前溫服

調衛湯 治濕勝自汗補胃氣虛弱表虛不任風寒

麻黃根

黃芪

蜜炙各一錢

羌活

生甘草

生地黄

生黃芩

半夏

各五分

麥門冬

當歸

猪苓

蘧米

紅花

各三分

五味子

九粒

右水二盞煎八分熱服

芪附湯 治氣虛陽弱虛汗倦怠

黃芪

蜜炙

熟附子

各等分

每服四錢水一盞姜五片煎七分食遠溫服

涼馬散 治胃中濕熱上蒸自汗者宜此

連翹

一兩

山梔

大黃

黃芩

薄荷葉

各半兩

甘草

一兩半

朴硝

三錢

為散為飲任服

辰砂五苓散 治濕熱自汗小便不利

白朮

白茯苓

猪苓

澤瀉

各半兩

肉桂

辰砂各二錢

為細末和勻每服二錢

朱砂安神丸

治心神不寧煩躁自汗

方見驚悸門

三建湯 治真氣不足上盛下虛面赤自汗小便頻數

大川烏製

附子製

天雄製各二錢

右水二盞姜五片煎八分無時服弗效加黃芪肉桂

正元散

治下元氣虛心腹脹滿時常自汗

方見諸虛門

○頭汗

頭汗證乃身無汗只是頭面出汗陽氣上脫也

柴胡桂姜湯 治頭汗出脇滿小便不利往來寒熱心煩而嘔

柴胡

桂枝

黃芩各一錢

乾薑炮

甘草

牡蠣各五分

天花粉一錢

右水盞半煎七分食遠溫服

○心液汗

心液汗證人多有之乃心氣溢盛故也面常發赤小兒因驚得之宜用收心氣涼心血

參歸湯 治心汗

人參

當歸酒浸各一錢

右先用猪心一枚破作數片煎湯澄清汁煎藥服

艾湯煎 治別無汗獨背間一塊有汗此思慮過多名曰心汗

白茯苓

為用艾葉煎湯調下數服

撲粉止汗法

牡蠣粉

麻黃根

天花粉

白芷

糯米粉

敗蒲扇燒灰

右為細末用綿包裹撲身上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣煨各一兩

赤石脂

龍骨各半兩

石為細末絹袋盛撲

又方 用川芎白芷白木各等分每兩入糯米粉三錢和

勻用絹袋盛撲身上日三度忌桃李雀肉仍灸大椎百壯即止

○飲食汗凡飲食汗出如洗日久心虛液耗令人清渴及半身不遂偏風痲疾此乃飲食慄悍之氣亦不可不為早治也

安胃湯 治飲食汗出宜用此藥按而收之

黃連

五味子

烏梅肉

甘草半生半炙各一錢

升麻稍三分

水盞半煎八分食遠溫服忌麪蒜姜樹

牡蠣白木散 治漏風證飲酒中風汗多食則汗出如洗久不治

必成消渴證

牡蠣煨一錢

白木炒

防風各二錢

右水二盞煎八分食遠溫服

撫芎湯 治自汗頭眩惡心痰逆

川芎

白木炒

陳皮各半兩

甘草一錢

右作二服每服水盞半姜三片煎八分食後服

易簡方

牡蠣散 治一切自汗盜汗用牡蠣不拘多少火煨通紅醋淬五

六次為末每一兩加定粉半兩和勻用絹袋盛之撲身上

一方 治虛汗不止玄府不閉用白木四兩分作四分製○一分

用黃芪同炒○一分用石斛同炒○一分用牡蠣同炒○一分

用麥麩同炒各煨炒黃色去餘葉只用白木細炒每服三錢粟米湯調下盡四兩為妙

又方 青桑第三葉焙乾為末空心米飲調下二錢最止心汗

一方 何首烏末唾調傳臍中即止汗

一方 鬱金為末臨卧以唾調乳上能止自汗

救急方 治自汗不止用陳糯米不以多少麥麩同炒令黃色研

為細末米飲調下三錢或熟猪肉蘸末食之亦可

一方 五倍子為末唾津調填臍中以帛縛定即止

一方 治自汗盜汗麥麩炒黃色椒目各等分每三錢水盞半煎

八分露一宿溫服

道藏經 治暑月汗漬腋下赤腫及痲瘡蕩以雪水蚌粉傳之

一方 治自汗不止粳米炒黃色為末絹袋撲身

一方 止自汗盜汗臨卧時少饑食宿蒸餅一枚不可飲湯水只

乾喫盡便就枕不過三次効

盜汗門

病機敘論

戴氏曰盜汗者睡中而汗出也不睡則不能汗出方其睡熟也湊然出焉覺即止而不復出矣非若自汗而自出也雜病盜汗責其陽虛與傷寒盜汗非比是亦心虛所致宜歛心氣益腎水使陰陽調和水火升降其汗自止

盜汗陰虛

丹溪曰盜汗屬血虛陰虛乃陽蒸陰分而液出者為盜汗故陰虛陽必湊發熱而盜汗陰虛火炎者法當補腎所謂壯水之主以制陽光是也

脉候

平人脉虛細微者善盜汗也○尺脉虛浮或滑泄為盜汗○脉濡者為有盜汗陰陽俱虛也

治法

治盜汗東垣有法有方

東垣云盜汗者寐中而通身出汗如浴覺來方知是屬陰虛禁血

之所主也宜補陰降火當歸六黃湯之類是也若虛寒者只以黃芪六一湯盜汗發熱因陰虛用四物湯加黃柏無氣虛加人參黃芪白朮○小兒盜汗不用治蓋血未乏也

藥方

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥

當歸

生地黄

熟地黄

黃連

黃芩

黃檗

黃芪

右水二盞煎八分服○或加甘草浮麥麻黃根

黃芪六一湯 治陰陽俱虛而盜汗

黃芪

甘草

水二盞煎八分服

黃芪湯 治虛盜汗

黃芪 蜜炙

人參

甘草 炙

白扁豆 炒

白朮 炒

白茯苓

陳皮

半夏 製

山藥

乾葛 各等分

每服八錢水二盞煎一盞溫服

神效麥麩湯 治心氣盜汗

麥麩 炒黃色

防風

白朮 炒

牡蠣 製

黃芪 蜜炙各錢半

水二盞棗二枚煎八分調長砂妙香散極效

辰砂妙香散

治盜汗補氣血安心神

大補陰丸

治盜汗 二方見虛損門

玉屏風

治自汗盜汗俱效

方見自汗門

白朮湯 治虛盜汗

黃芪 炙

防風

白茯苓

白朮 錢各

麻黃根

甘草

牡蠣 各五分

小麥 五粒

右水盞半煎八分食遠服

麥煎散 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩痛肌肉消瘦

知母

石膏

甘草 炙

滑石

地骨皮

杏仁 去皮尖

赤芍藥

葶藶

人參

白茯苓

麻黃根 各等分

右為末每服二錢浮麥煎湯食遠調服

石斛散 治陰虛盜汗

柴胡

防風

五味子

小草

遠志去心

黃芪炙

官桂

石斛

白朮炒

甘草炙

茯苓各等分

右每服七錢水二盞煎八分食前溫服

生地黄煎 治陰火盜汗

生地黄

當歸

黃芪炙

黃連

黃芩

甘草炙

麻黃根

黃蘗

浮小麥各一錢

水二盞煎八分溫服

木茯苓湯 治脾虛盜汗

白朮三錢

白茯苓二錢

右水半半姜三片棗二枚煎八分調妙香散至夜溫服

參苓散 治睡中汗出

酸棗仁炒去衣

人參

白茯苓各等分

右為細末每服三錢食遠米飲調下大人小兒皆可服

龍膽散 治盜汗有熱

龍膽草

防風各等分

右為細末每服一錢溫米飲調下臨卧服

防風散 治盜汗不止

防風一兩

人參半兩

川芎四錢

右為細末每服三錢臨卧米湯調下

正氣散 治盜汗

黃檗炒

知母炒各二錢

甘草炙六分

右水盞半煎八分熱服

四白散 治男婦血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能行

白朮

白扁

白茯苓

白豆蔻

厚朴姜汁炒

黃芪各七分

藿香

益智仁

人參

半夏

陳皮

烏藥

甘草

芍藥各五分

檀香

沉香各一分

右水二盞姜三片棗二枚煎八分食前溫服

椒目 治盜汗日久不止

椒目

麻黃根各等分

右為細末每服一錢食後無灰酒調下

白朮散 治盜汗極驗

白朮

半斤切成小塊用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水煮開取起切片焙乾去麥

右為末每服三錢別用浮麥煎湯食遠調服

治盜汗歌曰 睡中有汗醒時知 孰煮猪筒骨最宜 濃汁熟

調平胃散 清晨一服夜應稀

○陰汗 下焦濕熱不行以致陰間及囊俱有汗出常常不乾是也治法宜去下焦濕熱利小便滋陰而自止

青娥丸

治陰汗不乾

方見腰

大蒜丸

治陰汗濕痒用大蒜煨熟剝去皮爛碾同豆豉末搜和

丸梧桐子大朱砂為衣每服三十丸空心燈草湯下

珍珠散 治陰汗

蛤粉

牡蠣粉 等分

為細末絹袋盛撲

○脚汗脚汗為脾經濕熱內溢於四肢故令手足心常有汗
至冬陽氣內伏而汗愈多由此知其濕熱內溢也

清脾散 治手足心出汗

白朮 炒

蒼朮

茯苓

半夏

黃連 各錢

滑石

柴胡

升麻

甘草

羌活 各五分

水二盞加燈心煎八分空心服

牡蠣散 治脚汗除微氣

牡蠣 煨

白礬 枯

蜜陀僧

黃丹 各等分

右為細末每用少許乾摻脚指縫中即收

易簡諸方

本草衍義 椒目治盜汗切効將椒目微炒研為細末每服五分

以猪上唇煎湯調臨卧服蓋椒目行水又治水腫

本草藥性論 治盜汗牡蠣為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九

空心白湯下

一方 治盜汗浮麥一撮煎湯調防風牡蠣末二錢空心服

道藏經 治陰汗綿黃芪淨洗橫切細入銚內滴酒炒乾脆為末

以猪心者熟蘸食之効

肘後方 治脚汗用白礬一兩水二升煎洗脚瘡

一方 治脚汗用白礬乾葛等分為咀每二兩水三升煎十餘沸

乘熟洗脚一日二次經三五日自然無汗

一方治脚汗用楊花不拘多少水煎洗脚鋪於鞋底中嗟之
一方治脚汗不乾用燒人場內死屍土灰鋪於鞋底嗟之効

古今醫統大全卷之五十二

消渴門

病機

二消敘論

內經陰陽別論曰二陽結謂之消脉要精微論曰瘵成為消中
逆調論曰心移熱於肺傳為膈消也

巢氏病源云夫消渴者渴不止小便多是也由少服五石諸丸散
積經年歲石熱結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減少不
復能制於石石熱獨盛則腎為之燥故引水小便而不禁也其病
變多發癰疽此因熱氣留於經絡不引血流故成癰膿

消渴有病口甘者名為何何以得之此五氣之溢也名曰痺瘴夫五味入於口藏於胃脾為之行其精氣溢在脾令人口甘此肥美之所發此人必素食甘美而多肥令人內熱甘者令人滿故其氣上溢為消渴厥陰之病消渴重心中疼飢而不欲食甚則欲吐蚘又云五藏六府皆有津液若藏府因虛實生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩背寒而嘔者因利虛故也
內消候

不渴而小便多者是為內消由腎氣虛耗熱之所作亦名腎消
消渴由於脾不輸精而肺燥

內經曰飲入於胃游溢精氣上歸於脾脾氣散精上歸於肺通調

水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也渴而飲水蓋是脾液不上榮於肺而肺獨燥故多飲易渴
消渴有三焦受病之異

病機論消渴之疾三焦受病也有上消中消腎消**上焦受病**多飲

水而少食大便如常或小便清利知其燥在上焦屬於肺也又謂之為消病也**中焦受病**渴而飲食多小便黃經曰熱能消穀知其

熱在中焦屬於胃也又謂之消中**下焦受病**初發小便淋下如膏油之狀小便濁而有脂甚至面色黎黑形瘦而耳焦知其病在下

焦屬於腎也又名腎消

諸經皆燥熱為渴惟三焦為甚

經云有心肺氣厥而渴者有肝脾而渴者有痺痺而渴者有腎熱而渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言小腸痺熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥甘美食而渴者有醉飽入房而渴者有因遠行勞倦過大熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因病風而渴者雖五藏之部分不同而病之所因各異其為燥亡液一也獨三焦者為病甚未必不由微而至於漸也易曰履霜堅冰至君子當謹其微也

三消之疾為燥熱太過

劉河間曰三消之疾本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚皆因飲食服餌失節腸胃乾涸而氣液不得宣平或耗亂精神過遠其

度或因大病陰氣損五血液衰虛陽慄悍而燥熱鬱甚或因久嗜鹹物恣食炙煨飲食過度亦有年少服助陽金石丸散積久實熱結於下焦精液腎水不滋於上水火不相既濟遂成三消渴而引飲飲水多而小便亦多名曰上消若飲食俱多而不甚渴小便數消瘦者名曰中消若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液濁者曰腎消此三消者皆燥熱之亢極者也

有消中熱中強中除中之異

消渴病總為心火所乘肺金太燥故渴而引飲為氣旺血衰水不制火消中屬脾瘴熱而有三者之異有因陰勝陽鬱久為熱中經云脉洪大陰不足陽有餘則為熱中多食溲數為消中陰狂興

盛不交精泄則為強中病至強中其亦危矣厥而自利食已即饑則為除中病至除中不可治矣

消渴病因膏梁肥甘之變

消渴雖有數者之不同其為病之肇端則皆膏梁肥甘之變酒色勞傷之過皆富貴人病之而貧賤者鮮有也凡初覺燥渴便當清心寡慾薄滋味減思慮則治可瘳若有一毫不謹總有名醫良劑必不能有生矣

脉候

岐伯曰消渴脉實疾久可治○脉絃小病久不可治○脉經曰緊數相搏則為消渴○脉軟而散者當病消渴○又曰厥陰之為病

消渴氣上衝心中疼熱饑不欲食食則吐下之不肯止寸口脉浮而遲浮則為虛勞衛氣不足遲則榮氣竭○趺陽脉浮而數浮則為氣數則消熱以尖堅○緊數相搏則為消渴男子消渴小便反多以致一斗腎氣丸主之○心脉滑為渴滑者陽氣勝○心脉微小為消瘵脉實大病久可治實堅大者死細而浮短者死

治法

治消渴養肺降火生血為主

經云熱淫所勝治其甘苦以甘瀉之以辛潤之大法用黃連黃芩梔子石膏以瀉火天門冬麥門冬五味子以潤燥當歸地黃芍藥以生血黃蘗知母人參枸杞子以補腎水之源天花粉葛根以止

渴禁服半夏蒼朮生姜大料厚味更詳三焦分治其有不愈者子
治消渴分上中下三焦

上消肺也多飲水而少食大小便如常東垣云高消者舌上亦裂
大渴引飲者是也**以白虎加人參湯**主之一云上焦渴是心火刑

煉肺金所致宜降火清金以**白芍藥****白朮****黃柏****知母**加升麻引
清氣上升而渴自止春甫意謂降火潤燥而不効者宜升清氣

中消胃也多飲食而小便黃東垣云中消者善食而瘦自汗大便
硬小便數叔和云飲水多食癯成消中是也**以調胃承氣湯**主之

丸之類主之一云中焦渴飲食入胃傳送太急不生津液食已即饑
胃中有火宜黃芩石膏主之

下消腎也小便淋濁如膠油之狀東垣云下焦者煩躁引火耳輪
焦乾小便如膏腎水竭也此為腎消宜**六味地黃丸**之類

消渴屬熱有內外虛實之分

夫消渴本乎熱也而熱有內外虛實之分若傳經之熱熱甚液耗
而為渴者氣分受邪也當與寒涼淡滲之劑速清其熱熱去而陰
生陰生而渴止矣○若胃虛亡液陰虧而為渴者血受病也當與
甘溫辛酸之劑滋溢其陰陰生而燥除燥除而渴已矣

消渴末傳瘡疽中滿論

總論所謂末傳能食者必發癰疽背瘡有能食者必傳中滿鼓脹
皆為不治之證也東垣云末傳瘡疽者火邪勝也其瘡痛甚而不

潰經曰有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死未傳中滿者以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更治然藏府有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服皆失其所致為故如過與不及皆誅伐無過之地也如高消中消制之太急速過病所久成中滿之病正謂上消未除中滿復生者也治斯疾者宜審之

張潔古分治消渴

能食而渴者**白糜加人參湯**不能食而渴者**錢氏白朮散**倍加乾葛之屬上中既平不復傳下消矣先哲用藥厥有旨哉

治法總要當以白朮散養脾自生津液無用好粳米煮粥以膾肉切細煮服以養腎則水有所司又用淨黃連末入雄豬肚中蜜扎於斗水上蒸爛添些蒸飯臼中杵粘丸如梧桐子大每服百丸食後米飲下可以清心止渴

藥方

丹溪云三消者多屬血虛不生津液宜四物湯為主○上消者本方加五味子人參麥門冬天花粉前生藕汁生地黃汁人乳飲酒人加生葛汁○中消者本方加知母石膏滑石寒水石以降胃火○下消者本方加黃蘗知母熟地黃五味子之類以滋腎水當飲澡絲湯代茶

渴症治劑

寶麥門冬湯 治消渴日夜飲水不止飲下即沒

麥門冬

黃連

乾冬瓜各一兩

右咀分四劑每服水二盞煎一盞溫服無時當茶湯飲為妙冬
瓜如無乾者用新者一條重三斤去皮穰分作十二塊為十二
服每服一塊日三四次

東垣當歸潤燥湯 治消渴舌上白乾燥唇乾口乾眼澁黑處見浮雲

大便秘澁乾燥結硬喜溫飲陰頭短縮

當歸酒洗

升麻各錢半

枳胡

甘草半生半炙 各六分

黃檗

知母

石膏

桃仁

麻仁

生地黄酒洗各錢半

防風

荆芥穗

紅花各三分

杏仁六枚

小椒三粒

作一劑服水煎

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁

人參

生地黄

熟地黄

天門冬去心

麥門冬去心

黃芪

澤瀉

石斛去根

枇杷葉炙去毛

枳殼炒丹溪無此味

甘草炙各等分

右咀每服五錢水盞半煎七分食後服

河間大黃甘草飲子 治男婦一切消渴不能止者

大豆五升先煮二三沸淘去苦水再煮

大黃一兩半

甘草四兩一指長掩碎

右用沸水一桶煎藥同煮三五時如稠強更添水煮豆爛軟為
度盛於盆中枚冷令病人食豆渴飲湯汁無時候食盡如燥渴

止能藥未止依前再煮食之不過三劑其病悉愈

東和血益氣湯 治口舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除乾燥

當歸 酒洗 生地黄 黃連 黃栢 酒炒

升麻 各一錢 枳胡 甘草 半生半炙 各四分 麻黃根

知母 酒炒 漢防已 羌活 杏仁 去皮 各五分

桃仁 去皮尖 石膏 六分 紅花 少許

右水二盞煎一盞温服忌酒醋濕熱麪食

丹瓊玉膏 治三消最妙 方見咳

局清心蓮子飲 治三消小便不清 方見熱門

局黃芪六一湯 治男婦諸虛不足胃中煩悸時常消渴或先渴而

後發瘡或病諸瘡而後發渴者並宜服之 方見自汗門

暄麥門冬飲子 治馮消育滿煩心津液少氣多血少為消渴

麥門冬 去心 生地黄 人參 五味子

天花粉 甘草 炙 知母 茯苓神

乾葛 各等分 右咀每服五錢入竹葉十四箇煎服

梅花聚香湯 治消渴飲水日至石斗極病者可服之立愈

烏梅肉 天花粉 枇杷葉 麥門冬

五味子 瓜蒌子 人參 黃芪

乾葛 各一兩 檀香 半兩

右為粗末每日用一兩煎湯一斗代茶水飲無時

神仙戒水法 治三焦虛熱三消渴疾日夜飲水無度此藥王之

人參 天花粉 知母 宣黃連

苦參 麥門冬 浮萍 白藕豆

黃芪 各一兩 黃丹 一錢

右為細末每服二錢新汲水調下妙

梅蘊丸 治消渴渴熱能生津液

白梅肉 紫蘊葉 烏梅肉 各半兩 麥門冬 去心七錢

百藥煎 三兩 訶子 人參 各一錢 甘草 炙兩半

右為末煉黃蠟為丸芡實大不拘時噙化一九津嚥路行能

玉泉丸 治煩熱口渴

麥門冬 人參 茯苓 黃芪 半蜜炙

烏梅肉 焙 甘草 各一兩 天花粉 乾葛 各半兩

右為末蜜丸彈大每服一九溫湯嚼下

川黃連丸 治消渴

川黃連 五兩 天花粉 麥門冬 去心各二錢半

右為末生地黄汁并牛乳和丸梧桐子大每服三十九米湯下

茯苓丸 治消渴通用亦治白濁

兔絲子 製 北五味子 七兩 白茯苓 五兩 石蓮肉 二兩

右為細末乾山藥糊丸梧桐子大每服五十九米湯下

四汁膏 治三消止熱渴

黃連末

天花粉末

各二兩

牛乳汁

藕汁

生地黄汁

生姜汁

少許

右以藕汁地黃汁熬膏入前三味搜和佐以姜汁和蜜為膏徐

徐留舌上以白湯少許送下能食者加軟石膏天花粉

三和甘露飲 大治消渴每日進二服小便短澀者宜服之

滑石

石膏

人參

知母

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

甘草

各等分

每服五錢水二盞煎一盞食遠溫服

三消丸 治消渴骨蒸

宣黃連

去毛淨不拘多少為末

右取東瓜自然汁和連末成餅陰乾再碾為末用冬瓜汁為丸

如梧桐子大每服五十丸用東瓜湯送下或大麥湯下亦可

朱砂黃連丸 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

辰砂

一兩

宣連

三兩

生地黄

二兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸食前燈心棗湯下

三六神湯 治三焦渴疾

枇杷葉

炙去毛

括蕒根

黃芪

乾葛

蓮房

甘草

炙各一錢

右水二盞煎一盞食前服小便不利者加茯苓

黃耆湯 治諸渴

黃芪蜜炙

茯苓

括婁根

麥門冬

生地黃

五味子

甘草炙各一錢

水煎溫服

天花散 治消渴

天花粉

生地黃

麥門冬

乾葛各二錢

五味子

甘草各一錢

右作二服每服水盞半粳米百粒煎一盞食遠服

烏梅五味子湯

治消渴生津液

烏梅

五味子

百藥煎

巴戟去心酒浸

甘草炙各一錢

作二服水二盞煎一盞空心服

參芪湯 治消渴

人參

桔梗

天花粉

甘草各兩半

黃芪鹽湯炒

白芍藥

白茯苓

五味子各兩

右咀每服五錢水盞半煎一盞日四進

括婁散 治壯盛時不自謹次情縱慾年長腎氣虛弱不能房事

多服丹石真氣既盡石氣孤立唇口焦乾津液自泄小便赤黃

大便乾實小便日夜百十行當除熱補虛

天花粉

宣黃連

白藕豆

白茯苓

寒水石

甘草節

人參

白朮

石膏

猪苓各等分

為細末每服二錢白湯調下

玉壺丸一名天花丸

治消渴引飲無度

人參

天花粉 各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸麥門冬湯下

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉

人參

當歸

遠志 去心 生姜汁拌焙乾

白茯苓

黃芪 炙

川芎

北五味子

熟地黃

甘草 炙各五分

水二盞棗二枚煎服

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦

化痰涎祛煩熱療咽乾口燥育養心氣 方見虛損門

加減三黃丸 治消渴及治服丹石毒致成此疾

黃芩

春四兩夏六兩秋六兩冬三兩

黃連

春四兩夏七兩秋三兩冬二兩

大黃

春三兩夏一兩秋二兩冬四兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服二十九空心白湯下一月愈

寶鑑 天花粉丸 治渴通用

黃連 三兩童便浸

白扁豆 炒去支

白茯苓 各一兩

牡蠣粉

知母

天花粉

苦參

辰砂

鐵胤粉 各半兩

蘆薈 一分

金銀箔 各二片

右取括萋根汁和生蜜丸梧桐子大每服三十九麥門冬湯下

玉機 酒蒸黃連丸 治消渴飲水無度小便五七十次發熱瘦弱口乾

食已如飢此名消瘴今以苦味無毒除熱止消渴厚腸胃

黃連 八兩淨 酒一升重湯蒸伏時晒乾為末滴水丸梧桐子

大每服五十九食前溫水下

猪肚丸 治諸消渴

川黃連 五兩

乾葛

知母

茯神

麥門冬 去心

熟地黄 各一兩

瓜蒌 三兩

人參 一兩

粟米 一合

入石臼中為細末裝淨猪肚內密縫置甑中蒸

極爛乘熱杵細若硬少加蜜丸梧桐子大飲湯下五十丸

良醅醕膏 治消渴

烏梅 一斤搥碎甜水四大碗煎至一碗濾去渣

白沙蜜 五斤

砂仁末 半兩

右入砂鍋慢火熬赤色成膏為度取下放冷加白檀末三錢麝

香一字攪勻以磁器盛貯密封夏月凉水調冬月沸湯調服

良方珍珠龍腦丸 治消渴鎮心安神

珍珠

辰砂 另研

人參

黃連 各半兩

龍腦

天花粉 一兩

銀箔 五十片

右為細末煉蜜丸芡實子大每服一丸空心日午及臨卧時細

嚼麥門冬湯送下

神效散 治消渴

白芍藥

甘草 各等分

每服三錢水煎服



白虎加人參湯 治上焦消渴引飲

人參 一錢

石膏 三錢

知母 一錢半

甘草 五分

水盞半前八分溫服宜明麥門冬飲子同服

人參石膏湯 治渴消上焦燥渴不飲多食

人參 二錢 黃芩 知母 杏仁 各一錢

甘草 七分 石膏 三錢 粳米一撮水煎服

東垣絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩 黃丹 防已 括萎根 各等分

右為細末每服二錢溫漿湯下日進三服即止

中消諸劑

東垣生津甘露湯 一名清涼飲 治中消能食而瘦口舌乾自汗大便結小數

升麻 四分 防風 甘草 半錢 防已

生地黄 當歸 六分 柴胡 羌活

黃芪 炙 知母 黃芩 酒炒各八分 桃仁 去皮尖十枚另研

龍膽草 酒洗 石膏 黃蘗 各一錢 杏仁 十枚另研

右水二盞煎一盞溫服

東垣生津甘露飲子 治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下

時有腹脹或瀉黃如糜名曰殮泄身目俱黃四肢痿弱前陰如水尻臀腰背寒面鰲色急痛善嚏喜怒不常健忘

藿香 二分 柴胡 黃連 木香 各三分

白葵花 麥門冬 當歸身 蘭香 各五分

萹澄茄 甘草 半錢 梔子 白豆蔻

白芷 連翹 姜黃 各一錢 石膏 一錢半

杏仁去皮

酒黃栢各八分

知母酒炒

桔梗各三錢

升麻

人參各二錢

全蝎五枚去足

右為細末湯泛蒸餅和作餅子日中晒半乾杵細每用一錢於掌上食後舐之隨津嚥下或用白湯少許下

人參白朮湯 治胃高痺熱煩滿飢不欲食痺成為消中善食而

瘦燥熱鬱其而成消渴多飲水而小便數兼療一切陰虛陽食

風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒腸胃燥澁併傷寒雜

病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

梔子

荆芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉各半兩

茯苓

連翹

瓜蒌根

乾葛各一兩

甘草三兩

藿香葉

青木香

官桂各二錢

石膏二兩

寒水石二兩

滑石八兩

右為細末每服五錢水一盞入盆硝半兩生薑三片煎半盞入

蜜少許溫服漸加至十餘錢得臍府流利取効如常服以意加

減如腸胃鬱結濕熱內甚自利者去大黃芒硝服

甘露膏 治消渴飲水善食而瘦自汗大便結燥小便頻數

半夏

甘草半炙

白蔻仁

人參

蘭香葉

升麻

連翹

桔梗各五錢

防風各一錢

知母酒炒各半錢

石膏三錢

右為細末湯浸蒸餅和作薄片曬乾為粗末食後姜湯下二錢
錢加味白朮散 治消穀善飢

人參

白朮

茯苓

甘草炙

藿香各八分

乾葛一錢

木香

枳殼麩炒

五味子

柴胡各四分

水煎食遠溫服

茯苓 治消中煩熱消穀小便數

人參

茯苓

生地黄

黃連

麥門冬去心

枳殼麩炒

牡蠣粉

石蓮子去心

黃芪蜜炙

知母各半兩

瓜蒌子七錢半

右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服五十丸食遠米飲下

消痞丸 治三焦壅滯丹熱中消渴及治心火上炎上為咳血衄

血下為大小便血腸風痔漏小兒消疳積滯

黃連

葛根

青黛

牽牛頭末各半兩

大黃

黃蘗

山梔

薄荷

厚朴

藿香各二錢半

木香

官桂各一錢

黃芩

小茴香炒各二錢

右為細末水糊丸梧桐子大每服三十丸空心白湯下

下消諸劑

人參散 治消食善飲而食後數小便弱者

人參

砂仁

白朮

枳子

桔梗

括萎

連翹

澤瀉各錢

葛根

黃芩

大黃

白茯苓

甘草

薄荷各一錢

石膏

寒水石

滑石各錢

水二錢蜜少許煎八分溫服

加減腎氣丸

治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴飲水肢體

消瘦並皆治之

山茱萸肉

白茯苓

牡丹皮

熟地黃浸酒

五味子

山藥炒

鹿角霜

澤瀉各一兩

官桂

沉香各半兩

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服七十丸米飲或鹽湯任下

弱甚者加附子一兩兼常服黃芪六一湯

加減八味丸 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能溉濟心煩

燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不消多肌膚漸消如削或腿腫

脚先瘦小宜降心火生腎水煩渴即止

白茯苓

牡丹皮

澤瀉酒蒸各八錢

五味子微炒一兩半

山萸肉

肉桂

熟地黃酒蒸

山藥炒各二兩

右為末煉蜜丸梧桐子每服四十九丸五更溫酒鹽湯任下晚間

再服此藥不惟止渴亦免生癰久服永除渴疾氣血加壯

平補丸 治腎消不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如欲溲之狀

兔絲子製

山茱萸

益智仁

當歸各半

川練子

牛膝酒洗

葫蘆巴炒

杜仲製

肉蓯蓉酒浸

巴戟去心各三兩半

乳香二兩

右為細末糯米糊丸梧桐子大每服五十丸食前棗湯下

和葛根丸 治消渴腎消

葛根三兩

天花粉二兩

鉛丹一兩炒飛

附子一兩炮去皮臍

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十丸日進三服治日飲石水者

春夏去附子

枸杞子丸 治腎消久渴困乏小便滑數

枸杞子

白茯苓

牛膝酒洗

兔絲子製

麥門冬

熟地黄

黃芪炙

牡蠣粉各一兩

雞內金炙半兩

桑螵蛸

括婁根

牡丹皮各七錢

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服五十丸食前米飲下

鹿茸丸 治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸酥炙

麥門冬

熟地黄

黃芪

五味子

雞胫脰酒炒

肉蓯蓉

山茱萸肉

破故紙炒各七錢半

茯苓

地骨皮

人參

玄參酒浸各半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸米飲下

茯苓丸 止消渴補心腎

古今醫統卷之五十一
黃芪鹽湯拌

茯苓酒洗

巴戟酒浸

澤瀉

龍骨

兔絲子酒煮

磁石煨淬

茯苓

桂心

萹蘚

鹿茸去毛酥炙

牛膝

熟地黄

遠志

破故紙炒

山藥炒

杜仲製

茯苓

石斛

五味子

山茱萸肉

覆盆子各一兩

附子炮去皮暗八錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心米飲下

珍珠粉丸 治腎消白液隨洩而下或夢遺精滑

黃蘗一斤新瓦炒令褐色蛤蚧一對酥炙

右為細末水丸梧桐子大每服五十丸食前溫酒下

秘方補腎地黄丸 降心火補腎水治消渴除骨蒸壯筋骨明目

生地黄半斤酒浸二日蒸爛研膏與黃栢拌晒乾

黃蘗一斤剉細與地黄同拌晒

天門冬

麥門冬

人參

枳殼

條芩

當歸

熟地黄

甘菊各二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服七十丸空心溫酒下

醃飲渴證

烏梅木瓜湯 治飲酒積熱酷毒薰蒸五藏津液枯焦血泣小便

并多肌肉銷燂好飲冷漿

木瓜

烏梅打碎不去仁

麥芽炒

草果

甘草各等分

每服七錢水二盞姜三片煎八分溫服

白豆蔻湯 治酒毒消渴

黃連 葛根 天花粉 麥門冬各一錢

五味子 白豆蔻 陳皮各五分 黃柏

甘草各七分 右水二盞竹葉二十箇煎一盞溫服

強中消渴證 消燂肌肉如虫之蝕此乃膏液之滿 諸方書謂之強中宜大建中湯治之

大建中湯 治蠱病小腹急痛便尿失精洩出白液此真精不守

黃芪蜜炙 遠志去心 當歸酒浸 澤瀉各一錢

人參 龍骨 甘草炙 芍藥各一錢

右咀作二服每服水二盞薑三片煎八分食前服

此證脾風傳腎名曰疝瘕小腹寬熱而痛出白液一名蠱蠱者

蠱也在蠱卦上艮下巽以少男而惑於長女消燂脂肉如虫蝕之

蝕日見損削乃膏液之消也諸書謂之強中或謂之脾消又謂

之消腎其證脾消者飲食入腹如湯潑雪隨小便而出皆旋結

而如白脂肌肉日漸消瘦不能起止精神恍惚口舌焦乾若不

早治必至虛陽興盛不交而泄是為強中斃不久矣

二石薺苳湯 治強中多因耽嗜色慾或服丹石真氣既脫致消

渴飲水飲食倍常虛陽常與不交自泄乃中焦虛熱注於下焦

三消之中最為難治

石膏 薺苳各一兩半 人參 茯苓

磁石煨 葛根 黃芩 括萋根

知母

甘草 各一兩

右水五盞猪腎一具去脂膜黑豆一合同煮至一半去腎并豆入藥五錢在盞內再煎八分空心服下焦熱夜間服

薺苳丸 治強中為病虛陽盛舉不交精泄及服丹石致成此疾

薺苳

大豆

茯神

括萎根

人參

知母 各半兩

右為末用猪腎一具煮爛搗和

九梧桐子大每服五十九空心鹽湯下入少酒糊丸亦好

紫蘓湯

治消渴後遍身浮腫心禹不利

紫蘓

桑白皮

赤茯苓 各一兩

郁李仁 去皮炒三兩

羚羊角

栲榔 各三錢

淮心

枳殼 麸炒

獨活

木香 各二錢

右咀每服四錢水盞半姜三片煎八分溫服

藹麥湯

治消渴飲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

藹麥穗

澤瀉

滑石 各半兩

防風 三錢

黃芩

大黃 各一錢

桑螵蛸 炒十四枚

右咀每服三錢水一盞煎七分空心溫服良久再服

葶藶丸

治消渴後成水病浮腫

甜葶藶

兩紙炒

瓜蒌仁

杏仁 炒

漢防己 各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九食前赤茯苓湯下

藍葉散

治渴利口乾煩熱背生癰疽赤爛痲癩

藍葉

升麻

玄參

麥門冬

黃芪

葛根

沉香

赤芍藥

犀角屑

甘草各一兩

大黃二兩微炒

右咀每服四錢水一盞煎六分溫服

玄參散 治渴利煩熱生癰疽發背癰腫疼痛

玄參

芒硝

大黃微炒

犀角屑

羚羊角屑

沉香

木香

黃芪各一兩

甘草三分

右為細末每服二錢溫水調下

忍冬丸 治渴疾愈後預防疽發

忍冬草

不以多少根莖花葉皆可用一名金銀花一名左纏藤洗淨用

右用米麩酒于瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許為末即以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲任下 一方以忍冬草煎服此藤凌冬不凋三月開花五出黃白相間微香外科精要不犯鐵器將煮酒久嘗取服治一切風疾癰疽惡毒仍治五腫飛屍五痔諸漏并能止渴真奇効

易簡諸方

梁椹 治渴疾最効梁椹熟時盡意食之 牛乳 治消渴細細呷之効

蘿蔔汁 時飲少許 厚 湯 治渴神効者繭絲湯收貯入罐密封確

口埋地中任經數年愈久愈好遇渴疾取飲之頓効家無畜者旋用絲綿煮湯服

天花粉 治消渴之聖藥大忌半夏不宜發汗及利小便

一方 治消渴用糯米二升淘取泔水隨意飲之渴止勿服

一方 治渴用黃連一兩水一碗煎半碗頓服之立止

一方 用括萹三十斤水一石煮取一斗半去渣以牛脂五合煎

水盡以煖酒先服如雞子大日二服効

一方 用田螺五升水一斗浸經宿飲之每日易

魚膏心鏡 治上焦煩渴和中補脾利大腸解酒毒以甘蔗削去

皮截寸長食後嚼之止渴

一方 用次豉煮汁任性飲之

一方 治消渴小便多飲水無度用雞雞一隻去毛細切和鹽豆

豉作羹食之効或煮爛取汁二升飲之并食肉尤妙

一方 治渴不止用白鵝一隻去毛以蘆煮之飲汁

一方 治熱渴以甜瓜去皮食後徐徐喫之煮皮作羹亦佳

一方 用冬瓜搗取汁飲之或煨熟搗尤妙

雞鴨方 治消渴下元虛損牛膝五兩細剉同生薑黃芩五升夜

浸日曝以汁盡為度乾為末丸梧桐子大空心溫酒下三十丸

久服壯筋骨駐顏黑髮津液自生

衍義方 用瓜萹實九月十月取穰以乾葛粉拌焙乾砂鍋內慢

火炒熟為度研末食後夜卧以沸湯點二錢大治肺燥熱渴

濟眾方 烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎一盞入豆

鼓二百粒煎至半盞臨卧服

濟衆獨聖散 治消渴出子了蘿蔔二枚淨洗薄切日乾為末每

服一錢者猪肉汁澄清調下食後并夜卧日三服

聖惠方 治煩渴葛粉四兩先以水淘粟米半升濾出與葛粉同

拌令勻者粥食之

又方 霜降後取葵根皮一握水一斗煮三升服之酒渴傷寒妙

一方 晚慧粉為末每服一錢冷水調下

肘後方 治大渴日飲水數斛小便赤澀者糜子一升水三升煮

數沸取汁飲之無限日飲數升効

道藏經 治消渴用雄牛穿鼻橫木燒灰存性為末酒調一錢不

拘時服或剉煎湯

一方 治消渴不止大豆五升粉草四兩大黃一兩半剉用水一

桶煮三五時豆軟成於盆中放冷令病人食豆渴飲湯汁食盡

未已再煮服如前必愈

食醫心鏡 治消渴凡飲梁米陳粟米及粟煮粥飲之為妙

一方 用梨多食之止渴飲酒人甚佳無病人不宜多食

本草云 治消渴收百草頭上露水飲之瘥

一方 治消渴甚重者取市上眾人淘坑水一盞服勿令患人知

不過三次瘥

唐本註云 消渴不止小便急數以羊肺一具用豆葉一把煮

熟不拘時服之良

一方 止渴利小便 **苦菜** 煮熟任意食之

崔元亮方 治消渴羸瘦小便不禁 **兔骨** 和 **大麥** 煮汁服効

經驗方 **牛肉** 味甘平無毒止消渴安山益氣養脾胃 **牛肚** 醋煮

和汁食之主解消渴 **牛腦子** **牛乳** 食之尤良

一方 用菜豆汁煮飲之止消渴

養生導引法

凡人睡卧勿張口久成消渴及失血

赤松子云卧閉目不息十二通治飲食不消

古今醫統大全卷之五十二終

古今醫統大全卷之五十三

頭痛門

病機

頭痛敘論

靈樞厥篇云厥頭痛取之六經手少陰○真頭痛頭痛甚腦盡痛

手足寒至節死不治

難經曰手三陽之脉受風寒伏流而不去則厥頭痛入連在腦者

名真頭痛

嚴氏論云氣血俱虛風寒暑濕之氣所侵傳於陽經伏留不去名

厥頭痛蓋厥者逆也逆壅而衝於頭也痛引腦顛陷至泥丸宮者

名真頭痛非藥之能愈夕發旦死日發夕死

東垣論頭痛甚詳

東垣論金櫃真言篇曰東風生於春病在肝俞在頭項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如是太陽膀胱之脉病衝頭痛是少陽膽經之脉病頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在高中過在手臣陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上而不下頭痛顛疾者下虛上實也過右足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如頭半邊痛者先取手少陽陽

明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節者旦發夕死夕發旦死有厥逆頭者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陽三陰之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體虛或癱痛為痰癖其脉沉緩蒼木半夏南星為主少陰頭痛三陰三陽經不流行而是寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛湯為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸

川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主血氣俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其効如神半夏白朮天麻湯治痰厥頭疼藥也清空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治

頭痛病多屬三陽之經

張子和云頭痛不止乃三陽受病也三陽分部分頭與項痛者足太陽經也擗竹痛俗呼為眉骨痛是也額角上痛俗呼為偏頭痛足少陽經也如痛久不已則令人散目以三陽之經受病皆腎高有宿痰之致然也先以茶調散吐之吐訖可服川芎薄荷辛涼之藥清上故脉書云寸脉急為頭痛是也

頭痛屬外感傷寒者多

活人書云頭痛者陽證也太陽證頭痛發熱惡寒無汗麻黃湯有汗桂枝湯若已發汗未發汗頭痛如破者連髮葱白湯不止者葛根葱白湯陽明證頭痛不惡寒反惡熱胃實也調胃承氣湯少陽頭痛小柴胡湯太陰少陰並無頭痛仲景只有厥陰證吳茱萸湯頭痛屬火熱之為病

張子和醫丹陽僧病頭痛不散明知其熱以布圍其顛上置冰於其中日易數次戴人曰此三陽蓄熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法並行七日而愈

一婦人偏頭痛五七年大便結燥兩目赤腫眩運世之頭風藥無

不服其頭上鍼艾數千百矣一日戴人診其脉急數而有力風熱之甚也此頭角痛三焦相火之經乃陽明燥火勝金故也夫金勝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥於裏尋陽明治以大承氣湯冷河水煎二兩加芒硝一兩煎成頓令分三五服下泄如湯二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之波菱葵菜猪羊血以滑之三劑之外目豁首輕燥澤結釋而愈

頭痛大法分內外之因

頭痛自內而致者氣血痰飲五臟氣鬱之病東垣論氣虛血虛痰厥頭痛之類是也自外而致者風寒暑濕之病仲景傷寒東垣經之類是也

脉候

內經曰寸口脉中手短者曰頭痛○脉經曰陽絃則頭痛又曰寸口脉浮中風發熱頭痛○脉緊而頭痛者傷寒○脉緊上寸口者傷風頭痛○凡寸口緊急或短或浮或絃皆為頭痛○脉浮滑為風痰易治短濇者難治○脉浮緊屬太陽○浮緩長屬陽明○絃細屬少陽○浮緩屬厥陰

治法

治頭痛須分內外為要

風寒暑濕火熱皆外邪氣血痰飲五臟之證皆內邪宜隨其氣血痰飲七情內火分虛實寒熱而調其內治其外也然氣血而用補

宜用東垣之法若三因等方用附子以治氣虛此則後陽虛立意
非人身平和之血氣也若夫年久偏正頭風者多因內挾痰涎風
火鬱遏經絡氣血壅滯之證然亦有血虛者須宜分別以治之

分經用藥治頭痛法

太陽頭痛惡風寒川芎為引導○陽明頭痛自汗發熱惡寒白芷
少陽頭痛往來寒熱而脈浮弦者柴胡○太陰頭痛體重痰實及
腹痛半夏○少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒逆為厥頭痛
細辛○厥陰頭痛項痛脈微浮緩欲入太陽其疾痊然亦當用川
芎○氣虛頭痛用黃耆○血虛頭痛用當歸○氣血俱虛頭痛黃
芪當歸○傷寒太陽頭痛麻黃湯桂枝湯○陽明頭痛白虎湯○

少陽頭痛小柴胡湯 少陽頭痛大便多秘或可下之○太陰頭

痛脈浮桂枝湯脈沉理中湯○少陰頭痛脈浮微麻黃附子細辛

湯○厥陰頭痛外傷本經桂枝麻黃各半湯嘔而微吐清水吳茱萸湯

丹溪治法

頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火用二陳湯加白芷川芎
為主○肥人多是濕痰宜半夏蒼白朮○瘦人是熱與血虛宜四
物湯加酒芩防風○勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩大陽穴
痛甚此相火自下衝上宜補中益氣湯加川芎當歸甚者加知母
黃檗蔓荊子細辛

偏頭風在左屬風及血虛風用荊芥薄荷血用當歸川芎芍藥酒

黃檗在右屬痰與熱痰用蒼朮半夏熱用酒製片苓諸家不分所屬故藥多不効。○如因感冒而頭痛者宜加防風羌活稿本葛根升麻紫胡之類。○風熱上攻天麻蔓荊子台芎酒苓苦頭痛加細辛。○痰厥痛甚者吐之火者清之散之虛者補之。○杜實熱痛大便結燥者大承氣湯。○頭面壅腫有熱脈絃數者涼馬散去硝黃加桔梗枳殼荊芥薄荷如頂巔痛者宜加藁本酒炒升柴。○面上紅腫因氣實連頭痛者胃風湯。○面腫生瘡調胃承氣湯加薄荷荊芥。

治頭痛用發散之誤

節齋雜著云久病頭痛畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒也世人不識悉用辛溫解表之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風寒易入外寒束其內熱閉通而為痛辛熱之藥雖能閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表之劑以從法治之則可愈而根可除也若有感冒發散之後還宜調理正氣則因其病機而補益之庶無復作之患也

藥方

發散風寒諸劑

方 川芎茶調散 治諸風上攻偏正頭痛鼻塞聲重

薄荷葉二兩

荊芥穗

川芎各一兩

羌活

白芷 甘草各半 細辛 防風各二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

仲麻黃附子細辛湯 治三陰三陽經不流行而足寒氣逆為厥頭

痛其脉沉細

麻黃 細辛各六錢 附子一箇去皮

右咀水三升三合先煮麻黃令沸減七合掠去上沫納諸藥煎

取一升去查分三服

東垣羌活附子湯 治冬犯寒腦痛及齒亦痛名曰腦風

麻黃 附子炮 防風 白芷

僵蠶 黃檗各七分 羌活 蒼朮各五分

升麻二分 黃芪三分 甘草二分 佛耳草三分無嗽不用

右咀水二盞煎一盞去查温服

河間如聖餅子 治風寒伏留陽經痰飲氣逆頭痛

防風 天麻各半兩 南星 乾薑

川芎 甘草各一兩 半夏半兩 川烏去皮一兩

右為末蒸餅糊調作餅如錢每用五餅以荆芥末細嚼茶清下

三因芎半散 治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭痛如破兼眩暈嘔吐

附子去皮臍 烏頭去皮 南星 乾薑

甘草炙 川芎 細辛各一錢

右細切作一服加生姜五片芽茶少許水二盞煎一盞温服

嚴小芎細辛湯 治風寒在腦或感邪濕頭重而疼眩暈嘔吐

川芎 二錢 細辛 白朮 各一錢 甘草 五分

右咀水盞半姜五片芩茶少許煎七分食後服

寶鑑川芎神功散 治風寒鬱熱上攻頭目令人偏正頭痛

川芎 川烏 白芷 南星

麻黃 各一錢 甘草 薑三片棗一枚水煎服

仲麻黃湯 治太陽傷寒 桂枝湯 治太陽風頭痛有汗見傷寒門

局加減三五七散 治風寒入腦陽虛頭痛

山茱萸肉 一斤 細辛 半斤 乾薑 炮一兩 防風 一斤

附子 十二枚炮 茯苓 右為末每服二錢溫酒調下

川芎香附湯 治厥頭痛風寒腦後疼及傷寒傷風一切頭痛

川芎 香附子 羌活 蒼朮 米泔浸

細辛 茵陳 各七錢半 甘菊 薄荷

白芷 各二兩 荆芥 甘草 各八錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

方天香散 治年久頭風不得愈者

天南星 半夏 各製 川烏 去皮 白芷 各二錢

右咀作一服水二鍾生姜自然汁小半盞煎一盞食遠服

三藿香散 治體虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏正頭疼並治

藿香 洗去土 草烏 炮去皮 川烏 炮去皮 乳香 如皂角子

右為細末每服一錢食後薄荷湯下

大川芎湯 治新沐感風名曰首風旋運昏眩偏正頭痛

川芎 四兩 天麻 一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作十丸每服細嚼茶酒任下一丸

楊必勝散 治風寒流注陽經以致偏正頭痛六年不愈最效

附子 大者生去皮脂切四段以生姜自然汁一盞浸一宿火炙乾再浸再炙以汁盡為度 高良薑 各等分

右為末每服二錢臘茶清調下食後連進二服忌熱物少頃

都梁丸 治風吹項背頭目昏眩及腦痛婦人胎前產後傷風頭痛

白芷 大塊白者洗去土淨沸湯泡四五次剉用

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼荆芥點茶下

聖惠川芎散 治偏正頭風疼痛

川芎 羌活 細辛 香附子

槐花 甘草 炙 石羔 各半兩 荆芥穗

薄荷 菊花 茵陳 防風 各一兩

右為末每服二錢茶清食後服忌動風物

聖惠九龍丸 治婦人男子八般頭風一切頭痛

川芎 川烏 石膏 白芷

草烏 南星 半夏 各半兩 細辛

全蝎 各二錢半 右為末韭汁丸梧桐子大每服五十九茶清下

聖惠川芎丸 消風化痰利咽膈清頭目治頭眩心忪煩熱頸項肩背

拘倦肢體煩疼皮膚搔痒腦昏目疼鼻塞面上遊風狀如蟲行

川芎 薄荷葉各十兩 甘草六兩 細辛一兩

防風六兩 桔梗二十兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十丸細嚼茶清臨卧服

神香芎散 治偏正頭風

香附子炒 川芎 石膏飛 白芷

甘草 薄荷各一兩 川烏半兩去皮臍

右為末每服二錢食後茶清調下

直指芎芷散 治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

本牙皂散 治偏正頭風痛

猪牙皂角去筋 香白芷 白附子各等分

右為末每服二錢食後茶清調下右痛右側卧左痛左側卧

追風散 治諸風上攻頭痛目眩鼻塞聲重皮膚瘙痒眉角引牽

婦人血風及一切頭痛

川烏炮 防風 石膏另研各一兩 僵蠶炒去絲嘴

甘草炙 荆芥 全蝎去毒炒各半兩 川芎七錢半

麝香一錢 右為細末每服二錢食後茶清調下

灰火頭痛諸劑

旅清上瀉火湯 燕京温官人年少時氣弱常於氣海三里灸之節
次約千餘壯至老添熱厥頭痛雖冬天大寒尤喜寒風則頭痛
少愈若在煖處其痛復作五七年不愈此皆灸之過也

羌活 知母酒浸 黃芩 黃蘗酒浸

炙甘草 黃芪錢各一 防風 升麻各七

生地黄 羌胡稍 甘草根 黃連酒浸

藁本各五分 蔓荊子 當歸身 蒼木各三

荊芥穗 川芎各二分 細辛 紅花各少許

右水二盞葱白一寸煎八分食遠服

旅既濟解毒湯 治上熱頭目腫痛背膈煩悶不得安卧身半已下

皆寒足筋尤甚大便微秘

升麻 羌胡 當歸身 連翹

黃芩酒炒 蔓荊子 黃連酒炒 甘草灸

大黃大便利者勿用 桔梗各二錢

右咀水二盞煎一盞食後温服忌酒濕麪食大料生冷硬物

旅飛虎散 治風熱痰火偏正頭風痰痛

白芷 荆芥穗 石膏煨

川芎 天麻 薄荷 防風各半

蒼木米泔浸 兩頭尖黑心者不用各一錢

右為細末每服一錢食後温酒或茶清調下

清空膏 治偏正頭痛久不愈善治風熱自痛腦疼除血虛頭痛
不治其餘悉治

羌活 防風 黃連 甘草炙兩

柴胡七錢 川芎半兩 枯苓兩半酒炒一半

右為細末每服三錢茶清調如膏抹口內臨臥白湯下頭痛甚

加細辛三錢痰厥頭痛加半夏偏頭痛不愈加羌活防風川芎

菊花散 治風熱上攻頭疼不止

甘菊花 旋覆花 防風 枳殼

川羌活 蔓荊子 石膏 甘草炙各一錢

右咀水盞半薑五片煎八分不拘時服

良方上清散 治頭痛連眉骨眼睛痛不可忍

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗

芒硝各半兩 薄荷葉 乳香 沒藥各一錢

冰片五分 右為細末每用一字鼻內搐之

聖惠安神湯 治頭痛頭旋眼黑

羌活 黃檗酒炒各二錢 防風七分 柴胡

知母酒炒 生地黄 升麻各一錢 黃芪四錢

炙甘草九分 生甘草六分 右咀作二服每服水二盞煎盞

半蔓荊子五分川芎三分再煎一盞卧時熱服

川芎石膏湯 治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡

煩渴淋閉眼生翳膜此藥清神利頭目

川芎

山梔

芍藥

荆芥

當歸

黃芩

大黃

菊花

人參

白木

石膏

防風

薄荷

連翹

桔梗

寒水石

滑石

甘草

砂仁

右咀分二劑水煎食後溫服忌姜蒜熱物

芎犀丸 治偏頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣

遍服芎蝎等藥不効此藥數服而愈

川芎

朱砂

石膏

冰片

人參

茯苓

甘草

細辛

犀角

梔子

阿膠

麥門冬

右為細末煉蜜丸彈子大每服一丸食後細嚼茶酒任下

芎神丸 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽喉不利

大小便秘澁一切風熱之證並宜服之

大黃

黃芩

牽牛

滑石

川芎

薄荷

右為末滴入九梧桐子大每服五十九丸食後溫水下

醫林茶酒調散 治一切諸風痰壅頭痛目眩心熱皮風瘙痒并風毒

壅滯清爽神志通和閑寢

石膏 細研

菊花

細辛

香附子 各等分

右為細末茶酒任調服

二陳湯吞下清州白丸子 治一切風痰頭痛最効 方見風門

風熱頭痛諸劑

寶鑑 石膏散 治風熱頭疼

川芎

白芷

石膏 等分 每服四錢茶清調下

玉 川芎散 治風熱頭痛不清及目病

川芎

羌活

防風

藁本

升麻

甘草 各一錢

黃芩 炒

黃連 酒炒各四錢

生地黄 二錢

柴胡 七錢

右為末每服一二錢茶清調下

通天散 治偏正頭痛并夾腦風熱壅滯

赤芍藥

川芎

黃連

黃芩

玄胡索

皂烏

當歸

乳香 各等分

右為末用紙撚蘸藥入鼻中得嚏神効

御藥 靈砂丹 治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重清涕口苦

舌乾咽嗑不利骨膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥泄小便赤黃陰虛心火熾甚及偏正頭痛遍身麻木瘡痒一切風熱並宜治之

天麻

獨活

羌活

細辛

石膏

防風

連翹

薄荷 各二兩

川芎

梔子

荆芥穗

當歸

黃芩

大黃

全蠍

菊花

人參

白朮

朱砂

寒水石

桔梗

砂仁

生甘草

滑石

右為末煉蜜和每兩作十丸朱砂為衣每服一丸細嚼茶清下

青火金針

治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴

火硝

青黛

薄荷

川芎

右為末口噙冷水勿嚥此藥吹鼻

赤火金針

治同前

火硝

雄黃

乳香

沒藥

川芎

石膏

全蠍

用法如前

痰厥頭痛諸劑

東 半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶氣促上喘

無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭痛若裂身重如

山四肢厥冷不得安卧

黃栢

乾薑

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

神麩

白朮

麥芽

半夏

橘紅

右咀水二盞姜二片煎一盞食前稍熱可一服而愈此頭痛苦

甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能除眼黑頭旋風虛內作

非天麻不能療黃芪甘溫瀉火補氣實表止汗人參甘溫瀉火
補中益氣二木俱苦甘除濕補中澤瀉茯苓利小水道濕橘皮
苦溫益氣調中神麴消食滌胃中滯氣麥芽寬中助脾乾薑辛
熟以滌中寒黃栢苦辛以療冬天少火在泉發躁也

嚴氏三生丸 治痰厥頭痛

南星 半夏 白附子各等分

右為末姜汁浸蒸餅丸豆子大每服四十九食後姜湯下

氣虛頭痛劑

實升氣和中湯 治年高氣弱清氣不能上升頭昏悶本無表邪因
發汗數次表氣愈虛故苦頭痛惡風不喜飲食氣短脈弱絃細

而微宜升陽氣

黃芪錢半 人參一錢 白朮 陳皮

當歸 芍藥各五分 甘草 升麻

柴胡各三分 川芎 細辛 蔓荊子各一分

右咀水二盞煎一盞食後溫服

東垣加味調中益氣湯 治氣血兩虛頭痛其效如神

陳皮 黃蘗酒炒各二分 升麻 柴胡各四分

人參 甘草炙 蒼朮各六分 黃芪一錢

川芎六分 細辛二分 蔓荊子三分 當歸一錢

右咀水二盞煎一盞溫服

活人參順氣散 治頭痛增寒壯熱四肢疼痛

麻黃 乾葛 甘草炙 白朮

人參 桔梗 白芷各一錢 白姜炮五分

右咀分二服水一盞姜三片葱白二寸同煎連進取汗

氏葱附丸 治元氣虛壅上攻頭痛

大附子一箇 為末葱汁為丸梧桐子大空心茶下

血虛頭痛諸劑

要四物湯 倍加川芎治血虛頭痛

或元當歸酒 治血虛頭痛欲裂

當歸二兩 酒一升 煮取六合服

嚴氏玉真丸 治腎厥頭痛不可忍其脉之則絃按之則堅

生硫黃二兩另研 硬石膏 半夏製 硝石力研各一兩

右為末姜汁煮糊丸梧桐子大每服四十九食前米飲下

搐鼻諸藥

搐鼻之法則吐法之義也經云濕氣在上以苦吐之故邪在胃中
脈而吐之邪在頭上搐而嚏之張子和點目出泪搐鼻流涕皆同
乎吐之義也

通天散 青火針 赤火針並見前

珍珠散 治風熱上攻頭痛目眩鼻塞用此搐之

盆硝七錢半 滑石一兩 乳香五分 冰片少許

右研勻用一字口含水搐鼻中

神芎散 治前證

川芎

鬱金 各二錢

荊芥

薄荷 各二錢半

紅豆 一錢為末後入

盆硝 二錢

為末每用一字甚者連夜擗之

本事方 治八般頭風

草烏尖

細辛 各等分

以黃丹少許為末搐鼻立効

秘方 玄胡餅 治頭痛不可忍

玄胡索 七枚

猪牙皂角 肥實者二枚

青黛 二錢

右為末水和成小餅子如杏仁大用時令患人仰卧以水化開用竹管送入男左女右鼻中覺藥至喉小酸令患人坐却人咬

定銅錢一箇於當門齒當見涎出成盆便愈

五因方

防風 二分

羌活 三分

紅豆 二粒共為細末搐鼻

元瓜蒂散 治頭痛久不愈服藥及鍼灸不愈者以其濕氣在上也

瓜蒂 一朱

為末少許吹入鼻中清水徐徐出一晝夜濕盡痛上止

良丁香散 治頭痛不止

丁香 一錢

白芷 半兩

瓜蒂 一兩

右為細末用半字吹入鼻即瘥

敷貼頭痛頭風諸藥

急風散 治男婦偏正頭痛夾腦頭風太陽穴痛坐卧不安

生川烏 生皮

辰砂 研各一兩

南星 洗二兩

右為細末酒調塗貼痛處小兒貼顙門
良止痛太陽丹

大天南星 川芎各等分

右為細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處

乳香餅 治氣攻頭痛不可忍者

乳香一錢 草麻子十四粒

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去之解開頭髮出氣

决明散 治頭痛

决明子 為末水調貼太陽穴一方用决明築枕去頭風明目

烏麥餅子 治久病頭痛諸藥不効

烏麥麵半斤 吳茱萸二兩 為末 和勻淨水調作餅子入鑊上鑊

熟乘熟分頭髮蓋在頭上如帽子外以厚帛包裹定一時熱氣入腦而痛即止冷則去之未愈更換熟者無不愈也

枕頭方 治頭風頭痛百藥不効者

食茱萸葉細判 洒酒拌勻以絹袋盛之於甑中蒸熟乘熟分

作二包更換枕頭以効為度

顏思退方 治頭風掣痛

黃蠟二斤 鹽半斤 香油二兩

右溶蠟入油盐和勻捏作一兜盃樣可合腦大小蓋至額痛止

熨法 治風頭痛雖重綿厚帛不能禦風寒者

艾葉揉如綿用帛夾住包頭上用熨斗熨艾使熱氣入內良久即愈

正經驗方 貼頭風熱痛

朴硝 大黃各等分

右為細末用井底泥和作餅子貼兩太陽穴神效

易簡諸方

聖惠方 治頭風痛每天陰風雨先發者用桂心二兩為末酒調

如膏敷頂上并額角効

兵部手集方 治頭痛不可忍多是風痰所致梔子末和蜜濃噀

舌上吐即止

千金方 治頭風痛大黑豆三升炒令無聲先要盛一斗二升瓶

一隻盛九升清酒乘豆熟投於酒中密泥封之七日温服

一方 凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷破

雞子三枚攪調更煮三沸飲之

一方 治頭項強不得仰視蒸大豆一升令变色納囊中枕之

斗門方 治卒頭痛白殭蠶炒去絲研為末以熱水調下二錢

又方 治偏頭風痛用雄黃細辛等分為末左邊痛嗅入右鼻右

邊痛嗅入左鼻立効

又方 治痰厥頭痛用烏梅肉十箇鹽二錢水一盞煎七分去滓

無時温服吐即佳

又方 治頭風痛惡寒用大附子一枚去皮臍菜豆一合同煮豆

三古今醫統卷之五十三
熱為度去附子服豆即瘥每箇附子可煮五次後為末服之
一方治偏頭痛用草撥為末令患人口噙水左邊痛左鼻吸一
字右邊痛右鼻吸一字甚効

一方治頭風旋用蟬蛻微炒為末每服一錢溫酒調下

一方治頭風端午日採芥耳二兩茵陳一兩甘草半兩為末每
服三錢熱酒或茶調下

一方治頭痛蒼耳川芎當歸等分每服三錢臨卧茶清調下

灸法

神庭穴在髮際前上五分灸三壯 上星穴在髮際上一寸半灸三壯 後頂

百會 風池已上諸穴隨灸一處可愈

眩暈門

病機

眩暈敘論

經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行脾土受邪民
病飡泄食減甚則忽忽善怒眩冒顛疾

又云狗蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在少陽厥陰其則入肝
眩暈證乃風火之象

原病式云諸風掉眩皆屬木風主動故也所謂風氣甚而頭目眩
運者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火火風皆屬陽陽
主乎動兩動相搏則為之旋轉故火本動也煩得風則自然旋轉也

眩暈之證當分內外所因

嚴用和云眩暈之證雖云屬於肝風上攻所致然體虛之人外感六淫內傷七情皆能眩暈當以脈證別之風則脈浮有汗項強不仁寒則脈緊無汗筋攣掣痛暑則脈虛煩悶溫則脈細沉重吐逆及其七情所感遂使藏氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上逆令人眩暈眉稜骨痛眼不可開寸脈多沉此為異耳若疲勞過度下虛上實金瘡吐血便利及婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暈當隨其所因而治之

眩暈之病三虛宜審

肥人眩暈氣虛有痰瘦人眩暈血虛有火傷寒吐汗下後必是陽

虛故鍼經云上虛則眩此三者責其虛也

四氣眩暈

風眩暈挾風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也七情鬱而生痰動火氣因上厥此七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此氣虛眩暈也吐血或崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道此血虛眩暈也要尋致病之因隨機應變其間以墜鎮下行為最不可妄施汗下

尋常眩暈屬痰火者多

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此病屬痰者多至無痰不能成眩暈也雖有因風者亦必有痰也又曰火動其痰二陳

湯加太連蒼朮羌活扶氣血虛者亦以治痰為主兼補虛藥

脈候

左手脈緩而浮大者為風○脈虛大必是久病○左手脈數為熱多○脈澁而芤有死血○右手脈滑夫為痰厥頭眩脈實為痰積

治法

張子和云夫頭風眩運手之麻痺胃脘痛皆風寒濕三氣雜至合而為痺也在上謂之停飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛涼之藥凡眩運多年不已胃弱痰涎壅塞氣血頗實吐之甚効

王機微義云眩運一證人皆稱為上盛下虛所致而不明言其所以然之故夫所謂虛者氣血虛也所謂盛者痰涎風火也原病之

由有氣虛者乃清氣不能上升或汗多亡陽當升陽補氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰補血此皆不足之證有因痰涎鬱遏者宜開痰導鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火有因外感而得者嚴氏雖分四氣之異皆當散邪此皆有餘之證

鎮墜藥治眩運須識標本

世有所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法香燥散氣其不歸之氣豈能因此而復耶凡用鎮墜所謂急則治其標也若謂使氣歸元必無是理既曰歸元豈肯復作凡鎮墜少止又復眩者此氣未歸元而未治其本也要氣歸元必求其本緩而

丹溪治法

頭眩痰挾氣虛屬火治痰為主兼補氣藥如東垣半夏白木天麻湯之類也。○眩運不可當者以大苛酒炒為末茶清調下即止或用黑錫丹鎮墜之皆急則治標也。○火動其痰及濕痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活散風行濕。○早起眩運須臾自定日以為常者正元飲吞下黑錫丹。○傷濕頭運腎著湯加川芎名除濕湯。○風川芎茶調散有痰青州白丸子。○丹溪治一老婦患赤白帶下年半頭眩坐之不得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩亦安。○春甫治一婦人忽眩倒不能動診其脉兩寸浮大而滑知風痰眩運而兼火也以半夏白木天麻湯下滾痰丸一百粒即愈。

眩運通用方劑

半夏白木天麻湯 加味二陳湯 川芎茶調散 並見前

風眩頭運劑

愈風餅子 治風邪眩運或先服吐藥後服此

- 川芎 炮各半兩
- 川烏 炮各半兩
- 甘菊花
- 白芷
- 細辛
- 防風
- 荊芥
- 羌活
- 天麻
- 甘草 炙各一兩
- 薄荷 一兩半

右為末泡蒸餅捏作餅子每服三五餅細嚼茶湯任下

本川芎散 治風眩頭運

山茱萸肉 一兩

甘菊花

人參

芎藭

山藥

茯神 各半兩

為末每服二錢酒調下

白附子丸

治風痰眩暈頭痛

全蝎 半兩

白附子 炮

南星 製

半夏 製

旋覆花

甘菊花

天麻

川芎

橘紅

殭蠶 炒

乾薑 生各一兩

右為末生薑半斤取汁打糊丸梧桐子大煎荊芥湯下五十丸

芎藭散

治諸陽受風頭目旋暈目視昏暗肝氣不清

芎藭

甘菊花 各一兩

白殭蠶

細辛

防風

羌活 各三錢

旋覆花

草決明

蟬蛻 各一錢

天麻

蜜蒙花

荊芥穗

右為細末每服二錢水一盞煎七分食後溫服

天麻羌活丸

治頭目風眩邪氣鼓作或時旋暈

天麻

羌活

白芷

藁本

芎藭

芍藥

細辛

麻黃 各二兩

牛黃 另研

麝香 另研各一分

右為細末煉蜜為丸皂角子大不拘時薄荷煎酒下三九

人參前胡湯

治風痰頭暈目眩

人參 八分

前胡

南星 製

半夏麴 各一錢二分

木香 五分

枳殼

橘紅

赤茯苓 各一錢

紫菀

甘草各七分

水二盞姜五片煎一盞食後服

風寒挾虛諸劑

嚴三五七散 治風寒入腦陽虛頭痛目眩轉運如在舟車之上耳

內蟬鳴風寒濕痺脚氣緩弱

天雄炮去皮脂

細辛各三兩

山茱萸肉

乾薑炮各五兩

防風

山藥各七兩

右為細末每服二錢食前溫酒調服

人參湯 治風虛眩暈但覺屋地俱轉目不敢開

人參

白朮

麥門冬

當歸

防風各兩

獨活

官桂

黃芪

芍藥各兩半

右咀每服五錢水盞半煎八分食遠服

白朮散 治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白朮

厚朴姜製

甘菊花各半兩

防風

白芷

人參各一兩

右咀每服五錢水盞半姜五片煎八分食遠服

蔓荊子散 治風氣頭旋運悶起則欲倒

蔓荊子

甘菊花

半夏

羚羊角鈔

枳殼

茯神

芍藥

黃芩

防風各七分

麥門冬

石膏各一錢

地骨皮

天麻

細辛

甘草各半兩

右咀水二盞薑三片煎八分不拘時服

芎藭散 治風虛頭旋眼目昏痛眩運倦怠心忪

芎藭 前胡各一兩 防風各半兩 人參一兩

蔓荊子 天麻酒浸 白殭蠶一兩

右為細末每服二錢食後酒調服

痰火眩運諸劑

隱深痰丸 治痰火頭眩日運如坐舟車骨滿背脹服之止方見痰門

防風通聖散 治風熱眩運一服即愈方見風門

芎犀丸 治偏正頭痛及風眩目運一邊鼻不聞香臭常流清涕

或作臭氣服芎蝎等藥不效者此藥不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎 朱砂一兩 石膏研四兩 冰片四錢

人參 茯苓 甘草炙 細辛各二兩

犀角鎊 梔子仁各一兩 阿膠炒兩 麥門冬三兩

右為末煉蜜丸彈子大朱砂為衣食後細嚼二九茶酒任下

秘加味二陳湯 治氣鬱痰火眩運

陳皮 半夏 人參 茯苓

黃芩 川芎各一錢 甘草 木香各五分

右水二盞姜三片煎七分食後服

嚴氏玉液湯 治七情氣鬱生涎隨氣上逆頭目昏運心悸眉痛

大半夏泡七次 沉香磨汁 生姜十片 水煎溫服

十全大補湯 治氣血兩虛頭眩運痛方見虛指門

茯神湯 治七情所感氣血不足感氣不行鬱而生涎結為痰飲

留於心經則有怔忡四肢緩弱頭目眩運

人參 黃芪 半夏 麥門冬

山藥 前胡 熟地黃各一錢 枳殼一錢半

遠志甘草水煮 姜汁炒 甘草炙各七分 白茯苓 茯神各二錢

右作二服水盞半姜五片秫米一小撮煎一盞服

鎮墜諸劑

黑錫丹 治陰陽不升降上盛下虛

黑錫二兩 炒末 肉豆蔻 附子炮去皮 破故紙炒

胡蘆巴 官桂 茴香各一兩 青皮

川練子 陽起石 木香 沉香各半兩

右用新鐵銚內將錫化開下硫黃末提起以木杵搗極細枚地上退火毒同餘藥研一日至黑光色為度酒糊丸梧桐子六陰

乾入布袋內擦亮空心姜盪湯下四十丸女人艾葉湯下良加方

烏藥磁石各半兩

養正丹 治上盛下虛眩暈此藥升降陰陽及效逆翻胃霍亂吐瀉

硫黃 黑錫 水銀 朱砂各一兩

先以硫黃為末將鉛入鐵銚內溶化傾出取淨錫二兩復化入硫末漸入漸攪為末再入水銀同搗如硬再火上微煨又搗勻

放冷研極細末糯米糊丸蒸豆大每服二十九空心鹽湯下
嚴氏沉香磁石丸 治上盛下虛頭目眩運耳鳴耳聾

沉香半兩

磁石煨七次醋淬研水飛巴戟

胡蘆巴

陽起石煨

附子製

川椒去目炒

山茱萸肉

山藥炒各一兩

青鹽另研

甘菊花

蔓荊子各半兩

右為細末酒煮米糊丸每服七十丸空心鹽湯下

濕痰眩運諸劑

芎朮湯 治冒雨中濕眩運嘔逆頭重不食方見頭痛門

除眩湯 治感濕感寒頭重眩運方見溫門

丹溪頭運方 治痰火眩運清降利痰極效

南星

半夏各一錢

甘草五分

桔梗

陳皮各一錢

枳殼七分

茯苓

黃芩各一分

右咀水二盞薑七片煎八分食後服

丹加味六君子湯 治風虛痰甚風邪眩運不休者

人參

白朮

茯苓各一錢

甘草五分

陳皮

半夏各錢半

荊芥穗五分

右水二盞薑三片棗二枚煎一盞去滓入竹瀝二匙溫服

根六合湯 治血虛風眩

四物湯加秦艽羌活水煎服凡失血過多血虛眩運只以芎歸

一味煎服

一方 治頭目眩暈大黃荊芥穗防風各等分水煎服以利為度
一方 治失血過多眩暈不醒用苦蕒當歸酒浸等分每服四錢
水煎溫服甚者加附子

一方 治諸風目運用蟬蛻為末飲下一錢

瓜頸項強痛 與傷寒項
強時參治

病機

經曰諸瘕項強皆屬於濕

項強有痰熱客經

丹溪曰男子項強不能回顧動則微痛診其脉強而數實右手為

右手為

丹溪曰男子項強不能回顧動則微痛診其脉強而數實右
甚予作痰熱客太陽之經以二陳湯加酒炒黃芩羌活紅花服
劑而愈

藥方

木瓜煎 治筋項強不能轉移

宣州木瓜 一箇取
蓋去穢

沒藥 一兩

乳香 一分

右二味納木瓜中用葶子合了竹簽釘之飯上蒸三四次爛研
成膏子每服三五錢地黃酒化下生地黃汁半盞無灰酒和之
八分一盞燒煖化膏有人患此病日午後發黃昏時定予曰此
病必先從足起經言之十二經絡惟足太陽之筋從足至項

椒附散 治腎氣上攻項背不能轉移

大附子一枚六錢已上者
炮去皮臍為末用

右每服二錢好川樹廿五粒用白麩填滿水盞半薑七片煎七分去椒入鹽通口服

一人筋痛連及背却不可轉服諸藥不効予憶千金方有腎氣攻背強一病用前方頓差蓋腎氣上攻不得通用樹下達以歸經自能安矣

養神湯 治精神短少不得卧項筋腫急腹難伸

黃芪一錢 人參三分 甘草七分 白朮三錢

柴胡 升麻各四分 當歸五分 蒼朮五分

川芎三分 半夏七分 大麥麩五分 木香一分

黃芩酒炒二錢 陳皮一分 黃連五分 黃蘗三錢

右咀每服五錢水二盞薑三片煎八分不拘時稍熱服

鍼灸法

取手足太陽之經

經云足太陽之脉是動則病項似拔視虛盛陷下取之又云項痛不可俛仰刺足太陽不可以顧刺手太陽又云風頸項痛刺風府又云邪客手足太陽之絡令人頭項有痛刺足小指爪甲上與肉交者二痛立已

古今醫統大全卷之五十三終

古今醫統大全卷之五十四

身體痛

病機敘論

春有云身體痛者種種不同風寒濕痰者多風寒痛明知得於寒邪而脉浮緊濕痰留滯關節身盡痛有風濕相搏肢體重痛有陰毒傷寒身如被杖之痛者有濕蘚而周身作痛有傷食滯而身作痛痰滯經絡而作塊痛致於骨節痠疼或寒或熱皆宜隨證審其病機素昔所感寒熱虛實而施治之無不中也

飲酒濕熱身痛者多

凡飲酒之人時作身痛皆濕鬱或為項腫解痛或發熱而嘔吐痰

涎蓋執在上焦不能清利日久醞釀生痰留飲濕邪鬱於項僻
間不腫則痛其為痰為飲為涎三者亦各有別治有所不同也濕
邪隨氣上浮於肺壅嗽發動痰也聚於脾經隨氣溢口角流出不
禁者涎也惟飲生於胃腑為嘔為吐此為胃家之病飲之證也

脉候

六脉俱緊為傷寒太陽經表證○脉沉而緊身痛為陰毒傷寒○
傷寒汗後身痛脉絃而遲○脉緩者乃濕氣關節

治法

周身骨節痠痛多作濕治若是頭疼發熱而身亦痛此為傷寒若
非感寒時必是傷風證如此只須發散而身痛自愈明知節節食或

着冷着氣發熱身痛者宜消導之病後及汗下後而身痛者此為
氣血不足也宜六君子湯加當歸川芎之類其痛自除

藥方

新威靈仙丸 治濕痰風痛周身不已

威靈仙 酒炒

桂枝

羌活

各三錢以
其去骨節

南星

蒼朮 酒浸

黃芩 酒炒各
二兩

神麴

川芎 各一
兩

防己 下行

白芷

枳仁 各半
兩

紅花

草龍膽 五分下
行去濕 為末神麴丸梧桐子大空心白湯下一百丸

麻黃湯 治傷寒無汗身痛

桂枝麻黃各半湯 治太陽脉浮緩如瘧身痛無汗

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治風濕相搏一身盡痛 方並見傷寒門

直舒筋散 治風滿血刺身體疼痛四肢拘挛

延胡索炒 當歸 辣桂去粗皮 各等分

右為細末每服二錢酒調下延胡索能活血理氣除風濕

沉香蠶甲散 治勞倦身痛

人參 黃芪 秦艽 熟附子

沉香 木香 柴胡 牛膝

當歸各半 桂一錢 蠶甲酒炙去 全蝎

羌活 半夏製三錢 為末葱姜棗煎湯下二錢調服

東坡聖散子 治風寒濕氣遍身疼痛 見瘡核 當歸括痛湯 治濕

熱病肢節煩疼肩背沉重骨節不利下疰足脛腫痛 方見脾氣門

直麒麟竭散 治寒濕搏於經絡以致血凝泣遍身疼痛

血竭 沉香 沒藥 白芍藥

當歸各半 虎脛骨酥炙 麝香三分

右為末每服三錢食前溫酒調下

諸風應効酒方 治一切風寒濕痺通身疼痛○人參順氣散加

川芎 治身疼通用○加味五痺湯 治風滿身痛○左經丸○

麝香丸並見風門○黃芪建中湯加川芎當歸治血刺身疼 方見溫門

大半夏湯加陳皮肉桂 治痰滯身疼 方見痰飲門

十全大補湯加陳皮半夏 治勞倦身痛 方見虛損門

肩背痛

病機

背痛敘論

背痛連腰脊者此為太陽經風寒也經曰寒氣客於背俞之脉則血脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣若背脹而痛者搥打稍愈痰滯氣虛搥散而行之少愈宜踈痰散氣若風熱乘肺手太陰肺經氣鬱甚不行病則頰頰腫頸肩顛肘臂外後腫痛汗出小便
次者背風熱乘肺也小便遺失者皆肺金虛也

脉候

脉洪而大者為熱為風○脉促上擊者肩背痛○沉而滑者左脉絃緊者左臂痛○右邊絃緊者右臂痛

治法

集成云通經絡散風瀉火補元氣此大法也風寒背痛及脇痛當發散之若只在左在右偏痛一臂者當分氣血風痰寒濕之異而施治之庶無誤也

藥方

板通氣防風湯 治肩背痛不可回顧者太陽氣鬱而不行也以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者此是太陽經不通也

羌活

獨活各一錢

藁本

防風

甘草各五分

川芎

荊芥各三分

右咀水盞半姜一片葱一根煎服

羌活勝濕湯 治肩背痛如負重身體沉沉此寒濕也加防已附

子各五分方見濕門

蒼朮復煎散 治寒濕合作腦右痛惡寒項筋脊骨強肩脾眼痛

膝膺痛無力以行

蒼朮

羌活各一錢

白朮

澤瀉

升麻

柴胡

藁本

黃蘗

紅花各五分

先煎蒼朮湯二盞次投諸藥同煎服取汗

通氣散 治風熱永肩背痛

防風

藁本

羌活

獨活各一分

黃芩酒炒

黃連姜汁炒各一錢

虛加人參

水煎溫服

烏藥順氣散

治濕痰氣滯僻痛不能舉動方見風門

消飲丸

倍朮丸

治酒癖停飲僻痛方見飲門

天仙飲

治痰瘕僻痛

片姜黃一錢半

天仙膠

羌活

白朮

白芷稍各八分

半夏一錢

右咀水盞半姜五片煎服

消痰茯苓丸

治僻痛不能舉手及左右轉移或兩僻如人抽拽

半夏兩半

白茯苓一兩

風化朴硝一分枳殼炒半兩

右為末姜汁煮糊丸梧桐子大每服三十九食後姜湯下

拘急候

病機

屬寒濕風濕

經曰諸寒收引背屬腎水運氣口太陰司天之政民病寒濕拘急初之氣風濕相搏民病拘急筋強關節不利

治法

小續命湯仲景三黃湯是也

古今醫統大全卷之五十四終

古今醫統大全卷之五十五

皮膚候

病機

皮部論曰凡十二經絡脉者皮之部也是故百病之性生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃又曰皮者脉之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉滿則注經脉經脉滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善

肺主皮毛

經曰肺之合皮也其榮毛也又云肺主皮毛在藏為肺在體為皮

毛是也又云手太陰者衝氣溫於皮毛者也氣不榮則皮毛焦皮
毛焦則津液去皮焦津液去者則爪枯毛折而死

皮膚痛屬心火剋金

經曰夏脉者心也夏脉太過則病身熱膚痛為浸淫又云少陰在

泉熱淫所勝病寒熱皮膚痛又云少陰司天火淫所勝皮膚痛

皮膚索澤為肺燥

經曰三陽為發寒熱其傳為索澤又云陽明在泉燥淫所勝病身

無膏澤治以苦溫是也

皮膚索澤即仲景所謂皮膚甲錯蓋皮滯而不清澤者是也

藥方

生血潤膚飲 方見燥門

治皮膚索澤枯燥搔之有白屑

升麻湯 治皮膚痛不可以手按

升麻 五分

白芷 六分

乾葛

柴胡

玄參 各一錢

黃連

黃芩

當歸

生地黄

麥門冬 各錢半

甘草 四分

右水二盞姜三片葱一寸煎八分食遠服取微汗

澤膚膏 治皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓

真酥油 各等分

右二味合煉一處以淨磁罐貯之每日空心用二匙熱酒調服
不飲酒者蜜湯調七日肌膚潤澤久服滋陰養血止嗽榮筋

皮風搔癢門 有熱有寒 有虛有實

鬱熱生風作癢者宜清熱疎風涼血和法妙。○經曰諸癢為虛肺主氣司布皮毛肺氣不通而癢者宜防風參芪白朮之類補之衛陽滕實閉固熱鬱衛氣不和為之實宜調氣和血散鬱之劑玄參升麻湯 治皮風搔癢不能忍

玄參

升麻

白芷

各一錢

蟬退

防風

甘草

黃芪

各七分

葱一寸水煎服

消風散

蘓州薄荷葉

蟬退

去頭足土 淨各等分

為末食遠溫酒調下二錢

防風通聖散

治皮風搔癢服後隨吃熱羹得汗為妙

加味補中益氣湯 治中氣不足衛氣不舒以致搔痒

人參

黃芪

當歸

白朮

各一錢

陳皮

甘草

升麻

柴胡

防風

白芷

川芎

各五分

加薑棗煎服

潔洗湯 治一切風疾搔癢

乾荷葉

藁本

甘松

白芷

威靈仙

蒼耳草

忍冬藤

煨鹽

每用三兩煎水一桶去滓浴數次自愈

史國公浸酒仙方

治皮風搔癢日服數次自愈

方見風門

諸風應効酒

方見歷節風門

荻港青藤膏

每服酒調三匙臨卧服

風痺癩疹門

風氣挾熱鬱於腠理無從發散起於皮膚不紅不腫惟有顆粒高起而作癢者痺也畧有形迹見於皮膚者癩疹也要皆風熱之所為鬱不散而成也或因浴有溼風汗出脫解而得之者為挾暑濕久而不退必為瘡疹丹毒自微至著不可不知

加味羌活散 治風寒濕熱外洩肌膚發為癩疹

羌活

前胡各一分

人參

桔梗

天麻

蟬退

薄荷

川芎各七分

枳殼

柴胡

茯苓

甘草三分

右水二盞姜三片煎八分食遠溫服

胡麻散

治脾肺風毒鬱滯皮膚或如虫行結成癩疹搔癢

胡麻

荆芥穗

苦參

何首烏

威靈仙各等分

甘草炙減半

為末薄荷湯或酒調下三錢得汗妙

天麻散

治風熱癩疹

天麻

川芎

升麻

半夏

防風

細辛

羌活

前芥穗

蟬退

甘草各等分

右水二盞姜三片煎服○挾寒

加桂○挾暑加黃芩柴胡○挾濕加茯苓蒼朮

大胡麻散 治風熱癩疹搔癢

胡麻子二兩

苦參

荆芥

何首烏

威靈仙 防風 石菖蒲 土勞子

菊花 蔓荊子 白蒺藜 甘草各七錢

右為細末每服二錢薄荷湯調下助以熱葱湯出汗

殭蠶散 治癩疹

白殭直者去 為末姜湯調下一錢

玄參升麻湯方見皮風門 治癩疹搔痒 消風散同上

犀角消毒飲 治大人小兒風鬱結遍身瘡疹搔痒或項下結核

及小兒痘疹已出未出熱毒不解急可服此

防風 鼠粘子二錢炒研 荆芥一錢 甘草八分

犀角磨汁 右每服三錢水煎食後溫服

斑丹火毒門

熱邪積久鬱於皮膚輕則發為小斑重則發為丹毒平人發斑如

錦紋或赤色大便結心中煩躁總為熱鬱甚則防風通聖散輕

解毒防風湯疎風清熱涼血或汗或下隨治可愈至於傷寒發斑

又非尋常之比或因下之太早汗之太遲有表裏俱虛有溫毒熱

毒不可汗下惟可以化斑湯升麻湯之類若熱毒深入斑發紫黑

多不可救也

丹毒則有火邪結熾挾風而作由熱毒搏於榮血而風乘之所以

赤浮肌肉而為之走注也火與血皆主於心丹毒自內而出遊走

於四肢易治自四肢而走於身入於心腹者難治甚則肌肉糜爛

大可畏也敷之不散宜用排鍼砭刺出血無不愈

防風通聖散 治實熱鬱結發為錦斑方見風門

鮮毒防風湯 治斑疹痒痛

防風 地骨皮 黃芪 芍藥

荆芥 枳殼 牛旁子各等分 水煎温服

治陽毒梔子湯 治傷寒壯熱百節痛而發斑

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥

石膏 知母 杏仁 柴胡

甘草 右水二盞姜三片豆豉百粒煎服

犀角消毒飲 治風熱發斑方見癩疹門

玄參升麻湯 治傷寒吐下後發斑甚則煩躁

玄參 升麻各二錢 甘草一錢 水煎服

人參白虎湯一名化斑湯 治傷寒汗下失期以致發斑急服此

人參一錢 石膏三錢 知母錢半 甘草六分

右水盞半加粳米一合煎八分不拘時服

消毒飲 治一切赤丹火丹

牛旁子 荆芥各一錢 甘草 防風各六分

升麻五分 犀角磨一錢 麥門冬 桔梗各八分

朴硝錢半 右水煎服

藍葉散 治諸丹赤腫

白芷

川芎

柴胡

赤芍藥

升麻

各五分

乾葛

生地黄

山梔仁

石膏

各八分

甘草

杏仁

知母

藍葉

黃芩

玄參

右水煎服

上青散 治一切丹毒

藍青

知母

甘草

杏仁

黃芩

升麻

柴胡

石膏

寒水石

各一錢

山梔仁

赤芍藥

羚羊角

磨各八分

右水煎服

易簡方

一方

寒水石石膏黃柏甘草為末芭蕉汁調敷

一方

大黃朴硝土蜂窩為末水調敷

一方

伏龍肝錢豆豉五分為末麻油調敷

一方

赤豆為末雞蛋清調敷

一方

慎火草搗爛敷乾則易解者佳

慎火草一名掛牌青人家多栽於房上則耐火

風癬門

巢氏病源云有乾癬濕癬白癬頑癬諸候皆因風熱邪客於腠理

復值邪氣與血氣相搏發為此疾皮肉癢疹如錢文漸漸增長或

圓或斜有匡廓痒痛不一匡内生蟲搔痒出汗久久延及遍身則

成頑痺故為頑癬

三五八卷

二

心

除癰湯

防風

白芷

連翹

黃蓮

羌胡

甘草

蟬退

當歸

生地黃

赤芍藥各等分

右水二鍾加葱白三寸煎八分食遠溫服出汗

除濕散 治一切風癰狀如頑癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荊子

薄荷

白芷

天麻

川芎

防風

烏蛇酒浸一宿培各半兩

為細末每服三錢茶酒調下

不拘時日進三服五日一治令汗出血氣宣通一月膚澤如故

苦參丸 治遍身搔痒癰疥瘡瘍

苦參四兩

玄參

黃連

大黃

獨活

枳殼

防風各二兩

黃芩

梔子

菊花各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大食後茶酒任下三十九日三服

一掃散 治癰疥

防風

荆芥

苦參

地骨皮

薄荷各等分

甘草減半

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服

五七十丸半飢茶清送下或為散蜜水調三錢不過三五服淨

八寶散 治一切風癰乾癰濕癰神效

水銀 七分

枯礬 三分

蝎稍 一枚

大風子 五枚

胡粉

雄黃

硫黃

檳榔 各五分

右為末同大風子一處研如泥再加陳猪油調要先用羊蹄根和鹽醋搥之擦破然後以此藥搽上一日一次不過三次愈

獨聖散 治一切癬瘡如錢如豆者即以此藥神効

鉅蝮

二三枚去翅之浸醋內用針刺于燈上燒存性為末醋調如泥以手畧爪動搽上藥一時起泡出汗而愈永不復發

一方 用好石灰調城水搽上妙只一次而愈

附汗斑

濕熱鬱於皮膚久而不散發而為斑黑白相雜遍身花藻甚者變而為紫白癩風雖無疾痛苦事不可以不防微而杜漸也

防風通聖散

治汗斑內外挾熱

方見風門

玄參升麻湯

治同

方見班丹明

一方 用白茄切段蘸硫黃白附子擦之三次愈初次變黑三次則白而愈

一方 用生薑片蘸信末陀僧二味擦之良久小便洗過用清水洗之三次愈

卷之三

一、凡患此症者，宜早服此藥，其效如神。

卷之三

一、凡患此症者，宜早服此藥，其效如神。

卷之三

一、凡患此症者，宜早服此藥，其效如神。

