本草匯

六

特 7.
20
495

伊藤篤太郎記

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495

ガラス使用

特7-495

伊藤大記

[illegible]

本草匯卷六目次

傷寒病機畧
太陽六證
陽明十一證
少陽五證
太陰三證
少陰五證
厥陰五證
合病併病汗下吐後等證
四時傷寒
婦人傷寒
婦科病機畧
治法通論
胎前

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495　　ガラス使用

産後
外科病機畧
腫瘍
久漏瘡
同
幼科病機畧
通治
雜證
潰瘍
癰疽所發部分名狀不
丹毒痤疹
瘡瘡治法通論

本草滙卷六

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯
男 樹畦馨阡
姪 維均梅在參閱
紫藤陳陸坤白筆校訂

傷寒病機畧

傷寒通論 大法三日前病傳三陽宜汗三日後病傳三陰宜下若三日前脉靜無陽明少陽證不傳陰若三日後能食不嘔者不傳陰三日陰陽病俱傳曰兩

感三日脈微小身和者欲解七日傳經盡當病衰若七日脈大躁煩者解七日無熱躁煩者傳陰若更感異氣者變他病欲攻當先表後下汗證不罷者再汗和證下後和證不罷者復和汗下大法汗下吐後陰陽自和者愈仍不解者爲壞病下後便硬者陽多清穀者陰強診病解病解必先煩或口噤不言脈微小身和者欲解寸關尺同等者當愈能飲水者欲解未藥脈數大藥後脈遲小愈三陰病脈浮長欲愈三陽晝解三陰夜解脈浮緊按之若戰而汗解脈微當不戰不汗而解診生死陰病陽脈生陽病陰脈死脈盛汗出不解死脈虛熱不止死禁忌諸脈浮外實外未解及諸虛息下諸脈浮數息火便溏息栀子無汗息桂枝有汗便數宜桂枝誤下諸變不可勝數表裏發熱惡寒體痛脈浮爲表發熱惡熱便硬腹滿脈沉爲裏寒熱往來脇滿脈弦爲半表半裏陰陽頭痛身熱脈浮洪爲陽吐利厥冷脈微爲陰汗下分緩急脈浮有表爲表

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495　ガラス使用

之表宜急汗脉沉有表爲裏之表宜緩汗脉浮有裏爲表之裏宜緩下脉沉有裏爲表之裏宜急下汗下但當隨證不可拘日數

太陽病 發熱惡寒惡風頭痛項強身體痛

脉浮緩有汗者中風宜桂枝發之脉浮緊無汗者傷寒麻黃發之風見寒脉寒見風脉宜大青龍發之太陽病不惡寒兼渴者温病兼汗出者柔痓表不解者

不可表不可下不可和頭項支節不痛和表解無發熱惡熱和裏解寒熱移時和半表半裏解

卽太陽病心下支結柴桂脇滿而渴者柴胡水氣有欬者小青龍心下痞者先解表後攻痞脹利者先温裏後解表卒口噤背反張者痓病不狂不秘不反張者陰盛太陽解時從巳至未大陽病麻同等者必解太陽病血蓄者愈太陽未解表忌下痓音至痙音勁上聲同病兩音

發熱 惡寒脉浮爲表惡熱汗出爲裏脉細而嘔爲半表半裏咳喘爲表不解渴者有表有裏汗之仍熱脉浮數者更汗之但熱蒸心下硬者下之多汗多眠息鼾音輸者風溫悸瞤眩振者眞武温之發熱厥逆下利

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495　ガラス使用

者四逆脉躁不解不食者死【下】之仍熱【脉】浮者更汗之心滿小便不利者苓朮心痛煩懊懷者梔豉【發】熱【脉】浮滑者白虎浮遲利清穀者四逆【發】熱厥逆【下】利者爲陰【陰】陽【脉】浮有表屬陽者青龍葛苓脉微厥逆屬陰者通脉四逆【發】熱下利面赤微厥者汗出解厥躁死汗出不止死消穀不便者抵當【傷】寒續法丹溪補兼發散隨所現證加藥寒多者加薑桂熱多者補散加苓栢痰積者補散加消導海藏以神朮代蒼朮代麻黃以白朮代桂枝潔古以黃耆代桂枝以川芎代麻

黃惡熱而渴有【二】傷寒宜白虎雜病宜補陰立夏前忌白虎

【惡寒】不當風而增寒雖身熱而不欲去衣者是也發熱惡寒脉浮屬太陽無熱惡寒脉微屬陰症【惡寒】身【蜷】利止肢溫生自利肢厥死時煩去衣生四逆無脉躁者死大汗下利者四逆口躁者白虎口和者附子惡寒厥逆頭汗便硬者柴胡背惡寒中暑而渴者白虎汗後惡寒爲虛下後惡寒心下痞者桂枝瀉心痞而汗者附子瀉心【禁忌】惡寒爲表未解忌下惡寒使

国立国会図書館 タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』 請求記号 特7-495 ガラス使用

數脚攣息汗又息近火

惡風當風而增寒也發熱惡風屬太陽惡風脇痛而渴者小柴胡

頭痛發熱惡風屬太陽頭痛不大便便赤者承氣便清者桂枝頭痛發熱脉弦細者小柴胡脉反沉者四逆頭痛乾嘔吐逆沫者加茱萸表解脇痛者十棗小便利汗厥者寒邪頭痛吐利爲霍亂頭痛發黃爲濕丹溪補兼發散活人葱白發散海藏太陽頭痛無汗麻黃有汗桂枝陽明頭痛白虎少陽頭痛小柴胡太陰頭痛脉浮桂枝脉沉理中少陰頭痛脉沉發熱麻黃附子細辛厥陰頭痛外傷本經桂枝麻黃各半

項強發熱惡風項強屬太陽項強脇痛發熱而渴小柴胡下後身熱小便難息柴胡項強背反張者爲痙

身體痛發熱惡寒身體痛屬太陽純太陽者麻黃大青龍兼肢結者柴胡桂枝兼下利者先四逆後桂枝尺中脉遲者血少體痛脉沉發熱者四逆肢寒者附子體痛吐利爲霍亂體痛厥逆自利者四逆渴者中暑體痛面青咽痛爲陰毒濕痺身疼發黃爲濕痺脉

沉小便閉者甘附五苓下後額汗大小利死身疼不能轉側屈伸爲風濕不得屈伸者甘附不能轉側者桂附大小便利者朮附身重汗出者防已發熱日晡劇者麻黃

陽明病 胃實不大便自汗手足汗不得臥潮熱譫語狂亂撿衣摸牀渴嘔乾嘔陽明爲胃家實能食名中風不能食名中寒忌攻解時從申至戌胃實嘔多面合赤色心下硬皆忌攻之胃實有表者先解表頭痛惡寒脈浮者宜汗有汗桂枝湯無汗麻黃湯脇痛脈浮弦者宜和口渴脈浮緊者宜和胃實解表無裏證者忌攻硬者導之潮熱者攻之先試小承轉失氣者可攻不轉者忌攻譫語者攻之腹滿痛者攻之胃實解表有裏證者隨證攻心煩者調胃小便不利發黃者茵蔯屎黑清穀者抵當目不了了者承氣胃實反無汗虛邪厥者寒邪脈浮麻黃身黃者茵蔯胃實脈浮數能食名陽結陰結胃實欬寐者少陰自汗不因發散而自汗出也汗出身熱不惡寒爲裏兼便硬譫語者下之胃實汗多者急下之兼脈浮緊

口苦者忌汗下宜和解海藏太陽自汗桂枝陽明自汗白虎少陰自汗四逆似陽明而身反強吐後似陽明而關脈細不惡寒屬裏惡風寒屬表

汗後汗出身重多眠語難者風濕煩躁不眠欲水者胃乾厥逆惡寒者四逆身熱汗不止死脈微汗少者和汗多者過汗多渴者忌豬苓汗出小便數忌桂枝自汗身冷脈疾細者白虎湯加桂自汗筋惕肉瞤者防术牡蠣

手足汗

潮熱便硬爲熱不食初硬後溏爲寒

不得臥小閉大難不得臥者大承氣汗後不得臥欲水者與水汗下後不得臥反覆懊憹者梔子豉晝躁夜靜無表證脈沉微者薑附少陰欲寐變不得臥二三日變者黃連阿膠湯始不利不煩變自利煩躁不寐死六七日變嘔渴者豬苓厥利不臥死下利心煩不臥酸棗仁湯

潮熱若潮水之潮其來不失時也一日二發發于日晡時者乃爲潮熱屬陽明若二三五日發者即是發熱非潮熱也胃實表解而潮譫語者宜下不解者承氣

結胸者陷胸便溏脇滿脉弦浮而潮者宜和未和者柴胡和後者加硝

譫語亂語無次第數數更端也鄭聲鄭重頻煩也只將一句舊言重疊頻言而終日不換也陽明胃實潮熟譫語宜下下後轉氣爲實不轉脉濇爲虛實則譫語素註爲氣虛獨言全善用參朮者歸虛實不可一例用黃連解毒大小承氣也虛則鄭聲

汗後譫語便硬胃不和者宜下汗多亡陽者忌下宜和脉短者死和者生目眩者死火後譫語脉浮忌下不大便者液枯振慄自利者欲解汗下吐後譫語爲壞病胸滿譫語下後煩驚者宜和直視喘滿死下利死脉浮肢温生脉沉肢冷死便利肢厥脉微妄語爲便秘肢温脉洪妄語爲熱

狂亂大汗後狂亂者鎮墜之少腹滿身黃發狂者畜血狂言遺尿直視死狂而脉實者爲實熱狂而脉虛者爲虛熱

捻衣摸牀脉弦者生濇者死便利者生不利死

渴不惡寒者陽明濕病渴似陽明而有太陽渴而下利者少陰消渴吐蚘者厥陰忌下宜少飲水小便不

利而渴脉浮發熱者五苓猪苓頭汗者柴胡茵蔯表不解欬而渴者小青龍暑渴似表而腹滿表解而渴者白虎渴而脇滿往來寒熱未汗下者柴胡若汗下者柴胡薑桂渴而心下硬硬而痛不大便者大陷胸硬而痞小便不利者五苓欲飲不渴者文蛤散（文蛤即海蛤粉也）渴不能飲者下熱上寒渴欲飲水水入則吐者五苓渴欲飲水者少少與之（診）下利渴者脉弱數愈渴脉浮弱汗出愈（禁）無汗表不解渴忌白虎汗多表解渴忌五苓虚渴而食少者和

嘔食穀欲嘔者陽明腹痛欲嘔者胃有邪嘔而發熱者柴胡兼惡寒節疼心結者加桂兼脉緊者麻黄嘔而寒熱腸痛不下利者小柴胡下利者半苓薑嘔而鬱微煩下而和從心急者大柴胡極吐下後胞痛腹滿者調胃先渴却嘔屬飲兼惡寒頭痛鼻乾者葛根嘔而下利嘔而厥嘔而心煩不臥汗下吐後者梔豉未汗下吐者猪苓嘔多忌下忌服桂枝湯

乾嘔發熱汗出鼻鳴者桂枝水氣而欬者小青龍乾

国立国会図書館 タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』 請求記号 特7-495 ガラス使用

嘔脇痛表解短氣者十棗往來寒熱柴胡乾嘔下利身涼脇痛者十棗痞滿腹鳴者瀉心脉微厥逆者通脉乾嘔厥逆爲陰脉微不利者通脉脉强不利者四逆乾嘔涎沫爲飲乾嘔不止爲虛

少陽病 耳聾口苦咽乾往來寒熱胸脇滿

胸兼脇痛屬少陽但胸痛下利屬實未吐下脉滑利數者宜吐吐下後腹滿便溏者宜下

耳聾不經汗宜和重發汗宜補

口苦咽乾少陽爲病口苦咽乾目眩耳聾胸滿者已吐下脉强發熱者息汗解時從寅至辰

眩 少陽眩口苦宜和汗後眩爲虛振振者眞武肉瞤者建中言亂者死眩脉沉緊息汗

往來寒熱 屬少陽兼脇滿心煩乾嘔者小柴十餘日熱結在裏者太柴汗下後往來寒熱脇滿頭汗小閉渴者柴桂薑麻微遲者亡血脇滿乾嘔寒熱者小陽脇滿惡風項强者兼太陽未下而渴者宜柴胡二胃實者陽明脇滿潮熱者陽明大便自溏者柴胡脉浮細嗜臥者柴胡

脇滿 少陽口苦耳聾脇滿者柴胡嗌而胸滿者麻黃少陰咽痛脇滿者猪膚下後脇滿脉促者桂枝煩驚者柴胡舌胎者溫痺胸窒塞似滿者梔豉胸寤硬似滿者瓜蒂

太陰病 吐吐利下利二十門並附入少陰病蓋此多故附入少陰也。三門之病本屬太陰病因在少陰者居

腹滿 太陽爲病腹滿時痛吐利息下下後轉屬太陰者桂加芍藥脉浮者桂枝設行大黃芍藥宜減少解時從亥至丑腹滿吐利宜溫霍亂作利者理中下利

身疼者先溫裏後攻表腹滿大小閉宜利大閉者承氣小閉身黃者茵蔯胸脇病柴胡腹滿不減爲實時減如故爲虛腹滿脉浮但浮者桂枝浮弦脇痛者柴胡浮緊口苦者息汗下腹滿脉遲小便難者息下潮熱者宜下腹滿汗出身重難轉側者白虎腹滿汗出不惡寒脉遲潮熱者宜下脉浮口苦者息汗下汗後腹滿吐後腹滿嘔而胸痛者調胃臥起不安者梔朴不能食者爲虛腹滿脉沉細無力者理中有力者承氣

腹痛 腹滿痛吐利者爲太陰熱頭痛發熱者霍亂腹

滿痛不大便陽證但繞臍痛者承氣從心至少腹滿者陷胸腹痛下利爲陰脫重痛者眞武便膿血者桃花利清穀者四逆腹痛厥逆爲陰逆者四逆散厥者四逆湯腹痛欲嘔爲陽無寒熱者黃連有寒熱者柴胡腹痛欲吐不吐欲瀉不瀉爲乾霍亂此正氣擁閉陰陽隔絕其證最凶直指薑鹽同炒加童便溫服

黃濕熱黃小便不利色如熏黃身重者爲濕色如橘黃無痛者爲熱身黃脇痛便難汗後身黃下後身黃頭汗者茵蔯腹滿脉遲者邑心下脇痛不食者忌柴胡

畜血小便自利少腹硬如狂大便黑者畜血不硬不狂不黑者非血身冷汗出脉沉而黃爲濕熱鼻寒而黃爲濕在頭

少陰病 但欲寐嗜臥口燥舌乾咽痛吐利下利但欲寐嗜臥始得欲寐病一二三日發熱脉沉者微汗之無他證者微汗之口和背寒者附子口燥咽乾者承氣得三日者以上至四五日變不寐者連膠腹痛便膿血者桃花腹痛不利者眞武得六七日腹脹不便者承氣變欲欬嘔瀉不眠者豬苓變白利煩燥

不眠死變息高死得七八九日脈緊自利肢溫者愈
通身熱者便血厥逆欲寐無汗者忌汗惡寒身踡無
脈躁者死利者亦死利後重者四逆薤白無脈者通
脈白通身痛者附子脈沉欲寐者四逆兼體痛肢寒
者附子兼發熱者麻附辛解時從子至寅惡寒時欲
去衣可治利止眩冒死脈浮者欲愈脈細沉數者忌
汗下

陽證脈浮嗜臥無汗脇痛者柴胡脈但浮者麻
黃汗出身重者風溫盜汗者合病自開欲眠爲孤惑

口燥舌乾但欲寐而燥者少陰身體熱而燥者陽證
表解無痛者白虎心下滿痛者陷胸燥欲數水不咽
者嗌咽乾多眠自不閉者孤惑

咽痛

咽痛欲寐者少陰熱者甘草桔梗寒者半夏散
湯咽傷聲不出者苦酒咽痛吐利爲少陰毒咽痛面
赤斑者陽毒面青黑者陰毒眩而欬者咽痛不欬者
咽不痛先厥後熱利止者嗌痛不止者嗌不痛咽閉
忌汗下

伏氣先咽痛後下利

附吐

吐食腹滿痛者太陰欲吐不吐但欲寐者少陰
肢寒有物出者宜吐無物乾嘔者宜溫六日變燥利

国立国会図書館　タイトル『本草匯18卷補遺1卷圖1卷』　請求記号 特7-495　ガラス使用

不得臥。死腹滿欲吐者。黃連解後欲吐者。竹葉吐沫。頭痛者。茱萸。吐水煩渴者。五苓。吐下後吐入口即吐者。薑連苓參。朝食暮吐者。小逆。汗後吐脉數者。容熱胃冷。厥逆者。乾姜。吐膿血者。內熱。

附吐利

吐利無寒熱頭痛為陰腹滿吐利者。太陰欲寐吐利者。少陰。汗出。清穀脉微者。四逆。汗出咽痛者。亡陽。無汗厥逆者。茱萸。肢溫者。生逆者。死欲寐嘔利者。少陰。欲渴變不眠者。豬苓。小閉肢重冷者。眞武脉微汗出者。灸之。徐成嘔利去小者。傷氣未汗者。黃芩。

汗不解者。大柴水藥不入者。逆暴發吐利去多者。霍亂。熱渴者。五苓汗出肢厥者。四逆。脉微者。盜。裏寒多不渴者。理中乾嘔利。分陰陽。脇痛痞氣者。十棗瀉心。厥逆脉微者。四逆。白通。

附下利

腹滿自利不渴。屬太陰。但欲寐自利。屬少陰。下利。欲寐兼渴小便白者。四逆。利清水者。承氣變不眠者。豬苓。兼腹痛肢疼者。眞武。兼咽痛胸滿者。豬膚。厥利。屬厥陰。少陰。汗後拘急者。四逆。下後咽不利者。升麻。脉沉遲面赤身熱者。鬱自解。愈厥利。但兼欲寐。

屬少陰下利有表脉浮爲陽身疼者先溫後表頭痛鼻乾者葛根湯嗽發熱者青龍頭疼脇滿者黃芩下後脉促者連苓下利清穀脉沉厥逆屬陰者通脉浮不厥屬陽者四逆下後身疼者救裏救表下利便膿血欲寐者桃花厥少熱多者止脉數而渴者有熱下利譫語脉微肢厥欲寐爲陰脉和不厥不寐爲陽下利裏急後重熱者白頭翁逆者四逆散下利肢疼身痛四肢疼眞武四逆通身疼先溫後攻下利心不硬未下爲結熱宜承氣下後爲虛氣宜瀉心下利咽痛胸滿者猪膚厥逆者通脉嘔膿者升麻下利胸痛脉滑宜吐下後利遂不止者身協熱利心下痞硬者理中瀉心柱參脉促喘汗者葛苓連潮熱譫語者柴胡承氣脉大腸鳴者當歸四逆陰證厥逆者麻黃升麻下利脉治脉滑爲陽宜下脉微爲陰宜溫下後脉大者當歸四逆六七日忽自利肢溫自利厥者難治發熱汗不止死躁不得臥死脉微弱數而滑者自愈大者緊者未止實者死損者難治寒熱混腑下寒大便青白爲寒腑下熱大便黃赤

爲熱便膿血爲瀉汗下後下利大小利腹痛宜溫裏急後重宜下氣逆宜和

厥陰病　氣上撞心心飢不欲食吐蚘蟲厥少腹滿囊縮

厥陰爲病氣上撞心疼吐蚘欲飲水者少少與之脈浮欲愈不浮未愈解時從丑至卯氣上撞不吐蚘者陽證衝咽不得息者瓜蒂拘急者燒褌往來寒熱者奔豚卒口禁者剛痓

饑不欲食兼吐蚘厥冷者厥陰汗後者陽證病結者宜吐吐下後者陽證吐後吐食者中逆下後懊憹者梔豉

吐蚘蟲兼氣撞心疼或厥冷者厥陰汗後者陽證病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘烏梅丸

厥厥陰先厥而後熱者爲寒先熱而後厥者爲熱脈細弱而厥爲寒脈滑而厥爲熱脈促脈微而厥宜灸脈結脈緊而厥宜吐脈沉而厥體痛者附子頭汗者柴胡悸心熱煩厥者茯苓甘草逆者四逆桂吐而厥汗後者甘薑食入則吐復不能吐者宜吐利而厥下重者爲熱脈微沉爲重寒吐利而厥爲寒寒熱者四逆

煩躁者、茱萸、吐利止、脉微者、通脉。湯而厥、爲暑躁煩而厥、躁無暫安、爲臟厥、靜而復煩、爲蛔厥、少腹滿痛而厥、爲寒、四逆無脉、皆速死、厥多熱多、病進厥少熱多、病愈厥與熱相應、亦愈、熱少厥微、欲食愈、先熱後厥者、宜下、忌汗、先熱後厥、脉滑惡熱、口渴大、秘小赤、爲熱、得痛病厥、脉微惡寒、不渴自利、清便爲寒、厥脉沉疾有力、宜下、沉遲無力、宜温、厥脉浮大者、死、寒厥胃脊忽無汗者、必有汗、天寒證寒、宜從中治、天熱證寒、宜從之、天熱證寒、宜從中治。

少腹滿囊縮、脉沉短者、厥陰、宜下、按之痛、肢厥者、膀胱冷結、少腹滿、小便利者、畜血不利者、畜飲、從心至少腹滿、爲結胸、厥陰煩滿囊縮、脉浮者、宜汗、脉短者、宜下、脉緩者、宜和、煩厥囊縮、厥逆爪青、大小利、不熱、發熱引飲、宜下、大小利、不熱不渴、宜温、陰氣獨盛、變陰毒、咽痛面青、爲陰毒、仲景治陰毒、主發毒、活人、更爲陰毒傷寒、主退陰毒、陰毒脉沉細、疾陰毒漸深、爪青面黑、脉七至、沉細陰毒沉困、脉八至、附骨方、有。

傷寒合病、併病、汗下吐後等病、喘、身重、盜汗、遺尿、面赤、筋惕肉

瞤戰慄振搐心悸結胸痞煩躁欬小便不利小便難嘔無汗頭汗舌白胎鼻衄衄血唾血蓄血短氣心痛除中痺狐惑

合病必下利太陽少陽合宜和太陽陽明合宜表少陽陽明合宜下太陽陽明併病太陽不罷宜汗太陽證罷宜下

瞤發熱脉浮爲表無汗胸滿者麻黃有汗者桂加朴杏欬嘔者青龍潮熱腹滿大小秘脉沉爲裏（汗後瞤）汗出無大熱者麻杏飲水多者停飲脉沉大便難者裏實下後瞤無大熱者麻杏利不止脉促者葛芩表未解者桂杏額汗大小便利死但欲寐息高死汗淸髮潤瞤不休死

身重身重汗出不惡寒口苦脉浮緊者宜和面垢遺尿者合病多眠脉浮者風濕潮熱者宜下身重汗出者惡風寒脉浮者風濕脉虛而渴者中暑身重爲陽四肢重爲陰身重無汗脉浮緩不欲寐者青龍下後心悸者自汗解身重不能轉側爲熱濕腹滿汗出者白虎胸滿煩驚者柴胡身疼不能轉側爲風濕（盜汗）傷寒盜汗者非若諸病之虛由其邪氣在半表半裏

国立国会図書館　タイトル『本草匯18卷補遺1卷圖1卷』　請求記号　特7-495　ガラス使用

使然也。

遺尿　遺尿身重汗出腹滿譫語者合病。多眠息鼾者風濕衛氣虛脉微惡寒數欠遺尿者衛氣虛發而遺尿忌汗大汗失溲者欲解直視遺尿者腎絕。

面赤　面熱赤煩躁短氣脉澁者陽虛口禁背反張者痙病赤斑如錦咽毒痛者陽毒虛寒面赤下利脉微者爲陰面赤者忌下。

筋惕肉瞤　汗後者真武建中汗下吐後者難治戰慄

振搖　戰者身爲之戰搖也慄者心戰是也戰之與慄外而慄內也又云戰爲正與邪爭爭則鼓慄而戰搖但虛而不至爭故至聳動而振也戰與振振輕而戰重也汗後虛振振搖者芩桂振振躃地者真武未汗戰振爲欲解平居忽戰慄者初中邪

心悸　汗後心悸眩悸者真武心欲安者桂甘讝語者調胃膀悸者芩桂下後心悸身重尺微者自愈悸而驚者氣血虛小便不利及飲水多而悸者停飲先悸後煩及脉結代而悸者氣虛。

結胸　結胸皆心下滿痛大結胸不按而痛小結胸按

之而痛水結胸頭汗無大熱熱實結胸潮熱寒實結胸無熱太陽利後脈浮者必結胸結胸煩躁者死結胸脈浮下之死結胸藏結皆痛寸浮關細沉下利飲食如故爲藏結結胸項強心下滿痛如結狀小便不利者冬朮氣寒不通宜穿結散血結胸宜海蛤散以枳朮理中治大小結以半夏茯苓治氷結

痞心下痞硬關脈浮者大黃瀉心惡寒汗出者加附子惡寒表未解者先解表心下痞硬關脈沉者半夏瀉心惡寒表未解者大柴胡表解者下後心煩者甘草半夏熱不解者生薑下後表裏不解者生薑下後表裏不解者桂參病解後心下痞硬噫氣不利者旋覆下利者生薑心胸痞硬氣上沖心下支結似痞而表不解者柴胡加桂痞滿者先表後攻心下滿似痞而手足冷脈結心煩者宜吐脈細頭汗者宜和忌心下硬脈浮太厲裏者宜攻忌汗厲表者忌渡忌攻心下硬胃實忌攻色青黃膚瞤難治脈浮緊誤下成氣痞

国立国会図書館　タイトル『本草匯18卷補遺1卷圖1卷』　請求記号　特7-495　ガラス使用

虛滯積實理中治痞最良痞先用枯枳行氣

煩吐下後懊憹而煩無燥屎而大便者梔子豉有燥屎而不便者大小承氣胃實而煩吐下後者大小承氣不吐下者調胃承胸滿而煩未下者柴胡豬膚汗下後者桂薑龍桂胸窒者梔蔞豉心下滿而煩腹滿而煩臥起不安者梔朴有燥屎者大承胸痛欲吐調胃先煩後悸爲熟先悸後煩爲虛煩而渴但欲寐而煩自利便白者四逆脉微肢溫者欲解時欲去衣者可治手足厥而煩脉結宜吐無脉宜溫

煩躁煩躁有表者未汗已汗皆宜汗煩躁無表者未汗下心下硬大便難宜下已汗下脉沉微無大熱宜溫煩躁心下硬未下非結胸宜小承已下是結胸宜陷胸因火煩躁者爲火逆下後燒針者龍牡汗後振利者欲解煩躁厥逆先煩後躁可治先躁後煩死獨躁不煩死躁無暫安爲藏厥靜而後煩爲蚘厥初欲臥不煩至六日煩躁不臥死煩躁不飲食脉沉細身冷爲寒

欬表不解而溫屬太陽宜青龍往來寒熱而欬屬少

陽宜柴胡表解胃實而汗屬陽明但欲寐而汗屬少陰小閉肢重者眞武變嘔汗不眠者猪苓汗脈散死忌發汗

小便不利 表不解者青龍苓术胸脇滿者柴胡牡蠣大難不臥者大承氣小便不利而渴脈浮者五苓猪苓頭汗者柴胡茵蔯小便不利關節疼痛惡風不屈伸者甘附脈沉大便快者五苓小便不利但欲寐利膿血者桃花四肢重者眞武四肢逆者四逆

小便難 汗後小便難惡風難屈伸者桂附火劫陽汗者身黃欲飲火劫陰汗者汗利譫語下後小便難脇痛身黃小便難未下宜柴胡下後忌柴胡潔古冒熱失下者便祕脈實宜承氣便軟脈微宜瀉心身寒反渴不欲近衣汗下後為虛寒宜烏附

噦 汗下吐後噦為虛飲水得者虛寒火劫汗者虛熱腹滿前後不利前閉利前後閉利後活人冒寒者橘皮竹茹

無汗 無汗發熱惡寒屬太陽喘者麻黃躁者青龍項皮乾薑陽證者橘皮竹茹

强者葛根口噤者剛痓自刎者愈無汗不大便屬陽明脉浮喘者麻黃蟲行者建中小便利厥者寒邪小便閉黃者淤熱無汗身燔爲虛無汗小便不利頭汗身黃者茵蔯脇痛身黃者柴胡薑發黃者茵蔯蒿湯汗不出者死無汗脉浮緊忌桂枝表不解忌白虎但厥遲忌强發

頭汗頭汗小便不利脇滿者柴胡薑發黃者茵蔯蒿湯頭汗心下滿便硬脉細者柴胡無大熱者陷胸大陽頭汗小便難微者身枯腹滿不便甚者捻衣摸牀而噦頭汗不屎死下後額汗大小利死忌濕家頭汗惡寒忌下

舌白胎半表半裏舌白胎脇滿嘔者柴胡心煩懊憹者梔豉便閉者有寒有熱忌舌胎足冷脉緊勿妄治不日大熱者難治手足溫者欲解舌胎藏結者忌攻舌白胎邪淺舌黃澁邪深赤者白虎黃者下之舌黑者死

鼻衄衄而體痛無汗者麻黃衄而頭痛便清者桂枝脉浮發熱者自衄者愈汗後衄被火者陽盛陰虛厥

者難治脉浮鼻口燥嗽水不咽者必衄衄非脉浮忌發汗脉浮者麻黃桂枝脉微者犀角黃芩衄不止者茅花湯衄血唾血畜血衄血唾血嘔吐血者在上嗽水不咽胸胸滿手不可近爲血在中小腹滿小便利大便黑爲血在下下血少腹急結者桃仁承氣咽痛唾血面斑如錦者陽毒下后厥逆者宜升太陽畜血表在身黃發狂少腹滿抵當湯滿而不黃不狂者抵當丸但少腹急結者桃承氣口燥嗽水不咽者畜血在胸吐血表虛脉浮緊者麻黃加參者熱毒入內藏者抵當與桃仁許學士云血在上則喜忘在下則發狂

短氣短氣腹滿腹痛表不解脉弦浮者柴胡表解潮熱者承氣身凉者十棗煩躁汗後面赤表在者更汗下後心下硬痛者陷胸短氣脉微緊爲虛寒

心痛下後心中結痛者梔豉脉弦浮大脇及心痛小柴胡

除中口欲言舌不轉眼睛不慧反能食爲除中厥利反能食者恐爲除中

痙陽證發痙有四有溫毒發痙有熱病發痙有時氣

發痘有傷寒發痘熱病與時氣傷寒痘並同痘痘如錦紋或發之四肢或發之面部或發之胸背色紅赤者胃熱也紫黑爲胃爛也陽痘如錦紋溫毒斑咳嘔至春發熱病傷寒痘無時發陽毒痘赤在面陰痘如蚊咬狀赤痘五死一生黑痘十死一生皆用白虎人參湯可下者調胃承氣

【狐惑】欲眠目不開聲嘎爲狐惑仲景但名狐惑活人更爲狐惑傷寒欲眠目開面赤黑白爲狐惑聲嘎者瀉心蝕肛者雄黃熏之咽乾者苦參湯舌白唇黑爲蠱上唇有瘡蝕藏下唇有瘡蝕肛

勞復仲景攻邪食復者枳實大黃發熱者柴胡差後餘邪水氣者滲之喜睡者溫之欲吐者抑之下了了者二日愈勞氣者舉氣勞血者補血勞中者調中勞心者補脾氣欲絕者麥門冬湯陰陽易差後交接復病爲陰陽易熱者水調燒視竹皮寒而脈沉結微者四逆調燒視

【四時傷寒名不同】冬爲傷寒春爲溫病夏爲暑病秋爲溫疫多睡多汗脈浮爲癉病一歲長幼病相似一身盡痛爲濕身反張爲風

傷寒不同四時正氣獨辛苦人觸冒之爲傷寒非時邪氣不拘長幼皆染之爲溫疫四時傷寒通用宜補散補中益氣通治四時傷寒神朮湯白朮湯通治濕痙暍溫黃耆治暍

傷寒與中寒不同冬爲傷寒霜降至春分爲傷寒春爲溫病立春至夏爲溫病初夏發癍爲溫毒汗後灼熱爲風溫診溫不同仲景謂溫病壯熱不惡寒活人謂溫病發熱惡寒汗下後過經不愈亦溫病夏爲暑病中暍即暑病脉弦細乳遲息汗下針身熱惡寒汗出而渴者白虎身疼重者瓜蒂暑病有三脉洪身熱惡寒爲熱病有汗者桂枝加葛根無汗者加麻黃膏芩無汗加麻黃膏芩無汗者加麻黃膏芩日中勞役者汗多惡熱脉洪大前藥不差者桂膏病在二月爲晚發脉虛身熱惡寒爲中暑渴者白虎惡心疾滿者五苓痰逆惡寒橘皮渴仍不差者黃連脉弦細乳遲者參耆不惡寒者竹葉鹵燥者炙大杼濕溫皆中暑無熱脛冷腹滿汗多頭痛渴而無熱者濕溫秋爲瘧病長幼疾狀相似爲溫疫非其時有其氣爲溫疫大法非其時寒

者宜熱之非其時熱者宜寒之防病于未萌春反涼夏反寒秋反熱冬反溫多眠多汗脉浮爲風溫忌汗下火熏宜萎蕤灼熱甚者知母渴甚者瓜蔞一身盡痛爲濕濕病有二痛而發黃爲中濕痛而轉側爲風濕

續增妊娠傷寒產後傷寒

婦人傷寒與男子同惟熱入血室妊娠異○預防熱入血室○太法經水方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼寒多者柴胡乾薑熱多柴胡地黃實滿桔梗桃仁硝黃喘急先化涎身汗身涼經斷者桂附子表除汗解涼多者甘芍藥霍亂發痙大法澼古以參者四物爲君汗下之藥爲佐產後傷寒大法澼古以產後熱極惡寒宜補虛忌發表忌苦寒腹痛者去惡血乳不通者無子麥芽有子宜通草

婦人治法通論　調經經閉崩赤白帶血

大法四物六合婦人常用藥調經大法紫黑爲熱紅色爲虛兼脹者補中脉弦大爲氣不足將行時痛爲滯行後而痛爲虛經成塊爲

滯不及期爲血熱挾寒過期者爲血虛三月一來爲血氣俱虛天癸過期爲有餘

經閉無腹痛痞噫證爲血枯枯在上得于勞心大小秘結枯在中善食消渴枯在下大小秘結枯在上丹溪輕劑消痰降火氣血有腹滿痞噫爲污血臍腹疼痛者污血在下微者輕劑重者重劑甚者重劑有熱者寒消之有寒者熱消之痞噫寒熱者結痰在上丹溪輕劑消痰降火叔和重劑消痰下積

血崩大法或腹滿或腹痛宜行之氣短自汗無力言

者脾虛宜補之或脈沉細或沉洪或久瀉者氣陷宜舉之虛挾積滯者補中破積虛挾濕者補加伏龍肝燥之虛脫者澁之脾虛宜補宜舉心虛宜戒宜勸大補氣血自止脈數有熱爲熱脈弦無力臍冷爲寒

赤白帶大法帶皆濕痰少腹熱痛者爲熱痠少腹熱痛者爲寒濕惡飲及滑脫者澁以枯之骨枯及滯者滑以潤之少腹寒痛爲寒疝挾腰痛者宜摩腰虛而有積者攻補施脈微無力言食少倦怠爲虛脈滑有力爲實

胎前

求子法　本法謂經爲先肥人脂閉子宮者燥之瘦人無血攝精者潤之

受胎　本法精成其子血成其胞子宮分左右男受胎左子宮女受胎右子宮男女兼形者受胎在左右之間宮太谿脉動甚爲孕脉左尺疾大爲男右疾大爲女胎上逼心逼心逼心滿悶者下氣通陽逼心疼痛者消食溫中遍身痛冲心者去水跌蹼傷者逐汚養新痛不可忍命在須臾縮砂桂枝

十月未足欲産過期不産先期欲産者涼血安胎過期不産者補血行滯

難産縮胎法　氣虛者補氣行滯氣實者耗氣抑陽

臨産坐草法　産脉或離經或沉細滑皆産候胎陷痛極穀道迸漿破爲正産未正産候宜養痛或作或止者未腹痛腰不甚者未胎高不陷者未穀道不迸者未漿血不出者未痛者未宜任意行坐養力忌愴惶劇産母志忌抱腰亂妄用力忌妄用催生藥見正産候宜催冬産宜常温煖夏

產宜適溫涼橫倒偏產宜正凝產宜撥盤產宜水醋噴面忌面赤舌青母活子死唇口俱青子母俱死面青舌赤母死子活

產後

大法產後必用雜方熟證多及春夏者清之寒證多及秋冬者溫之面白陽虛嘔而頭汗爲陽盛血暈下血少而暈者宜破血下血多而暈者宜補血無乳宜疏之虛當補之乳汁自出不痛爲虛急痛爲實丹溪產後纔見身熱不可發表并一切苦寒必用乾薑

治火發熱輕用茯苓淡滲其熱即有發熱惡寒皆屬血氣虛

外科病機畧

癰疽 腫瘍潰瘍 久漏瘡

大法腫瘍宜托裏忌大黃潰瘍宜補接忌香散

腫瘍癰疽未見膿而腫者也丹溪腫瘍內外皆壅宜以托裏而表散爲主設欲行大黃者所當審也潔古以發表爲先發表即是內托太陽分野宜羌防發表陽明分野宜升葛發表少陽厥陰分野宜柴胡發表

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495　ガラス使用

脉有力者。春夏發者。宜寒凉發表。脉無力者。秋冬發者。宜温熱發表。服丹石者。宜解毒發表。灼見有實熱者。解裏積毒沉痼者。攻裏。少陽厥陰太陽分野。宜預補。忌疎利。寒熱邪風外入者多。屬寒。宜梁内發者多。屬熱。内熱惡熱者。宜凉藥敷貼。内冷及惡寒者。宜熱藥敷貼。常患痤瘡。愈而復生者。積熱泄瀉自汗。肢冷脉微者。沉寒鬱積不遂志欲而成者。行氣十一經少陽分野發瘡。當補虚。妄用大黄十宜致死。禁忌夏月及潰瘡。忌施十宜。年老體衰。宜補。忌施。内托綠豆散。

不熟痛者。熱内鬱者。忌冷藥敷貼。血虚。忌施鍼灸。瘡家忌汗。血氣不和。寒熱者。忌表散。面赤反鬱冒者。忌下。宜表。脉浮洪滑數爲瘡。微沉緩澁爲疽。脉緩除濕。脉大除熱。脉弦去風。脉澁瀉氣補血。脉緊細寒。初起便燃痛腫大者。可治。不痛熱腫大而陷者。不治。

潰瘍瘡疽之膿已潰出者也。内外皆虚。宜以補接爲主。設欲行香散者。宜防其虚也。凡按之軟及色不變者。有膿按之堅皮白。艾灸赤者。無膿。又以手掩腫上。熱者。爲有膿。不熱者。爲無膿。瘡則皮薄。腫高疽則皮

厚腫堅。初發宜灼艾膿成則宜針烙膿大泄宜內補。膿不多宜排膿（脉）六脉沉數有力。雖隆冬亦宜下。脉微泄瀉內陷者。雖盛夏亦宜溫。腫瘍口乾嘔作。毒氣治宜內托散。潰瘍口乾嘔作。陰虛治宜參芪朮。瘡口久不收膿小者。峻歛之。瘡口不合者。必兼補接藥。丹溪收歛瘡口。止有桃柳枝皮白歛煎飲之。又亂髮露蜂房蛇蜕皮各燒存性。酒服。治久不合。神効。（亂髮補陰甚捷也。）

久漏瘡 丹溪須先服補藥以生氣血。用參芪朮歸芍

爲主。大劑服之。外以附子末唾和作餅。如錢厚。艾炷灸令微熱。不可令冷。如痛則止。來日再灸。至肉平爲效。

瘡疽所發部分名狀不同 疔瘡石瘡瘰癧馬刀結核癭瘤天蛇頭代指甲疽乳癌乳岩囊癕陰頭瘡便毒瘡內癌。

大法。腦鬚鬢顱四處。乃爲瘡疽必死之處。涓子不可患瘡疽者七處。眼後虛處。顱接骨處。陰根上毛間。胯與尻接骨處。耳門前車骨接處。額骨下近耳後虛處。鼻骨中。諸因小腹風水所成瘡疽。並能害人。腦瘡疽

宜急破額及太陽發疽慎風水發肋慮內攻宜急破腳接骨上慮損筋腳心發毒淺可治深不治

疔瘡皆生四肢發黃疱中或紫黑先癢後痛先寒後熱也世傳蒼耳與白梅研爛貼疔上拔出根腳

石癮其堅如石不作腫者是也

瘰癧馬刀結核連續者瘰癧形長如蛤者爲馬刀須表裏交攻內除藏府之本出耳下耳後至肩腋者手足少陽出頰車者手足陽明癧有七種瘰癧如豆如梅排列肩項流注癧如梅流注四肢單窠癧生不難治蓮子癧一包十數動可治不動死重臺癧重臺見之不治妳癧燕窠癧似燕窠不治鼠瘻脈濡赤脈貫瞳主死忌癧起于厚味鬱氣非痛斷嗜慾思慮者不治

結核獨行而單核者爲結核此火氣熱甚則鬱結堅硬如果子核也但散熱自消或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是濕痰作核耳

瘿瘤癭則着于肩項瘤則隨氣凝結忌妄破決忌厚味浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不變即

名肉癭筋脉露結者名曰筋癭赤脉交結者名曰血癭隨憂愁消長者名曰氣癭五癭皆不可妄來破唯胎瘤破而去其胎粉則愈癭氣結核腫破聖惠以昆布一兩洗去鹹搗爲末綿裹于好醋中浸過含咽肘後以海藻一斤洗去鹹酒浸飲之。

天蛇頭蒲公英陰乾與苍耳草二味等分爲末用好醋煎浸洗即愈又以蒲公忍冬酒治天蛇頭極妙

代指手指忽腫痛名爲代指以烏梅入醋浸研塗患處立差

甲疽腫痛黃水浸淫泡如火燒綠礬五兩熔盡研細末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡末傅之

乳癌乳岩乳癌結核腫痛乳岩隱核下痛乳癌在行滯氣活血祛痰有熱者清之乳岩在早治清心疎厥陰乳房陽明所經乳頭厥陰所屬此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相搏而成又有因只氣吹噓或怒氣鬱悶而成也治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行污濁之血以生甘草節消腫導毒以瓜蔞子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當

歸頭或湯或散隨意消息然須以酒少佐之山居婦人吹乳用桑樹蛀屑飯搗成膏貼之乳頭裂破丁香末傅之

囊癰陰頭癰　癰疽入囊者死囊屬厥陰以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之若陰頭癰不能醫者驚甲燒末以雞子白和傅之

便毒癰　穀道前後生癰謂之懸癰此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃子即破若破難治

內癰　肺癰喘而兩脇滿吐膿如米粥脉滑數而實先解表次取膿終補裏肝癰兩脇臥則驚不得小便腎癰小腹痛而痞堅便數似淋脉滑數即腸癰也肺癰收斂瘡口止有合懽樹皮白斂煎湯飲之若已破入風者不治

丹毒痤疹　丹毒痤疹附疥癬

丹毒發斑屬風熱當微汗散之不宜下防風通聖散虛人發斑游火外行也宜補以降之風丹遍身風癢癮疹凌霄細末酒下立止

痤 小瘡即熱瘡勞 ○汗當風寒薄爲鼓鬱乃痤

疹 似傷寒暴發暴消者是也疥似疹而延歲月乾濕瘙不一經所謂癮疹癘是也癬亦延歲月乾而不濕癢而不痛是也疹屬熱與痰在表者消毒飲子在裏者太柴胡湯虛者補中益氣疥膿胞瘡治熱爲主如癬狀退熱殺蟲爲主癢者治癢痛者治痛春天發焦疥開鬱爲主經年不愈殺蟲爲主

通治 小兒病機畧

心主驚實則忡搐虛則悸動肝主風實則目直虛則發牙脾主困實則睡虛則吐瀉肺主喘實則悶亂虛則咳氣腎主虛畏明無睛光

五藏病法 肺陝

唇白熱唇紅肝熱手撥衣招眉心實仰臥心熱合臥腎虛白睛多解顱腎虛下竅心熱上竅五藏相勝參見時令肝病見秋宜補脾瀉肺肺病見春宜補肝瀉肺腎病見夏宜治腎脾病見四旁心病見冬宜補瀉心凡病先補後瀉

生下胎疾胎實面紅黑睛多胎性面黃白睛多母虛羸瘦父虛解顱

角弓反張發時身軟爲癇張爲痙

驚搐早辰熱搐當瀉心肝補脾日午熱搐當瀉心補肝日晚熱搐當瀉心肝補脾肺夜間熱搐當瀉心補脾傷風後搐口氣熱呵欠煩悶者宜表傷食後搐身温或吐宜裏急驚屬陽屬熱痰慢驚屬陰屬脾虛痰盛氣者礞石辰砂鎮之痰盛濕瀉者膽星半夏燥之

驚癎（陰）大法身熱驚啼脈浮爲陽身冷不驚啼脈沉爲陰

潮熱肝熱手掐衣領肺熱手捫眉毛心熱上窜咬牙脾熱目黃肚大腎虛下窜畏明脈沉欲飲水者爲內熱脈浮數不飲水者爲外熱（熱有八般潮熱有作止）壯熱一向不已風温温而不熱傷寒熱呵欠頂急瘡瘡熱噴嚏耳冷變蒸熱辰發搐風痰熱宿食熱皆在夜

積熱無擇法面赤大小赤者清涼下之下之不退汗之汗下不退和胃錢氏法胸滿短氣者桃枝下之煩燥昏迷者梔豉吐之

瘡瘍治法通論

大法錢氏溫凉攻發隨宜丹溪分氣血虛實潔古海藏皆宗錢氏陳氏偏主溫補潔古法先宜安裹解毒太便不秘宜微發大便過秘宜微利海藏法惡寒者發之表大熱者奪之渴者清之大秘者下之小秘者利之泄者分之

證驗施治傷寒瘡疹疑似之間均宜微發大便酸臭爲傷食宜消導昏不知人脉豁大虛宜補

禁忌忌妄下忌妄發忌房勞忌穢氣忌風冷及壅遏忌辛熱煿炙忌過愛痘密宜凉藥解毒

痘出不快大法出不快用溫藥微發之微發不出加藥分兩加藥不出即大發之有熟不出者利小便色淡不紅活爲虛如水疥不紅活爲虛表裏煩不得眠宜汗利便澁宜流利

痘灰白色靜怯爲寒躁勇爲熱大小利爲表虛大小閉爲裏實

痘黑陷爲倒靨毒不出者補中有通色淡補血大小清利脉浮者疎通表色紫解毒小赤大結脉實者調和裏寒戰咬牙身黃腫赤者下之未綻齊黑爲陷已綻不齊黑爲靨

国立国会図書館　タイトル『本草匯18卷補遺1卷圖1卷』　請求記号　特7-495　ガラス使用

發熱　大熱煩渴腹滿喘便澁利小便利小便又熱不差者下之。

痘渴　面赤煩躁大小澁爲熱面白脹瀉足指冷爲寒

渴瀉　身熱脉洪數爲熱足冷脉虛遲爲寒兼不起不

紅活　爲表裏俱虛。

痘癇搐　痘不發搐斑疹發搐斑疹後發癇身熱驚跳

宜發散

雜病

吐瀉　大法夏秋治裏五月身熱瀉黃九分下一分補

六月身溫瀉黃六分下四分補七月身溫涼三分下七分補八月身冷青一分下九分補下後不愈隨證用藥大法冬夏治表身溫瀉黃白欬嗽先表後補身熱瀉黃而渴先止渴後表身涼瀉青不渴先補後表身熱瀉黃多渴爲熱肢冷瀉青不渴爲寒睡露睛爲虛熱睡不露睛爲實熱脾寒痰乳不化爲傷食微則消積甚則下之。

吐　吐涕痰白綠及脉遲爲寒吐稠涎及脉數爲熱

泄瀉　脾虛結者補而散脾虛清者補而收虛而有積

者先補後攻瀉白爲虛寒瀉青爲風寒瀉黃赤黑而渴爲熱渴而瘦脹爲疳

赤白痢治痢先下後補弱不堪下者滑之黃赤爲熱青白爲寒

腹脹脹因病後脉微手足冷不喘爲虛寒脹不因病後脉實有熱而喘爲實熱脹而喘滿宜下脹而嘔喘滿忌下腹如蜘蛛時痛便濁爲疳脹實者分氣消積虛不大便者并陽潤血瘦黃食少者升陽導食症後者益胃解毒

水腫水腫加喘難治

疳大法疳在內脹瀉獨瀉不脹多食爲蟲疳少食爲冷疳初病寒熱爲肥熱疳久病寒熱爲瘦冷疳冷疳似熱肝疳目疾瀉血多驚筋疳瀉血心疳身熱疳熱先去積化蟲脾疳面黃食土便渴肺疳喘腎疳痿疥骨疳喜臥冷地

渴不因病後爲實熱因久病爲虛熱小便不利爲濕熱

黃陽黃大小赤澁身熱而赤飲水陰黃清便自調皮

特 7
20
495

冷淡白黃爲胃怯

腹痛面白肢冷便清爲寒痛面赤肢熱便黃爲熱痛面黃白大便酸臭爲積積痛食痛虛痛相似蟲痛與痼相似蟲痛目青腹泄食不化。必死。

鵝口胎熱爲鵝口　噤口風痰爲噤口

欬嗽欬喘面腫爲肺盛哽有聲爲肺虛春夏嗽爲虛秋冬嗽爲實肩實腹脹爲實痰宜下。嗽止痰乳宜下積。

嗌喘而氣少爲肺虛喘而氣盛爲肺實喘脉緩生急死

夜啼大法曲腰面青白爲寒仰面身赤爲熱

五硬五軟五硬卽痙屬五軟卽痿屬

本草滙卷六終

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495　ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495

ガラス使用