


新片芳踪

欽



新

欽

206


31084
31084
王一石 摘
古今新編

中華民國教育部
圖書館

登記號 31084

類別號

4/4.3
112
2:2



分類飲片新參

下編

新安王一仁主撰

從學整理

去瘀之品

蟲蟲

形色

身黃頭黑。體小。狀如蟬。

性味

苦寒。

功能

逐瘀破結。消堅痞痕。通經閉。

分量

三分至六分。

用法


炙用包煎。多入丸劑。

禁忌

體虛無瘀者忌用。

分類飲片新參

蟲蟲



3 1774 0763 6

●水蛭

形色 色黑。如條蟲。

性味 苦鹹腥。

功能 破瘀通經絡。治血瘀。

分量 一錢至三錢。

用法 炙用。

禁忌 血虛者忌用。

●地鱉蟲（即麤蟲）

形色 色紫黑。形小如鱉。無翅有足。

性味 鹹腥苦。

功能 破瘀痕血癥。通乳脈。利經絡。

分量 八分至一錢半。

用法 風乾用。

禁忌 氣血虛者忌用。

斑蝥

形色 頭身黑色。大如小指。翅有黃黑斑紋。

性味 辛苦熱。

功能 破瘀積石淋。下瘀犬毒。外用蝕死肌。拔瘻癰疔腫。

分量 三分至五分。

用法 內服。宜用糯米炒黃研服。或取米研用。

禁忌 有毒慎用。

● 蜈蚣蟲

形色 外壳色黑光潔。頭有角。內藏乾翅。

性味 咸寒。

功能 去瘀熱。消痞塊。治多骨。

分量 酌用。

用法 合丸劑。及研末外用。

禁忌 虛者忌用。

● 蟒螬（卽地蠶）

形色 色灰黃。粗大於蠶。

性味 咸微溫。

功能

破血結。治療傷疼痛。通乳汁。

分量

一個至三個。

用法

酒洗淨。炙研末沖服。罕入湯劑。

禁忌

體虛血弱者忌用。

●青娘子（卽茺蔚）

形色

色青藍。身細翅長。

性味

微辛溫。

功能

消癰瘻。下瘀積。去瘀墮胎。塞耳開聾。

分量

一個至三個。

用法

去翅足研末。外用。罕入湯劑。

禁忌

體虛者慎用。

● 紅娘子（卽樗雞）

形色

身色紅。頭翅黑。

性味

苦平微溫。

功能

去瘀。通經閉。消痰癰。強陰。益精氣。可作溫中坐藥。

分量

三個至五個。

用法

去翅足，糯米炒。罕入湯劑。

禁忌

體虛血衰者忌用。

● 五靈脂

形色

色灰褐。形如鼠屎。

性味

鹹溫腥。

功能

散瘀通經。治心腹血滯疼痛。

分量

一錢至三錢。

用法

生用去瘀。炒炭止崩血。

禁忌

血虛無瘀者忌用。

鱗甲

形色

色黃。甲有駭紋。

性味

鹹平。

功能

養陰平肝。去瘀退熱。主治勞瘧癰疽。

分量

三錢至一兩。

用法

炙用。或醋炒。

禁忌

外感寒熱者忌用。

牛角腮

形色 色灰黑兼黃。爲角尖中之堅骨。

性味 苦辛溫腥。

功能 破寒癆。通經絡。治療血疼痛。止血崩赤白帶。冷痢。

分量 一錢半至三錢。

用法 炙研末。酒沖服。

禁忌 濕熱癆結者忌用。

白丁香（卽雀糞）

形色 色灰白。細條。

性味 苦溫。

功能 治癰瘍久癥。塗癬癩即潰。和乳消鬱。外塗瘡癩。平胬肉。

分量

酌用。

用法 研末製丸。或外用。

禁忌 陰虛內熱。及生內翳者忌用。

●花蕊石

形色 色白結晶。

性味 淡平香辛。

功能 治金瘡出血。能化瘀為水。下死胎。平血暈。

分量 二錢至四錢。

用法 煅煉水飛用。

禁忌 血虛者忌用。

● 硒砂

形色

色紅光潔悅目。如瑪瑙。

性味

鹹苦辛熱。

功能

消惡肉。除疣贅。化瘀積。治噎膈。去鼻中瘻痔。

分量

五厘至一分半。外用酌配。

用法

煎膏藥。及製末外用。罕有內服。

禁忌

疗毒。及內熱虛體忌用。

● 無名異

形色

色紫褐。石粒小如花子。

性味

香涼平。

功能

活血涼血。治跌仆損傷。消腫止痛。

分量

一錢半至三錢。

用法

研碎包煎。或酒沖服。或醋調外塗腫毒。

禁忌

寒瘓者忌用。

● 黑丑

形色

色黑。作三角形。

性味

苦辛潤。

功能

去瘀消痞。導水通腸。

分量

八分至一錢半。

用法

生用。或炒用。

禁忌

血虛無瘀。大便溏泄者忌用。

白丑

形色 色淡黃。形如山楂核。

性味 苦腥微甘。

功能 去瘀結。消核塊。通水利腸。

分量 五分至一錢半。

用法 生研用。

禁忌 血虛便溏者忌用。

乾漆

形色 色黑。如泥塊。

性味 腥溫。

功能 去瘀。續筋骨。消痞結。
分量 八分至一錢半。
用法 炒漆令烟盡，研末冲服。
禁忌 胃弱血虛。及內熱者忌用。

● 血竭

形色 色紫紅。結晶。
性味 香淡溫。
功能 散瘀止痛。消癰瘍。療傷。
分量 三分至六分。
用法 研末酒沖。入丸散為多。
禁忌 血少陰虛者忌用。

●自然銅

形色
色金紫相雜。

性味
辛平。

功能
主治折傷。續筋骨。消瘀止痛。

分量
三錢至五錢。

用法
生研包煎。

禁忌
非筋骨折傷者勿用。

●荆三稜

形色
色黃白。映之有小紅點。

性味
苦香平。

功能

入肝肺。散血瘀氣結。消堅癥止痛。

分量

八分至三錢。

禁忌

氣血虛者忌用。

用法

醋炒用。

●蓬莪朮

形色

色淡紫。中有白點。形似川鬱金。稍枯晦。

性味

香宣苦溫。

功能

去瘀。通經止痛。消癰癧。

分量

一錢至三錢。

用法

生用。或醋炒。

禁忌

熱癆。及氣血虛者忌用。

● 延胡索

形色 質堅色黃。

性味 香苦溫。

功能 入肝理氣。去瘀止痛。

分量 一錢半至三錢。

用法 炒用。

禁忌 氣滯內熱血瘀者慎用。

● 乳香

形色 色灰黃。結晶。

性味 香溫微苦。

功能

散寒療止痛。外用去腐生肌。

分量

六分至一錢半。

用法

灸用。或生用。

禁忌

溼熱血瘀者忌用。

◎灸沒藥

形色

色黑。

性味

焦香溫微苦。

功能

溫散寒療。止痛。外用化腐生肌。

分量

八分至一錢半。

用法

炙煅存性。

禁忌

內有溼熱者忌服。

當歸尾

形色

片小色黃。中有圈心。

性味

甘香苦溫。

功能

去瘀生新。治跌仆損傷。及經閉血風痛。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

胎前血虛無瘀者忌用。

赤芍

形色

色黃白。小片。外有輪齒。中心細理。

性味

苦甘微辛涼。

功能

活血。消癰腫。散風熱。清營。

分量

一錢半至三錢。

用法

水炒用。或生用。

禁忌

胎前血虛者慎用。

桃仁

形色

色白潔。如南瓜子。

性味

腥香苦潤。

功能

去瘀。通便祕。經閉。

分量

八分至三錢。

用法

去皮尖。研碎用。

禁忌

血虛便溏者忌用。

紅花

形色 色淡紅微黃。如散煙絲。

性味 香甘微苦。

功能 行瘀。治血。通經。少用生血。

分量 七分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 血熱而濫者忌用。

附註 藏紅花。味辛潤涼微苦。色綠紅紫潤澤。置水中有紅絲下

垂者為真。養血功多。去瘀力少。

蒲公英

形色

葉青綠。

性味

鹹酸微香。

功能

消乳癰腫核。解疔毒。

分量

三錢至五錢。

用法

生用。

禁忌

中寒血虛者忌用。

參三漆

形色

片圓色黃。有紋圈。

性味

苦辛微甘。

功能

去瘀止血。理傷痛。

分量

五分至一錢半。

用法 研末冲服。

禁忌 血脫無瘀者忌用。

毫三漆

形色 色黃白。如骨骼。

性味 苦香。

功能 療傷活血。強筋骨。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。或研末冲服。

禁忌 外感骨痛者忌用。

山茶花

形色 花朵外灰內紅。有細絨毛。

性味 涼平微苦香。

功能 清血去瘀。止吐衄。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 中寒者忌用。

●澤蘭葉

形色 色青黃。

性味 香苦微甘。

功能 化熱瘀。調經治傷。散水熱浮腫。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 血虛。及崩漏者慎用。

● 雞血藤

形色 色紫紅有圈。中多細孔。

性味 苦澀香微甘。

功能 去瘀血。生新血。流利經脈。治暑痧。風血痙症。

分量 一錢半至三錢。

用法 酒炒。或生用。

禁忌 風熱風寒表症者忌用。

● 生蒲黃

形色

粉色金黃。

性味

苦涼。

分量

活血去瘀。消頤毒腫痛。
三錢至五錢。

用法

包煎。

禁忌

中寒血虛者忌用。

●淮牛膝

形色

色黃白。梗形挺。質軟。

性味

苦甘微寒。

功能

達下。通泄膝痺。降瘀。止吐衄。

分量

二錢至四錢。

用法 生用。或炒用。
禁忌 氣墜泄瀉者忌用。

劉寄奴

形色 梗白。葉細。
性味 苦辛香溫。
功能 去療傷。止金瘡血。
分量 一錢半至三錢。
製法 生用。或研末外敷。
禁忌 血虛者忌用。

赤小荳

形色

形圓。紅多黑少。色光澤。

性味

甘香微腥。

功能 分量

消腫。行瘀熱。解毒排膿。外敷瘡疽。

用法

三錢至五錢。

禁忌

血虛者忌用。

馬鞭草

形色

葉青。梗黃。

性味

苦香平。

功能

去瘀通經。消癰瘍。

分量

八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 血虛者忌用。

●馬蘭花

形色 色黃。花瓣長細。

性味 酸微苦涼。

功能 消癰疽。治喉痺。通利二便。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或酒炒。

禁忌 便溏者忌用。

附註 馬蘭子。色灰黑。角形。味甘淡涼平。療傷。消癰腫。除煩滿。利大小便。分量一錢半至三錢。忌禁同花。

●平地木

形色 葉色紫。邊有鋸齒。

性味 香平微苦。

功能 解毒去瘀。療傷腫。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或酒炒。

禁忌 虛弱者慎用。

●河白草

形色 梗葉細。色紫赤。

性味 苦香平。

功能 止吐衄。消癰結癧瘻。截瘻。治傷腫蛇咬。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 血虛及風寒者忌用。

●翻白草

形色 花黃。梗葉細長。色紫紅。

性味 香苦平。

功能 治吐衄崩中。瘻疾。消疔毒瘡腫。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 風寒外感者忌用。

●凌霄花(一名紫葳花)

形色

花色紫黃。中有心鬚。

性味

酸苦香涼平。

功能

去瘀清熱。通經閉。治癰疽崩帶。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。或酒炒用。

禁忌

寒瘓者忌用。

●茜草

形色

色紫紅。

性味

微香苦溫。

功能 行瘀止吐衄。通經療傷。散風痺。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或炒炭。

禁忌 風寒外感者忌用。

●兩頭尖

形色 色灰黑。形長圓。即鼠糞。

性味 甘寒微苦。

功能 去銜任瘀熱。治傷寒陰陽易。腹痛發熱。

分量 六分至一錢。

用法 生用包煎。

禁忌 濕滯腹痛者忌用。

○蘇木

形色 色鮮黃。

性味 苦平微香。

功能 去療理氣。止痛消腫。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 血虛者忌用。

○落得打

形色 葉小色青。梗細色黃。

性味 酸苦香平。

功能 去瘀。療跌打損傷。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或外敷。

禁忌 傷血過多者慎用。

● 甜瓜子

形色 色黃白。子小。

性味 甘平微腥。

功能 清熱排膿。治肺癰咳嗽吐膿血。

分量 三錢至五錢。

用法 生用。

禁忌 風寒咳嗽者忌用。

大胡蘿

形色

子小扁。色紫光潔。

性味

淡腥微甘。

功能

滋血助氣。排膿。治肺癰吐膿血。

分量

一錢半至三錢。

用法

生研用。

禁忌

胃弱嘔噦者忌用。

夜合子

形色

色紫紅。形扁長圓。

性味

鹹腥平微甘。

功能 化瘀熱。和心氣。治肺癰吐濁。

分量 一錢半至三錢。

用法 生研用。

禁忌 外感咳嗽者忌用。

●虎杖根

形色 根皮色灰。內黃白。多孔。

性味 苦平微香。

功能 破瘀通經。消癰結。治傷撲煩渴。利熱毒。通淋。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或酒炒。

禁忌 中寒胃弱者忌用。

◎ 大小薊

形色 葉梗色灰黑。有白毛花。

性味 香淡微鹹。

功能 去瘀消癰。化濕熱。治血淋。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 寒瘀陰疽者忌用。

◎ 仙鶴草

形色 葉色淡青。

性味 苦香澁。

功能 去瘀止血。治吐衄。退熱。
分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 外感寒熱者慎用。

●黃藥子

形色 色灰黃。邊有節鬚。

性味 苦酸涼平。

功能 治瘡腫。解血毒。消癰氣。止吐衄。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或研末外搽。或浸酒內服。

禁忌 外感及體虛者慎用。

◎敗醬草

形色

葉梗灰黃。

性味

苦涼香平。

功能

去瘀清熱。治腸癰腫痛。排濃。利小便。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

血虛中寒者忌用。

◎紅藤根

形色

邊紫紅。中有淡白色輪紋。細孔。

性味

苦香平。

功能 行血。通經絡。治瘀閉經阻。療傷腫。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或酒炒用。

禁忌 風寒痺痛者少効。

◎ 王不留行

形色 色紫黑。子小圓。

性味 膽平。

功能 通任行血。利乳竅。治淋濁。

分量 一錢半至三錢。

用法 生研包煎。

禁忌 外感者忌用。

金牛草

形色 色青黃。梗葉細。連根鬚長不及三寸。
性味 苦涼。

功能 去瘀熱。消癰腫。治傷。止痛。殺蟲。
分量 六分至一錢半。

用法 生用。或煎洗。

禁忌 外感及虛寒者忌用。

茺蔚子

形色 色青灰。形如芝麻。作三角狀。
性味 苦香平。

功能 去瘀調經。止吐衄。理氣開鬱。明目益精。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用包煎。

禁忌 瞳睛散大者忌用。

●剪刀草

形色 色紫褐。梗葉細。

性味 苦平。

功能 消瘡腫毒。蟲咬傷。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或酒炒。

禁忌 風寒胃弱者忌用。

●大青草

形色

梗葉細。色灰紫。

性味

香溫平。

功能

活血通經脈。理氣散瘀。療傷。止吐衄。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。或酒炒。

禁忌

血虛氣弱者忌用。

●鳳眼草

形色

色淡黃。薄葉嵌子如鳳眼。

性味

苦涼。

功能 活血祛風。治經閉勞熱。遺精白濁。利小便。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 中寒泄瀉者忌用。

●石見穿

形色 梗葉色紫褐。

性味 苦香涼。

功能 活血利氣。祛大風骨痛。消癰腫瘡傷。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 血虛氣弱者忌用。

重 鎮 之 品

硃砂

形 色 色紅。粉末。

性 味 甘涼微香。

功 能 安魂鎮心。養神明目。治驚煩癲狂。

分 量 三分至八分。

用 濡 冲服。或入丸劑。忌火煎。

禁 忌 心陽虛弱者忌用。

花龍骨

形 色 色白黃。有花紋。

分 類 飲 片 新 參 硃砂 花龍骨

性味 辛香涼。

功能 安神。治久痢滑泄。夜夢鬼交。熱邪驚癇。

分量 三錢至六錢。

用法 生用。或煅用。

禁忌 寒症表邪者慎用。

●青龍齒

形色 外灰白。內黑。類礦質石塊。

性味 香涼。

功能 安心神。定魂魄。止虛汗。治怔忡不眠。

分量 三錢至五錢。

用法 生用。

禁忌

中寒者忌用。

●靈磁石

形色

色黑結塊。或研粉末。

性味

辛燥鹹平。

功能

平腎氣。治耳鳴耳聾。瞳人散大。周痺痠痛。

分量

三錢至一兩。

用法

研末包煎。

禁忌

溫邪致聾。及溼熱癥痛者忌用。

●珍珠母

形色

介屬色白。內外光潔。有五線。多層片結成。

性味
鹹平涼微腥。

功能
平肝潛陽。安神魂。定驚癇。消熱痞眼翳。

分量
三錢至一兩。

用法
生用。

禁忌
中寒者忌用。

代赭石

形色
色紫紅。

性味
苦香涼平。

功能
鎮逆氣。安心寧神。治心下痞硬。噫氣呃逆。

分量
三錢至一兩。

用法
煅研包煎。

禁忌

虛寒泄瀉。及陰痿者忌用。

◎密陀僧

形色 色灰黃。有金紋。光炫。

性味 辛涼平。

功能 墓瘧。定心氣。外用治瘡腫。減黓斑腋臭。
分量 五分至八分。

用法 研末冲。但以外用爲多。

禁忌 中寒。及風溼瘡腫者慎用。

◎飛黃丹

形色 色鮮澤黃赤。粉末。

性味 辛平微寒。

功能 鎮逆下氣。治反胃。驚癇狂煩。外用消炎腫生肌。

分量 五分至二錢。

用法 飛末沖服。或製丸煎膏藥。或外搽。

禁忌 外感。及氣墜者忌服。

●金精石

形色 色金黃光潔。作層片。

性味 淡平。

功能 平肝鎮驚。安魂魄。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌

外感寒熱者忌用。

附註

銀精石。色青烏。光潔層片。性味功能相同。

●紫石英

形色

色紫白相雜。

性味

甘溫平。

功能

治衝任虛寒。不孕。喘咳上氣。

分量

三錢至一兩。

用法

煅用。

禁忌

陰虛內熱者忌用。

附註

白石英。色白結晶。溫平。入氣分。平喘逆。止帶下。分量禁忌相同。

● 牡蠣

形色 潔白光澤。有層片。

性味 咸平。

功能 平肝。潛陽。軟堅。消痰痞。止脫痛。滻精散汗。

分量 三錢至一兩。

用法 生用或煅用。

禁忌 外感食滯者忌用。

● 紫貝齒

形色 醬紅色。上有白花點。光潔悅目。

性味 甘寒。

功能 清心。平肝安神。治驚惕不眠。
分量 三錢至五錢。
禁忌 外感者忌用。
用法 生研用。

◎ 鵝管石（附鍾乳石滴乳石）

形色 色黃白。形如鵝管。中有孔紋。
性味 鹹溫平。
功能 治咳逆。止氣。益精。安五臟。
分量 一錢半至三錢。
用法 煎用。
禁忌 外感咳嗽及內熱者忌用。

附註 滴乳石。色潤白。管長。鐘乳石。色灰白結塊。性味功效
相同

● 珊瑚片

形色 片薄質堅。透明。作雲影狀。
性味 淡平。
功能 平肝鎮驚。定心氣。
分量 三錢至五錢。
用法 生用。
禁忌 體溫低者忌用。

● 石決明

形色 介屬。外灰色。內層有五線。光澤。

性味 鹹平涼。

功能 平肝明目。潛陽熄風。

分量 三錢至三兩。

用法 生用。或煅用。

禁忌 中寒泄瀉者忌用。

●雲母石

形色 色青瑩。片如軟玻璃。

性味 淡平。

功能 鎮肝明目。定魂魄。安神志。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 表邪寒熱者忌用。

●蛇含石

形色 外色紫灰。作點狀。內雜金黃。

性味 辛平。

功能 鎮心安神。治驚癇抽搐。及血痢久不止。

分量 三錢至一兩。

用法 煅研用。

禁忌 風寒驚癇及溼熱赤痢者忌用。

化 溼 之 品

● 蒜豆花

形色

花黃白。萼青綠。

性味

甘平。

功能

調理溼溫病後。和脾健胃。止泄。進飲食。

分量

八分至一錢半。

用法

生用。

禁忌

脾胃虛寒者無効。

● 橘白

形色

去橘紅外層。故見孔點。色黃白。

性味	甘辛微苦。
功能	化濕。和脾胃。進食。
分量	八分至一錢半。
禁忌	脾胃液虛而燥者不宜。
用法	炒用。
形色	色白糕狀。澱粉質結成。
性味	甘淡平。
功能	和脾胃。化濕。利水。
分量	三錢至五錢。
用法	生用。

●雲茯苓(附茯神)

禁忌

傷寒邪熱者勿用。

附註

菝葜神形色相似。中有木梗。多非真品。實少安神之力。故不另詳。

●墓頭回

形色

皮色紫。內黃。有紋孔。

性味

苦澀微臭。

功能

化溼熱。治下痢崩中。赤白帶下。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。或酒炒。

禁忌

外感風寒者忌用。

●荷葉（附荷梗）

形色 色青綠。

性味 香甘平。

功能 升清氣。止泄瀉。化溼和胃。

分量 一角至一張。

用法 生用。

禁忌 輕重隨宜。

附註 荷梗通氣。治暑溼胸悶。

● 蟲豆花

形色 色灰黑而白。花瓣輕薄。

性味 辛香微酸平。

功能 利氣開胃。止痛。化濕。生津液。

分量 八分至一錢半。
用法 生用。或炒用。
禁忌 氣虛汗多者勿用。

木防已

形色 色淡黃。紋線彎曲。
性味 苦寒。
功能 清血中溼熱。通經絡滯痺。利小便。
分量 一錢至三錢。
用法 生用。或酒炒用。
禁忌 中寒泄瀉者忌用。

地膚子

形色　　色青綠。子細圓。
性味　　苦香涼。

功能　　利膀胱溼熱。通淋閉。治皮膚溼瘡。

分量　　一錢半至三錢。

用法　　生用包煎。或外洗。

禁忌　　中寒泄瀉及胃弱者忌用。

● 糜卿草

形色　　葉色紫紅。

性味　　苦香平。

功能　　化溼熱。治酒風痺痛。利小便。

分量　　一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 風寒痺痛者勿用。

枳椇子

形色 子色紅澤。形扁圓。

性味 滯苦微甘。

功能 解酒積。治消渴。除煩安神。

分量 一錢半至三錢。

用法 炒研用。

禁忌 非酒溼者勿用。

白蘚皮

形色 色白。中有黃圓心。
性味 苦香。
功能 化溼熱。治皮膚瘡癬。
分量 一錢半至三錢。
用法 生用。或浸酒搽瘡癬。
禁忌 陰虛內熱者忌用。

● 土槿皮

形色 色淡紅。粗理。皮厚。
性味 苦澀涼。
功能 治腸風便血。化溼熱。殺蟲。治癬瘡。
分量 一錢至三錢。

用法 酒炒用。或浸膏，酒擦癬。

禁忌 外邪寒熱者忌用。

● 川槿皮

形色 色外灰內黃。皮薄捲狀。

性味 苦涼平。

功能 化溼熱。治癬瘡。黃痘。白帶。白痢。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或浸酒搽瘡癬。

禁忌 寒溼下利者忌用。

● 苦參子

形色	壳灰黑肉黃。
性味	奇苦而寒。
功能	化溼熱。殺蟲。止赤痢。
分量	三分至五分。
禁忌	法法生研煎。或腐皮包吞。
中寒胃弱者忌用。	
分量	一錢至二錢。

● 苦參

用法 生用。或酒炒用。

禁忌 中寒者忌用。

● 稀莶草

形色 葉色青綠。梗灰內白。

性味 苦微香腥。

功能 化溼熱。堅筋骨。治溼瘡。解痙痛。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或酒炒。或外洗瘡。

禁忌 風寒外感者忌用。

● 槐花米

形色 色青黃如米形。
性味 苦涼微香濃。
功能 主治下焦溼熱。腸風便血。
分量 三錢至五錢。
用法 生用。或炒用。
禁忌 便結者忌用。

●北秦皮

形色 色灰白。內微黑形捲。
性味 香平微苦寒。
功能 化溼熱。治腸風下痢。開胃和中。
分量 一錢半至三錢。

用法 生用

禁忌 外感者忌用。

綿茵陳

形色 色淡青。如艾絨。

性味 辛香苦平。

功能 化溼熱。主治黃疸。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 陰黃者慎用。

附註 茵陳梗。色灰黑。味淡平微香。清熱利溼。治黃疸少効。

分量 一錢半至三錢。禁忌同上。

省頭草

形色

梗黃。葉黃黑。

性味

清香。

功能

化濕悅脾開胃。治濕溫頭重。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

液虛冒燥者忌用。

川棟子

形色

皮紫。內肉核黃。大如桂圓。

性味

苦酸。

功能

理肝胃氣。化濕熱。殺蟲。止痛。

分量

二錢至五錢。

用法

炒用。

禁忌

脾胃虛寒者慎用。

佩蘭葉

形色

色青晦。

性味

香苦平。

功能

化濕。開脾胃。進飲食。

分量

一錢至二錢。

用法

生用。

禁忌

脾胃氣虛者慎用。

葛花

形色 色淡黃。形如穀粒。分叉。
性味 香苦溫微酸。
功能 化濕熱。止泄瀉。解酒毒。
分量 八分至一錢半。
用法 生用。
禁忌 體虛者慎用。

● 婆婆子(一名天師栗)

形色 色灰黃。大如栗子。
性味 【壳】苦溫。【肉】苦溫微甘。

功能 開胃。化寒濕。治風癆。

分量 一錢半至三錢。

用法 酒炒用。

禁忌 內熱者忌用。

(◎) 茅朮(附製蒼朮)

形色 色黃微白。切片。形如梅花瓣。

性味 辛香烈苦燥。

功能 入脾胃。化寒濕瘀積。散水飲。止瀉。

分量 五分至二錢。

用法 炒用。

禁忌 陰虛液燥者忌用。

附註 製蒼朮色黑。因蜜製微甘。燥性仍在。力稍緩。兼補脾。

●益智仁

形色 色灰黑。如大粒花籽。

性味 苦香辛滑。

功能 悅脾胃。開神智。攝涎沫。止唾。

分量 八分至一錢半。

製法 生用。

禁忌 胃熱液虛者忌用。

●梧桐子

形色 壳色灰黃。多皺紋。內肉黃白。形圓。大如天竺子。

性味

甘淡微香。

功能
擣汁染髮。又敷小兒口瘡。油塗疥癬腫毒。又吐風痰喉痺

。

分量

酌用。

用法

詳功能條。

禁忌

多食作吐。得酒即解。

●蘆甘石

形色

色白間紅。石脂結塊。

性味

香燥平。

功能

消濕腐。退目翳。治瘻瘍。

分量

酌用。

分類飲片新參　浪苔　樟木皮

七六

用法　研末外搽爛脚。或配藥退翳。罕有內服。
禁忌　癰疽及無水瘡症者忌用。

●浪苔

形色　色外黑內灰。片薄。作殷襞狀。
性味　苦涼平。
功能　化濕熱。治皮膚癬瘡癢痛。
分量　八分至一錢半。
用法　生用。或研末。或浸酒外用。
禁忌　中寒胃弱者忌用。

●樟木皮

形色

色隱紅。片薄。中炭白線紋。

性味

苦涼平。

功能

治黃疸熱毒。乳癰瘡腫。小溲熱短。

分量

一錢至三錢。

用法

生用。或炙研酒沖服。

禁忌

中寒胃弱者忌用。

● 香椿葉

形色

梗紫葉青。

性味

香淡微溫。

功能

化暑濕。透熱。利水道消腫。

分量

八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 氣虛汗多者忌用。

●骨牌草

形色 葉色黃紫。上有骨牌點。

性味 苦香平。

功能 治暑濕瘡痢。風氣腫毒。辟惡散邪。疎經絡。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 風寒瘡邪者勿用。

●白荷花

形色

色灰黃。瓣大。

性味

鹹苦涼平。

功能

清暑。除煩渴。安胎止血。化瘀熱。

分量

八分至一錢半。

用法

生用。或炒用。

禁忌

寒瘀泄瀉者忌用。

●六月雪

形色

梗葉色青灰。

性味

苦香涼平。

功能

化濕熱。解暑消積。利膈止痢。散瘀。療瘡瘍。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。或代茶。

禁忌

寒症瀉痢者忌用。

◎ 奶孩兒（一名嫗酣草）

形色

梗色灰紫。

性味

苦香溫平。

功能

和中辟惡。去臭氣。治霍亂吐瀉。行氣活血。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

陰霍亂者無効。

化痰之品

◎犀黃

形色

色黃赤。

性味

苦香涼。

功能

化心腦熱痰。治驚癇昏語。解毒生肌。

分量

一分至三分。

用法

生用研冲。或入丸散。

禁忌

熱未入營。及外瘡潰久氣虛者忌用。

◎濂珠粉

形色

色白細粉。

性味 香涼。

功能 清心化痰。助神明。定驚悸。治虛煩不眠。外用解熱生肌。

。

分量 一分至三分。

用法 生研水飛冲服。或入丸散。

禁忌 虛寒者勿用。

●猴棗

形色

色紫黑光潔。大如白棗。碎爲粉末。

性味

鹹平微苦。

功能

治虛喘。化痰納氣。治驚癇。亦新出奇藥。

分量

一分至三分。

用法 研細末冲服。

禁忌 寒症。及水飲者勿用。

馬寶

形色 研如粉質。色白。

性味 香涼。有象貝氣味。

功能 清肝腦。化熱痰。治癰癧。止吐衄。

分量 一分至二分。

用法 用酒水調服。

禁忌 中寒痰溼者忌用。

常山

分類飲片新參 馬寶 常山

形色 色黃。質粗脆。

性味 苦平微香。

功能 化痰截癰。

分量 一錢半至三錢。

用法 炒用。

禁忌

瘧疾初起者忌用。

●青礞石

形色 色灰青。有光點。

性味 寒平燥。

功能 塞瘻泄熱。治癇狂驚癇。

分量 三錢至五錢。

用法 研末包煎。或製丸用。

禁忌 虛寒便溏者忌用。

附註 磻石有二。青礞石即金礞石。又有銀礞石。色帶灰黃。功

用差同。

●鐵口兒茶

形色 色紫紅。如泥質粉末。

性味 酸涼。

功能 軟堅。消癰腫止痛。清熱化痰癖。

分量 三分至八分。

用法 生用包煎。

禁忌 中寒泄瀉者忌用。

海藻

形色 色黑。細條。

性味 咸平。有青腥氣。

功能 軟堅。消瘰癧。痰塊。癰腫。疝氣。

分量 一錢至二錢。

用法 生用。

禁忌 時行疫毒者勿用。

昆布

形色 色黑。片薄如樹葉。

性味 滑微青香。

功能

消癰癰氣。軟堅化痰。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

寒痰者勿用。

瓦楞子

形色

色白介屬。背多縱溝。

性味

鹹平。

功能

平肝和胃。治日久膀胱熱痛。

分量

三錢至一兩。

用法

研用。

禁忌

寒痛外感者忌用。

●山慈姑

形色 色白。片光潔。
性味 滑潤。
功能 散瘀療結核。消癰腫瘍癰。
分量 八分至一錢半。
用法 生用。或研末沖服。
禁忌 虛體者慎忌。

●陳胆星

形色 色白。粉質結塊。
性味 苦酸辛。

功能 化風痰。治心腦痰鬱昏迷。

分量 六分至一錢半。

用法 研末納牛膽。陳久用。

禁忌 風寒痰咳者忌用。

○製南星

形色 片薄。色黃白光潔。

性味 氣微腥。味淡燥。

功能 化風痰。治肝厥神昏。舌強言塞。

分量 八分至一錢半。

用法 酒浸洗。風乾用。

禁忌 陰虛熱痰者慎用。

分類飲片新參 肥皂莢 細牙皂角

九〇

肥皂莢

形色 皮色紫黑。夾背有絃。內黃白。子色紫紅。

性味 辛辣溫鹹苦激。

功能 破堅積。逐風痰。通關利竅。

分量 三分至八分。

用法 研末沖服。

禁忌 體虛胃弱者大忌。

附註 子能治大腸風秘燥結。消核塊。功用。七粒至十五粒。

細牙皂角

形色 色紫紅。如猪牙。

性味

辛酸麻浸潤。

功能

滌風涎痰渴。通關竅。破堅殺蟲。

分量

三分至八分。

用法

研末冲。

禁忌

虛體者慎用。

灸殭蠶

形色

色黃。如其名。

性味

辛鹹微溫。

功能

泄風痰。散結消腫。行經絡。定抽搐。

分量

二錢至四錢。

用法

炙用。

禁忌 寒燥痰咳者忌用。

●遠志

形色 色淡黃。形圓。作梗管狀。

性味 苦溫辛酸。

功能 通七竅。益志健腦。安神。化痰。止咳。

分量 六分至一錢半。

用法 去心。炙用。

禁忌 瘰癧。及燥咳者忌用。

●化橘紅

形色 皮色青綠。肉厚。有毛孔。

性味

苦香辛燥。

功能

化風寒痰。止咳嗽。

分量

五分至一錢。

用法

去白生用。

禁忌

內熱燥咳者忌用。

附註

據傳化州。惟賴氏園。有橘樹。下生礞石。所產橘紅。化痰奇効。今藥肆所售。多用柚皮代之。久無道地出品。然性亦香燥。不失其化風寒痰濕之効也。

賴氏紅

形色

色綠如蟠皮。理細。

性味

苦香燥。

功能 化風痰。開胃進食。

分量 五分至一錢。

用法 生用。

禁忌 热咳不爽者忌用。

附註 較化橘紅爲細潔。未易辨其真贗。姑存之。

● 橘紅

形色 色紅。有孔點。

性味 辛香苦微甘。

功能 入肺胃。理氣化痰。止嘔逆。助汗開胃。

分量 五分至一錢半。

用法 陳用。止嘔用薑汁炒。

禁忌

內熱涼少者慎用。

●佛耳草

形色

花黃小朵。陳者色紫黃。有纖毛。梗葉灰褐。

性味

微甘香酸溫。

功能

治寒飲久咳。化痰。利肺氣。

分量

八分至一錢半。

用法

炒用包煎。

禁忌

痰熱燥咳者忌用。

●旋覆花

形色

外黃內白。瓣如絲。有毛。

分類飲片新參

佛耳草 旋覆花

性味 酸溫苦平。

功能 化痰癖。治咳嗽。除噫氣。

分量 一錢至二錢。

用法 包用。

禁忌 燥熱咳嗽者忌用。

● 金沸草

形色 梗黃葉青。

性味 酸苦辛溫。

功能 治風寒咳嗽。消痰結堅癆。下噫氣。泄腸水。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 虛者。及內熱者慎用。

法半夏

形色 色白。片圓薄光潔。

性味 淡溫燥。

功能 化溼痰。治咳嗽吐噔。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 燥咳者忌用。

姜半夏

形色 質堅。色白滑。如螺電錐。

分類 飲片 新參 法半夏 姜半夏

性味 香溫燥。
功能 化痰止嘔。和胃健脾。
分量 一錢半至三錢。
用法 姜汁製。
禁忌 痰熱致嘔者慎用。

④ 仙半夏

形色 圓如棋子。內白。多含澱粉質。外層裏肉桂、薄荷、陳皮
、木香、等末。故見灰黑色。
性味 苦辛溫。
功能 化濕痰。開胃止嘔。
分量 一錢半至三錢。

用法 嘔吐甚者。用薑半夏。濕痰挾熱者。用竹瀝半夏。普通用
法半夏。挾食者。用半夏麴。
禁忌 热痰煩渴者忌用。

●白芥子

形色 色黃。形如粟米。
性味 苦辣溫激。
功能 化膀胱寒痰。理氣止痛。消痞滿。弔炎。
分量 八分至一錢半。
用法 生研包煎。
禁忌 陰虛熱痰者忌用。

●菜菔子

分類飲片新參 白芥子 菜菔子

形色 皮色淡紅。內黃。

性味 香微甘。

功能 滌痰降肺。寬胸膈。定喘嗽。

分量 一錢半至三錢。

用法 炒研用。

禁忌 肺虛脾弱者忌用。

●天將殼

形色 色青黃。形如薄柚皮。內層有膜皮。扯之有網絡。

性味 咸平。

功能 軟堅。化痰。清肺。治肺風痰喘。定驚癇。

分量 八分至三錢。

用法 生用。
禁忌 寒痰喘咳。不可獨用。

● 川貝母

形色 色白。形如剖開蓮子。多澱粉。
性味 苦涼微香。
功能 潤肺化痰。治勞熱咳嗽。
分量 一錢半至三錢。
用法 生用。
禁忌 外感痰飲者忌用。

● 象貝母

形色 如去皮荸薺。光潔潤白。片微凹。含多量澱粉。
性味 苦潤平。

功能 入肺化熱痰。止咳開鬱。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 温痰咳嗽者少用。

● 括薑仁

形色 色紫黃。形扁凸。如結鈕。

性味 甘滑微苦涼。有油腥氣。

功能 化痰熱。寬胸膈。潤腸。通大便。

分量 三錢至五錢。

用法 生研用。

禁忌 瘦飲。及泄瀉者忌用。

●瓜蔓皮

形色 色金黃光潔。

性味 甘苦滑微涼。

功能 寬胸膈。化熱痰。生津潤肺。

分量 一錢半至五錢。

用法 生用。或炒用。

禁忌 脾胃虛寒泄瀉者慎用。

●瓜蔓仁

形色 壳色淡紫。肉青白。大於南瓜子。

性味 腾潤涼微滑。

功能 清肺。化熱痰。潤腸。通大便。

分量 三錢至一兩。

用法 生研用。

禁忌 大便滑泄者忌用。

海浮石

形色 色灰白。質輕脆。

性味 香平微鹹涼。

功能 化熱痰。散癰癧。清肺。治咳嗽。

分量 三錢至五錢。

用法 生用。

禁忌 風寒咳嗽者忌用。

●海蛤壳

形色 介屬。外黃有直紋。內光白。

性味 涼滑。

功能 化熱痰。治咳嗽面腫。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 寒飲咳嗽者忌用。

●硼砂

分類 飲片 新參

海蛤壳 硼砂

形色 色白。結晶。

性味 鹹涼。

功能 化痰熱。消炎腫。軟堅。

分量 一錢至一錢半。

用法 研末沖服。

禁忌 風寒咳嗽者忌用。

●地栗粉

形色 粉色白。

性味 涼甘平。

功能 化熱痰。消銅屬瘀積。和藥用點眼去翳。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 寒嗽者忌用。

●白螺絲壳

形色 色白。即螺絲壳。

性味 淡平。

功能 化熱痰。治脢氣疼痛。利水熱。

分量 一錢半至三錢。

用法 研用。

禁忌 風寒痰咳者忌用。

●款冬花

分類 鈎片新參

白螺絲壳 款冬花

形色 色淡紅。內作絲棉狀。

性味 青香苦溫。

功能 温肺。治咳嗽化痰。

分量 一錢半至三錢。

用法 炙用。

禁忌 便溏。及燥咳者忌用。

●紫莞

形色 色紫。片有花紋。

性味 甘香苦潤。

功能 顧肺氣。止咳嗽。通調大便。

分量 一錢至三錢。

用法

灸用。

禁忌

便溏者忌用。

●天竺黃

形色

片色白脆。多澣粉。

性味

燥香涼。

功能

開風痰。定驚癇。強骨骼。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

液燥煩渴者忌用。

附註

本草以竺黃甘寒。故有化熱痰之効。今驗藥肆中所備。疑似骨質合葛粉製成。故功用亦異。

●朝天子

形色

色淡黃。形小於馬兜鈴。中有莢房。含白絨細子。

性味

苦香涼平。

功能

清肺化痰。治肺風痰喘。咳嗽音瘡。

分量

八分至一錢半。

用法

生用。

禁忌

風寒。虛喘。不盡相宜。

●仙桃草

形色

梗細。色青灰。

性味

鹹平。

功能

軟堅化痰。消癰瘍。疝腫。癰瘤。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

寒瘀作痛者無効。

●水紅子

形色

子小扁。色紫紅。

性味

甘腥平。

功能

清肺化痰。透疹痘。降氣定喘咳。通大小便。

分量

一錢半至三錢。

用法

生研包煎。

禁忌

虛喘便溏者忌用。

分類飲片新參

一一一

理氣之品

● 合歡花

形色

色青黃。朵小形如茶子。

性味

香苦甘平。

功能

和心志。開胃。理氣。解鬱。治不眠。

分量

八分至一錢半。

用至

生用包煎。

禁忌

外感不眠者勿用。

● 合歡皮

形色

色灰。皮有縱紋。

性味 苦澀微香溫。

功能 平肝開鬱。安神止汗。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 外感不眠。風熱自汗者忌用。

●陳橘核

形色 色淡黃。

性味 辛臭苦溫平。

功能 治厥陰癩疝。小腹痛脹。

分量 一錢半至四錢。

用法 生用。或炒用。

禁忌

非關下部病者勿用。

橘葉

形色

色淡綠。

性味

香苦平。

功能

疏利厥陰氣鬱。治疝痛。

分量

一錢至二錢。

用法

生用。

禁忌

外邪寒熱腹痛者忌用。

白蘇子

形色

色灰白子小。

分類飲片新參 橘葉

白蘇子

性味 脣平微香潤。

功能 平肺氣止逆。治咳喘。通腸府。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或炒用包煎。

禁忌 風寒咳喘。及便溏者。忌用。

附註 黑蘇子。色紫褐。子細。性味功效差同。兼有納氣之効。

●雲台子

形色 色淡黃。子小圓。

性味 苦平微甘。

功能 降肺氣。定咳喘。治痰多胸悶。

分量 一錢半至三錢。

用法

生研包煎。

禁忌

虛喘便溏者忌用。

●紅花子

形色

形多角。似葵花子而小。色淡白。

性味

苦香微澁。

功能

理氣止痛。化瘀消癟。治瀉痢。

分量

八分至一錢半。

用法

研用。

禁忌

氣弱血虛者勿用。

●豆蔻花

分類飲片新參

紅花子

豆蔻花

形色 色淡黃。瓣如茅。

性味 香辛平。

功能 開胃理氣。止嘔。寬胸脹。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

●白豆蔻

形色 壳色黃白。仁紫。多子結成。

性味 香辣涼爽。

功能 理氣開鬱。治腕痛。止嘔吐。進飲食。

分量 六分至一錢。

用法

生用研末冲服。

禁忌

陰虛內熱者慎用。

附註

豆蔻壳。色淡黃。味微辛香。理氣。寬胸。止嘔。力輕於

蔻仁。

●西砂仁

形色

色灰白。多子結成。

性味

辛香溫潤。

功能

理氣寬胸。止嘔噦。進食。治便溏遺泄。

分量

六分至一錢。

用法

生用研沖。

禁忌

氣虛汗多。及內熱煩渴者忌用。

●縮砂仁(即春砂仁)

形色

色紫紅。多子結成。

性味

辛香辣溫。

功能

開鬱除寒。化溼滯止痛。溫中進飲食。止溏瀉。

分量

八分至一錢半。

用法

生用。或研冲。

禁忌

陰虛氣弱。內熱煩渴者。忌用。

附註

砂壳。色紫褐。多皺縮紋。味香淡溫。用以利氣。力薄。

用量八分。春砂花。香溫鹹。色紫黃。寬胸理氣。化痰治喘咳。用量八分。

●茉莉花

形色

色淡黃。蒂綠。

性味

香苦微甘。

功能

平肝解鬱。理氣止痛。

分量

五分至一錢。

用法

生用。

禁忌

風寒外感者勿用。

附註

茉莉花根。傳說可作麻藥。食一寸。能使人昏迷一日。多

服醉而不醒。

●佛手花

形色

色黃。花蒂同色。心瓣微淡。

性味

苦香酸平。

功能 平肝理氣。開鬱和胃。
分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 肝胃熱症者忌用。

● 小草

形色 色淡青。細梗。

性味 微香苦甘平。

功能 理氣開鬱。寬胸和胃。化濕。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或酒炒。

禁忌 陰虛內熱者勿用。

紅梅花

形色

色紅紫。

性味

苦香劣。

功能

清肝解鬱。治頭目痛。

分量

五分至一錢。

用法

生用。

禁忌

胃納少。及風寒頭痛者。忌用。

杜薑梗

形色

色青白。方角形。中空。

性味

青香平微溫。

功能 理氣寬中。化溼濁。治胸悶。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 內熱者慎用。

● 佛手片

形色 片白軟。

性味 甘香微苦。

功能 解鬱理氣。和胃暢中。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 內熱甚者忌用。

● 綠萼梅

形色

花黃白。萼綠。小朵。

性味

香苦微甘。

功能

平肝和背。止腕痛頭暉。進飲食。

分量

五分至一錢。

用法

生用。

禁忌

外感風寒者忌用。

● 玫瑰花

形色

萼青。朵紅。心白。

性味

香濃微苦。

功能 養血平肝。止吐血。治頭目痛。

分量 八分至一錢半。

用法 引用。或泡茶。

禁忌 中寒陽虛者勿用。

●紫蘇梗

形色 色白。中有小長式軟圈。

性味 香平。

功能 理氣開鬱。寬中和胃。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 氣虛者忌用。

降香

形色 色紅紫。

性味 香燥平。

功能 去瘀理氣。解鬱。治傷痛。

分量 六分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 血虛有熱者忌用。

製香附

形色 紫黑色。碎如大粒瓜子。中心有白紋圈點。
性味 辛香。

功能 入肝行血中之氣。止痛調經。

分量 五分至一錢半。

用法 水炒用入血。醋炒斂肝。生用去頭面風。

禁忌 陰虛肝燥。脾胃無濕者。忌用。

◎ 代代花

形色 色黃。長花朵。

性味 甘香微苦。

功能 理氣寬胸。開胃止嘔。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 肝熱甚者忌用。

● 伽楠香

形色 色紫褐。如沉香片。

性味 辛潤微苦香。

功能 下氣辟惡。散寒止痛。開痰閉。通竅。治噎膈。

分量 二分至五分。

用法 研末冲服。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

● 龍涎香

形色 色金黃晶瑩。如樹脂結晶。

性味 淡溫香平。

功能 化痰。定喘逆。治心痛。開竅。通神明。

分量 一分至三分。

用法 研末冲服。

禁忌 風寒喘逆。及痰火內盛者。忌用。

沉香

形色 色灰白。中有齒紋。

性味 香苦。

功能 理氣開鬱。止痛。納氣定喘。

分量 二分至五分。

用法 研末冲服。

禁忌 氣虛汗多者慎用。

廣皮

形色

廣柑皮。外紅內白。有皺孔。

性味

辛香微苦燥。

功能

健胃止嘔。助消化。入脾肺。利氣。

分量

五分至一錢半。

用法

陳用。

禁忌

燥咳無痰。及煩渴者。忌用。

●青鹽陳皮

形色

色黑。

性味

辛香甘溫鹹。

分類飲片新參

廣皮 青鹽陳皮

分類飲片新參 參貝陳皮

一三二

功能 順氣生津。解煩止渴。醒酒。開胃化痰。進飲食。

分量 六分至一錢半。

用法 陳皮用青鹽炒製。

禁忌 陰液枯耗者忌用。

◎參貝陳皮

形色 粉末製成顆粒。色淡黃。

性味 甘溫平。

功能 化痰。止虛咳。開胃。補而不滯。消而不伐。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或代茶食。

禁忌 外感咳嗽者勿用。

● 廣木香

形色

灰褐色。中有縱溝。

性味

辛香苦溫。

功能

走脾胃。理氣開鬱。止痛止瀉。消脹滿。

分量

五分至一錢。

用法

生用理氣。煨用止泄。

禁忌

陰傷口渴者忌用。

● 香櫟皮

形色

皮黃形皺。內白。

性味

辛香苦微甘溫。

功能 散肝胃鬱滯。理氣止痛。消腫脹。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

●樟樹蓼

形色 色淡黃內紫。有如荳蔻而皺摺。

性味 辛香苦涼爽。

功能 治肝胃氣痛。開心腦。醒酒。消痞脹。散暑癆。通厥逆。

分量 三分至六分。

用法 研末沖服。

禁忌 陰虛氣弱者慎用。

龍腦薄荷（即水蘇）

形色 葉色青灰。梗紫灰。質粗。

性味 香鹹微溫。

功能 下氣消食。辟口臭。除邪惡。醒酒。止吐衄崩中。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 溫邪溼熱者忌用。

廣鬱金

形色 皮綢灰白。內色淡黃。結晶。

性味 異香微苦涼。有松樹氣。

功能 寬胸開鬱。去瘀理氣。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 肝旺血燥者忌用。

● 枳壳

形色 色黃。片形如扣針。

性味 苦香燥。

功能 治胸悶下氣。開胃進食。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。或炒用。

禁忌 氣虛胃燥者忌用。

● 小青皮

形色

色褐。形如小輪。中有輻轂狀。

性味

苦香麻溫。

功能

入肝脾。破積疎氣。治脇腹痛。

分量

三分至一錢。

用法

生用。或炒用尤溫。

禁忌

陰虛血燥者忌用。

● 青木香

形色

色黃白。內圓有花紋。

性味

苦辛香溫。

功能 理氣止痛。助消化。散瘀痕。

分量 四分至一錢半。

用法 生用。或原塊磨汁用。

禁忌 陰虛內熱。肝旺血少者。忌用。

● 九香蟲

形色 色紫黑。大如小指。有頭翅。

性味 香鹹溫。

功能 宣胸膈。理氣滯。

分量 八分至一錢半。

用法 風乾用。

禁忌 氣血虛者忌用。

烏辣草

形色 細梗色淡青。形如穀精艸。

性味 微鹹香淡平。

功能 平肝和胃利氣。治噎膈噫氣眩暈。進飲食。利尿。

分量 一錢半至三錢。

用法 生煎。

禁忌 調理之品。重症無効。

厚朴花

形色 花蕊形。色紫黑。

性味 温香微苦。

功能 寶中理氣。治胸悶。化脾胃濕濁。

分量 五分至一錢半。

用法 生用。或炒用。

禁忌 陰虛液燥者忌用。

刺 猬 皮

形色 色黃。刺尖白。

性味 酸辛苦平。

功能 治胃脘痛。腸風痔血。

分量 一錢半至三錢。

用法 炙用。

禁忌 胃燥者忌用。

川鬱金

形色

皮灰色。肉紫黑微黃。光潔結晶。中有圓心。

性味

苦辛。

功能

開胸理氣。解心肝鬱熱。治吐衄。

分量

一錢至三錢。

用法

生用。

禁忌

氣血虛者慎用。

烏藥

形色

色黃白。淨潔細理。中有圓紋。

性味

辛香苦溫。

功能 散脾胃寒溼。理氣止痛。治泄瀉。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或炒用。

禁忌 热滯腹痛泄瀉者忌用。

甘松

形色 色黑紫。如茅根蓬。

性味 辛香溫微苦甘平。

功能 理脾胃。開氣鬱。止腹痛。煎洗脚氣浮腫。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 氣血大虛者忌用。

●白檀香

形色

色黃。多皺紋。

性味

苦香平。

功能

和肝胃。理氣解鬱。止痛。

分量

六分至一錢半。

用法

生用。

禁忌

陰虛內熱者勿用。

●山羊血

形色

色青黑凝塊。入水有絲到底者真。

性味

甘溫微鹹。

功能 養筋骨。活氣血。止腕痛傷痛。治冷勞氣虛。赤白帶下。
分量 八分至一錢半。

用法 炒用。

禁忌 溫症者忌用。

●薤白頭(附葱白頭)

形色 色黃。質軟粘。形如小蒜。

性味 辛臭微甘。

功能 治胸痹痰痛。通陽化痰濁。

分量 二錢至五錢。

用法 生用。或酒炒用。

禁忌 肺熱燥咳者忌用。

附註

葱白頭。色白。形小於大蒜頭。性味辛溫。有散寒發汗解肌之効。分量二個至五個。內熱煩渴忌用。

◎ 枸李子

形色 色青肉黃。內有仁。外皮粘。

性味 辛香微苦溫。

功能 開鬱散寒。消痞滿。化痰。

分量 一錢至三錢。

用法 生用後煎。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

◎ 桂皮

分類飲片新參 枸李子 桂皮

形色 皮色青灰。肉紫黑。質堅。
性味 辛香溫微甘。

功能 散寒開胃。理氣止痛。家常作調味品。
分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 內熱者忌用。

桂木

形色 色白淡紅。
性味 微香甘。
功能 解肌和胃。理氣止痛。
分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 濕熱者忌用。

◎ 小茴香

形色 色青黃。小於穀粒。

性味 味香溫。

功能 入厥陰。治寒疝。理氣止痛。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或炒用。

禁忌 血虛內熱者忌用。

◎ 荔枝核

形色 色紫紅。形長圓。

性味 滋溫微苦。

功能 入厥陰經。行散滯氣。治癩疝囊腫。婦人經寒刺痛。
分量 一錢半至三錢。

用法 碎炒用。

禁忌 溼瘀內熱者忌用。

● 薜蘿子

形色 色褐。子小有紋。

性味 辛臭溫。

功能 下氣利膈。消痞止痛。溫腎強陽。

分量 六分至一錢半。

用法 生用。或炒用。
禁忌 溼熱煩渴者忌用。

分類飲片新參

一五〇

消導之品

范志麵

形色 色青黑糕狀。

性味 苦香甘溫。

功能 散風寒。化溼熱。治寒熱鴻利。

分量 三錢至五錢。

用法 生用包煎。

禁忌 內熱煩渴者忌用。

半夏麵

形色 色白。形方。作糕狀。

分類飲片新參 范志麵 半夏麵

性味 苦辛平。

功能 化痰止咳。消食積。治泄瀉。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 內熱煩渴者忌用。

●沉香麵

形色 色青黑糕狀。

性味 苦香溫。

功能 入脾胃理氣。止痛瀉。消脹滿。

分量 八分至一錢半。

用法 生用包煎。

禁忌

陰虛內熱者慎用。

建神麵

形色

灰色。形如渣餅。

性味

苦香甘。

功能

消食滯。止瀉。健脾胃。

分量

二錢至四錢。

用法

生用。或炒用。

禁忌

燥咳者忌用。

六神麵

形色

焦炒外黑。形如酒藥。

分類飲片新參

建神麵

六神麵

性味 苦香燥。

功能 消食止瀉。解熱化濕滯。

分量 三錢至五錢。

用法 炒用。

禁忌 燥咳者忌用。

霞天麪

形色 色黑糕狀。

性味 微苦甘溫。

功能 健胃化痰。消宿飲。癖塊痰核。

分量 一錢半至三錢。

用法 包煎。

禁忌　內熱燥痰者忌用。

●寒食麵

形色　色灰黃。如片糕。

性味　甘香微苦溫。

功能　主治咳嗽。下氣調中。健脾化滯。

分量　三錢至五錢。

用法　生煎。或嚼食。

禁忌　泄瀉者慎用。

●雞內金

形色　皮色淡黃。多皺紋而捲。

分類飲片新參　寒食麵　雞內金

性味 咸平微甘溫。
功能 消食積。運脾開胃。進飲食。止嘔。縮小便。
分量 一錢半至三錢。
用法 生用。或炙用。
禁忌 內熱陰虛氣弱者忌用。

麥芽

形色 色淡黃。形似穀芽而胖。
性味 甘平微腥。
功能 温中消食。去乳結。治瀉利。
分量 一錢半至五錢。
用法 生用。或炒用。

禁忌

胃弱陰虛內熱。及乳婦忌用。

◎ 喬麥

形色

壳色紫褐肉白。作三角形。

性味

甘平微溫。

功能

養胃生津。化腸胃食滯。治白濁帶下。

分量

三錢至一兩。

用法

煎湯代水。

禁忌

多食動風發熱。氣虛頭暉者忌用。

◎ 大腹皮

形色

色灰黃。如棕皮。多纖維。

性味 淡平微香溫。
功能 除脹滿脚氣。化濕濁。利小便。止瀉。
分量 一錢半至三錢。
用法 酒洗用。

禁忌 氣虛者忌用。

●山查

形色 色淡紅。橢圓。內有核。
性味 酸甘溫。
功能 散瘀消食。磨積止瀉。健脾胃。
分量 三錢至五錢。
用法 生用。或炒用。

禁忌 氣虛胃燥者忌用。

◎ 炒山楂核

形色 色焦黃。作三角形。

性味 淡平微香。

功能 消食開胃。治偏疝腫大。

分量 三錢至五錢。

用法 炒研用。

禁忌 中虛氣弱者忌用。

◎ 花楂榔

形色 形圓。有紫花紋交織。

性味 苦溫麻。

功能 入三焦。破堅積。消痰水。殺蟲。醒酒。

公量 一錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 氣血虛者忌用。

●棗梔榔

形色 色紫質堅。如棗形。

性味 甘香微苦澀。

功能 消食醒酒。寬胸腹。止嘔惡。

分量 一錢半至三錢。

用法 炙用。或作藥食。

禁忌 中虛氣弱者忌用。

● 阿魏

形色 色黃赤。質軟。樹脂結塊。

性味 臭羶溫。

功能 消肉積。解毒去瘀。治癰塊。殺尸疰蟲。止痛。

分量 酌用。

用法 多製膏藥外用。

禁忌 中虛便溏。及濕熱者。忌用。

● 地枯體

形色 外黃內白。中虛如棉。

性味 微鹹甘平。

功能 消食止熱瀉。疎腸滯。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。

禁忌 脾胃虛寒泄瀉者忌用。

●薑菔英

形色 葉色灰黃。

性味 鹹平微香。

功能 生津利氣。化濕。和腸府。治瀉利。開胃。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或煎湯代水。

禁忌

氣虛血弱者忌用。

●五穀蟲

形色

色黃。形扁長。

性味

鹹寒。

功能

治小兒疳積。肝胃熱滯氣痛。並可通乳。

分量

六分至一錢半。

用法

炒用。

禁忌

中寒者忌用。

分類飲片新參

一六四

止 滯 之 品

● 訶子肉

形色 色黑形如小胡桃。內黃。

性味 滯麻苦溫微酸。

功能 滯肺腸。治瀉利。久咳脫肛。失音。

分量 一錢至二錢。

用法 生用斂肺。炙用固腸。

禁忌 風寒咳嗽。及痢疾下重者。忌用。

● 白芨

形色 片色黃白光潔。

性味 苦膩微甘。

功能 填補肺陰。治虛損久咳吐血。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或研末沖服。

禁忌 外感咳嗽。及內有瘀熱者。忌用。

● 煙膠

形色 色黑如烟煤塊。

性味 滯臭。

功能 外用治溼瘡癬疥。

分量 配用。

用法 合青黛。黃柏。熟石膏等研末。麻油調敷。

禁忌

內服不宜。瘡症無水者勿用。

柿蒂

形色

色紫黑。形如其名。

性味

微苦溫。

功能

溫胃止呃逆。

分量

一錢至三錢。

用法

生用。

禁忌

熱呃者勿用。

天竺子

形色

色紫紅。

性味 苦澀微甘。

功能 敗肺治久咳自汗。

分量 八分至一錢半。

用法 生研用。

禁忌 外感咳嗽者忌用。

●五倍子(附百藥煎)

形色 色灰白。質脆。形如菱壳。

性味 澄苦微酸。

功能 敗肺澀精。止咳嗽。腸虛泄利。痔血。陰虛水腫。殺虫。

效漬瘡。

分量 四分至一錢半。

用法 生用。或研末冲服。

禁忌 外感咳嗽者忌用。

附註 研末法釀。為百藥煎。形如灰色泥塊。味香甘酸澀。主治略同。能消酒毒。

● 没石子

形色 色青黃。形圓多角。

性味 滯溫微苦。

功能 治日久血痢。產後下痢。外用研末撲陰汗。塞牙痛。染鬚。

◦

分量 八分至一錢半。

用法 碎用。

禁忌 初痢腹脹痛者忌用。

● 伏龍肝（卽竈心黃土）

形色 色黃泥塊。

性味 香溫。

功能 捕脾胃。治崩淋吐衄。久痢遠血。外用消癰腫。

分量 五錢至一兩五錢。

用法 煎湯濾清。代水煎藥。外用研末。和蒜泥敷。

禁忌 內熱中滿者忌服。

● 明礬（附枯礬）

形色 色白結晶。

性味

酸鹹滻涼。

功能

殺蟲燥濕。澄濁化痰。治驚癇喉痺。崩帶。陰蝕陰挺。

分量

三分至八分。

用法

研末沖服。或外用。

禁忌

風寒表症者忌用。

附註

枯蓼即經煅過者。色白如粉。外用燥溼生肌。不宜內服。

禹餘糧

形色

色黃結石。

性味

辛香甘平。

功能

固潛大腸。治久瀉滑利。血閉崩淋。止心亂恍惚。

分量

一錢半至三錢。

用法 研末沖服。

禁忌 濕滯泄瀉者忌用。

●蓮鬚

形色 色黃細條。

性味 滯苦微甘香。

功能 固肝腎精氣。治遺泄。安神止汗。

分量 六分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 濕熱而遺精者忌用。

●百草霜

形色

色黑粉末。即釜底烟煤。

性味

焦潘温。

功能

止血潘精。治赤白久痢。

分量

三分至八分。

用法

冲服。或外敷。

禁忌

疗热者忌用。

● 血見愁

形色

葉色淡綠。有細絨毛。

性味

苦香平微温。

功能

止吐衄血淋。消癰腫。外用療傷。止血。

分量

八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 瘰熱內盛者忌用。

● 藕節

形色 色淡黃。多孔竅。

性味 苦澀微甘涼。

功能 止吐衄去瘡。清肺胃熱。治歷節痛。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或炒炭。

禁忌 風寒外束者忌用。

● 蒲黃炭

形色 色黑細末。

性味 苦澀微香。

功能 止血。治吐衄崩漏。

分量 一錢半至三錢。

用法 包煎。

禁忌 外感。及中虛吐衄者勿用。

● 血餘炭

形色 色黑有光。如煤屑。

性味 苦澀。

功能 治吐衄崩漏。

分量 三分至六分。

用法 研末冲。

禁忌 热病者忌用。

●象皮

形色 皮色黑。有點紋。內黃白。有纖維質。

性味 酸鹹涼。

功能 燒灰敷下疳。又斂金瘡。

分量 酌用。

用法 火灰研末。

禁忌 罕有內服。

●象牙屑

形色 色白粉屑。

性味 淡平微甘。

功能 退管生肌。治魚骨哽。

分量 三錢至五錢。

用法 焙用包煎。

禁忌 癰疽未成管者勿用。

● 麻黃根

形色 皮色微紅。心白。

性味 淡平微澀。

功能 功專止汗。

分量 五分至一錢。

用法 生用。
禁忌 實症自汗者忌用。

● 甜茶（即蜀漆）

形色 色黑黃。如茶而大。
性味 滷微甘。
功能 功專截止久癰。
分量 一錢至三錢。
用法 炒用。
禁忌 瘡疾初起者忌用。

● 刀豆壳

形色 色黃莢壳。如樹皮。

性味 苦澀平。

功能 平胃膈氣。止呃逆。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或炒用。

禁忌 胃寒呃逆者少用。

附註 刀豆子皮紅肉白。味帶微甘。功用無異。忌亦相同。宜割

炒用。三錢至五錢。

○ 茄實

形色 皮色淡紅。肉白。

性味 香甘澗。

功能 捕肺腎。化濕治泄瀉。固精止帶。

分量 三錢至一兩。

用法 生用。或炒用。

禁忌 濕熱內盛。腹脹滿者。忌用。

●石榴皮

形色 色黃外紫。

性味 苦酸澀微甘。

功能 敛肺。固腎。瀆腸。治久咳久痢。

分量 一錢至二錢。

用法 炒用。

禁忌 外感咳嗽。及初起下痢者。忌用。

● 罂粟壳

形色 色黃。肉有隔片細子。

性味 苦香。

功能 滋腸肺。止久瀉。虛咳。欬汗。

分量 一錢半至三錢。

用法 炒用。

禁忌 外感咳嗽者忌用。

● 功勞子

形色 皮色紫黑。形圓。大於天竺子。核分四粒。
性味 苦澀氣臭微溫。

功能 固澑下焦。治久崩帶。淋濁泄瀉。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌 濕熱崩帶者忌用。

●石蓮子

形色 皮黑肉黃白。即結老蓮子。

性味 苦澗溫微甘。

功能 止虛病。固精氣。開胃進食。

分量 一錢至三錢。

用法 炒研用。

禁忌 濕熱初痢者忌用。

金櫻子

形色 色紅長圓。如指大。外有刺。內裏子。

性味 甘平微澀。

功能 養肝腎陰。固精氣。止滑遺。縮小便。

分量 三錢至五錢。

用法 炒研煎。或製膏。

禁忌 濕熱遺泄者忌用。

乾蓮房

形色 色外青內紫。中多孔房。

性味 香平微苦澀。

功能　止血崩久帶。胎漏漏血。理氣。治血脹腹痛。

分量　一錢半至三錢。

用法　生用。或炙研用。

禁忌　體實血瘀者忌用。

◎臭椿皮

形色　皮色灰黑。內黃。

性味　苦澀。

功能　治久痢崩帶。

分量　一錢至三錢。

用法　生用。或炒用。

禁忌　初病者忌用。

赤石脂

形色

如紅泥塊。

性味

辛香甘平。

功能

固滯大腸。治久瀉。生肌催產。止崩帶滑泄。

分量

三錢至一兩。

用法

研末水飛分沖。

禁忌

濕滯瀉利初起者忌用。

白石脂

形色

如白石塊。

性味

香甘平。

分類飲片新參 赤石脂 白石脂

功能 入氣分。亦治久瀉崩帶。

分量 三錢至一兩。

用法 研末水飛分冲。

禁忌 獄利初起者忌用。

◎黃蠟

形色 色黃。易於溶結。白者謂之白蠟。

性味 淡平。

功能 治久利崩帶。緩中補虛。解毒化濕熱。固腸脂。

分量 酌用。

用法 湯藥罕用。多入丸劑。

禁忌 冒暑納少者忌用。

●桑螵蛸

形色 色黃如爾而長。中有孔隙。

性味 甘鹹微溫。

功能 补肝腎。益精氣。治滑泄。縮小便。

分量 一錢半至三錢。

用法 炙用。

禁忌 肝腎有熱者忌用。

●海螵蛸（即烏賊骨）

形色 色白潔。質中鬆。

性味 鹹溫滑。

功能 入肝腎。溫血脈。治久帶崩漏血枯。

分量 三錢至五錢。

用法 炙用。

禁忌 療熱者忌用。

◎棕櫚炭

形色 色黑紫。粗於髮絲。

性味 滯平。

功能 治吐衄崩帶。腸風失血不止。

分量 一錢至三錢。

用法 炒炭用。

禁忌 初起血症者忌用。

附註

棕櫚子色灰黑質堅。長圓腰形。大如黃豆。性味功効差同。

○宜打碎入煎。

● 莼菜子

形色

色黑子扁。

性味

腥臊臭。

功能

通補任脈。治夢遺滑泄。止崩帶。

分量

一錢半至三錢。

用法

酒炒研包煎。

禁忌

陰虛肝腎有熱者忌用。

● 六軸子

分類飲片新參

莼菜子

六軸子

形色 色黃。作莖狀。形如芝麻莢。

性味 香溫。微苦腥。

功能 敛肺止汗。化痰。定喘咳。治瀉利遺泄。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 風寒濕熱咳嗽者忌用。

●南竺子

形色 形小圓。色紫褐。

性味 酸澀微甘。

功能 強精氣。益腎陰。烏鬚髮。治久泄夢遺。赤白帶下。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。
禁忌 風寒外感者忌用。

◎紫梢花

形色 色灰白。綿軟。多細子。係吊蛇產子裹結樹叉而成。

性味 甘溫。

功能 治遺精餘濕。小溲不禁。陰冷久帶。
分量 一錢半至三錢。

用法 生用包煎。或入丸劑。或作溫中坐藥。

禁忌 陰虛內熱者忌之。亦罕內服。

◎橄欖核

形色 色灰黑。

性味 燥平。

功能 治魚骨哽喉。及耳膿流水。

分量 一錢半至三錢。

用法 打碎煎服。或炙研末外搽。

禁忌 禁用。

宣通之品



麝香

形色 色紫黑。

性味 香苦温。

功能 開心竅。通神明。行血氣。止痛。

分量 五釐至二分。

用法 研末冲服。或入丸散。

禁忌 內熱。及孕婦忌用。

◎ 鬼箭羽(卽衛矛)

形色 片色紫灰。質脆。

分類 欽片新參 麝香 鬼箭羽

性味 苦澀微香溫。
功能 散風痺疼痛。安神退邪祟。
分量 一錢半至三錢。
用法 生用。或酒炒用。
禁忌 寒甚痺痛者。忌用。

● 淡吳萸

形色 色黑小粒。有蒂。
性味 苦溫辛激。
功能 温肝散寒。止嘔吐。腹痛。寒厥。冷疝。
分量 五分至一錢半。
用法 止痛生用。止嘔黃連水炒。治疝鹽水炒。

禁忌

痛嘔屬熱者。忌用。

◎葫蘆巴

形色

色紅。如鳳仙花子。

性味

辛香溫微苦。

功能

溫腎陽。緩脾胃。治寒疝脚氣。

分量

六分至一錢半。

用法

生用。或蒸炒。

禁忌

相火旺。及濕熱者忌用。

◎肉果

形色

色黃白。中有細花紋。

分類飲片新參

葫蘆巴

肉果

性味 辛香苦溫。

功能 溫中散寒止痛。治寒瀉。

分量 八分至一錢。

用法 煙用。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

附註 肉果花。色黃赤。狀如小佛手。味辛香溫潤。功用差同。
力緩於肉果。

草荳蔻

形色 色淡灰。形如荔枝。由多子結成。

性味 辛香烈苦溫。

功能 散寒溼。暖脾胃。止嘔。治寒癰痞滿。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 除虛內熱者。忌用。

草菜仁

形色 子色灰褐。作三角形。

性味 辣香溫激。

功能 祛寒燥濕。開鬱化痰食。治療瘧寒熱。脘悶嘔噦。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或炒用。

禁忌 濕熱傷暑。口乾溲赤者。忌用。

皂角刺

形色 皮色紫內黃。尖如刀針。

性味 燥平。

功能 消腫痛。潰癰。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 氣虛。及癰膜已潰者。忌用。

●蛇床子

形色 色青黃。壳有紋。形扁小如芝麻。

性味 嚴苦辣熱。

功能 散任脈寒瘻。治陰腫。強陽。

分量 五分至一錢半。

用法

生用包煎。

禁忌

陰虛內熱。及陽亢者忌用。

良姜

形色

色微紅。紋細結。

性味

香辣熱烈。有玉樹神油氣。

功能

溫散腸胃寒溫。治霍亂冷癆。理氣止痛。

分量

四分至一錢。

用法

取汁沖。或煎服。

禁忌

肺胃有熱。及陰虛者忌用。

山奈

形色 色黃白。形如乾姜。
性味 香辣溫。
功能 温中辟惡。治冷痛寒霍亂蟲牙。
分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 內熱煩渴者忌用。

●神黃豆

形色 色灰黃。形扁圓如象棋子。搖之有聲。仁大如豆。
性味 苦甘溫。有香油氣。
功能 貫通氣血。解托痘毒。爲稀痘神藥。
分量 二粒至五粒。

用法 去壳用仁。研末冲服。

禁忌 斑疹及時痘者慎用。

附註 壳苦澀。於回曆時用之。可解餘毒。

大茴香

形色 色紫黃。稜角作花朵狀。內有仁。

性味 辛香甘熱。

功能 溫腎陽。開胃止嘔。散小腸寒疝。

分量 八分至一錢半。

用法 炒用。

禁忌 肝腎陰虛內熱者忌用。

花椒葉

分類飲片新參

大茴香 花椒葉

二〇一

形色 葉色青紫。

性味 苦香溫。

功能 温中祛寒。治四肢痺痛。肺虛喘咳。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 內熱煩渴者忌用。

◎ 花椒目

形色 色黑。形如小丸。

性味 焦香溫。

功能 溫胃散寒。治嘔。

分量 八分至一錢。

用法

炒用。

禁忌

胃熱者忌用。

灸山甲

形色

色外黃裏白。背有紋。

性味

香竄腥。

功能

潰癰。消腫。化痰。通絡。泄風。破癰痕。

分量

一錢至三錢。

用法

灸用。

禁忌

癰疽已潰。及氣血衰少者忌用。

附註

生者色黑堅硬。上有直紋。味辛竄溫。少腥味。

生附子（即鹹附子）

形色 外色灰白內黑。整個形如煨芋。

性味 热辣麻烈。(鹽水製。故有鹹味。)

功能 溫腎回元陽。治虛脫厥冷自汗。完穀下利。

分量 一錢半至三錢。

用法 煎服。或擦敷足心。

禁忌 內熱脈沉數者忌用。

●熟黑附塊

形色 色黑。塊狀。內灰白。

性味 淡麻溫。

功能 溫脾腎。散寒濕。回元陽。止冷汗虛瀉。

分量 八分至三錢。

用法 煎服。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

● 淡附片

形色 色白片薄。

性味 热麻微辣。

功能 溫腎散寒。消水止瀉。

分量 五分至一錢半。

用法 泡淡用。

禁忌 陰虛內熱者大忌。

● 白附子

形色 片色黃白光潔。

性味 香淡微苦溫麻。

功能 散陽明經風濕。治癬瘡陰癰。洗齧黑。

分量 六分至一錢半。

用法 生用。或入面脂。

禁忌 血虛氣弱者忌用。

(川椒(即花椒))

形色 外色紫紅。子黑形小圓。

性味 香辣麻溫。

功能 溫肝腎。逐寒溼水飲。殺蟲。止嘔吐寒喘。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。椒紅散寒止痛。椒目定喘逐水。
禁忌 陰虛內熱者忌用。

◎胡椒子

形色 色灰白。形圓。
性味 辣香熱烈。
功能 散寒濕。溫中。止痛瀉。殺蟲。
分量 四分至八分。
用法 生用。
禁忌 陰虛內熱吐衄者大忌。

◎生姜衣

分類飲片新參 胡椒子 生姜衣

形色
色灰黃。

性味
香辣。

功能
散皮膚水腫。發汗祛寒。

分量
六分至一錢。

用法
生用。

禁忌
內熱汗多。及虛腫者忌用。

●畢澄茄

形色
色紫黑。形圓。外皮裏子。

性味
苦辛香。

功能
溫胃散寒。治脘腹脹痛。

分量
八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

● 石菖蒲

形色 片色白微紅。

性味 苦辣香溫。

功能 散寒濕。化痰開竅。通神明。

分量 五分至一錢。

用法 生用。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

附註 九節菖蒲。根段小結。色黃紫內白。味香潤微酸。主治心

陰不足者之昏譫。不似石菖蒲之辛燥開泄。

草藤子

形色 色紫。形長圓。有灰色花紋。

性味 辛溫。麻瀧。

功能 滌風通絡。拔毒邪。敷療瘻癰腫。縮產後子腸。

分量 二分至六分。

用法 炒研用。但以生搗外敷者為多。

禁忌 陰虛內熱便溏。及外瘡潰久者忌用。

胡荽子

形色 色淡黃。形小圓。中有隔房。

性味 辛香溫。

功能

開胃利氣。消水穀。托痘。開心竅。

分量

六分至一錢半。

用法

生用。

禁忌

陰虛。內熱及目疾者忌用。

●公丁香

形色

色紫灰。花圓小萼。有四角作丁字形。

性味

辣香溫麻。有異味。

功能

溫胃散寒。止呃逆嘔吐。治腕痛。

分量

六分至一錢。

用法

生用。

禁忌

陰虛內熱者忌用。

●母丁香

形色 色紫灰。大如橄欖核。一端有四角。

性味 香辣溫。

功能 治肝胃虛寒。呃逆嘔噦。小兒痘疹虛陷。

分量 四分至一錢。

用法 生用。

禁忌 热呃陰虛者忌用。

●華芨

形色 色黃黑。長條。有粒刺。中裹紅子。

性味 辛溫辣激。

功能

溫中下氣。治寒瀉腹痛。

分量

六分至一錢。

用法

生用。

禁忌

陰虛肝熱者忌用。

草烏

形色

根皮灰紫。內微白。多澀粉質。

性味

苦溫辣麻激。

功能

除寒濕。風毒痺痛。開頑疾。可作麻藥。

分量

六分至一錢。

用法

生用。或泡用。

禁忌

有大毒。陰虛內熱者尤忌。

川烏

形色 色灰白。如熟筭肉。

性味 苦辛溫微麻。

功能 治風毒頑痺。通經絡發汗。

分量 八分至一錢半。

用法 泡用。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

天龍（卽壁虎）

形色 色灰黑。四足。尾長。頭扁。

性味 鹹寒。

功能

宣通經絡。治大風驚癇。血病瘡瘍。外敷移痘。

分量

三分至五分。

用法

取尾炙用。多入丸劑。或外用。

禁忌

有毒。湯劑罕用。

● 蟠蛇

形色

頭赤背黑足黃。形長。多脊椎。

性味

辛溫。

功能

通督脈。治風痰驚癇。瘧厥。

分量

入丸劑。

用法

炙用。去頭足。

禁忌

有毒。宜慎用。陰虛內熱者尤忌。

●花蜘蛛

形色 色黑。多足腹大。

性味 微寒。

功能 主治陰狐癩疝。

分量 一個至三個。

用法 炙研末酒沖。

禁忌 有毒。不可輕試。

●白茄根

形色 色淡黃。細理。亦有中空軟者。

性味 香溫微苦。嘗皮舌尖如針刺。

功能 治大麻風。癩癧。及發背癰毒。

分量 一錢至二錢。

用法 生用。或浸酒服。或外搽瘡毒。

禁忌 有毒。體虛者忌用。

附註 白茄果。色灰黃。形如小茄。有蒂。性味功効差同。

●狼毒

形色 色灰。根粗理。

性味 麻苦平。

功能 破積聚水氣。治惡瘡鼠瘻。

分量 八分至一錢半。

用法 酒炒煎用。或生研外敷瘡毒。

禁忌　有毒。虛體者大忌。

● 急性子（卽鳳仙花子）

形色　色灰紫。形小圓。

性味　微苦香溫。

功能　治產難。噎膈。骨哽。消痞積。

分量　一錢至三錢。

用法　炒研包煎。或煎膏藥外用。

禁忌　有毒。體虛者忌用。

● 天仙子（卽莨菪子）

形色　色黃白。多角形。小於葵花子。內有紫紅。

性味

腥平。

功能

治癩狂風癇拘攣。蛀牙痛。

分量

五分至一錢。

用法

炒研用。或外搽牙痛。

禁忌

氣虛胃弱者忌用。

●番木鱉

形色

外殼紫晦。如小鱉。內仁皮色綠肉黃。

性味

苦臊寒。

功能

解熱毒喉痺痛。研末和麝香冰片輕粉吹耳。治斑痘毒攻目。

分量

三分至八分。

用法 生煎用。或磨汁冲服。

禁忌 性能毒狗。未可輕用。

● 土木鱉子

形色 色灰白。外層細皮。括之有絨屑。內仁青綠形扁。大如圓

枳子。

性味 苦溫辛麻激。

功能 去瘀。治瘡塊。解安眠藥毒。強心。療傷。消癰腫。生肌
除斂。

分量 不入煎劑。即用以三分爲限。

用法 製散用。

禁忌 有毒。內服宜慎。

●八角金盤（即鬼臼）

形色 皮紫內黃。作圓顆相連狀。中陷如臼。

性味 苦烈辛平。

功能 破瘀散結。治頑癥風毒。跌撲損傷。化痰積。

分量 三分至五分。

用法 生用。或研製丸散。

禁忌 有毒。氣血虛弱者忌用。

●鬼球

形色 色紫灰。大如芋艿。中空多子。

性味 香濃溫平。

功能 辟邪通腦。治鬼疰精物。失魂妄見。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 氣弱陰虛者慎用。

● 開羊花（卽羊躡躅）

形色 花色紫灰。

性味 苦麻溫。

功能 治惡毒諸癥。可作麻醉藥。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或研末外敷。

禁忌 有毒。宜慎用。

● 白藥子

形色 色灰白微黃。如柏白。

性味 苦溫微辛。

功能 消腫毒喉痺。散瘀血。治傷痛。

分量 五分至一錢。

用法 生用。或研末沖服。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

● 硝石(即火硝)

形色 色白多棱。結晶。

性味 辛苦鹹熱。

功能 治傷冷霍亂。心腹痛。破堅散結。

分量 五分至一錢。

用法 溶沖服。或入丸劑。

禁忌 陰虛內熱者大忌。

●冰片

形色 色灰白光澤。

性味 辛香涼微苦。

功能 通竅。治驚癇痰迷。喉痺腫痛。外用退熱生肌止痛。

分量 五釐至二分。

用法 生研冲。或入丸散。

禁忌 氣弱。及孕婦忌用。

●石綠

形色

石粉結晶。平西色綠。

性味

微酸香平。

功能

作吐劑。治暴中風。痰眩悶。

分量

三錢。

用法

每服合冰片一分研勻。薄荷汁調服。取唾涎。

禁忌

有小毒。不可以治溼痰。

附註

今之藥肆。多以石綠爲銅綠。

形色

色青瑩結晶。

●膽礬(卽綠礬。又名皂礬。煅赤者爲絳礬)

性味 酸澀。

功能 滌吐風痰。殺蟲。消腫滿。燥溼。蝕惡肉。

分量 五分至一錢。

用法 皂礬研末調服滌吐。絳礬和蒼朮治黃腫。

禁忌 風寒胃弱者忌用。

●藜蘆

形色 根色灰黃。作管狀。

性味 辛平微苦。

功能 吐風癇痰閉。治蠱毒。喉痺。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌

中虛津燥者忌用。

●針砂

形色

色黑。鐵質粉末。

性味

辛平。

功能

消脾胃堅痞。脹滿黃腫。

分量

三錢至五錢。

用法

醋煖包煎。

禁忌

外感。及胃弱者忌用。

●枳實

形色

皮色黑。內黃。

分類飲片新參

針砂

枳實

性味 苦溫香麻。有橘皮氣。

功能 下氣導滯。破堅積。

分量 八分至二錢。

用法 生用。或炒用。

禁忌 虛脹者忌用。

○川厚朴

形色 黃理細紋。

性味 苦溫香燥。


功能 寬中下氣。燥濕化滯。消脹滿。

分量 五分至一錢半。

用法 生用。

禁忌 脾胃液燥。及氣虛者忌用。

殺蟲之品



形色 色紫赤。葉梗如粗茶葉。
性味 苦腥平。

功能 敷洗瘡毒腫痛。脫肛蟲咬。
分量 酗用。

用法 和水搗敷。或煎洗。
禁忌 內服不宜。令人脚弱。



形色 色灰褐。中有黃花紋。

性味 苦香涼。

功能 消毒。排膿殺蟲。治癰疽瘡瘍痔漏。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或酒炒。或外洗。

禁忌 中寒氣虛者忌用。

●功勞木

形色 色黃白。片形長圓。木質粗。

性味 苦香平。

功能 清肺。止勞咳。殺蟲。通大便。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。

禁忌

風寒咳嗽者忌用。

百部

形色

色黃白。片小。有細花紋。

性味

苦烈微甘。

功能

殺蟲。治療咳。清溼熱。

分量

八分至一錢半。

用法

蒸用。

禁忌

風寒咳嗽者忌用。

雄黃

形色

色鮮黃。結石。

分類飲片新參

百部 雄黃

性味 辛平微溫。

功能 解毒殺蟲。化痰結癥。定驚癇。

分量 三分至八分。

用法 研末沖服。或外搽。

禁忌 陰虛內熱泄瀉者忌用。

● 雜黃

形色 色淡黃光瑩。

性味 辛平。

功能 殺蟲。治惡瘡禿頭。痴瘻。鼻中瘻肉癩痛。

分量 酒用。

用法 研末外用。

禁忌 有毒。不宜內服。

◎ 獵肝

形色 色黑。兩葉結塊。

性味 甘鹹腥平。

功能 殺蟲。治傳尸癆瘍。小兒鬼疰。辟溫疫。

分量 五分至一錢。

用法 炙研末冲。或酒服。

禁忌 虛寒者忌用。

◎ 八月札（卽預知子）

形色 色灰褐。質堅。子房如蜂窩。

分類 飴片 新參 獵肝 八月札

性味 苦寒。

功能 治勞傷。去瘀殺蟲。消痞塊。

分量 一錢至三錢。子以二十粒至三十粒為限。

用法 生用。或酒炒。磨汁搽蟲蛇咬。

禁忌 中寒泄瀉者忌用。

雷丸

形色 切片。色黃白。有花點。

性味 寒燥平。

功能 消熱積。殺蟲。

分量 一錢半至三錢。

用法 酒拌蒸。故不覺苦。

禁忌

脾胃虛寒者忌用。

●烏梅

形色 色黑。形圓。肉嫩。

性味 酸澀溫。

功能 入肝。斂肺瀆腸。治久痢。止汗生津。殺蛔蟲。

分量 五分至一錢半。

用法 炙用止嘔。生用殺蛔。

禁忌 外感症有汙。及熱滯泄瀉者忌用。

●大楓子

形色 外壳灰褐。質堅。內肉白。

分類 飲片 新參 烏梅 大楓子

性味 辛溫微甘。

功能 殺蟲却痰。治大麻風。痈腫瘡疥。

分量 一錢半至三錢。

用法 去壳用仁。外用為多。

禁忌 體虛液燥者忌用。

●松香

形色 色黃光澤。樹脂結晶。

性味 香甘溫微苦澀。

功能 殺蟲。治瘡疥。消癰疽凍瘻。

分量 酌用。

用法 湯劑罕用。研末或煎膏外搽。

禁忌 疗瘡。及熱痛溼瘡者忌用。

使君子

形色 皮色紫灰。肉青黃。形如榧子肉。

性味 甘溫微腥。

功能 健脾胃。退虛熱。消疳殺蟲。為小兒要藥。

分量 一錢半至三錢。

用法 煙用。

禁忌 忌熱茶同服。犯之作瀉。

輕粉

形色 粉色白光潔。

性味 辛燥寒。

功能 却痰。消積殺蟲。按骨絡結毒。外用治瘡。去腐生肌。

分量 酗用。

用法 不入湯劑。研末製丸。及外科藥。

禁忌 痘不在骨絡者大忌。

● 蕤荑仁

形色 色紫晦。形扁小。

性味 辛辣苦平。

功能 去骨中溼熱。消瘡殺蟲。治腸風痔瘻。惡瘡疥癬。蛀牙痛。
○除瘡疥。

分量 四分至一錢。

用法 炒研內服。或外用。

禁忌 體虛氣弱者慎用。

附註 藥肆中每以壳泥混成。宜多用包煎。

◎ 巨勝子(亞麻。俗名鼈蠱胡麻)

形色 壳色紫灰。小於穀粒。作四方形。子如芝麻。

性味 苦澀微香。

功能 燥溼殺蟲。治大麻風。洗惡瘡。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或炒用。或煎洗。

禁忌 陰虛內熱者忌用。

附註 本草皆以芝麻爲巨勝。故言甘平。此則大異。

◎ 鶴鱉

形色 色灰黃。形如虱。作多足狀。

性味 苦辛躁。

功能 殺蟲。治蛇蠍腹痛。化奇經溫熱。

分量 一錢至一錢半。

用法 陳久炒用。

禁忌 冒熱者忌用。

◎ 檀脂

形色 粉色白。

性味 辛香苦。

功能

開心腦。殺蟲辟穀治療。

分量

三分至五分。

用法

冲服。或煎油外搽。

禁忌

體虛汗多者忌用。

◎ 石灰

形色

色潔白。

性味

溫燥香微苦澁。

功能

溫脾胃。止泄瀉。化寒飲。強骨殺蟲。

分量

五分至一錢。

用法

陳用。宜泡水澄清服。陳燒灰可外用生肌止血。

禁忌

陰虛內熱者慎用。

◎ 砥石

形色

生者。名砥黃。色黃赤。燥者。名砥霜。色白。

性味

苦酸熱烈。

功能

殺蟲。消寒溼蠱。積癆。治哮喘。刲瘻截瘻。牙疳惡瘻。

分量

內服一釐至五釐。外用酌配。

用法

多入丸丹。及外用。

禁忌

有大毒。不宜輕試。

◎ 倭硫黃

形色

色潤黃艷。

性味

酸淡大熱。

功能 温命門。治脚冷疼痛。納氣。疎大腸。治陰結便閉。外用

殺蟲療瘡。

分量 酥用。

用法 不入湯劑。研末製丸。或外用。

禁忌 陰虛內熱者大忌。

附註 土硫黃色淡黃鮮燥。宜於外用。殺蟲搽瘡。不宜內服。

分類飲片新參

二四四

附錄

◎仙人對坐草

形色 梗葉青綠。長約二三寸。有黃細子。葉形如竹葉。

性味 苦香涼。

功能 化溼熱。治黃疸臌症。搗汁治毒蛇咬傷。渣敷瘡口立愈。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 虛寒泄瀉者忌用。

◎萬年青

形色 色青綠。葉長闊。

分類 飲片 新參 仙人對坐草 萬年青

性味 苦澀涼微香。

功能 止吐衄。治喉痺結閉。腫痛。洗痔瘡。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。或搗汁用。

禁忌 中寒及瘀血者忌用。

附註 子色黃。心白。大如小指。作番米狀。可以催生絕孕。有毒勿輕用。

● 土牛膝

形色 皮色灰。內白。梗堅韌。

性味 苦酸涼微甘。

功能 達下消瘀熱。通淋閉。治產癆。

分量

一錢半至三錢。

用法

生用。

禁忌

氣虛胃弱者忌用。

◎土人參（俗名粉沙參）

形色

根質堅白。形類人參。

性味

苦澀微甘。

功能

治肺熱咳喘。痰湧。通淋濁。解梅毒。

分量

三錢至五錢。

用法

酒蒸用。

禁忌

虛症及孕婦忌用。

◎水碱（即銅壺中煮水日久結成）

分類飲片新參

土人參 水碱

二四七

形色 色灰白結塊。

性味 酸平涼。

功能 利小便。軟堅化癥。外用治湯火泡傷。

分量 一錢半至三錢。

用法 研末外敷。麻油調搽。內服生研包煎。

禁忌 風寒外感者忌用。

●地橘子(又名老不大)

形色 梗細色紫。葉青綠。長不及尺。

性味 清香涼微苦澀。

功能 清頭目。散風熱。化溼瘀。治癆通絡。

分量 一錢半至三錢。

用法

生用。或酒炒。

禁忌

外感寒溼者勿用。

◎仙鶴鱗蛋草

形色

色皮灰肉白。形小於麥冬。作串狀。

性味

甘涼微腥。

功能

治肺勞。潤燥止咳。通大便。

分量

三錢至五錢。

用法

生用。或炒用。

禁忌

痰飲咳嗽者忌用。

◎兩頭龍

形色 皮色灰紫。內黃。有纖維。梗粗。

性味 苦。瀯寒。

功能 滌。療熱。化。溼。殺蟲。消。蠱。脹。通。大便。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。

禁忌 虛寒胃弱者忌用。

地龍

形色 皮色紫。內淡黃。木質。粗梗。

性味 苦。香。膩。

功能 治。傷。痛。續。筋。骨。散。瘀。通。絡。

分量 一錢半至三錢。

用法 生用。或酒炒。
禁忌 虛弱者慎用。

●黃零

形色 根節多齒。亦有白形。皮色黃赤。內淡黃。

性味 苦溫微澀。

功能 去瘀殺蟲。消脹滿。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或酒炒。

禁忌 陰虛胃弱者忌用。

●飛蛇 色青灰。四足長尾。兩翼如樹葉。形類蝙蝠。貼胸可以催產。內服治白虎歷節風痛。

●金錢白花蛇 色花白。身長細。盤如錢大。治麻風癰瘍疥癩。

●烏梢蛇 色灰黑。長一尺至二尺。透骨搜風。治風痺癰瘍。日

久瘡瘍。

●海龍 色白。長一寸至尺餘。助陽催產。

●海螵 色灰黑。形彎曲。小及寸許。効同海龍。

●將軍盔 色灰黑。沉香樹脂結晶。降氣定痛。力勝沉香。研末一分至三分冲服。

●猴血 色紫紅結塊。附有青草。味鹹平。治血症。肝胃氣痛。調經。用量二分至八分。研末冲服。

中華民國二十四年十月付印
中華民國二十五年一月發行

(全二冊 ▲ 定價國幣二圓)

飲片新參

主撰者 新安王一仁

參訂者 潘源江 聲達芬

襄校者 勾章徐鴻經

印刷者 漢文正楷印刷所

發行者 千頃堂書局

發行人 謝祖芳

◀印翻不許●有所權版▶

處 售 經

廣州永漢北路
長沙南陽街

漢口交通路

廣州永漢北路
會文堂書局

漢口四宮殿
鴻文書局

南京太平街
林記書莊

嘉義市西門街

蘭記書局

總發行所 上海漢口路二九六號

千頃堂書局

本草經新註

全西裝一冊·定價國幣一圓五角▼

本草經一書。所述性味功能。最能駁括。雖有三家註印行。然無名詞術語。未易瞭解。而於西醫之研究中藥者。尤感不便。本書為杭州中國醫藥學社兩年來討論會之積稿。集中西醫於一堂。為上下千古藥理之研究。由阮其煜王一仁董志仁三先生撰著。經各社友之參訂而成。以科學名詞。解釋中醫經驗。關於性味功能用量禁忌。詳盡靡遺。兩美合二難并。中西醫士人手一篇。獲益無窮。

41
10/012