



幼幼新書卷第一 求端探本 凡一門

後學古吳陳履端

鳴山華承美以藪校

求子論第一

素問岐伯曰女子二七而天癸至任脉通太衝脉盛

月事以時下故有子

癸壬癸北方水任脉衝脉皆奇經脉也腎氣全盛衝任流通經

血漸盈應時而下天真之氣降與從事故云天癸然衝為血海任主胞胎二者相資故能有子所以謂之

月事者平和之氣常以三旬而一見愆期則有病

丈夫二八腎氣盛天癸至

精氣溢寫陰陽和故能有子

男女陰陽之質不同天癸精血之形亦異陰靜

海滿而去血陽動應合而
泄精二者通和故有子

千金曰欲求子者當知夫婦本命五行相生與德合
并本命不在子休廢死墓中者求子必得不然縱得
之終累人

凡人無子夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所其治法
男服七子散女服紫石門冬丸及坐道藥盪胞湯無
不有子

古者求子多用慶雲散承澤丸

陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所

會則多生女姪娘二月名始胎血脈不流象形未定
見物而化是以男女未分不滿三月可服藥方術轉

之令生男也

方術見
本門

御女者當避丙丁日及亥望晦朔大風大雨大霧大
寒大暑雷電霹靂天地晦冥日月薄蝕虹蜺地動犯
之男損神女得病子必顛狂頑愚瘖聾瞶孿跛盲
眇多病短壽不孝不仁至于日月星辰火光之下神
廟佛寺之中井竈園廁之側塚墓尸柩之傍皆悉不
可夫交合如法有福德大智善人降托胎中仍令性

行調順所作和合家道日隆禎祥競集又須待婦人
月經絕後一三五日擇旺相日及月宿在貴宿以生
氣時夜半後施瀉子皆男且壽而賢明高爵也六日
後不可不然反是

旺相日

春甲乙

夏丙丁

秋庚辛

冬壬癸

月宿日

正月一日

六日

九日

十日

十一日

十二月

十四日

廿一日

廿四日

廿九日

十六日

二月四日

七日

八日

九日

十日

十二日

十四日

十九日

廿二日

廿七日

十三日

三月一日

二日

五日

六日

七日

八日

十日

十七日

廿五日

廿五日

十四日

四月三日

四日

五日

六日

八日

十日

十五日

十八日

廿二日 廿八日

五月一日 二日 三日 四日

五日 六日 十二日 十五日

廿日 廿五日 廿八日 廿九日

三十日

六月一日 三日 十日 十三日

十八日 廿三日 廿六日 廿七日

廿八日 廿九日

七月一日 八日 十一日 十六日

廿一日 廿四日 廿五日 廿六日

廿八日 廿九日

八月五日 八日 十日 十三日

十八日 廿一日 廿二日 廿三日

廿四日 廿五日 廿六日

九月三日 六日 十一日 十六日

十九日 廿日 廿一日 廿二日

廿四日

十月一日 四日 九日 十日

十四日	十七日	十八日	十九日
廿二日	廿三日	廿九日	
十一月一日	六日	十一日	十四日
十五日	十六日	十七日	十九日
廿六日	廿九日	廿六日	
十二月四日	九日	十二日	十三日
十四日	十五日	十七日	廿四日
春甲寅乙卯		夏丙午丁巳	
秋庚申辛酉		冬壬子癸亥	

此与上月宿日相合尤益

黃帝雜禁人有怒血氣未定因以交合令人癩疽又不可忍小便交合使人淋莖中痛面失血色遠行疲乏入房為五勞虛損少子且婦人月事未絕交合令人成病得白駁

聖惠云人無子者其事有三一墳墓不嗣二夫婦年命相刺三夫病婦疹若墳墓年命非藥能益婦人無子由勞血血氣生病或月經澀閉或崩血帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子診右尺脈浮為

陰陽脉絕無子微澀中年得此為絕產少陰脈如浮
緊則絕產惡寒脉尺寸俱弱絕產
婦人將攝失宜飲食不節乘風取冷或勞傷過度致
風冷之氣乘其經血結于子宮故無子
肘後婦人崩中漏下青黃赤白致無子方

禹餘糧

赤石脂

牡蠣

桂心

烏賊魚骨

竈下黄土

等分為末粥飲服方寸七日三

乾薑經墨等分為末丸酒下日三

鹿茸當歸蒲黃等分擣篩酒服一錢七稍加至方寸

七

燒露蜂房三指撮酒服之

常灸猪腎脂食或麵裹煮吞佳

千金七子散治丈夫風虛目暗精氣衰少無子

五味子

牡荊子

兔絲子

車前子

新葶子

附子

蛇床子

石斛

署預

乾地黄

杜仲

鹿茸

遠志

各八

芎藭

六

山茱萸

天雄

人參

茯苓

黃耆

牛膝

桂心十銖

巴戟天十二銖

菴蓉十一銖

鍾乳粉八銖

治末飾酒服方寸七日二不知增至二七知為度
禁如藥法不能酒蜜丸一方加覆盆子八銖
朴硝盪胞湯治婦人全不產及斷緒久不差

朴硝

牡丹

當歸

大黃

桃仁生用各三銖

細辛

厚朴

桔梗

赤芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮各二銖

蜜虫

水蛭十枚

附子六銖

以咀清酒水各五升煮取三升分四服日三夜一

相去三時如常覆被取汗冬日火籠之必下積血

及冷赤濃如赤小豆汁本子宮有此惡物或天陰

臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下

盡氣弱不堪再服二三服即止如大悶不堪可食

酢飭冷漿一口即止恐惡物不盡不大得藥力忍

服盡更好一日後仍著道藥千金翼不用甘草桔梗

著坐道藥方

皂莢

山茱萸

千金翼作苦瓠

當歸

各一兩

五味子

細辛

乾薑

各二兩

礬石

戎鹽

蜀椒

大黃

各半兩

末之絹囊盛大如指內婦人陰中坐卧任意行勿急小便時去之更新者必下青黃汁止即御有子未見出只安十日為服朴硝湯恕去未盡用之值天陰冷不疼不必用一日外服紫石門冬丸

紫石英

天門冬

各三兩

當歸

芎藭

紫葳

卷柏

桂心

烏頭

乾地黄

牡蒙

一作牡荊

禹餘糧

石斛

辛夷

各一兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各三兩

柏子仁

署預

烏賊骨

甘草

各一兩半

為末蜜丸如桐子酒服十九日三漸增至三十九腹中熱為度不禁房室不盡劑即有孕夫不在勿服

白薇丸主婦人有子

白薇

細辛

防風

人參

秦椒 白欵一云白止 沙参 桂心

牛膝 秦朮 蕪荑 芍藥

五味子 白彊蚕 牡丹 蟾曹各一兩

乾漆 柏子仁 乾薑 卷柏

附子 芎藭各三銖 紫石英 桃仁各一兩半

鍾乳 乾地黄 白石英各二兩 鼠婦兩半

麻布叩一尺 水蛭 蜜虫各十枚

吳茱萸十八銖

為末蜜丸桐子大酒服十五丸日再加至三十九

當有所去小覺有異止

慶雲散主丈夫陽氣不足不能施化施化不成

覆盆子 五味子各一升 天雄一兩 石斛

白朮各三兩 桑寄生四兩 天門冬九兩 兔絲子二升

紫石英二兩

治篩酒服方寸七先食日三素不耐寒者去寄生

加細辛四兩陽氣不足而無子去石斛加檳榔十

五枚

承澤丸主婦人下焦三十六疾不孕絕產

刀斤書

梅仁 辛夷各一 葛上亭長七枚 溲疏三

藁本一 澤蘭子五

為末蜜丸先食服如大豆二九日三不知稍增若

腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一两按酒送下

大黃丸主帶下百病無子服藥十日下血二十日下

長虫及清黃汁三十日病除五十日肥白

大黃同黑豆熬黑 乾薑 柴胡 朴硝各一

芎藭五 蜀椒二 茯苓如雞子

為末蜜丸如桐子先食服七丸米飲下加至十丸

五日微下

吉祥丸治女人積年不孕

天麻 柳絮 牡丹 茯苓

乾地黄 桂心各一 五味子 桃花

白朮 芎藭各二 覆盆子半 桃仁一百

兔絲子 楮實各一

為末蜜丸豆大每服空心酒下五九日中一服晚

一服

消石大丸治十二癥瘕及帶下絕產無子先服此下

之延服寒食散此不下水穀但下病不令人困

消石

六兩朴硝亦得

大黃

八兩

人參

甘草

各二兩

為末三年苦酒置銅器中以竹筴柱器中一升作一刻置火上先內大黃攪不息使微沸盡一刻內餘藥微火熬使可丸如雞子黃欲合先齋戒一宿勿令兒婦奴婢等見欲下病用二丸若不能可分作小丸多不過四丸不分為善人羸少食強者不須二十日五度服和調半日乃下若下如雞肝或如米汁色赤黑或一升三升下後慎風冷作粥食

後作羹臠自養如產婦法六月有子禁生魚猪肉

辛菜

寒食散方未見

金太守白薇丸治月水不利閉塞絕產十八年服此

二十八日有子

白薇

細辛

各三十銖

人參

杜蘅

一用牡蠣

牡蒙

厚朴

當歸

紫苑

白殭蚕

半夏

各十銖

蜀椒

防風

附子

各一兩半

沙參

乾薑

秦艽

牛膝

各半兩

為末蜜丸如桐子先食服三丸不知增至四五丸
覺有娠止用之大驗崔氏有桔梗丹參十八銖

白薇丸主久無子或上熱下冷百病皆治

白薇 乾薑 蜀椒 乾地黄

車前子各十銖 石膏 紫石英 藁本

菴藺子各三銖 卷柏各三銖 芎藭 蛇床子

當歸各一兩 白龍骨 太一餘糧 麥門冬

遠志 澤蘭 茯苓 赤石脂各二兩

覆盆子 白芷 桃仁

人參各兩半 細辛三兩 蒲黃 桂心各二兩半

橘皮半兩

為末蜜丸梧子大酒服十五丸日再漸增以知為

度可至五十丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉

等覺有娠止聖惠少石膏石英菴藺 澤蘭蒲黃多菖蒲

秦椒丸治婦人絕產生來未產盪滌府藏玉門受子

秦椒 天雄各十銖 玄參 人參

白欬 鼠婦 白芷 黃蓍

桔梗 露蜂房 白彊蚕 桃仁

蟻螯

白薇

細辛

蕪荑各一兩

牡蒙

沙參

防風

甘草

牡丹皮

牛膝

卷柏

五味子

芍藥

桂心

大黃

石斛

白朮各三銖

柏子仁

茯苓

當歸

乾薑各兩半

澤蘭

乾地黄

芎藭各一兩

八銖

乾漆

白石英

紫石英

附子各二兩

鍾乳二兩半

水蛭七十枚

蜜虫百枚

麻布叩腹頭七尺

末之蜜丸如桐子酒服十九日再加至二十有所

去如豈汁臯涕此是病退覺有孕止

丹參丸主始覺有娠養胎并轉女為男

丹參

續斷

芍藥

白膠

白朮

柏子仁

甘草各二兩

蕪荑十八銖

東門上雄雞頭一豆一枚

當歸

吳茱萸

橘皮各一兩十八銖

白芷

冠纓燒灰各一兩

乾地黄兩半

人參

芎藭

乾薑各三銖

犬卵乾一具

為末蜜丸酒服十九日再加至二十九如梧子

琴弦一枚絳囊盛帶左臂一懸腰下百日
雄黃一兩絳囊盛帶要女用雌黃

以斧一柄置卧床下刃向下勿令人知不信待雞抱
卵試之

大澤蘭丸治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛
或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去
來目淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不
止及瀉痢淋瀝或五藏六府寒熱不調心下痞急邪
氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮

膚中澀如麻豆苦痒痰癖結氣或四肢拘攣風行周
身或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺鼻癢風癩癩疾或
月水不通或晁晁不定飲食無味并產後衄無所不
治令人有子

澤蘭 二刀 六銖 藁本 二 四十 甘草 各一 兩十

八銖 芎藭 乾地黄 柏子仁

五味子 各一 兩半 桂心 石斛 白朮 各兩 六銖

白芷 茯苓 厚朴 防風

署預 茯苓 乾薑 細辛

卷柏各一

蜀椒

人參

杜仲

牛膝

蛇床子

續斷

艾葉

蕪荑各十

紫石英三

赤石脂

石膏各五

禹餘糧一兩一本有枳實

末之蜜丸如梧子酒服二十九至四十九丸又赤白

痢去乾地黄石膏麥門冬柏子仁加麥蘗陳麩龍

骨阿膠黃連各一兩半有鍾乳加三兩良

柏子仁丸治婦人五勞七傷羸冷瘦削無顏色飲食

減少貌失光澤斷緒無子久肥白補益

柏子仁

黃耆

乾薑

白石英

紫石英

鍾乳各二

赤石脂

厚朴

桂心

白朮

菴蓉

細辛

獨活

人參

五味子

石斛

白芷

芍藥

桔梗各一

防風

烏頭一作牛膝

地黄各三

蜀椒一兩

澤蘭二兩

藁本

杜仲

當歸

甘草

芎藭

為末蜜丸如梧子酒服二十九不知加至三十九

聖惠無烏頭有龍骨防葵秦
光各半兩并治產後半身枯

紫石門冬丸主風冷在子宮有子常隨或始為婦便
患心痛成疾月水未曾來服之肥充有子

紫石英 禹餘糧 天門冬 各三兩 烏頭 二兩

菴蓉 桂心 甘草 五味子

柏子仁 石斛 人參 澤瀉 一作澤蘭

遠志 蕪荑 杜仲 各二兩 蜀椒

卷柏 桑寄生 石南 雲母

當歸 一作辛夷 烏賊魚骨 各一兩

末之蜜丸如梧子酒服二十九丸加至四十九

鼈甲丸治女人小腹積聚大如七八寸盤面上下周

流痛難忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火灸玉門

冷如風吹經水不通或月前或月後服三十日差有

子 子

鼈甲 各一斤 桂心 各一斤 蜂房 半兩 蘇合 玄參

蜀椒 細辛 人參 苦參

丹參 沙參 吳茱萸 各十銖 麤虫 各一兩

乾薑 牡丹 附子 水蛭

皂莢

當歸

芍藥

甘草

防葵

各一兩

蟻螯

二十枚

大黃

蜜虫

各一兩六

銖

末之蜜丸如梧子酒下七丸日三稍加知為度

牡蒙丸治婦人產後十二癥帶下無子皆冷風寒氣或產未百日胞絡惡血未盡便利于懸圃上及久坐濕地寒入胞裏結在小腹牢痛小如雞子大如拳按之跳手隐隐如虫嚙或如針刺時槍入心兩脇支滿不食或食不消化上下流通或守胃管連玉門背膊

痛嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創欬引陰痛小便自出子門不正令人無子腰膝疼痛四肢沉重滯躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉五色如豆汁夢想不祥

牡蒙

桂心

吳茱萸

芍藥

厚朴

消石

前胡

乾薑

蠱虫

牡丹

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

各十銖

當歸

大黃

二兩半

附子

一兩六銖

未之蜜和更擣萬杵丸如梧子空心酒服三九日
三不知加至五六丸下赤白青黃物如魚子病根
出矣

女人腹中十二疾一經水不調二經如清水三經水
不通四不周時五生不乳六絕無子七陰陽減少八
腹苦痛如刺九陰中寒十子門相引痛十一經來凍
如葵汁十二腰急痛得病之時因與夫卧起月經不
去或卧濕冷地及冷水洗浴當時取快後生百病或
瘡痍未差便合陰陽起早作勞衣單席薄寒從下入

宜服此

半夏

赤石脂各一兩

蜀椒

乾薑

吳茱萸

當歸

桂心

丹參

白欬

防風各一兩

瞿蘆兩半

末之蜜丸如梧子空心酒服十九日三稍加知為
度

外臺廣濟療無子令子宮內灸丸

麝香

二分

蜀椒六分

皂莢

十分 酥炙
去黑皮

搗篩蜜丸酸棗仁大以綿裹內產宮中留少綿線

公公新書 卷一
聖惠無烏頭有龍骨防葵秦
光各半兩并治產後半身枯
大不味味至三十次

紫石門冬丸主風冷在子宮有子常隨或始為婦便
患心痛成疾月水未曾來服之肥充有子

紫石英 禹餘糧 天門冬各三兩 烏頭二兩

菴蓉 桂心 甘草 五味子

柏子仁 石斛 人參各二兩 澤瀉一作澤蘭

遠志 蕪荑 杜仲各二兩 蜀椒

卷柏 桑寄生 石南 雲母

當歸一作辛夷 烏賊魚骨各一兩

末之蜜丸如梧子酒服二十九丸加至四十九丸

蠶甲丸治女人小腹積聚大如七八寸盤面上下周
流痛難忍手足苦冷效噫腥臭兩脇熱如火灸玉門
冷如風吹經水不通或月前或月後服三十日差有
子

蠶甲各一斤 桂心各一斤 蜂房半斤 蘇合半斤 玄參

蜀椒 細辛 人參 苦參

丹參 沙參 吳茱萸各十銖 麤虫各六銖

乾薑 牡丹 附子 水蛭

刀刀斤書 卷一 十一

蜀椒去目汗

吳茱萸各一升

末之蜜丸彈子大綿裹道腸中日再易無所下但

開子藏令陰溫即有子正里更取一服必效

聖惠杜蘅丸主婦人腹藏久積風冷血氣凝澀不能

宣通故無子

杜蘅

防風

白茯苓

細辛

附子

炮去皮臍各一兩

白薇

牛溲

沙參

半夏

湯洗七次去滑微炒

秦艽

菖蒲

藁本

蛇床子

桂心各三分

川椒

一分去目及閉口者微炒去汗

羅為末蜜和搗五七百杵丸如桐子空心及晚溫

酒下三十丸有子止

紫石英丸主久無子由子藏久積風冷陰陽不能施

化

紫石英

二兩水飛

細辛

厚朴

去皮塗生薑汁炙令香熟

桔梗

川楸

去目及閉口者去汗微炒

防風

礞黃

川大黃

附子

炮去皮臍

白薇

當歸

微炒

桂心

各一兩

鼈甲

一兩半生半熟

牡蒙

人参

来寄生

各三

半夏

湯洗七次

白僵蚕

炒

紫苑

續斷

牛膝

杜衡

各半

羅蜜和搗五七百杵丸如桐子空心晚食前各一

服温酒下三十丸

卷柏丸治子歲冷由風寒邪氣客于經血

熟地

牡蒙

乾薑

當歸

微炒

熟地

柏子仁

乾薑

禹餘糧

燒醋

石斛

桂心

五味子

附子

炮去皮臍

防風

甘草

吳茱萸

川椒

微炒

牛膝

桑寄生

川椒

附子

炮去皮臍

羅末蜜和搗五七百杵丸如梧子空心晚食前温

酒下三十丸

陽起石

熟地

乾薑

白朮

炮

白朮

牛膝

吳茱萸

末之蜜和搗二三百杵丸如梧子空心晚食前温

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

酒下三十丸

熟地黄散治婦人久無子是子藏積冷血氣不調

熟地 牛膝 當歸微炒 柏子仁

白薇各一兩 桂心半兩 防風 芫薺

卷柏各三分

為散每服三錢水一鍾煎六分去查空心服

靈苑內補丸治受氣虛弱及五勞七傷藏府積冷瘕癖癥塊虛脹或經脈不調疝冷赤白帶下口苦舌乾面色痿黃黑黥心煩驚悸頭目旋暈不喜飲食痰涕黏涎手足百節熱疼無力肌肉消瘦子息斷緒服一

月當雄娘百病皆愈

葶藶四兩 牛膝各二兩 五加皮各二兩 白米

川烏頭炮去皮 丹參 枳實麩炒去

細末蜜丸梧子大温酒下二十九丸空心日午晚各

一服

阿膠煎丸治婦人血氣久虛胎孕不成大補虛損常服滋助血海

伏道艾葉搗熟篩去查用苜二兩米醋煮一伏時候乾研成膏 阿膠炙二兩

糯米炒 大附子炮去皮 枳殼去瓢麩炒

為細末入前膏內杵勻丸如梧子空心温酒下三十丸午食前再服忌藻菜羊血腥臊等物

千金婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸

婦人絕嗣胞門閉塞灸關元三十壯一灸胞門五十壯

婦人姪子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯

在關元左邊二寸右邊二寸名子戶

婦人絕嗣灸氣門穴在關元傍三寸各百壯

婦人絕嗣漏赤白灸泉門十壯三報之穴在橫骨當

陰上際

千金翼崩中帶下因產惡露不止中極穴在關元下

一寸婦人斷緒最要穴四度針即有子若未有更針

入八分留十呼得氣即寫灸亦佳但不及針日灸三

七至三百止

莊氏膈穴婦人月水不利黃豚上下并無子灸四滿

三十壯穴在丹田兩邊相去各一寸半

姪數隨胎姪娘三月灸膝下一寸七壯

一、凡小兒氣勢微弱在干襁褓乳氣腥臊醫者操
 行英雄詎肯瞻視靜而思之可為太息者矣小品方
 云黃帝凡人年六歲以上為小十六歲以上為少三
 十歲以上為壯五十歲以上為老六歲以下經所不
 載乳下兒有病難治無承據也中古巫妨立顛顛經

幼幼新書卷第二

方書叙例

凡十三門

後學古吳陳履端于始輯

吳江周應郊孺獻校

叙初有小兒方第一

千金曰小兒氣勢微弱在干襁褓乳氣腥臊醫者操

行英雄詎肯瞻視靜而思之可為太息者矣小品方

云黃帝凡人年六歲以上為小十六歲以上為少三

十歲以上為壯五十歲以上為老六歲以下經所不

載乳下兒有病難治無承據也中古巫妨立顛顛經

以占壽夭判疾死生始有小兒方逮晉宋江左推諸
蘇家齊徐王氏有小兒方三卷今之學者頗得傳授
然徐氏方不甚深細少有可採今博選諸家及自經
驗以為此篇竝小無橫天之禍也

叙小兒有病與大人不殊第二

小大之病不殊用藥有多少之異其驚癇客忤解顛
等篇合為一卷餘下痢等方並見諸篇中

論方

叙小兒方可酌量藥品分兩第三

肘後云古今方藥品分兩灸穴分寸不顯者蓋古今

人體大小有異藏府血脈亦差以意酌量藥品分兩
多少配之或一分為兩或一銖為兩以盞當升可也
如中卷紫丸方代赭石脂各一两巴豆四十粒杏仁
五十枚兒服一麻子百日服一小豆且多矣若兩用
二銖四黍巴豆四粒可療十數小兒此其類也灸之
分寸取人中指中節即病有毒狼虎性藥乃急救性
命者或遇毒發急掘地作小坑以水令滿熟攪稍澄
飲水自解名為地漿

叙小兒病宜早治第四

外臺秘要凡人少有病若似不如平時須早治若隱
忍則不療兒益甚

叙調理小兒第五

嬰童寶鑑人稟陰陽二氣生疾病于三焦然病壯易
明童稚難治黃帝云吾不能療其幼小者為別是一
家調理耳小兒如水中泡草頭露用藥毋令造次為
小兒藏府嬌嫩血氣懦弱肌體不密精神未備故稱
不易醫嬰孩兒童大小各異不可槩以用藥也必明
消息形候審定生死察病患之淺深知藥性之寒熱

廼一世之良醫

叙修合藥第六

修合藥餌切要分別州土深曉好惡明辯真偽然後
精細潔淨炮熅炙燂依方分兩子細秤定始可和合
又須用不津器盛藥勿令嘗嗅

聖惠云衆鼻嗅衆口嘗換藥精氣不靈效

又不可全用古方恐分兩差悞古今風俗尚不同豈
得更用古方分兩今人合小兒藥唯少是妙故別立

圭則古方用一刀圭即今一錢七

抄以錢

一錢重是秤

之一錢秤二錢半為一分四分為一兩依此修合必

無美謬兒藏府与大人異故立此一篇

叙用藥第七

萬全論兒純陽病則熱多冷少藥宜少冷于大人有
用温藥處以意減損如水瀉白痢胃冷之類用温藥若丸散一月與
百日同周歲與二歲同三歲与四歲同同者多少同
一服更詳輕重而減增之

叙小兒氣弱未易吐瀉第八

秘要云天地之性人為貴氣清者賢氣濁者愚乃受
父母胎氣成人兒病難曉受氣血弱不可吐瀉所謂

病輕藥重反受其殃人命既絕不可復生

叙十五歲以下皆小方治之第九

聖惠云襁褓至一歲曰牙兒二歲曰嬰兒三歲曰姝
童四歲曰姝腥五歲曰孩兒六歲曰小兒以至十五
歲皆以小方脉治

論受氣第十

聖濟孕元立本章曰渾淪一判既見氣矣曰太初形
既立矣曰太始氣初形始天地相因生生化化品物
彰矣有生之初雖陽与之正育而充之必陰為主因

形移易日改月化坤代終也謂之姪陽既受始陰壬
之也謂之胞已為正陽陰包之也謂之坏未成為器
猶之坏也謂之胎既食于母為口呂也若娘則以時
動也若懷則以身依也天之氣地之德陰陽之至和
相流薄于一體能慎時數謹人事勿動而傷生育之
道得矣觀四季運而生長收藏儀則咸備天地之氣
未嘗虧蓋陰陽相養以相濟也昧者不知欲拂自然
之理謬為求息之術推生克于五行斲補養于藥石
雖或得子孕而不育育而不壽者衆矣昔人謂男不

盡八八女不盡七七氣血有量豈能逃陰陽至數哉
藏真賦序章曰水木火土金相生有母子之道水火
金木土相克有夫婦之義相生所以相繼相克所以
相治維人稟生命門肇乎始胎之後未有不相克而
成者自軋坤交遇于亥一陽始壬于西北壬為陽水
合丁之陰火而生丙丙為陽火合辛之陰金而生庚
庚為陽金合乙之陰木而生甲甲為陽木合己之陰
土而生戊戊為陽土合癸之陰水而生壬茲夫婦之
義化毓妙理出焉方壬之兆懷命門初具有命門然

後生心心生血法丁之生丙也有心然後生肺肺生
皮毛法辛之生庚也有肺然後生肝肝生筋法乙之
生甲也有肝然後生脾脾生肉法己之生戊也有脾
然後生腎腎生骨髓法癸之生壬也腎與命門合二
數備矣壬者其一水一石之謂欵此腎于五藏所以
獨耦苟徒知器有權準物有龜蛇色有黑赤不知一
水一石之道是未達生化之妙夫太一真精兆于水
立于石故火之悍金之堅木之撓土之和得以朕存
諸中其相克相治者正所以相成也犯人之形者詎

可一于相生相繼而欲以収成物之功哉析而推之
一月血凝二月胚兆三月陽神為竟四月陰靈為魄
五月五行分五藏六月六律定六府以之七精開竅
八景神具宮室羅布氣足象成靡不有自然之序觀
妙之士兩之以九竅之變叅之以九藏之動了然曾
次無或逆施者其始生之序如此
顛顛云天地大德陰陽化功父母交和中成胎質爰
自精凝血室兒感陽興血入精宮女隨陰旺故清氣
降而腸谷生濁氣升而陰井盛此二者二儀互換五

氣相叅自覩元機非賢莫趨謂真陰錯雜使精血聚而成殃陽發異端感榮衛合而有疾遂使嬰兒繞養驚候多端不測始末亂施政療致兒枉損吁哉蓋天和太清降乘赤海真一元氣乘之則母情光槐蕩漾熾然是陽盛發陰當妊其男也六脉諸經皆舉陽證所以妊衰不勝藏氣則觸忤而使傷妊勝而氣劣則母疾三五月而發皆隨五藏心藏干而口苦舌乾肺藏睊而多涕發寒肝藏邪而服酸多睡脾藏發而嘔逆惡食腎藏困而軟弱無力藏妊氣平則和而無苦

胎若劣則強得藏養至生亦多疾二儀純陰之證升雜真一者謂陰發陽則父情博妊當成女也六脉諸經皆發陰證若血盛氣衰則肥而劣氣氣盛血衰則瘦而壯氣餘藏妊之氣同男說孩兒子處母腹內時受化和之正氣分陰陽之紀綱天地降靈日月而化萬物以生成隨其時變大理清純至一化成祥瑞之基金真道一故生成焉一月為坏精血凝也二月為胎形兆分也三月陽神為三魂動以生也四月陰靈為七魄淨鎮形也五月五行分藏安神也六月六律

定臍姿靈也七月精開竅通光明也八月元神具降
真靈也九月宮室羅布以生人也十月氣足萬象成
也太一元真在頭曰泥垣惣衆神也得諸百靈以禦
邪氣陶真萬類以靜為源是知慎終靜遠以守恬和
可以保長生耳故小兒之瘦疴蓋他人之過也
千金云兒在胎一月胚二月胎三月有血脈四月形
體成五月動六月諸骨具七月毛髮生八月藏府具
九月穀入胃十月百神備則生生後六十日瞳子成
能咳笑應和人百日任脈成千金翼
五十日能自反覆百八

十日髓骨成能獨踞二百十日掌骨成能扶伏三百
日髓骨成能獨立三百六十日腓骨成能行千金作
脈贖成
若不依期必有不平處

張渙曰嬰兒在腹亦可辯男女訖母脈左手沉實為
男右手浮大為女母面南行呼之左回首男右回首
女且妊娠一兩月血脈行澀勿食腥辛居必靜三四
月形漸成無食薑兔五六月勿食辛七八月勿食瓜
果酸物九十月忌生冷一切動風痰物常端心清虛
行住坐卧視聽言動喜怒思慮皆無邪慝見偃僂醜

惡之人則避之田野禽獸之類則不覩蓋動靜聽聞胎必隨母不依此法兒無由聰慧且多疾病又妊娠常須調蓄寒暑小不調便須服藥去疾病益氣血扶養胎氣則生兒強盛慎之

相壽命第十一 面南背北之式四首與本四首

千金云兒生枕骨不成能言死

尻骨不成能踞死 一作膝骨

掌骨不成能扶伏死 百六十日

踵骨不成能行死 聯珠 膝骨

臍骨不成能立死 聯珠 尻骨

胛骨不成能坐死 聯珠云此不足之疾皆父母已過之疾也

生身不收者死

魚口者死

股間無生肉者死 非卦入

頤下破者死

陰不起者死

囊下白者死赤者死

相法甚博略述數條

兒初生額有旋毛早貴妨父母

陰大與身色同者成人

叫聲連延相屬者壽聲絕復揚急者不壽

汗血者多危

一作云血

目不正視數動者非佳人

自開目者不成人

通身軟弱如無骨不成人

髮稀少者強不聽人

聖惠不聰

臍小者不壽

早行早坐早語早齒生皆惡性非佳人

頭四破者不成人

毛髮不周匝者不成人

啼聲散不成人

啼聲深不成人

汗不流不成人

小便凝如脂膏不成人

常搥手足不成人

兒初生臍下有血者好

鮮白長大者壽

卯下縫通達而黑者壽

觀兒性氣高下即知壽夭故少時識悟通敏過人多
天項橐頰面之流是也骨法成就威儀迴轉遲舒稍
費人精神彫琢者壽預知人意迴旋敏速者天楊脩
孔融之流是也

三關錦紋第十二

水鑑云兒託質胞胎成形氣血誕生之後三歲之間
榮衛未調筋骨輕軟腸胃微細動靜易驚致于夭凶

得不傷哉編成三關之脉于右深可指迷

脉形論兒手第二指指有三節脉之形出其上近虛
口之位號曰風關其次氣關指端曰命關凡有疾當
視三關之脉察病斷之指左手指也一云男在女
右按當通者

脉形圖

楊大鄴寶童莊氏
同異各註下

風關脉是驚傳心藏

莊氏云黑主癩赤
主熱青緊小主微

受冷邪青絛
大者主寒邪

氣關脉是疳傳肺藏

莊云赤青色
紫主疳積

命關是肺風急慢驚不療通度者死



魚刺形

風閉慢驚可醫

楊云急驚可治
莊云黑難治青易治別


本驚風
痰積

氣閉心疳可醫

莊云青主疳勞身
熱易治別本積滯

命閉難醫

莊云虛風邪
傳脾難治



形如魚刺物多驚遍體如湯面色青或瀉或狂

宜此斷消徵調氣便惺惺

寶童

因驚著

命閉難醫曰命閉

紋如魚刺是初驚紅色須知病在心若遇黑時

連腎脉更宜詳審究元因

難治

懸針形

風閉水驚亦醫

莊有青黑
別主瀉利


氣閉疳入肺亦醫

楊不治
莊積熱

三閉通度慢驚候下二閉不斷難療單

關亦醫

楊主疳通關不治
莊別肺疳通度驚風不治



形如懸針瀉痢多水驚急療更安和

莊水驚紫
黑候偏和

受病只因心藏起三閉通度是沉疴

寶童

有驚在心

驚傳心藏積因多壯熱通身氣不和此患却稱

天鈞病緩若醫持不柰何

水字形



風關是肺藏驚莊欬嗽面赤別本驚積

氣關慢驚有虛積莊膈上有涎

命關疳氣風不瘵莊兼驚不拘五色別本慢驚

形如水字肺家驚虛積相傳面色青膈上有食

宜便取消癥洗肺得安寧楊膈上

寶童

夾驚傷寒

紋黑驚傳入腎囊青黃脾藏受災殃夾驚傷寒
紅赤色鎮心解表要相當

乙字形



風關肝風易醫莊別肺風不治

氣關慢驚風入肺難醫莊驚風

命關不瘵莊慢脾青黑危

形如乙字病傳肝眼慢驚啼淚不乾此是肺風

傳受得莊云三關觀候細詳看

寶童

喫食并驚有積

紋彎食上有垂時傳受風邪入在脾若黑之時

休整療遙知大命已傾危

曲虫形



風閉傷肺堪治 莊疳病積聚胃前如橫排箕子肚皮如吹起猪

氣閉大腸有積 莊別肺粗不治

命關難治 莊心傳脾別不直可治

形如曲虫疳積深肺家有病腎藥心患此若能

醫得好良工須是用情深 楊急消沉積

寶童

驚入肝

曲虫紋是病傳肝外證分明子細看符藥一時交併服何憂此患不能安

環形



風閉肝疳可醫 楊腎有積可治莊有積在肝

氣閉肺疳亦醫 楊肺積堪治莊疳入胃吐逆不治一

云大腸受積

命關不治

形似環來腎受疳好泥喜土作常餐消癥未遇

良工藥取動方知體漸安

寶童

驚涎入肺

驚風入肺少人知八錦紋中子細推環子作紋

如面白涎聲潮響急須醫

亂紋形

風關 楊直腎有積

氣關 楊疳細 風氣可治三關難治

命關 三關若有皆虫 楊不治 虫在心肺初因



熱赤脚連連赤紫定為驚更加赤色食軟硬睡裏驚三關可治小兒腎有積

紋亂涎橫虫在心悲啼曉夜痛難禁求神拜鬼

渾無效喫藥安和望治深

寶童

脾生疳虫

虫亂縱橫總在脾瀉痢頻生更惡啼亦有筋皮

乾卷縮用心調理莫延遲

流珠形又名涼米



三部都遇有積命關獨有不治面身有者是流米死候止在風關可下涎取積

涼珠死候不須醫更看三關在所推風氣得之

猶可治命關有此外何疑

水鏡八脉主病要括

形如魚刺物驚瘥形似縣針瀉痢多水字肺驚

癥已見乙知肝積要調和

形如曲虫疳患久如環腎積細詳看逢紋亂後

知虫犯流米通身莫望安

寶童多魚鈎形附。是驚風在膈上

膈上驚風入肺中病人生熱又遭風涼肌解膈蒸

不開胃次鎮心田病乃通

莊氏外八錦紋

曲向裏

氣疳

曲向外

風疳

斜向右

傷寒身熱不食

斜向左

傷寒身熱不食

雙鈎



傷寒

三曲如長虫



傷硬物

兩曲如鈎



傷冷

一頭如環



傷冷

面有黑子



再發之候

頭面肚上有脉


并青筋



食毒

驚積難治

如亂虫



常疳亦有虫疳

食積之疳治之必差凡脉不足細者並是風氣

消疳後取虫肥兒為効

別本外八錦紋

指間魚刺動隱上類虫行此病從心得先因

四足驚

曲 虎口團成曲因驚或感風熱生由病乳神亂

臉仍紅

乙 上吐多頻併飜腸瀉若傾指紋端似乙有濕

在中停

川 捩頭時拱手熱極意昏沉赤黑紋如現因人

自外驚

也 內隱風還盛沉疴目不開都緣因喜怒到此

有逆災

丰 赤脉過三節仍加顛似癰縱多神妙藥此病

也難攻

丰 頻因驚撲著啼叫沒時休亂紋三節現無病

也堪憂

茅先生論小兒虎口三關脉如丹紅色傷寒及食壯
熱如紅夾青色是驚紫青色腹肚不和紫黑色腹中
冷或瀉或利此是氣閉風關受色与前面同欲丹紫

若患甚色黑必死命關被虛口色充來通治紫黑色

死似以第一節為氣關二節為風關斷病則一第一要看大衝脉動即吉

不動凶更看陰陽二部脉沉慢死猛尚通治

楊大鄴云兒脉紅赤色在節內如細魚腸大者即風

熱盛脉微紅風熱也微紅半青驚積風熱脉青色在

指節內如魚腸大者驚候也脉青色在節內如練據

兩頭大中心細者急驚癇風候若如青已過節二三

分如曲鱗伸縮來去者慢驚風候白色在節似細魚

腸大者傷脾瀉也前白色在節內半白紅半赤色者

傷寒候也陰陽候脉息過節二三分如曲鱗縮來縮

去者是傷寒被人將藥取動此無辜疾必死候也白

色過節二三分脾泄瀉也傷寒候脉當節中者無辜

疾日久也七九十一日以上如見本傷寒者祇一三

五日醫得若前白色青紅色在節內似細魚腸大者

脾胃不順脉白色在節內即驚釣風也凡兒脉黃色

必死過節亦死候

又定生死三關訣

手上青紋見情知四足驚黑因遭水撲一作赤赤是

大人驚

一作黑

內隱連風急

一云脈沉驚宿乳

紋灣食上尋

又渾身雖壯熱耳冷痘還生

又內八片錦

青色小大曲水火飛禽撲黑花小大曲人鬼并四

足赤色大小曲米麵并魚肉若有紅絲見慢脾驚

作毒

飛仙論兒脈見青紫紅淡黑有紋如錦一直者姤傷

脾及熱驚發左右手皆有驚積齊發有三條或散肺

生風痰或齁齶鳴者青是傷寒主嗽紅大主瀉兼黑

主痢紅多赤痢黑多白痢兼紫渴且虛也

歌曰

左手三關見錦紋定傷脾胃熱和驚右同左樣

雙紋起食積驚傷是本形一痢傷驚一齊生紋頭又着

三叉樣肺熱風涎夜作聲有青却是傷寒候若

只紋紅瀉欲生

寶童歌孩兒生下繞過月有病如何為人說男左女

右席口中若有紫紋是驚熱青色成胎氣未全

亦本驚生搐有涎赤色必然經數日或驚水火

病相連孩兒一臘至兩臘席口更交開掌握若
生米粒過初關並是有驚防眼合若過一節至
兩節便與驚積同一說似出不出隱隱紋此號
應傳脾藏結若紫之時定難療青紫有驚入脾
竅此時呼作慢脾風好手醫人急難療若逢紅
色但寬心下藥之時却神妙脉出三關連指面
孩兒死候還須見不須顏色赤白紅萬死一生
休憤怒

係生論脉一直者驚治驚曲裏傷寒解曲外傷食有積

下積紫多瀉痢并有熱黃色雷聲鼓聲

風關一脉見初得病氣關二脉見病漸深命關三脉

過者死

長沙毛彬傳驚八片錦歌

席口開昔赤星現雙睛翻后卒難辯定是人驚

風入心手足抽牽無定限虎口開時見黑星楊作

水顙門腫起及成坑定知四足曾驚著面上時

捫手不停虎口開時帶白色小兒病是水驚得

口眼同開鼻作聲身上汗珠益流出席口開時

青色交

足楊四

唇青相應又胃高只因飛鳥來驚

著小腹臃臍氣轉牢虎口開時青色長看天仰

面牙齒當小兒高處曾經撲面黑還兼手帶黃

虎口開時帶黃色孩兒兩處曾驚嚇作驚開口

汗常乾頂黑須防被災厄虎口中心色帶紅兒

驚因水遂生風鼻中出氣多開口目直身長勁

似弓虎口紋生出外停若逢此候號胎驚不論

紅赤并青黑逢此之時命必傾

脉法第十三

顛顛經兒三歲以下為純陽脉以一寸取之呼之脉

來三至吸之亦三至呼吸定息六至此為無患以大

人脉五至取之羌矣七至已上為有氣脉浮如弓之

張弦此為有風七至以下為冷候十五至以上三至

以下死

王叔和兒生死族歌

小兒乳後輒嘔逆更兼脉亂無憂慮

兒啼未定氣息未調

遽乳之氣逆上乳不得下停滯胃膈則胃滿氣急令兒嘔逆又母將息取冷冷氣入乳交壞不

捨除而即乳之冷氣與胃相逆則腹脹滿痛氣息喘急亦令嘔逆又兒解脫洗浴露體風冷客



缺 P22

于轉理傳于血氣入于胃亦腹脹吐逆久則變為痢矣

弦急之時被氣纏脈緩即是不消乳弦主風邪氣緊數細快亦少

苦脈緊與形相稱虛濡邪氣驚風助痢下宣腸急痛時

浮大之脈歸泉路下痢脈浮大者死形與脈相反

聖惠云脈弦緊者客忤沉數者骨間有冷孔氏骨

浮而數乳癰風熱緊而絃腹痛千金云

弦而數乳熱五臟壅牢而實大腸祕澀

乍短乍長乍大乍小不等者有祟

變蒸身熱寸口脈亂汗出不食乳食即吐不藥自愈

大是驚大小不勻是惡候冰鑑論浮數為熱伏結為寒沉細為冷數者緊也浮者輕也伏者貼也重手方見結者亂也重沒為沉細者微也大小不勻則氣不生必死

甚分明抱着遍身不温煖血絕四肢垂躄哭鵝

聲胃主四肢既啼哭無淚瀉涎清肝撮眉搐眼

爪甲黑筋絕筋痒泥壇腫起或為坑將口咬人

魚口急兩口角垂脚直肚大有青筋筋絕不能

絕上視以覩于高物上視長吁出氣黑文行氣

絕出而不廻黑文血不癢脈喫乳不收舌出口乳不收胃絕

唇不蓋齒眼坑傾脾主肌肉外應瀉痢多

變異黧血心主血絕偏搐似笑沒心情一邊搐

不止顏沒其不論貴賤及男女救療十人無一

心情惡候也

錢乙脉法

脉亂治不弦急氣不和沉緩傷食促急虛驚浮風

沉細冷

嬰童寶鑑兒三歲至七歲其脉駛一息七八至為平

八至至十至太過病為陽盛不及五六至不足病為陰盛

徵為寒往來如亂絲之細

重手即無輕手得

數為雷弦如箏通

伏為氣行筋中

大小不勻曰中惡或大或小

脉虛病亦虛輕手乃得重手即無

左寸無脉心下痛胃中熱時時嘔口中生瘡由乳母

食冷所致欬嗽頭有汗寒熱作喉中哽塞作聲

右寸無脉短氣氣逆喉中欬噫由乳母抱衝風露

心脉滿大肝脉小急並為癰癧瘰之疾

寸脉浮直上直下皆脉連腰脊強不得俛仰大人顛

三部脉緊急癰可治 中惡微者可治

吐現浮者可治

弦緊牢強為癥癖脉隨左右見

沉乳食不消

少陰脉數為疝淋

雀啄若緊者風癩

孔云兒脉多雀啄

傷寒脉洪者易理微者難理

浮大者宜發汗

一投一止病假令六投六止六日病也

春脉弦

夏脉洪

秋脉浮

冬脉沉

四季脉緩各推其王相表裏

浮病在表屬皮膚在腑為順陽脉沉病在裏屬藏骨髓而逆行陰之理也脉在上病在上死生見焉

傷寒身大熱體黃脉沉細者死中惡脉緊細者死黃疽脉沉細腹滿者死

惠眼云凡疾重當以一指在魚際或太衝者若傷寒急驚痘疹之類為腑病得浮洪易安沉細難安与回

陽兩三日再診如得陽脉方許調理輕手如捻葱管乃有滿部重按即無是也若慢驚吐瀉瘡痢之候為

歲病沉細易安浮洪難安蓋陰陽脉行于内不可行

于外輕手按之不顯尋之至骨沉者是陰脉也凡病
脉來三點大又三點細難治兒脉只看陽脉大陰脉
細餘不可驗

保生云兒脉在五百七十六日外歌曰小兒有病須

憑脉一指三關定其息浮洪風盛數因驚虛冷

沉遲實有積

浮為風秋浮為平輕手大重手細弱如按慈葉曰浮主中

風傷風效嗽嚏噴煩躁壯熱鼻流清涕一身頭面虛

浮下泄小便如粉可解表甚者出汗即愈

洪為熱夏洪曰平輕手大重手亦大曰洪主間發熱身生

瘡癤及癰瘰喉閉顛腫風熱面赤氣喘心藏熱小便

淋瀝頻患赤痢

數因驚春數曰平脉來小急過數速疾曰數主夢中咬齒

驚擲見人恐怖夜多盜汗白日多困氣粗不語忽瀉

青糞若得數脉乃生驚候此驚傳膀胱主疝徧墜

沉遲為虛冷沉遲者輕手按不見重手按至骨脉來

沉弱細小主脾胃虛冷泄瀉無時嘔逆不食

實有積冬實曰平一輕手不見重手大曰實主藏府

有積腹脹面黃髮立小便如油面仆地卧頻頻吐食
腹內鳴響又積不治即成疳勞丁奚哺露若兒肥實
宜涼藥取積後補若羸瘦歲府虛薄與溫藥取積後
補凡脈急如弓弦或兩動而止不見者死

寶童中指脈法孩兒五七歲五歲脈方現中指兩畔

內于中子細看

左男右女專心記左主脾肝心腎肺右主熱生
驚氣疳女子背看各從類欲察病源誰得知脈
洪大急來歸內皆是傷寒病因熱洪大却慢傷

脾氣遲細脾虛因取極脈小急來腎虛致疾在
小腸憑藥力到此醫人須用意診脈若來三兩
通此為死候命須終吸人指面如弓急慢脾死
候命將畢

楊大鄴云中指中間為動脈醫家莫便懷疑惻此時
風滿四肢頭萬卷千書醫不得

五指指節冷驚來不可安忽然中指熱必定是
傷寒中指獨自冷疹痘有多般

莊氏脈歌小兒脈數多風熱沉伏元因乳食結弦長

必動肝腸風弦數驚蛔四肢掣洪浮胸中似火
燒若兼膈痛好添愁息數和平八九至此個分
明不必憂

陳氏頌
枳堂梓

幼幼新書二卷終

