

鷄峯普濟方卷第二十五

馮翊賈兼重校定

雜治

大効紫光丸

唐明皇帝勅錄下臣寮奏過療小腸難治之疾臟腑積聚之冷疾癖氣塊大如拳掌亦如杯碗及黃疸病朝起嘔吐上攻心膈兩肋分痛脹徹連甲脊痛无休息常時達臍九種心痛五淋五痔及冒口閉塞吐逆飲食積年不消及婦人斷續多年又療一切諸風身躰頑麻不知痒痛半面浮疼眼目冷渙遍身如錐刀所刺眉毛墜落面上生瘡逕如虫行莫知所有或手足煩熱或夜卧不安療小兒七十二種風及二十五種驚癇男女夜夢鬼交四肢无力沉重飲

食无味昏昏似醉只欲求死真如鬼魅終日憂煩不樂悲
啼歌哭並不依常月候不調或多或少時似有孕連年羸
瘦在床漸困而致命終但服此藥无不痊愈

紫苑

人參

各式
兩

巴豆

醋煮去
心膜研

肉蔻蓉

吳茱萸

菖蒲

乾薑

白欒郎

當歸

防風

茯神

桔梗

車前子

川椒

烏頭

炮去
皮脐

豬牙皂角

去皮了塗酥
炙各壹兩

白术

漢防已

柴胡

羌活

麥門冬

甘草

各壹兩
壹分

黃連

厚朴

乾地黃

茯苓

大黃

各壹
兩半

肉豆蔻

叁分

右二十八味各依法修制衣爲末煉蜜爲丸如梧桐子大
每服空心五元茶酒或熟水下當宣三五行不定以溫
粥止之小兒臨時加減此藥臣兄因墜馬天陰即痛羸
瘦在床不能飲食命在湏更日服五元至月宣下一片
如菜菜大白膿水一升許已安臣又見圭簿陳勝妻
患心痛羸瘦在床氣急懸飲食不下日服五元十日
取下青虫六十四个大如筋頭又出膿水三升已来自
後漸安臣妻先患癥氣塊服此藥十日每日五元出自
虫一條有頭尾下膿三升已來又出青黃水三升其病
自愈臣又見功曹長孫患腰脚着床經年每日五元至
二十日出蟻娘五个又出青黃水二升已來其病自愈

臣有師張意困在床枕食即便吐命在逡巡每日五元至半月出似蝦蟇虫五個又出清水二升已來其病自差臣妻又常患宿冷病發便欲死日服五元出肉蛇三條長三尺各有頭目遂使人用刀破腸腹乃是頭髮三條其病自後平愈臣見多有大風疾眉毛墜落已及三年身上生瘡疼如刀割日服五元至半月出五色癩虫三升已來當時平復部內有縣令妻父患帶下絕嗣多年服至半月出酸水一升又似鷄肝黑血五升已來後有孕及生子數人台州王推官可道患大風疾二周年眼見得効又剡縣監酒王奉議妻父患諸藥不効是時冬月取青黃水三升第十四服取下韭一圍尚自青

色如新至十五日取下白魚狀如指甲面闊長一尺三
條自後平愈

接骨丹治男子女人骨節疼痛起止不得腎臟風毒下注
瘡癬痒痛不可忍者口面不正脚膝无力只可五七服立
見功效校定接骨丹用川烏頭草烏頭當令炮過微裂不可過熟用

駢鱗竭

沒藥

骨碎補

各壹兩

自然銅

津兩

海桐皮

狼毒

沙苑蒺藜

川附子

新羅白附子

天南星

何首烏

仙靈脾

川芎

羌活

牛膝

川烏頭

各壹兩

虎頭骨

津兩地龍

牛膝

天麻

草烏頭

乳香

防風

各壹兩

青鹽

赤小豆

各兩

津

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服十五元茶
酒任下空心臨卧各一服此藥能治水藏久冷及婦人
血風瘦弱常服助筋骨輕利氣血衝壯手足冬月不冷

大黃散治百種毒

大黃

瞿麥

白乾葛

牛蒡子

地骨皮

蒼术

各壹兩

升麻

大青

芍藥

赤者

枸杞子

當歸

禹藤

黃芩

黃連

連翹

羌活

青皮

鬱金

芎

桑白皮

甘草

牽牛

黃者

荆芥穗

各二兩

右爲細末每服二三錢生薑自然汁調下食後臨卧服

无憂解毒丸

解諸色毒

校定鳳髓不知爲何物疑是草名
重校定鳳髓乃鳳眼草

藍根

藍花

藍菜

菝葜

菝葜

土馬驥

小茴陳

各壹兩

藍子

伏龍肝

鳳髓

大黃

各半兩

甘草

薄荷

乾葛

貫衆

各貳兩

大豆

壹合生

蛇黃

壹對生

寒水石

肆兩

龍腦

麝香

各少許

右爲細末搗糯米煮粥爲元如彈子大青黛爲衣驗乾
每服一元含化鹽津大段熱者蜜水化下

活絡丹去風活血止骨節疼痛

穿山甲

半兩

白芷

細辛

藁本

白僵蚕

石膏

藿香

木鳖子

骨碎補

荆芥

天麻

天南星

乾蝎

各壹兩

大赭石

貳兩

羊蠅蠍

麻黃

各壹兩半

草烏頭

春拾式兩
秋夏各半斤

天麻

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服嚼二元荆芥湯
不以時

生木炭湯消食和氣

生木炭

壹斤不計個數去皮穰
秤於沙盆內磨肉并漿

生薑

叁兩去皮沙盆內同研

鹽

陸兩炒

甘草

參兩

肉豆蔻

壹分去皮

益智子仁

叁錢

白芷

丁香

桂

縮砂

檀香

各壹錢

叁

右爲細末与生薑木瓜鹽同研勻令得所以乾淨垍罐
子盛之旋旋以白湯點服每用匙輒不得犯生水可收
三二年

犀角散

治咽喉毒氣結塞疼痛不湯水宜服

犀角屑

沉香

馬牙硝

鷄舌香

各半兩

木香

薰陸香

甘草

黃芩

各半兩

川升麻

射干

各半兩

射香

壹分

右爲鹿末每服三錢水一盞入竹葉二七片煎至六分
去滓溫服不以時

保靈丹

治蠱毒及一切藥毒

硃砂

壹兩

麝香

或分

班猫

壹分去頭炒令半熟

巴豆去皮
分兩條一兩

雄黃
黃丹各壹分

蜈蚣炒
壹生用之

苦藥子生用各一分

山大豆根壹兩

右十味修剗同入乳鉢研勻五月五日午時或九月九日合之忌鷄犬婦人見用糯米稀粥爲丸如七斤魚目大有中毒者先煮脇肋脹滿攻心腹疼更令人嚼黑豆聞香即是毒將發此藥一元入門病人先聞香氣來逼亦其驗也令以无粉茶下一元不得嚼斯湏患人必言頭如拽皮片斷声相次毒物便下或自鼻或自大便中出毒嫩即是益毒老則成鱉兒蟻娘等諸雜蟲毒帶命之物及凝血必裹其藥下却以水洗净收之一元

可治男子五人婦女三人無問何毒服之便解如卒中
諸毒若蛇蝎并馬汗一切水中之毒但以好醋磨塗在
傷處立解病人既差如知用毒之人不可論訴恐更害

人愈深忌酒肉毒食一月惟喫薤羹淡軟飯佳

荆瀝湯 治諸風疾有熱者及風癰疾

牛黃

伍分

人參

麥門冬

各二兩

升麻

鐵精

各壹兩

龍齒

天門冬

茯苓

梔子仁

各三兩

右除牛黃鐵精外為鹿末每服五錢水一盞半入竹瀝
一合煎至一盞去滓入牛黃鐵精各炒一字調勻溫服
若忽爾搖頭口噤背強直如發癟之狀此由風邪乘虛

客於足太陽之經訣其脉緩散而遲者善瘧人本虛風邪日久而發謂之風瘧其脉三部俱洪數者由蘊熱搏於諸陽之經甚則日夜數十發正所謂熱劑生風亦名曰瘧如斷齒大便不通者名剛瘧風瘧宜荆芥豆淋酒食前當歸湯風瘧宜龍膽湯剛瘧宜大承氣湯

橘紅湯 快氣消食

鹽

二兩

黃橘

津兩

生姜

半斤

甘草

二兩

神麴

大麥蘖

壹兩

草豆蔻

壹兩

右七味拌勻同罨一宿焙乾搗羅為細末白湯點熱呷之食後

和中湯 調適陰陽通流榮衛養脾胃進飲食治脇肋脹

滿止嘔逆惡心

白术

肆兩

橘皮

黃者
兩

厚朴

貳半兩

人參

茯苓

甘草

糧
兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分溫服用生薑煎空心下

靈羨湯和養脾胃

大小麥

各半升
炒黃

甘草

貳兩
各兩

鹽

肆兩

乾生薑

陸兩
肉豆蔻

草豆蔻

各兩
個

右爲細末每服二錢白湯點服不以時

食柏聖餅子

消草毒和脾胃

大豆

大棗

各壹升

白茯苓

貫衆

甘草

各貳兩半

右除棗肉外爲末後以棗肉和勻如乾入少煮棗水和之捻作餅子如錢大每一餅子分作四口十餘日外分作六口餘分作八口止百日或經歲則不必藥自可以食餘但一切草菜皆可服食如在路人家遠有飲食未及只服藥一兩餅子飮亦止及臨卧服一兩餅能縮小便服藥後不可飲煎湯只飲冷水

杏仁元

取寸白虫

杏仁

貳個生用

皂礬

半升火紅用之燒

砒霜

壹升半生用

南粉

半升生用

朱砂

壹升半

右件五味爲末研勻以湯浸饁餅和元如粟米大每服

一元水一盞同菠蘿或葛苣同煎以水濃爲度臨卧溫服翌日取下糞切忌執物如覺心頭悶亂即以宿饑餅壓之

皺子花散

神仙變白爲黑方

深色皺子花

壹斤

白芷

秦椒各半斤

肉桂

壹兩

熟乾地黃

貳兩

右同爲細末每日空心粥飲調下五錢以食壓之服月餘日則白變爲黑若人不信但以白羊將此藥拌草喫不過三二十日乃變黑羊也

止汗散治諸虛不足汗出不止

牡蠣

參分

白朮壹兩

白芷

壹分

甘草

壹分

防風 半兩

右爲細末每服一錢煎水調下不以時
神仙煎烏龜治虛三元節日合之尤佳

茯苓

杏仁

各肆兩

枸杞子

菊花

生地黃

右爲細末酒盃麵糊和元如梧桐子大每服三十元空心溫酒米飲皆可下

除邪丹

博濟名臘第六

除邪丹治諸疾

漏蘆

攻鱗壹兩

乾薑

附子

各壹兩

巴豆

參三兩以水

一椀浸柒日去皮取肉去油

盡就炒作聲再用

河秤壹兩

右件除巴豆霜外搗爲細末同巴豆霜研勻每一料用

靈砂一字同研勻又名創丹以水煮麵糊爲元量人虛
實大小元之用橘皮湯下不入靈砂謂之臟邪丹如新
合成只服一元藥舊則加數元產後婦人亦可少服治
百病

近侍湯和脾胃

縮砂仁貳兩 丁香壹分 甘草參不
鹽壹兩

右爲細末每服二錢白湯點服

洞庭湯和氣

橘子壹斤和甘草 生薑 塩各肆
兩

右四味一處搗爛作餅子火上焙乾爲末每服二錢白
湯點服

香棗湯行滯氣

綿棗拾個細切去子

宿

生甘草

同棗淹宿

益各參兩

白檀壹分

右用木臼搗爲細末每服二錢白湯點之不得犯鐵器

道合湯健脾胃進飲食

削木

壹斤米泔浸宿控乾隔希炒

甘草

白鹽各陸兩

椒子

壹百貳拾粒地希上攤之隔希炒於淨用枕蓋之

右件合搗時須要念道合道合四十九聲一搗一念數足即不須念每服二錢薑棗煎至七分點服亦得

磁石元脫肛方不問新舊

磁石

肆兩好者

桂貳兩

猾皮壹枚

右爲細末湯泡饁餅和元如梧桐子大每服五十元空心食前米飲下日二服候服藥了喫食罷腹中稍空即用後法洗日再

新生鐵

右以水一斗煮取汁五升微熱淋洗至夜臨卧時再淋洗一次了用後按之

鑿頭一枚

自死者
燒成灰

右爲細末摻凸出肛門上炙舊履底以按尉令入永不出

化鐵丹誤吞物在喉中不下者

管衆

赤茯苓

各半

道人頭

壹分

右搗爲細末每服一錢新水調下如是已吞下更用鷄子清調藥即隨大便下

龍砂湯和氣

縮砂仁貳分

甘草

鹽各半

右將甘草同鹽炒候甘草黃熟取出寫在縮砂上即以盞枕蓋之候冷同爲細末湯點二錢

真一湯和胃

太麥

小麥升各壹

右二味淘洗净炒黃取麵各四兩用生薑半斤取汁和成餅子焙乾入炒甘草二兩肉豆蔻二箇麵裹煨熟同爲細末入鹽點服

瓜蒂散治胃膈停滯

瓜蒂 赤小豆末各等分

右二味研勻熟米飲調一錢羸人服半錢得吐即止

治耳聾方

菖蒲 壹寸 **巴豆** 壹粒去皮心 一方巴豆與菖蒲同等分

右二味合杵分作七箇綿裹塞耳中日一次易

六一湯

和胃氣

白朮 陸兩 **甘草** 壹兩

右二味爲細末每服二錢沸湯點之

廣濟療蛔虫方

酸石榴皮 剉入土伍寸

漬引升用

檳榔 柒个

右二味以水七升煮取二升半絞去滓着少米煮稀粥
空心食之少間虫必死使利効无忌

遠志膏解烏頭天麻附子毒

遠志

乾防風

各半兩

右爲細末用飴糖半斤同熬成膏瀝去滓每服彈子大
一粒含化食後臨卧服之

乳香散治肉刺久不差

松脂

乳香

各一錢

右同研細先用針刺破以藥傅之密封即差

解藥毒方

右以蚕退燒灰細研每服二錢冷水調下雖面青脉絕

腹脹嘔血服之即活頻服即差

治骨梗方

右先面北取氣一口飲氣於水椀內默寫龍字令人細呷之

治湯火燒法

右用寒水石不以多少研細新水調塗

治蛇傷法

右以雄黃研細傅瘡上

治下脫不收等雜方

右以紙撫子任鼻內一嚏即止

治脫肛

管衆

朴消

橘皮

黃者

右等分同爲鹿末每用五錢煎湯淋洗

治鼻血不止

右以小便盆內刮人中白爲末乾研入麝香少許男左女右着鼻內

又方

右綿裹驢糞塞耳內

治蟲入耳

右用桃葉塞之出

治蜈蚣入耳

右用炙豬肉掩之出

治油蜒入耳

右炒麻子以葛布盛側耳枕之出或用牛乳清油灌之
出

潤膚膏治皮膚風熱生瘡麻痺赤色

槐花末

松脂

薰蠟

黃蠟

黃柏末

壹兩

白礬

半兩

乳香

少許

膩粉

叁兩

右以清油三兩先煎令沸次入松脂候消即入黃蠟候
鎔消即入槐花黃柏白礬乳香膩粉攬勻收入垍器內
塗瘡上

雲母膏治諸般瘡瘍

雲母粉

硝石

甘草

各肆兩

槐枝

柏葉

柳枝

桑白皮各參

桔梗

防風

桂

蒼耳

菖蒲

良薑

黃芩

柴胡

厚朴

松脂

吳椒

芍藥

龍膽草

白芷

白斂

白芨

黃耆

芎藭

茯苓

夜合

附子

鹽花

人參

當歸

木香

麒麟竭

沒藥

麝香

乳香

各半兩

陳皮

壹兩

黃丹

拾肆兩

清油

肆拾兩

水銀

貳兩

右件藥除研者藥外並剉如豆大用上件油於壇器中
浸所剉藥七日以物封閉後用文火煎不住手攬三上
三下每上候匝匝沸乃下火候沸定再上如此三次候

白芷附子之類黃色爲度勿令焦黑以綿或新布絞去
滓却入鑄中再上火熬後入黃丹與藥八味以柳籠不
住手攬直至膏凝良久色變再上火熬仍滴少許水中
凝結不粘手爲度先炙一塊器熱即傾藥在內候凝如
人躉溫熱殫水銀在上每用膏藥先刮去水銀

花蕊石散 治折傷內損等疾

花蕊石

壹斤

硫黃

肆兩

右二味相拌勻先用紙筋和膠泥固濟瓦罐子一箇內
可容藥候泥乾入藥內密封泥口了焙籠內焙令透熟
便安在方埠上埠上書分封字五行用炭火一秤籠壘周匝自午
時從下生火漸上徹有墜下火旋夾火上直至經宿火

冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研羅極細撮合內
盛依法使用

雄黃散治新久癬瘡

雄黃

白礬

歷青

壹兩

輕粉

紅

血餘

少許

右爲細末菜油調塗之先用薺汁洗了揩乾用藥

蘇乳湯解渴生津液

紫蘇葉

壹兩

乳糖

肆兩

甘草

桔梗

貳兩

烏梅

貳兩

生薑

壹兩

右將烏梅甘草紫蘇爲末先以薑絲拌次入糖用垍器
收點之水亦可

金粟散治肺熱

白术

芍藥
赤者川芎

當歸

各壹
兩

右爲鹿末每服二錢水一盞入粟米百粒棗一枚同煎至六分去滓食前溫服

燒肝散治筋脉疼痛四肢倦急

附子

肆兩
汁半斤慢火煮汁盡焙乾用
炮去皮臍切片子以生薑

縮砂

壹兩

肉豆蔻

川椒

各半兩

茴香

壹分

右爲細末每服二錢先以羊肝四兩切作片子去筋膜然後入藥并葱白鹽醋各少許同拌勻以荷葉濕紙裹於塘灰中燒令香熟喫之了後用溫酒壓之

苦參散洗瘡藥

苦參

漏蘆根

蒺藜

楮莖葉

各壹
兩

右為鹿末以漿水二盞煎至一盞以綿沾日八九訖以
粉拭

天門冬元治鼻塞

天門冬一兩

防風

茯神各參

川芎

白芷

人參各半兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食後臨
卧熟水下

妙効膏治疥癬

槐花半兩

歷青

黃蠟各一錢

白礬

乳香

輕粉各一錢

清油二兩

蛇脫壹兩

右爲細末將油蠟青三味銷鎔後入餘藥攬勻用擦之
團參散補氣生津

白朮

人參

五味子

各半兩

甘草

壹分

右爲鹿末每服二錢水一盞入生薑三片同煎至六分去滓溫服不以時

蜜陀僧散治新久瘡疥

蜜陀僧

壹兩

膩粉

乳香

各壹兩

麝香

壹字

右爲細末先以甘草湯浴瘡揩乾然後用少許貼之

仙散治大風疾遍身生瘡

胡麻子

牛蒡子

枸杞子

蔓荆子

已上炒黑

白蒺藜

苦參

瓜蔓根

防風

各半兩

右為細末每藥末一兩半入輕粉二錢拌勻每大人用一錢淡茶調下空心日午臨卧各一服喫藥後五七日間先於牙齒縫中出夏涎水渾身覺疼痛利下穢惡夏氣為度量小兒大小加減與之

地骨皮散 治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛作時或斷

爛生瘡

地骨皮 **麥蘖**

各壹兩

皂角 半兩

青鹽 壹分

右為細末每服看患人大小用之仍以鹽漿水先漱口

了摻擦

靈鷲湯 和脾胃

棗 壹斤

甘草 參兩

生薑 伍兩

右三味一處搗爛罨一宿焙乾末之

走蓮散治口瘡

五倍子

糊

黃柏

錢

蜜施僧絳

銅青

一錢

右爲細末乾摻之

朱砂丹

解蠱毒

朱砂

壹兩

麝香

貳兩

山豆根

壹錢生杵

巴豆

參分

雄黃

黃丹

班貓

壹半生米炒

苦藥子

半炒壹

續隨子

沒藥

各壹分

蜈蚣

貳個炒

右以糯米元如鷄頭大每服一元用無粉茶下凡中毒者便下藥少時覺心頭拽斷皮條聲即是毒下或從口中出或從下部出嫩即成血老即成蟻娘蟹子帶命之

物因凝血裹出即知當初下者毒物其藥瀉出便以洗
過香湯再度仍以朱砂收之每一元可治男子五人婦
女三人服藥後轉瀉不止白粥止之黃連湯可湏端午
日或臘日合忌一切穢惡內中毒即服之外中毒則醋
磨塗之如纔覺中毒先喫黑豆覺其味香甜者是中
毒也

雞峯普濟方卷第二十五

鷄峯普濟方卷第二十六

馮翊賈秉重校定

奇疾

項上生瘡如櫻桃大有五色如瘡破即項皮遂斷上連髮
卷去下至足脫之乃爲肉人矣初見此瘡治但逐日飲牛
乳自消矣

人發寒不止經數日後四肢堅如石以物輕擊之似鐘磬之
聲日漸瘦惡治以茱萸木香等分煎湯飲五日可解愈

大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名爲截腸病若
腸盡乃不治矣但初覺截寸餘治用油壹盞以臀坐之飲
大麻子汁數升愈

口鼻中腥臭水流以碗盛之有鐵色蝦魚粳米大走躍不

住以手捉之即化爲水此肉壞矣治用任饌食鷄月餘可補完獲安矣

鼻中毛出一晝夜可長五尺漸漸鹿圓如細繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖即復更生此由食猪羊血過多乃生治用乳石硝砂各一兩爲末以飯元如梧桐子大空心臨卧各一服水下十粒自然退落

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飮身減少久則透腔名曰瘻光疾治多喫魚鷄葱韭自愈矣脇破腸出臭穢多急以油摸腸却送入煎人參枸杞湯淋之皮自合矣喫羊腎粥十日愈

口鼻氣出盤旋不散凝如蓋黑色過十日則漸漸垂下至

肩背與肉相連堅勝金鐵無由飲食此多因瘧後得也治前澤瀉湯日飲三盞連服五日自除耳

婦人月信退出皆為禽獸之狀似來傷人治先將綿塞陰戶只頓服沒藥一兩餘作元散皆可服即時愈

遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血住若不速治必潰而膿出治以赤皮慈燒灰淋洗喫豉湯三五盞自安矣

眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不較者治用蒜三兩取汁酒調下立愈

毛竅非時一齊血出不止皮脹膨脹如鼓湏臾眼鼻口被氣脹合此名脉溢治飲生薑水二三盞自安

手十指節斷惟有筋連無節肉出如燈心鹿長數尺遍
身綠毛脊多名曰血餘治以茯苓胡黃連煎湯飲兩盞愈
遍身忽皮底混混如波浪之聲痒不可忍抓之肉血出亦
不能解謂之氣奔治以人參苦杖青鹽白术細辛各一兩
都爲末作一服水二椀煎十數沸去滓飲盡便安
眼白人渾黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語如
大醉名曰血潰治用五靈脂二錢爲末酒調下立愈
因着炙訖火痴便退落瘡內鮮肉片子飛出如蝶狀騰空去
了手足隨壞痛不可忍是名肉血俱熱治用大黃朴消各
半兩爲末水調下微利即愈

每至臨卧渾身風出約及五升隨手血肉俱壞每宿漸多

痒痛不可名狀惟喫水卧坐床上晝夜號哭舌尖血出
不止牙齒俱黑唇動鼻開治但飲鹽醋湯十數盞即愈
眼赤鼻張大喘渾身生班毛髮起如銅鐵蓋目中熱毒氣
結於下焦治用白礬滑石各一兩為末都作一服水三碗
煎至半放令不住飲盡乃安

有虫如蠍走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化治用雷
元雄黃各一兩為末摻在一片豬肉上炙令香熟喫盡自
然安

手足甲忽然長倒生刺肉如錐痛不可忍治只任喫葵
菜自愈

咽喉間生肉層層相疊五色漸漸腫起不痛多日乃有竅

子臭氣自出遂退飲食治用石楠葉煎湯喫五盞愈
腹脹如鐵石臍中水出變作步闕虫之狀緣身咂啄痒痛
難忍撥掃不盡治用濃煎蒼朮湯浴之別用麝香以水調
服立痊

眼前常見諸般禽蟲飛走以手捉之則無有乃肝膽經
為疾治用酸棗仁羌活玄明粉青葙子花各一兩為末每
服二錢水一盞滿煎至七分和滓飲逐日喫三服愈

大腸蟲出長百十尺不絕斷之復生行坐不得治服鶴虱
末水調下五錢愈

眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出名
曰肝脹治用煎羗活汁服數盞自愈

腹中有物作聲隨人言語不能自言治用板藍汁一盞分
作五服一日間喫盡便安

又見小說名曰應聲
並當服雷丸虫自愈

兩足心以凸如腫上面生黑色豆瘡便似丁子釘着復地
不得脛骨生碎眼子髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝
腎冷熱相攻治用炮川烏頭末傅之前服華子湯一盞愈
丸腹脹經久忽泄瀉數升晝夜不止服藥不驗廻爲氣
脫治用益智子煎濃湯服之立愈

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解治以酒浸黃蘆
三兩取出焙乾爲末每服二錢酒調下每日喫候服盡則安
玉莖硬不痿精流無歇時時如針狀者捏之則脆碎此爲
腎滿漏疾治用華子破故紙各一兩爲末每服三錢水一

盡煎至六分每日三次飲之愈即住服

遍身生瘡如橘子大有眉口鼻眼因喫諸般肉菓子乃爲白人面疾治濃煎貢母湯一椀服只一服愈

有飲油五升以來方始快意長得喫則安不爾則病此是髮胃被氣血裹了化為虫也治用雄黃半兩爲末水調服虫自出愈如虫出活得者置於油中逡巡間油自耗矣久卧於床四肢全不能動只進得飲食惟好太言說喫物謂之失說物妄漑病治如說食猪肉時便云你喫猪肉一頓病者聞之即喜遂急致肉令病人見却不與喫比乃失他物望也當自睡口中涎出便愈

忽氣上喘全不能語口中汁似脂如流吐逆齒皆搖動氣

出轉大則悶絕蘇後復智是名曰傷寒併熱霍亂治用大黃人參末各半兩水參盞煎至壹盞熟去滓一服飲盡口內生肉毬臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵股味出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心力困不可言治用喫水調麝香壹錢參宿見効

渾身生燎胞大如甘棠梨每一箇破出水內有石一片如指甲面大胞復生抽盡肌肉則不可治急用京三稜蓬莪茂各五兩為末分作三服酒調下服藥盡乃愈

頭面上發熱有光色他人不敢以手近之如火燒人治用蒜汁半兩酒調下吐出如蛇狀遂安

人自覺身形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃是

離魂治用辰砂人參茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化矣遂如舊

牙齒逐日微長漸漸脹開口難爲飲食蓋髓溢所致治只喫白朮漸漸自除耳

雞峯普濟方卷第二十六

雞峯普濟方卷第二十七

馮翊賈兼重校定

雜記

烏髮齧復容方

凡人生以血氣爲主四十而後血氣漸弱髮齧班白凡修合烏髮齧藥往往使石灰石榴皮鹿毒諸藥之類使時隔夜用荷葉包裹次日黃黑不定根白如銀乘其毒藥脆其髮齧如此非良法也今收得此藥凡要烏髮齧每用半粳米大可令左右祗候捻在兩指上撲於髮齧間立得烏色澤滋潤不唯此得烏黑百日外自者換黑也

乾蒲

宿江竹

象子

藿香

牡礪

好墨

防風

各壹兩

右先用胡桃五箇去皮搗成膏子然後入杏仁面油稀稠得所入前項藥七味在內搗成膏子入下項藥

麝香 生龍腦 芬陵香末

已上各一錢再搗干餘下作餅子用油紙貼收之

烏龜藥

新皂角 嫩芭蕉葉 嫩槐枝 生薑

嫩酸石榴皮

並陰乾用

右藥等分同剉碎入堦罐子內鹽泥固濟了不蓋口燒煙尽存性於火內取出罐子別掘地坑子埋罐子一半候一宿出火毒將藥研為末每藥末一兩用鷄骨升麻半兩末同末拌勻每日早晨日午臨卧三度揩牙少時

漱吐之或用細辛亦得其芭蕉葉採時取近心嫩者截
了便倒撈急繫定截處恐出了津倒懸陰乾

又方 烏龜鬚

南粉

黃丹

各半

朴硝

壹分

風化石灰

半錢
細研

右爲細末以造胡餅藥汁調如糊於垍盞中以慢火溫
之候稍熱以竹枝子蘸藥於手指甲上試以黑爲度塗
於白髮上不宜侵肉如一茶間便用溫水洗去所塗以
胡桃油撲_後光潤自然如烏羽黑半月之後自鬚根再
生依前用藥

又方 烏龜

風化石灰

半斤

黑錫

黃丹

南粉

各貳
兩

右用鐵鍋先將石炭熬炒用象子木一枝長一赤五寸徑一寸者攢燒反四寸次節次用黑錫黃丹南粉同炒攢及象子木又四寸通燒八寸爲度將藥攤冷搗爲細末用藥汁調塗荷葉裹護

又方烏龜

硇砂壹兩

鐵粉肆兩

青胡桃皮半斤

酸石榴大者壹个

右先將石榴胡桃皮同搗成膏如泥并前藥共盛均罐子內油單封口馬糞內埋四十九日取出用頭髮刷子蘸藥湏稍刷之次用木梳梳之藥力倒行名四倒梳油

嵌甲方

膽礬

乳香

各壹分

人剪下指甲

燒存

亂髮

燒存

烏魚骨 乾燕脂坯

蜜庵僧

格貳

右將前四味燒存性次入後藥研極細用萬苣菜煮湯
淋脚淨令眼明人剔去脚指甲刺以藥貼上一日夜一
易之

又方

右以詞子麵裹炮去核用皮搗羅為細末乾摻瘡上用
紙裹定不痛自安

又方

鷄屎礬

甘鍋子先燒了
細研堆合子盛

乳香絃

麝香

半分

右三味和勻合子盛貯每用先以唾潤嵌甲腫痛處後
以藥摻其上成乾即剥去如此三次其病已安

又方

治嵌甲亦洗得油汚衣上

陳橘皮

不去白

右爛嚼貼甲上乾即換之數次病甲自退

治癰

白礬

乾蝎

等分

右用甘鍋子內炭火煅存性為末每服一字猪或羊麝一枚摻藥在上於脂麻油燈上燎熟臨卧含定嚥津後徐徐細嚼嚥下去枕少時神効

治諸丹流

右以燕子窠故舊者為末以水調塗即安

治節腕脫

右用床米粉木鳖字仁同研爲細末以酒熬蘇木汁和
成膏塗病處即愈

治因熱取涼睡有蛇入七尺深挽之不出者

右取椒七粒破蛇尾裹之在內湏臾即出

治耳痛通耳

右用曲善一條於帛子上放之次摻縮砂末曲善成水
就便裂汁滴耳中痛即止

治中惡欲死者

右嚼太糞甚妙

保命丹

仁宗皇帝賜狄相公征蠻解毒二十四味

滑石

縮砂

青黛

山梔子

白茯苓

草龍膽

寒水石

甘草

管仲

黃芩

乾葛

大豆

各上拾貳味
生用壹兩

益智

地黃

大黃

山豆根

桔梗

紫河車

馬氣勃

薄荷

黃藥子

粉花

百藥煎

藍根

各上拾貳味
生用半兩

右件各揀擇令潔淨搗羅為末用生蜜和元如鷄頭大
青黛為衣每服一元細嚼新水送下大治一切諸毒并
瘴疫久年暑積咽喉不測之患常服解化諸毒大効
神効救命丹
參合方四解中
毒諸蛇蟲蠭毒一切藥毒通療

朱砂

壹兩

麝香

半兩

雄黃

黃丹

各貳
外半

巴豆

貳分去皮油

班貓

式外半去頭足壹半生壹半炒用

蜈蚣

式條壹生壹熟

已上七味各細研

苦藥子

式外半

山豆根

壹兩

續隨子

式外半去皮生用

已上三味同搗末

右同再入鉢內勻煞用糯米煮糊為元如十斤魚眼大
每粒可救男五婦三大忌酒肉毒物一月惟食韭羹淡
飯凡初中毒便令人嚼生黑豆取驗急將藥用真臘茶
清下一元須臾患人自竚心頭如斷皮條之言其毒從
目口鼻出或大便下中毒未久即血久即成虫更將藥
淨洗收之再用有一切蛇蝎蜈蚣馬汙毒傷以藥點好
醋磨汁塗之立解常於端午日修合不及於九月九日

亦得但於靜室中不令人見爲妙

又方

豆豉

參百粒

巴豆

拾肆粒心不出油

去皮

百草霜

參合底黑墨金

右豆豉巴豆二件研細入百草霜再細研勻用水滴為元如彈子大一元新汲水磨下若毒在膈即吐在腹即

瀉

又方

巴豆

去皮心不出油

馬牙硝

各肆分

右同熬研極細生蜜為元如彈子大用冷水送下甚捷

又方

常山

肆兩

白鹽

肆分

右用水一斗漬一宿次日五更令煮取二升分作兩服
少時即吐以銅器盛取若青色以杖斧五尺不斷者即
毒未尽更二日再依次煮服直候毒尽且慎勿食熟薯
之物

又方 取多年廁下摶於水中洗過就炎日中暴曬刮取白
霜收之用冷水調一錢匕大効人无中毒莫輕与服此
藥大寒能解中毒神良

又方 取蕷莖生搗汁服數盞大解又用蕷莖煮汁一二升
飲之亦解又用蕷莖搗末作散調服亦能單解諸藥毒
甚効

又方 取甘草剉微火炙熟細嚼嚥汁若食中毒藥即吐急

別求方製藥療之古常囊盛甘草十寸自防

又方取雄雞一隻刀刺冠血用好酒調服如无以雌雞亦得及用生鴨一隻斷頭瀝血口中咽下即解若口不開取竹筒灌下甚驗

又方取甘草蕤英等分濃煎汁不厭多飲即解

又方

都淋藤

拾兩嶺山背
有土人悉知

右用水一斗和酒二升煮取三升分三服飲訖毒藥並逐小便出湏是一月慎食毒物不差更依前服之即愈

又方

黃藤

拾兩亦在嶺南皆有
土人悉知得採處

右件依前都淋藤製法

又方取藍根大豆搗汁和猪血飲之即解未則更服

又方取乾藍葉搗末調服大解諸毒又用根亦得

解中暑症腰生蟲通療

羖羊皮

方參寸

蘘荷葉 苦參

黃連

當歸

各壹兩

蘘荷葉 苦參

黃連

又方

右用水七升煮取二升分作三服訖即吐未差更服

羖羊皮

方參寸

蘘荷葉

肆兩

苦參

黃連

當歸

犀角

升麻

各參兩

右件細剉以水九升煮取三升分作三服曾与人服即

時吐出蜂蠱數升便愈名曰百解散

又方

雄黃 朱砂

梨蘆各一錢分

右件搗末空腹以井花水調服刀圭當下毒蠱吐出

又方

班貓

壹分去足
翅別研

桃皮

木戟各一錢分

右為細末水和如棗核大以米飲吞下即吐未差候十
日更作一服必差

又方

茜根

蘘荷菜根

各二兩

右細剉以水四升煮取二升去滓放溫頓服即好

又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬死尽服其汁欲死者皆可治

又方取桑木心細剉一斛入釜淹之令上有三寸水煮取二斗澄清再微火煎取五升空腹服五合又用桑白皮咬咀蘸汁湏臾吐盡出自愈

又方取鐵精搗末細研用鳥雞肝和之為元如梧桐子大每服三元甚者不過十日輕者即差

又方取益一升和淳苦酒作一服即吐立愈又用苦酒煮化益服之亦良

又方取猪肝一具和蜜一升共煎之令熟分作二十服為元亦得

又方取桔梗苗搗汁一二升飲之甚解

又方取苦瓠或苦葫一枚以水四升煮取一升頓服立愈
即吐又用苦酒一升煮化服之亦驗

又方取皂莢三錠炙去皮子用酒五升漬一宿去滓分作
三服甚効

又方取好雄黃一二錢冷水細磨服之大散腹內百虫毒
藥極良

解中毒諸飲食菜野芋等物通療

取雞屎燒灰水調服方匕不解更服極良

又方取蒿根不以多少煮汁一二升飲之即解

又方取甘草煮汁飲之能解又用蘿蔔煮汁亦同

又方

生姜 沛兩

甘草 索兩

右以水六升煎取二升去滓空心作三服併服輕則已重則別療

又方 取人屎搗汁一升與飲應解諸藥中毒无有及此者大抵人意嫌穢不獲已湏是用此為最良

解中毒諸魚鱉肉通療

取黃耆橘皮濃汁飲之未解更服大効

又方 取冬瓜不以多少濃煮汁服之多最良

又方 取蘆根剉碎煮取汁飲一二升極妙

解中毒諸禽獸肉通療

取頭垢一錢匕水調服之未差更服

又方取豆豉甘草煎汁數升飲之即解

又方取薺搗汁一二升和水服尽即差

又方取黃蘖搗末水調下未差再服

治傳屍骨蒸湯

取黑錫炒末細研用精肉二兩燒熟空腹蘸藥末二
錢早服則晚虫下晚服則明日虫下未下再服

又方取呑水蛭入腹用以牛羊熱血一升飲之次煮豬脂
一升飲之立下

治中毒蛇傷等

又方

神効祕傳勝散治中毒蛇傷并蜈蚣蝎蜂蠻

蜘蛛射工沙
通療

川椒

豆豉

各拾粒

右二味入口爛嚼吐在手心中次零將天南星末調勻
得所塗所傷處手擦微熱自有黃水出尽未差更作此
藥救毒神良慎勿輕忽

又方取生薄荷搗汁調白礬末喫餘滓塗去傷處立効如
用野薄荷更妙

解中毒蒙昧昏悶不省通療

取甘草不以多少寸剉安乾人糞底以土薄覆却用元
糞蓋三經雨後晴取出陰乾為末水調服一二分即省
未省更服大妙

又方取乾人糞燒末水調服一二分立解諸毒

冬於地下掘坑深一尺取新井水一斗傾入就攪百轉
候稍澄下連併飲之候吐即解名曰地漿能解衆毒
冬半夏末用一字許吹患人鼻中立効用皂角末亦良

雞峯普濟方卷第二十七