


聖濟總錄

六十

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 (64)
函號	300 212





大學東
校典籍
局之印

大德重校聖濟總錄卷第六十
黃病門

黃疸

急黃

陰黃

酒疸

穀疸

胃疸

黑疸

女勞疸

日木
占
同

總錄六十

大論重外聖新編卷六十一

女勞疸

胃疸

酒疸

穀疸

黃疸統論

論曰疸病正有五種一曰黃疸二曰黃汗三曰穀疸四
 曰酒疸五曰女勞疸一黃疸者徧身面目悉黃如橘二
 黃汗者身體洪腫汗出如黃蘗汁不渴狀如風水三穀
 疸者食畢頭眩心中怫鬱不安而發黃四酒疸者心中
 懊痛足腫滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水
 所致五女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難
 由大勞大熱房室過傷此五者證狀雖異大率多因酒
 食過度水穀相并積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸
 所以發黃為疸其證食已如飢曰胃疸額上黑足下熱



日黑疸其因傷寒時氣後變成黃者緣陽明病無汗小便不利熱瘀在裏心中懊懣身必發黃若被火額上微汗出而但小便不利亦發黃其狀如橘色腹微滿此亦由寒濕不散瘀熱在於脾胃故也然又有九疸三十六黃其證其名悉各不同治皆有法具如後章凡黃病當利其小便疸而渴者其病難治疸而不渴者其病可治

黃疸

論曰內經謂目黃者曰黃疸又曰安臥脉盛謂之黃疸其外證身體面目及爪甲小便盡黃其內證食已如飢此由酒食過度脾胃有熱復為風濕所搏瘀結不散熱

氣鬱蒸故發是疾若面色微黃身體或青赤黑色皆見者與純熱之證不同當於濕家求之諸黃疸發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱疸而不渴者可治其渴而疸者難治

治黃疸目黃小便如血心煩躁悶口苦頭痛茵陳湯方

茵陳蒿

山梔子

各

甘草

炙半

木通

剉

栝樓根

菟胡

去苗各壹兩

麥門冬

去心焙壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢水二盞入竹葉三七片

同煎至一盞去滓食後溫服

治黃疸脾胃積熱皮肉皆黃煩躁口苦小便赤澀木通湯方

木通剉 瞿麥穗各壹兩 赤茯苓去黑皮

白茅根 大青 秦艽去苗土

生乾地黄焙壹兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治黃疸遍身面目皆黃黃連湯方

黃連去鬚 大青 山梔子人參

茵陳蒿 葛根 芫花 地骨皮

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服

人參 黃芩去黑心 芒消各壹兩

中大黃細剉醋炒

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

治黃疸通身並黃芫胡湯方

芫胡去苗 茵陳蒿各壹兩 升麻

龍膽各分 三葉白朮

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入地黄汁一合攪勻食後溫服

治黃疸面黃眼如金色四肢羸弱或時煩渴雞舌香湯

雞舌香

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食前溫服

方黃連... 雞舌香... 秦艽... 胡黃連

雞舌香 一合 秦艽 去苗土 各參分 胡黃連

右六味 麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服

治黃疸身眼皆如金色及諸黃桃根湯方

東引桃根 壹握細切如釵股者佳取時勿見風及避婦人雞犬

右一味以水一盞半煎至七分去滓空心溫服如眼中黃色未退可時飲酒一盞

治黃疸身體面目皆黃茵陳丸方

茵陳蒿 參分 大黃 剉 黃連 去須

黃芩 去黑心 各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸食後臨臥溫水下

治黃疸心中懊懣煩熱梔子湯方

山梔子 人兩半 枳殼 去瓤炒 壹分 大黃 剉炒 壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入豉二十粒同煎至七分去滓溫服不拘時候

治諸黃皮肉如金色小便赤黑口乾煩渴白鮮皮散方

白鮮皮 貳兩 黃連 須去 土瓜根

芍藥

大青

梔子人

茵陳蒿

栝樓根

此胡去苗各壹兩半

芒消

參兩半研入

黃芩

去黑心壹兩

貝珠

參拾枚燒赤研入

大黃

兩

右一十三味搗羅為散每服三錢匕煎茅根汁調下

空腹頓服取利至晚不利再服服了以少葱豉粥投

之

治黃疸面目身體皆黃口乾煩躁發熱狂悶茵陳丸方

茵陳蒿

常山各半兩

大黃

剉炒參分

朴消

研壹分

豉

炒壹分

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後温竹葉湯下

治中熱黃疸寒熱往來脉數煩困四肢勞倦知母散方

知母

焙

赤茯苓

去黑皮

常山

茵陳蒿

黃連

去須

犀角

鎊

羚羊角

鎊

人參

各壹分

此胡

去苗

鼈甲

醋炙去裙襴

甘草

炙各半兩

龍膽

半分

右一十二味搗羅為散別入丹砂末半分合研勻瓷

合收每服二錢匕食前人參湯調下日再

治黃疸此胡湯方

芪胡去苗半兩 甘草炙壹分

右三味細剉以水一椀白茅根一握同煎至七分去滓溫服

治黃疸面目黃瓜蒂散方

瓜蒂壹拾肆枚 丁香大者壹枚 黍米肆拾玖顆

右三味研為細散每服一字先含水一口以鼻搐藥取下黃涎為効

治黃疸大小便難喘息促甜葶藶丸方

甜葶藶炒貳兩 大黃剉炒壹兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫米飲下食後臨臥服

治黃疸身體面目皆黃大小便秘澁臧府壅熱黃連散

方

黃連去須 大黃細剉醋炒各貳兩 黃芩去黑心

甘草各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕食後溫水調下日三

治黃疸面黃肌瘦大黃丸方

大黃剉壹斤 芎藭半斤

右二味搗羅為末用蜜和成劑甑上炊七徧丸如梧桐子大每服三十九熟水下空心食前臨臥日三服

治身面悉黃大便如濃梔子汁茵陳蒿丸方

茵陳蒿各肆 芫胡去苗 梔子人各肆

龍膽去心 枳殼去瓢 黃芩去黑心

升麻去心 大黃剉炒各

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸

飲下以利為度日再

治黃疸身體面目爪甲小便俱黃病甚者秦艽煮散方

秦艽去苗土壹兩

右一味搗羅為末用牛乳二盞半煎至一盞半分溫

二服空心食前

治一切黃病茵陳蒿丸方

茵陳蒿肆 大黃剉 黃芩去黑心

右四味生用為末鍊蜜和丸梧桐子大每服米飲下

黃二十丸一日二服量病與之小便金色身皮皆黃並

治身面黃大便如濃梔子汁茵陳蒿丸方

治黃疸身腫發熱汗出而渴汗出著衣正黃吳藍飲方

吳藍 芍藥 麥門冬去心

桑根白皮剉 防已 白鮮皮

梔子人各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

急黃

論曰諸發熱心戰定必發為急黃謂其卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故名急黃也有初得病即身體面目發黃者有初不知是黃死後變黃者但先見其證當急治之此由脾胃有蓄熱穀氣鬱蒸因熱毒所加故有斯病治急黃目如梔子色小便赤心煩悶茵陳湯方

茵陳蒿

梔子人

黃芩去黑心

大黃剉炒

白鮮皮

黃連去須各壹兩

右八味除朴消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入朴消末一錢匕再煎令沸食後溫服

朴消研

貝齒煨各半兩

犀角屑參分

茵陳蒿

梔子人

升麻各半兩

黃芩去黑心參分

大黃剉炒壹兩

朴消研壹兩半

甘草炙剉半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉三七片同煎至一盞去滓食後溫服

治天行急黃身如金色茵陳黃連湯方

茵陳蒿 去黑 黃連 去 黃芩 去黑

大黃 剉炒各壹兩 甘草 剉壹兩 人參 各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服

治急黃煩熱口乾皮肉急黃赤小豆散方

赤小豆 壹合 丁香 壹分 秫米 八分

瓜蒂 別研各壹分 青布 伍寸燒作灰研

麝香 別研壹錢

右七味除研外搗羅為散入研者和勻每服一錢匕米飲調下食後服服後當吐下黃水即差

治急黃面目如金色渴欲飲水龍膽湯方

龍膽 壹兩 木通 剉 土瓜根 各壹兩

石膏 貳兩 犀角 屑壹兩 梔子 人兩

大黃 剉炒壹兩半 白茅根 剉 朴消 各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓食後溫服

治急黃面目如金色煩渴飲水升麻湯方

升麻 參分 秦艽 去苗土壹兩 凝水石 壹兩

栝樓根 參分 朴消 壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓食後溫服日三服三匙以水一盞煎至十分之一

治急黃小便赤黑口乾煩躁白鮮皮散方

白鮮皮壹兩

黃連去須

芍藥

茵陳蒿

大青

土瓜根

各參分

梔子人兩半

茈胡

去苗參分

黃芩

去黑心半兩

栝樓根

剉參分

大黃

剉炒壹兩半

朴消

壹兩

貝齒

燒壹兩半

右一十三味搗羅為散每服二錢七煎茅根湯調下

空心服取利為度未利以葱豉粥投之

治急黃煩熱口乾徧體悉黃黑豆煎方

黑豆壹升

右一味用水五盞煎至二盞去豆取汁再煎一盞然

後下蜜生地黃汁麥門冬汁生藕汁各二合酥半兩

相和慢火煎成膏瓷器盛候冷每服半匙或一匙食

後含化日三服

治急黃小便赤黑口乾煩躁方

蔓菁子取油

右一味不計時候頓服如無油即以蔓菁子搗水和

絞取汁一盞服之亦得未効再作服

治急黃疸方

大黃貳兩

右一味剉碎水三盞生浸一夜平旦取汁入朴消二兩攪和分作四服每日一服取快利為度

陰黃

論曰陰黃者面色黃頭痛不發熱不欲聞人聲此由陽伏於陰邪熱沉潛散於肌肉身黃如橘故謂之陰黃昔人有說下之後身目發黃者當於寒濕中求之此其類也

治陰黃不欲聞人言小便不利秦艸湯方

秦艸去苗土壹兩

旋復花半兩

赤茯苓去黑皮半兩

甘草炙剉半兩

右四味麤搗篩每服四錢匕以牛乳一盞煎取六分去滓溫服不拘時候

治陰黃身如橘色小便不利茵陳散方

茵陳蒿貳兩

桂去麤皮半兩

澤瀉壹兩

赤茯苓去黑皮

白朮

豬苓去黑皮各參分

右六味搗羅為散每服二錢匕溫水調下日三服

治陰黃龍膽湯方

龍膽

秦艸去苗土各壹兩半

升麻壹兩

右三味麤搗篩每五錢匕水一盞半浸藥一宿平旦

煎至八分入黃牛乳五合再煎至一盞去滓空心分
溫二服日再取利為度

治陰黃赤小豆散方

赤小豆

丁香各參

麝香細研

瓜蒂貳

青布灰貳

右五味搗研為散每服一錢匕熟水調下日再服以

吐為度更取少許吹鼻中即有黃水出為效

治陰黃小便色不變欲自利腹滿而喘者必噦宜半夏

湯方

半夏

湯洗柒遍去
滑焙壹兩

人參貳

葛根貳

右三味剉如麻豆每服四錢匕以水一盞入生薑半
分切煎取七分去滓不計時候溫服

酒疸

論曰胃虛穀少醉以入房冒犯風邪胃中熱毒隨虛入

裏小便黃赤濕毒內聚心下懊痛熏發肌肉則身目發

黃或發赤斑足脛浮腫或下之早則變為黑疸令人心

如病飢大便黑癩皮膚不仁治法槩宜先去濕毒後分

小水餘隨證治之

治酒疸心中懊痛小便黃赤茵陳湯方

茵陳蒿 去黑皮 赤茯苓 去黑皮 葛根 剉各半兩

小水梔子 人分 栝樓根 分 秦艽 去苗土

升麻 各壹兩 右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服日三 治酒疸心懊痛足脛滿小便黃面發赤斑或黃黑色此

由飲酒大醉當風入水所致黃耆木蘭散方

黃耆 剉壹兩 木蘭皮 剉壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕食前熱酒調下日三

治酒疸身目俱黃心中懊痛艾葉湯方

生艾葉 一握無生者乾者亦得 麻黃 去根節

大黃 剉炒壹兩半

右三味剉如麻豆大每服四錢匕以酒一盞半入大

豆半合同煎至八分去滓食前溫服

治酒疸小便不利或飲少洩多如白泔色凝水石散方

凝水石 燒令通赤 白石脂 栝樓根 各壹兩

菟絲子 酒浸別搗炒乾 知母 焙 桂 去麤皮

右六味搗羅為散每服二錢匕煮大麥粥飲調下日

三

治酒疸小麥飲方

生小麥合貳

右一味以水一盞研絞取汁食後頓服

治酒疸腹滿如水狀心中懊懣不能下食時時欲吐桔

梗湯方

桔梗剉

百合剉

赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉

枳殼去瓢

枳殼去瓢 枳殼去瓢 枳殼去瓢

枳殼去瓢

木通剉

右七味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓食前溫服良久再服

治酒疸身面黃心懊痛小便黃赤不利黃連丸方

黃連去須

黃蘗去麩

黃芩去黑心

大黃剉

梔子人

黃藥子

鬱金

秦艸去苗

貝母去心

甘草炙

欬冬花

黃明膠炙令燥

白芥子

各半

右一十三味搗羅為末研粳米飯丸如梧桐子大每

服十九煎麥門冬湯下

治酒疸通身黃腫木通散方

木通剉

甘草炙

木香

檳榔剉

麻黃去根

秦艸去苗

瞿麥穗

乾薑炮

右八味等分搗羅為散每服一錢匕白湯點服空心
食前日三病甚者用豬膽一枚去汁一半入巴豆一
粒薤白二寸在膽內以線繫定同青橘皮少許水一
盞半煎熟瀝去膽取藥湯調下一錢匕

治酒疸徧身發黃追毒飲方

狗脊去毛壹兩

白芥子壹錢

甘草壹分

右三味細剉用酒一升煎取半升去滓分溫三服利
下為度

治酒疸心下懊痛身目發黃乳香礞砂丸方

乳香研

礞砂研

安息香研各壹分

巴豆參拾粒去皮心膜醋煮研

杏仁去皮尖雙人炒研貳茶粒

右五味合研勻細裹肉丸如菘豆大每服五丸食後
臨臥溫生薑米飲下

治酒疸心下懊痛脛腫溲黃面發赤斑大黃湯方

大黃剉炒貳兩

枳實去蘗麩炒

梔子人各壹兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去
滓溫服日三

治酒疸徧身黃瓜蒂丸方

盞去滓溫服日三

治穀疸食畢頭眩心中怫鬱發黃由失飢大食胃氣攻衝所致其腹必滿苦參丸方

苦參壹兩半

龍膽兩半

右二味搗羅為細末以牛膽汁和搗三百杵丸如梧桐子大每服十五丸早晚食後煎大麥湯下

治穀疸頭眩心忪發黃腹滿滌熱湯方

茵陳蒿

大黃剉炒壹兩半

山梔子人參分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服小便利色如皂莢汁一宿腹減

治穀疸苦參梔子丸方

苦參壹兩

山梔子人參兩

龍膽

治黃芩去黑心各壹兩

右四味搗羅為細末以豬膽汁和搗五百杵丸如梧桐子大每服二十九丸食後米飲下日三

治穀疸食畢頭眩腹滿及酒疸脉沉實礪砂乳香丸方

礪砂

乳香

安息香各壹兩半

巴豆

參拾粒去皮心膜用醃醋煮至半盞取出研

杏仁貳柒粒去皮尖雙入麩炒

右五味再研勻為細末棗肉丸如棗豆大每服五丸

食後溫生薑米飲下日再夜一
治穀疸脣口先黃腹脹氣急鬱金散方

鬱金壹兩

牛膽壹枚

麝香研半錢

右三味搗研為細散每服半錢匕新汲水調下不拘

時

胃疸

論曰已食如飢者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如飢者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脉絡屬於心陽明得熱則心火上行陽炎過矣故單陽成瘧心槽煩而身面黃小便赤色也

治胃中有熱食已如飢不生肌肉面色萎黃瀉熱湯方

大黃生剉

麻黃去根

黃芩去黑心各肆兩

杏仁去皮尖

赤茯苓去黑皮

甘草剉

陳橘皮去白

芒消

澤瀉各參兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

食後溫服

治胃中熱食已即飢舌強腹脹身重節痛大黃瀉熱湯

方

大黃

細剉水壹升半別漬壹宿

甘草剉各參兩

澤瀉

赤茯苓去黑皮

黃芩去黑心

細辛

去苗葉

芒消

陳橘皮

去白焙各貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓食後溫服

治胃中積熱食已輒飢面黃肌瘦胸滿脇脹茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

去白焙

澤瀉

桑根白皮

剉各兩

芍藥

白朮

各肆兩

人參

桂 去麤皮各貳兩

石膏

捌兩

半夏

陸兩湯洗柒遍

右一十味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入生薑少許同煎至一盞去滓不計時候溫服

治胃中熱盛食已復飢面黃肌瘦唇燥口乾瀉熱梔子湯方

湯方

梔子

赤芍藥

犀角屑

赤茯苓

去黑皮

黃芩

去黑皮

射干

大黃

剉微炒各壹兩

右七味麤搗篩每四錢匕水一盞半煎至八分去滓入生地黄汁一合蜜一大匙攪勻再煎一兩沸食後

分溫二服

治胃中熱盛食已如飢唇燥口乾黃芩湯方

黃芩

石膏 各參分

赤茯苓

去黑皮

甘草剉

葛根剉

五加皮剉

麻黃

去根節各半兩

芫胡

去苗壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至八分去滓食後溫服

治胃中熱盛食已如飢常渴引飲滌熱蘆根湯方

蘆根剉

栝樓根

麥門冬

去心各壹兩

知母

甘草剉各半兩

赤茯苓

去黑皮參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入小麥五十粒

竹葉二七片生地黃一分生薑半分切煎至八分去

滓食後溫服

治胃中熱盛食已如飢多渴心煩肌肉羸瘦黃連丸方

黃連去須

栝樓根各壹兩

麥門冬

去心焙壹兩半

知母焙

茯神

去木各參分

右五味搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大

食後粥飲下三十丸或牛乳汁下亦得

治胃實熱嘔逆不下食犀角湯方

犀角屑

葛根剉各參分

枇杷葉

拭去毛炙黃

麥門冬

去心各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至八分去滓不計時候溫服

治諸黃病眼目已黃丁香散方

丁香

赤小豆

瓜蒂各半

秫米壹分

右四味搗羅為散只作一服溫水調頓服令盡當吐

利黃水兩服永除

黑疸

論曰諸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變為黑疸其狀小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也黃本脾病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎為水藏其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黑大便黑足

下熱是皆足少陰經受病之證

治諸疸久不差變成黑疸當歸湯方

當歸參兩

桂去麤皮

麥門冬去心壹兩

大黃剉炒壹兩

茵陳蒿

黃芩去黑心

黃耆

乾薑炮

赤茯苓去黑皮

芍藥

黃連去須

石膏碎

人參

甘草炙各貳兩

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入大棗

兩枚擘破煎取七分去滓溫服日三一方無黃者

治黃疸變成黑疸醫所不能藥土瓜飲方

治黃土瓜根

右一味每日空心服半盞其病隨小便出即愈然須量病人強壯者可半盞羸人一合如無生者即剉乾者一兩水一盞半煎取七分去滓頓服羸火量減治黑疸身體及大便並黑及黃疸久不差瓜蒂散方

瓜蒂壹分

雄黃醋煮研壹錢

甘草炙剉壹兩

女萎貳兩

右四味搗羅為細散每服一字七用赤小豆二十粒茯苓一分水一盞煎至六分去滓調服須臾當吐吐不止即愈

治黑疸身體黯黑小便澀茵陳蒿丸方

茵陳蒿

赤茯苓去黑皮壹兩

葶藶子微炒各壹兩

枳殼去瓤炒

白朮各壹兩壹分

半夏湯洗去滑柒偏焙

大黃細剉醋炒

杏仁湯浸去皮尖雙炒各參分

蜀椒去閉口及目炒令出汗

當歸切焙

乾薑炮過各半兩

甘遂炮壹分

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如棗豆大每服空心米飲下一十九日三

女勞疸

論曰脾胃素有濕熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸

腎濕氣交攻小水不利少腹堅脹濕毒流散於肌肉之中則四肢身面發黃故謂之女勞疸然其證又有額上黑微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利者宜各隨其證以治之

治女勞疸手足煩熱肢節疼痛小腹拘急時有虛汗鼈甲湯方

鼈甲去裙襴塗醋 芫胡去蘆

茵陳蒿 地骨皮 赤芍藥

梔子人 黃耆剉 麥門冬去心焙

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時候溫服

治女勞疸苦參丸方

苦參兩 龍膽貳兩 梔子人參兩

右三味搗羅為末以牛膽汁和為丸如梧桐子大每服二十九溫水下二夜一稍加至四十九

治女勞疸身目皆黃發熱寒小腹滿急小便難由大勞太熱房室傷損得之消石散方

消石 礬石熬令汁枯

右二味合研為散每服一錢匕用大麥煮稀粥飲調下蓋衣出汗其病隨小便出者色黃大便出者色黑

治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足俱熱小便亦澁

犀角湯方

犀角鎊

龍膽各壹兩

升麻

甘草炙各半兩

麥門冬去心焙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎同煎至七分去滓入生地黃汁一合食後溫服

治黃疸病日晡即發惡寒小腹滿急體黃額黑大便黑

澹泄足下熱此為女勞疸腹滿者難治一石散

石膏各壹兩碎

右二味同研令極細每服一錢匕用大麥煮稀粥調

下日三小便利即差

治女勞疸身目俱黃惡寒發熱少腹滿急小便難滑石

散方

滑石壹兩半

礬石熬令汁盡壹兩

右二味研羅為散每服二錢匕以大麥粥飲調下不

拘時候小便出黃水為度

又方

亂髮如雞子大

豬脂斤

右二味同於鑊內以微火煎令髮消盡不計時候以

溫水調下一匙匕以小便利為度

治女勞疸額上黑汗出手足中熱四肢煩疼薄暮發熱
小便自利龍膽湯方

龍膽去蘆頭

甘草炙

麥門冬去心焙

此胡去蘆頭

升麻

犀角鎊各參分

牡蠣壹兩燒研如粉

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入生地黃汁半合更煎一兩沸不拘時候溫服

治女勞疸額上汗出四肢虛煩日晡發熱小便自利牡

蠣湯方

牡蠣燒令通赤

龍膽

升麻

大麥門冬去心焙

甘草炙各參分

犀角鎊半兩

藁本

桂各半兩

右八味搗篩為散每服四錢匕水一大盞煎至八分

去滓熱服溫覆即避風寒

大德重校聖濟總錄卷第六十



...

...

...

