

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十五

明周王朱橚撰

嬰孩吐瀉門

冷吐 附論

冷吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷之氣入於乳
令乳變敗兒若飲之則冷氣入胃故成嘔吐其青涎夾
絲吐出是也治之當令乳母捨去舊宿敗乳然後服藥

用醞乳法以療之楊氏云乳母服香蘇散夾和灌香正氣散姜棗煎服逐去寒邪次服理中湯加丁香木香煎服以溫養乳母

方

聖石丹 治小兒胃氣不和乳哺重疊及食入不消或呼吸風冷即令嘔吐若不止最為大病胃氣虛嘔吐久差神驗

真陽起石 半夏洗七次焙各半兩 人參去蘆 木香

白茯苓 母丁香各一兩 礞石炭灰燒一伏時四兩 不灰

木炭灰燒一伏時二兩 杏仁同巴豆製 巴豆各一七個上同連皮燈上煉為

度研末 阿魏研一錢

右先將八味搗羅為末次用杏仁巴豆阿魏研末同入湯泡炊餅和丸如龍眼大每服一粒水一盞入生姜一皂子大同擘碎煎豆分溫服須於銀器中煎藥石器亦得

治胃寒嘔吐方

金液丹 青州白丸子

右合和為末麩糊再丸如米大米湯送下仍服助胃膏

助胃膏 治小兒冷氣入胃嘔吐不已

人參去蘆 白朮 白茯苓 甘草炙各半兩 砂仁拾四

個 白豆蔻十四個 木香三錢炮 丁香半兩 乾山

藥一兩 肉豆蔻四個炮

右為末煉蜜丸如芡實大米湯下一歲服一丸加一霍

香陳皮

丁香丸 治小兒胃虛腹疼吐逆

丁香 木香 藿香 牛黃各半兩 腦麝一錢 膩

粉少許

右為末麩糊丸小豆大熱湯化一丸服之

金鍼丸 治小兒冷氣吐逆不止心胃痞滿

陽起石 杏仁十五枚湯浸去皮尖雙仁砂 不灰木生研半兩

阿魏半錢 巴豆去皮膜十二枚

右除巴豆杏仁別研外為末後入二味再研勻以糯
米飲丸如雞頭子大焙乾每服一九用鍼穿燈焰上
燎透為度入鹽少許研細冷姜湯調下量大小加減
以意

溫脾散 散寒濕治嘔吐

厚樸

去皮塗姜汁
炙香熟一兩

丁香

白朮

乾姜

各半
兩

肉桂

一分

右為末每服一錢煎人參湯調下

中結丸 治脾胃冷吐逆水食不下噎妳此因乳母多
食酒肉淹藏毒物得之

禹餘糧

火煨赤米
醋滓半兩

巴豆

麩裏煨
七粒

硃砂

皂子
大

定粉

炒二
錢

麝香

少
許

右為末蒸餅為丸如菜豆大每服三五丸遠志湯下
流星散 治小兒胃氣虛冷痰吐嘔逆

半夏

十四個大
者生用

胡椒

四十
九粒

右為麤末每服半錢水一盞入生姜一片油一滴煎

至四分去滓溫服

橘皮湯 治小兒嘔吐膈上有冷

陳橘皮 湯浸去白焙

細辛 去苗葉

乾姜 炮製各分

大黃

剉甘草 炙各三分

右麤搗篩每服一錢水七分盞煎至四分去滓溫分

三服一日令盡更令兒大小以意加減

瑞蓮散 治脾胃一切虛寒嘔吐不食並皆治之

石蓮肉 一兩

木香

丁香 各二錢半

人參 二錢

澤瀉

三錢

訶子肉 一個

紫蘇子 炒半兩

肉豆蔻 二個煨

白芷 半兩

陳皮 五錢

右為末每服一錢姜棗湯下

熱吐 附論

夫小兒熱盛患極熱而吐更下熱藥脾胃熱而胃口閉所以吐傷水穀不通及下湯藥乳食只伏在管胃口不開脾胃伏乳食上下不動若下取藥胃口不開只在胃膈不上不下乃是結腸翻吐候也歌曰得患初因是熱復

熱極吐逆也尋常候人最是庸醫見熱病仍將熱藥嘗致令胃閉并腸結莫服冷藥不須涼若還更服兒當死先須開胃後通腸

方

辰砂丸 治胃熱吐逆不止及驚風涎盛潮作

辰砂 別研

水銀砂子 各一分

牛黃

腦麝 別研各半錢

生犀 末

天麻

白僵蠶

酒炒

蟬殼

去土

乾蝎

去毒

炒麻黃 去節稱

天南星

湯浸七次切了焙乾稱各一分

右為末再研勻熱蜜丸如菜豆大朱砂為衣每服三丸或五七丸食後煎薄荷湯送下

保命膏 治吐逆不定服熱藥過多不能瘥者

丁香 山大戟

大黃

炮 不灰木

燒紅放冷

甘遂

各一分已上俱為細末

朱砂 細研

水磨雄黃

細研水飛各半兩

粉霜

水銀

用結錫砂子各一錢重

巴豆

去皮心膜不出油研細十

箇

右都研勻用黃臘四兩銀石器中鎔攪成膏旋取和

丸如黍米大每服未周晬一粒二三歲兩粒四五歲
三粒六七歲五粒十歲已上七粒用新汲水下

清膈飲 治小兒伏暑嘔吐者最宜服之

淡竹葉

去枝梗剪
葉焙令乾

香薷

各一兩

檀香

人參

去

頭

半夏

湯洗
七遍

白茯苓

甘草

各半兩

白粳米

合一

右為麤末每服一錢水一大盞煎至六分去滓溫服
量兒大小以意加減一方薑棗煎

益胃湯 治胃虛挾熱嘔吐不止

丁香

人參

去蘆頭
各一兩

訶藜勒皮

一分

官桂大

黃

此黑黃
各十兩

右為末細每服一錢水一小盞入生薑二片煎至五
分去滓溫服下

妙聖散 治小兒胃熱吐逆

龍腦

粉霜

膩粉

滑石

各等分

右研為細末麪糊為丸如菜豆大每服一九煎乾

柿湯下不拘時候

麥門冬散 治小兒嘔吐心胃煩熱

麥門冬 去心 焙

厚樸

去粗皮 塗生姜 汁炙令香熟

人參

右為散每服一錢水一小盞入生薑少許棗二枚粟米五十粒煎至四分去滓放溫量兒大小漸漸與服

又方

麥門冬 去心 焙

甘草

炙微 赤剉

人參

去蘆 頭

陳橘皮

湯浸去白 瓢焙各一分

右為散入淡竹茹茆一根分剉碎每服一錢水一小

盞入生薑少許煎至五分去滓稍熱頻服量兒小大

以意加減

香茹散 治小兒熱吐秋夏多伏暑出有黃涎頭額溫

至心熱小便赤澀或乾嘔無物霍亂吐瀉轉筋腹痛

宜服此乳母同之又宜服露飲

香薷 一兩

厚樸 製

白扁豆

各兩

右先用薑汁四兩又杵厚樸令細炒令赤色入香薷

扁豆搗都為末每服五錢水一盞酒一盞共煎去滓
入甕瓶內蠟紙封沉入井中候極冷取出一瓶服加
減兒母同

甘露飲 治證同前

方見本門霍亂吐
利類一名玉露散

蘆根粥 治小兒嘔吐煩熱渴

生蘆根

剉二兩

粟米

一合一方
作糯米

右以水二大盞煎至一盞去滓投米作粥入生薑蜜
汁少許服

甜消散 治小兒風熱吐不止

甜消

一錢

滑石

白膩者
半兩

右為散每服半錢用漿水半盞入生油一點打勻調
下極者三服必定兒大者每服一錢忌生魚菓實
治小兒壯熱嘔吐不飲食驚癇方

以葛粉二大錢水合調勻瀉銚鐸中傾側令偏重湯
中煮令熟以米飲相和令下之

清胃散 治小兒熱吐

用生薑薄切以生麩拌晒極乾各焙為末以紫蘇湯調下

治熱吐兼利方

用敗毒散五苓散陳米煎服凡夏秋吐利多是母感冒暑毒必脉虛面赤自汗身熱惡寒煩渴證治與此熱吐或利同

夾驚吐 附論

小兒吐乳早則發熱則是驚吐而不睡是也此由胃氣

實其乳或氣不定或食交乳或怒未息或成房事因以乳兒到劃然便吐吐出乳若不變色無害若色青黑或如水或其中有蟲者須溫中以溫物煖其腦後避惡風吹其風府也既生其氣又溫其上焦吐即止也更宜與調劑以療之善歌曰吐乳從來胃氣實乳滿胃中生吐逆吐多徧身有氣熱驚邪本是從斯得治法過後腦溫和吐乳須教無變色先與定氣後除驚如此醫流無費力

方

歸命丹 治夾驚吐嘔不止

丁香 藿香 各一分 生犀 牛黃 各半錢 猪膽

狗膽 蝟蟾 熊膽 鯽魚膽 各等分共秤取半兩

右末和丸如菘豆大量兒大小加減一歲以下煎苦棟湯研下二丸已殊聖方歌曰小兒驚嚇吐還頻晝夜連連不暫停綠水槐黃泔散汁虬蟲乳食一時噴藿香研共生犀角五膽牛黃立有勳若有得逢如此藥直饒命困却還魂

三香丹 治夾驚嘔吐不定

藿香葉 丁香 各一兩 半夏 湯洗七遍焙乾半兩已上並為細末用

膩粉 各一分 龍腦 麝香 當門子各一錢

右同拌勻取生薑汁打麩糊和丸如黍米大每服十粒入人參薄荷湯下量兒大小加減

人參温中湯 治小兒驚吐熱吐心神悶亂中脘不和漸加恐悸恍惚無定

人參 白朮 白茯苓 半夏 湯浸七次 陳皮 肉

豆蔻 煨各分

右為細末蒸棗肉為丸如麻子大朱砂為衣藿香生薑湯下三五十九不拘時候多服勿慮

藿香湯 治驚吐諸吐

藿香 三兩

白扁豆 薑製

白茯苓 各兩半

甘草 炙一兩

右剉酒水煎子母同服

定吐丸 治小兒驚食胃脘不快吐逆乳或心胃發熱

丁香 二十一枚為末

蝎稍 四十條

半夏 三個洗焙乾為末

右研勻煮棗肉丸如黍米大每服七丸至十九金銀

湯吞下如傷暑藿亂吐瀉煎藿香散送下

睡驚丸 治熱化痰涎鎮心神止驚悸吐逆

半夏 末薑製

乳香 末

犀角 末各一錢

右以生薑自然汁煮麩糊為丸如菜豆大每服七粒

至十粒薄荷水夜卧服

四季散 治久患翻胃及驚吐諸吐

上好硫黃 半兩細研

水銀 同硫黃再研無星一分

生薑 四兩取汁

右同研如黑煤色每服三錢入薑汁并酒一盞同煎
熟調藥空心服用衣被蓋覆半日汗出即瘥有人患
反胃三年不瘥治療百端無一驗者持此藥與服汗
出如膠腥穢不可近後更不復吐其神効如此又須
量兒大小服一錢至一匙冷水調下此藥難調須先
滴水少許以指緩研碎稍增湯始令調和若入湯酒
則浮泛不可服矣一方無生薑

毒氣吐

附論

小兒服湯中毒氣吐下俟春夏以湯下蓋由腸胃脆嫩
不勝藥勢遂吐下不止藥勢熏臟腑乃煩懊頓乏者謂
此為中毒毒氣吐也

方

藿香湯 治小兒毒氣吐下腹脹逆害乳哺

藿香

一兩

生薑

三兩

青竹茹

甘草

炙各半兩

右以咀以水二升煮取八合每服一合日三有熱加
升麻半兩

消妳毒方 令小兒喫妳無毒

升麻 劉半兩

大麻子 搗破一合

右酒浸每早晨與妳一盞喫了要乳時須先稔去此少方與兒喫并兒有毒亦解

吐利 附論

夫吐利者由腸虛而氣逆故也小兒有解脫而風冷入腸胃虛則泄利胃氣逆則嘔吐此大體與霍亂相似而小輕不劇悶頓故直云吐利不呼為霍亂也 歌曰小

兒吐利早須醫只是腸虛逆氣為更有中他湯藥毒必加煩燥在心脾

方

掌胃膏 治小兒脾胃虛弱嘔吐泄利

人參 白朮 白茯苓 去黑皮 甘草 炙 肉豆蔻

麩裏煨 白豆蔻 陳皮 草豆蔻 去皮 批把葉

去毛 青皮 去白 丁香 沉香 木香 藿香葉

縮砂仁 各等分

右為末煉蜜丸如龍眼大每一丸食前米湯化下日

二服

助胃膏 治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脇脹滿腸鳴

泄覘乳便青或時夜啼胎寒腹痛

官桂 去皮

白茯苓 去皮

白朮

藿香葉

縮砂仁

各三兩

白豆蔻仁

肉豆蔻 煨

木香 各一兩

各一兩

丁

一兩

甘草 炙剉

二兩

橘紅 去白

山藥 各四兩

各四兩

人參

一兩

右為細末煉蜜和膏丸如雞頭大每服一丸量兒大

小加減米飲化下不拘時侯

參苓散 治吐瀉

人參 白茯苓 山藥 乾葛 麥門冬 去心 黑

附子 炮去皮臍

桔梗 去蘆

甘草 炙各半兩

蓮子心

木

香 不見火

藿香葉 一分

右為末每服一錢紫蘇米飲調下

醒脾散

人參 五錢 去蘆

丁香 一錢

赤茯苓 五錢

藿香葉 五錢

白朮 五錢

白殭蠶 二錢 炮

甘草 炙三錢

木香 二錢 炮

厚朴 薑製

南星 大者二個

縮砂仁 一兩同南星炒

右剉薑棗煎燒鹽服

醒脾湯 治小兒吐瀉脾虛多困不思乳食欲生風侯

人參 白茯苓 白朮 山藥 白扁豆 炒 白

附子 藿香 白殭蠶 甘草 升麻 酸棗仁

各等分

右為末三歲一錢冬瓜子三七粒水半盞煎至三分

去滓服仁劑消風散最治吐瀉生風多困加硃麝

香朴飲子 治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚狀

人參 茯苓 甘草 紫蘇葉 木瓜 澤瀉

香薷 半夏麩 白扁豆 炒 陳皮 烏梅肉

厚朴 炒各四錢

右為末每服一錢薑棗煎服

治小兒直腸泄瀉水穀不分小便不利口乾作渴

人參 白朮 白茯苓 木香 訶子麩裹 砂

仁 陳皮炒 瞿麥炒 車前子去心各等分 甘草

減半用

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分量兒大小無時服

小兒青糞者冷也亦是肝尅脾之證也肝屬木其色青脾屬土其色黃糞黃者脾家之本色也若脾受肝尅則其糞青肝木主風宜早治之不爾成脾風發癇也然所

謂青糞才下便青若初下時黃良久乃青小兒安樂者皆然不可認為青糞也可服白附子丸羌活膏

白附子丸 治小兒青糞及吐而有冷證者

白附子一分為末 舶上硫黃 半夏米兩生為細末用生薑自然汁

和成劑藥作小錢大餅子沸湯內下候煑熟不麻入為度取取研成膏

右加蝎稍末一分同研勻入在半夏膏內和冷得所乾即添湯丸如蘿蔔子大每服三十五粒米湯或乳汁下

羌活膏 治小兒胃虛吐瀉生風

羌活 天麻 防風 人參 茯苓 蝎

桂 各一兩 硃砂 一錢 水銀 一錢 硫黃 一錢 同研

右先將八味為末入水銀硫黃研勻煉蜜為膏每服一皂子大用荊芥薄荷湯化下食前服更量度加減

醒脾散 治小兒吐瀉脾困不食痰作驚風

全蝎 白附子 天麻 甘草 人

參 白茯苓 石昌蒲 木香 蓮肉

白朮 各一錢

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一個煎服有熱者去木香一味加南星半夏陳米

大醒脾散 治證同前如兒不肯服藥令乳母服後即

仰卧片時乳兒

南星 白茯苓 橘紅 全蝎 甘草

白附子 蓮肉 人參 木香 陳

朱 二百粒

右為末每服一錢水一小盞薑三片棗一個煎服

木香散 治諸般瀉利久不瘥者並皆治之

白朮

炒 麩

麥芽

木香

人參

陳紅麩

各一錢 用白朮

炒

茯苓

神麩

甘草

青皮

各二錢

當歸

一錢

右為末每服半錢白湯下一方用紫蘇木瓜湯調下

加減觀音散 治小兒食瀉及調理脾胃宜常服之

白扁豆

蒸

白朮

炒

人參

白茯苓

乾山藥

黃耆

蜜水 炙

甘草

神麩

麥蘖

香附子

炒去 毛各

等分

右為末空心米湯調下此藥宜常服取後復補

調中散 治脾胃不和霍亂吐瀉

人參

白茯苓

白朮

木香

炮

乾薑

炮

藿

香葉

香附子

炒去 毛

縮砂仁

甘草

炙

丁香

不焙各 等分

右為末薑棗煎大小以意加減或肚疼急以白湯調

下

參朮散 治小兒吐瀉亡失津液煩渴心躁不食多服

尤妙

人參 白朮 白茯苓 山藥 白篇豆炒 乾

葛 藿香 甘草炙 丁香 訶子炮去核 各一分

右為末三歲一錢水半盞生薑二片煎三分食前如

渴速進三五服

羌活膏 治小兒吐利不止煩渴悶亂欲成脾風手足

微搐但非次發熱不能辨認證候請於一中時併服

隨手有應冬末春初最宜頻服

羌活 獨活各去蘆頭 人參切 白茯苓去皮切 天

麻炙 乾蝎 青黛研各一分 腦射各半錢研 水銀

硫黃各一錢 結沙子

右為末研勻煉蜜丸皂子大捻作餅子五七歲每服

三餅三二歲二餅一歲半餅一餅如發熱煎荊芥湯

下或乳香湯手足飲冷人參生薑湯下舊方有丁香

而無龍腦青黛此方去三物亦不曾入丁香三二歲

兒每服止一餅恐大寒也若吐甚丁香湯化下亦佳
又方

治小兒因驚發熱涎嗽累經利動或因傷乳食吐瀉後
氣虛弱精神昏倦減乳食手足厥冷脉息微細漸成慢
驚用藥普同

羌活膏 治小兒伏熱吐瀉不定煩渴肚疼

羌活 獨活 人參 防風 肉桂 去皮不見火 硫

黃 錢三 白茯苓 全蝎 各一分 水銀 一分同硫黃研無星

右為末煉蜜丸如雞頭子大三歲一丸薄荷湯化下

食前

和安散 治冷熱不調瀉盛下泄

木香 當歸 川芎 北前胡 柴胡 青皮

比梗 甘草 炙 赤茯苓 各等分

右剉散每服一錢水一盞生薑二片棗二枚煎空心

服

觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進

乳食久則漸漸羸弱此藥主溫養脾胃進美飲食

人參一兩 茯苓一錢 神麴 石蓮肉炒去心一分

綿耆 白芷 木香炮 甘草炙 白扁豆去皮炙焦

令色黃去火毒各一錢

右為末每服一錢水一小盞棗一枚藿香三葉煎四分去滓溫服量兒大小加減一方無藿香煎一方加麥蘖香附子冬炒二錢大抵脾虛則瀉胃俱空吐瀉不已遂成風癇之證矣

和中散 治胃氣止吐瀉

茯苓 石蓮肉各一分 藿香 人參 天麻 白

扁豆製 木香 白朮 甘草炒各半分

右對散每服三匙水煎服

和中散 治吐瀉止煩渴腹痛和胃氣

人參切去須焙 白茯苓 白朮 甘草對炒 乾蝎對

黃耆切焙 白扁豆 藿香

右為末每服二錢水一盞棗二枚薑五片煎至八分

去滓温服之一方無乾葛名減加四君子湯每服一錢鹽點服

玉桂杖丸 治小兒吐瀉胃虛腹脹脾困昏睡不食

茯苓 訶子去核 藿香 丁香各一錢半 人參 木

香 甘草炒各半兩 厚朴薑製一兩

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸白湯化下食前

大安丸 治小兒吐瀉不止

南木香 白芍藥 人參 白朮各一錢 白茯苓

訶子炮 厚朴製 橘紅各半錢

右為細末蜜丸如雞頭子大陳米飲湯化下一二丸

厚朴散 治小兒虛滑利不止

厚朴 可子皮各半兩 史君子一個 棟丁香十個

吳白朮 茯苓 青皮各二錢 甘草二寸炒

右為末每服一匙量兒歲加減用清米湯下

訶子湯 止瀉及治臟寒泄瀉

訶子炮肉

人參

白茯苓

白朮

各一兩

木香

炮半

兩

陳皮

去白半兩

甘草

炙半兩

豆蔻

半兩

右為末薑煎若久瀉手足厥冷加附子大小加減服之

人參散 治小兒臟寒泄瀉

人參

木香炮

白朮

白茯苓

各一錢

山藥

一分

肉豆蔻

一個炮

附子尖

炮一錢

甘草

炙半錢

右為末薑棗煎量兒大小加減服之

妙丸子 治小兒吐瀉并傷食腹痛不思乳食兼吐哕

丁香

藿香葉

木香

白茯苓

官桂

去皮

青

礞石

代赭

各一錢

巴豆

二七粒大者去皮心膜紙上壓去油

右為末酒糊丸如芥子大一歲二丸薑湯下或藿香湯食前不得喫物須權住乳効恐乳多再吐如傷食瀉與五七丸利下食次與益中膏

木香散 治小兒脾胃虛弱瀉泄飲食不進

木香

藿香葉

青皮

去白

甘草

丁香

香附

子 益智仁 各半

縮砂仁 一兩

薑黃 一錢

右為末甘草末一兩每服一錢紫蘇湯調下食前大人用每服三錢

濟世丹 治小兒吐瀉并百物所傷驚疳潮熱

木香 五靈服 一錢

肉豆蔻 二個

胡椒 一錢

丁香

一錢 全蝎 二錢 巴豆 四粒去油存性

硃砂 半錢為衣

右為末糊丸如蘿蔔子大每服二三十丸米湯下

訶藜勒散 治小兒脾胃氣弱不欲乳食四肢不和吐

利不止者

訶藜勒皮 陳皮 去白各半兩

黃耆 去蘆頭

藿香葉

赤茯苓 白朮 桂心 甘草

右為麤散每服一錢水一小盞入生薑少許棗一枚同煎至五分去滓食前溫服

感應丸 治小兒脾虛屢有暴傷糞白腥臭水穀不分

肚腹疼痛吐瀉不定

百草霜 二錢 杏仁 七個去皮火

丁香 七粒

肉豆蔻 一個

木香 一塊如棗大

乾薑 炮一塊如棗大

巴豆 七粒去黃殼去油

蠟 二棗大酒煮蠟鎔酒冷臘浮於取用

右為末酒蠟搗三二千下成劑入磁器中每服三歲五瓦小豆大乾薑湯下食前此藥不損氣亦不吐瀉只磨積滯

碧香丹 治小兒吐利後大渴不止得眠睡甚則成疳

天竺黃 不灰木 燒赤放冷 赤石脂 龍骨 各一兩

鐵粉 定粉 鉛白霜 蛤粉 各一兩細研

右為細末以先四味後入霜粉四味更加麝半兩研滴水和丸如雞頭子大每服一九至二丸用蛇螺兩個研細沸湯浸水沉極冷化下大渴即令服神驗
治秋深腹虛吐利無時喫食微細面目黃腫方

胡黃連 丁香 馬牙硝 蜜陀僧 各一分 訶子

五分 豆蔻 二個 檳榔 一個 麝 少許

右為末以蒸餅酒浸為丸如棗豆大每服三丸陳米飲下日三服五歲五丸止吐用楠木湯下止瀉用棗

豆湯下

醒脾散 治小兒吐瀉脾困多睡不思飲食

人參 木香 茯苓 陳皮去白 甘草炙 草豆

菹去皮 厚朴用銅砂一錢膽水一碗入此二味煮冷乾切細却焙已上各一分

白木半兩

右為細末每服一錢以冬瓜子煎湯下

勻胃散 治三焦不調停寒膈上乳哺不消胃月痞滿

甚則喘逆吐利肌體痿黃

甘草一分炙 藿香葉兩 白豆菹兩 人參去蘆頭一

兩一方 木香炮半兩一方用一錢 乾薑炮半兩一方用一錢 厚

朴去粗皮薑製半兩一方用一方 丁香半兩

右為細末每服一錢水一小盞入生薑二片煎至六

滓溫服一方為末薑棗鹽湯或紫木瓜湯點服兼治

霍亂

草豆菹散 治小兒吐利兼胃脇脹滿

草豆菹去皮 木香 五味子 人參去蘆頭 白茯苓

苓 陳橘皮

湯浸去白勳 焙各一兩

訶藜勒皮

甘草

炙

赤剉各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

俟稍熱服隨兒大小以意加減

訶梨勒 治小兒吐利腹脇虛滿

桂心

一分

訶藜勒皮

人參

去蘆

甘草

炙微赤剉

白

木 厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

陳橘皮

湯浸去白瓢焙已上各半兩

兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

俟稍熱服之量兒大小加減

增減神妙方 治小兒下利及吐兼驚

大黃

二朱

鈎藤

六分

黃耆

細辛

半分

蛇蛻

一寸炙

蚱蟬

二個炙

甘草

一分炙

右切以水一升半煮五合絞去滓研牛黃五大豆許

入湯中一服一棗許日三夜更用艾炙兩耳前三炷

必瘥無牛黃麝香代之十日以止吐以意量之二十

日全愈

人參異功散 治小兒瀉利止嘔逆順氣補虛

人參 一錢半 白朮 半兩 青橘皮 陳橘皮 茯苓

甘草 各一分 豆蔻 三個入呵子

右為末每服一錢陳米飲調下如秋間冷則加訶子
春夏不用或用紫蘇木瓜煎七沸半盞末半錢或加
至一錢逐日早服如傷風及諸般傷寒此藥亦能和
正氣俟然後以紅綿散治之無不効者

醒脾散 治小兒吐瀉脾困及脾胃怯弱為風冷所乘
體熱頭疼霍亂

人參 二錢 丁香 二十粒 白茯苓 白朮 各一分 藿

香 甘草 炙合一錢 天南星 一個七八錢重去心用縮砂仁入在天南星內

麩裏煨熟麩焦為度去麩不用

右為細末每服一錢水六分生薑三片冬瓜子十四
粒同煎三分溫服不拘時

紫霜丸 治小兒吐瀉

代赭石

陳皮

去白巴豆半錢重同炒乾巴豆去棄

木香

杏仁

去皮火研各一錢

肉桂

去皮不見火

丁香

各半錢

藿香葉

二錢

右為細末粟米飯為丸小菜豆大每服七粒藿香湯下吐瀉以藿香橘皮湯下吐煎棗子湯下

溫脾散

治吐利不進乳食

蒼朮

二錢細剉先以油葱炒令赤

陳皮

草果仁

不炮去皮用

桂心

不見火各五分

桔梗

甘草

炙各一錢

右為末每半錢棗湯調下

銀白散

治小兒胃氣不和吐瀉不止痰逆不進乳食

平胃引行諸藥

半夏

一兩湯洗七次焙乾為末姜汁製為餅子

白菡豆

微炒

罌粟子

人參

去蘆洗

白朮

洗剉焙

山藥

白茯苓

各四錢

右為末每服二錢水八分一盞生薑二片棗一枚煎至

六分溫服

桑葉膏

治小兒伏熱吐瀉渴腹疼肢冷

水銀 硫黃 各一錢 同研黑 丁香 槐花 蜜炙 沙 藿香

葉 蠟茶 各十分 滑石 三錢

右為末煉蜜和丸如雞頭子大三歲一丸煎桑葉湯食前化下

平胃散 治小兒伏熱吐瀉煩渴腹冷痛

水銀 硫黃 各一錢 同研黑 訶子 炮去核 肉豆蔻 炮

桂 去皮 草豆蔻 去皮 附子 炮去皮臍炙 已上各一錢

右為末煉蜜丸如雞頭子大三歲一丸米湯調下食

消食丸 治小兒吐瀉不定傷食腸痛可食亦治瀉利

丁香皮 縮砂 甘草 甘松 蓬朮 益智 各一

兩 香附子 二兩一方加 神麴麥蘖

右為末糊丸小豆大三歲三十九丸米湯下

益中膏 治小兒吐瀉脾虛全不食腹脹肚疼困倦

丁香 二錢 縮砂 一錢 訶子 炮去核 甘草 半兩 炒 青

橘皮 半兩 炒 陳皮 一兩 炒 內豆蔻 二錢 炒

右為末煉蜜丸如雞頭子大三歲一丸白湯磨下肚

腹脹不思飲食大便米穀不化夜起者連進三服立効

人參膏 治小兒吐瀉脾虛困倦不思乳食腹痛滿加

沉香

人參 訶子炮去核 木香 肉豆蔻 丁香 藿

香 硝砂 甘草炙各一錢

右為末煉蜜丸如雞頭子大三歲一丸白湯下食前空心服

白朮散 治暑瀉身熱發渴不問陰陽虛實並宜服

白朮一兩本用半兩今增 人參一兩 木香炮半兩 白茯苓

甘草炙半兩 藿香葉半兩 葛根一兩本用二兩今減半

右以咀水煎冷服一方無木香一方以咀咀每服二錢水一盞煎至半盞量大小與服仍用香連丸間之渴欲飲水者時時煎服取意飲之彌多彌少一方白

朮散治嘔吐用白朮人參各一兩半夏兩半茯苓乾薑甘草各半兩薑棗煎 錢氏方謂小兒吐瀉當溫

補之每用理中湯以溫其中五苓散以道其逆連進數服兼用四君子湯加橘紅等分調之名異功散若吐瀉之後已覺虛損若因虛發熱必作慢風急用金液丹雜青州白丸子等分為末米飲調服此方多服為佳若胃氣已生則旋減金液却以異功散等分藥徐調理之不因吐瀉後忽因驚發搐搦者名急驚風則服大青膏奪命丹等 有因傷食并傷風發熱驚跳搐搦如風者是瘡疹之候宜服參蘇飲仍於惶

惶散方中求之 若食不化脾胃虛寒嘔吐惡心者當服益黃散用陳皮半兩青皮詞子肉甘草各一分丁香一錢量大小煎服 小兒暑月吐瀉其證不一有伏暑小便必不利宜服五苓散有傷食者其吐并糞必酸臭氣宜服紫霜丸 有因驚者泄瀉其色必青宜服睡驚丸 有虛冷者泄瀉無度或復自利宜以六神湯加附子服之用人參茯苓山藥白朮白朮篇豆甘草等分薑煎服風証於六神湯中加天麻痢

加罌粟殼熟痢當用斷下湯中治法 若吐瀉初定
 當單以天南星為細末每服用冬瓜子仁七粒煎服
 以防變痢有霍亂吐瀉諸藥不納者用胡椒菜豆各
 十九粒研破水煎服 小兒之病與大人無異用藥
 一同得當量力服之唯回氣臍風夜啼重舌變蒸客
 忤驚癇解顱魁病疳氣不行等大人無之自有專科
 不敢濫及 海藏云四君子湯加減治法濕勝氣脫
 泄利大過

木香丸 治小兒泄瀉不止進食和氣 方見本門噦噎類一名木香豆

菹丸

荳菹丸 治痘疹泄

木香 縮砂仁 各二錢 白龍骨 訶子肉 各半兩

赤石脂 枯白礬 各七錢半 肉豆菹 半兩

右為末麵糊丸如黍米大每服三十九至五十九煎
 異功散下或瀉水穀白色淡黃木香散

雞舌香散 治小兒吐瀉

良薑 香附子 天台烏藥 辣桂 各二錢 甘草

微炙 陳皮 藿香 各一錢

右為細剉每服一錢水煎灌下仍別前與乳母服

沉香散 生胃氣止吐瀉

茯苓 二錢 沉香 丁香 木香 藿香 川厚朴

製 甘草 各一錢

右為末每服一匙米飲調下

惺惺散 治小兒吐瀉脾困內虛

人參 茯苓 木香 天麻 白扁豆 陳米 炒

全蝎 焙各等分

右為末每服半錢薑棗畧前服

助胃丹 治小兒泄注不止手足厥冷及霍亂吐利

附子 一枚重半兩炮製去皮刺 舶上硫黃 乾薑 肉豆蔻

肉桂 白朮 各半兩

右為細末麩糊丸如黍子米大每服十九米飲下食

前

木香益黃散 治胃虛腹痛泄利

陳皮一兩 青皮 訶子肉微炒 丁香二錢 木香

甘草炙各錢半

右為細末每服一錢陳米少許水煎服

六神散 治吐瀉胃氣不和不進飲食

人參半兩 甘草二錢 山藥半兩 白茯苓 白扁豆

炒各一兩 白朮半兩

右為末每服一錢薑棗煎服吐瀉後發搐加天麻更

瀉不止加白豆蔻 治吐逆瀉利入藿香陳皮少許同煎湯風即入香白芷桔梗渴即加

乾葛小兒加減服

固腸丸 治小兒脾胃不和腸滑泄瀉

木香 肉豆蔻麩裏煨以麩熟為度去麩 縮砂仁 赤石脂

厚朴薑製 川薑各等分

右為細末麩糊丸如黍米大每服三十九丸乳食前

煎草節湯下

香橘餅子 治食瀉

木香一分 青皮一分 去白 陳皮一分 去白 厚朴三分 製

神麴半兩 炮 麥蘖半兩 炒

右為末煉蜜丸如芡實大煎石香薷湯化下一歲一丸

嬰房散 治小兒久新吐瀉不思乳食或成白痢

嬰粟殼一兩 炒 陳皮一兩 炒 訶子一分 炮 去核 縮砂

仁 甘草二錢 炙

右為末三歲半錢米飲下食前

沉香散 治小兒吐瀉不思乳食腹滿

沉香 丁香各半 兩 木香 藿香葉 甘草炒

縮砂仁各一兩

右為末三歲半錢紫蘇木瓜湯調下食前

人參散 治小兒吐瀉煩渴不止兼虛執踈轉後可服

人參 茯苓 桔梗 乾姜各半 兩 生犀角屑

甘草各一分 炙

右為末每服一錢水一盞入燈心五莖煎至五分煩

渴入新竹葉煎服大小以意加減一名犀角 人參散

調男

人參去蘆 白朮炮 丁香各一兩 乾姜 甘草炙

赤茯苓各半兩

右為末鍊蜜丸如皂子大每服一粒熱湯化開新水或冷沉令極冷即服

木香散 治小兒腹脹瀉渴此藥性溫暖和平能和表裏通津液清上實下扶助陰陽

木香 丁香 官桂 人參 大腹皮炒一用子 陳

皮 訶子肉 前胡 半夏製姜汁浸 甘草 茯苓

各等分

右以咀每服三錢水一盞薑三片煎六分稍熱服量大小加減服之

調中六神散 治小兒或吐或瀉脾困不進乳食或驚風傷風傷風潮熱或喘後出汗

白朮 茯苓 甘草 藿香葉 草果子各一分

丁香二錢

右為細末每服一錢紫蘇米湯煎下兼治氣不勻疴
瀉利妙

沉香飲子 大治吐瀉

沉香 丁香 藿香 各半錢一方用一分 檳榔 二個一方用一個

肉豆蔻 二個 甘草 炙一錢一方用一分

右為末每服一大錢水一小盞入老薑一小指大槌
碎同煎三兩沸去滓溫服

人參散 治脾胃氣虛吐瀉

人參 白茯苓 白朮 乾葛 陳橘皮 去瓢 厚

朴 薑汁塗炙 各等分

右為末每服半錢用百沸湯點量大小服之

人參散 治小兒吐利發熱不欲乳食

人參 半兩去蘆頭 一方用四兩 乾薑 製炮 剉 桂心 各一分一方用各三

分 甘草 一分炙微赤剉 一方用各四兩 黃芩 二分一方用六分

右為末散每服一錢水一小盞棗一枚煎至伍分去
滓不拘時稍熱服量大小加減

白朮散 治小兒冷熱不和吐利不止

白朮 木香 丁香 陳橘皮 湯浸去白 剉焙各一分 麥門

冬 三分去心焙

右為散每服一錢水一中盞煎至五分去滓不拘時稍熱服量兒大小以意加減

丁香散 治小兒吐瀉

丁香 二七粒 肉豆蔻 一個 木香 半錢 藿香 桂心 各半錢

右先將前三味研用醋麩裏熟灰煨令麩赤色去麩不用次同藿香桂心為末每服一匙半錢用陳米煮飲調下

醋酒白丸子 治小兒吐利中寒并各忤

半夏 先 人參 各三分 桔梗 附子 炮去皮臍 乾薑 各四分

右以為末以苦酒和丸如小豆大一服一丸日三此一歲服法

降靈丹 治小兒非時吐瀉腹脹膈痞閉

一名來復丹

舶上硫黃 雪白硝石

二味各一兩並於沙石鈹內或銀器用文武火慢炒

鎔令作末子無令火緊大過即不中須傾在紙上於許許之研細末二味先將成末為妙須如法製

連花青皮 久年陳皮

焙乾

上等無石五靈脂

各一

錢

右為細末麩糊丸如麻子大量兒大小加減大人丸如豌豆大每服十五丸空心食前溫米飲下此藥治陰陽不和冷熱相擊榮衛差錯上下隔寒心腎不升

降水火不交養男女老幼一切危證並可救治但醒胃氣在服者無不獲安邪執炎上煩燥及冷熱攻注急痛諸霍亂吐瀉水穀湯藥不過一服即安吐逆唇口青色手足厥冷脚轉筋兼着熱煩躁昏塞倒地不省人事者兩服見效若吐瀉下痢不問赤白冷熱或非時吐瀉氣痞食不下或一丸兩丸化服甚效五十九輕者二十九小兒十九十五丸嬰兒三九五丸因驚成癇發渴多日變成虛風或作慢驚者五七丸併

服其神聖救人隨時變動不能具述

白朮丸 治小兒吐利不止溫胃消食

白朮 木香 丁香 肉豆蔻 黃連 各等分

右為末麩糊 如黃米大每服十九米飲下

雙金散 治小兒吐瀉實脾胃進飲食

丁香 人參 甘草 各一錢 白朮 白茯苓 各半兩

半夏 姜製半錢

右為末每服二錢水七分盞姜二片棗二枚同煎至

四分去滓溫服

厚樸散 治小兒脾胃冷或吐或瀉

厚樸 姜製 白朮 各一兩 神麩 炒 麥蘖 炒各半兩 藿

香 甘草 各一分

右細末棗湯調下

開胃丸 治小兒臟腑怯弱內受風冷腹痛脹滿鳴泄

利或青白乳食不化兼胎寒臟冷腹痛夜啼

白芍藥 麝香 細研各一分 人參 木通 蓬朮

煨

白朮 當歸 炒各半兩

右為末勻湯浸灼餅和丸如黍米大每服十五丸溫米飲下新生兒每服五丸乳食前一方有木香無木通

異功散 治溫中和氣吐泄思食凡小兒虛冷病服之

正氣

人參 茯苓去皮 白朮 甘草炒 陳皮各等分

右為末每服二錢薑五片棗二枚同煎至七分食前

溫熱服量多少與之海藏云四君補脾湯加減法一方治榮衛脾胃弱加白扁豆等分陳米飲調下

木瓜丸 治小兒吐瀉

木瓜一字 麝香 木香末 膩粉 檳榔末各一字

右同研麪糊丸如黃米大每服一二丸甘草水下無時

人參膏 治小兒泄瀉煩喝嘔逆

人參兩一 白朮半兩 丁香半兩 藿香半兩 白扁豆一分

右為末蜜丸如菜豆大或麥粒大量兒大小加減生薑湯下五七丸至十九

厚樸膏 治小兒吐瀉不思食

厚樸 製

訶子 炮去核

肉豆蔻 炮

當歸 各半兩

右為末鍊蜜丸雞頭子大三歲一九白湯化下食前

益黃散 治暑瀉身熱發渴及乳食失節肚痛腹大腸

鳴好食泥土久瀉不止面青肌瘦或食乾嘔久病體

黃口中氣出吐酸水不能消食一切脾胃虛冷宜服

此藥

陳皮 去白一兩

青皮 去白炒半兩

訶子 炮五錢

丁香

甘草 五錢

右為末三歲一錢半水半盞煎三分去渣食前加減服本方陳皮一兩大踈氣若與甘草各減半方按古今用藥不同用陳皮青皮加肉豆蔻累驗若依原方內有青皮陳皮大腹反燥其氣今故加減于方後今又濟患庶得穩當亦不敢去其舊焉一方加木香 半兩

和胃丸 治小兒吐瀉有痰不思飲食困頓欲生風

丁香 藿香葉 蝎尾各一錢 白朮切焙 半夏炮七次各

一兩

右為末薑汁糊丸如小豆大三歲三十九生薑湯服

或乳煎服之

千金丸 治小兒吐瀉腹痛不思飲食及傷食酸餽氣

神麩炒 麥蘖炒各一兩 烏梅肉 乾薑炮 縮砂去皮

各半兩

右為末白糊丸如小豆大三歲三十九食前米飲下

溫白丸 治小兒脾氣虛困洩瀉瘦弱令疳洞利因吐

瀉或久病後成慢驚身冷瘕瘕

天麻 白殭蠶 白附子 乾蝎去毒 天南星各一錢剉

湯浸七次焙

右為末湯浸寒麩丸菜豆大仍於寒食麩內養七日

取出每服七丸至三十九空心生薑米飲漸加丸

數多與服之

桂心湯 治小兒利下吐逆壯熱數日不止不得乳哺

或但羸困欲斃者

甘草 灸

牡蠣

赤煨

芍藥

桂心

各三兩

右為粗末一歲兒水一升內四方寸匕煮三合頓服

日再小兒以意加減此能除熱止利上下神驗

溫白丸 治小兒寒中吐利及容忤

附子 炮

桔梗

各二兩

人參

一兩

乾薑

二分

右為末煉蜜丸二十日兒麻子大一丸五十日兒胡

豆大一丸百日兒小豆大一丸米飲送下

藿香散 治吐利不止

藿香

一兩

丁香

一錢

木香

縮砂

各五分

右為末每服五分水五分煎三分通口服或續加陳

皮甘草人參草果尤妙

附子湯 治吐利過多手足厥冷六脈沉細

生附子

白薑

炮

人參

甘草

各等分

右剉薑棗冬瓜仁煎服

豆蔻散 治吐瀉煩渴腹脹小便少

豆蔻 丁香 各半 舶上硫黃 一分 桂府白滑石 三分

右為細末每服一匙至五分米飲調下無時

木附膏 治小兒吐瀉不定氣粗煩渴眼慢困頓肚疼

不食口鼻氣冷諸藥力不能攻者宜服此

附子 大者一箇泡去皮臍薑汁製浸夏三日 白木

訶子 炮去核 甘草 炙各二錢五分

右為末煉蜜為丸如雞頭子大三歲一丸水半盞煎

三分暑月冷服食前春秋冬溫服危者連進三服小
可吐瀉一服效須是首尾住妳則可

附苓丸 治小兒溇泄小便不利即五苓散加附子

附子 泡去皮半兩 白茯苓 澤瀉 滑石 各三錢

右為末白糊丸小豆大三歲二十九燈心湯下

金液散 治小兒吐瀉危困四肢逆冷口鼻氣冷肚疼

氣急乳藥難進但多灌死中亦得活

硫黃 十兩好者入罐子 水鑑草 一兩把節似花田草一名田草

黃土 同搗為泥其用新益母草泥搗亦得 石龍芮 兩握又名狗啼草

右固濟藥罐子均厚半寸置平地以瓦覆口四面炭火五升擁定以熟火一斤自然之候罐子九分赤口縫有碧焰急退火以潤灰三斗覆至冷剖罐取藥去沉底滓濁依前五煨為定藥如雞卵氣取出罐子埋潤地一宿以水煮半日取藥以柳木槌碎研頻滴水候無滓更研令乾每藥一兩以蒸餅兩浸捻乾同杵為丸如小豆大三歲三十九丸米飲下食前危困連進

十服或為末多灌為妙或用生薑煎米飲調灌之若手足暖陰退陽回即減金液散二分增青州白丸子二分研服

四君子湯 治小兒吐瀉氣虛煩渴此藥生津液養五臟多服妙

人參 白朮 茯苓 甘草 灸各一分

右為末三歲一錢水半盞煎三分食前服如久瀉手足冷或服藥不痊以豆蔻三分水一盞薑一片棗一

枚附子三片煎取一半五歲以上以意加藥假如只
瀉加肉豆蔻煨陳皮厚朴如渴則加麥門冬天花粉
熱則加地骨皮銀柴胡

滯腸散 治小兒腸胃虛寒臟腑久冷泄瀉不止夏月

暴瀉尤宜

真鉛粉半兩 白石脂二錢 白礬焙二錢 白龍骨一錢

右為末每服半錢七歲者一錢溫飯飲調下或薄糊
作小丸多服尤效

朮附湯 治小兒臟腑虛寒泄瀉洞利手足厥冷

附子半箇 白朮一分 乾薑二錢 甘草炙一分

右吹咀每服一錢水一盞煎至半去渣服手足煖止
之須是手足冷洞泄方可

白朮散 治小兒脾胃虛弱吐瀉

白朮 肉豆蔻 甘草 丁香 青皮 茯苓各等分

右為末每服一錢紫蘇湯下或用二錢水一盞薑二
片烏梅半箇棗二枚蘇梗三寸煎溫服

和中散 治小兒脾胃不和嘔逆惡心冷熱不調減食
泄瀉腸鳴腹痛少力嗜卧

厚朴去皮薑製六兩 白木三兩 乾薑炮 甘草炙各二兩

右為末每服一錢水八分益生薑二片煎六分去渣
稍熱服

乳食煎 治小兒吐瀉不止男子婦人大人亦宜服

陳鹽梅兩 乾木瓜三錢 食茱萸 食鹽各二錢

右用鹽炒茱萸水一椀煎半椀不拘熱服

去桂五苓散

猪苓 白木 赤茯去皮各五錢 澤瀉七錢半

右為末用車前草燈心湯下一方加羌活鎮心加茱
萸炒吐不止加生薑自然汁渴盛加人參

肉苳菹丹 治小兒泄瀉水穀不消

木香 肉苳菹各一兩 青橘皮半兩炒黃 黑牽牛一分炒

右為細末滴水如黍米大每服十粒米飲下食前
或生薑米飲須量大小加減

建中丹 治洩注不止啼哭腹痛

胡椒 蓬朮 肉豆蔻 全蝎
各半 兩 一分

右為細末麩糊丸黍米大每服十粒米飲下

藿香散 治小兒脾胃虛弱乳食不調時作身熱或吐

瀉不定

藿香 人參 白茯苓 丁香
各半 兩 一分

右為末每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服不拘
時若傷風熱入生薑一片作驚加羌活防風各半兩

痰逆加湯洗半夏一片薑三片煎服

治百日兒以下吐利方

麩 龍骨
一錢 兩 六分

右為末龍骨煎入炒麩服之

中和散 治小兒未及周晬吐瀉不止因乳母氣血勞

動或熱奶傷胃致有痰涎

雄黃 大黃 五靈脂
少 許 各等分

右同研為末每服一匙磨刀水調下

大白木散 治脾胃氣虛嘔吐泄瀉外熱裏寒手足厥
逆昏困嗜卧面色青白下利清穀不思乳食

甘草 二兩 炙

乾薑 一兩五錢 炮

附子 一箇 生用 去皮切作八片

右為細末每服一錢水六分盞生薑二片煎至四分
去滓溫服量兒大小加減

龍骨散 治小兒吐利

龍骨 赤石脂 縮砂 去皮各一兩

右為末麩湯下一匙或五分大人一錢若止吐入丁

香一分代縮砂

桃紅散 治小兒脾胃虛弱吐利不止不問冷熱可服

人參 去蘆洗剉 藿香 用葉 紅麴 各二錢半

右為細末每服五分米飲下無時量兒大小加減

治吐利不止

陳鹽梅 二箇 乾木瓜 二錢 食茱萸 三錢

右用食鹽二錢炒同煎服

三和散 治吐利津液燥少

白茯苓

兩一

烏梅肉

乾炒

乾木瓜

兩各半

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓時時

溫服之

妙應丸 治吐瀉霍亂下利不止

丁香

四十九箇

杏仁

胡椒

各四十九粒

巴豆

七粒

好

硃砂

二錢

右為細末飛羅麩為丸硃砂為衣每服五七丸白湯下

甘露飲 治小兒伏熱吐瀉兼中暑昏迷煩渴不止心

躁體熱頭疼及傷風體熱煩渴滋煎

石膏

寒水石

各一兩

甘草

三錢

右為末三歲五分燈心湯下暑熱冷水下立夏後立

秋前宜用餘月不可一方獨用薑汁調下而止

豆寇香連丸 治泄瀉不分寒熱赤白陰陽不調腹痛

腸鳴切痛大効

黃連

三錢炒

肉豆蔻

南木香

各一錢

右為細末粟米飯丸米粒大每米飲下十九至二三

十九食後服日四五服

小香連丸 治冷熱腹痛水穀利滑腸

木香 訶子肉 各一錢 黃連 五錢炒

右為細末粟米飯和如菜豆大食前米飲下十九至三五十九頓服之取效為度

白龍丸 治小兒吐瀉不定滑洩注水小便少

附子 炮半兩 白石脂 煨 白龍骨 煨各一分

右為末白糊丸小豆大三歲三十九末飲下食前一

方加白礬煨一分除白石脂加滑石

契聖既濟丹 治小兒陰盛陽虧臟腑虛寒泄瀉不止

熟硫黃 一錢 白礬 枯二錢 半夏末 二錢薑汁浸半日乾秤

右為末雪膏丸如麻子大每服三五十九溫米湯下

茱連丸 治小兒夏月暴瀉注下

土黃連 吳茱萸 各一兩 陳皮 半兩去白

右為末水煮白麩糊為丸如麻子大每二三十丸米

飲下

治白瀉不止

白石脂錢一 白龍骨錢一 白茯苓錢二

右為末滴水丸如粟米大每服二十九丸乳前用紫蘇木瓜湯下

神功散 治小兒滑腸不止

五倍子 百藥煎 乾薑炮各等分

右為細末每服一錢米飲下大人煮糊丸黍米大每服三十九米飲下

治小兒因吐瀉胃虛生風作驚癇狀

天麻 白附子各一分 白朮二分蜜煮焦用水洗切焙入蝎稍三七箇用

右為末米飲調下一方無天麻

治小兒吐瀉不止

龍骨火燒存性 滑石 定粉各等分

右為細末每服一錢至二錢熟水調下

治小兒吐利

亂髮半兩燒灰 鹿角六銖

右為末米汁服一匕圭日三

石黃散 治小兒吐瀉

白滑石 硫黃等分

右為細末糯米泔下一匙治霍亂吐瀉用滑石一分

硫黃半兩每服半錢

不二丸

巴豆 三十箇去心膜細研別用好黃連半兩水浸紙二張裏豆煨令出烟

硃砂末

寒食麩錢一

右研勻滴水丸如菉豆大以新汲水磨下一丸

木香丸 治小兒兼大人吐利

木香 白茯苓等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九生薑米飲下

小兒量大小化下三五丸

治小兒吐利

舶上硫黃 藿香等分

右為末每服五分生糯米泔調下

治吐利

丁香 白木等分

右為末麩糊丸如粟米大米飲下十九至十五丸臨時增減

治吐瀉

草果 甘草

右等分為末每服五分米飲下

二聖丸 治小兒吐瀉不止羸瘦成疳宜常服

川黃連去鬚一兩

黃蘗去粗皮一兩

右為末入猪膽內湯煮熟丸如菉豆大每服三十丸米飲下量兒大小加減頻服

附香丸 治小兒吐瀉不止腸鳴腹疼肚急氣粗

附子炮去皮 木香炮等分

右為末白糊丸如小豆大三歲二十九食前米湯下一用附子白茯苓等分不用木香糊丸治用同

香肉丸 治小兒吐瀉不定兼咳嗽噫氣入口便定

木香 肉豆蔻 等分並裏煨
令麩焦為度

右糊為丸小豆大白湯下若作末白水煎亦可咳嗽
熱服

雙黃丸 治小兒洩瀉注水腸鳴肚疼

黃連 炒 硫黃 等分

右為末白糊丸小豆大三歲食前米湯下十丸

半硫丸 治小兒洩瀉注下或手足冷者亦治咳嗽

半夏 湯泡
七次 硫黃 各一兩一方加蝎
白附子各半兩

右為末薑汁糊丸小豆大三歲三十九丸米湯下一方

加白礬半兩名既濟丹

川椒丸 治小兒夏月傷濕冷入於腸胃泄瀉不止

川椒 一兩去目用
雙者連核炒 肉豆蔻 炮半兩

右為末粳米飯為丸如小豆大三歲三十九丸食前米
飲下

豆附丸 治小兒搐搦吐瀉

肉豆蔻 一箇 附子 一箇
炮

右為末麩糊丸粟米大飯飲下

正氣人參膏 治小兒脾胃氣虛中寒腹痛泄利嘔逆
不入乳食夜哭睡中多驚吐利虵蟲虛煩悶亂服之
止煩渴調脾胃進飲食

人參 乾木瓜 甘草 剉炒各半兩 陳橘紅 罌粟

米 炒 乾薑 炮 茯苓 各一分

右為末煉蜜和膏每服一皂子大米飲化下

梓朴散 治小兒吐瀉兼誤食冷藥脾虛成慢驚風

涎潮搐搦大人亦可服去涎去風

梓州厚朴 一兩 剉 半夏 一錢 湯洗七次 薑製晒令乾

右以米泔水二升同浸一百刻以水盡為度如水未
盡加火熬乾去原朴只用半夏為末每服五分或一
匙薄荷煎湯下効

半粟散 治小兒脾胃虛寒吐瀉水穀不能入及冷痰

齊州半夏 一兩 湯泡七次 細切焙乾 陳粟米 二錢 一方用 陳粳米三錢

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片煎至八分

去滓食前溫服一方用棗煎

治小兒吐利

以熟牛屎含之一作牛膝

又方

燒牡猪尿水解取汁少服之

治小兒吐利不止

以鬱金一箇剖開心入去殼巴豆一箇麩裏煨熟
取出候冷去麩及巴豆不用只用鬱金為末米泔

汁調下一匙

治小兒夏秋吐利

以大好黃連二兩剉碎去鬚土炒令深黃色次入號
丹一兩同黃連炒令丹焦為度傾出放在紙上仍放
散著地令冷為末薄煮麩糊為丸如芥子大每服二
十粒至三十粒用壁土生薑煎湯下量兒大小加減
服連進二服尤佳

獨附散 治小兒吐瀉氣脫四肢冷肚疼眼慢

以附子一枚炮去皮臍為末三歲用一錢水半盞薑汁一蜆殼棗半枚煎三分以下水中頓冷飢服

治瀉不止

用椽斗子兩箇入黃丹在內合定燒灰存性為末每服五分至一錢米飲調下

又方

以訶黎勒皮為末每一錢陳米飲下

半夏湯 治小兒吐瀉發搐覺有痰者

以五苓散入生薑半夏煎服吐了痰瀉亦止驚自退

豆蔻散 治腹痛洞泄腸鳴脾胃虛冷乳食不化

肉豆蔻一枚剉小孔內滴乳香一塊麩裏煨熟為末每服一錢米飲調下一法用麩糊為丸如黃米大一

歲兒服二三十丸空心日進二服溫米飲送下

椒紅散 治小兒水瀉及年五十以上患瀉

用椒二兩醋二升煮醋盡慢火熬乾為末磁器貯之每服二錢或酒或米飲下

治小兒熱瀉

用黃蘗削皮焙杵末用薄米飲為丸如粟米大每服十九米飲下

治小兒瀉

以桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過線繫葉蒂上繙陰乾細切用水煎汁服之

治小兒暑月泄瀉無度

半夏

五錢用生薑一兩半搥爛將半夏每箇切作兩片水一大碗同煮乾取出再用水半碗煮

薑氣用白麩一錢乳鉢內研作餅子慢火炙熟

沒石子一箇

滑石一分

人參一分

丁香

白礬枯

朱砂

一錢細研

右為末每服五分煎冬瓜子生薑湯調下如為丸用水調薄薑汁麩糊為丸子每服三十丸量大小加減服

觀音散

菘豆

炒

白朮

煨

茯苓

人參

炙

神麩

炒

麥芽

炒

香附子

各等分

右為末空心米飲調下

霍亂 附論

夫小兒霍亂者由陰陽清濁二氣相干氣亂於腸胃之間故為霍亂也然腸胃怯弱或因解脫為風冷所乘及乳哺不消而成吐瀉或乳母觸冒風冷及飲食生冷等物冷氣入乳令乳變敗兒若飲之亦成吐利是皆觸犯臟腑使清濁之氣相干之所致也挾風而實者體熱頭疼而復吐瀉凡遇此病須暫斷乳食仍以藥調適乳

母先當散乳間風冷之氣宜服香蘇飲加霍香正氣散煎食後捨去宿乳服之逐去寒邪次用理中湯加丁香木香煎服溫養其乳此先定其大勢然後自合釀乳藥同兒飲之乃服醒脾散使免生慢驚之疾也楊氏曰陽隔陰而不降為霍亂也先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛吐利並作所謂賊邪木來勝土也王氏曰小兒內因脾胃虛弱乳哺停積外因感冒寒暑邪正交爭證有冷熱之不同藥用溫涼之各異陳元澤曰傷風則

惡風自汗傷寒則惡寒無汗胃濕則冷凝傷暑則熱煩必以外所因而治之扶救不先立致危殆治法必先止吐次則隨證治利許仁則曰濕霍亂死者少乾霍亂死者多楊氏曰足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴利津液驟已失其所養甚則轉筋入腹而死王氏曰小兒吐利暴作最為急證蓋脾虛則吐胃虛則利脾胃俱虛吐利俱不止吐而不止瀉者危楊氏曰吐瀉不止必轉慢驚慢脾虛風也又曰小兒有中霍亂吐瀉俟上吐下瀉遍身微熱

不能乳哺此因喫食冷熱不調脾家受熱胃冷不消化所致宜用睡驚沉香飲夾丁香散乳香散活脾散與服如傳變大渴不食面紅眼微視氣少不語汗多恐患慢脾風死候不治又小兒霍亂而成吐瀉仍須進大七寶散二三服并觀音散二三服溫白丸二三服如不退恐脾困不進乳食須進惺惺散二三服如此不效往往變作慢脾風慢驚風此候宜進竹瀝膏二三服間惺惺散調胃氣並沉香散又小兒霍亂吐利由陰陽不和清濁相

干與大人無異如救火拯溺宜速療之並宜用聖石丹
 順正湯霍亂吐瀉形候忽然吐瀉謂之霍亂吐瀉如有
 渴即下沉香飲子夾平胃丸若未有渴量大小下鮓湯
 丸通一二遍白涎只依前用沉香飲子平胃丸調理或
 尚猖狂煩躁夜睡不得喘息急促此死候不治翰林待
 詔楊大鄴問小兒霍亂吐瀉者為何答曰凡將息小兒
 之道切須慎擇妳母精神強健智慧深遠身無疾病肌
 肉肌潤溫厚善能調理乳食疾何從生眾疾易愈

方

大七寶方 治小兒霍亂吐瀉不進乳食

木香炮 丁香炒 官桂不見火 茯苓 麻黃去節

當歸 甘草炙 人參 大腹皮 川棟子去核

阿膠炒各一錢 訶子去核一錢 肉豆蔻一箇炮 藿香葉一錢

炒 地榆二錢炒

右為末每服一歲兒一匙二三歲五分四五歲一錢
 水一藥注或半銀盞入棗子半片煎十數沸溫服

地黄散 治小兒脾胃氣衰弱霍亂吐瀉嘔逆不食煩

躁迷悶

乾地黄

厚朴

去粗皮薑汁浸炒

人參

茯苓

乾葛

藿香葉

黃耆

蜜炒

白朮

麩炒各一分

丁香

訶子

炮取肉各一錢

右為末每服五分或一錢用蒼朮煮飯飲調下併進

四五服

肉豆蔻散

治小兒霍亂吐瀉不止食飲不下

肉豆蔻

一箇去殼

丁香

黃耆

剉

枇杷葉

去毛炙微黃各

半分

桂心

人參

甘草

白茯苓

各半兩

陳橘

皮一分湯浸去白穰焙

右為散一歲兒霍亂每服以溫水調下五分大小加

減

半夏散

治小兒霍亂後吐瀉不止煩悶

半夏

湯浸七遍去骨用

桑黃

去鬚

乾薑

炮剉

陳橘皮

去白

穰湯浸焙

人參

去蘆頭

當歸

微炒剉各半兩

黃芩

甘草

灸赤微剉
各一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不拘時
量大小溫服

丁香散治小兒霍亂吐瀉不定

丁香 木香 甘草 灸微剉 葛根 剉 枇杷葉 去毛

灸微黃 藿香 人參 去蘆頭 桑黃 各半兩

右為末散不計時以麝香湯調下五分量大小以意
加減服之

救生丹 治小兒心膈伏熱生涎霍亂躁悶身熱吐
逆惡心乳食不下

大洩 一錢半 輕粉 三匙 乳香 丁香 各五分 龍腦 一匙

粉霜 三匙 水銀 黃臘 各二錢 黑鉛 一錢一匙與水銀結砂子

右為末鎔蠟為丸如小豆大一歲一丸木瓜甘草湯
飢服如煩躁研生芝麻馬齒莧水下如吐逆煎藿香
湯下更量虛實加減食後臨卧服之此藥除熱化涎
下膈止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止者不可服凡小

兒吐逆宜速療之久不止常為慢驚宜收此藥備急
醒脾散

人參 半兩 去蘆 丁香 四十粒 白茯苓 藿香葉 白

木 甘草 灸各半兩 天南星 二箇重八錢已上者 縮砂仁 十四

箇同南星泡

右為末生薑冬瓜子煎大小以意加減

勻氣散 治霍亂吐利 方見本門利類

蘆薈丸 治霍亂後乾噦不常

蘆薈 安息香 胡黃連 枳殼 麩炒各一錢 史君

子 三七箇炒 蕪荂 一分 定粉 一錢五分 麝香 少許

右為末積猪膽糊丸如梧子大米飲下五七丸
麥門冬散 治小兒霍亂不下乳食

麥門心 一兩去心焙 白茯苓 人參 去蘆頭 陳橘皮

湯浸去白穰焙 乾木瓜 各一分 厚朴 去粗皮塗薑汁灸令香熟 香

茆 各半兩

右為粗散每服一錢水一盞入生薑少許煎至五分

去滓不計時候量大小加減服

沉香散 定霍亂治吐止瀉補虛調胃氣進乳食

沉香 茯苓各一分 甘草炙 丁香炒 藿香葉

錢各一 木香炮 官桂去粗皮不見火各五分

右為末每服一歲兒一匙二三歲五分五七歲一錢

以意加減紫蘇木瓜湯調下一日三服

順正湯 順陰陽治霍亂吐利

白豆蔻 高良薑微炮 藿香葉 當歸湯浸焙乾 草

豆蔻麩裏炮 陳橘皮去白炮乾各半兩 丁香一兩

右為細末每服五分至一錢溫粥飲調下

順氣散 治霍亂吐瀉

人參 藿香 丁香各一分 茯苓 乾葛 甘草

天台烏藥各半兩 紅橘皮一兩

右為細末每服一錢水八分盞入生薑二片煎四分

溫服

香參膏 治霍亂吐瀉不住者

人參 一指 大對

丁香 十四粒

藿香 一錢

糯米 七十粒 同丁香

炒令 米黃

右為末用棗肉和丸每服一指頭大溫湯下

丁香散 治霍亂吐不食

丁香 二十箇

母丁香 一箇

藿香 一錢

半夏 五箇湯 泡七次

右為末以薑汁浸三宿焙干再為末每服一匙藿香

湯下

治小兒霍亂吐利

人參 一兩

厚朴

甘草

各半兩

白朮

十八銖

右咬咀以水一升二合煮取半升六七日兒一合百

日兒三服期歲二服中間隔乳服之乳母忌生冷油

膩等物一方加乾薑一分或加生薑三分

治小兒霍亂方

人參

蘆籜

各半兩 一用根

菹豆

二兩

倉米

一撮

右咬咀水二升煮取八合溫服

菖蒲散 治小兒霍亂吐瀉不止煩悶

菖蒲 肉豆蔻去殼 人參去頭 白茯苓各一分

右為散不計時以生薑湯調下五分量大小加減

人參散 治小兒霍亂吐瀉不定

人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白穰焙 黃連去鬚 厚朴去粗

皮薑汁炙令香熟

右各三分為散以陳粟米粥飲調下五分三歲以

上加服

香連散 分清濁定霍亂吐利

木香 川黃連去頭各一兩 人參去蘆頭 厚朴去粗皮塗

薑汁炙令香熟各半兩

右為細末每服一錢粟米飲下

快膈散 定霍亂吐利服藥多吐即先服此藥

甘草半兩炙 高良薑微炮 肉豆蔻去殼 丁香各一錢

右為細末每服五分新冷水調下

桃仁膏 治霍亂吐瀉

桃仁 杏仁 巴豆各一粒 硃砂少許

右同研飯為丸如米大每服一九米飲吞下

治霍亂吐瀉不止方

乾薑炮 人參 白朮各四錢 厚朴二分薑汁浸炙

右細剉分作四服每服水二盞煎取六分以意加減

與服入甘草二分尤佳

青金丹 治小兒霍亂吐逆及治大人虛實冷熱吐瀉

并諸般吐逆不定一名陰陽丸

水銀一錢 硫黃二錢生者同水銀研令水銀不見星只作黑色

右薑汁糊丸麻子大每服二十九淡薑湯下治吐水

調末服

治霍亂常用妙方

南沒石子 肉豆蔻 訶子

右三味各磨水少許煎數沸一二服可止若加黃連

木香等分為末麩糊丸便是沒石子丸亦治熱瀉久

痢

治霍亂吐瀉面色青四肢冷虛汗出方

香薷一分

生薑棗大

碎

薄荷葉

半分

右以水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減溫服

丁香散 治霍亂吐瀉

丁香一錢

藿香

兩半

枇杷葉

七片湯洗炮去毛灸為末

右為細末每服一匙或五分飯飲調下只兩服住

治小兒霍亂吐瀉方

草豆蔻

檳榔

甘草

等分

右為末薑煎一錢空心服

木香散 治霍亂吐瀉

木香

細剉

人參

藿香

各等分

右為末每服一錢水五分煎至三分服

藿香散 治小兒霍亂吐瀉

藿香

香薷末各一分

白茯苓

末二錢

右研每服五分薑湯下如人行三五里進一服連進

三服

乳香丸 治小兒霍亂吐瀉不定

乳香 硃砂錢各一 半夏半兩湯浸洗七次薑汁炒黃

右為末麩糊丸如菜豆大每服五丸米飲下日三張

氏家傳方半夏却只用一兩名香砂丸

又方

丁香錢末一 消梨錢一枚絞汁 妳汁合一

右和勻少少與兒服之

又方

甘草半兩灸微赤對 肉豆蔻去殼 乾薑炮製對各一分

右為散每服以冷水調下一匙二歲以上加減服

龍骨散 治小兒霍亂吐瀉不止

龍骨末一分 草豆蔻末半兩 爛蘆蔎末半分

右妍勻以妳汁三合煎二合去滓別入麝香牛黃兔

毛灰各一匙生薑汁炒許調勻分為三服如人行五

里一服

治霍亂吐瀉并冷瀉欲死

肉豆蔻去殼 甘草灸微赤對 藿香各一分

右為散每服一錢水一小盞至五分去渣不計時大小加減溫服一方用粉草

香薷散 治小兒霍亂吐瀉體熱煩躁昏冒多渴陰陽

不順清濁相干

厚朴

去皮製

黃連

二味同薑汁炒作紫色

香薷

各一兩

右為末三歲一錢水半盞酒少許煎三分去渣水中頓冷服一方用白菡豆各等分

又方治小兒霍亂立驗

取側屋戶簾燒灰研飲服一錢

又方

用訶黎勒一箇先煎沸湯研一半與兒服立住如未止再服

治百日以來及葶內兒霍亂方

以人乳半合及生薑汁少許和煎服入口定

治小兒熱霍亂諸藥不瘥者

用蘆葉二兩或蘆根糯米三大合水三升先煮葉入

米煮取一升入蜜少許和服瘥不止即取桑葉二升生薑半兩切以水二升煮取一升入一匙白米為飲服

牛泄方 治小兒霍亂腹脹不得利

取牛泄絞汁百日兒一合二百日一合半三歲二合服

治小兒霍亂吐乳不止
以人參煎湯服瘥

又方

取薄荷葉未乾者研汁量多少捻鼻合口開灌之

治霍亂

用陳大蓼濃煎湯洗足止并服濃汁一二合自愈
蒔蘿丸 治小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下及脇痛
以蒔蘿為末糊丸如菉豆大三歲三十九青皮湯下

治小兒霍亂

以尿滓乳上服之

又方

以牛涎灌口中一合差

治小兒吐利霍亂

用寡婦薦取二七莖煮飲之

又方

用芹葉細切煮熟汁任性飲多少止

又方

用桑蟲一枚炙焦黃細研以妳汁調灌之

又方

用蠟蛎窠微火炙為末以乳汁調一匙服之

備用方 治小兒霍亂吐利

用生蒜研塗心下及兩足心効

八白飲 治小兒脾虛胃弱膈有風痰水穀入口悉皆

嘔噦體羸氣乏飲食不下霍亂吐利神情恍惚心胸

脹滿中脘不和

沉香 藿香葉 人參 草果 半夏麴 白川

薑炮 白芍藥 白檳榔 白芷菴 白茯苓

白朮 白蔞豆炮 白芷各等分

右為末瀉後復吐或吐後復瀉每服一錢水一小盞

生薑三片棗半箇煎三五沸通口不拘時服

五苓散 治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利

澤瀉三兩半剉 木猪苓去皮剉 官桂去皮 白茯苓剉一兩半

苓剉一兩半 白朮剉一兩半

右為細末每服一錢溫湯調下渴燥新水調服以意加減不以時服

丁香散 治霍亂

丁香 藿香各一兩 人參半兩

右為細末每服一錢水半盞煎五沸更入妳汁少許去滓稍熱細呷頻服量兒大小加減

乾霍亂 附論

夫乾霍亂者由脾胃氣寔陰氣內積外傷陽邪熱之

氣搏於脾胃稽留不散傷動陽經遂致精神昏亂則血脈不榮易受風冷卒被所感便即心痛煩滿氣粗腹大如膨涎擁咽乾因其氣虛而邪氣勝邪氣既勝則與衛氣並行其所以不吐利也蓋脾胃充實難於吐利其證心神煩亂惚惚多驚故曰乾霍亂也又云忽然心腹脹滿絞痛欲吐不吐欲利不利痰壅腹脹頃刻之間便致悶絕此乃所傷之物因吐利泄盡則生若上不得吐下不得利所傷之物壅閉正氣關格陰陽躁擾喘脹霍亂氣息少者危法宜蘇感丸疎利之

方

治小兒霍亂不吐利肚脹腹滿上下不通

甘草分四 當歸分三 食鹽分三

右以水漿一升半煎至六合去滓入牛黃麝香各五分研蜜半匙相和灌之即通妳母與漿水粥飲勿喫麪肉等

立應散 治小兒乾霍亂不吐不瀉腹脹如鼓心胸痰

壅

鹽

二兩

生薑

一兩

右同炒令轉色三歲半錢童子小便半盞煎三分去滓溫服

保安丸

治小兒乾霍亂不吐不利煩悶不知所為

以巴豆一枚去皮心分作十九每服一九水研服之當快利三五行即以漿水粥補之

治乾霍亂

以蘇合香丸加枳殼一分木瓜半分煎湯調下

又方

以炒鹽二椀紙裹綃護頓胸前并腹上截以熨斗火熨令熱氣透即蘇又一方用鹽一大盞極鹹熱飲以手剉喉令吐三飲三剉三吐即止

治小兒乾霍亂渴熱及壯熱眼色慢四大困悶

以烏豆二升淨洗乾生薑一斤切水三升煎豆皮欲爛即搗取汁二合和少許蜜喫即便吐如人行五七

里又與喫無問大小兒並令服之效

霍亂心腹痛 附論

夫小兒冷熱不調乳哺不節使陰陽二氣相干而變亂於腸胃則成霍亂也心腹痛者是冷氣與真氣相擊或上攻心或下攻腹故成痛也

方

人參散 治小兒霍亂心腹痛不欲飲食

人參 去蘆頭

白朮

芎藭

草豆蔻 去皮

厚朴 去粗

皮塗薑汁灸令香熟

當歸 剉微炒

陳橘皮 浸去白穰焙

丁香

桂心 各一分

右為細散不拘時煮薑棗米飲調下五分量大小加減

治小兒霍亂心腹刺痛吐利方

茯苓

桔梗

人參 各六分

白朮 五分

甘草 灸四分

厚朴 灸四分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

量大小加減温服

人參散 治小兒霍亂心腹痛不欲飲食

人參 一分去頭蘆

丁香 一分

桂心 一分

白朮

芎藭

各三分

右為散不拘時煮薑棗米飲下五分量兒大小加減服

肉豆蔻散 治小兒霍亂吐瀉不止腹痛

肉豆蔻 去殼

桂心 各一分

人參 去頭蘆

甘草 炙微赤剉各半

兩

右為散每服一錢水一小盞生薑少許煎至五分去滓不計時量大小加減温服

烏藥散 治小兒乳食冷熱不和及心腹痛或水瀉乳

汁不好

香附子 用白者

高良薑

赤芍藥

天台烏藥

等分

右為末每服水一盞煎六分温服如心腹痛入酒煎水瀉米飲調下無時

調中丸

甘草 半兩 炒

白朮 半兩

人參 切去鬚 半兩

乾薑 炮 四錢

右為細末蜜丸如菉豆大每服十九至二十九食前溫水送下

治轉筋入腹欲死

用生薑一兩槌碎酒五盞煮服

又方

令病人仰睡熱土頓臍上令人尿之

針頭丸 治小兒霍亂吐利腹中疼痛

巴豆肉 二箇水半 盞煮乾

阿魏 雞頭大 一塊

船上硫黃 阿如

大魏

右研勻以薄糊搜作餅子如錢眼大每服一餅子針頭穿定燈上燒留三分性淡薑湯化開服

治霍亂吐利腹痛

用高良薑水煎加粳米如粥食之

普濟方卷三百九十五

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十六

明 周王朱橚 撰

嬰兒下痢門

疳病附論

夫小兒八痢曰冷曰熱曰疳曰驚曰冷熱不調曰休息
曰滾曰蠱毒諸痢無積不能成冷痢白積熱痢赤積冷
熱不調積下赤白疳痢黃白積下無處驚痢青積休息

痢糞黑如魚腸愈而復作滾痢停積不下肚大飲食不為肌膚氣息大便秘澁疼痛啼叫蟲毒痢下紫黑不可不祥察略具數方量大小以大方藥斟酌用之。痢與瀉名雖不同感受之源一也胃為水穀之海其精英則流布以養五臟其糟粕則傳送以歸大腸葛氏曰內由腸胃虛冷乳食積滯外因感冒寒熱所傷遂成瀉痢楊氏曰傷風者自汗惡風痛引腰脊鼻塞項強夾寒者筋脊拘急面慘惡寒傷暑者面垢煩燥渴飲水漿背寒自

汗傷濕者肌肉虛浮身痛重着冷則腸鳴肚冷而手足清冷熱則煩燥身熱而手足溫熱不調者乍澁乍冷熱積於內者不能去其積徒以藥藥解之熱氣無所發泄故冷熱相傳而下注或冷積於中不能去其滯徒以熱藥壓之冷積不能宣通故冷熱相干而或泄外則傷食一證食傷傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭夜熱晝涼泄者若脾胃合氣以消水穀既分安有所謂脾積而泄也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若

風邪夾熱則所下黃而赤焉白者冷搏腸間凝滯則白也若寒邪併之則所下白而黑焉冷熱相交故赤白相半重者狀若濃涕而雜之輕者白涕中間微有黑縷內挾風邪故清血注毒如腸胃之間則下如豆汁或有瘀血也 痢頻不食腹脹喘粗下糞如黑澤身熱渴脉大者皆不可治也 楊氏曰究以受病之源決以對病之藥大要散風邪行滌氣積滯開胃脘為先不可使用肉苳寇訶子白朮葷補佐寒邪不可悞後嬰粟穀龍骨榴

皮等閉澁腸胃邪氣得補而愈勝腸胃澁滯則腫脹日久淹延而未愈也至若泄瀉之後腹滿身疼厥逆是為表裏俱病急與理中湯溫裏仍以桂皮湯解表活人書已言之泄瀉而面色青慘者肝輕受寒寒肝之賊木能勝土古人慮之特設當歸厚朴湯以活之亥機論曰大便黑者難瘥 痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積欲出而氣滯之不與出是以墜裏急乍止日夜頻併多因傷暑伏熱食啖熱毒之物而得物積用巴豆大黃葷氣

滯用枳殼桔梗青皮蓬朮等佐以黃連丸佐之阿膠丸
乃大腸虛滑有熱毒留滯則能踈導無熱毒則能安愈
無阿膠丸即以當歸青皮赤茯苓黃連阿膠炒作劑入
烏梅濃密同煎甚能蕩滌惡穢積滯既去痢數漸踈調
以木香茯苓縮砂白芷薏陳皮甘草和胃食後以真人
養臟湯易簡斷下湯可止則止 下痢雖曰有積有暑
如用藥不效即是腸胃有風邪冷熱如熱者赤者宜敗
毒散冷者白者宜不換金正氣散加三木香 下痢壯

熱須用敗毒散如陳米飲調五苓散佐之或下阿膠丸
凡卒暴注下皆飲乳食不節脾胃傷胃濕熱水穀不
分洞泄不止夏熱飲水食冷之由多有之不可便服止
瀉及溫煖之劑必致成裏急後重成痢積也凡痢疾不
進乳食乃邪氣疫毒傳入臟腑必成噤口痢九死一生
當用敗毒散加陳糯米一百二十粒服經効 傷食痢
乃哺乳大飽損傷脾胃不能消化遂成積痢其證夜熱
冷氣急發渴目胞腫肚硬下痢酸臭湯氏曰吐瀉難止

亦不宜補當紫霜丸或五積丸白湯下取其積虛者調
消積飲吞下補脾止痢消積飲同益黃散煎縮砂湯調
服 熱血痢裏急而痛已踈通而下吐乃榮血虧少當
於藥中以川芎為佐以調榮血 凡小兒患痢之時未
熱久積氣虛其臟腑虛急作熱此瀉惡候終見痢後作
熱此兒臟腑虛弱同於虛熱主治其或三焦熱引飲不
歇四肢浮腫者理宜溫補臟腑散除濕氣喘則難治九
痢熱疳熱吐瀉熱不可發散退熱不佐寒涼藥但理其

病源調其臟腑和其榮衛生其胃氣令進飲食加與痢
藥服之參酌赤白多少膿血相雜裏急後重用行血後
腸胃和中腕溫臟腑其熱自然退愈凡小兒患痢不問
輕重悉忌葷腥冷熱炙烤醃醢陰毒之物若恣口腹愈
而復作若要永安須用戒絕之矣 赤痢當用黃連地
榆瞿粟殼阿膠等藥白痢當用乾姜訶子龍骨人參荳
蔻等藥赤白痢當用沒石子黃連荳蔻噤口痢治當用
先助胃壯脾漸能入食始用木香皮等藥若更虛弱加

以附子依此調理數日飲食頗進漸有黃糞夾雜脾胃
漸能充化當以去積藥下之若擬幼幼新書皆用編銀
丸今之小兒非上古比受之比久痢腸胃以薄豈宜用
膩粉藥以取之若執方成成大害余治痢之法若欲取
積只用官局進食丸甚穩雖取積而又能治痢萬無一
失積已下而急以四君子湯加荳蔻訶子補之以常服
厚腸香丸此得効之法然有準定恐孩兒虛實又當隨
機變化有虛極者加以附子之屬 凡痢久則冷腫滿

下焦偏熱上焦熱結薰蒸於肝則眼昏生翳古今八利
者因觸八邪所得故名八痢八邪者飢飽勞役風驚暑
濕八般痢者強而為名其實皆冷熱所作也下痢舌黃
燥不渴膏中實熱腹滿身熱譫語者復有燥糞大柴胡
湯下之後與滋腸痢藥如覺有食積或久痢不退先補
脾與妙丸下之後再補脾胃若不痢者舌白而渴小柴
胡加罌粟無如此妙也大柴胡湯亦宜加之虛腫者女
麵散痢後或疳眼生翳者六甲丸並濕平疳藥治之楊

達柙綱子五歲七月中患痢自與治不退召愚視之見
兒攢眉乃痢之後作煩主人問兒欲思酒可與否遂問
兒平日曾飲酒曰不曾飲痢忽思酒時欲飲之答曰此
病不治素問云病不治者治之無功蓋痢欲思酒者是
大腸已虛津液已枯榮衛不能相滋是猶日薄西山無
住之况主人怒曰兒痢方十餘日久又能食而不熱證
候平穩何相駭也若果不能治幾日當治答曰今未絕
直候兒兼食藥喉中鳴响三日內涎潮肺絕當卒有氣

急者五日不退再七日而死矣肺與大腸為表裏俱絕
即死正如齊侯病將死之疾怒扁鵲之先見也乃長揖
而退楊別易數醫旬日病雖不退皆言不妨忽一日咽
湯飲喉中鳴响再告召愚楊慚對曰果如斯言能斯言
能救之否答曰不可果三日內涎漸而卒後楊請問此
二証出向書而說死合曰諸書皆不載歷試三十年累
見斯証試之多驗故敢言不治也 知縣冷世修子三
歲入中患膿血痢累醫作食痢或作暑痢或作疳痢或

用感應九或用胃風湯紫丸子下之并雜藥共治五十
徐日皆無應効召愚視之其証面黃惟悴多睡露清温
熱温疼大便黧血或如豆汁雜色腥臭愚曰病久証危
可喜者面白而不昏是形氣相得謂之可治也是色澤
以浮脉沉而有力是脉從四時素問曰形氣相得謂之
可治也澤以浮謂之易蕪脉從四時又手足不冷雖危
可治蓋此病脾胃有風虛中有積前後醫者雖以胃風
湯主風下氣紫丸子下積滯猶在所以進退日久也問

曰何知有風積錢氏曰多睡露睛身温風在脾胃故大
便不聚孫氏曰大便雜色米穀不化腥臭肥膩虛中有
積或腸中沉冷今用四君子湯胃風湯四物湯此三藥
助氣和胃調脾活火共治五日日各二服次與宣風散
連進二服令微微去脾間風再進前藥二日空心與妙
靈丸一服去沉積瀉數行再四子湯加訶子末一日六
服從訶子膏駐車治愈

方

大効至聖千金飲子活幼口議小兒脾積虛痢下五色先由

嘔吐復作泄瀉臍腹疔痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿血相

雜下如豈汁亦如瘀血日夜無度食少飢羸宜服

綿黃耆炙甘草炙陳皮 罌粟炙 木香

白芍藥 地榆 川當歸 枳殼炒製 黑豈炒

烏梅 淮棗 白木 訶子炮去核 黃連

右等分咬咀每服一錢水一小盞煎至半去滓通口

十二與服 議曰臍腑虛中加燥故患熱痢或爾虛

寒或患冷痢或有暑氣冒之水穀不分或受濕氣臨

之腸胃有作因食毒傷觸脾肺或因宿冷停積臍腑

或因表裏有解因冷熱相承或因飲過多或因飲巽

不及多食醃醢常噉魚腥或是母懷胎恣其口服積

之日久氣不宣通遂冷患疾有加發作無度畢竟腸

胃虛損日夜呷冷痢下頻併宜服此方效驗

生熟飲子活幼口議治嬰孩小兒虛積痢腹肚疼痛裏急後

重日夜無度

罌粟殼

大者四箇一半炙此一味去盡內辨涼楞之者佳

陳皮

二片半炙甘草 二寸半炙

烏梅

兩箇半煨

淮棗

二箇半煨

生薑

二塊指大半煨 木香 一兩作兩半煨

訶子

二箇大者半煨

黑豈

六十粒半炒

黃耆

二寸半炙

白木木

二塊大半煨

當歸

二寸半煨

右件各半生熟咬咀和勻每服三錢水小盞入磁瓶

內煮濾去滓任意與服至多勿慮所有生黑豈不要

破只完全同煎効 議曰病有冷熱藥有生熟病有

陰陽藥有造化病者虛實藥有君臣按君臣以理虛

實分生熟而均冷熱治療主本之法也平和腸胃之

方也順益三焦之功也安調五臟之至也陰陽既分

冷熱既散腸既厚三焦既益五臟既順良由藥有造

化且水穀自分榮衛自正糟粕自聚其瀉與痢何患

不愈生熟飲子之功乃盡天下之妙不可忽

澤瀉茱萸湯 治小兒夏月暴寒寒入胃則暴下如水

四肢被寒所折則壯熱不除經月許日變通身虛滿腹

痛其脉微細服此湯一臍漸漸安神

澤瀉 青木香 海藻各二分 吳茱萸 茯苓

白木 桔梗 芍藥 當歸各三分 大黃一分

右吹咀以水四升煮取一升半二百日至一歲兒一合二合半一歲已上至二歲一服四合

養臟湯 治冷熱不調泄瀉裏急後重

木香 白芍藥各八分 訶子肉三分 人參

白朮 當歸各三錢 甘草炙 肉桂各四錢

嬰粟殼去筋蔓蜜炙一兩

右劉薑棗煎服

生金牛黃湯 治小兒積下不止因發癩

生金三兩一分用六銖無生金用熟牛黃三銖亦得法用作屑今方盡成器者

麻黃二分 黃蓮 乾薑 人參 甘草各二分

細辛半分

右以吹咀水一升六合煮取八合去滓臨服研牛黃以煮湯中如兒熱者用生薑代乾薑今世之生金但用成器金亦善二三兩皆得用也

胃風湯 金嬰方 治小兒風冷乘虛客入腸胃水穀不化洩

瀉注下胸脇虛滿腹鳴肚疼及腸胃溫毒下如豆汁或

下疼血日夜無度身熱不食

人參 白茯苓 去黑皮 白朮 白芍藥 當歸 切焙

川芎 官桂 去粗皮 粟米 少許

右等分為末三錢水半盞煎三分食空心日二量兒

大小加減

訶子湯 醫方大成 治冷熱不調泄瀉裏急後重

訶子肉 炮 人參 去芦 白茯苓 去皮 白朮 各一兩 木香 炮

陳皮 去白 甘草 炙 肉苳蔻 各八分

右末薑棗煎服手足厥冷加附子

梅肉散 醫方妙選 治渴痢不止眼生醫障身體浮腫

烏梅肉 炒 綿黃耆 乾薑 各一兩 川黃連 瓜蒌仁

乾薑 甘草

右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓時時服

厚朴丸 治小兒腑臟怯弱風冷邪客之令兒腹脹氣

不宜通甚者變為下痢

厚朴姜汁塗 丁香 木香 白朮各一兩 青皮去白兩

牽牛子一分炒

右為細末煉蜜搗成膏如黍米大每服十粒煎陳皮

湯下

木沉散醫方妙選 治証同前

木香 沉香 益智各一兩去皮 草苳蔻麩裏 蓬朮

白豆蔻各半兩

右為細末每服一錢水八分生姜三片煎至五分去

滓溫服

丹砂丸聖濟總錄 治小兒一切痢疾

丹砂研半錢 砒霜研半錢 巴豆霜研 硫黃研 麝香研

菜豆粉研各一分

右細研令勻饒飯為丸如荳大每服二丸血痢煎黃

子湯下疳痢蛤粉湯下

龍骨丸一名香連丸和濟方 治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不

化腹痛腸鳴或下膿血裏急後重夜起頻併不思乳食
肌肉消瘦漸變成疳

龍骨 白石脂 乾薑炮 黃連去須 微炒 白礬煨各 半兩

右為末錯煮麩糊和丸如麻子大每一歲兒服十九
米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量兒大小
加減日三四服

益黃散儒門親事 治一切痢冷熱不調泄瀉裏急後重脾胃

虛弱腹痛泄利不思乳食嘔吐不止困乏神懶心脇脹

顏色青黃懨懨不醒

陳皮去白 訶子南 丁香 甘草炙 青皮去穰各 等分

右為末米湯調服 楊氏曰本用青皮陳皮太疎痢

宜加肉豆蔻去青皮 久痢由腸胃虛冷滑泄下痢

嬰粟訶子龍骨等皆溢腸止痢之藥必先以確砂湯

下感應丸去積等劑俟其積消方可服此粟殼本用

治嗽今用治痢功能溢氣令人滿悶不食能消息去

之尤為妙也一方水煎服

梅煎散 治小兒暑毒下痢煩渴肚疼發熱

赤芍藥 黃連 甘草 各一兩 罌粟殼 三兩

右末三歲一錢水半盞烏梅一箇煎三分去滓食前

服

訶子膏 方今嬰 治小兒久新痢疾

訶子 炮 赤石脂 甘草 罌粟殼 炒等分

右為末煉蜜丸雞頭大每服一丸米湯化下

荳蔻散 活幼口議 治嬰孩小兒腸胃虛弱糟粕不聚泄瀉不止

或赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發宜服滯腸荳蔻

散良方

肉豆蔻 火煨一箇 胡粉 炒三錢 龍骨 生一錢 白礬 枯一錢

右為末每服一錢溫飯飲調服不拘時薄糊丸麻

子大五十九 議曰胡粉即真鉛粉也以鉛法造

出韶州名韶粉定州名定粉總名光粉其性滯故

用之以滯其腸令不虛滑荳蔻溫臟之藥安和腸

胃龍骨白礬澀腸止痢所患大腸虛滑下痢日夜

無度者服之隨時痊瘥一應葷腥之物醃鹹之屬悉與禁止亦治秋間白痢至效

白餅子治小兒秋利號曰毒痢純下白腹肚痛

口議 白礬枯白 鐵粉一錢 白麵半兩 胡粉炒一分

右伴和勻水搜作餅如錢大每復半餅大者一餅飯飲磨化 議曰秋氣金旺則君虛矣夏月火燥則子困矣夫人五臟六腑乃循四時而行故曰秋溫脾胃若胃口有毒禁閉不食輕粉却毒次用豆蔻麵喫蕪雞子清

開胃醒脾乃愈

等住丸出危方氏 治溏瀉并一切瀉痢立効

當歸 硫黃 牡蠣煨 木香各一分

右為末麵糊丸粟大每服二七丸糯米飲入姜三滴

送下

小駐車丸出危方氏 治小兒冷熱不調或乳食失節泄瀉不

止或下痢鮮血或赤多白少腹痛裏急後重腸胃虛滑便數頻併減食困倦一切泄痢並宜服之

當歸 去炒 訶子 炮去核

二兩 一兩

乾姜 炮

黃連 去須各

三分

右為末用膠膠一兩三分煎成汁搜和為丸如粟米大每一歲兒服十粒至二十三十粒溫飯飲下隨乳亦得更量歲數加減與服一方無訶子醋糊丸

草嬰飲

出仁存方

治小兒久新痢疾不食身熱

木瓜草

一兩一錢方馬莖莧

嬰粟穀

甘草

各半兩

右吹咀三歲一錢水半盞煎三分去滓食前服

神効雞清丸

醫方大成

嬰孩小兒一切痢疾久瀉無時度冷

瀉白痢

木香 二錢 土黃連 一分

去須

肉荳蔻

一個大者生

右三味先碾為麤末取雞子清搜藥作餅於慢火上炙過冷黃色變紅者稍乾擘破碾羅為末白麵糊丸麻子大每服三五十九溫下一方以黃連半用茱萸一分同炒令紫色去茱萸不用肉荳蔻半兩煨木香一分用雞子糊丸如麻子大每服五九飯飲下赤痢粟米湯下白湯厚朴湯下名木香丸一方粟米飯為

丸如米粒大米飲下治泄瀉陰陽不調腹痛腸鳴名
 荳蔻木香丸治泄瀉痢赤白 議曰木香黃連一陰
 一陽藥木香善導水利氣脉黃連厚腸胃二味君臣
 相佐陰陽相順加之荳蔻溫和臟肺止瀉痢功效彌
 良凡兒患瀉與痢不問證輕重並宜撓先與服不問
 臟腑冷熱愈多愈効然雞清為物有毒是以毒氣引
 藥致効若去此一味其功不足矣

治惡痢家傳方

湯氏方

南沒石子 荳蔻

右於砂器上磨水煎數沸服之肚疼加木香血多加

臘茶此乃備急妙方

香連丸

湯氏方

厚腸胃除餘積

黃連

一兩一半生一半熟菜芡炒

木香

半兩炮

右為末化蒸餅丸如黍米大湯下一歲十九大小以

意加減一方煉密丸治冷熱痢

橘薑湯

治小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之

橘皮 生薑 各三分

右切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

烏賊骨散 全嬰方 治小兒痢肚疼後重

用烏賊骨為末三歲半錢米湯調下 一名海燥

炒雞子方 危氏方 治休息痢痞瀉日久不能安者兼小兒

痢日夜數十行者延延日久百藥俱試飲食不方便下

痢不止百用百中無不獲安神效 昔項文學 從龍在臨安見

鄉人潘省幹之子服之其子方三歲有此證服之甚效

用雞子一枚打破用黃臘一塊如指大鉢內以雞子

拌和炒熟空心食之一方雞子白和釀醋攪如白酒

煎如錫灌之勿令吐一方用黃肱雞子和臘作煎餅

與兒食之止痢

治小兒水痢形 不勝大藥湯

用白石指半兩研如粉和白粥空肚與食

治小兒痢

用林檎搗子杵取汁服以意多與服之瘥

乳母方 肘後方

用扁荳莖一升炙令為炭切之人參三兩以水三升煎取一大升去滓取煮粟粥與乳母食良仍復乳勿令住又法乳母常食粥仍欲乳母先捨去少許即當

療小兒三歲即患痢初患膿少血多四日膿多血少日夜

四十餘行 肘後方

用生地黃汁五小合入羊腎脂令煖分三四服立効

預知丸 傳氏活嬰方 治一切痢疾

預知子 一錢去殼別研 訶子 二錢煨去核 木香 半錢 白附子 半錢

海金沙 半錢 石决明 二錢煨研 肉荳蔻 一錢

方為末冷水滴丸如菴荳大每服二十九菴香湯下

調中散 傳氏治嬰方 治下痢純白

人參 一錢 白茯苓 一錢 白木 一錢煨 木香 一錢 御米 各一錢

扁荳 一錢 藿香 一錢 訶子 二個煨 甘草 一錢 石連肉 一錢

右為末每服一錢陳米飲下或甘草湯下如和氣紫菀木瓜湯下吐瀉氣虛不食頭汗不止鹽湯下胃氣

虛弱嘔吐腹脹陳皮湯下盤腸氣痛木瓜鹽下一方
加丁香枳殼華澄茄肉荳蔻四味尤佳

黃連散

楊子見萬全獲命方

治小兒肝受疳氣相形于脾

所下之痢多是鮮血忽是膿血忽赤白相雜宜喫

此方

防風 地榆

白茯苓

去刺 川芎

史君子

各一分 半兩蒸四五回

焙乾 木香

甘草

各三錢

黃連

四錢

右為細末每一錢半無時食任意煎冷喫

香連丸

儒門侍親

木香

訶子肉

麵炒

黃連

炒已上 女半兩

龍骨

二錢

右為細末飯丸如黍米大每服二十九米飲湯下

硃砂丸

楊氏家方

治一小兒泄瀉痢疾

硃砂

半錢 人言

半錢 黃丹

三錢

右為細末水丸如粟米大每服五七丸乾薑甘草湯

下

雞子湯

肘後方

小兒病食不消腹滿下痢

亂髮如雞子一枚去垢吹咀之雞子七枚去白以黃并髮煮雞子汁熟數按之令汁出取服大小無毒

治小兒下痢腹大且堅方 千金方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服

又方

以腹上磨衣中白魚亦治陰中

胡椒散 治小兒下痢日夜頻併

龍骨 胡粉 炒焦研 白礬 枯飛過秤 黃連 去鬚四味各等分

右件為細末每服半錢温米飲調下乳食後空心服

烏頭丸 鮑氏方

川烏 一箇分三片一生一炮一燒灰存性

右為末蜜丸菴荳大一日服一粒二日服二粒三日三粒

正氣調胃散 活幼口議 治嬰孩小兒八種虛痢作熱或吐或

瀉發熱霍亂上下氣不復常心虛煩悶等作熱並不可

加用寒涼之藥宜與服此方正氣調胃散兼生熟飲子

如不納食宜服分氣紫蘓飲子

半夏 一兩洗去滑七次 白扁豆 炒 藿香葉 陳皮 各一分

蒼朮 炒半兩 甘草 炙半兩 白茯苓 白朮 各半兩 厚朴 一兩

生姜和皮二兩搗壓在鉢中二三宿翻轉取土日慢乾火炒極焦用之

右為服每一錢水一小盞生姜二片棗子同煎如氣

未復不納食分氣紫蘇飲四君湯打合服 議曰吐

瀉作熱皆由陰陽不順邪正相干臟腑不和上吐下

瀉又有只吐不瀉者又有只瀉而熱者皆是運動真

氣上下不升降又吐瀉俱作曰霍乳其兒陰陽二氣

不正臟腑愈虛且瀉加之或也不爾風生作疾候變

即慢脾風病家不知其理醫工用究其詳古人不迷

其微致後學必招利害今之吐瀉疴痢熱自裏虛發

作豈可解利其表若要攻裏由虛生熱循此調理可

得其宜大小一同輕重盡善至理之言明智可鑒

止小兒下痢 本草

用紅蜀葵葉炙煮食

治小兒熱毒下痢

以黃柿和米粉作糗蒸與食見食之良

治小兒患秋痢與蟲 本草

以棗食之良

療小兒秋痢 本草

以柿研先煮粥熟即下柿更三兩沸與小兒飽食并

乳母喫亦良

一切痢久不瘥 附論

夫小兒一切痢者痢色無定或水穀或膿血或青黃或赤白變雜無常相兼而下也此背乳母哺不調冷熱交爭經久則脾胃虛弱連滯不瘥令肌體羸瘦也

方

人參散 聖惠方 治小兒痢久不瘥腹痛多渴

人參 半兩 去蘆 桔梗 三分 去蘆頭 當歸 三分 去微炒 烏梅肉 一分 微炒

地榆 三分 微炙剉 艾葉 半兩 微炒 黃耆 半兩 剉 龍骨 一兩

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計

時候量兒大小分減服温

神効散 楊氏方 治久痢并血痢不瘥

赤石脂 煨一兩 白龍骨 一兩 阿膠 二兩 柯子肉 炮半兩 木香

炮半兩 黃連 兩半 乾薑 兩半 甘草 半兩

右為細末煎粟米飲調下大小以意加減一方有硝

砂蜜一兩

當歸散 聖惠方 治小兒一切痢久不瘥腹痛羸瘦不欲飲

食

當歸 三分判 阿膠 三分搗 人參 半兩 黃芩 三分 甘草

一分炙 龍骨 三分

右為細散每服粥飲湯下半錢日三四服量兒大小

加減

木香散 聖惠方 治小兒一切痢久不瘥脾胃氣虛飲食全

少腹脹無力

木香 半兩 白礬 二兩 黃連 半兩 龍骨 三分 桃白皮

半兩 麝香 一錢

右為細末不計時以粥飲調下半錢量兒大小加減
青金散 聖惠方 治小兒一切切痢久不瘥

定粉 二兩 黃丹 半兩 白朮 一分 白礬灰 半分 白龍骨 半兩

訶梨 一分

右為末用棗一升去核共藥都搜作團入菟罐內盛

燒令通出取出細末為散每服以粥飲調下半錢日三

四服量兒大小加減

定痢丹 醫方妙選 治下痢久不瘥

密陀僧 白礬 定粉 黃丹 以上四味各一兩

知泥固濟文武火燒令亦候冷取出次用 龍骨 黃連 各一兩為細末

右研勻粟米飯島成膏如黍米大每服五粒至七粒血

痢黃連湯下白痢阿膠湯下相雜米飲下大小加減

鹿角散 聖惠方 治小兒一切痢久不瘥

鹿角 一兩 定粉 半兩 蜜陀僧 黃丹 白礬 各半兩

右入餅內燒令通赤放令取出細研為散每服以粥

飲調下半錢日三四服大小加減

黃丹連

方 聖惠

治小兒一切痢久不

黃丹

苳苳子

黃明膠

各半 兩

青川棗

三十枚 去核

石搗為團燒令通赤放令搗羅為末每服米飲調下

半錢日三四服量兒大小加減

蜜陀僧散

方 聖惠

治小兒一切痢久不瘥日夜度數無恒

蜜陀僧

一分 細研

定粉

一分 微炒

黃丹

一分 微炒

龍骨

一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

妙靈丸

方 全嬰

治小兒久患惡痢裏急後重并滑腸洩瀉

靈中有積

硃砂 錢一 辰砂

右研細以黃臘半兩先於盞內鎔成汁入皮巴豆三

七粒煎巴豆紫色取巴豆入前二味再研和於蠟內

三分中取一分再成汁傾藥在內急攪令劑刮出磁

盒內收丸小豆大三歲二丸洩瀉惡痢艾湯送下水

瀉冷水下食前取積增藥丸數冷甘草湯下臨卧服

定粉丸 方 聖惠 治小兒一切痢久不瘥

定粉 砒霜 各一分

右同研為末以麵糊丸如黍米大每服以冷漿水下
二丸量兒大小加減

栗房散 方 金嬰 治小兒久痢不食

生栢枝 櫻栗殼 九土炒

右為末三歲半錢米湯調下

枳實散 治小兒久痢淋瀝水米穀不調形羸不堪大

湯藥者用枳實二兩治下篩一二歲以上飲服方寸

如若兒小以意斟酌日三服

治小兒久痢不効并無辜瀉痢不止 方 肘後

用沒石子二箇切炒令黃色研作餛飩食之一方和
麵作餅子燂熟為末不計時以粥飲下半錢大小加
減

定粉散 治小兒瀉痢腸滑日久

定粉 一兩炒 蜜陀僧 四錢 烏魚骨 一錢

右為細末每服半錢至飲調下

治久痢手足逆冷服藥不効

用四君子湯二錢磨肉豆蔻水分蓋生薑一片棗半枚加炮附子數片煎服重者加白薑丁香五歲以上水半盞加藥末大小以意加減

烏龍散 治小兒吐後瀉痢久患不瘥大腸滑泄

龍骨 黃丹 定粉 猪指甲子 各等分

右味同入磁罐子內安藥以物塞口用火煨令通赤

放冷取出研為細末每服半錢米飲調下

鍾乳益黃丹 治小兒久痢不止及扶積作瀉疳氣腹

滿不食

定粉 黃丹 鍾乳粉 或煉者 丁香 石榴皮 炒焦各半

兩巴豆 七粒去殼同定粉號丹三味研勻水和作一塊陰乾小豆丸上熟炭火煨紅出毒一

宿研 人參 去蘆頭 益智子仁 半兩 硃砂 另研二錢半 木香

七錢 白豆蔻 三兩 訶子 煨去核七錢 黃連 四錢 烏梅 十梅取半

右件為細末煮麵糊為丸如黍米大每服十五丸加

至二十九丸加至瓜陳皮湯下空心服

黃連散 治痢久腸痛行夜頻併

大黃連 一兩切用吳茱萸等分炒去茱萸 人參 兩半 木香 三錢

右等分每服一錢陳米飲下

女麩散 治小兒因久痢腿後脾虛浮腫狀若水氣

乾薑 細辛 椒目 附子 炮去皮 桂心 各等分

右為末三歲一錢酒調下陳皮湯亦得

久痢羸瘦 附論

夫小兒久痢羸瘦者由乳食不節臟腑挾挾疴氣腸胃冷熱不調變為下痢經久不瘥則皮胃虛弱穀減少血不榮故令肌體羸也

方

雜黃散 治小兒久痢不瘥羸瘦壯熱毛髮乾焦不能

飲食

雄黃 蘆薈 細研 青黛 細研 硃砂 細研 當歸 白芷

熊膽 細研 龍膽 去頭 蘆黃連 去須 黃蘗 微炙 甘草 炙 赤

麝香 細辛已上各一分 蚱蟬七枚去定 乾蝦蟆一兩塗酥灸令黃焦

右為細散入研了藥更研令勻每服以井華水調下半錢日三四服量兒大小加減

桔梗丸 治小兒久痢不斷肌體羸瘦食不消化

桔梗一兩去蘆頭 神麴一兩微炒 火藥半兩微炒 烏梅肉半兩微炒

黃連一兩半去鬚微炒 厚朴半兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 白朮半兩

人參半兩去蘆頭 赤石脂半兩 黃芩半兩 甘草炙微赤半兩 龍骨

兩半 黃雌雞骨一具淨洗去肉酒浸一宿炙令黃

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服以粥米飲下五

丸日三四服量兒大小加減

蕪荑散 治小兒久痢羸瘦春夏秋不瘥

蕪荑一分微炒 猪苓半兩 黃蘗半兩微炒 阿膠一分搗碎炒令黃焦

赤芍半兩 厚朴半兩去粗皮生薑汁炙 人參半兩去蘆頭 地榆三分微炒

判 當歸三分微炒

右為麤散每服一錢水一中盞入銀一兩韭白一莖生薑一片投五十粒煎至五分去滓不計時量大小

加減溫服

草菓飲 治痢後浮腫

厚朴薑製青菓煨去皮藿香洗甘草炙丁香 神麩

半夏各半兩

右為散每服二錢棗子同煎如瘧疾脾胃虛弱並可

服之

暴痢 附論

夫小兒暴痢者由腸胃虛卒為冷熱之氣所傷而為暴

痢痢熱則色黃赤冷色青白若冷熱相交則為赤白痢也

方

胡黃連散 治小兒冷熱氣不和忽暴下痢腹內疼痛

胡黃連 母丁香 桂心 木香各一分犀角屑半分

肉豆蔻去殼當歸剉微炒麝香細研

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

甘草散 治小兒暴痢

甘草炙微赤厚朴去粗皮塗生薑汁人參去蘆頭黃連

去鬚微炒龍骨一兩白茯苓兩半

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計

時量大小加減服之

乾薑散 治小兒暴痢痛不食

乾薑一分炮人參三分去蘆頭甘草一分炙訶梨勒兩半

煨用皮厚朴半兩去粗皮

右為麤散每服一錢水一小盞入薤白一莖煎至五分去滓不計時量兒大小分減溫服

龍骨散 治小暴痢

龍骨一兩枳殼半兩麩炒當歸半兩剉黃連一兩去鬚微炒

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時量兒大小分減溫服

治小兒暴痢方

用小鯽魚一尾燒末服之亦治大人痢

又方

燒鯉魚骨末服之一方作龍骨一方用小鯉魚尾燒灰以粥飲調服半錢

又方

用赤小豆末酒和塗足下日三度油和亦得

胃風腹脹泄痢 附論

夫小兒肌膚腸胃脆弱若解脫不時風邪易侵客於肌肉搏於胃經則為胃風其壯腹善滿食寒則泄瘦瘠而

腹大蓋足陽明胃經其支者起胃下口循腹裏下至氣衝故風冷入腹中善脹大又胃為水穀之海得寒則食物不化氣血損故痢而形瘦也

方

厚朴散 治小兒胃風腹脹泄痢脾胃氣不和羸瘦少

厚朴 去粗皮塗生薑汁炙令香熟微黃 人參 各三分 肉豆蔻 去殼一枚 乾

薑 炮製剉半兩 阿梨勒 煨用皮 白朮 黃連 去鬚微泡 地榆 微炙

剉各一分 甘草 炙微赤剉半分

普濟方

三四

右為散每服以粥調調下半錢食前日三四服量兒大小加減

厚朴散 治小兒腸胃風冷泄瀉水穀腹脇脹滿不欲食

厚朴 去粗皮塗生薑汁炙令香熟 黃連 去鬚微炒 丁香 肉豆

寇 去殼 當歸 剉微炒 木香 龍骨 白朮 各一分

右為散每服半錢以粥飲調下食前服日三量兒大小加減

訶梨勒湯 治小兒胃風腹脹得冷則泄痢并冷熱痢腹痛

訶梨勒 煨用皮 當歸 剉微炒 黃連 去鬚微炒 甘草 炙微赤剉

木香 乾薑 炮製各半兩

右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓放溫不計時量兒大小分減服之

訶梨勒散 一名厚朴散 治小兒胃風泄瀉兩脇虛脹腹痛不

欲食

訶梨勒

煨用皮

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

當歸

剉微炒

枳殼

麩炒微黃去瓢

赤芍藥

各等分

右為散每服半錢米飲調下日三量兒大小加減服之

白朮湯 治小兒胃風泄痢不止腹脹羸瘦

白朮

三分

赤茯苓

去黑皮一兩

當歸

切培半兩

人參

一兩

厚朴

去粗

皮塗薑汁炙令香半兩

右搗篩每服一錢水半盞入生薑二片煎至三分去

滓帶熱服至夜三四服量兒大小加減

調中湯 治小兒胃風下痢水穀不止羸瘦腹脹不欲

飲食

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

黃連

去須微炒一各兩

木香

半兩

右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓不計時量兒

大小加減

冷熱痢

附論

夫小兒先因冷食有氣在腹胃之間而復為熱氣所傷

此腸胃虛故受於熱冷熱相交而便下痢乍黃乍白或水或穀是冷熱痢也

方

犀角散 聖惠方 治小兒冷熱痢不止腹痛心神煩悶

犀角屑 白朮 黃連 去須剉 微炒 地榆 剉 當歸 剉 微炒 一兩

右為粗散每一錢水小盞煎至五分去滓放溫不計時量兒大小加之

石榴皮煎 聖惠方 治小兒冷熱痢不止

醋石榴皮 三分炙 令焦剉 黃連 三分去須 剉 微炒 赤石脂 二分

石為粗散以水二升煎至合去滓內臘一兩更煎煎三五沸不計時溫服量兒大小加減

當歸黃連丸 聖惠方 治小兒冷熱痢心神煩渴腹痛胸膈

滯悶

黃連 二兩去須 剉 微炒 當歸 一兩 剉 微炒 烏梅 一兩 微炒

右為末煉蜜和丸如棗大不計時以粥飲下七九量

大小加減

訶梨勒 聖惠方 治小兒冷熱痢

訶梨勒 二兩煨用皮 地榆 一兩炙微赤

右為末煉蜜丸如棗荳大每服以溫粥飲下五九日三四服量兒大小加減

冷痢 附論

凡痢皆為乳食不節傷動胃氣腸胃虛弱清濁不分因虛而泄滯久不散故為痢也虛而冷者則所下青白或如凝脂久不瘥則陳寒結痼或下黑瘀診其脉沉而遲

者冷痢也

方

訶梨勒散 治小兒秋後大腸挾冷下痢不止

訶梨勒 煨去核半兩 肉豆蔻 去殼二枚 當歸 切焙 赤石脂

蜜陀僧 別研如粉 枳殼 去瓤面炒 龍骨 乾姜 炮裂

厚朴 去粗皮姜汁炙各半兩

右為散三歲兒每服半錢米飲調下空心午後各一服量兒大小加減服之

實腸散 治冷痢腸滑下痢頻數

厚朴 姜汁炙 兩半 肉豆蔻 訶子肉 煨 宿砂仁 陳皮

蒼朮 炒 茯苓 各一兩 木香 五錢 甘草 炙四錢

右剉姜棗煎手足冷加白姜 休息痢乃脾胃虛冷

腸胃滑泄下痢無禁日夜無度 大養脾丸助胃膏

或益黃散不止理中丸不止三藥丸合和日乾夜吃

溫中湯 治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷

水洗浴以冷乳飲兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下痢如

水胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調其胃氣下痢即止

乾姜 厚朴 各一分 當歸 桂心 甘草 各三分

人參 茯苓 白朮 桔梗 各二分

右以咀以水二升煮取九合六十日至一百日兒一

服二合半餘隨兒大小加減

龍骨飲 治小兒五歲已下百日已上冷痢

龍骨 黃 去須各一兩半 人參 甘草 炙 乾姜 炮

半夏水洗十遍焙乾 厚朴去粗皮生姜汁令炙剉 赤石脂各一兩

右搗篩一歲兒每一錢水半盞入米一枚同煎至三分去滓分溢二服空心午後各一量兒大小加減

黃耆湯 治小兒下痢具膿

黃耆剉 芎藭 乾姜焙裂 人參 黃芩去黑心

當歸切焙 甘草炙焙各半兩 桂去粗皮各一分

右搗篩一歲兒每一錢水半盞同煎至三分去滓分溫二服空心日晚各一量兒大小加減

荳蔻丸 治小兒腸胃虛弱清濁不分痢下青白或如

凝脂陳寒痼冷或下黑瘕

肉荳蔻去殼一枚 宿砂去皮七枚 訶梨勒去枝三枚 鉛丹炒

胡粉各二錢 天仙子一分與子內合定用麻絲縛定灰火內

燒黑存性細研 白礬一分 龍骨二錢

右為散再令勻每服半錢米飲調下乳食前服

艾葉散一名艾香散 治小兒冷痢腹痛多時不斷

艾葉炒 木香 黃連去須各半兩 龍骨研 訶梨勒煨取皮

當歸 切焙各三分 乾姜 炮裂一分

右為散每服半錢米飲調下日前三四服大小加減

人參飲 治小兒下痢白小便赤

人參 五分 龍骨 一分 厚朴 去粗皮生薑汁剉二兩 當歸 加焙

乾姜 白茯苓 去黑皮 甘草 各一兩

右搗篩一二歲兒每一錢水半盞煎至三分去滓分

溫二服憲心日晚各一量兒大小加減

當歸飲 治小兒冷痢

當歸 切焙 黃連 去須 赤石脂 乾姜 炮製 龍骨

酸石榴 微炙 厚朴 去粗皮生薑汁剉炙各三分

右搗篩每一錢水半盞煎至五分去滓分溫服食前

日一量兒大小加減

丁香丸 治小兒冷痢心腹痛悶不欲乳食嘔逆不止

丁香 硫黃 胡椒 桂 去粗皮一枚 陳橘 去白焙

附子 炮製去皮臍各一分 肉豆蔻 去殼一箇

右為細末用生薑汁煮麩糊丸如菴荳大每服五丸

生姜艾湯下煎食前服量兒大小加減

木香白朮散

一名木香散

治小兒冷痢腹痛四肢不和飲食

減少漸至羸瘦

訶梨勒

炮去核

厚朴

去粗皮姜汁炙

當歸

微炒各半兩

木香

乾姜

炮

白朮

各一分

右為細散三歲兒兒每服一錢水一小盞入棗二枚

同煎至五分去滓食前溫服量小兒大小加減一方

治白痢腸胃虛弱腹痛不食加生姜二片煎

丁香散

一名香朴散

治小兒冷痢腸痛面無顏色四肢痿痺

不欲飲食

丁香

一分

厚朴

半兩去粗皮生薑汁炙令香熟

人參

半兩去芦頭

白朮

半兩炮

當歸

一分剉微炒

草豆蔻

半兩去皮

白石脂

一兩

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減一方有甘草用棗煎

白丸子 治小兒虛冷臟腑滑泄不止

硫黃

半兩研

附子

炮製去皮臍取來秤半兩

硝石

鍾乳

研

白龍骨 寒食麪 各一分

右研令勻細麪糊丸如麻子大每服三五丸粥飲下
量兒大小加減

五脂散 治冷痢大便色青甚有膿

白石脂 當歸 焙 丁香 白朮 各一分 草豆蔻 去皮

厚朴 姜汁製 各半分

右為細末每服半錢以粥飲調下量兒大小加減

養臟湯 治白痢頻併

當歸 洗焙 乾 烏梅肉 炒 乾姜 黃耆 白朮

龍骨 各一兩

右為細末服一錢水一小盞生姜粟米各少許煎至
五分去滓溫服乳食前量兒大小加減

固腸散 治冷痢腸滑下頻併

陳皮 一兩 炒 白姜 炮 甘草 炙各二錢半 肉豆蔻 生二兩

木香 一錢 罌粟殼 去筋蒂蜜炙一兩

右為細末姜棗煎服

茯苓飲 治小兒冷痢白膿

白茯苓去黑皮一分 人參一兩 厚朴去粗皮生薑汁炙剉一兩半

桂梗炒一兩 桂皮炙一兩

右搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服

食前日二量兒大小增減

龍骨湯 治小兒冷痢腹痛不止

龍骨 甘草 黃連去須各一兩 乾姜炮製 當歸切焙各三分

右搗篩一歲兒每半錢水一盞煎至三分去滓分溫

二服日再量大小加減

厚朴丸 治小兒脾胃虛弱清濁不分因成冷痢其色

清白甚則色黑

厚朴去粗皮生薑汁製炙黃色一兩 肉豆蔻麩裹炮製一兩 木香

訶梨三枚麩裹炮固皮 龍骨半兩

右為細末水浸炊餅心和丸如麻子一二歲兒每服

十九溫米飲下日三服

厚朴湯 治小兒冷痢便青白或如凝脂或痢下瘀黑

厚朴去粗皮生 蒼朮米泔浸切焙 陳橘皮去白焙各一兩

甘草炙剉 乾姜炮二分

右搗篩每服一錢水一盞生姜二片棗二枚煎至五分去滓溫服

補脾丸 治小兒冷痢或下青白或下黑痰如凝脂

肉豆蔻炮去殼一枚為末 龍骨燒研 乳香研 蕪荑仁炒研

麝香研各一錢

右為末同研勻軟飯丸如麻子大每服五七丸陳米

湯下

艾葉丸 治白痢

艾葉微炒 當歸各一兩 乾姜 木香 訶子炮各半兩

右為細末每服一錢水八分粟米少許煎至五分去

滓食前溫服

乳香丸 治小兒冷痢諸藥無効

乳香一分 訶黎勒一兩煨用皮 地榆半兩微炙剉 赤石脂半兩

乾姜一分炮製剉

右為末粟米飲和丸如菜豈大每服以粥飯下五九日三四服大小加減

草節丸 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或凝脂相似

烏頭炮製去皮臍 黃連去須 吳茱萸湯洗焙炒 乾姜焙各一錢

朴附丸 治小兒滑冷下痢不禁

厚朴 附子 乾姜 陳皮各一兩

右為末糊丸粟米每服三十九米飲下日三服

養脾丸 治便膿頻數

附子一枚重半兩炮去皮臍 赤石脂 川薑 訶子各一兩

右為細末粟米飲和如黍米大每服十粒食前粥飲下

陳橘皮湯 治小兒冷痢心腹脹滿乾嘔不止

陳橘皮湯浸去白焙一分 人參一分 甘草炙半兩

右搗篩一歲兒每一錢水半盞生姜二片同煎至三分去滓分溫二服食前日再服隨兒大小加減

訶梨勒丸 治小兒冷痢

訶梨勒

煨去核
半兩

桂

去粗皮
一分

赤石脂

半兩

右為末煉蜜和更入白中搗三五百杵丸如麻子大
一二歲兒三九三四歲五九空心午後各一服米飲下

阿膠飲 治小兒白痢

阿膠

焙令燥一兩一分

黃芩

去黑心一兩

黃連

去須半兩

右到末一二歲兒每服一錢水半盞煎至三分去滓
分溫二服空心日晚各一量兒大小加減

蜀椒丸 治小兒秋深冷痢止腹痛

木香

一兩

訶梨勒

煨去核一兩

右為末以粳米飯和為丸如麻子大一二歲兒三九
五歲兒五九米飲下食前服

醋石榴皮散 治小兒冷痢百藥無効

醋石榴皮

一兩到碎炒令微焦

硫黃

一分

右為細散每服以粥調下半錢日三四服量兒大小

加減

麝香丸 治小兒久患冷痢脾胃冷極致使大腸滑泄

不絕

麝香一分 鹿茸一兩去毛塗

右為末煮棗肉合丸如菘菹大每服以粥飲下五九日三四服量兒大小加減

又方

當歸半兩剉 大蒜一

右為細末燒蒜熟和丸如菘菹大每服以粥飲下七九日三四服量兒大小加減

又方

當歸半兩剉 大蒜一

右為細末燒蒜熟和丸如菘菹大每服以粥飲下七九日三四服量兒大小加減

治小兒疹痢

方 用蓼菜搗汁量大小與之一方作芥菜

治冷痢內因脾胃虛冷外觸冒風啖食冷物積滯下痢其證面青或白腸鳴腹脹乳不化手足清冷下痢青白

或成白凍

右為用不換金正氣散理中湯加茯苓厚朴入燒鹽
下感應丸或實脾散加白姜下五積丸或五積散加
白姜棗子粳米煎空心服

治患冷痢

用附子一枚炮水五升合煮鷄子一枚令熱以哺兒
瘥

治小兒冷痢多時宜服此方

用川椒三分去目及閉口者微炒法汗為末煉蜜和
丸如棗莖大每服以粥飲下五九日三四服量兒大
小加減

調胃散 治冷痢

人參去芦 陳皮去白 白朮 蒼朮 白茯苓去皮

桔梗炒 縮砂仁 厚朴姜製 肉豆蔻 扁莖姜炒

薏苡仁炒 山藥 石蓮肉去心 粉草以上各等分

右為末猪肉伴食痢不止加訶子肉吐不止加丁香

吐痢內虛可酌加附子木香重者加姜

保嬰艾葉湯 治冷痢肚痛

陳艾葉炒當歸各一兩乾姜 木香 製厚朴

肉豆蔻各半兩草菓半兩良姜 丁香各一錢甘草五分

右為末粟米煎服

溫臟湯 治小兒因驚滯乳氣不宣導冷搏腸間下痢

青末或乳多傷脾疝癖不化常服溫臟腑暖脾胃化宿

令進乳食

人參去芦一兩白附子炮陳皮去白白朮三味半兩

神超炒黃麥藥炒黃甘草炙黃丁香已上各二兩

右為細末每服半錢空心棗湯調下

雄朱散方 治嬰孩小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜痛

不可忍

雄黃一分沙飛過細研乳香一錢各一錢白礬一錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下一

日三服

雞子餅 療小兒秋夏冷痢脹脹乍熱白滯下方

用雞子一枚胡粉一九碎絹篩合雞子黃共搗研調
教令熱如常雞子餅兒年一歲一食半餅日再不過
二餅即瘥兒大倍之作凡羸弱治冷痢用生姜汁蜜
水各半佐以木香荳蔻

普濟方卷三百九十六

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣周厚轅

騰錄監生臣汪瀾