

孫真人千金方卷之十二

八分六

孫真人備急千金要方卷之十二

貧

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

少小嬰孺方

欬嗽第六方

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小

瘡復發五月中忽小小欬嗽微溫和治之因
變癩一日二十過發四肢縮動背脊𦏧眦眼
反須臾氣絕良久復蘇已與常治癩湯得快
吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日
一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹

瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝湯方

竹瀝合五

羚羊角

黃芩三十

白朮各六
作白鮮

木防已

大黃二

白薇

茵芋三

桑寄生

麻黃

草薺

甘草各半

右十二味以水二升半煮取藥減半內竹瀝煎取一升分服二合相去一食久

進一服一方無

紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽
喉鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫菀

杏仁

黃芩

當歸

甘草

橘皮

青木香

麻黃

桂心各六銖

大黃一兩

右十味㕮咀以水三升煮取九合去滓六

十日至百日兒一服二合半一百日至二

百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽晝夜不息食則吐不下方

五味子

當歸

各半兩

麻黃

乾薑

桂心

人參

紫苑

甘草

各六兩

細辛

款冬花

各二分

大黃

一兩半

白朮

右十二味以水二升半煮取六合去滓

滓兒六日至百日一服二合半一百日

至二百日一服三合其大黃別浸一宿下

一方無款冬花大黃有棗三枚

治小兒大人欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾
嗽出臭膿方

燒淡竹瀝煮三十沸小兒一服一合日
五服大人一升亦日五服不妨食息乳
哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食
方

乾地黄

兩四

麥門冬

五味子

蜜

各半升

大黃

消石

各一兩

右六味以水三升煮取一升去滓內

消石蜜煮令沸服二合日三宵中當有宿
乳汁一升許出大者服五合

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干

麻黃

紫苑

甘草

生薑各一兩

半夏五枚

桂心

五分六分

大棗

二十枚

右八味咬咀以水七升煮取一升五合去

滓內蜜五合煎一沸分溫服二合日三

又方半夏四兩

紫苑

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘草各二兩

欵冬花仁

蜜合一

右九味咬咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小多少加減之服之立効

杏仁圓治大人小兒欵逆上氣方

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分以一分內杏仁搗令強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食已含咽之多少自在日三每服不得過半方寸匕則

利

又方

半夏

二斤去皮河水洗六七度完用

白礬一斤為末

丁香

甘草

草豆蔻

川升麻

縮砂各四兩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸

春冬三七日夏秋七日密封口日足取出

用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破用薑

湯下或乾喫候六十日乾方得服疑非孫思邈方

八味生薑煎治少小嗽方

生薑兩七

乾薑兩四

桂心兩二

甘草

款冬花各三兩

紫菀各三兩

杏仁

蜜各一升

右合諸藥為末微火上煎取如飴鋪量其

大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核

分六

四

許日四五服甚有驗

四物款圓治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不

能復啼方

款冬花

紫菀各一兩半

桂心兩半

伏龍肝六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令
兒飲之日三傳之漸漸令兒飲之

菖蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆

鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢各六銖

欵冬花

乾薑

桂心

紫苑各十銖

蜀椒伍銖

吳茱萸合六

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服

五丸加至十九日三兒小以意減之兒大

以意加之暴嗽數服便瘥

桂枝湯治少小十日已上至五十日卒得聲
欬吐乳嘔逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝

兩半

甘草

二兩半

紫苑

十八銖

麥門冬

一兩一分八銖

五

右四味呔咀以水二升煮取斗升以綿著
湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節

乳哺

麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風

入肺方

麻黃兩四

甘草兩一

桂心寸五

五味子升半

半夏升半

生薑兩各二

兩各二

右六味以水五升煮取二升百日兒

服一合大小節度服之便愈

癖結脹滿第七方

灸法

霍亂附

雙紫圓治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹
滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小
兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節
或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥更可重服小
兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼

不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數

用神驗千金不傳方

臣億等詳序例中凡云服紫丸者即前變蒸篇

中四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差駛病重者當用之方中並無赤丸而此

用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆

蕤核仁各十麥門冬十

甘草五銖

甘遂

朱砂各二銖

牡蠣

蠟各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別

擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研蕤核

人令極熟乃內散更擣二千杵藥燥不能

相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一
雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲
者服如麻子二丸五六歲者服如大麻子
二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲
微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出
時不下者熱粥飲數合即下丸皆雙出也
分六
下甚者飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁
不起兒乳哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠
四肢痿躄繚戾服之可令充悅方

芍藥

柴胡各二兩

大黃

人參各一兩

乾薑如熟以枳實代甘草各半兩

鼈甲

茯苓各一兩半

右八味為末蜜丸如大豆服一九一歲已上乳服三丸七歲兒服十九日二

牛黃圓治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

牛黃三銖

附子二枚真珠

巴豆

杏仁各一兩

右五味搗附子真朱為末下篩別搗巴豆

杏人令如泥內藥及牛黃搗一千二百杵

藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米
一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服
如胡豆一丸日二先乳哺了服之膈上下
悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以
藥完出為度

分六

芒消紫圓治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱
不欲食消瘦方

芒硝

大黃各四兩

半夏

甘遂

各二兩

代赭

一兩

巴豆

二百枚

杏仁

一百二十枚

右七味為末別擣巴豆杏人治如膏旋內
藥末擣三千杵今相和合強者內少蜜百
日兒服如胡豆一九過百日至一歲服二
丸隨兒大小以意節度當候兒大便中藥
出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥

梔子

知母

大黃

各二兩

柴胡

二兩六銖

升麻

黃連

黃芩

各二兩半

竹葉

切一升半

桔梗

二兩半

細辛

十五銖

右十一味以水六升煮取一升八合
去滓分四服十歲見為三服一本有枳實
杏仁各一兩半而桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃

柴胡

黃芩各三

枳實一兩 十升麻

芍藥

知母

梔子各二兩半

生薑十八銖

杏仁二兩

竹葉切一升半

右十一味以水六升半煮取二升十

歲至十五者分三服

牛黃雙圓治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃

太山甘遂各半兩

真珠六銖

杏仁

芍藥

黃芩

各一兩

巴豆十八銖

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二

九但隨兒大小加減之

牛黃雙甲圓治少小疳實壯熱食不消化中

惡忤氣方

牛黃

厚朴

茯苓

桂心

芍藥

乾薑各半兩

鼈甲

麥麩

柴胡

大黃

枳實

芎藭各一兩

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以

意量之

芫花圓治小兒心下痞痰癖結聚腹大脹滿

身體壯熱不欲哺乳方

芫花

黃芩各一兩

大黃

雄黃各二兩半

右四味為末蜜和更搗一千杵三歲兒至

一歲已下服如粟米一九欲服丸內見喉

中今母與乳若長服消病者當以意消息
與服之與乳哺相避

真珠圓治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲

食方

真珠

兩半

麥門冬

兩一

麩仁

二百枚

巴豆

四十分六枚

右四味為末蜜丸朞歲兒服二丸如小豆

大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為

度當下病赤黃白黑葵汁下勿絕藥病盡

下自止久服使小兒肥白已試驗

鼈甲圓治少小腹中結堅脅下有疹手足煩

熱方

大鼈甲日炙為藥十斤 大黃各三

茯苓各二 柴胡十 乾薑各二

桂心六 麈蟲十枚 蟻螬各二

右九味為末蜜和服如梧子七九漸漸加

之以知為度

鼈頭圓治小兒痞氣脅下腹中有積聚堅痛

方

鼈頭一枚 皮半 蟲蟲

次下薤米米熟藥成稍稍服之

地黃圓治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黃

大黃

各一兩
六銖

茯苓

十八銖

當歸

柴胡

杏仁

各半
兩

右六味為末以蜜丸如麻子大服五丸日

分六

三

馬通栗圓治少小脅下有氣內痛喘逆氣息
難往來寒熱羸瘦不食方

馬通中栗

十八銖

杏仁

紫菀

細辛

各半
兩

五味子

石膏

秦苳

半夏

茯苓

各六銖

右九味為末蜜丸服如小豆十九日三不
知加至二十九

治小兒下痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取

一升分三服

又方

腹上摩衣中白魚亦治陰腫

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

米粉鹽等分炒變色腹上摩之

治小兒癬

灸兩乳下一寸各三壯

當歸圓治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青

涎下方

一名黑丸

新下當歸

狼毒各九銖

吳茱萸一作杏人

蜀椒各半兩

細辛

乾薑

附子各十銖

巴豆十枚

豉七合

右九味搗七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍內末搗令相得蜜和桑椹蒸

五升米飯下出搗一千杵一月兒服如黍

米一九日一夜二不知稍加以知為度亦

治水癖

馬齒礬圓治小兒胎寒嘔啼驚癇腹脹不嗜

食大便青黃并大人虛冷內冷或有實不可

吐下方
黃芩
大人
白
亦
實
不
可

馬齒礬一斤燒半日以棗膏和大人服

如梧子二九日三小兒以意減之以腹

內溫為度有實實去神妙

治小兒忽患腹痛天矯汗出名曰胎寒方

煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

半夏圓治小兒暴腹滿欲死方

半夏隨多少微火炮之搗末酒和服如

粟米粒大五九日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參

兩一

厚朴

甘草
兩各半

白朮

銖十八

右四味㕮咀以水一升二合煮取半升六

十日兒服一合百日兒分三服暮歲分二

服中間隔乳服之乳母忌生冷油膩等一

分六

十三

方加乾薑一分或加生薑三分

藿香湯治毒氣吐下腹脹逆害乳哺方

藿香

兩一

生薑

兩三

青竹茹

兩二

甘草

兩各半

右四味㕮咀以水二升煮取八合每服一

合日三有熱加升麻半兩

治孩子霍亂已用立驗方

人參

蘆籜各半兩

藕豆藤二兩

倉米

撮一

右四味吐咀以水二升煮取八合分溫服

又方

人參兩

木瓜一枚

倉米撮一

右三味吐咀以水煮分服以意量之立效

治小兒霍亂方

研尿滓乳上服之

又方

牛涎灌口中一合

治少小吐痢方

亂髮

半兩 燒灰

鹿角

六銖

右二味為末米汁服一刃圭日三服

分六

十三

又方

熱牛屎舍之一作牛膝

又方

燒特猪屎水解取汁少小服之

孫真人備急千金要方卷之十二



