

醫方類聚卷之一百四十六

諸虛門

四時勞傷此黃二補白散藥

聖惠方

二人參去地黃州干散藥夫

黃治虛勞裏急諸方

半刻

夫虛勞裏急者為腎氣不足傷於衝脈衝脈

為陰脈之海起於關元關元穴在臍下循腹

裏此至咽喉令勞傷肉損故腹裏拘急也上

部之脈微細者而附引裏急心膈上有熱者

則口乾渴也寸脈陽絃裏急陰弦裏急絃



為胃氣虛食則難飽飽則裏急痛不得息寸口脉微關上實尺中絃緊者則小腹腰背下苦拘急痛也如不喜寒身憤憤也

治虛勞小腹裏急少氣羸弱不能飲食宜服黃耆散方

黃耆剉 白茯苓 當歸 牛膝去苗 五味子

桂心去蘆 人參炮裂去皮臍 附子已上各一兩半夏

半兩湯洗七遍去滑 熟乾地黄二兩 白芍藥三分 甘草兩

炙微赤判 藥卷之六 一百四十六

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治虛勞裏急少氣心胃痰冷手足不和身體恒自汗出宜服補諸不足熟乾地黄散方

熟乾地黄二兩 川烏頭半兩炮裂去皮臍 人參壹兩

頭桂心兩 乾姜半兩炮裂判 黃耆壹兩 白芍藥

兩川椒壹分去目及閉 白茯苓壹兩 白朮二分

半夏半兩湯洗 當歸壹兩

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食
前溫服

治虛勞裏急諸不足宜服建中黃耆散方

黃耆二兩 桂心兩 甘草半兩炙 五味子三分

牡丹三分 澤瀉兩 白芍藥三分 山茱萸兩 遠志

半兩 當歸兩 去心

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水壹中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓更

入飴糖棗許大同煎壹兩沸每於食前溫
服

治虛勞四肢羸弱兩脇裏急飲食無味宜服

此方

黃耆一兩 人參兩 白朮兩 白茯苓兩 當歸三

白芍藥三分 五味子三分 牛膝兩 甘草兩

赤五 加皮分 桂心分 熟乾地黄兩

右件藥搗篩爲散每服四錢以水壹中盞
入生姜半分棗三枚煎至六分去滓每於

食前温服

治虛勞裏急四肢疼痛氣引胃脇不利宜服
芍藥散方

白芍藥

壹兩

黃耆

二兩

甘草

半兩

炙

人參

兩

去蘆

熟乾地黄

壹兩

附子

壹兩

去皮臍

裂

桂心

壹兩

乾姜

半兩

炮

當歸

壹兩

前胡

壹兩

去

枳殼

半兩

麩炒微

黃耆

壹兩

詞梨勒皮

兩

右件藥

搗麩羅

爲散

每服

四錢

以水壹中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓內

飴糖棗許大更煎壹兩沸每於食前温服
忌菘菜

治虛勞氣不足羸瘦困乏兩脇裏急四肢煩
疼無力睡恒不足腰背疼痛宜服五加皮散

方

五加皮

半兩

牛膝

壹兩

五味子

半兩

桂心

三分

白茯苓

三分

當歸

三分

甘草

半兩

炙

人參

壹兩

頭白芍藥

三分

黃耆

壹兩

白朮

三分

附子

兩

去皮

臍

裂

去皮

臍

裂

臍

裂

右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食
前溫服

治虛勞不足小腹裏急四肢少力疼痛不欲
飲食宜服白茯苓散方

白茯苓兩黃耆壹兩半夏三分湯洗
甘草七通去滑
半兩炙入參一兩去
微赤到蘆頭桂心兩白芍藥一麥
門冬一兩半陳橘皮三分湯浸熟乾地黃
壹兩去心焙

右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前溫服

治虛勞裏急四肢不和身體疼痛不欲喫食

宜服白朮散方

白朮兩白芍藥三分人參一兩去
甘草半兩

赤當歸兩半兩夏七通去滑桂心三分附子兩

炮裂黃耆壹兩皮臍

右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食
前溫服

治虛勞裏急兩脇疼痛四肢無力不欲喫食
宜服訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩木香三分陳橘皮三分易浸當

歸三分黃耆壹兩甘草半兩炙白朮三分牛膝

去苗壹兩白茯苓兩人參壹兩去蘆頭兩白芍藥兩桂

心三分○神巧桂兩右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前溫服

治虛勞心熱不得睡諸方

夫血爲榮氣爲衛晝行於陽夜行於陰行於

陽者行於身行於陰者行於藏上下循環榮

華表裏也今虛勞之人氣血俱弱邪氣稽留

於內衛氣獨行於外灌注於陽不入於陰陽

脈滿溢陰氣既虛則陽氣大盛遂生煩熱榮

衛不和故不得睡也

治虛勞煩熱驚恐不得睡卧宜服酸棗人散
方

酸棗入微炒當歸 扶神 黃耆剉人參去蘆

頭五味子已上各一兩防風去蘆頭甘草炙微遠赤剉

志去心猪苓去皮桂心 芎藭 白朮剉

芍藥已上各半兩熟乾地黃已上各半兩

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治虛勞煩熱不得睡卧四肢疼痛宜服白茯苓散方

白茯苓 鼈甲塗醋炙令黃去裙襴麥門冬去心酸棗

人微炒甘草炙微赤剉生乾地黃 黃芩 草薢

剉人參去蘆頭黃耆剉柴胡去苗已上白芍

藥半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入秫米壹百粒生姜半分煎至六分去滓

不計時候溫服

治虛勞煩熱四肢疼痛不得睡臥宜服此方

酸棗人微炒白茯苓 麥門冬去心白芍藥

紫蘇葦葉 黃耆剉已上各壹兩人參去蘆頭陳橘

皮湯浸去白穢焙甘草炙微赤剉已上各三分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞煩熱不得睡臥脇下氣上攻心悶宜服五味子散方

五味子三分酸棗人二兩人參壹兩去蘆頭 白朮

甘草半兩炙微赤剉黃耆壹兩剉訶梨勒皮壹兩柴

胡壹兩去苗

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞少氣四肢疼痛心神煩熱不得睡臥喫食全少宜服人參散方

人參半兩去蘆頭黃耆三分麥門冬壹兩去心焙 甘

草半兩炙熟乾地黃兩當歸半兩白芍藥三分

白朮三分酸棗人壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞煩熱不得睡卧少氣翕翕口乾失食

宜服此方

麥門冬壹兩半前胡壹兩去心焙人參三分

黃耆壹兩檳榔半兩扶神兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生姜半分小麥一百粒煎至六分去

滓不計時候溫服

治虛勞煩熱不得睡卧宜服黃芩散方

黃芩三分知母壹兩羚羊角屑甘草半兩

白茯苓兩酸棗人兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫

服

治虛勞羸瘦四肢煩熱疼痛喫食減少不得
睡卧宜服鼈甲丸方

鼈甲

塗醋炙令黃去殼

酸棗人

沙羌活

黃耆

麥門冬

去心焙

柴胡

去苗

白茯苓

人參

牛膝

去苗

知母

五味子

白芍藥

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫水下三

十九

治虛勞煩熱不得睡卧宜服酸棗人丸方中

酸棗人

微炒

榆葉

麥門冬

去心焙已上各二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗白餘杵丸如

梧桐子大每服不計時候以糯米粥飲下

三十九

治虛勞不足諸方

夫虛勞不足者是因風傷寒熱病勞損濕

瘧大病之後血氣減耗藏腑味和故使虛乏

不足虛乏不足則經絡受邪隨其所犯變成

諸病也不宜同刻無代不計杵食食四

治虛勞不足四肢無力不能飲食食即多汗
宜服熟乾地黃散方

熟乾地黃 牡蠣 黃耆 剉 人參 去蘆 麥

門冬 去心 白茯苓 已上各一兩 續斷 白芍藥

桂心 五味子 甘草 炙微剉 當歸 白朮

山茱萸 已上各三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一升煮
入生姜半分棗三枚煎至六分去滓每於
食前溫服

治虛勞不足汗出而渴脉結心忪虛煩煎服

龍齒散方

龍齒 壹兩 石膏 半兩 黃耆 壹兩 麥門冬 壹兩

去熟乾地黃 壹兩 人參 壹兩 桂心 壹兩 乾姜

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服

治虛勞不足小便數四肢無力不能自持

服此方

石斛 壹兩半 去根到 黃耆 壹兩 到 澤瀉 三分 補骨脂 壹兩

微 遠志 三分 去心 牛膝 壹兩 當歸 三分 人參 壹兩 去蘆

頭 熟乾地黄 二兩 桂心 三分 五味子 半兩 白茯苓

一鹿茸 壹兩半 去毛 龍骨 壹兩

右件藥搗麤羅為散每服用羊腎一對切

去脂膜以水壹大盞半煮取汁一盞去羊

腎入藥五錢煎至五分去滓食前溫服晚

食前覆滓再煎服之

治虛勞不足藏腑虛弱四肢乏力不能飲食

宜服黃耆散方

黃耆 到 人參 去蘆 陳橘皮 湯浸去 當歸

附子 炮裂去 石斛 去根 白朮 八 山茱萸

白茯苓 已上各 桂心 三分 甘草 半兩 炙 麥門

冬 一兩半 去心 焙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前溫服

治虛勞不足欬逆上氣不欲飲食四肢乏力

宜服胡麻散方

胡麻根桂心 甘草炙微赤 人參去蘆 澤芎

黃耆剉 白茯苓已上各壹兩 五味子去心 麥門冬去心已上 熟乾地黄

去地骨皮 天門冬各半兩 熟乾地黄

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入薤白兩莖生姜半分煎至六分去滓不

計時候溫服

治虛勞不足乏力食少宜服大補益石斛散

方

石斛二兩大根剉 肉苳蓉二兩酒浸一宿刮去 遠

志壹兩去心 兔絲子壹兩酒浸三日曝乾別搗為末 續斷壹兩 天

雄三分炮裂 熟乾地黄二兩 枸杞子二兩

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治虛勞能益氣補不足建中散方

黃耆剉 桂心 白芍藥 白朮 當歸

附子炮裂去皮臍已上各壹兩 甘草半兩炙 木香三分 熟

乾地黄

三分

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓下
飴糖如棗大更煎一兩沸於食前溫服
治虛勞不足陰陽失度傷筋損脉噓吸短氣
漏泄不止小便赤黃陰下濕痒腰脊如折顏
色不悅宜服兔絲子散方

兔絲子

三兩

甘草

二兩炙

棗肉

三兩

桂心

三兩

杜仲

五兩去

麥門冬

二兩去

生乾地黄

五兩

兩

肉蓯蓉

三兩

剉

食心

六

升

曝

乾

右件藥以酒五升漬三宿出曝乾復浸更
曝乾以酒盡爲度搗細羅爲散每服食前
以酒調下三錢
治虛勞脚腎氣寒飢不欲食面色黑少氣不
足宜服礞石散方

礞石

二兩

搗碎

水

黃耆

壹兩

杜仲

壹兩半

白石英

壹兩

五味子

三兩

白茯苓

壹兩

白朮

壹兩

附子

三兩

去

皮

三

錢

以

水

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
蓋煎至六分去滓食前溫服

治虛勞絕傷羸極氣少不足四肢消瘦宜服

胡麻湯方

胡麻三兩熟乾地黄二兩人參一兩去二兩甘草一分

炙微麥門冬二兩去二兩藁本三分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蓋煎至五分去滓食前溫服

治虛勞不足補益思食助力宜服此方

石斛一兩半桑螵蛸三分紫芝三分五味子三分

紫苑三分洗熟乾地黄壹兩鍾乳粉壹兩遠

志半兩附子三分炮裂一分去皮臍入一小

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

治虛勞不足益氣力思飲食宜服鍾乳散方

鍾乳粉二兩黃耆一兩桂心一兩乾姜三分炮

肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮白朮壹兩

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治虛勞不足補養五藏療風氣堅筋骨益精
髓宜服鍾乳浸酒方

鍾乳粉三兩石斛二兩去根二兩去牛膝二兩黃耆二兩

剉防風二兩去蘆頭二兩去熟乾地黃五兩

右件藥細剉都以生絹袋盛以酒二斗浸

三日後每於食前溫飲一小盞

治虛勞腎氣不足夢與鬼交心多忪悸頭目
昏悶四肢少力不欲飲食宜服肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉二兩酒浸一宿剉去熟乾地黃二兩鍾

乳粉二兩五味子三兩龜骨三兩山茱萸三兩車前

子一兩桂心三兩人參三兩牛膝壹兩枸杞

子三兩遠志三兩白茯苓壹兩黃耆壹兩杜仲

皮一兩半壹兩防風二兩去蘆頭三兩薯蕷三兩石菖蒲

分二兩附子壹兩地黃壹兩石斛壹兩去根壹兩兔絲子二兩

酒三升別三升杵為末三升乾別三升杵為末三升

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒

下三十九

治虛勞不足腎藏傷絕宜服麋茸丸方

麋茸 二兩去毛塗 鹿茸 壹兩去毛塗 熟乾

地黃 二兩 牛膝 壹兩 人參 壹兩 白茯苓 壹兩

桂心 壹兩 五味子 壹兩 巴戟 壹兩 兔絲子 壹兩

焙乾別 附子 壹兩炮裂 肉蓯蓉 壹兩酒浸

搗為末 漢椒 半兩去目及閉 山茱萸 壹兩

黃 壹兩 車前子 壹兩 遠志 壹兩 蛇床子 壹兩

右件藥搗羅為末取白羊腎十隻去筋膜

細切爛研用好酒五升慢火熬成膏入前

藥末和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

空心及晚食前溫酒下三十九

治虛勞諸氣不足數數夢泄宜服棘刺丸方

棘刺 二兩 天門冬 二兩 乾姜 壹兩 炮

絲子 壹兩 厚朴 一兩 去雞皮塗

熟烏頭 壹兩 炮裂 小草 壹兩 防葵 壹兩 薯蕷 壹兩

石龍芮 壹兩 枸杞子 壹兩 巴戟 壹兩 草薢 壹兩 細

辛葳蕤 壹兩 石斛 壹兩 去 牛膝 壹兩 去 桂心

壹兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

治虛勞羸瘦諸方

夫虛勞羸瘦者是五藏六腑虛損之候也凡人耽嗜聲色貪味甘脆殊無搏節唯恣性情而又外觸風寒內傷氣血表裏受病陰陽相傳久而不瘳遂成羸瘵此皆冷熱風血氣之所起五勞六極之候因茲有焉脾腎勞傷肌

汁枯瘁故成勞瘦之病也

治虛勞羸瘦四肢少力睡恒不足少思飲食

宜服黃耆散方

黃耆壹兩人參三分去蓋頭五味子三分牛膝壹兩

去白朮一兩桂心三分當歸三分續斷三分白茯苓三分

甘草半兩炙肉蓯蓉二兩酒浸一宿去皺皮炙令乾

右件藥搗羅爲散每服四錢以水一中

少盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓每

於食前溫服何火餅心噉熱即不味

治虛勞羸瘦夜卧失精心神虛煩咽喉不利

少思飲食宜服此方

人參壹兩去龍骨壹兩桑螵蛸壹兩熟乾

地黃壹兩桂心三分黃耆壹兩神麥門

冬一兩半甘草一分白朮三分肉蓯蓉兩

酒浸壹宿刮去去皺皮炙乾

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

盞入生姜半分棗二枚煎至六分去滓每

於食前溫服

治虛勞傷憊四肢羸瘦腰膝無力不能飲食

宜服肉蓯蓉散方

肉蓯蓉壹兩酒浸壹宿刮去熟乾地黃兩石

斛壹兩防風兩附子一兩黃

者壹兩白茯苓兩人參兩牛膝兩去

白朮兩五味子兩桂心兩

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓每

於食前溫服

治虛勞羸瘦膝冷腰疼神思昏沉肢節無力
少精乏氣睡卧多驚宜服補益甘草丸方

甘草壹兩炙薯蕷兩遠志一兩去心續斷一兩

心壹兩牛膝壹兩半人參一兩去蘆頭澤瀉一兩防

風壹兩天雄一兩炮參石斛一兩去根茯苓

神壹兩覆盆子兩車前子一兩五味子壹兩肉蓯

蓉二兩酒浸壹宿刮鹿茸壹兩去毛塗兔

絲子二兩酒浸一日楮實一兩水淘去山

茱萸一兩蛇牀子兩杜仲一兩去微黃巴戟兩

革薺一兩白竜腦半兩研入狗脊兩黃耆一兩

劉生乾地黃二鍾乳粉二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服空心以溫酒下三十丸

晚食前再服

治虛勞水藏久憊腰膝疼冷筋骨無力夢寐

不安陽道劣弱面色萎黃飲食不得日漸羸

瘦宜服補益鍾乳天雄丸方

鍾乳粉天雄炮裂去巴戟已北各肉蓯

蓉 酒浸壹宿刮去 兔絲子 酒浸三日曝乾別搗為末 續

香子 補骨脂天木香天門冬 續

不斷 沉香 石斛 丁香 山茱萸

附子 炮裂去皮臍 肉桂 去皺 當歸 麝香研白

木 人參 仙靈脾 薯蕷 牛膝 去

厚朴 去蘆皮塗生姜 磁石 二兩燒令赤

飛 熟乾地黃 石龍芮 已上各

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如枯桐子大每日空心以煖酒下三十丸

臨臥時再服如不飲酒菹湯下亦得

治虛勞羸瘦心神健忘腰膝多疼臟腑氣虛

陽事衰絕宜服肉苳蓉丸方

肉苳蓉 二兩酒浸一宿刮 兔絲子 酒浸三日曝乾

別 枲 薯蕷 牛膝 巴戟 杜仲 去麤皮

續斷 白茯苓 枸杞子 五味子 蛇

牀子 山茱萸 已上各 茯神 遠志 去心 栢

子 各二

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每日空腹以溫酒下三十九
晚食前再服

治虛勞羸瘦補益骨髓悅澤肌膚羊腎丸方

羊腎

二對去脂膜切破炒乾

人參

去蘆頭

白茯苓

白

木

已上各

杜心

熟乾地黃

二兩

肉蓯蓉

酒

浸

一宿剉去

常歸

蛇牀子

已上各

枳殼

麩

微黃

薯蕷

去穢

黃耆

澤瀉

山茱萸

白

芍藥

吳茱萸

湯浸七遍

兔絲子

酒浸三

日曝乾

別杵

鹿茸

為末

去毛塗酥

遠志

去心

附子

炮裂去

皮臍

壯丹

石斛

去根剉

牛膝

去苗

訶梨勒

畏用

壹兩

右件藥

搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每日空腹以煖酒下三十九

晚食前再服

治虛勞羸瘦食飲無味百節痠疼神思昏沉

四肢無力宜服補益強元氣令人肥健川椒

丸方

川椒

壹兩去目及閉口者炒去汗

白茯苓

栝子

入

芎藭 人參去蘆頭 桂心 黃耆 乾姜炮裂

刺當歸 山茱萸 附子炮裂去皮臍 枸杞子

薯蕷已上各三分 枳實炒微黃 牛膝去骨 厚朴去蠹

皮塗生姜汁炙令香熟 肉苁蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾 石斛去根

刺熟乾地黄 鬼絲子酒浸三日焙乾別搗為末已上各壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空腹以溫酒下三十丸晚食前再服

治虛勞百病絕傷羸瘦久服強筋骨長肌肉悅澤顏色延年不老松子丸方

松子去皮 白茯苓 麥門冬去心焙 栢子人

薯蕷 枸杞子 五味子 茵桂 山茱

萸 覆盆子 熟乾地黄 澤瀉 女貞

實 石南 黃耆剉 遠志去心已上 肉苁

蓉二兩酒浸一宿刮去波皮炙令乾 石斛壹兩半 杜仲壹兩

半去皺皮 炙令黃 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服空心及晚食前溫酒下
三十丸

治虛勞羸瘦下元冷憊脚膝無力風氣相攻
宜服巴戟丸方

巴戟酒浸三日曝乾別壽為末兔絲子酒浸三日曝乾別壽為末石斛去根

子去皮桂心去頭人參去頭牛膝去苗羌活去苗附

子炮裂去皮白茯苓已上各鍾乳粉去雲母

粉酒浸一宿刮去肉蓯蓉酒浸一宿刮去熟乾地黄已

各二兩甘菊花五五味子防風去蘆頭已

右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻鍊

密和得五七百枚丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以溫酒下三十丸

治虛勞痰飲諸症

夫勞傷之人則脾胃氣虛弱不能消化米漿

故為痰也痰者是涎液結聚在於胃膈停積

不散故為痰飲也巢氏病源痰者涎液結聚在於胃膈飲者水漿停積

在勝人參三白大如白

治虛勞消渴飲順氣思食宜服此杷葉散方

枇杷葉半兩拭去毛前胡壹兩去蘆頭半夏三分湯洗

比過人參大腹皮半兩桂心半兩

茯苓壹兩白朮壹兩陳橘皮三分湯浸木香兩

甘草半兩炙夫按件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蒸入生姜半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治虛勞胃中氣滿痰飲澀結或時嘔逆不食

宜服白朮散方

白朮壹兩湯浸枳實三分麩一分

前胡壹兩白茯苓壹兩附子三分

在侏藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治虛勞痰飲心腹煩滿不欲飲食宜服半夏

散方

半夏三分湯洗防風半兩大腹皮三分

麥門冬三分 去心焙 枇杷葉半兩 拭去毛炙微黃 白茯苓

三分 白小三分 桔梗三分 去蘆頭 青橘皮三分 湯浸

前胡三分 蘆頭 人參三分 厚朴一兩 去雜皮塗生薑

汁炙令香熟

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治虛勞心胃痰飲不散少欲飲食宜服前胡

散方

前胡一兩 半壹兩 旋復花半兩 桑根白皮壹兩 陳

橘皮壹兩 湯浸壹兩 枇杷葉壹兩 拭去毛炙微黃 白朮壹兩

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治虛勞痰飲胃脇氣不利宜服桔梗散方

桔梗壹兩 去蘆頭 柴胡壹兩 去苗 赤芍藥三分 赤茯苓

三分 旋復花半兩 五味子三分 人參壹兩 去蘆頭 龍中

壹兩 塗醋炙 陳橘皮壹兩 湯浸 白朮三分 檳

椰三分甘草一分炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服思莧菜宜

治虛勞痰飲嘔吐涎沫宜服桂心散方

桂心一兩甘草半兩炙皂莢三寸去皮塗酥

白木三分陳橘皮一兩湯浸前胡三分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

大計時候稍熱服

治虛勞脾胃氣弱痰飲不散嘔逆不下食宜

服草薹薹丸方

草薹半兩薹半兩桂心半兩丁香一分高良姜半兩

附子半兩炮裂半夏半兩湯洗人參半兩

頭白茯苓二分訶梨勒三分煨厚朴一分

生薑汁炙白荳蔻半兩陳橘皮二兩湯浸

右件藥搗羅為末酒煮麪糊和丸如梧桐

子大每服食前以姜棗湯下

治虛勞胃膈積聚痰飲不思食宜服旋復花
丸方

旋復花半兩 細辛三分 前胡一兩 去蘆頭 桂心三分

茯苓兩 半夏三分 湯洗 枇杷葉三分 去毛炙令黃

枳實三分 麩一分 訶梨勒皮兩 壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服食前以生姜湯下二十九

治虛勞脾胃虛冷食不消諸方不食宜

夫脾為藏主消水穀胃為腑主盛水穀若脾

胃溫和則能消化今有虛勞則血氣衰弱脾
胃虛冷故不能消於穀也

治虛勞脾胃冷弱食不消化四肢少力宜服

白荳蔻散方

白荳蔻壹兩 去皮 木香兩 青橘皮壹兩 湯洗

人木兩 吳茱萸半兩 湯浸 訶梨勒壹兩 用皮 乾

姜三分 草荳蔻兩 厚朴壹兩 去麩皮

令香 桂心兩 人參壹兩 去蘆頭 甘草半兩 炙

右件藥搗羅為散每服三錢以水啗之

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前稍熱服

一人參

壹兩去

甘草

壹兩

此

治虛勞脾胃虛冷食不消化腹脇氣痛宜服

人參散方

人參

壹兩去

常歸

壹分

草薺

壹分

陳

皮

橘皮

一兩湯浸

厚朴

二兩去

薑汁

炙令香熟

桂

皮

白朮

壹兩

白朮

壹分

大麥

壹兩

微

黃

炒

吳茱萸

半兩湯浸

七

山

不

微

炒

山

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前稍熱服

治虛勞脾胃虛冷食不消化漸加無力宜服

白朮散方

白朮

壹兩

陳橘皮

壹兩湯浸

人參

壹分

蘆頭

麥

藥

壹兩

附子

壹兩炮

裂

芎藭

壹兩

厚朴

壹兩

薑皮

壹兩

訶梨勒

壹兩

桂心

壹分

此

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食
前稍熱服

治虛勞脾胃虛冷食不消化腹脇氣痛宜服

人參散方

人參

壹兩去

常歸

壹分剉

草薺

壹分

陳

橘皮

一兩湯浸

厚朴

二兩去

薑汁炙

令香熟

桂

心參

半兩炙

白朮

壹分

大麥

二兩炒

微黃

吳茱萸

半兩湯浸七

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食
前稍熱服

治虛勞脾胃虛冷食不消化漸加無力宜服

白朮散方

白朮

壹兩湯浸

陳橘皮

壹兩湯浸

人參

壹分去

麥

藥

壹兩炒

附子

壹兩炮裂

芍藥

壹兩

厚朴

薑皮

壹兩湯浸

訶梨勒

壹兩

桂心

壹分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前稍熱服

治虛勞脾胃虛冷喫食即吐胃中妨礙宿食不消宜服厚朴散方

厚朴壹兩 薑兩 炙甘草兩 高良姜兩 丁香兩 白芷兩

薤白兩 枳實兩 厚朴兩 薑兩 炙甘草兩 高良姜兩 丁香兩 白芷兩

訶梨勒兩 陳橘皮兩 桂心兩 前胡兩 蘆頭兩 半夏兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前稍熱服

治虛勞脾胃虛冷飲食不消宜服白朮散方

白朮壹兩 人參兩 蘆頭兩 桂心兩 厚朴兩 去麤皮

塗生薑汁兩 吳茱萸兩 遍焙乾兩 訶梨勒兩 皮兩

益智子兩 陳橘皮兩 白穰兩 檳榔兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

治虛勞脾胃虛冷食不消化宜服草薹散

方

草荳蔻一兩 去皮 人參一兩 去頭 桂心一兩 白朮一兩

半夏七兩 湯洗 去滑 甘草壹分 炙 微赤 剉 陳橘皮壹兩 湯浸

去白厚朴壹兩 半 去麤皮 塗 薑汁 炙 令香 熟

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前稍熱服

治虛勞脾胃冷弱腹中氣脹滿食不消化宜

服神麴散方

神麴二兩 微炒 木香壹兩 陳橘皮一兩 湯浸 去白 瓢焙 麥蘖二兩 微炒 草荳蔻壹兩 去皮

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下壹錢

治虛勞脾胃虛冷飲食不消腹脇脹滿宜服

訶梨勒丸方

訶梨勒壹兩 煨 用皮 桂心叁分 丁香半兩 高良姜半兩

剉草荳蔻一兩 皮 神麴壹兩 炒 微黃 麥蘖兩 炒 微黃

白朮一兩 去 人參一兩 去 吳茱萸半兩 湯浸 十 遍 乾 微炒

厚朴壹兩去麁皮塗生陳橘皮一兩易浸

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以姜棗湯下二十

丸

治虛勞脾胃虛冷飲食不消腹脇氣滿宜服

神翹丸方

神麴三兩炒白朮一兩附子一兩炮裂枳殼

壹兩麩炒高良姜壹兩人參壹兩去吳茱

萸壹兩湯浸七訶梨勒壹兩煨草荳蔻壹

壹兩湯浸七訶梨勒壹兩煨草荳蔻壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前煎橘皮湯下二十

丸

治虛勞脾氣虛弱腹脹食飲不消面無顏色

四肢羸瘦宜服丁香丸方

丁香壹兩硫黃三分神麴壹兩炒陳橘皮壹

湯浸去厚朴壹兩去麁皮塗生檳榔壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

丸

如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒
下豈十九粥飲下亦得

治虛勞不思食諸方

夫脾胃者候身體肌肉也胃為水穀之海若
虛勞則藏腑不和令脾胃氣弱故不思食也
治虛勞脾胃氣虛不思飲食宜服白朮散方

白朮 木香 草薢 薤白 陳橘皮 湯浸去

人參 去蘆 肉苳蔻 益智子 去乾姜 裂

白茯苓 厚朴 去蘆皮塗生薑汁炙 半夏

半兩湯洗 甘草 半兩炙
七遍去滑 微赤剉

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治虛勞脾胃氣不和心腹冷氣不思飲食宜

服厚朴散方

厚朴 薑汁炙令香熟 人參 一兩去蘆頭 吳茱

萸 半兩湯浸七沸 青橘皮 半兩湯浸白朮 兩

白茯苓 兩 草薢 去皮 桂心 兩 高良姜 兩

附子半兩炮川草壹兩炙

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壺中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治虛勞脾胃氣虛弱不思飲食四肢無力睡

恒不足面色萎黃宜服訶梨勒散方

訶梨勒三分煨人參半兩去當歸半白朮

一芍藥半兩丁香半兩甘草一分炙陳橘皮壹

湯浸去黃耆三分桂心半兩熟乾地黃壹兩麥

白甄焙剉剉

門冬壹兩半去心焙

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壺中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治虛勞脾胃不和少思飲食或時自瀉宜服

厚朴散方

厚朴壹兩去皮朴厚人參壹兩去蘆

頭陳橘皮壹兩易浸白朮一兩訶梨勒一兩

皮草薏壹兩甘草半兩炙剉剉

右件藥搗細羅為散每服食前以生薑棗湯調下壹錢

治虛勞脾胃虛冷不思飲食宜服溫脾散方

訶梨勒二兩煨用皮肉桂二兩去皺皮木香壹兩肉荳

寇壹兩去殼人參壹兩去蘆頭附子壹兩炮裂去皮臍乾姜

半兩炮白茯苓壹兩丁香半兩沉香兩厚朴一

人麤皮塗生姜甘草半兩炙藿香兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服忌醋物菘菜

治虛勞不思食煮肝散方

木香兩人參壹兩去蘆頭桂心兩胡椒一分補骨

脂半兩白朮兩白芍藥兩高良姜兩乾姜

半兩炮陳橘皮壹兩浸厚朴兩去蘆

汁炙冷縮沙半兩去皮

右件藥搗細羅為散每服用獐猪肝一具

和切以散五錢拌和令勻入於鑊內以漿

水二大盞入葱白五味煮令爛熟任意食

之二大益入藥白芷和熟令服藥汁意食

治虛勞暖脾壯胃令思飲食和氣通真丸方

厚朴一兩去麤皮塗生楮實三分水淘大

石斛壹兩去根到肉桂壹兩去皮乾姜三分炮附

子一兩炮梨牛膝三分白木壹兩青橘皮兩

湯浸去人參一兩白茯苓兩檳榔三分薯

黃兩木香三分乳香兩肉荳蔻壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大每服食前以生姜棗湯下三

十丸酒下亦得

治虛勞脾胃虛冷氣滿不思食宜服桔梗丸

方

桔梗壹兩去白木一兩棗心吳茱萸兩

半湯浸十遍厚朴二兩去麤皮塗生陳橘

皮壹兩湯浸枳殼一兩炒人參一兩半

乾姜壹兩炮甘草半兩炙麥蘗壹兩半神

麴壹兩半肉荳蔻三分

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以煖酒下二十九
以差爲度

治虛勞脾胃不調腹脇脹滿不思飲食宜服
厚朴丸方

厚朴 壹兩去麤皮塗生 五味子 兩 桔梗 壹兩
去蘆 白朮 半兩 枳殼 壹兩麩炒 訶梨勒 壹兩
頭 煨用 桂心 三分 乾姜 半兩炮 人參 壹兩去
皮 益智子 三分 去皮 麥
右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九
治虛勞脾胃大冷全不思食或氣脹滿宜服
華菱丸方

華菱 兩 人參 壹兩去 桂心 兩 乾姜 壹兩炮
訶梨勒 壹兩半 白茯苓 三分 胡椒 三分 陳橘皮
三分湯浸 去白蠟 末 鍊蜜和搗壹二百杵丸
右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗壹二百杵丸
如梧桐子大每服食前以粥飲下二十九
治虛勞脾胃氣冷不思飲食或氣滿刺痛宜

服木香丸方

木香半兩訶梨勒壹兩肉荳蔻一分麝香

右件藥搗羅為末煮棗肉和丸如棗豆大

每服食前以煖酒下十九

治虛勞心腹痛諸方

夫虛勞者藏氣不足故也復為風邪所乘邪

正相干冷熱擊搏故為心腹痛也

治虛勞肩背疼悶心腹脹痛腸胃虛鳴臍下

拘急宜服鱉甲散方

鱉甲一兩半塗醋炙柴胡壹兩半京三稜

炮一兩當歸壹兩赤芍藥一兩人參一兩去

木壹兩陳橘皮三分湯浸大腹皮兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞入生姜半分煎至六分去滓食前稍熱

服

治虛勞肩背及心腹疼痛或四肢不和腹胃

脹滿宜服芎藭散方

芎藭兩 柴胡壹兩半 桂心三分 赤芍藥兩 白

木兩 大腹皮三分 桃人二十枚 湯浸去皮 陳

橘皮三分 湯浸去白穢 焙木香三分

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治虛勞心腹痛胃氣不和腹脇脹滿宜服木

香散方

木香 芎藭 枳殼麩炒 微桃人 湯浸去

人麩炒 陳橘皮湯浸去 桂心 赤芍藥
微黃 人參去蘆 檳榔已上各

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

治虛勞冷氣攻心腹痛宜服丁香散方

丁香半兩 當歸三分 赤芍藥三分 厚朴一兩半 去

姜汁炙 青橘皮壹兩 湯浸去白 木香三分 桂心三分

人參半兩 去蘆頭 桃人二分 湯浸去皮 尖 川椒

一分去目及閉 口者微炒 去汗

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不
計時候稍熱服

治虛勞心腹痛小腹滯悶宜服沉香散方

沉香一兩附子炮裂去皮臍檳榔去殼肉桂去皮

陳橘皮湯浸去白麝香子已上各當歸兩丁香

香兩半

右件藥搗細羅爲散每服食前以熱酒調
下二錢

治虛勞心腹脹滿刺痛食不消宜服肉苳菹
升方

肉苳菹壹兩木香壹兩丁香半兩當歸半兩京三

稜壹兩神麴壹兩陳橘皮半兩白兩麝香一分麥

人二兩雙兩炒微黃安息香兩麝香一分麥

藥壹兩微黃

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服食前以熱酒下十五丸

治虛勞心腹或臍下疼痛兼暖脾腎順氣思

食阿魏丸方

阿魏半兩細研用白麩壹兩吳茱萸湯浸

七遍炒木香二兩補骨脂二兩微炒青橘皮湯浸

去白微炒乾姜二兩炮裂附子二兩炮裂檳榔二兩

藜香子二兩微炒肉桂二兩去

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵凡

如梧桐子大每服食前以熱酒下十五丸

生姜湯下亦得

又方高橘皮

壹兩湯浸枳心壹兩木香壹兩桃人

壹兩湯浸辰去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗細羅為散每服食前以熱酒調

下壹錢

又方乾漆

壹兩杵碎京三稜一兩炮蓬莪茂兩

煨青橘皮三分湯浸桃人壹兩湯浸去皮

黃枳心壹兩

右件藥搗細羅為散每服食前以熱酒調

下壹錢

治虛勞積聚諸方

夫虛勞積聚者藏腑之病也積者藏病也陰氣所生也聚者腑病也陽氣所成今虛勞之人陰陽氣傷損血氣凝澀不宣通於經絡故成積聚於內也

治虛勞積聚或心腹疼痛四肢羸瘦小便赤不能飲食宜服鱉甲散方

鱉甲 三兩塗醋炙 厚朴 一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟
木香 三分 檳榔 三分 神麴 二兩炒 京三稜 一兩
川大黃 二兩剉 芎藭 半兩 青橘皮 三分湯浸碎微炒 白礬 煨

桃人 壹兩易浸去皮尖 雙人 麩炒微黃 麥蘖 壹兩炒 當歸 半兩 赤芍藥 一兩 桂心 三分 柴胡 一兩半
右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中盞入生姜半分煎至六分去滓食前稍熱服忌菹菜生冷

治虛勞積聚結塊心腹脇助刺痛宜服桃人散方

桃人 貳兩湯浸去皮尖 雙人 麩炒微黃 川大黃 貳兩剉 鱉甲 壹兩塗醋炙 吳茱萸 半兩湯浸 當歸 壹兩 微黃去滓 微炒

壹訶梨勒壹兩半京三稜一兩木香半兩桂兩心兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓食前稍熱服息菟菜生

冷

治虛勞積聚堅實腹如鼓食即却吐坐卧不安喘急宜服白朮散方

白朮半兩防葵兩欖榔二兩郁李人二兩湯浸去皮微炒鱉甲兩醋炙微黃吳茱萸三分湯浸去滓乾微炒枳

人三分湯浸去滓尖雙人雙炒微黃訶梨勒壹兩半煨用皮

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中盞入生姜半分煎至六分去滓食前溫服

以微利為度忌菟菜生冷油膩

治虛勞積聚心腹壅悶喘息氣促不能飲食

四肢瘦弱宜服赤茯苓散方

赤茯苓壹兩紫苑三分洗白朮半吳茱萸壹湯浸七通郁李人三分湯浸去當歸半兩

參半兩去鱉甲三分湯浸去枳心半兩欖榔

盧頭微黃大裙欄桂心半兩欖榔

兩半

右件藥搗羅羅爲散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分煎至五分去滓食前溫服
忌菹菜濕麵生冷

治虛勞積聚腹中堅硬氣脹喘急宜服狼毒
丸方

狼毒 二兩半 醋浸炙 肉桂 二兩 去 川烏頭 半兩 去
拌京三稜 一兩 炮 紫苑 三分 洗 附子 壹兩 去
臍川大黃 二兩半 剉 鱉甲 貳兩 塗 微黃 去 甜

葶藶 叁分 隔紙 檳榔 二兩 鱉甲 壹兩 木香 一

桃人 二兩 湯浸去皮尖 吳茱萸 一兩 湯浸

微皂莢 三分 湯浸去皮塗 芫花 半兩 炒

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸

如柿桐子大每服空心以溫酒下十丸忌

菹菜濕麵生冷末驗

治虛勞積聚脇下妨滿腹脹不能食及腹中
痛宜服防葵丸方

防葵 壹兩 柴胡 一兩 去 木香 三分 桃人 壹兩 湯浸

人麩炒 驚甲 一兩塗醋炙 桂心 一兩 川大黃

微黃 壹兩 對當歸 兩 京三稜 壹兩 炮赤芍藥 兩 檳

榔 兩 郁李人 壹兩湯浸去 皮 壹兩湯浸去 不消食又服中

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九

忌莧菜生冷濕麵

治虛勞積聚痞結腹脇脹滿宜服京三稜丸

方

京三稜 三兩 炮川大黃 二兩 對驚甲 二兩 塗

黃去 赤芍藥 壹兩 桂心 兩 乾姜 壹兩 炮訶梨

勒 二兩 煨檳榔 兩 川烏頭 壹兩 炮裂 吳茱

萸 壹兩 湯浸七 桃人 四兩 湯浸去皮尖

右件藥搗羅為末熬醋如膠和搗三二百

杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二

十九漸加至三十九下爛肉黑膿為度

治虛勞積聚羸瘦不任宜服驚甲丸方

驚甲 二兩 塗醋炙 肉桂 二兩 去川大黃 二

對訶梨勒 二兩 煨牽牛子 壹兩 京三稜

壹兩 桃人 二兩湯浸去皮尖 吳茱萸 湯浸
 炮剉 雙人 麩炒微黃
 七漏焙 白木 兩
 乾微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
 如梧桐子大每服空心以溫酒下三十九
 加至四十九忌莧菜生冷濕麪

治虛勞癥瘕諸方

夫虛勞癥瘕病者皆由久寒積滯冷飲食不
 能消化所致也結聚牢強按之不轉動者為
 癥推之轉移則為瘕也今虛勞之人脾胃氣

弱不能消化水穀復為寒冷所乘故結成此
 病也

治虛勞癥瘕或攻心腹四肢無力不思飲食

宜服驚甲散方

驚甲 一兩半塗醋炙 桃人 一兩湯浸去皮
 微焦黃去裙襖 柴胡 壹兩半乾姜 半兩炮
 黃 京三稜 壹兩 柴胡 壹兩半乾姜 半兩炮
 芎藭 兩半木香 三分川大黃 壹兩剉陳橘皮 兩
 湯浸去 訶梨勒 兩皮 赤茯苓 兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水盪中

蓋入生姜半分煎至六分去滓食前稍熱服忌菟菜生冷濕麵

治虛勞癥瘕或氣攻脾胃令人心下及胃管

兩傍堅硬喘息急促牽引兩脇妨痛宜服防

葵散方

防葵三分京三稜三分剉碎蓬莪茂半訶梨

勒半兩煨檳榔兩赤茯苓兩人參半兩去

白朮兩桂心兩枳殼半兩煨炒白荳蔻兩

去木香兩川大黃半兩剉碎丁香壹分附子兩

炮裂去皮臍郁李人三分湯浸去鱉甲二兩洗
用硃砂半兩研碎以醋二合浸硃砂
去却石塗醋炙鱉甲硃砂醋盡為度

右件藥搗細羅為散每服空心及晚食前

以溫酒調下一錢忌菟菜生冷濕麵

治虛勞癥瘕結塊不消者宜服三神煎方

桃人一千二百粒湯浸去皮尖雙人京三

稜三兩鱉甲三兩塗醋炙微黃去醋爛

右件藥除桃人外搗羅為末於鐺中先煎
桃人汁耗一半下二味藥末以木篋不住

手攪煎良久又下好酒三味煎如稀餈收
瓷器中盛每日空心及晚食前以熱酒壹
中盞調下壹茶匙忌莧菜生冷濕麪

治虛勞癥瘕心腹脹滿或氣喘欬嗽宜服烏

頭丸方

川烏頭

壹兩炮裂去皮

桃人

二兩湯浸去皮尖

驚甲

二兩塗醋炙

吳茱萸

壹兩湯浸七皂

莢

三分去皮塗酥

陳橘皮

壹兩湯浸白木

枳殼

壹兩炒微黃

桔梗

壹兩去蘆頭

枳殼

壹兩炒微黃

檳榔

壹兩防

葵

壹兩赤芍藥

乾姜

壹兩炮裂

細辛

壹兩去蘆頭

甘草

壹兩炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

加梧桐子大每服空腹及晚食前以溫酒

下二十九

治虛勞癥瘕心腹疼痛胃膈不利宜服京三

稜煎丸方

京三稜

八兩炮

陳橘皮

八兩湯浸去白

桃人

四兩湯浸去皮

已上四味除桃人外擣羅爲末用好酒五升於鍋中以慢火煎次下桃人膏熬如稀餈入後藥末

檳榔二兩訶梨勒二兩煨用皮枳殼四兩麩炒微黃去瓢木

香三兩鱉甲二兩塗醋炙微黃去礞砂壹兩硫黃二兩

細研水附子二兩炮裂去皮生薑三兩炮裂剉

右件藥擣羅爲末入研了礞砂硫黃等重研令勻入前煎內和丸如梧桐子大每服空腹及晚食前以生薑湯或溫酒下三十

丸忌莧菜生冷末入前煎內和丸如梧桐子

治虛勞癥瘕久不差躋肋有塊形如盃或如

雞子透隱皮膚或經年不消或疼痛如刺或

堅硬如石能服此藥令自消化芫花丸方

芫花二兩醋拌炒令乾蓬莪茂二兩神麴壹兩炒麥

藥壹兩炒微黃鼈甲二兩塗醋炙微黃去京三稜二兩

炮白朮壹兩草薺二兩麝香一分

右件藥擣羅爲末醋煮麴糊和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下十九

忌菟菜生冷
心久與食前以盛水不十成

治虛勞癥瘕食不消化面色萎黃四肢羸瘦

喫食全少腹內常多冷氣大腸不調腰膝疼

痛宜服陳橘皮煎丸方

陳橘皮 一斤湯浸去白瓢焙乾為末

膏附子 二兩炮裂 草薢 三兩 京三稜 三兩

當歸 三兩 桂心 三兩 乾姜 三兩炮裂 桃人 三兩湯

尖雙人麩炒微黃

右件藥搗羅為末入前橘皮煎中印搗五

七百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食

前以清粥飲下三十丸

治虛勞癥瘕心腹冷氣胃管煩痛臍下多疼

氣塊發即上搶心胛手足逆冷宜服三稜鱉

甲布方

京三稜 一兩 鱉甲 二兩塗醋炙微 乾姜 壹

炮裂 青橘皮 壹兩湯浸 蓬莪茂 壹兩 芫花 壹兩

醋拌炒 川椒 壹兩去目及閉

右件藥搗羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐

子大每服食前以生姜湯下十五丸忌菹菜

治虛勞癥瘕腹脹食飲不消面無顏色四肢

羸瘦宜服硫黃丸方

硫黃一兩細研一兩木香一兩厚朴一兩半去蘆皮塗

陳橘皮一兩白穰一兩神麴一兩炒一兩檳榔半

桃人一兩湯浸一兩去皮一兩去一兩微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵丸

如梧桐子大每服食前以桃人湯或口酒

天下三十丸

治虛勞癥瘕不消宜服驚甲煎丸方

驚甲二兩別搗二兩乾漆一兩附子炮裂

上各一兩京三稜壹兩炮壹兩加大黃壹兩炒壹兩木香半

右件藥搗羅為末先將驚甲末以頭醋三

升煎令稠然後入諸藥末和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫

酒下十丸忌菹菜生冷

治虛勞癥瘕不能下食日漸羸瘦宜服白朮

丸方 雙料 不 宜 煎 宜 煎 宜 煎

白朮一兩 防葵一兩 木香壹兩 鱉甲二兩 塗醋炙

神麴壹兩 炒 檳榔壹兩 梨勒一兩 煨

右件藥搗羅為末 鍊蜜和搗 三百杵 丸

如梧桐子大 每服空心及晚食前以生姜

湯下三十丸 忌菹菜生冷

治虛勞驚悸諸方

夫心藏神而生血脉 今虛勞之人 損傷於血

脈致令心氣不足 因為邪氣所乘 則使驚而

悸動不安定也

治虛勞驚悸 心神不安 宜服人參散方

人參壹兩 白芍藥三分 桂心三分 黃耆壹兩

甘草半兩 炙 茯苓壹兩 白竜骨一兩 牡蠣壹兩

粉遠志一兩 去心 澤瀉一兩 酸棗人二兩

右件藥搗羅為散 每服二錢 以水一

盞煎至六分 去滓 不計時候 溫服

治虛勞驚悸 奔氣在胸中 不得眠睡 酸棗人

參散方

參散方

參散方

參散方

散方 治虛勞驚悸不安心膈煩滿不能嗜食宜服

酸棗人一兩 甘草三分 白茯苓兩 半夏一分

三分湯洗前胡 蘆頭五分 去五味子 三分 林心兩

人參壹兩 去盧頭 右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

煮入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞驚悸不安心膈煩滿不能嗜食宜服

黃耆丸方

黃耆壹兩 去盧頭 桂心兩 當歸兩 赤

石脂壹兩 研扶神 壹龍齒 一兩 朱砂壹兩 遠

志壹兩 去心 桔梗三分 去栢子 人三分 五味子壹

麥門冬壹兩 去心 焙薯蕷 兩枳實 一分 炒黃耆

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵凡如栢桐子大每服不計時

候以溫酒下二十九

治虛勞驚悸不能食神思虛煩不多睡宜服

安和定志令人嗜食人參丸方

黃耆壹兩 去盧頭 桂心兩 當歸兩 赤

石脂壹兩 研扶神 壹龍齒 一兩 朱砂壹兩 遠

志壹兩 去心 桔梗三分 去栢子 人三分 五味子壹

麥門冬壹兩 去心 焙薯蕷 兩枳實 一分 炒黃耆

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

人參三分去蘆頭 茯神壹兩 芎藭半兩 枳殼半兩 炒微

去微 薏苡人壹兩 桂心半兩 甘草半兩 炒微 薯蕷

一兩 白朮半兩 龍齒三分 鐵粉半兩 黃耆一兩

厚朴三分 姜汁去麤皮 生薑令香熟

右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻鍊

蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以溫酒下二十九

治虛勞風邪驚悸心氣不定喫食少四肢瘦

損無力宜服竜齒丸方

竜齒三分 黃耆壹兩 熟乾地黄壹兩 人參三分

頭栢子 人三分 防風三分 去蘆頭 獨活三分 甘草半兩

炙微 枳殼半兩 炒微 白朮三分 乾姜三分 炮

桂心三分 鱉甲壹兩 去微 裙襴炙 桔梗半兩 去蘆頭 茯

神一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二

十九忌苜蓿菜

治虛勞驚悸心氣不定宜服丹砂丸方

丹砂 壹兩細研 龍齒 半兩末研 茯神 兩 遠志 兩

去雄黃 細研 犀角屑 鬼白 去毛 桂心 人參

去蘆頭已 虎鼻 壹枚乾者 麝香 壹分細研

右件藥擣羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

擣三二百杵大如梧桐子大每服不計時

候以溫酒下十五丸晚食前再服

治虛勞驚悸神氣不足多忘不安宜服遠志

丸方

遠志 二兩去心 茯神 壹兩 石菖蒲 壹兩 黃耆 壹兩熟

乾地黄 壹兩 人參 壹兩 去蘆頭 薯蕷 壹兩 麥門冬 二兩

去心 龍齒 一兩細研 紫石英 壹兩細研

右件藥擣羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

擣三二百杵大如梧桐子大每服不計時

候以人參湯下十五丸

補虛勞止驚悸令能食紫石英湯方

紫石英 五兩打碎如米

右以水一斗煮取二升去滓澄清細細溫

服或者羹粥食亦得服盡更煎之

治虛勞兼痢諸方

夫虛勞兼痢者此由藏腑虛損傷於風冷故也胃為水穀之海今胃冷腸虛則為痢也

治虛勞大腸久冷洩痢不止宜服華菱散方

華菱 三分 肉苳蔻 三分 赤石脂 兩 訶梨勒 兩
壹
 煨 用 丁香 兩 白茯苓 兩 阿膠 兩 黃燥 白
 皮 用
 造骨 三分 當歸 兩 桂心 兩 縮砂 三分 人參 三分
 去蘆 厚 朴 三分 去麤 及塗生 陳橘皮 半兩
 頭 去白 甘草 壹分 炙 微赤 剉
 瓢焙

右件藥搗細羅為散每服煎艾粥飲調下
 二錢空心及晚食前服

治虛勞腸胃久冷洩痢不止訶梨勒散方

訶梨勒 兩 煨 用皮 乳香 兩 乾姜 兩 炮 裂剉 縮沙
 半兩 肉苳蔻 兩 赤石脂 兩 燒 兩 甘草 一分
 去皮 剉 赤

右件藥搗細羅為散每服食前以粥飲調

下二錢

治虛勞久痢腹內疼痛不可忍者宜服肉苳

菹散方

肉荳蔻

三枚去殼以大麥麩二兩用水和如餅劑子裏荳蔻於灰火內煨製

黃熟為度放冷取黃連二兩木香二兩

右件藥除荳蔻外別搗羅黃連等為散每

服二錢以水壹中盞煎至五分去滓調下

荳蔻末壹錢不計時候服

治虛勞洩痢至甚神效無比入石散方

白礬 陽起石 太陰玄精 禹餘糧已

各三兩鍾乳粉 寒水石 金牙石 黃丹

已上各壹兩

右件藥搗研如粉以塩泥固濟瓶子內諸

藥末密封泥候乾以火漸漸逼之相次加

火至二十斤斷之火盡為度候冷取出重

研令極細每服三錢病重者四錢以猪肝

一具切作片摻藥末在肝內并入塩二錢

葱白壹握擘碎鑪斲令熟了便以胡椒

薑芩末生姜醋醬喫後飲煖酒一兩盞渴

即粥飲解之甚者不過三服

治虛勞泄痢腹脹滿痛或時疼痛飲食減少

四肢無力宜服白荳蔻丸方

白荳蔻半兩去皮半兩白朮兩胡椒半兩當歸兩白龜

骨兩葶芩兩厚朴壹兩去麤皮塗生陳橘

皮壹兩湯浸芎藭兩人參兩去肉桂兩

去皴白茯苓兩訶梨勒壹兩用皮乾薑兩炮裂

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服食前以粥飲下三十九

疔痛宜服赤石脂丸方

赤石脂兩石斛壹兩去肉桂兩去鍾乳

粉兩肉荳蔻壹兩乾姜兩附子兩

去皮當歸兩白龜骨兩人參兩去川椒

壹兩去白茯苓兩訶梨勒兩

右件藥搗羅為末以神麴末酒煮和搗三

二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以

粥飲下三十九

治虛勞泄痢腸胃虛冷飲食不消腹內雷鳴

疔痛宜服赤石脂丸方

赤石脂兩石斛壹兩去肉桂兩去鍾乳

粉兩肉荳蔻壹兩乾姜兩附子兩

去皮當歸兩白龜骨兩人參兩去川椒

壹兩去白茯苓兩訶梨勒兩

右件藥搗羅為末以神麴末酒煮和搗三

治虛勞脾胃氣不和
大腸泄痢水穀難化不
思飲食宜服訶梨勒丸方

訶梨勒三分地榆一分木香半兩乳香一兩

當歸三分乾姜半兩白龍骨壹兩阿膠一兩

炒令附子壹兩去皮臍裂

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大勿服空心及每食前以粥飲

下三十九

治虛勞泄痢兼脾胃氣不和不思飲食宜服肉

荳蔻猪肝丸方

肉荳蔻壹兩去殼草荳蔻壹兩去皮訶梨勒二兩煨

縮沙壹兩去皮陳橘皮壹兩半炙

右件藥擣羅為末川猪肝壹葉可重四兩

已來切為片子以烏梅上枚搥碎以米泔

汁同浸猪肝一宿後却用濕紙裹煨令肝

熟後入醋少許同細研如糊入前藥末和

丸如梧桐子大每服以粥飲下三十九空

心及每食前服

治虛勞洩痢腹痛不欲飲食宜服香連丸方

木香壹兩黃連壹兩地榆壹兩訶梨勒二兩

皮用厚朴二兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟當歸壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如櫻桐子大

每服不計時候粥飲下二十丸

治虛勞脾胃久積冷氣大腸泄痢嘔逆面色

萎黃宜服硫黃丸方

硫黃二兩蛤粉五兩

右件藥用固濟了瓶子壹箇先以蛤粉壹

半鋪底當心藥作一坑子然入硫黃末後

以餘者蛤粉頭慢火燒莫令焰起真待硫

黃鎔後取出於淨地上出火毒一夜二味

壹處細研以粟米飯和丸如棗豆大每服

不計時候以粥飲下七丸至十九

治冷勞諸方

夫冷勞之人氣血枯竭表裏俱虛陰陽不和

精氣散失則內生寒冷也皆由臟腑久虛積

冷之氣傳注於內遂令宿食不消心腹積聚

臍腹疼痛面色萎黃口舌生瘡大腸洩痢手足無力骨節痠疼久而不痊轉加羸瘦故曰冷勞也

治冷勞羸瘦四肢無力不思飲食或時洩痢

宜服補骨脂散方

補骨脂二兩剉梨勒一兩半枳殼三分麩

肉蓯蓉二兩湯浸一宿刮厚朴壹兩去

生薑汁一兩去毛酒洗肉苳蔻三分

去龍骨壹兩赤石脂壹兩白木壹兩縮沙二兩當

歸半兩

右件藥搗細羅為散每服食前以粥飲調

下二錢忌生冷油膩

治冷勞藏腑虛弱心腹氣脹不能飲食四肢

無力宜服華澄茄散方

華澄茄兩附子半兩炮裂木香半兩京三稜

炮剉白茯苓半兩肉苳蔻半兩沉香半兩人參

蘆頭半兩去白木半兩桂心半兩丁香半兩甘草一分

剉桃人半兩湯浸去皮尖陳橘皮半兩湯

輒吳茱萸壹分易浸七遍焙乾訶梨勒壹兩半厚

朴半兩去蘆皮塗生驚甲壹兩塗醋炙

右件藥擣細羅為散每服食前以粥飲調

下二錢忌莧菜生冷

治冷勞欬嗽四肢無力大腸不調喫食減少

腹脇氣脹宜服炙肝散方

蒼木半兩柴胡一兩半桔梗半兩去赤芍

藥三分陳橘皮半兩湯浸紫苑三分洗縮沙

三分訶梨勒一兩煨高良姜半兩

去皮用皮

右件藥擣細羅為散每服用猪肝一具切

去脂膜如肉片入散一兩拌和令勻竹筍

子串慢火炙令熟食前任意喫以粥飲下

治冷勞羸瘦不能食心腹多疼四肢無力炙

川散方

紫苑半兩洗乾姜半兩炮縮沙半兩燕莢

半人參壹分去蘆頭白茯苓一分甘草壹分炙當

歸一分木香一分陳橘皮壹分湯浸川椒一分

及開口者厚朴半兩去蘆皮塗生草荳蔻

半兩桂心一分胡椒一分桔梗半兩去蘆頭細辛半兩

蒼朮半兩白朮半兩附子半兩炮裂去皮臍芎藭壹分

右件藥擣細羅為散每服用猪肝一具去

脂膜薄切如肉片入散壹兩半葱薤白一

握細切鹽末相拌令有味以竹串了穿慢

火炙令熟每服空心食之後飲煖酒一兩

蓋為妙

治冷勞心腹虛脹食飲全少四肢無力大腸

不調宜服炙肝散方

蒼朮半兩芎藭半兩青橘皮半兩湯炙白芍

藥壹兩紫苑兩桔梗壹兩木香兩肉苳蔻

半兩檳榔兩厚朴壹兩去麤皮壹兩薑汁炙令香熟

修製同前方法

治冷勞肌體羸瘦或時腹痛食飲不消日漸

羸宜服猪肝丸方

猪肝一具切去脂膜用醋五鱉甲壹兩塗醋炙

令黃二兩厚朴二兩去麤皮壹兩訶梨勒壹兩

半兩陳橘皮壹兩湯浸川椒三分去目炙

柴胡壹兩 枳心三分 神巧壹兩 蒼朮壹兩
 汗去 訶梨勒壹兩 木香三分 桔梗三分 烏梅壹兩
 肉三分 甘草半兩 紫苑壹兩 乾姜三分
 炮裂萬全 蕪荑二分 當歸三分 附子壹兩
 壹兩 右件藥搗羅為末入猪肝膏內和搗五七
 百杵丸如梧桐子大每服食前以粥飲下
 三十九忌菟菜
 治冷勞羸瘦四肢無力肩背疼痛脇積聚

氣喫食不消宜服驚甲丸方

驚甲壹兩 熟乾地黄壹兩 郁李壹兩
 人壹兩 陳橘皮壹兩 當歸壹兩
 白朮壹兩 枳殼三分 赤茯苓壹兩 牛膝壹兩
 去兩 檳榔三分 桂心三分 人參三分 五味子三分
 柴胡壹兩 訶梨勒壹兩 附子壹兩
 皮壹兩 木香壹兩 乾姜三分 赤芍藥壹兩 桔梗三分
 去壹兩 京三稜壹兩
 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵

如梧桐子大每服食前姜棗湯下三十丸
忌苜菜

治冷勞四肢疼痛體瘦少力不思飲食宜服
沉香丸方

沉香兩 白朮三 柴胡二 桂心三 乾姜三
訶梨勒壹 附子壹 地裂壹 木香壹
人參壹 蘆頭去 白茯苓壹 當歸三 檳榔三
鱉甲一 兩十 塗醋炙陳 橘皮壹 白瓢湯 肉
豈菝壹 去殼

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸
如梧桐子大每服食前以粥飲下三十丸

治冷勞氣四肢羸瘦而色萎黃腹內疼痛不
思飲食宜服華菱丸方

華菱半 木香兩 訶梨勒壹 肉荳蔻壹
去檳榔壹 白朮兩 阿魏兩 厚朴一 陳橘
皮半 兩湯 浸乾 姜兩 炮厚 朴一 兩去 薑
汁多 令人 參半 兩去 桂心兩 胡椒兩 甘草

半兩炙
微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵
如梧桐子大每服空心及晚食前以煖酒
下三十九

治冷勞心腹氣痛食少羸瘦宜服驚甲丸方

驚甲

一枚大者以鹽泥固濟殼上用煎後藥

木香

一兩

訶梨勒皮

二兩

附子

二兩去皮臍

肉苳菘

一兩去殼

人皮壹兩湯浸去尖雙

右件藥細剉用酒二升於驚甲內煮令酒

盡捨下火取出諸藥其驚殼去泥用之並

焙乾搗羅為末鍊蜜和搗一二百杵九如

菜苳大每服空心及晚食前以生姜湯下

十五丸忌菹菜

又方附子

三分炮裂去皮臍

吳茱萸

一分湯浸七分

膝

壹兩去苗

硫黃

半兩細研

白朮

三分

右件藥搗羅為末入硫黃更研令勻醋煮

麩糊和丸如梧桐子大每服食前以溫酒

下二十九

治冷勞疝瘕瘕氣宜服硫黃丸方

硫黃

二兩細剉水飛過

木香

末壹兩

川大黃

末壹兩

人

四十九枚湯浸去皮尖雙人研如膏

右件藥先取大黃末以少熟水灑取潤於

新竹筒中盛炊飯甑中蒸飯熟為度然取

諸藥末及桃人膏以大黃和之如稍硬以

新炊飯少許研和丸如梧桐子大每服空

腹以粥飲下二十九

治冷勞久不差食少洩痢諸藥無効宜服羊

肝丸方

羊肝

一具去脂膜切作片子

白礬

三兩燒令汁盡

右件藥以醞醋三升煮羊肝令爛入砂盆

內研後入白礬和丸如梧桐子大每服空

心及晚食前以粥飲下二十九丸漸加至三

十丸

治冷勞氣不能飲食漸加黑瘦宜服此桃人方

桃人

五百顆大者

吳茱萸

三兩

右件藥相和入淨鐵鍋中着微火炒經一
 炊久取桃人一顆撚去皮看似微黃色卽
 漸加火令極熱鍋中微煙出卽承熱取出
 於新甕瓶子盛厚著紙封瓶口勿令泄氣
 每日空心只取桃人二十顆撚去皮爛嚼
 以溫酒下至重者服五百顆卽差

治氣勞諸方

治氣勞羸瘦腹脇痞堅臍下冷疼不欲飲食

宜服桃人散方

桃人三分易浸去皮尖 柴茱萸半兩湯浸
 微炒木香兩 京三稜三分炮制 芎藭兩 桂心半兩
 木三分 青橘皮半兩湯浸 柴胡一兩 訶梨勒
 三分煨 高良姜三分 當歸半兩 檳榔兩 赤芍
 藥兩 甘草半兩微赤剉
 右件藥擣篩爲散每服三錢以水壹中盞
 入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計
 時候稍熱服

治氣勞脾胃久弱嘔逆不納飲食四肢羸瘦
漸加乏力宜服香散方至六分去黃不

丁香二分半夏七分白米三分前胡七分

頭桂心三分人參三分枇杷葉半兩去毛

厚朴三分去麤皮塗生柴胡去苗白茯苓

三陳橘皮二兩湯浸訶梨勒用皮兩甘草

半兩炙微赤

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治氣勞心腹冷痛與食減少四肢羸弱宜服

華澄茄散方

華澄茄三分白朮一兩黃耆三分附子三分

臍草荳蔻三分桂心半兩神巧蓬莪

參當歸分木香半兩芎藭半兩柴胡兩牛膝

去苗吳茱萸遍焙乾微炒甘草微赤剉

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治氣勞心腹積聚兩脇妨悶四肢羸瘦不能

起止宜服三稜散方

京三稜

壹兩

木香

叁分

鼈甲

壹兩塗醋炙

歸

叁分

陳橘皮

壹兩湯浸

赤芍藥

兩川大黃

參

叁分

桔梗

叁分

桂心

叁分

微炒

一兩

乾姜

叁分

訶梨勒

叁分

白朮

兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

蓋入生姜半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服忌苽菜

治氣勞心腹滿悶身體羸瘦脚膝微腫不能

飲食宜服沉香散方

沉香

兩

紫蘇子

叁分

赤茯苓

壹兩

木香

兩

勒

壹兩

柴胡

壹兩

鱉甲

壹兩塗醋炙

陳

兩

橘皮

壹兩

湯浸

桂心

兩

白朮

兩

檳榔

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蓋入生姜半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治氣勞羸瘦四肢疼痛心腹妨悶不欲飲食
宜服訶梨勒散方

訶梨勒 壹兩煨用皮 鱉甲 壹兩塗醋炙 防葵 叁分

柴胡 壹兩 陳橘皮 三分易浸 木香 半兩 赤茯苓

苓 三分 桔梗 半兩 去蘆頭 桂心 半兩 白朮 三分 赤芍藥

三分 檳榔 兩

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服忌葷菜

治氣勞脾胃乏弱飲食不消四肢羸瘦宜服

陳橘皮丸方

陳橘皮 一兩湯浸去白 厚朴 三分去麩皮塗生

神麴 壹兩 木香 兩 檳榔 三分 人參 半兩 去桂

心 兩 柴胡 三分 白朮 三分 訶梨勒 三分煨 白

荳蔻 叁分 高良姜 半兩 白茯苓 叁分 沉香 二分

枳實 叁分 微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候姜棗湯下三十丸

治氣勞大腸時不欲飲食四肢厥冷面色青

黃白服華菱丸方

華菱叁分白木叁分肉苳蔻叁分丁香半兩訶梨

勒青兩附子壹兩桂心叁分胡椒半兩

乾姜半兩厚朴壹兩去麤皮塗生陳橘

皮叁分湯浸木香半兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸

如桐子大每服不計時候以粥飲下三十

丸

治氣勞心胃噎塞不下食漸加羸弱宜服前

胡氏方

前胡一兩去蘆頭木香叁分枳實叁分陳橘皮

壹兩湯浸壹兩驚甲壹兩塗醋炙壹兩梨勒壹兩

皮壹兩枳心叁分檳榔叁分半夏壹兩湯洗七桃人

雙壹兩湯浸壹兩去皮尖赤茯苓壹兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生姜橘皮湯下二十九粒忌菹菜

治虛勞嘔逆諸方

夫虛勞嘔逆者為勞傷之人五藏不安六腑不調胃氣虛弱故也胃為水穀之海今既虛弱復有寒氣所侵則不勝於水穀故氣逆而嘔也

治虛勞嘔逆煩渴不能食四肢少力宜服橘皮湯方

陳橘皮 壹兩湯浸去白瓢焙半夏 半兩湯洗白茯苓

半兩白木人參 半兩去蘆頭麥門冬 半兩去心黃耆

半兩剉枇杷葉 半兩拭去毛炙微黃甘草 壹分炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治虛勞脾胃氣滯胃膈痰壅不散食即嘔逆宜服前胡散方

前胡 壹兩去蘆頭赤茯苓 半兩陳橘皮 三分湯浸去白瓢焙

枇杷葉半兩拭去毛 檳榔半兩 人參半兩去蘆頭 草

荳蔻半兩去皮 半夏半兩 七遍去滑 甘草半兩炙

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水一中

盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

稍熱服

治虛勞脾胃氣不和嘔逆不納飲食四肢少

力胃膈妨悶宜服訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩 黃耆壹兩 白荳蔻叁分去皮 陳橘

皮叁分湯浸 白朮叁分 半夏半兩湯洗 檳榔

去白瓢焙

半人參叁分去蘆頭 前胡叁分去蘆頭 厚朴壹兩去

牛姜汁炙 甘草半兩炙 桂心三分

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水一中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治虛勞胃膈氣滿嘔逆不納飲食宜服赤茯苓散方

赤茯苓

陳橘皮三分湯浸 人參三分去蘆頭

丁香半兩 半夏半兩 七遍去滑 黃耆三分 白朮三分

五味子半兩枳實半兩炒微黃甘草一分訶梨

勒皮三分栲心半兩右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治虛勞脾胃氣冷食即嘔逆無食即飢宜服

白朮散方蘇合香兩桂心半兩枇杷葉三分拭去

人參壹兩去蘆頭白茯苓兩肉荳蔻壹枚厚朴

薑汁炙令香熟右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治虛勞脾胃氣弱嘔逆不欲飲食四肢少力

宜服丁香散方

丁香三分人參三分去蘆頭甘草半兩炙白朮三分

茯苓兩高良姜兩白荳蔻半兩陳橘皮

半兩湯浸半夏七遍去滑

去白穰焙

治虛勞脾胃氣弱嘔逆不欲飲食四肢少力

宜服丁香散方

丁香三分人參三分去蘆頭甘草半兩炙白朮三分

茯苓兩高良姜兩白荳蔻半兩陳橘皮

半兩湯浸半夏七遍去滑

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治虛勞脾胃氣不和喫食嘔逆宜服黃耆散

方

黃耆壹兩 訶梨勒壹兩煨 桂心半兩 夏半兩

湯洗七白木兩 白茯苓兩 草壹兩 薤去皮厚

補去滑 朴一兩去麤皮塗生人參三分去陳橘皮

一兩湯浸甘草半兩炙
去白瓢焙微赤到

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治虛勞嘔逆不能下食心腹脹滿面色萎黃

宜服葦菱丸方

葦菱壹兩 乾姜壹兩 炮人參壹兩 夫薑頭

一兩 白茯苓壹兩 胡椒一兩 萬全方各

勒二兩煨 桂心壹兩 萬全方 檳榔壹兩 陳橘皮

壹兩湯浸去白穰焙 萬全方已
上三味各一兩半加厚朴壹兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和膏三二百杵
如梧桐子大每服以粥飲下二十九日三
四服

治虛勞唾稠黏諸方

夫虛勞者則致津液減少減少者由腎氣不
足故也腎主液而為唾上膈若虛虛則生熱
熱衝咽喉故唾凝結也

治虛勞羸瘦上膈壅滯每唾稠黏不思飲食
宜服黃耆散方

黃耆黃耆兩黃耆枳殼三分鼈甲壹兩

柴胡壹兩麥門冬三分赤茯苓壹兩

桑根白皮三分五味子兩紫蘇莖葉

半夏兩木通三分訶梨勒皮兩

甘草兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞
入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治虛勞羸瘦每唾稠黏心胃壅悶宜服白朮

散方

白朮一兩前胡一兩去半夏參分湯先白編

味全方已上參人參參分去桑根白皮三分

杏人半兩湯浸去皮尖雙人參紫苑去苗分

蘇茯苓參枳全方壹兩桂心參分萬全方

肉桂去鼈甲壹兩塗醋炙令黃去百部參

枳殼參分麥炒旋復花全方一兩廿草分參

炙微赤劉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞損乏短氣不足上膈壅滯唾稠如膠

咽喉不利宜服前胡散方

前胡壹兩去麥門冬壹兩去心河梨勒皮壹兩赤

茯苓壹兩枳殼參分麩炒亦芍藥參射干分參

生乾地黄壹兩人參參分去紫苑參分甘

草半兩炙微赤劉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞上膈氣壅每唾稠黏不思飲食四肢少力宜服人參散方

人參壹兩去蘆頭桔梗壹兩去蘆頭桑根白皮壹兩

枳殼叁分麩炒微黃去瓤麥門冬三分柴胡壹兩去苗黃

耆壹兩赤茯苓叁分鱉甲壹兩塗醋炙令黃

全方訶梨勒皮兩木香叁分桂心叁分肉桂兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞上膈浮熱每唾稠黏咽喉不利宜服此方

黃耆一兩赤茯苓叁分麥門冬叁分枳殼叁分

麩炒微桑根白皮叁分射干叁分桔梗三分

甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治虛勞上膈氣滯喘促唾稠如膠心神煩熱

宜服桔梗散方

桔梗

三分去蘆頭

黃耆

壹兩

桑根白皮

一兩

門冬

壹兩半

枳殼

三分

甘草

三分

桂心

叁分

前胡

三分

五味子

叁分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞肺壅心昏不利每唾稠黏不思飲食

宜服桑白皮散方

桑根白皮

一兩

菴苳

兩

麻黃

叁分

去根節

仁

三分

湯浸

去皮

甘草

半兩

澤瀉

三分

紫苑

三分

去

柴胡

一兩

大腹皮

三分

存件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治虛勞氣壅膈不利喘急每唾稠黏不思

飲食完服五味子散方

五味子壹兩訶梨勒皮壹兩人參三分去枳殼

三分去蘇炒前胡二兩去陳橘皮半兩湯浸

微黃去蘇炒前胡二兩去陳橘皮半兩湯浸

紫蘇莖葉三分大腹皮三分麥門冬一分半

夏半兩湯洗甘草三分炙微赤射干壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞每唾稠黏咽喉不利宜服茯苓散方

赤茯苓壹兩麥門冬壹兩生乾地黄壹兩人參

壹兩去前胡二兩去枳實壹兩炒微黃赤芍藥

兩甘草半兩炙射干壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞心腹痞滿諸方

夫虛勞損傷血氣者皆因虛也復為寒邪所

乘腑藏之氣則不能宣發於外致停積在內

故令心腹痞滿也

治虛勞心腹痞滿不思飲食胃膈不利宜服
桔梗散方

桔梗一兩去 陳橘皮壹兩湯浸去白穰焙 人參壹兩

頭赤茯苓兩厚朴壹兩人麤皮塗生 杏仁半兩湯浸去皮尖 木香兩前胡壹兩去 甘草壹兩

雙人麤炒微黃 草半兩炙微赤

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中

盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞冷氣不和氣攻心腹痞滿不思飲食
宜服木香散方

木香兩訶梨勒壹兩煨 人參三分去 桂心壹兩

分白朮三分 京三稜三分 芎藭三分 陳橘皮兩

湯浸去白蘆焙 檳榔三分 赤茯苓三分 桔梗三分去 枳

實三分 麩微黃 吳茱萸壹分湯浸七 甘草壹分

赤炒微黃 右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞順氣利胃膈消心腹痞滿不思食訶梨勒散方

訶梨勒壹兩煨白木叁分桂心半兩紫蘇莖葉

分赤茯苓兩壹黃耆叁分人參叁分去陳橘

皮兩壹湯浸桔梗半兩去檳榔二兩木香兩

前胡壹兩去甘草壹分去草荳蔻叁分

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治虛勞心腹痞滿胃膈壅悶不思飲食宜服半夏散方

半夏壹兩湯洗鱉甲壹兩塗醋炙白木壹兩

人參壹兩去黃耆壹兩去赤茯苓壹兩桔梗兩

去蘆桂心兩前胡壹兩去陳橘皮壹兩湯

煎甘草半兩炙木香半兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服忌生冷油膩葷菜等

治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少力
宜服白朮散方

白朮壹兩 人參壹兩 蘆頭去 訶梨勒壹兩 陳橘壹兩

皮壹兩 湯浸去 草荳蔻壹兩 桂心壹兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞
入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候稍熱服

治虛勞心腹痞滿氣攻兩脇滿痛不思飲食
宜服木香散方

木香兩 青橘皮壹兩 檳榔兩 訶梨勒兩

用皮壹兩 柴胡壹兩 桂心兩 當歸分 白朮分

鼈甲壹兩 塗醋炙令 微黃去 裙襴

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中
盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候
稍熱服忌生冷油膩菹菜等

治虛勞冷氣心腹痞滿四肢少力不欲飲食
宜服厚朴丸方

厚朴壹兩 姜汁炙令 香熟生 木香兩 桂心二分

巧萬全附子三分炮裂人參半兩去陳橘
 方參分去皮臍
 皮壹兩湯浸訶梨勒一兩煨黃耆三分白
 木一兩藟姜半兩炮草荳蔻壹兩去當歸兩
 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵丸
 如梧桐子大每於食前以生姜湯下三十
 丸

治虛勞心腹痞滿脇下時痛不思飲食宜服

訶梨勒丸方

訶梨勒一兩煨厚朴一兩去麤皮生楨
 用皮姜汁炙令香熟

椰一兩白朮一兩乾姜半兩炮吳茱萸半兩湯
 焙乾人參蘆頭一兩去桂心壹兩當歸三分

右件藥搗羅為末鍊蜜搗三二百杵丸如

梧桐子大每於食前以生姜湯下三十丸

治虛勞心腹痞滿脇下妨悶不思飲食宜服

草荳蔻丸方

草荳蔻壹兩去木香半兩當歸分前胡壹兩去

人參壹兩去赤茯苓兩桂心兩陳橘皮兩

白朮兩檳榔兩訶梨勒一兩煨

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵
如椹桐子大每服食前以生姜湯下三十
九

治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少力
疼痛宜服白朮丸

白朮壹分當歸叁分人參壹分法去桂心壹分附子

一兩皮壹分裂叁分木香壹分吳茱萸半兩湯浸七桔

梗一兩去陳橘皮壹兩湯浸梨勒壹兩

皮石斛一兩根判黃耆一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵
如椹桐子大每服食前以溫酒下三十九

治虛勞身體疼痛諸方

夫勞傷之人陰陽俱虛經絡凝澁血氣不利
若遇風邪與正氣相搏逢寒則體痛值熱則
皮痒診其脉緊者則肢體疼痛也巢氏病源
診其脉緊

濡相搏主
體節痛

治虛勞少力身體疼痛不欲飲食宜服黃耆
散方

黃耆一兩 柴胡壹兩 桂心兩半 赤芍藥兩半 熟

乾地黄兩壹 白朮兩壹 陳橘皮三分 湯浸去白 常歸

甘草兩半 微赤到

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

温服

治虛勞身體背膊疼痛心膈妨悶不欲飲食

食則腹脹坐臥不安口苦頭疼手足無力宜

服赤茯苓散方

赤茯苓三分 芎藭兩半 桔梗半兩 去蘆頭 五味子兩半

木香兩 當歸三分 柴胡壹兩 鼈甲半兩 塗醋去

桂心三分 枳殼半兩 微去 白朮壹兩 赤芍藥

一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蒸

入生姜半分煎至六分去滓不計時候温

服忌葷菜等

治虛勞煩熱致身體疼痛少力不欲飲食宜

服枳殼散方

枳殼半兩 微炒 赤茯苓一兩 黃耆壹兩 人參

壹兩夫 甘草半兩 當歸三分 白朮兩 地骨

皮兩 酸棗人 三分 微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治虛勞四肢無力骨節身體煩疼不思飲食

芎藭散方

芎藭壹兩 酸棗人 壹兩 微炒 黃耆一兩 人參壹兩 去蘆

頭前胡壹兩 去蘆頭 赤芍藥壹兩 鼈甲壹兩 塗醋炙令黃

粘梗半兩 去蘆頭 甘草半兩 炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫
服忌葷菜

治虛勞羸瘦身體疼痛不欲飲食宜服人參

散方

人參壹兩 去蘆頭 赤茯苓兩 柴胡壹兩 去苗 地骨皮

三鼈甲壹兩 塗醋炙 芎藭三分 棟橘皮一兩 湯浸

去白枳殼半兩麩炒木香半兩甘草半兩炙

白米三分赤芍藥兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫

服忌葷菜

治虛勞衰損氣血虛弱風邪所乘肢節不利

身體疼痛宜服石斛丸方

石斛壹兩去根剉天雄三分炮裂黃耆一兩肉

枳壹兩半去麤皮神龍甲壹兩塗醋炙

枳萬全方止一兩

當歸三分芎藭三分白朮三分沉香三分海桐皮三分

剉牛膝一兩半杜仲壹兩半去麤皮巴戟一兩

○萬全方五味子三分乾漆三分

○萬全方枳殼三分加骨碎補沒藥各三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五百杵丸

如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒

下三十九丸忌葷菜

治虛勞寒熱諸方

夫勞傷之人血氣俱虛使陰陽不和互有勝

弱故也陽勝則熱陰勝則寒陰陽相乘故發寒熱也

治虛勞寒熱不能飲食四肢羸瘦少力宜服

黃耆散方

黃耆二兩人參壹兩法白茯苓柴胡兩半

去當歸兩白朮兩桂心兩甘草兩枳

殼半兩微黃去穢桔梗半兩去桃人皮尖雙

人麩炒微黃

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞寒熱四肢羸瘦食少體痛宜服鼈甲

散方

鼈甲參兩醋塗炙人參壹兩去白茯苓

壹兩甘草半兩炙桔梗半兩去枳殼半兩炙微黃

去麥門冬半兩去心黃耆壹兩白芍藥兩白朮

兩半夏半兩湯洗乾地黃兩桂心兩

右件藥搗節為散每服四錢以水一中盞

入牛姜半分棗三枚煎至六分去滓不計
 時候溫服忌菹菜
 治虛勞寒熱四肢疼痛黃瘦無力宜服天門
 冬散方

天門冬 壹兩半 去心焙 黃耆 壹兩 桑根白皮 三分
 柴胡 壹兩 半兩 塗醋炙 人參 壹兩 去
 白朮 壹兩 木香 三分 白芍藥 半兩 當歸 兩 地骨皮
 半兩 甘草 半兩 炙 熟乾 地黃 兩 桂心 半兩
 全方肉 壹兩 白茯苓 兩 桂去皮

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水壹中
 盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不
 計時候溫服忌菹菜

治虛勞寒熱夜卧盜汗四肢無力喫食口苦
 上氣咳嗽宜服柴胡散方

柴胡 壹兩半 去苗 五味子 兩 桔梗 壹兩 去 熟乾
 地黃 兩 白茯苓 兩 麥門冬 壹兩 去心 紫苑 壹兩 洗去
 苗人參 壹兩 去 地骨皮 兩 黃耆 壹兩 去 甘草 兩
 三分 參 桂心 兩 牡蠣粉 兩 半夏 兩 湯洗
 微赤生

白朮兩一

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞寒熱心煩體痛喫食減少白茯苓散

方

白茯苓壹兩 白朮壹兩 甘草半兩炙 黃耆壹兩

人參三分去蘆頭 龍甲壹兩塗醋炙 熟乾地黄兩壹

當歸三分 白芍藥三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生姜半分豉三十粒煎至六分去滓不計時候溫服忌菹菜

治虛勞寒熱四肢羸瘦不欲飲食宜服地骨皮散方

地骨皮壹兩 半夏半兩湯洗 桔梗半兩去蘆頭 人參半兩去蘆頭

白茯苓半兩 白朮半兩 陳橘皮三分湯浸

柴胡三分去蘆頭 甘草壹分炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞羸瘦寒熱進退如瘧半眠半起或時與食或則不能飲食宜服桃枝飲子方

桃嫩枝壹握長柳嫩枝一握長柴胡一兩

白朮兩一烏梅肉壹兩甘草三分炙鱉甲兩

塗醋炙令木香三分赤芍藥壹兩

右件藥細剉和勻每服半兩以童子小便壹大盞入生姜半分葱白七寸煎至五分

去滓不計時候溫服忌葷菜

治虛勞盜汗諸方

夫虛勞盜汗者因眠睡而身體流汗多也此由陽虛所致久不已則令人羸瘦枯痺心氣不足亡於津液故也診其脉虛弱細微者皆為盜汗之脉也

治虛勞盜汗四肢無力腰脚冷疼宜服肉蓯蓉散方

肉蓯蓉壹兩酒浸一宿刮黃耆壹兩五加

去麋皮炙令乾

皮三分牡蠣粉兩壹熟乾地黄兩壹枸杞子兩壹白

茯苓兩壹石斛兩壹去根五味子兩壹當歸兩壹白朮

兩壹牛膝兩壹右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中

蓋入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前服

治虛勞盜汗翕翕少氣四肢乏力咽乾食少

宜服黃耆散方

黃耆壹兩白朮兩壹白茯苓兩壹人參兩壹去

乾地黄兩壹牡蠣粉兩壹

麥門冬兩壹甘草兩壹五味子兩壹

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中

蓋入棗三枚煎至六分去滓溫服

治虛勞盜汗口乾心煩不欲飲食四肢少力

宜服麻黃根散方

麻黃根兩壹牡蠣粉兩壹黃耆兩壹人參兩壹

頭枸杞子兩壹麥門冬兩壹白朮兩壹

骨兩壹白茯苓兩壹熟乾地黄兩壹加杜仲兩壹去皮炙

兩壹

兩壹

兩壹

兩壹

壹兩
 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
 入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計
 時候溫服

治虛勞盜汗牡蠣散

牡蠣粉壹兩 麻黃根壹兩 杜仲壹兩 鹿角黃耆
 二兩 白茯苓二兩 敗蒲扇灰兩
 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
 煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞盜汗粉身方

敗蒲扇灰三兩 菰蘆三兩 白朮二兩 米粉三兩 麻黃
 根三兩 牡蠣三兩 燒

右件藥搗細羅為散入米粉和令勻以生

絹袋盛用粉身體日夜有汗即用之

治虛勞盜汗夜卧心煩口乾宜服此方

麻黃根壹兩 牡蠣一兩 燒黃耆壹兩 人參壹兩
 去蘆地骨皮兩 白龍骨一兩

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中

蓋入棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

治虛勞盜汗口乾咽喉不利心神煩喫食少宜服此方

牡蠣二兩燒為粉黃耆二兩麻黃根二兩杜仲二兩去麂

皮炙微麥門冬三兩去心焙甘草一兩炙微赤剉

右件藥搗細羅為散每服不計時候以清粥飲調下二錢

治虛勞盜汗夜卧心煩少睡宜服白朮散方

白朮二兩酸棗仁一兩麻黃根二兩防風壹兩

頭白竜骨二兩黃耆二兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候温服

治虛勞盜汗惡風怯寒宜服澤瀉散方

澤瀉三兩牡蠣壹兩燒為粉桂心半兩白朮二兩黃耆

一兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓食前温服

治虛勞盜汗不止方

麻黃根一兩故敗扇成兩三發以水

右件藥擣細羅為散每服食前以牛乳調

下二錢此藥林心兩白木兩黃膏

又方小麥合麻黃根兩

右件藥以小三大盞煎至一盞半去滓不

許時候煖服一小盞每三盞以水一中

又方牡蠣粉兩麻黃根兩黃耆二兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞煩熱諸方

夫虛勞煩熱者由陰陽俱虛陰氣偏少陽氣

暴勝則熱乘於心故煩熱也

治虛勞煩熱四肢疼痛不欲飲食宜服柴胡

散方

柴胡一兩黃耆一兩枳殼半兩麩炒麥門

冬一兩去心焙鼈甲一兩塗醋炙地骨皮參生

乾地黄分三人參一兩蘆頭一兩去歲藜分三赤茯苓一兩

赤芍藥 三分 甘草 半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中
盞煎至六分去滓不計時候溫服忌菹菜

治虛勞煩熱體瘦無力不思飲食宜服麥門
冬散方

麥門冬 一兩 人參 參分去蘆頭 白朮 參分 黃耆 壹兩

剉訶梨勒皮 參分 白茯苓 壹兩 陳橘皮 參分湯浸去白

穰甘草 半兩炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞煩熱心神不安四肢疼痛喫食全少
宜服犀角散方

犀角屑 半兩 伏神 壹兩 赤芍藥 參分 人參 參分去蘆頭

黃耆 壹兩 地骨皮 半兩 麥門冬 參分去心 生乾地

黃一 兩 甘草 半兩炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服三錢以小一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞煩熱心胃壅悶不思飲食四肢少力

宜服此方

黃耆一兩前胡參分赤茯苓壹兩枳殼參分

麩炒參分人參壹兩去麥門冬參分陳橘皮參分

去白瓢焙桂心參分甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候温

服

治虛勞胃中煩熱心下痞滿不欲飲食宜服

半夏散方

半夏半兩湯洗七遍去滑石壹兩前胡壹兩去木

香三分桂心半兩陳橘皮壹兩酒浸去白瓢甘草半兩炙

判赤茯苓壹兩桔梗三分去麥門冬三分人

參壹兩去蘆頭枳殼壹兩麩炒微赤去瓢

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入生姜半分煎至六分去滓不計時候温

服

治虛勞煩熱不欲飲食四肢少力宜服枳實

散方

枳實壹兩 炒微黃黃耆壹兩 剉青箱子壹兩白前壹兩

黃芩兩半菰蘆根兩壹麥門冬壹兩 剉柴胡壹兩 去心 焙

去地骨皮兩壹

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹盅

盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞煩熱口熱頰赤多渴宜服生地黄散

方

生乾地黄兩壹伏神三分葳蕤三分知母一分菰蘆

根壹兩 剉黃耆兩壹地骨皮兩壹石膏兩壹人參兩壹

去蘆頭麥門冬壹兩 剉甘草兩半 剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹盅

煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞煩熱食少無力宜服地骨皮散方

地骨皮兩壹玄參兩壹黃耆兩壹澤瀉兩壹麥門

冬三分 剉生乾地黄兩壹葳蕤兩半人參兩壹 剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹盅

煎至六分去滓不計時候溫服

治虛勞大便難諸方

夫虛勞之人脾肺損弱穀食減少氣血阻隔陰陽不和胃氣壅滯上膈虛熱流注大腸故令秘澁也

治虛勞氣壅大便難頭目昏心神煩熱宜服

大黃散方

川大黃一兩剉碎微炒芎藭半兩檳榔一分桑根白皮半兩漢防已兩甘草半兩炙微赤剉右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治虛勞藏腑氣滯大便難頭目昏心腹壅悶

宜服檳榔散方

檳榔一分川大黃一兩剉碎微炒木香一分枳殼一分微黃甘草一分炙微赤剉郁李人一兩湯浸去皮尖右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓每於食前溫服

治虛勞心腹氣壅滯大便難四肢拘急宜服

羚羊角丸方

羚羊角屑一兩獨活兩川大黃二兩碎微炒到葳靈

仙分枳殼微參分麩炒檳榔兩大壹麻人兩郁

李人二兩去皮微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫水下五十丸

治虛勞胃膈氣滯心腹脹滿大便結澁宜服

郁李人丸方

郁李人參兩湯浸去皮微炒訶梨勒皮壹兩木香兩

桂心兩枳實壹兩微炒黃前胡二兩去蘆頭川大黃

二兩到芎藭壹兩檳榔兩壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前煎生姜湯下五十

丸

治虛勞氣壅大便秘澁四肢煩疼宜服麻人

丸方

大麻人二兩川大黃壹兩微炒枳殼微壹兩麩炒

赤芍藥兩郁李人壹兩湯浸去皮微炒木香兩

椰膏兩柴胡壹兩

去齒人

去

木

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

梧桐子大每服食前以生姜湯下三十九

治虛勞小便不利諸方

夫虛勞小便不利者蓋膀胱是津液之府也

腎主於水二經合為表裏水氣通行流於小

腸入於脬而為小便也今脬內有客熱則水

不流通而凝澁故小便難也

治虛勞骨節疼痛心膈躁悶小便不利宜服

澤瀉散方

澤瀉壹兩鼈甲壹兩

壹兩塗醋炙

麥門冬

半兩

子人半兩甘草半兩

微炙夫裙襴

木通

赤芍藥

叁分

菴苓壹兩

赤到

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蒸

入生姜半分蔥白七寸豉五十粒煎至六

分去滓不計時候溫服

治虛勞小便不利心神煩熱宜服蘧麥散方

蘧麥半兩川大黃壹兩

碎微炒

茅根

半兩

枳殼

半兩

麩炒微子苓半兩木通半兩赤芍藥兩川朴

黃去穢兩消半兩甘草壹分微赤劉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日三四服以利為度

治虛勞下膈氣滯臍腹妨悶小便不利宜服

紫蘇散方

紫蘇莖葉壹兩木通三分石韋叁分冬葵子

壹兩兩木香兩青橘皮三分湯浸赤茯苓壹兩兩檳

榔壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治虛勞小便不利氣攻腹內妨痛宜服赤茯

苓散方

赤茯苓壹兩猪苓壹兩當歸兩枳殼三分

微黃兩羚羊角屑壹兩大麻人兩木香兩甘草

半兩兩赤芍藥兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓食前溫服

治虛勞煩熱小腸不利陰中疼痛宜服石韋

散方 石韋三分 蘧麥兩 王不留行三分 冬葵子兩

車前子兩 當歸三分 大麻人兩 赤芍藥散方

右件藥搗細羅為散每於食前煎木通湯

調下二錢

治虛勞下膈有熱小便不利骨節疼痛肌肉

急腹內痞滿宜服赤芍藥散方

赤芍藥三分 柴胡一分 赤茯苓兩 大麻人合

木通半兩 檳榔三枚

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中

盞入生姜半分豉五十粒葱白五十煎至

六分去滓食前溫服

治虛勞小便不利腹脇滿悶四肢煩疼宜服

大黃丸方

川大黃壹兩 剉壹兩 赤芍藥三分 木通一分 陳橘

皮一兩 湯浸大 麻人兩 檳榔兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

類聚百病

百五

梧桐子大每服食前以清粥飲下三十丸
以利爲度
治虛勞小便不利心神煩悶不欲飲食四肢
羸瘦宜服大麻人丸方

大麻人二兩枳實壹兩炒微黃壹兩赤芍藥壹兩杏仁壹兩

湯浸去皮尖雙壹兩川大黃壹兩碎微炒壹兩陳橘皮壹兩

入麩炒微黃壹兩白穰壹兩焙

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗百餘杵丸如
梧桐子大每服食前以清粥飲下三十丸

治虛勞小便數諸方

夫虛勞小便數者由膀胱與腎俱虛而有客
熱故也腎與膀胱爲表裏俱主於水腎氣下
通於陰若二經既虛則不能制水而小腸有
熱則水澁澁則小便不利故令數也
治虛勞內不足小便數四肢瘦心神煩不能
食宜服腎瀝湯方

人參壹兩石斛壹兩麥門冬壹兩

澤瀉三兩桑寄生兩半遠志半兩甘草半兩

分三兩兩半去心半兩微赤兩

當歸兩熟乾地黃壹兩菝葜兩桂心三五

味子三分黃耆壹兩白龍骨兩礞石二兩海

法赤兩白茯苓兩地骨皮兩

右件藥搗羅維為散每服用羊腎一對切

去脂膜先以水壹大盞半煎腎至壹盞去

腎入藥末半兩生姜半分棗三枚煎至七

分去滓食前分為三服

治虛勞少氣小便數無力不能食宜服黃耆

散方

黃耆二兩白芍藥壹兩桂心兩當歸壹兩麥門

冬壹兩白龍骨兩熟乾地黃兩甘草兩

赤兩

右件藥搗羅維為散每服三錢以水壹中

盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食

前溫服

治虛勞下焦虛傷微渴小便數宜服枸杞子

散方

枸杞子兩黃耆兩人參兩桂心三分當歸兩

壹兩 白芍藥 兩
 右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
 入生姜半分棗三枚傷冷小便日五六十餘行宜服
 滓食前溫服

治虛勞腰臍傷冷小便日夜五十餘行宜服

鹿茸散方

鹿茸 二兩去毛 白龍骨 一兩 桑寄生 一兩 當歸 三兩
酒洗微炙 白芍藥 壹兩 烏賊魚骨 二兩 桑
 分 人參 壹兩 頭 去 鹿茸 三兩 微炒

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調
 下二錢

治虛勞小便數及精氣虛冷宜服桑螵蛸散

方

桑螵蛸 三七枚 薯蕷 壹兩 山茱萸 壹兩 黃耆 三兩
微炒 劉桂心 二分 附子 壹兩 炮裂 鹿茸 壹兩 半酒
炒 杜仲 壹兩 去麋 皮炙 微黃

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調
 下二錢

治虛勞小便數及水臧虛冷補骨脂散方

補骨脂一兩肉苁蓉二兩酒浸壹宿白芍

藥三分白茯苓三分茵朴三分附子三分炮裂川

椒四分粒去目及閉黃耆壹兩剉

右件藥并麝羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓食前溫服忌醋物

治虛勞小便數或多心煩夜臥不安宜服此

方 黃耆壹兩當歸半兩人參三分白竜三分

去甘草半兩炙微赤剉

白芍藥三分桂心三分桑螵蛸半兩麥門冬三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食前

溫服

治虛勞但覺羸弱小便數者宜服白薇散方

白薇三分白龍骨兩黃耆壹兩牡蠣三分燒

附子三分炮裂去皮臍甘草半兩炙微赤剉

肉苁蓉壹兩酒浸去皴皮炙乾

去皴皮炙乾

炙乾

炙乾

炙乾

右件藥搗篩為散每服四錢用水壹中盞
入生姜半分棗三枚煎至六分去滓食前
溫服

治虛勞小便數或不禁者宜服附子散方

附子壹兩炮裂 熟乾地黄二兩 白龍骨兩 桂

心三分續斷 乾薑壹兩炮裂 甘草壹兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓食前溫服神巧萬全方同

治虛勞上焦煩熱小便滑數不可禁止菝葜

散方

菝葜壹兩 土瓜根兩 黃耆壹兩 地骨皮

兩壹兩 五味子兩 人參壹兩去 石膏兩 牡蠣粉

又方

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方鹿角屑壹兩炒 肉蓯蓉壹兩酒浸制 桂

心三分 韭子壹兩炒 附子三分炮裂

右件藥搗細羅為散每服食前以清粥飲

調下二錢

又方兔絲子

二兩酒浸三宿曬乾搗為末鹿茸壹兩去毛

黃乘螺蛸

半兩微炒雞肫黃皮三兩微炙

右件藥搗細羅為散每服以溫清粥飲調

下二錢

又方白竜骨

壹兩半牡蠣壹兩半桂心壹兩白芍

藥壹兩甘草

壹兩炙微赤

右件藥搗麤羅為散四錢用水壹中盞入

生姜半分棗三枚煎至六分去滓食前溫

服

治虛勞四肢羸劣手足多疼小便數心神煩

宜服牡蠣丸方

牡蠣壹兩半竜骨壹兩半續斷壹兩肉苳蓉二兩

酒浸壹宿刮遠志壹兩黃耆壹兩鹿茸壹兩

去毛酥塗桂心半兩神巧萬附子半兩

去微黃天門冬壹兩半熟乾地黃二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每日空心及晚食前以粥飲

下三十九人

本竹藥...

...

...

醫方類聚卷之

...

...

...

...

