

大德重校聖濟總錄卷第九十四

諸疝門



寒疝

心疝

厥疝

寒疝心腹痛

寒疝積聚

七疝

蠱病

陰疝門

陰疝

卒疝

陰疝腫縮

陰疝腫痛

控舉

諸疝統論

論曰疝者痛也陰氣積於內復爲寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入腹而成疝也或少腹痛而不得大小便或手足厥繞臍痛白汗出或冷氣逆上搶心令腹心痛或裏急腹痛又有五疝七疝其證非一故云諸疝當診其脉弦而急者是謂疝也皆由府藏虛弱飲食不節血氣不和寒溫不調之所生也

寒疝

論曰寒疝爲病陰冷內積衛氣不行結於腹內故遇寒則發其狀惡寒不欲食手足逆冷繞臍痛白汗出

治寒痲四肢逆冷氣弱汗出蓬莪湯方

蓬莪茂壹兩炮 乾薑半兩炮 附子炮裂去皮臍壹兩

芎藭參分 桂去麤皮兩 白朮參分

檳榔壹兩 芍藥壹兩

右八味判如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服不拘時

治寒痲攻注胸脇滿痛汗出木香湯方

木香參分 檳榔剉 細辛去苗葉

赤茯苓去黑皮 人參 芍藥

當歸切焙 桂去麤皮 前胡去蘆頭

青橘皮湯浸去白麤已上各兩

右一十味鑊搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服不拘時

治寒痲手足逆冷身體疼痛冷汗自出烏頭湯方

烏頭炮裂去皮臍貳兩 桂去麤皮壹兩 細辛去苗葉參分

右三味判如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服

治寒痲來去腰腹攻痛茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙炒參分 生薑切焙壹分 豉炒

桂去麤皮各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞酒少許同煎七分去滓溫服

治寒疝冷痛氣物汗自出不欲食人參湯方

人參

白茯苓

去黑皮蜀椒者炒出汗各壹兩

乾薑

炮各半兩

附子

炮裂去皮臍

檳榔

白朮

青橘皮

湯浸去白各壹兩

右八味判如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服

治寒疝亦治陰疝走馬湯方

巴豆

貳枚去皮杏仁貳枚去皮心膜炒

右二味取綿裹椎令極碎投熱湯二合絞取白汁服之未差更一服

治寒疝來去疼痛冷汗出牡丹丸方

牡丹皮

桂去麤皮各貳兩

烏頭

炮裂去皮臍貳枚

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒下空心日午臥時服

治寒疝胸脇支滿食飲不化臍腹痛桂心丸方

桂

去麤皮伍分

吳茱萸

湯洗陸乾參兩

白薇

分

乾薑

炮壹兩

烏頭

炮裂去皮臍半兩

蜀椒

去目并閉口者炒參分

芎藭

壹兩

防葵兩半 白芷分參

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九溫

酒下食前

治寒疝滿逆手足不溫徧身疼痛烏頭湯方

烏頭買大者伍枚 去皮臍生切 白蜜壹斤

桂去麤皮 貳兩

右三味先以慢火煎蜜及烏頭候蜜減半濾去烏頭

別就一處以水三盞煮桂候減半濾去桂將桂汁并

前蜜汁共和別煎取二盞許每服半盞溫服未知再

服其知如醉狀得吐爲中病也

治寒疝繞臍痛結鞭不消木香丸方

木香 附子炮裂去 皮臍 硃砂飛研各 壹兩

右三味搗羅爲末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

三十九溫酒下空心食前

治寒疝卒痛積聚不散上衝心腹與陰相引痛則汗出

高良薑湯方

高良薑炒 檳榔剉生 木香

當歸切焙各 壹兩半 吳茱萸湯浸焙乾 炒壹兩

右五味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

心疝

論曰內經謂診得心脉而急病名心疝少腹當有形也
心爲牡藏小腸爲之使故曰少腹當有形也夫藏病必
傳於府今心不受邪病傳於府故小腸受之爲疝而痛
少腹當有形也世之醫者以疝爲寒濕之疾不知心氣
之厥亦能爲疝心疝者當兼心氣以治之

治心疝心痛悶絕木香散方

木香炮

陳橘皮湯浸去白炒各壹兩

高良薑

乾薑炮

訶梨勒皮

赤芍藥

枳殼去瓤炒

赤茯苓去黑皮各半兩

草豆蔻去

芎藭

牽牛子炒各分

右一十一味搗羅爲散每服二錢匕水一盞煎至七分溫服不拘時

治心疝心痛虛冷煩悶當歸湯方

當歸切炒

乾薑炮

赤芍藥

黃耆

蜀椒去目并閉口炒出汗半夏爲末薑汁

人參

青橘皮湯浸去白炒附子炮裂去皮臍

甘草炙剉各壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

桂去麤皮半兩

右一十二味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時

治心疝心痛如錐所刺牡丹丸方

牡丹皮

桂去蘊皮

芍藥

烏頭

炮裂去皮臍

細辛去苗藥

甘草炙

木香

吳茱萸湯浸焙炒

檳榔各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒下不拘時

治心疝心痛不可忍木香散方

木香

羌活去蘊頭

檳榔生

牡丹皮

當歸切炒

桂皮去蘊

青橘皮

湯浸去白切炒

蓬莪茂

各壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕沸湯或溫酒調下不

拘時

治心疝心脇痛及繞臍痛芍藥丸方

芍藥

桔梗去蘊

細辛去苗

蜀椒

去目并閉口炒出汗桂去蘊皮

乾薑炮各參分

附子

炮裂去皮臍

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒或米飲下不拘時

治心疝心痛肢體虛冷蓬莪茂煮散方

蓬莖茂

煨

檳榔

剉生

附子

炮裂去皮臍

甘草

剉

桂

去蘆皮各壹兩

胡椒

半兩

芍藥

白朮

各參分

右八味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分溫服不拘時

治痼冷在內陰氣交攻心痛如刺橘皮益智湯方

青橘皮

湯浸去白焙

益智

去皮

烏頭

炮裂去皮臍

威靈仙

去土各壹兩

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片鹽

少許煎至六分去滓食前溫服日三

治陰冷交攻心痛疼紫桂丸方

桂

去蘆皮半兩

當歸

焙參分

吳茱萸

湯浸炒壹兩

右三味為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸炒生薑鹽酒下米飲亦得日三

治心疝冷痛不可忍三溫散方

附子

炮裂去皮臍

蓬莖茂

煨剉各壹兩

胡椒

半兩

右三味為細散每服一錢匕熱酒調下不拘時婦人

醋湯下

厥疝

論曰內經謂黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥

氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝
藏疾言隱而難見陰沉而伏也今脾虛風寒客於腹膜
之間不能與胃通行水穀之氣結而成積使氣道厥逆
而痛故謂之厥疝

治厥疝腹中陰冷痛積氣上逆吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾
炒貳兩

烏頭炮裂去
皮膽

細辛去苗葉
各參分

高良薑剉
炒

當歸切
焙

乾薑炮

桂去麤皮
各壹兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕以水二盞煎取一

盞去滓溫服日二

治厥疝上攻腹痛無時檀香丸方

檀香子炒

吳茱萸湯洗焙
乾炒

桂去麤
皮

胡椒

棟實剉碎
炒

延胡索各半
兩

木香

蠶蟲去翅
足炒

海蛤洗
去法

芫花醋炒
焦

礞砂研

木通各壹
分

右一十二味搗羅爲細末酒煮麩糊和丸如梧桐子

大每服十九鹽酒下食前服

治厥疝上搶心腹冷痛山茱萸丸方

山茱萸

吳茱萸湯洗焙
乾炒

食茱萸

棟實剉碎
炒

馬蘭花去
土

藜香子炒

青橘皮湯去白焙

陳橘皮湯去白焙

乾薑炮

京三稜炮各參分

附子壹枚重半兩者炮裂去皮臍

右一十一味擣羅為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子

大每服二十九酒或鹽湯下空心服

治厥疝腹中冷痛當歸乾薑湯方

當歸切

乾薑炮

附子炮裂去皮臍

人參

甘草炙

細辛去苗

芍藥各壹兩

右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治厥疝逆上攻腹冷痛木香湯方

木香

檳榔生剉

烏頭炮裂去皮臍

細辛去苗

當歸切

吳茱萸湯洗焙乾

枳殼去瓢炒

甘草炙各壹兩

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治厥疝冷逆攻心腹痛細辛丸方

細辛去苗

芍藥

吳茱萸湯洗焙乾

人參

白朮

桂去麤皮

乾薑炮

甘草炙

當歸切

附子炮裂去皮
臍各壹兩

右一十味搗羅爲細末稀麩糊丸如梧桐子大空心
米飲下三十九日三

寒疝心腹痛

論曰疝者痛也本由寒氣內積陽衰陰盛不得散釋寒
邪因得攻擊或上搶心或腹內疔刺發卽俱痛故名寒
疝心腹痛也

治寒疝心腹痛胸脇支滿不下食汗出嘔逆人參湯方

人參
白茯苓去黑皮
檳榔剉
木香
芍藥
芎藭

當歸切焙
桂去麤皮
青橘皮湯浸去白
焙各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服不拘時

治寒疝心腹痛此胡湯方

此胡去苗
肆兩
大棗去核焙
黃芩去心
人參
甘草剉炙
半夏湯洗去滑
生薑汁製

桂去麤皮
芍藥各壹兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大切
煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝心腹痛或逆搶心煩滿不得臥惡風驚惕不食

變發寒熱吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙細辛葉

芍藥

此胡註

旋復花

黃芩去黑心

紫苑去苗

人參

白朮

白茯苓去黑皮

乾薑炮

桂皮去麤

附子炮裂去皮臍

甘草炙

半夏湯洗去滑

當歸切焙各半兩

右一十六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十九溫酒下不拘時

治寒疝心腹痛不可忍汗出悶絕椒附湯方

蜀椒去目并閉口炒出汗貳佰粒

附子炮裂去皮臍壹枚

粳米壹斗

乾薑炮半兩

半夏湯洗去滑切拾貳枚

甘草炙兩

右六味咬咀如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑半分切棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服空心食前

治寒疝心腹痛附子丸方

附子炮裂去皮臍貳兩

桃人去皮尖雙人別研膏參兩

蒺藜子炒去角壹升

右三味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下不拘時

治寒痢心腹痛汗出厥冷地黃湯方

生乾地黃兩焙 甘草炙

白茯苓去黑皮

人參

當歸切焙各兩

羊肉去脂切參斤

右六味前五味細剉將羊肉用水二斗煮取汁一斗去羊肉入諸藥煮取七升入葱白一把切棗十四枚擘破再煮取六升絞去滓每溫服一盞不拘時

治寒痢心腹痛裏急當歸湯方

當歸切參兩

生薑切伍兩

羊肉去脂膜切作片壹斤

右三味以水一斗煮取五升去滓每溫服一盞不拘時日三夜二

寒痢積聚

論曰氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚蓋積者陰也陰沉而伏發則不離其部聚者陽也陽浮而動上下無所留止其痛無定處令人洒淅惡寒飲食不為肌膚或吐利脹滿或心下如覆杯腹中如人臂所橫皆寒痢積聚之證也

治寒痢邪氣往來堅固積聚不散多寒不得臥苦汗出大小便不利桔梗丸方

桔梗剉炒半兩

葶藶子紙上熬壹兩壹分

藜蘆去蘆頭炙半兩

厚朴去麤皮生薑汁塗炙剉壹兩壹分

杏人去皮尖雙人炒伍拾故

附子炮裂去皮臍壹兩壹分

桂去麤皮

人參

沙參各參分

特生礬石壹兩兩燒半日許

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五

丸或七丸米飲或溫酒下日三

治寒疝積聚大如鼈形小如杯狀乍來乍去腸胃脹滿

寒則腸鳴心下寒氣上搶胸膈支滿芫花丸方

芫花蠟炒

蜀椒去目并閉口炒出汗各壹分

大黃剉沙壹兩半

細辛去苗葉壹兩半

桔梗炒壹兩分

烏頭炮裂去皮臍壹兩

吳茱萸湯洗焙乾炒

芍藥

白茯苓

去黑皮龍膽兩各參分

半夏湯洗采編去滑壹分

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十九米飲或溫酒下日三利下毒物爲効

治寒疝積聚邪氣往來厥逆搶心痛羸瘦少氣胸脇滿

不嗜食續命丸方

食茱萸

貳兩半炒

芍藥

細辛去苗葉

前胡

去蘆頭各壹兩壹分乾薑炮

烏頭炮裂去皮臍各貳兩半

紫苑

去苗

黃芩去黑心

白朮

白薇

芎藭

人參

生乾地黄焙各壹兩壹分

蜀椒去目并閉口炒出汗

桂去麤皮各
貳兩半

右一十五味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
七丸米飲或溫酒下食前服

治寒疝積聚來去攻擊疼痛不欲飲食木香湯方

木香

訶梨勒皮炮

檳榔剉

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙

青橘皮湯浸去白
焙各半兩

白朮

人參

桂去麤皮
各壹分

赤茯苓

去黑皮
參分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎七
分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚胸腹緊急脹滿不食檳榔湯方

檳榔生

桃人去皮尖
雙人炒

郁李人炒
去

木香

京三稜炮各
兩

桂去麤
皮

青橘皮

湯浸去白
焙各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至
七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚心腹結痛飲食不下鼈甲湯方

鼈甲

醋炙去
襍襍

京三稜炮
剉

大黃剉炒各
壹兩

當歸切

桂去麤
皮

赤芍藥

木香

枳殼去
麤麤
炒

訶梨勒炮取
皮

檳榔

剉各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝凝結積聚不散攻注腹內疼痛不下飲食白木湯方

白朮

兩

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去穢炒

人參

桔梗

炒

桂

去麤皮

京三稜

剉

檳榔

剉各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚結塊攻注心腹脹滿檳榔湯方

檳榔

剉生

芎藭

桔梗

剉炒

當歸

切焙

桂

去麤皮

赤芍藥

白朮

木香

各半兩

大黃

剉碎微炒壹兩

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚心腹疼痛結塊不消桂心湯方

桂

去麤皮

大黃

剉

桔梗

剉炒

附子

炮裂去皮臍

木香

白朮

當歸

切焙

檳榔

赤芍藥

各壹兩

高良薑剉炒

芎藭

枳實去瓢炒 各半兩

右一十二味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時

治寒疝積聚臍腹疼痛兩脇脹滿懷香子散方

懷香子炒

檳榔炮

京三稜炮

青橘皮

湯浸去白鹽 炒黃各半兩

木香分

右五味搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服

不計時候

七疝

論曰疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥疝腹

中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則脇下腹
中盡痛者名寒疝腹中乍滿乍減而痛者名氣疝腹中
痛在臍傍者名盤疝腹中痛在臍下有積聚者名附疝
少腹與陰相引而痛大便難者名狼疝凡此七疝皆由
寒氣內積血氣凝滯不得通利冷劇則痛故皆謂之疝
難經曰任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚
蓋明此也

治七疝諸寒在臍傍痛上义胸中滿少氣椒薑丸方

蜀椒

去目及閉口炒 出汗壹兩壹分

乾薑炮

厚朴

去鹽皮塗 生薑汁炙 黃芩 去黑

細辛去苗

芍藥

烏喙炮裂去皮
臍壹分 此胡去苗

牡丹皮各壹分

右一十二味搗羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服二

十九溫酒或米飲下日三服

治諸疝桃人湯方

桃人去皮尖
雙入炒

海藻洗去鹹

蒺藜子炒去角
各參兩

右七味廬搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大切

桂去蠹皮
各壹兩

此胡去苗

牡丹皮各壹分

右一十二味搗羅為末鍊蜜和九梧桐子大每服二

十九溫酒或米飲下日三服

吳茱萸湯洗焙
乾炒 陳橘皮湯浸去
白焙

白茯苓去黑
皮

羌活去薑
頭

各參兩

煎至七分去滓溫服不拘時

治七疝或心腹厥逆不得氣息痛達背脊或心下堅痛

手不可近或臍下堅痛得寒冷食輒劇或臍下堅痛大

如手或少腹脹滿引勝眈急痛或女子月事不時椒附

丸方

蜀椒去目及閉口者
炒出汗壹兩

乾薑炮

細辛去苗
葉

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子太每服二十九

米飲或溫酒下日三服

桔梗剉
炒

厚朴去薑皮生
剉

烏頭炮裂去皮
臍壹分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子太每服二十九

米飲或溫酒下日三服

治七疝臍腹堅痛蓬莖茂丸方

蓬莖茂炮

木香

大黃炒

當歸切炒

芎藭

京三稜炮

草豆蔻皮去

桂皮去

桃人去皮尖雙人炒各壹兩

肉豆蔻炮半

乾漆炒令煙出壹兩

右一十一味搗羅爲末醋麩糊爲丸梧桐子大每服

二十九溫酒或生薑湯下不拘時

治七疝肢體寒臍腹堅痛滿悶厚朴丸方

厚朴去蘘皮生薑汁炙

附子炮裂去皮臍

藜香子炒

白朮炒

桂皮去

乾薑炮

枳殼去蘘炒

青橘皮湯浸去

芎藭

烏頭炮去皮臍

木香炮

當歸切焙各壹兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服

二十九溫酒下生薑湯亦得不拘時

蠱病

論曰內經謂脾風傳之腎病名曰疝瘕少腹寬熱而痛
出白一名曰蠱夫脾受風邪傳於腎經邪熱內燦故其
證少腹寬熱而痛真精不守故其證洩出白液病名曰
蠱以邪熱內燦真精不守久而弗治適以喪志也水之
精爲志志喪則精從之左傳謂惑以喪志爲蠱者如此

治蠱病少腹急痛便溺失精大建中湯方

黃耆剉

遠志去心

當歸去蘆頭

澤瀉各參兩

芍藥

人參

龍骨

甘草炙各兩

右八味剉如麻豆每服五錢匕水二盞生薑三片棗

二枚擘破煎至一盞去滓溫服不拘時候

治蠱病少腹寬熱而痛精氣不守洩便出白澤瀉丸方

澤瀉剉

補骨脂炒

巴戟天去心

五味子

石斛去根

芍藥

人參

甘草炙各兩

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒或鹽湯下空心日午臨臥各一

治蠱病少腹寬熱而痛便溺出白肉菴蓉丸方

肉菴蓉

去皺皮酒浸切焙

白茯苓去黑皮

黃耆剉

澤瀉

牡蠣火煨

五味子

龍骨

當歸切焙各兩

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒下空心日午臨臥各一

治蠱病少腹熱痛精液出自磁石丸方

磁石

水煨醋淬

龍骨各壹兩

白茯苓去黑皮

牡蠣火假各貳兩

右四味搗羅爲末，鍊蜜丸，如梧桐子大，每服三十九。

鹽湯下，空心日午臨臥各一。

治蠱病精氣不守，便溺出白，少腹寬熱而痛，乾地黄丸。

方

熟乾地黄燉貳兩

鍾乳粉半兩

龍骨

菟絲子

酒浸壹宿別燒磁石火煨燂滓柴燂

芍藥

黃芩去黑心各壹兩

右七味搗羅爲末，酒煮麩糊丸，如梧桐子大，每服二

十九，溫酒或鹽湯下，空心日晚。

陰疝門

陰疝統論

論曰：疝者痛也，邪氣聚於陰，致陰器腫大而痛者，陰疝也。一名癰疝，其類有四，卽腸癰、卵脹、氣癰、水癰是也。世俗云：疝氣亦云小腸氣，或曰膀胱氣，原其病本，緣腎氣通於陰，與膀胱爲表裏，胞囊者膀胱之候，此二經不足，下焦受寒，皆能致陰卵腫大，或發疝痛，故通稱曰陰疝。若寒濕之氣有通於小腸者，卽少腹控辜而痛，陰丸上下，謂之腸癰，寒氣客於經筋，足厥陰脉受邪，脉脹不通，邪結於辜，卵謂之卵脹，腎虛之人，因飲食不節，喜怒不

時津液內溢下流於寒氣結聚不散謂之氣癩水氣
盛則津液內結謂之水癩水癩氣癩病生於標故鍼灸
可治其疾易愈腸癩卵脹病生於本邪氣入深其治難
差

陰疝

論曰黃帝鍼經曰足厥陰之脉環陰器抵少腹是動則
病丈夫癩疝卽陰疝也嗜慾勞傷腎水涸竭無以滋榮
肝氣故留滯內結發爲陰疝之病世俗論陰疝者爲腎
餘氣殊不知邪實又本於肝經也治法宜寫邪氣之實
補肝經之虛

治陰疝牽引少腹痛桃人湯方

桃人去皮尖
雙入炒

吳茱萸湯洗焙
乾炒 陳橘皮去白
切炒

桂去麤
皮

海藻湯去鹹炙
各壹兩 白茯苓去黑
皮

羌活去頭
頭

蒺藜子炒去角各
壹兩半

檳榔拾枚
剉

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎
至八分去滓溫服不拘時

治陰疝蒺藜湯方

蒺藜子炒去
角

附子炮裂去
皮臍

山梔子人各壹
兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服食前

治陰疝牽引疼痛沙參散方

沙參壹兩

桂去麤皮半兩

桃人肆拾玖枚去皮尖雙人炒

研

右三味搗研為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治陰疝疼痛或上攻臍腹椒附丸方

蜀椒去目并合口炒出汗壹兩

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮

巴戟天去心

桃人去皮尖雙

芎藭

當歸切炒各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

空心日午夜臥溫酒下

治陰疝腫大偏墜昆布丸方

昆布洗去鹹炙

海藻洗去鹹炙

葶藶子炒去角

蕪荑人炒

檳榔剉各壹兩半

枳沒去瓢炒

大麻人貳兩

木香

黃耆剉

訶梨勒炮去核各參分

陳橘皮去白炒

桃人去皮尖雙

菟絲子酒浸壹宿別搗各壹兩

右一十二味搗研為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每

服三十九空心食前溫酒或鹽湯下

治陰疝氣攻腫痛黃耆丸方

黃耆 剉
桃人 去皮尖雙山菓更
人炒研

龍骨 煨
蒺藜子 炒去角
櫟榔 剉各壹兩

五味子 兩
海藻 洗去鹹炙
玄參 各壹兩

牛膝 酒浸切焙
白茯苓 皮去黑
肉苁蓉 酒浸切焙

枳殼 去麩炒
人參
續斷

桂 去麩皮
還志 心去
石南 各半

右一十八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九空心食前溫酒或鹽湯下

治疝氣沙參丸方

沙參 兩
昆布 洗去鹹焙
懷香子 炒各兩

右三味搗羅爲末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二

十九空心食前溫酒下

治陰疝上而不下臍腹疼痛二氣丸方

石硫黃 研
黑鉛 各壹兩

右二味先以鉛於銚內鎔成汁次下硫黃炒煙煇透

移下候冷取出研爲細末糯米糊和丸如梧桐子大

每服二十九溫酒下

治陰疝急脹疼痛卵腫木香丸方

木香
陳橘皮 去白
萊菔子 炒

青橘皮 去白
桂 去麩皮
牽牛子 兩

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九
溫酒下以利爲度

治小腸疝氣巴戟散方

巴戟天去心

棟實取肉麩炒

木香

茴香子炒

附子炮裂去皮

右五味搗羅爲散每服一錢七空心溫酒調下

治小腸疝氣棟實散方

棟實取肉麩炒

茴香子炒

京三稜煨

蓬萊茂煨

右四味等分搗羅爲散每服二錢七葱酒調下

治陰疝攻痛葫蘆巴煮散方

葫蘆巴

沉香

馬蘭花

蓬萊茂煨

茴香子炒各壹兩半

棟實取肉麩炒

木香

薑黃

檳榔剉

桂去蠶皮各壹兩

附子炮裂去皮甘草炙兩

右一十二味搗羅爲散每服三錢匕水半盞酒半盞
同煎至七分空心食前和滓溫服

治陰疝氣攻疼葫蘆巴丸方

葫蘆巴

補骨脂炒

白豆蔻去皮

葶藶

青橘皮去白

茴香子炒

附子炮裂去皮臍

肉蓯蓉酒浸切焙

牛膝酒浸切焙

桂去麤皮

防風洗

菴絲子酒浸兩各壹兩

右一十二味為細末酒煮麪糊為丸如菴豆大每服二十九空心生薑鹽湯下

治小腸膀胱疝氣疼痛菴香子散方

菴香子炒

京三稜煨剉各壹兩

馬蘭花醋炒各半兩

乾薑炮各壹分

右六味搗羅為散每服二錢匕空心食前熱酒調下

芫花醋炒

木通剉

青橘皮去白

胡椒

大黃煨

桂去麤皮各半兩

棟實肆枚剉炒

菴香子炒參分

右八味搗羅為末酒煮麪糊丸如小豆大丹砂末為衣每服十九至十五丸空心食前生薑熱酒下

治陰疝撮痛不可忍者應痛丸方

韭子炒

芎藭

右二味等分為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

治陰疝腰腹疼痛及不能食已即嘔吐寒熱往來吳茱

萸丸方

吳茱萸參分湯浸
染徧微炒

半夏參分湯洗
染徧去滑

細辛兩

紫苑壹兩去
苗土

甘草半兩炙
微赤剉

附子壹兩炮裂
去皮臍

旋復花半兩

前胡壹兩去
薑頭

乾薑參分炮
剉

人參參分去
薑頭

熟乾地黄兩

赤茯苓壹兩
去皮

當歸參分剉
碎微炒

赤芍藥參分

白朮兩

桂心兩

剉梨勒壹兩半
用皮

木香兩

右一十八味搗篩爲末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐子大食前生薑湯下二十九

治陰疝腰腹痛手足逆冷身體疼烏頭散方

川烏頭拾枚炮裂
去皮臍

桂枝兩

右二味搗羅爲細散每服二錢七水一盞入生薑半分煎至五分次下蜜半合更煎三沸令熟食前和滓

溫服

治陰疝積聚繞臍腹疼痛川烏頭丸方

川烏頭壹兩炮裂
去皮臍

吳茱萸半兩湯浸
染徧乾

甘草半兩炙
微赤剉

京三稜壹兩
剉

細辛兩

桂心兩

藁本兩

木香兩

郁李人壹兩湯浸
去皮微炒

右九味搗羅爲末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子

大每服二十九生薑湯下

卒痂

論曰卒痂者謂腎藏虛弱之人形寒飲冷暴受邪氣傳入經脉蓋足少陰腎經與太陽膀胱二經合為表裏卒然感寒熱相薄則津脉不得流通氣道結澁而脹滿或繞臍腹牽引於陰暴發疼痛或白汗出悶絕不省難可堪忍故曰卒痂也

治卒痂心痛如刺繞臍腹中盡痛白汗出氣欲絕蜀椒散方

蜀椒去目并閉半夏生薑汁製附子壹枚炮炙

乾薑炮裂

甘草炙

桂去麤皮

右六味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞生薑一棗大切棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

治卒痂攻臍腹痛汗出悶絕茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾

細辛去苗

附子炮裂去

人參

白茯苓去黑

桂去麤

半夏生薑汁製暴乾

當歸切麤各

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞生薑一棗大切棗二枚擘破煎至七分去滓溫服不拘時

治卒痂腹痛裏急四味當歸湯方

當歸焙

生薑

芍藥各貳兩

羊肉切去脂膜半斤

右四味將三味細剉先以水五升煮羊肉爛熟去肉以汁煮藥候熟去滓澄清每溫服一盞不拘時

治卒疝繞臍腹卒暴疼痛乾薑湯方

乾薑炮裂

白茯苓去黑皮

椒去目并閉口炒出汗

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮

芎藭

當歸焙切

芍藥各壹兩

右八味咬咀如麻豆每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治卒疝攻少腹疼痛穠香煮散方

穠香子炒

木香

芍藥

陳麴

厚朴去麤皮生薑汁炙剉枳殼去麤皮炒

桂去麤皮

青橘皮湯浸去白焙乾薑炮裂

人參

白茯苓去黑皮

京三稜煨各半兩

生乾地黄焙分

右一十三味搗羅為細散每服三錢匕水一盞葱白二寸鹽少許煎至七分熱服

治卒疝腹痛不可忍木香丸方

木香

桂去麤皮

檳榔剉

藜香子炒

蓬莪菹煨

桃人去皮尖雙入研膏各參分

萊菔子炒

青橘皮湯浸去白焙各半兩

厚朴去臘皮生薑汁炙剉壹兩

右九味將八味搗羅為末入桃人膏和勻酒煮麩糊

丸如梧桐子大每服二十九空心食前溫酒下

治卒疝少腹與陰相引疼痛不可忍薑朮丸方

蒼朮米泔浸切炒

乾薑炮

馬蘭花

芫花醋炒

五靈脂土

烏頭炮裂去皮臍各壹兩

右六味搗羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服十

丸食前溫酒或鹽湯下

陰疝腫縮

論曰陰疝腫縮者寒邪客於厥陰之經而陽氣不能自溫故令諸筋拘急陰器緊縮而腫痛也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本脉不營即筋縮急筋縮急則引卵與舌故舌卷卵縮者皆厥陰為病也

治陰疝腫縮疼痛狼毒丸方

狼毒炙貳兩

防葵炒

附子炮裂去皮臍各壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九溫

酒下空心日午臨臥服

治陰疝腫縮雞翅灰散方

雞翅

左右俱用不限多少燒灰

右一味細研爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

黃連

須

熟艾

炙

杏人

去皮尖別研各半兩

右三味搗研羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸鹽湯下空心服

治陰疝腫縮疼痛硝砂丸方

硝砂

研

木香

各半兩

棟實

去核炒

懷香子

炒

京三稜

炮各壹兩

右五味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

空心酒下

治陰疝腫縮槐子丸方

槐子

炒壹兩

右一味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒下空心服

治陰疝腫縮疼痛萹苣熨方

萹苣

切金斤

皂莢

剉碎參搗

蜀椒

去目及閉口者炒出汗壹兩

右三味少用水煮令相得不可太稀乘熱用布三兩重裹熨腫處冷卽易頻熨自消

治陰疝腫縮雄黃洗方

雄黃研

甘草各壹兩

礬石研貳兩

右三味搗研為末每用藥一兩熱湯五升通手洗腫處良久再煖洗

治陰疝腫縮車前子塗方

車前子

不拘多少

右一味搗羅為末湯調塗腫處

治陰疝腫縮蔓菁散塗方

蔓菁根

不拘多少

右一味搗羅為散溫水調塗腫處或以絹帛傅之以

差為度

陰卒腫痛

論曰陰卒腫痛者腎氣虛弱暴受邪氣傳入陰中冷熱相溥故卒然而痛也痛甚則邪勝邪勝則熱勝熱勝則腫皆卒然而作也

治陰卒腫雞翎散方

雞翎陸莖燒灰

蛇牀子壹兩炒

右二味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下如左邊腫

即取鷄右翎右邊腫即取左翎

治陰卒腫痛不消發歇疼痛丸香散方

沉香參分

檳榔兩壹

丹參參分

赤芍藥參分

白茯苓參分
微炒

枳殼參分
微黃去瓤

赤茯苓參分
去皮

右七味搗篩為散每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓食前溫服

治陰卒腫痛攻注腹脹悶木香散方

木香兩半

赤茯苓兩壹
去皮

牡丹參分

防風兩半
去蘆頭

檳榔兩壹

澤瀉參分

郁李人兩壹
湯浸去皮微炒

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治陰卒腫脹丹參散方

丹參兩壹

檳榔兩壹

青橘皮兩半
去白

懷香子兩半

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒一盞調下食前服之

治陰卵卒腫痛塗傅方

桂壹分
去麤皮

右一味為末煮稀麩糊調塗腫處頻易以効為度

治陰腫雄黃淋洗方

雄黃

白礬

甘草各壹兩

右三味搗研爲散每用藥一兩以水一斗煎至三升
通手淋洗至冷候汗出差

治久坐卑濕忽陰囊虛腫氣上築黑豆漿方

右以米醋炒黑豆青布袋盛熨心腹更以椒葱湯淋
燥腰膀厚衣蓋下部然後服諸藥

治陰腫偏著一邊連小腸痛不可忍方

右以酸香苗葉搗取汁一升服之日三四服其滓貼
腫上

控睪

論曰甲乙經曰少腹控睪引腰脊上衝心肺邪在小腸

也又曰小腸病者少腹痛股脊控睪而痛夫小腸者連
睪系屬於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間
而入邪氣旣盛則有厥逆之證其氣上衝肝肺客冷散
於育結於臍控引睪丸上而不下痛引少腹甚則衝於
心胸蓋其經絡之所系屬然也

治小腸受邪控睪痛引少腹懷香子散方

懷香子 炒

華澄茄

棟實 剉

木香 各壹兩半

葫蘆巴

青橘皮 湯浸去白
糖各壹兩

檳榔 剉半兩

右七味搗羅爲散每服一錢匕溫酒調下空心食前

日二

治小腸受邪控睪上而不下疼痛棟實散方

棟實

肆兩拾字銅開

巴豆

椎令微破貳味用麩壹升同炒候變色黑藥焦黃去巴豆

并製取棟實去皮用

懷香子

炒壹兩甘草壹兩

青鹽

別研壹分

右後三味同前棟實搗羅為散每服一錢匕熱酒調

下空心服病作不拘時

治小腸受邪控睪牽痛木香散方

木香

馬蘭花

棟實

巴豆

各參拾枚剝去皮同棟實懷香子炒壹炒候黑色去巴豆用棟實

硝砂

別研半錢

右六味除巴豆不用外搗研為細散每服二錢匕煎

慈酒調下鹽湯亦得空心食前服

治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰曲不伸吳茱萸散方

吳茱萸

湯洗過炒

棟實

肆拾玖枚

巴豆

半兩椎令破參味同炒

候入棟實黃焦色去巴豆茱萸不用將棟實去核用

沉香

半兩

木香

馬蘭花

懷香子

炒各壹分

右七味除巴豆吳茱萸不用外搗羅為散每服二錢

匕炒慈酒調下空心夜臥發時服

治小腸受寒控睪少腹堅鞭疼痛不可忍延胡索丸方

延胡索 青橘皮湯浸去白焙 葫蘆巴

海藻酒洗去鹹焙乾 昆布酒洗去鹹焙乾 馬蘭花

檀香子炒 棟實肉炒各壹兩 木香半兩

巴戟酒浸切焙壹分

右一十味為末入硃砂阿魏安息香三味各一分以醋二升化開去泥土以重湯煮令成膏和九葉豆大每服二十九燒綿灰酒下空心食前服

治小腸受寒氣控睪牽痛木香丸方

木香壹兩

石南

肉蓯蓉酒浸切焙別為末

牛膝酒浸切焙別為末 菖蒲

檀香子炒

棟實炒各貳兩

右七味除蓯蓉牛膝二味別作末外搗羅為末以酒二升熬從蓉牛膝成膏和藥丸如梧桐子大每服三十九空心食前以紙裹蒸白一寸煨熟細嚼溫酒下治控睪上而不下痛引少腹小腸受寒丁香丸方

丁香

木香

狼毒

蜀椒去目并閉口炒出汗各壹兩

附子炮裂去皮臍

芍藥

桔梗炒

乾薑炮各兩半

細辛去苗葉壹兩半

右九味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九

延胡索

青橘皮湯浸去白焙 葫蘆巴

海藻酒洗去鹹焙乾

昆布酒洗去鹹焙乾 馬蘭花

藜香子炒

棟實肉炒各兩 木香兩

巴戟酒浸切焙青分

右一十味爲末入硃砂阿魏安息香三味各一分以醋二升化開去泥土以重湯煮令成膏和九葉豆大每服二十九燒綿灰酒下空心食前服

治小腸受寒氣控睪牽痛木香丸方

木香壹兩

石南

肉蓯蓉酒浸切焙別爲末

牛膝酒浸切焙爲末 菖蒲

藜香子炒

棟實炒各兩

右七味除蓯蓉牛膝二味別作末外搗羅爲末以酒二升熬蓯蓉牛膝成膏和藥丸如梧桐子大每服三十九空心食前以紙裹葱白一寸煨熟細嚼溫酒下治控睪上而不下痛引少腹小腸受寒丁香丸方

丁香

木香

狼毒

蜀椒去目并閉日炒出汗各壹兩

附子炮裂去皮臍

芍藥

桔梗炒

乾薑炮各兩

細辛去苗葉壹兩半

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九

食前炒藿香子酒下

治控畢小腸氣痛礪砂丸方

礪砂壹兩別研 蓬莪茂炮

棟實炒

青橘皮湯浸去 木香

丁香

萹澄茄 肉豆蔻去殼

檳榔剉

附子炮裂去 巴戟天心

藿香子炒各

右一十二味除礪砂外搗羅爲末以酒一升先取礪

砂并飛礪砂水一盞同熬及一升入諸藥再熬頻攪

候得所丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下加

至二十九

治控畢痛引少腹烏藥散方

烏藥 木香 藿香子炒

青橘皮湯浸去 高良薑炒各 檳榔剉

棟實剉 巴豆炒 用麩壹升 炒候變黑色 棟實味

麩不用

右八味除炒巴豆不用外搗羅爲散每服一錢匕溫

酒調下空心食前服痛甚炒生薑熱酒調下

治小腸受邪畢丸控引上下臍腹痛乳香丸方

丹砂研半 礪砂研壹 胡椒半

海蛤禮 棟實炒 富歸切

懷香子炒壹兩

木通剉半兩

馬蘭子炒半兩

右九味搗研為細末用乳香一分研細以酒煮糊和諸藥末丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下鹽湯亦得空心食前

治小腸受邪控羣引少腹痛棟實丸方

棟實麩炒去核

懷香子炒

山茱萸

食茱萸

吳茱萸湯洗焙乾炒

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙

馬蘭花醋炒各壹兩

芫花醋炒半兩

右九味為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二

十九溫酒下空心食前

大德重校聖濟總錄卷第九十四

大德重校聖濟總錄卷第九十五

大小便門

大小便關格不通

小便不通

小便不禁

大小便統論

論曰脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也蓋管受水穀之真精榮衛之根源大小腸膀胱得以變化皆管爲之本是以小腸爲受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱而爲溺傳於大腸而爲糟粕必曰氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而遺泄或燥而結或熱而秘皆陰陽不和之病也治此者不槩以寒熱爲法寒劑蕩滌熱劑枯燥反傷和氣耗其津液若關格不通三焦約病專以榮衛之否塞乳後便難與

夫老者秘澁之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟蕩以駛劑則糟粕不通真氣受弊不可不知也
大小便關格不通

論曰大小便不通者陰陽關格及三焦約之病也陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳導今陰陽偏盛氣否於中則榮衛因之以不行故氣結於腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞也

治關格不通妨悶大小便秘澀大黃散方

大黃剉貳兩

桂去麤皮參分

冬瓜子微炒壹合

滑石研參兩

朴消生鐵銚子炒乾刮出紙裏於黃土內甞壹宿取出細研貳

半兩

右五味先擣前三味細羅爲散更與滑石朴消同研勻細每服二錢匕濃煎白茅根湯調空腹服之至晚再服

治大小便不通黃芩湯方

黃芩去黑心貳兩

赤芍藥

白茅根

大黃生用各參兩

瞿麥穗壹兩半

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入朴消末半錢匕更煎二沸空心溫服

治關格不通脬腹妨悶大小便不通芒消湯方

芒消研半 冬葵子參妙 滑石碎參

右三味除芒消外咬咀二味每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎二沸空心溫服

治腹勝脹滿關格大小便不通茱萸湯方

吳茱萸湯浸洗去涎暴乾微炒 大黃炒

當歸焙切 桂去麤皮 赤芍藥

甘草炙 芎藭各貳 人參

細辛去苗葉各肆兩 桃白皮去麤皮壹斤 乾薑炮壹兩

雄黃分參 真珠末半兩與雄黃同研細

右一十二味將一十一味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓下雄黃真珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之

治大小便不通滑石湯方

滑石壹兩半 茅根 車前子各參

天門冬去心 冬瓜瓢 苧蓉子淘去淨者煮令芽出

暴乾微炒 各壹兩

右六味咬咀每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服日三

治大小便俱不通車前子湯方

車前子

伍兩 生用

木通

剉肆兩

黃芩

去黑心

郁李人

湯浸去皮尖雙人 研如膏各參兩

右四味將前三味麤搗篩與郁李人拌勻每服五錢
匕水一盞半煎至一盞去滓入朴消末半錢匕更煎
二沸食前溫服日三

治大小便俱不通榆白皮湯方

榆白皮

甘草

炙剉各 壹兩半

滑石

參兩

桂

去麤皮 壹兩

右四味咬咀每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓
食前服日三

治大小便不通芍藥湯方

赤芍藥

桑根白皮

剉各 參兩

瞿麥穗

大黃

剉

榆白皮

剉

防葵

去蘆頭

麻子人

研如膏 各貳兩

右七味將前六味麤搗篩與麻子人拌勻每服五錢
匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎
二沸空腹溫服日晚再服

治大小便不通木通湯方

木通

剉貳兩

大黃

剉生

滑石

各參兩

麻子人

壹合 研如膏

右四味將前三味麤搗篩與麻子人拌勻每服五錢
匕水一盞半煎至一盞去滓入芒消末半錢匕更煎
二沸空心服之

治大小便不通冬葵根汁方

生冬葵根

淨洗貳斤搗
絞取汁參合

生薑

肆兩搗絞
取汁壹合

右二味攪勻分作兩服空腹一服有頃再服服盡卽

通

治氣否心腹脹喘促大小便不利甘遂散方

甘遂

煨

牽牛子

炒

續隨子

去殼

大戟

葶藶子

各等分

右五味搗羅爲散每服半錢匕濃煎燈心湯空心調
服利下水爲度

治大小便不通紫金沙散方

紫金沙

不拘多少
蜂房帶也

右一味搗羅爲散每服一錢匕溫酒調下

治大小便不通土馬騮湯方

土馬騮

不拘多少

右一味走水淘火上用新瓦煑過爲麤末每服二錢

匕水一盞煎至七分去滓溫服

治大小便不通豬脂酒方

豬脂如半雞子
大碎切

右一味以酒一升微煮沸投豬脂更煎一二沸分爲兩度食前溫服未通再服

治大小便不通冬葵子湯方

冬葵子微炒
壹兩

右一味麤搗篩都用水二盞煎至一盞去滓入人乳汁半合和勻空腹頓服

治大小便不通髮灰散方

亂髮壹兩淨洗
燒爲灰

右一味細研每服三錢匕溫水調食前服日三以通

利爲度

治下焦結熱腸胃燥澀大小便不利牽牛子丸方

黑牽牛淘洗令淨炊令氣透便取出
攤令微冷便杵取末參兩

青橘皮焙和
白用 陳橘皮焙和
白用 桑根白皮炒

芍藥焙各
壹兩 栝樓根壹兩 木通剉壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜拌和杵至三五千下九如梧桐子大每服十五丸加至二十九茶酒任下

治下焦熱大小便不通氣脹滿悶木香飲方

木香 黃芩去黑心 木通剉

陳橘皮湯浸去白
焙各參分 冬葵子研

瞿麥穗各壹兩 檳榔

茅根

赤茯苓去黑皮各半兩

右九味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治大小便不通茯苓丸方

赤茯苓去黑皮 芍藥

當歸切

枳殼去穢 白朮

人參各伍兩

大麻人 大黃剉各參兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸至二十九空心煎茅根湯下

治大小便不利芫花丸方

芫花炒 滑石碎各半兩

大黃剉炒參分

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸蔥湯下

治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急大黃湯方

大黃剉炒 前胡去蘆頭 半夏湯洗棗

人參各參分 黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮

木香 檳榔剉各半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

同煎至八分去滓溫服

治大小便不通腹脇堅脹蒸下部方

蓮葉參

參采莖并須皂莢壹挺
用去葉切

生薑壹兩

右四味以漿水一斗二升煮十餘沸并滓分兩度用旋旋盛入小口瓷缸中坐缸口上熏蒸冷則易之未通即傾藥於桶斛中添熱水坐薰下部即通

小便不通

論曰腎藏不足氣不傳化膀胱有熱水道不宜故小便不通也令人少腹脹滿其氣上衝心腹膨否甚則喘急不能升降內經曰膀胱不利為癃者如此

治膀胱積熱小便不通通關瞿麥湯方

瞿麥穗

芍藥

大黃炒

當歸焙切

葵子

甘草炙

榆白皮剉

梔子人

木通剉

石韋去毛

大麻人各壹兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入燈心少許煎至一盞去滓溫服

治膀胱熱結小便不通立應散方

井泉石

車前子

滑石各壹兩

葶藶紙上炒

海金沙壹斤

右五味搗羅爲散每服一錢七新汲水食前調下未
通再服

治小便不通氣上衝心胸滿悶玉蘂丸方

丹砂研

硝砂研

滑石研

瞿麥穗

海金沙各壹分

右五味搗研爲末別研篋麻子人丸如梧桐子大每
服十九十五丸葱白煎酒下小兒減丸數服

治小便不通葵子飲方

木通剉

冬葵子

甘遂

瞿麥穗

脾味各半兩
細剉都微炒

滑石研貳錢

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞入燈心同煎至
七分和滓溫服未通再服

治小便不通懷香子散方

懷香子炒

馬蘭花炒

葶藶紙上炒
等分

右三味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下食前服以
通爲度

治小便不通瞿麥湯方

瞿麥穗

滑石

木通剉各兩

海金沙

冬葵子各壹分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入燈心二十

新金方十一
荜煎至七分去滓溫服不拘時

治小便卒不通滑石散方

滑石

朴消

木通

右三味搗羅爲散每服二錢匕溫水調下不拘時以通爲度

治小便不通臍腹脹痛不可忍諸藥不効者續隨子丸

方

續隨子

去皮

鉛丹

兩半

右二味先研續隨子細次入鉛丹同研勻用少蜜和作團盛堯罐內密封於陰處掘地坑埋之上堆冰雪

惟多是妙臘月合至春末取出研勻別鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九煎木通湯下不拘時甚者不過再服要效速卽化破服病急卽旋合亦得治小便淋瀝疼痛不通滑石散方

滑石

海金沙

木通

右三味搗羅爲散每服二錢匕濃煎燈心湯調下空

心服

治小便不通或淋瀝疼痛滑石丸方

滑石

續隨子

濕生蟲

木通

各壹分

右四味罇研爲末麩糊丸如梧桐子大每服五丸煎
燈心湯下不拘時

治小便不通松煙散方

墨好者水濃
研汁半盞 酒半盞

葱白參茸
拍破

膩粉研半

右四味同煎至七分放溫去葱白頓服卽通

治小便不通臍下滿悶海金沙散方

海金沙兩 臘茶半兩

右二味搗羅爲散每服三錢匕煎生薑甘草湯調下
不拘時未通再服

治小便不通氣滿悶酸漿酒方

酸漿草壹握

右一味研取自然汁與醇酒相半和服立通不飲酒
用甘草三寸生薑一棗大剉同研用井華水五分盞
濾取汁和服亦得

治小便不通膀胱熱朴消散方

朴消不拘
多少

右一味細研爲散每服二錢匕溫釐香酒調下不拘
時服如熱躁以蜜水調服

治小便不通諸藥無効螻蛄麝香散方

蠅姑活者
壹枚

右一味生研入麝香少許新汲水調下立通

治飲水過多心悶着熱小便不通茯苓散方

赤茯苓去黑皮
參兩

右一味搗羅爲散冷水調下二錢匕如男子小便中
有餘瀝漏精夢泄等用溫酒調空心服妙

治小便不通獨蒜塗臍方

獨顆大蒜壹枚

梔子人參柴
一枚

鹽花少
許

右三味爛搗攤紙花子上貼臍良久卽通未通塗陰
囊上立通

治小便不通通臍法

右以白瓷瓶滿盛水以有字紙七重密封瓶口於患
人臍內用鹽一捻倒置餅口覆在臍上偃臥如覺大
段冷小便卽通

治小便不通蜀葵子湯方

右取黃蜀葵子三四十粒細研以湯衝絞取汁一小
盞頓服効

治小便澀痛不通蠶灰散方

右用蠶退紙不拘多少燒灰研細入麝香少許和勻
每服二錢匕米飲調下

治小腸積熱小便不通葵根飲方

葵根壹大

胡荽貳兩

滑石壹兩
爲末

右三味將二味細剉以水二升煎取一升入滑石末
溫分三服亦治血淋

治小便不通久卽成淋方

右以琥珀搗研成粉每服二錢匕濃煎萱草根汁調

下空心服

治小便不通少腹急痛悶絕消石湯方

消石碎

瞿麥穗

葵子

滑石碎

甘草炙

大黃剉

木通剉各
半兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸煎
至七分入生地黃汁半合去滓不拘時溫服

治卒不得小便杏仁散方

杏人去皮尖雙
人貳柒枚

右一味炒黃細研米飲調下立差

治小便不通莖中痛及女人血結腹堅痛牛膝湯方

生牛膝根并葉

黃芩去黑心

當歸焙壹兩

右三味細剉每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓

溫服日三

治膀胱積熱小便不通防已散方

防已兩

海蛤

滑石

木香各半

右四味搗羅為散每服二錢匕濃煎木通湯調下

治小便不通桑螵蛸湯方

桑螵蛸

炙參拾枚

黃芩去黑心貳兩

右二味細剉用水三盞煎至二盞去滓分溫二服相

次頓服

又方

車前草半斤

右一味細剉用水七盞煎至四盞分溫三服即通

治小便不通葵石湯方

葵菜根

剉半斤

滑石為末半兩

右二味除滑石外麤搗篩用水三盞煎至二盞去滓

入滑石末分溫二服

治小便不通秦朮散方

秦朮

去苗壹分

冬葵子壹兩

右二味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下未通再服

治膀胱積滯風毒氣脹小便不通方

右取蔥津一蛤蜊殼許入膩粉調如泥封臍內以裹

肚繫定熱手熨須臾即通

治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶石韋湯方

石韋去毛參分 徐長卿參半兩 茅根參分

木通炒到 冬葵子各壹兩 滑石貳兩

瞿麥穗半兩 檳榔壹分

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓下朴消末一錢匕溫服空心食前日三

治膀胱熱小便不通舌乾咽腫滑石散方

滑石碎 桑螵蛸炒 桂去麤皮

大黃剉炒各半兩 黃芩去黑心 防已

瞿麥穗各參分 木香壹分

右八味搗羅爲散每服二錢匕煎木通湯調下

治小便不通茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 白芍藥 瞿麥穗各壹兩

白朮參分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入葱白五寸

生薑一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治小便不通木通湯方

木通 石韋去毛 瞿麥穗各貳兩

冬葵子壹兩

右四味剉如麻豆大以水十盞煎取三盞去滓內滑石末一兩分溫三服微利為度

治小便不通濟下急痛脹悶欲絕鹽熨方

鹽貳升

右一味鑊中炒令極熱布帛裹熨臍下以小便通快

為度

治小便不通雞蘇飲方

雞蘇壹握

石韋去毛參分

冬葵子兩

杏仁湯浸去皮滑石兩各壹

木通思時不

生地黃切焙各

右七味剉如麻豆以水十二盞煎至四盞去滓分溫四服如人行四五里未通再服

治膀胱蘊熱小便不通石韋飲方

石韋去毛

瞿麥穗

木通剉

葛根剉

麥門冬去心

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮

冬葵子

生乾地黄焙

滑石碎各壹兩

甘草炙剉半兩

右一十一味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取

八分去滓空心頓服

治小便不利石韋散方

石革毛

瞿麥穗

冬葵子各兩

滑石碎伍

右四味搗羅為散每服三錢匕溫水調下食前服

治小便不通方

蓬莪茂炒

藜香子炒

茶葉各半

右三味搗羅為散每服三錢匕以水一盞鹽二錢匕

葱白二寸煎至六分和滓空心服

小便不禁

論曰內經言膀胱不約為遺溺亦腎虛不能約制水液故小便便利多甚則下焦傷竭真氣不固而小便不禁也

治腎藏虛冷腰膝無力小便不禁或溺白色菴菴丸方

肉菴菴

淨刷去殼皮酒浸兩宿薄切焙乾

兩半黃耆細切

桂去臘皮

杜仲去臘皮貳兩半

牛膝

去苗酒浸貳兩

山茱萸貳兩

韭子水淘去淨者焙乾炒參兩

右七味搗羅為細末鍊蜜和劑更白內塗酥杵令勻

熟丸如梧桐子大每日空腹煎黃耆湯下三十九至

晚再服

治腎藏虛腰膝冷疼夜遺小便鹿茸散方

鹿茸

去毛酥炙令黃剉

烏賊魚骨

去甲微炙各參兩

當歸

切

人參

白芍藥

龍骨研

桑寄生各壹兩

桑螵蛸壹兩半中劈破慢火

炙令黃色

右八味先搗羅前七味為細末更與龍骨同研令勻細每服一錢匕溫酒調服空心日晚臨臥各一

治小便不禁菟絲子散方

菟絲子

酒浸兩宿焙乾微炒別搗細羅為粉壹兩

蒲黃微炒細研

黃連

去須各壹兩半

肉苁蓉酒浸切燂壹兩

五味子炒

雞臙腫黃皮

炙黃色乾各壹兩半

右六味先同搗四味為細散再入菟絲子粉與蒲黃同研勻細每服兩錢匕酒調食前服日三

治小便不禁黃耆散方

黃耆

細剉

狗脊去毛剉

牡蠣煨

肉苁蓉

酒浸切焙各壹兩參分

土瓜根參

赤石脂

研

革薺微炒剉

牛膝去苗酒浸切焙微炒

山茱萸

各貳兩半

右九味先搗羅八味為細散更與赤石脂同研勻每服一錢匕酒調食前服至午間夜臥各一服漸加至兩錢匕

治小便不禁日夜無數鷄腸散方

黃雄鷄腸

肆具切破淨洗炙令黃熟

肉苁蓉酒浸切焙

苦參

赤石脂研

白石脂研

黃連去須各伍兩

石六味檮羅四味爲細散更與赤石脂白石脂同研
勻細每服二錢匕酒調食前服日二夜一

治小便不禁柏白皮湯方

柏白皮焙乾剉貳斤 酸石榴枝壹握燒灰細研

右二味先搗柏白皮爲麤末每服四錢匕水一盞半
煎至一盞去滓下石榴枝灰一錢半匕更煎至八分
空心服至晚再服

治小便不禁牡蠣丸方

牡蠣白者參兩益堯合子內更用鹽未壹兩益頭鋪底以炭火約伍斤燒半日取出研如粉

赤石脂參兩搗碎醋拌勻濕於生鐵銚內慢火炒令乾研如粉

右二味再同研勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十

五丸空心鹽湯下

治小便不禁鵲巢散方

重鵲巢中草壹斤燒作灰細研如粉 薔薇根皮去土伍兩

右二味先搗薔薇根爲麤散每服三錢匕水一盞煎
至七合去滓調鵲巢灰兩錢匕空心服

治小便不禁乾薑飲方

乾薑炮裂壹兩 附子炮裂去皮臍半兩 芎藭參分

桂去麤皮

麻黃去根節

右五味剉如麻豆每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓空心溫服至晚再服

治氣牽腰背及脇內痛小腹堅小便不禁當歸湯方

當歸切

大黃炒

桂去麤皮

人參壹兩

乾薑炮裂

甘草炙

白芍藥各貳兩

吳茱萸水浸兩宿每日兩度換水洗去涎焙乾微炒貳兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服日三

大德重校聖濟總錄卷第九十五