

卷四

溫燥疫

斑疹癰瘍

瀉瘧

三消
脾胃癰瘍

疫飲


鬱

肝火

不寐

增臨證指南醫案

上海文益書
局印行



臨證指南醫案卷四

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲仝校

濕阻
肺不
上焦

津傷胃

濕入

心經

熱

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

濕

溫陽
脾陽

厚角 連翹心 元參 石菖蒲 金銀花 野赤豆皮 煎送至寶丹

蔡 陽虛挾濕邪熱內陷。所以神識如蒙。議用瀉心法。人參 生乾薑 黃芩 川連 枳實 生白芍
張六此溫濕氣中足太陰之氣不為鼓動。運行試以痞結胸滿。仲景列於太陰篇中。概可推求其理矣。

半夏 醋炒

茯苓

川連

厚朴

通草湯煎

周 濕傷脾陽。腹膨小溲不利 茄朮 厚朴

茯苓 淹瀉

猪苓 泰皮

又 五苓散 又 二虎膏

范 四肢乍冷。自利未已。目黃稍退。而神倦不語。濕邪內伏。足太陰之氣不運。經言脾竅在舌。邪滯竅必少盡。以致

語言欲寢。必當分利佐辛香以默運坤陽。是太陰裏症之法。

生於水瓶

厚朴五

茯苓三

草菓仁分

木瓜五

澤瀉五

又 身體稍稍轉動。語寢。神呆。猶是氣機未為靈轉。色脈非是有餘。而濕為陰邪。不徒偏寒偏熱已也。

生於木

茯苓

茯仁

鬱金

木瓜

澤瀉

石菖蒲汁

炒黃川貝

淡竹葉

曹三腸胃屬腑。濕久生熱。氣阻不爽。仍以通為法。

生於木

川黃連

厚朴

淡生薑渣

廣皮白

酒煨大黃

水法丸服三錢

李四脈小濫。瘦多上湧。食入脘阻。大便不爽。上秋至今夏不愈。自述飢飽失知。曾病黃疸。以濕傷氣滯主治。

大杏仁

苡仁

半夏

薑汁

茯苓

橘紅

鬱金

香豉

俞五酒濕鬱傷。脘中食阻而痛。治以辛苦寒。

小川連

半夏

薑汁

枳實

茯苓

香豉

某五舌白目黃。口渴溺赤。服來呆鍼。此屬濕鬱。

綿茵陳三

生白朮一

寒水石三

飛滑石三

桂枝末錢

茯苓皮三

木猪苓錢

澤瀉錢一

濕阻
中風

陽氣

此等症多
由風寒濕
諸上身所
致。禁以治
之。心有未

李酒客中虛寒地潮濕長夏涉水外受之濕下越水穀不運中焦之濕內服治法不以宣通經脈致瀉阻氣分數而為熱。自脾胃不主運通水濕橫瀆於脈腠之間二便不爽濕熱濁氣交扭混亂前輩治中滿心曰分消此分字明明謂分解之義但亂藥既多不能去病就是脾胃受傷於藥蔓延腿肢腫極且痛病深路遠藥必從喉入胃然後四布病所未得藥益清陽先已受傷此湯藥難以進商也議用丹溪小溫中九三錢專以疏利腸中取其不致流散諸經亦一理也小溫中丸八服

某三陽微體質濕痰內聚便溏脫泄肌麻舌乾清理濕邪氣機升降自安。

金石斛 茯苓 半夏 廣皮白 鈎藤 白蒺藜

金石斛

茯苓

半夏

廣皮白

白蒺藜

張脈右緩濕著阻氣

厚朴 廣皮 煙草葉

炒查肉

白蒺藜

某二不耐煩勞是本虛脫悶便泄屬濕邪先治濕後治本

蒼香梗

廣皮 茯苓

炒神麪

陸濕滯如痞山茵陳草葉仁 茯苓皮

大腹皮絨

厚朴 廣皮

炒神麪

汪三舌黃脫悶濕內著氣機不宣如久釀蒸必化熱氣即有身熱之累

杏仁 薑香 茯苓皮 滑石 厚朴

廣皮白

炒神麪

某鬱病源皆濕熱內停之象當走濕清熱為主至於藥酒鹽濕亦有者助熱尤當戒

綿茵陳

黃柏

茯苓

澤瀉

某脈濡頭脹身重著而痛寒熱微嘔此濕阻氣分

茯苓皮

大腹皮

滑石

竹葉

厚朴 杏仁 白蔻仁 木通

茯苓皮

大腹皮

滑石

竹葉

某長夏外受暑濕與水穀之氣相併上焦不行下脫不通氣阻熱從濕下蒸逼不飢不食目黃舌白氣分之結

厚朴 杏仁 廣皮 茯苓 半夏 薑汁

茯苓皮

大腹皮

滑石

白蔻仁 通草 猪苓

某脈緩身痛汗出熱解繼而復熱此水穀之氣不運濕復阻氣鬱而成病仍議宣通氣分熱自濕中而來徒追清熱不應黃芩 滑石 茯苓皮 大腹皮 白蔻仁 通草 猪苓

方四形質頗然脈遲小澇不食不寐腹痛大使室癥平昔嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕濁陰鳴聚為痛

沙黑生附子

炒黑川椒

生淡乾薑

葱白

調入猪膽汁一枚

王五冷濕損陽。經絡拘束。形寒酒客少。勞力所致。

桂枝 淡乾薑 熟附子

生白朮

莫拉今年夏四月。寒熱不飢。是時令潮溼氣蒸。內應脾胃。夫濕屬陰晦。必傷陽氣。春酸形寒乏陽。運行議散。運轉

脾胃一法。
苓蓋术桂湯

禁六地中濕氣。自足先腫。濕屬陰邪。陽不易復。裹寒筋骨。猶牽強無力。以金匱苓蓋桂术湯。

陳五濁凝氣結。有形酒肉。挾濕草撥

生香附汗

木香 草藥

茯苓

廣皮白

江脈緩脣上痛。腹微膨。便稀滿短不爽。此乃濕鬱脾胃之陽。致氣滯裏急。宗古人導瀉分消用桂苓散方。

生茅朮

官桂 茯苓 厚朴 廣皮白

飛滑石 猪苓 淳瀉 炒查肉

林五中年清陽日薄。忽然脫中痞悶。乃清陽不自轉旋。酒肉濕濁之氣。得以凝聚矣。遇飲淳瀉。濕傷脾胃。胃陽微仲

景法以輕剝宣通其陽。若投破氣降最傷陽氣。有格拒之害。
苓桂朮甘湯

嚴三胸滿不飢。是陽不運行。嗜酒必挾濕凝阻。其氣久則三焦皆閉。用半硫丸二便已通。議治上焦之陽。

苓桂朮甘湯

王六病人述病中厚味無忌。腸胃滯雖下而留。濕未解。濕重濁令氣下墜於肛。肛墜痛不已。胃不喜食。陽明失關。舌

上有白腐形色。議劫腸胃之濕。大腸有熱不得用潔補之劑

生茅朮肝痛不宜

人參

厚朴 廣皮 炮薑皮

生炒黑附子

胡七受濕患瘡。久瘡陽之氣泄。半年淹淹無力。食少噯噫。難化此脾胃病。法以運中陽為要。

茯苓

桂枝 生於朮

炙草

生於朮

苡仁

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

汪夏令脾胃司氣。兼以久雨泛濬。地中濕氣上干。食味重濁。少運所謂濕勝成五泄也。古云寒傷形熱傷風。若種

夏至天漸熱。宜益氣分以充脾胃。此夏三月必有康健之理。

補中益氣湯

某十五穢濕邪吸受。由募原分布三焦升降失司。脘腹脹悶。大便不爽。當用正氣散法。

藿香梗

厚朴

杏仁

廣皮白

茯苓皮

神曲

麥芽

綿茵陳

蔡仲景云。小便不利者。為無血也。小便利者。血症諦也。此症是暑濕氣蒸。三焦滯漫。以致神昏。乃諸竅阻塞之兆。

溫熱入經
辨

徐

溫瘡初愈。驟逢濁氣。食物濕聚。熟蒸。益於經絡。寒戰。熱盛。骨骱煩疼。舌起灰滯之色。面目發黃。色顯然。濕熱為
瘡。仲景謂濕家忌復發汗者。恐陽傷變病。蓋濕邪重著。汗之不却。是苦味辛通為安耳。

防已

杏仁

滑石

醋炒半夏

連翹

山梔

苡仁

野赤豆皮

某

風着濕。渾雜氣不主宣。咳嗽頭脹不飢。右股若廢。

法當通陽驅邪。

本有汗不解。

桂枝加桂

厚朴錢

半夏

漢防己錢

白芍藥錢

生薑絲

大黃

水

杏仁錢

桂枝加桂

厚朴錢

半夏

漢防己錢

白芍藥錢

生薑絲

大黃

水

經脉

某

汗多身痛。自利小溲全無。胸腹白疼。

此風濕傷於氣分。醫用血分涼藥。希冀熟緩。殊不知濕熱在脈為痛。濕家

本有汗不解。故仁

桂枝加桂

厚朴錢

生薑絲

大黃

意謂何為

方家空顧

令聞者生疑

意謂何為

本有汗不解。故仁

桂枝加桂

厚朴錢

生薑絲

大黃

意謂何為

方家空顧

令聞者生疑

意謂何為

本有汗不解。故仁

桂枝加桂

厚朴錢

生薑絲

大黃

意謂何為

氣分肺胃津液虛大醫上度心過動傷胃虛

某下夏秋燥致傷都因陰分不足。

大沙參

桑葉

杏仁

茱萸

白芍

大沙參

生甘草

白芍

生扁豆

地骨皮

麥冬

花粉

桔梗

黑梔皮

桔梗

葛根

某陳

秋燥復傷宿恙再發未可補湯姑與甘露養胃。

麥冬

玉竹

北沙參

生甘草

茯神

橘梗

桔梗

葛根

某某

燥火上鬱。頭脹咽痛當平涼清上。

薄荷梗

連翹梗

生甘草

黑梔皮

桔梗

葛根

某張

脈數虛舌紅口渴上齶乾涸腹熱不飢此津液被劫陰不上承心下溫溫液液用炙甘草湯。

天冬

人參

甜梨肉

生白蜜

桂枝

生地

麥冬

人參

麻仁

桂枝

某炎

心中煩熱正值經來而熱渴不已若清肺氣大謬用復服法。

炙甘草

生地

阿膠

麥冬

人參

桂枝

某人參

生地

阿膠

麥冬

人參

桂枝

某瘧為乾涸不通之疾內傷外感宜分外感者由於天時風熱過勝或由深秋偏亢之邪始必傷人上焦氣分其

法以辛涼甘潤肺胃為先喻氏清燥救肺湯及先生用玉竹附子桑葉薄荷梨皮甘草之類是也內傷者乃人

之本病精血下革而成或因偏餌燥劑所致病從下焦陰分先起其法以純陰靜藥柔養肝腎為宜大補地黃

丸六味丸之類是也要知是症大忌者苦澀最喜者甘柔若氣分失治則延及於血下病失治則槁及乎上喘

咳痽厥三消噫膈之類總由此致大凡津液結而為患者必佐辛通之氣味精血竭而為患者必藉血肉之滋

三焦
伏熱

張

伏氣熱蘊三焦。心凜熱發煩渴。遍體赤斑夜躁不寐。雨脈數搏。

烽羊角

犀角

連翹心

玄參心

鮮生地

金銀花

花粉

石菖蒲

溫溫

嚴

濕溫雜受。身發斑疹。飲水渴不解。夜煩不成寐。病中強食反助邪威。議用涼膈疏斑方法。

桂枝

川連

黃芩

花粉

杜鵑

枳實

又

寒熱必有形象。攻觸及於胃脘之下。口渴喜飲。緩漫。癥已發現。病不肯退。此邪氣久伏厥陰之界矣。終可也。

連翹

薄荷

杏仁

鬱金

枳實汁

炒牛蒡

山梔

石膏

風溫

江某。溫邪發病。濕熱內蘊。便閉不通。先開上焦。杏仁一杯。臨服研入周少川牛黃丸一丸。先煎至六分後。和入雪白金汁一杯。臨服研入周少川牛黃丸一丸。

江

溫邪

發病

江某

風溫發病

江某

風溫

江

溫邪

發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江

溫邪

發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫

江

溫邪

發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

溫熱

江

溫熱

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

溫熱

江

溫熱

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

外寒

江

外寒

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

外寒

江

外寒

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

外寒

江

外寒

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

風溫發病

江某

吳 痘在暴雨而發肌表頭面不透。是外溫為寒，內伏為熱。肺病為衛，衛氣分兩解為是。

麻黃 石膏 牛蒡子 枳殼汁 杏仁 射干 桔梗 生甘草

尹 環口爆裂而痛。頭面身半以上發出瘡。赤紋乃陽明血熱。久蘊成毒。瘦人偏熱。頗有是症。何謂醫人不識。以前服藥未妙。再加風藥尤妙。

溫陽 腹大 胃瀉 膽瀉

此症乃
中熱之
前服藥
未妙。

風溫

江 溫邪自利瘧疹 黃芩 連翹 牛蒡子 桔梗 香豉 薄荷 杏仁 橘紅 通草

李仁發瘧熱腫。獨現正面。每遇九月大發。五六月漸愈。七八年如是。因思夏令陽氣宣越。營衛流行無間。秋冬氣涼。外薄氣血凝滯。此濕熱漫無發泄。乃少陽木火之鬱。及陽明經蒸之濕。故上焦尤甚。耳法以平涼。位以苦寒。俾陽分導。熱得疏。庶幾發作勢緩。夏枯草 鮮菊葉 苦丁茶 鮮荷葉邊 羚羊角 黑施皮 鬱金 索仁

唐四五麻木忽高腫發瘧。必有風濕襲入皮膜。乃軀殼病。昔人每以宣行通劑。此防變風症。

片黃黃

羚羊角 川桂枝

撫芎

半夏

白芥子

某十九風塊瘡癰。咳嗽腹痛。邪著表裏。當用雙和。

牛蒡子 杏仁 連翹 桔梗

桑皮 茄貝母 煎藥送通聖丸

症者有觸目之色而無礙手之質。即猶如錦紋稀如蚊跡之象也。或佈於胸腹。或見於四肢。總以鮮紅起發者

為吉。色紫成片者重。色黑者為凶。

解明音亦可愈

色青者為不治。蓋有諸內而形諸外。可決其臟腑之安危。邪正之之

勝負也。玷傷寒瘡痘諸症。失於宣解。邪蘊於胃腑。而走入營中。每有是患耳。

考方書之治。其法不一大抵由失表而致者。當求之汗。失下而致者。必取乎攻火。甚清之毒甚化。如營氣不足者。助其虛而和之。託之。至於陰癰

一說。見象甚微。若憑指定。些些之斑點為陰。猶恐不能無誤。想前人此例。無非覺後人勿執見症為實驗之義

也。吾故曰。必參之脈象。及兼證多方。痧者。參之通稱。其頭粒而如粟象。瘻者。即瘻之屬。腫而易痒。須知出要周

身涼。宜徐緩。不外乎太陰陽明之患。故繆氏。耑以肺胃論治為精也。若先生之法。本乎四氣。隨其時令之勝。復

酌以草涼辛勝。及甘寒苦寒。鹹寒淡滌等法。而治之。凡吾幼科諸友。於此尤當究心焉。

邵新甫

疫

汪五宿嘯久矣。不發心悸震動。似平燠瘞之象。此屬痰火。治以宣通鬱遏。勿徒呆補。

半夏 川建 石菖蒲 姜粉 枳實 茯苓 川鬱金 橘紅 竹瀝姜汁泛丸
劉

疫火鬱遏氣滯吸煙上熱助壅。是酒肉皆不相宜。古稱疫因氣滯。熱鬱治當清熱理氣為先。

川建

白朮

枳實

厚朴

茯苓

半夏

淡薑湯泛丸

沈三瘦大久嗽。

海蛤丸

張姬瘦火風眩暈防外跌。

明天麻 炒半夏 茯苓 橘紅

羚羊角

鈎藤 竹瀝

陳姪老年疫火咳逆痰有機氣。

蘆根 沔仁 桃仁 緣瓜子 荸薺 大棗

即兼肺腎治法

丈下虛不納濁泛嘔逆痰穢氣。

熟地炭 紫衣胡桃肉 炒杞子 炒牛膝

川斛 茯神

某瘦火上逆蒙蔽耳鳴頭暉。

二陳加天麻鈎藤甘菊

羚羊羹及

某夏至節雨觸脈弦長五火燔燎而肝陽胃陽尤甚動怒抽掣為肝病食辛香厚味即病。

至胃病使然瘦火根深非頓可除。惟靜養勿恚忿。薄味以清裏。此病發之勢必緩由漸加功議藥乃近理治法。

羚羊角 川建 鬱金 山梔

北秦皮 牛黃 膽星 橘紅

生石膏

寒水石 金箔 方諸水法丸竹葉燈心湯送下。

何姐診脈右關弦滑。疫多舌乾微強。語言似寒。蓋因瘦火上蒙津液不得上承。高年頤慮風癆。宜清上宣通分追剛

燥及膩滯之藥。

半夏 金石斛 橘紅 黑山梔 茯苓 鬱金 生甘草 石菖蒲 竹瀝 薑汁

張某皆如麻神憐如逝。熱疫內閉。勢非輕渺。

半夏 石菖蒲 桔梗 枳實 鬱金 橘紅 竹瀝 薑汁

某營疫 半夏麪 鬱金 石菖蒲 明天麻 白蒺藜 橘紅 茯苓 鬱金 橘紅 竹瀝 薑汁

陶脈左弦堅搏。疫多食不易運。此營處已甚。肝侵脾胃。有年最宜開懷。不致延及噬膈。

半夏 薑汁 杏仁 鬱金 橘紅

又脈如前。疫氣未降。前方去杏仁加白芥子。

金六漏熱內蒸。疫火日盛。根本漸傷。陽泄為汗。陰泄遺溺。酒客喜於爽口食物。醫藥中滋膩補方。決不適用也。

豬肚丸方

葉久寓南土水設之濕蒸熱感。脈沈弦目黃肢未易。有瘡疾皆濕熱感致氣隧不得流暢法當苦辛寒清裏通肌做前輩痰因熱起清痰為要。

生芥末 黃柏

瓜萎實

山梔

萊菔子

川連

半夏

厚朴

橘紅

竹瀝

薰汁丸

某

病後厚味惹痰

風化硝

瓜萎仁霜

枳實

鬱金

生茯苓

薑汁炒山梔

竹瀝法丸

木火

祀中

胃虛

生瘡

桑葉丹皮

文

脈左浮弦數

痰多脫中不爽

煩則火升

眩暉靜坐神識安舒

議少陽陽明同治

徐

脈脹濕阻熱痰

半夏

茯苓

黑山梔

橘紅

製蒺藜

遠志

降香

汪

陽動內風用滋養肝腎陰藥壯水和陽亦屬近理

夏季脾胃主司肝膽火風易於貴膈犯中

中土受木火之侮

疫火上盛

腎氣少攝

下焦暮服清肅

上焦方法

羚羊角

半夏

茯苓

橘紅

黑山梔

鬱金

苦丁茶

天冬

金箔

曹王色鮮明屬上有痰飲蓋上實則下虛半百年歲未得種王診得脈左小不靜右部弦滑法當清肺胃之熱痰益

腎肝之精血做更清衛生方法

慈窩膠

甜梨膏

人參

黃芪

麥冬

山藥

茯苓

於朮

黃節

青鹽

黑節

鹿尾膠

好奇取人遂開後人無

羊內腎

淡蕊客

故紙

胡桃

熟地

茯苓

補骨脂

胡桃肉

杞子

五味

牛膝

遠志

車前

蜜丸

肝腎虛上有痰

腎多

苟

向來痰多食少而參水服餌未合

此裏質為陽不受溫熱剛燥之劑

上年冬季溫燥

入春痰愈多體中微倦

乎藏股未固

春氣自地升舉之徵

法當攝腎固真乃治療之本方為有益

熟地

茯苓

補骨脂

胡桃肉

杞子

五味

牛膝

遠志

車前

蜜丸

疫症之情狀變幻不一古人不究標本每著消痰之方立消痰之論者甚多後人遵其法而用之治之不驗遂

有痼疾為怪病者矣不知痰乃病之標非病之本也善治者治其所以生痰之源則不消痰而痰自無矣余詳

考之夫痰乃飲食所化有因外感六氣之邪則肺脾胃升降之機失度致飲食輸化不清而生者有因多食甘

膩肥腥茶酒而生者。有因本質脾胃陽虛濕濁凝滯而生者。有因鬱則氣火不舒而蒸變者。又有腎虛水泛為痰者。此亦因土衰不能制水。則腎中陰濁上逆耳。非腎中真有痰水上泛也。更有陰虛勞症。龍相之火上炎燥肺。以致痰嗽者。此痰乃津液所化。必不濃厚。若砍消之。不惟無益。而徒傷津液。其餘一切諸痰。初起皆由濕而生。雖有風火燥痰之名。亦皆因氣而化。非風火燥自能生痰也。其主治之法。惟痰與氣一時壅閉咽喉者。不得不暫用豁痰降氣之劑。以開之。餘皆當治其本。故古人有見痰休治痰之論。此誠千古之明訓。蓋痰本飲食濕濁所化。人豈能禁絕飲食。若而欲消之。由於外邪者。邪散則痰或可清。如寒痰溫之。熱痰清之。濕痰燥之。燥痰潤之。風痰散之是也。若涉本原者。必旋消旋生。有至死而痰仍未清者矣。此乃不知治本之故耳。今觀素中治法。有因鬱因火者。必用解鬱清火為君。以消痰佐之。有因濕因熱者。則用燥濕清熱略佐化痰之品。若因肝腎虛而生痰者。則純乎鎮攝固補。此真知治痰之本者矣。若因寒因濕者。更當於痰飲門兼參而治之。華岫雲所列方案。皆治肺胃浮痰之藥。若遇經人路盤踞。請及三窓隱處之老處尚有岐屬製煉之方。此等方不能奏效也。

痰飲

某六高年衛陽式微。寒邪外侵。引動飲邪上逆。咳嗽形寒。仲景云。治飲不治咳。當以溫藥通和之。

杏仁三錢

粗桂枝一錢

淡乾薑三錢

茯苓三錢

苡仁三錢

炙草四錢

周向有耳聾鳴响。是水虧木火。蒙發冬陽不潛。亦屬下元之虛。但今咳嗽喉下有痰音。腸痛臥著氣衝。乃衛陽升而痰飲泛脣溼。當此驟冷恐有外寒引動內飲。議開太陽以肅上。

雲茯苓

粗桂枝

乾薑二味同用

五味同量

白芍

炙草

當午時服

某二新涼外束肺受寒冷。氣餒不降。宿飲上干而病發矣。法當暖護背心。宿病可卻。

淡生薑粉

半夏

蛤蜊粉

茯苓

桂枝末

苡仁煎湯

某五背寒咳嗽。此屬飲象。先當辛通飲邪。以降肺氣。

鮮枇杷葉

杏仁

茯苓

橘紅

生薑

半夏

某五二服右大弦。氣喘咳嗽。濁沫不能着枕。喜飲湯水。遇寒病發。此屬飲邪留於肺衛。如見咳嗽以清潤。愈投愈劇矣。華岫子山東大處

徐氏痰飲上吐。喘不得卧。乃溫邪阻蔽。肺氣氣不下降。壅滯不能着。右議用宣通開氣分方法。

小青龍去細辛。麻黃加苡仁白糖砂石膏。

沈姪冬溫陽不潛伏。伏飲上返。仲景云。脈沈屬飲。面色鮮明。為飲。飲家咳甚。當治其飲。不當治咳。緣高下焦根蒂已虛。因溫緩氣泄。不主收藏。飲邪上擾。乘肺。肺氣不降。一身之氣交阻。薰灼不休。絡血上湧。經云。不得卧。卧則喘。甚。瘻塞乃肺氣之逆亂也。若以見病圖病。昧於色診候氣。必致由咳變幻。腹脹滿漸不可挽。明眼醫者勿得忽為泛可也。茲就管見略述大意。議開太陽。以使飲濁下趨。仍無礙於冬溫。從仲景小青龍越脾合法。

杏仁
茯苓
苡仁
炒半夏
桂枝木
石膏
白芍
炙草

方氏冷暖失和。飲泛氣逆。為浮腫喘咳。腹脹。卧則衝噫。議用越脾方。

石膏
杏仁
桂枝
炒半夏
茯苓
炙草
不用麻黃不成越脾

施七勞煩太甚。胃陽受傷。外衛單薄。寒畏冷。食物少運。痰飲內起。氣阻濁凝。胸背皆痛。辛甘理陽已效。當此長夏。

脾胃主令。崇其生氣。體旺病可全好。

黃昭身居沿海。氣鹽霧露。邪侵入。清陽陽傷畏寒。久嗽。病人不知却病。護身猶然用力承辨。裏結飲邪沈痼。不卻。

病。茯苓桂枝湯。

胡六脈沈而微微。則陽氣不足。沈乃寒水陰凝。心痛怔忡。漸及兩脇下墜。由陽衰不主運行。痰飲聚氣。欲阻致痛之

來。其心震之謂。亦如波撼岳陽之義。議用外臺茯苓飲合桂苓方。人參
茯苓
半夏
枳實
桂枝
薑汁

白六脈沈小弦。為陰濁。飲邪累質。陽不克旺。胸中清氣不得舒展。曠遠。偶觸入寒冷。或誤進寒物。飲邪暴冷凝結。胸

痞。當平日食物忌用酒肉腥濁。使清陽流行。常服仲景苓桂术甘湯百劑。若病來因冷即服。大順散。

戴載病去神已爽慧。但本脈帶弦。平素有飲。為陽氣不足之體。年紀漸多。防有風痺。此酒肉宜少用。勞想當深戒矣。

議外臺茯苓飲方。人參
茯苓
廣皮
枳實
半夏
金石斛

朱九煩勞太過。陽傷痰飲。日聚陽躋脈空。人寐不放。寐衛陽失護。毛髮自墮。乃日就其衰。尊矣。初進通飲。濁以甦陽。接服外臺茯苓飲。

吳氏服弦背中冷。左偏寒瘡食少欲嘔。四肢牽強。此飲邪內結。議通陽氣。

桂枝

茯苓

半夏

薑汁

火棘

大棗

某

眩晕。悲心。胸悶不爽。脈右弦左弱。面色紅亮。此乃痰飲上泛有礙中之事。

脾陽
不運

炒半夏

製茱萸

橘紅

天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

光

口中味淡。是胃陽虛。失濡飲下降。痛漫向有飲濕為患。若不急進溫通理陽濁飲。必數復聚。議火半真湯法。

人參 半夏 茯苓

枳實

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

張七酒客穀少中虛。常進疎散表藥。外衝之陽亦傷。其痰飲發時。胸中痞塞自述。或飢遇冷。病來。其為陽氣受病何疑。不必見痰搜逐。但護中焦脾胃。使陽氣健運。不息陰濁痰涎。馬首驅擗之理。

生於朮 川桂枝

茯苓

淡葷渣

火棘

澤瀉

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

王三脈沈端瘡飲。是陽氣不足。濁陰欲散。當以理脾為先。俾中陽默運。即伸景外飲治脾之意。

苓桂朮甘加半夏陳皮水法丸

某嘔舌白。咳嗽不渴。非飲象而何。宜宣溫藥和之。

杏仁 茯苓

半夏 乾薑

粗桂枝

茯苓

厚朴

火棘

天麻

石菖蒲

某食後脘中痞塞。按之濁漉有聲。手麻腸痛。心煩耳目昏眩。是氣不流行。痰飲內聚。中焦用桂苓丸竹瀝薑汁法

丸

火桂枝

人參 茯苓

半夏

廣皮

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

黃味過甘膩。中氣緩不主運。延綿百天。聚氣結飲。東垣云。病久髮不焦。毛不落。不食不飢。乃痰飲為患。較屬陰類。故不渴飲。仲景五飲互異。其要言不煩。當以溫藥和之。通陽方法。固無容疑。惑大意。外飲宜治脾內飲。治腎是燒炬草繩矣。議用苓桂朮甘湯。

苓桂朮甘湯

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

火棘

天麻

某形體似平。壯實。陽氣外泄。畏風怯冷。脾陽消乏。不可健運。水穀悍氣變蒸凌飲。壅道日塵。上實下虛。仲景謂飲

邪當以溫藥和之。

苓桂朮甘得效。從外飲立方。

人參 淡附子

生於朮

枳實

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

增定本草 卷之二

病飲

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

火棘

天麻

石菖蒲

王三脈沈端瘡飲。心搏如墜。形盛氣衰。漸有痰飲內聚。當溫通補陽方。復辟斯飲潤自解。

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

火棘

天麻

石菖蒲

茯苓

人參

淡附子

乾薑

茯苓

生於木

生白芍

馮陽虛則形寒。汗出痰飲惡聚。都是陰濁成形。飛陽氣衰微。致上干竊路。古人法則必通其陽。以掃陰氣。但宿病無急攻方。况平素憂鬱氣滯。血澑久耗之體。不敢純剛。防劫液耳。

人參

熟附子

淡乾薑

炒川椒

川桂枝

烏梅肉

生白芍

另真武丸三兩

程心左脈沈靜。右脈微弦。四旬清陽日薄。脾臟益漸羸弱。加以煩心繁思。水穀得氣。蘊蒸痰飲。仲景謂外飲當治脾陽。此語况中年常有遺泄之患。按脈非龍相之動。搏議固下益腎。轉旋運脾。一方分早晚服。早服從還少服精七寶參用丸方。熟地、茯苓、枸杞、五味、萸肉、茯神、山藥、菟絲、瘦益、魚膠、菖蒲、遠志。

龍骨

青鹽

熟蜜

同棗肉

搗丸

早晚服五七錢。

茅朮

於朮

半夏

茯苓

廣皮

生益智

白蒺藜

鉤藤

蓬萊湯

丸

晚服三錢

開水下。

徐某

清陽未復。

濁陰欲退。

久延心結痰飲。

議用真武丸二錢

五分人參一錢。

煎湯送胃。

陽得裏。

清當退遲矣。

十服。

某脈沈弦。

飲泛嘔咳乃下虛無以制。

上議早服腎氣丸攝納下焦散失以治水泛之飲。

此古法也

午服外臺茯苓飲。

轉旋中焦使食不致釀積後苓飲去水。

某一高年久嗽。

脈象弦大。

寤不成寐乃陽氣微濁。

濁飲上泛。

仲景云追溫藥和之。

杏仁

錢三

茯苓

銀鋟

川桂枝

錢一

生薑

錢三

苡仁

錢三

艾草

分四

大棗

二枚

顧二咳嗽數月。

嘔出涎沫。

建中不應已。

非營衛損傷。

視其面色鮮明。

飲食仍進。

做飲邪主治。

小半夏湯

加桂枝

杏仁

薑汁

辛心勞傷陽氣。

內起痰飲。

卧着氣鈍。

且體常汗泄。

非風寒表邪不解。

並不熱渴。

亦非火炎燒金。

仲景云飲家而效。

當治飲不當治飲。

茯苓

桂枝木

苡仁

炙草

薑汁

陳脈濡小舌白不渴。

身動嘔逆。

身如在舟車中。

此寒熱攻冒。

致傷逆。

氣痰飲互結。

通補陽明為正。

白朮甘草守中。

未能去濕宜緩。

人參汁

半夏

枳實汁

茯苓

竹液

薑汁

馬蛔肉豐溢脈來沈緩。

始發右半腸痛。

湯飲下咽汨汨有聲。

吐痰涎頭痛。

此時脾胃陽微寒。

濕滯聚年方壯盛不

必介懷溫中。佐其條達運動為宜。

茅术

厚朴

半夏

茯苓

陳皮

淡薑湯

葫蘆巴

炙草

薑汁旋丸

馬四甘緩頤安。辛泄不受。此陽分氣衰。將來飲邪日聚。然臥著數多。清氣失旋。先用苓桂木甘湯。繼進外臺茯苓飲。曹七中年陽氣日薄。痰飲皆屬陰濁上逆。清道為衝逆咳嗽。仲景治法外飲治脾。內飲治腎。分晰甚明。昔年嘗用桂苓澤液。得效是治。支飲治法數年真氣更衰。古人謂飲邪當以溫藥和之。須急治嗽肺藥。

先用小青龍湯去麻辛。接服外臺茯苓飲。

程五昔肥今瘦為飲。仲景云。脈沈而弦。是為飲家。男子向老。下元先虛。氣不收攝。則痰飲上泛。飲與風湧。斯為咳矣。今醫見嗽。輒以清肺降氣消痰。久而不效。更與滋陰不明。痰飲皆屬濁陰之化。滋則堆砌。助濁帶氣。試述者。枕喫一端。知身體臥着。上氣不平。必下衝上逆。其痰飲伏於至陰之界。腎臟絡病無疑。杜形寒畏風。陽氣微弱。而藩籬疏遠。仲景有要言。不煩曰飲邪必用溫藥和之。更分外飲治脾。內飲治腎。不讀聖經。焉知此理。桂苓甘味湯熟附都氣加胡桃。

陳一痛久氣亂。陽微水穀不運。蘊釀聚濕胃中。之陽日薄。痰飲水濕必傾囊上瀉。而新進水穀之氣與宿邪再聚復出。致永無痊期。仲景云。飲邪當以溫藥和之。又云不渴者。此為飲邪未去故也。則知理陽通陽誠有合於聖訓。斷然矣。真武湯。

張一痰飲喘咳。肌肉麻痺。唇脣不堪納。冬寒日甚。春暖日減。全足陽氣日衰。陰濁遂干犯上。肺藥治嗽。無非辛泄。滋潤益辛散。則耗陽。滋清助陰濁。濁阻在陽分。氣不肅為夜不得卧。小青龍意主乎由上以泄水。寒直從太陽之裏。以通膀胱。表中裏藥也。仲景謂飲邪。當以溫藥和之。驅陰邪以復陽。一定成法。

早晉氣去莫操白芍。

妙查炭水法九。

晚外臺茯苓飲。薑羹湯法九。

程六腎虛不納氣。五液變痰上泛。冬藏失職。此病為甚。不可以肺咳消痰。當用八味丸。收納陰中之陽。暫時撤飲用

仲景桂苓味甘湯。

孫未交冬至。一陽來復。老人下虛。不主固納。飲從下泛。氣阻升降而為喘嗽。發散寒涼。苦瀉諸藥。馬得中病。仲景

未交冬至。一陽來復。老人下虛。不主固納。飲從下泛。氣阻升降而為喘嗽。發散寒涼。苦瀉諸藥。馬得中病。仲景

云然家而咳當治飲不當治咳。後賢每以老人喘嗽從脾腎溫養定論是恪遵聖訓也。

桂枝 茯苓

五味子

甘草湯代水加旋蘆菔

李 腸紅久病不必攻治。今者氣衝喘嗽。脫腸疼痛。是飲濁上僭。最宜悉究。

川桂枝散

茯苓錢 乾薑一錢

五味子半錢 合一錢

杏仁半錢

白芍錢

炙草分生左牡蠣錢

生左牡蠣錢

虛陽
胃陽

吳二壯年下元久虛。收納氣泄。母交秋冬。受冷。冷氣深入。伏飲夾氣上衝。為咳喘嘔。吐沫肺降氣不發者。病在腎絡中也。蓋精血少壯不旺。難以搜逐。病根不去。謂此絕愁一年。小暑艾灸靜養一百二十天可愈。附都氣加車前。

潘王秋深天氣收肅。背寒喘咳。飲濁上泛。緣體中陽氣少振。不耐風寒所致。最宜暖護背部。進通陽以治飲。

淡芩

桂枝

半夏

薑汁

苡仁

炙草

又

早腎氣丸

夜真武丸

陳

脈虛微春陽地升。濁陰上干喘。不得卧。治在少陰。

人參

淡熟附子

猪膽汁

用此以傷胃氣

丈

照前方加淡乾薑一錢半

丈

半夏

淡芩

薑汁

久

脈弱。暮夜濁陰衝逆。通陽得效。議真武法以撤其飲。

人參

真武湯本無參

淡附子

生白芍

茯苓

薑汁

半夏

又

真武泄濁。膀通恩食。龍寐昨宵已有渴欲飲水之狀。考金匱云渴者飲邪欲去也。當健補中陽以資納穀。

者所宜

人參

生於术

波附子

淡芩

澤瀉

丈

早服腎氣丸四五錢。晚用大半夏湯。

人參 半夏 淡芩 薑汁

丈

照前方加淡乾薑一錢半

丈

半夏

淡芩

薑汁

半夏

董

脈弦右濡。陽微惡寒。飲酒上千。咳吐涎沫。且食減。胃脹。寒症。踴陰。濁見症。豈止一端。喻嘉言謂濁陰上加於

天。非離照當空。氣森焉得退避。反以地董五味陰藥附和其陰。陰裡冲逆。肆虛飲邪。滔天莫制。議以仲景熟附配

生薑法

無此說

掃屋陰以驅飲邪。維陽氣以立基本。况尊年尤宜急護真陽為主。

人參

淡芩

熟附子

生薑汁

南星

載

十二月間。診得陽微濁飲上千為咳。不能臥。曾用小青龍湯。減去麻黃細辛。服後已得着枕而臥。想更醫接用。不明。治飲方法。交驚蟄陽氣發泄。病勢更熾。頃許脈來。濡弱無神。痰欲咳逆。未已諒非前法可效。宗仲景真武湯。

法以熟附配生薑。通陽逐飲立法。真武湯去白朮加人參。

計

不臥。嘔喘泛起白沫。都是腎病。議通太陽膀胱。

茯苓 川桂枝 滅乾薑 五味子 白芍 火草

火草

虛陽
虛氣
化不
通降

顧

飲邪泛溢。噏聲顫動。頭垂身動。喘甚。食則脘中痞滿。臥則喘咳不得息。肺主出氣。腎主納氣。二臟失司。出納失職。議用早進腎氣丸三錢。以納少陰。晚用小青龍法。滌飲以通太陽經脈。此皆聖人內飲治法。與亂投膩補有間矣。

小青龍去麻辛甘芍加茯苓杏仁大棗。

某 形盛面亮。脈沈弦。此屬痰飲內聚。暮夜屬陰。喘不得臥。仲景謂飲家而咳。當治其飲。不當治咳。今胸滿腹脹。小水不利。當開太陽以導飲逆。小青龍去麻辛合越脾。桂枝 半夏 乾薑 五味 杏仁 石膏 茯苓 白芍

某 服三拗湯。音出喘緩。可見苦寒沈降之謬。素多嘔逆。下血中焦必虛。而痰飲留伏。顧然議治其飲。

桂枝湯去甘草加杏仁茯苓苡仁糖炒石膏。

某 太陽經氣不開。小水不利。下肢浮腫漸上。着枕氣塞。欲坐。濁飲上千。竟有坐臥不安之象。醫者但以肺病刻治。於理未合。急用小青龍法。使膀胱之氣無阻。礙濁飲痰氣自無逆冲之患矣。

桂枝

杏仁

乾薑

五味

半夏

茯苓

章 伏飲陰濁上干。因春地氣主升而發。嘔吐不飢。自然脾胃受傷。六君子宣補方法。未嘗不然。今診得吸氣甚微。

小溲晨通。暮癃足跗浮腫。其腑中之氣開闔失司。最慮中滿。夫太陽司開。陽明司闔。濁陰瀦漫。通腑即是通陽。微仲景開太陽一法。牡蠣 濕潤 防已 茯苓 五味 乾薑

張七 嘴喘。坐不得卧。神迷如呆。氣降則清。水寒飲邪上冲。膻中用逐飲開濁法。

薑汁炒南星

桂枝

炙草

石菖蒲

桔梗

某四 咳緩痰少。脫中不爽。肌腠癢癉。皆濕邪未盡。痰飲蘊踞之象。當用六安法。

杏仁

白芥子

炒半夏

茯苓

波乾薑

橘紅

王 當年陽虛濁飲上泛。喘急。用真武湯丸而效。因平素嗜酒。少穀中虛。濕聚熱。蘊痰。目黃。頭暈。未可為實熱論。治議方用外臺茯苓飲。減甘草佐以微苦。清滌理其濕熱。以酒客忌甜故也。

虛陽
虛氣
化不
通降

中虛
濕熱

虛陽
虛氣
化不
通降

寒
濕

虛陽
虛氣
化不
通降

寒
濕

虛陽
虛氣
化不
通降

寒
濕

中魚
熱痰

痰飲

扶陽
氣火大降

汪人參二
苡仁四
桔實一
半夏二
廣皮二
金石斛八
雨煮汁為九

杏仁 枳實汗 橘紅 瓜萎皮 鬱金 半夏麯 桔梗 黑梔皮

陳姪痰飲挾燥喉中癢 杏仁 花粉 茶芩 象貝母 橘紅 半夏麯

某脈弦右滑而亮舌白口乾不喜飲頭重身冷然胸脇痺塞而痛得嗳氣稍舒酒客穀少中虛痰飲聚蓄當此夏季氣上升飲邪挾氣上阻清空遂令前症之來金匱云脈弦為飲色鮮明者為留飲口乾不欲飲水者此為飲邪未去故也况熱痰汗出豈是風寒春夏溫邪辛溫發散為大禁自云身體空飄年已六旬又四早散以泄其陽不亦左乎

半夏

薑汁 川連

吳萸

茶芩

枳實

竹瀝

嘔喘
伏飲
經絡
飲伏
胸次
清陽
大承氣
結飲

潘心遠客路途風寒外受熱氣內蒸痰飲日聚於臟之外脈絡之中凡遇風冷或驟烈日或勞碌形體心事不甯擾動絡中宿飲飲逆氣逆咳嗽氣塞喉底胸膈不思食物者枕嗆吐稠痰氣降自愈病名哮喘伏飲治之得宜除根不速到老年歲仍受其累耳

小青龍湯去細辛

童五背寒短氣背痛映心貫腸入腰食粥噫氣脘痞瀉出黃沫飲邪伏濕乃陽傷發此溫經通絡為要緩用

人參 川桂枝

生白朮

炒黑蜀漆

炮黑川烏

厚朴

茶芩

瓜萎皮

葉四脈右弦舌黃不渴當心似阻昔形壯今漸瘦咳久不已臥着則咳痰出稍安此清陽少旋支脈結飲議通上焦

之陽鮮雞白

薑汁

半夏

茶芩

川桂枝

瓜萎皮

場頭中冷痛食入不消經脈中常似掣痛此背陽微不主流行痰飲日多氣隧日結致四末時冷先以微通胸中

之陽乾薤白

桂枝

半夏

茶芩

川桂枝

薑汁

丈微通其陽已效痰飲阻氣用茶芩飲去膚皮加薑汁

程三支脈結飲寒月喘甚初因寒濕而標故食辛稍安

杏仁

半夏

厚朴

茶芩

薑汁法丸

主脉

趙支飲腸痛咳逆

小青龍去麻辛

醫飲

汪氏支脈結飲。阻氣喘脹入腸則痛厥。遂為眩。茯苓桂枝半夏杏仁鬱金糖炒石膏。

支脈結飲。發必喘急。病發即桂枝。茯苓。五味。炙草。

渴。懸飲流入胃中。令人酸痛湧噫。酸水當早。通其陽以驅飲。

桂枝木。半夏。茯苓。沙黑川椒。薑汁。

丈。照前方加冰附子。

又。桂枝木。半夏。茯苓。沙黑川椒。薑汁。

丈。照前方加冰附子。

又。初服旋覆花湯未應。另更醫。謂是營虛。用參歸熟地桂芍炙草。服後大痛。醫又轉方。用金鈴半夏桃仁延胡。茯苓。服之大吐大痛。復延余治。余再議方。謂肝絡久病。懸飲流入胃絡。致痛不已。議太陽陽明開闔方法。

人參。茯苓。炙草。桂枝。煨薑。

丈。前方服之痛止。議丸。雖止必發。

服苦藥痛嘔。可知胃虛。以參苓開陽明。用草桂開太陽。并辛香入絡。用薑來通營衛。生薑恐伐肝。故取薑以護元氣。而微開飲氣也。

又。前方服之痛止。議丸。雖止必發。

人參。半夏。川椒。茯苓。桂枝。煨薑。南棗。

丈。前方服之痛止。議丸。雖止必發。

某。夏季陽氣上升。痰多。嘯喘。甚至夜不得眠。穀味皆變。大便或溏或秘。診脈右大而弦。議以懸飲流入胃絡。用開闔散法。人參。茯苓。桂枝。炙草。煨薑。南棗。

又。早診脈兩手皆弦。右偏大。凡痰氣上湧。咳逆愈甚。日來小溲少。下焦微腫。議通太陽。以散飲承。

人參。茯苓。桂枝。炙草。五味。乾薑。

丈。脈弦略數。不渴不思飲。此飲濁未去。清陽不主運行。前方甘溫主乎開闔。能令胃喜。次法開太陽。以散飲邪。亦

主防通據。自述心下胃口。若物阻。呆滯。其濁。網陽微大。著其治。咳濁陰過為陰濁橫熾矣。議用大半夏湯法。大半夏湯加炒黑川椒。

內經止有積飲之說。本無瘦飲之名。而漢以前。謂之瘦飲。仲景始分瘦飲。因有瘦飲。懸飲。濁飲。支飲之義。而立法。而謂治者不知。何如。此老治。飲症。竟有不用以等。法。而謂治。至。於。葉。中。重。覆。竟。滅。此。老。治。竟。無。不如。每。篠。此。老。書。竟。無。不如。每。

此藏集之
人真不得
校集之法
者也惜哉

瘦酒痰食痰之法實有此等分別仲聖迥異總之痰飲之作必由元氣虧乏及陰盛陽衰而起以致津液凝滯不能輸布留於胸中水之清者悉變為濁水積陰則為痰若真元充足胃強脾健則飲食不失其度運行不停其機何痰飲之有故仲景云病痰飲者當以溫藥和之乃後人不知痰飲之義妄用滾痰丸茯苓丸消痰破氣或滋填膩補等法大傷脾胃雖助濁其於仲景痰飲之法豈不大相乖謬乎然痰與飲雖為同類而實有陽之別陽盛陰虛則水氣凝而為痰陰盛陽虛則水氣溢而為飲故王晉三先生取仲景之小半夏茯苓及外臺飲三湯從脾胃二經分痰飲立治法而先生又取仲景之法桂枝甘外臺茯苓飲腎氣丸真武湯分內飲外飲諸法而於痰飲之症無遺蘊矣愚歷考先生治痰飲之法則又有不止於此者然而病變有不同治法亦有異如脾腎陽虛膀胱氣化不通者取仲景之苓桂术甘湯從苓飲腎氣真武等法以理陽通陽及固下益腎轉旋運脾為主如外寒引動宿飲上逆及膀胱氣化不通飲逆肺氣不降者以小青龍合趙婢等法開太陽膀胱為主如飲邪伏於經絡及中虛濕熱成痰者則有川烏蜀漆之溫經通絡外臺茯苓飲去甘草少佐苦辛清滲理濕之法其飲邪上冲體中及惡飲流入胃中而為病者又有薑附南星菖蒲旋覆川椒等驅飲開濁導通陽氣等法絲絲入扣一以貫之病情治法胸有成竹矣非深於得道者其孰能之郁溫九

不過指其總名耳

心陽
營損

心陽

于五營損心陽陽墜入陰為淋濁由情志內傷即為陰虛致病見症亂治最為庸劣心藏神神耗如憤諸寡夫司非偏寒偏熱藥治必得開爽其有向安股藥以草木功能恐不能令其歡悅妙香散

陸六人參

桔梗

帶入

烏藥

木香

天冬三分磨汁

又夜服白金丸

又久營心脾氣結利寡佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

胡細悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅硬正在心下用辛苦泄降先從氣結治

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

達皮辰草

建皮辰草

季六老年情志不適鬱則少火發壯火知飢脘中不爽口舌糜爛心脾營損木火劫燬精華肌肉日消惟悅悅開爽

內起鬱熱可平但執清火苦寒非調情志內鬱熱矣

金石斛

連翹心炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

心脾

氣結

神志

不清

心下痞結

症急成熱

證急成熱

心脾

營損

內熱

心脾

內熱

肝鬱

又接服養心脾之營少佐苦降法

人參 川連 炒丹皮 生白芍 小麥 茶神

某脫痛已止味酸乃肝鬱也

當用平藥

金石斛 黑山梔 丹皮 半夏麯 橘紅 杞杞葉

某初起左邊麻木舌強筋弣腦後痛痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地 元參

石菖蒲 鬱金汁

某氣鬱不舒木不條達嘔則少寬

逍遙散去白朮加香附

某肝鬱成熟加味逍遙去白朮加鬱金

某鬱熟杏酸

溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈四脈虛濁

情懷失暢肝脾氣血多鬱半載不愈難任峻劑議以局方逍遙散兼補中益氣莫以中宮虛寒為泥

吳十四勞倦嘔逆致傷病在肝脾久有脛泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宣補

鈎藤

生香附 丹皮

桑葉 神曲

白芍

茯苓

廣皮

遠志

葉氏危鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火風變動氣橫為痛為脹疎泄失職便祕忽渴

情志之鬱難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必變格拒中滿與辛潤少佐和陽

柏子仁

錢歸賾二錢

桃仁

三錢

生白芍

一錢

小川連

三分

鈎藤

生香附

桂圓肉

當歸 炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃七情之鬱損以丹溪趙鞠方法

香附

川芎 小川連

半夏 橘紅

炒查肉

神曲漿丸

程姪脈弦濁外塞內熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不舒

此方無著 鐵金 鈎藤 丹皮 夏枯草

生香附 桂圓肉

當歸 炙草 黑山梔 丹皮 遠志

吳一持持過動肝膽陽升胃氣日減脈應左搏從鬱熱治

丹皮 黑山梔 鈎藤 廣皮 白芍

薄荷梗 丹皮 夏枯草

生香附 鐵金 白蒺藜

丹皮 鈎藤 廣皮

茯苓 神曲

白芍 茯苓 廣皮 茯苓

王六勞怒傷陽氣逆血鬱致痛脹便溏風木侮土。前方既效與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁柏仁當歸薑棗湯法

肝鬱
胃寒
逆血
升

朱二因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲。貫膈冲咽自覺冷者非真寒也。內經以五志過極皆火但非六氣外來苓連之屬不能制伏。固當柔緩以濡之。合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也。

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

杜鵑

小麥

人中白

熟膏

無熟膏之理

趙四鬱勃日久五志氣火上升冒氣逆則脫悶不飢肝陽上潛風火凌竅必旋暎咽痺自覺冷者非真寒也皆氣痺

不通之象病能篇以諸禁敲撻屬火丹溪謂上升之氣從肝膽相火非無遠矣。

生地

阿膠

玄參

丹皮

川斛

黑穧豆皮

甘草

膽脾
氣血
鬱

木火
上升
喉腫
瘡阻

朱氏

脈弦右大乳房刺痛經阻半年若遇勞怒腹痛逆氣上衝此邪鬱既久少火化為壯火氣銳不循脈胞遂痙治

以泄少陽補太陰氣血流利鬱熱可解

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

茯苓

甘草

吳心脈弦濶數頸項結瘦咽喉腫痛阻煙水穀難下此皆情志鬱勃肝膽相火內風上循清竅雖清熱直降雖制情

淒之陽是以頻藥勿致也

鮮桃杞葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱情懷悒鬱五志熱蒸痰氣阻氣脘中空隘不舒脹及背部上焦清陽欲結治肺以展氣化務宜怡悅開懷莫令

鬱瘴綿延

鮮桃杞葉

杏仁

瓜萎皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹懸

又脈左大弦數頭目如蒙背俞脹都是鬱勃熱氣上升氣有餘便是火治宜清上

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜萎皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃頭目已清而膈嗳氣頤嘔濁此肝膽厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而出是

其明微矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜萎皮

吳氏氣血鬱瘴久不化熱女科八脈失調漸有經阻瘕帶諸疾但先治其上勿滋膩氣機

黑山梔皮

炒黃川貝

桃杞葉

瓜萎皮

杏仁

鬱金

橘紅

徐氏火升頭痛來去無定期咽喉垂下心搏二便不爽帶下不已固奇經通補陽明及養肝熄風度轉未能却病病

上支

陰火

先清熱

醫熱

瘧

此症

犀角

羚羊角

野蠻金

炒達志

鮮石菖蒲

炒丹皮

黑山梔

荻神

鬱傷

胃熱

鬱損

腸熱

瘧藥

金匱參

金匱參門冬湯

金匱參

金匱參

金匱參

金匱參

王十瘦多咽痛

頻遺家難

鬱傷心中空洞

嗰逆不已

議與胃藥

王十瘦多咽痛

王十瘦多咽痛

王十瘦多咽痛

王十瘦多咽痛

王十瘦多咽痛

陸五病起憂慮上損

兩年調理

氣經反覆

今夏心胸右脇之間

常有不舒之象

此氣血內鬱

少辰支脈中必有痰飲

少辰支脈中必有痰飲

少辰支脈中必有痰飲

少辰支脈中必有痰飲

氣阻是宣通流暢脈絡

夏至宜進商兵

天竺黃

茯神

鬱金

橘紅

遠志

石菖蒲

丹參

琥珀

竹瀝法丸

趙六脈左濶右弦

始覺口鼻中氣觸

腹機今則右脅板痛

呼吸不利臥着不安

此屬有年鬱傷

治當宣通脈絡

金鈴子

延胡

桃仁

歸賀

王女陰虛齒酸

腸血未出閑

鬱熱為多

與養肝陰方

王女陰虛齒酸

張叔情志違

鬱動臟陰中熱

內蒸舌絳赤糜乾燥

心動悸若飮食不加餐

內傷情懷起病務以寬懷解釋

張叔情志違

張叔情志違

張叔情志違

張叔情志違

張叔情志違

陰鹹補苦瀉

是為醫藥

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

黃柏

許厥陰少陰

臟液乾涸陽升結

痙瘗於喉舌

心境失暢所發

藥無效者

病由情懷中來

草木涼藥僅能治六氣外

朱之偏耳熟地

朱之偏耳熟地

朱之偏耳熟地

龍久鬱氣血不行

升降皆鈍外涼內熱

骨節沈痛肌腫復脹

膚腠無汗

用藥務在宣通

五鬱六鬱大旨

五鬱六鬱大旨

五鬱六鬱大旨

五鬱六鬱大旨

五鬱六鬱大旨

香附汁

白葵葵

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神曲

神曲

金氣血久鬱成熱

膀胱瘻悶不通

常有風疹腹痛

瘀血已深

發時宜用通聖

一劑半時以通調氣熱之鬱

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

楊驚憤忿怒都主

肝陽上冒血沸氣滯瘀濁

宜宣通以就下因悽投止塞舊瘻不清新血入瘀絡中

匝月屢屢反覆究竟肝膽氣血鬱

仍宜條達宣揚漏腸在肛得體中稍健設法

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

水處花新絳青葱管炒桃仁柏子仁

肝腎

從清志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎丸三錢早上放鹽湯送四服

趙氏瘧癥寒熱盜汗。腕中微熱。經期不來。大便溏。嘔咳減食。春深至冬未痊。此乃鬱氣成勞難治之症。

香附

丹皮

白芍

川貝

茯苓

牡蠣

夏枯草

胡氏頭頂結核。夜寒熱盜汗。乃是憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻。便難調治。

炒當歸

炒白芍

炙草

廣皮

茯神

鈎藤

南棗

張氏據說喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知飢不能食。內珠忽陷。忽脹。兩脇忽若刀刺。經先期色變發紫。半年來

藥無效者。情濃不得解。釋草木無能為矣。

人參 當歸 生白芍 炙草 肉桂 炒杞子 茯苓 南棗

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣。有太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱。而況於人乎。故六氣著人。皆能鬱而致病。如優寒之邪鬱於衛。鬱於營。或在經。在腑。在臟。如暑濕之蘊結。在三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感。而成瘧症。總之邪不解散。即謂之鬱。此外感六氣而致者。也。前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾。怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱而成病矣。其症心脾肝膽為多。案中治法。有清泄上焦鬱火。或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃。泄膽補脾。宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用鹹補苦泄。種種治法。未能按症分晰詳論。今舉其大綱。皆因鬱則氣滯。氣滯久則必化熱。熱鬱則津液耗而不流。升降之機失度。初傷氣分。久延血分。延及鬱勞沈疴。故先生用藥大旨。每以苦辛涼潤宣通。不投燥熱。致滯呆補。此其治療之大法也。此外更有當發明者。鬱則氣滯。其滯或在形體。或在臟腑。必有不舒之現症。蓋氣本無形。鬱則氣聚。聚則似有形。而實無質。如胸膈似阻。心下虛痞。腸脹。腹脹。脘悶不食。氣疲攻衝。筋脈不舒。醫家不察。誤認有形之端。放膽用破氣攻削。直至愈治愈劇。轉方又屬呆補。此不死於病。而死於醫矣。不知情志之鬱。由於隱情曲意不伸。故氣之升降開闔。樞機不利。雖內經有泄折違。發奪五鬱之治。猶慮難復全功。故疏五過論。有始富後貧。故貴貌勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者。能移情易性。醫者擇思靈巧。不重在攻補。而在乎用苦泄熱。而不損胃。用平理氣。而不破氣。用滑石濡燥。而不滋膩。氣機用宣通而不僵。苗助長底。幾或有俾成。若必欲求十全之治。則惟道至有一言可以啟之。曰欲要長生。先學短死。此乃治鬱之金丹也。華山雲

肝火此亦各病有之。不得另立一門。如此則五臟之火當立五門矣。

藥力俱清
穩推重複

上風大

葛根次苦
桔梗乃治
火熱結通便潤燥平不得已
葛根次苦
桔梗乃治
火熱結通便潤燥平不得已

怒動氣火鬱火
急躁氣火鬱火

陽動心木火上蒙

秦氏年前肝風眩暎。主以涼血分和陽熄風。一年未發。今歲正月春寒非比。天暖開池。此番病發必因勞慾觸動。有志。至於嘔逆微冷。條熱交互。漸作耳鳴。咽痺食納久留院中。想少陽木火盛於寅。脈貫耳孔。逆之威必向陽。

明而後上憑諸就脈。右濶大。胃逆不降。食味不甘。而膜中逆亂。蒸蒸日熾。營血內耗。無以養心。斯寢不寐。心搖蕩漾。有難以鳴狀之象。今頭重脣痺。全是上焦為木火升騰。阻遏清揚。前方滋清。血藥居多。必不奏功。今議湯劑。

方以苦降其逆。幸通其源。然湯宜小其製度。以久病體虛。初春若此。冬藏未為堅固。可知其九制當以局方龍膏丸。大傷胃氣。暫服半月再議。

九制大傷胃氣暫服半月再議

黑棗皮錢

羚羊角錢

鮮菊葉錢

紫苑錢

鬱金分

大杏仁

去皮尖角

六粒

土瓜姜皮錢

鮮菖蒲根四分

忍冬

午服

川連

吳萸

大茴

沈女腹痛少減。嘔逆已止。上焦熱下焦冷。肝陽尚未和平。擬進高歸龍膏法。

蘆薈

請自嘗之
具苦

川連

吳萸

大茴

黃氏肝膽風火上鬱。頭面清空之筋掣不和。治以清散。

羚羊角

連翹

瓜萎皮

荷葉梗

薄荷梗

青荊葉

竹葉

黃氏

頭

脹

神迷

經脈

抽痛

脹

閉

不欲納食

一月

經期

四至

此

鬱

傷

氣血成病

龍

膏

丸

葉氏

厥

陽

擾

亂

神明

經色已

黑

肢冷

面青

便祕

龍

膏

丸

一錢

二分

十服

闕八誦讀吟咏。身雖靜坐。而心神常動。凡五志之動皆陽。陽胃無利。清靈遂蒙易旨。以外加之義。述病發之時。

頭中欲搘。院欲撫摩。二使必不自利。此腑氣之室。由乎肝膽厥拂逆起見矣。議從手經上食治。

唐女脈左濶右弦。氣大不降。胸臆隱痛。院不裏。最慮失血。

葛根

連翹

心參

石菖蒲根

鬱金

麥冬

瓜萎皮

山梔

鬱金

竹茹

半夏

麌

杏仁

川貝

山梔

丹皮

鬱金汁

鈎藤

爪莖皮

後芩

橘紅

葛根

此有

瓜莖皮

山梔

鬱金

竹茹

半夏

麌

杏仁

葛根

夏枯草

丹皮

桑葉

鈎藤

山梔

地骨皮

肝腎
陰陽
上升

朱五

頭痛煩。忽然而至五行之速莫如風火。然有虛實內外之因。非徒發散苦寒為事矣。如向有肝病目疾喪明。是陰氣久傷體質。今厥陰風木司天。春深發泄。陽氣暴張。即外感而論。正內經冬不藏精。春必病溫。育陰可使熱清。大急發散。蓋陰根久傷。表之再傷。陽劫陰液。仲景謂一逆尚引日再逆促命期矣。余前主阿膠雞子黃湯。佐地黃。熟水。守甘培土。亟和其厥陽衝運之威。鹹味入陰。甘緩其急。與內經肝病三法恰合。今已入夏三日。虛陽條上煩躁頭痛。當大滋腎母以甦肝子。補胃陰以杜木火乘侮。旬日不致反覆。經月可望全好。

此方作丸無害。若作煎劑則大為恨矣。

人參

熟地

天冬

麥冬

龜膠

阿膠

北味

茯神

陸

鼻塞

有血

左肩

胛痛

皆君相多動

營氣

氣偏

脈得

左虛右數

先以清肝通絡

丹皮

山梔

夏枯草

羚羊角

鶯沙

鉤藤

連翹

青葙葉

倪

多痛

陽升

陰液無以上注

舌潤赤絳

煩不成寐

當益腎水

以制心火

不寐

倪

鮮生地

元參

麥冬

菜豆皮

銀花

竹葉心

吳

少陽鬱火不寐

丹皮

半夏

鉤藤

桑葉

茯苓

橘紅

程氏

上晝氣逆

填脫子夜

寤不貞

寐乃陽氣不降

議月溫膽湯

溫膽去枳實加金斛

滾浸九二錢五分

顧四

鬚髮已蒼

而色光亮

操心煩勞

陽上升動

痰飲亦得上溢

雲陽氣下交入陰

陽躊躇滿令人得寐

今氣越外池

陽不入陰

勉飲酒醴

欲其神昏假寐

非調病之法程

凡中年已後

男子下元先損

早宜用八味丸

暇時用

陽路

腹虛

辛夏林采湯

某陽不交陰夜卧寐躁。小半夏湯。

趙氏嘔吐眩暉。肝胃兩經受病。陽氣不交於陰。陽躡六空。寤不肯寐。靈樞半夏秫米湯主之。

又接用人參溫膽湯。

脾營

膽液

升虛

肝膽

陽浮

陰虧

某四肢澀不能充長肌肉。夜不適脾胃。消家無以灌潤故耳。當用歸脾湯意溫之。

嫩黃芪

於术

茯神

遠志

棗仁

當歸

炙甘草

桂圓

新會皮

某

肝陽不降。夜無寐。追酸棗仁法。

棗仁

知母

炙草

茯神

小麥

川芎

炙草

桂圓

某

不寐六十日。溫膽諸藥不效。嘔痰不通。明係陽升不降。用金匱酸棗仁湯。

棗仁

知母

茯苓

川芎

炙草

桂圓

新會皮

陳

陰精走泄。復因洞瀉重。七津滯致陽暴升胃。遂食入欲嘔。神識不靜。無寐。議酸棗仁湯。

棗仁

知母

茯苓

川芎

炙草

乘仁

火草

知母

茯苓

小麥

川芎

炙草

乘仁

火草

知母

茯苓

小麥

川芎

炙草

某

三宿不成寐。食不甘味。延暉脈細數。渴陰液內耗。厥陽外越。化火化風。燔燎煽動。此屬陰損。厥不易治。姑與仲景

酸棗仁湯。

棗仁

知母

茯苓

桂圓

新會皮

田

臟液內耗。心腹熱灼。陽氣不交於陰。陽躡穴空。

知母

雲茯神

生甘草

川芎

桂圓

又

鹹苦酸收已效。下焦液枯。須填實肝腎。

龜鹿膠

熟地

茱萸

天冬

肉桂

桂圓

桂圓

求

陽和須介屬之鹹佐以酸收。甘緩底幾近理。

作九尤可前方

龜膠

熟地

黃柏

桂圓

桂圓

鹹

苦酸收已效。下焦液枯。須填實肝腎。

龜鹿膠

熟地

茱萸

天冬

肉桂

桂圓

新會皮

(鑄)亦不必另立一門此症中之一也

陽升

某

陽升

鑄雜

麥冬

三

生地

二

錢

柏子仁

錢

川斛

三

錢

茯神

三

黑楂豆皮

錢

黑楂豆皮

錢

黑楂豆皮

錢

黑楂豆皮

錢

黑楂豆皮

錢

心陽
熱虛
肝陰某
心中煩熱頭上汗泄汗止自安易餌

程氏血虛心餌咽嗆生地天冬

某氏經半月一至夜餌痛生地

阿膠天冬

女貞子生白芍

火草

茯神

麻仁

白芍丹參

白芍

茯神

白芍

丹參

白芍

茯神

白芍

茯神

白芍

茯神

白芍

茯神

白芍

茯神

白芍

茯神

體有虛實真偽其病總在於胃經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺又云脾與胃以膜相連耳又云脾主為胃行其津液者也由此觀之脾屬陰主半血胃屬陽主半氣胃易燥全賴脾陰以和之脾易燥必賴胃陽以運之故一陰一陽互相表裏合冲和之德而為後天生化之源也若脾陰一虛則胃家飲食遊溢之精氣全輸於脾不能稍留津液以自潤則胃過於燥而有火矣故欲得食以自資稍遲則餌雜愈甚得食則餌可暫止若失治則延便閉三消噎膈之症治當補脾陰養營血兼補胃陰甘涼濡潤或稍佐微酸此方脾陰之虛而致胃家之燥也更有一切熱病之後胃氣雖漸復津液尚未充亦有是症此但以飲食調之可以自愈此二種乃為虛餌症所謂實者年歲壯盛脾胃生發之氣與腎陽充旺食易消磨多食易飢而餌得食即止此非病也不必服藥以上皆是真餌症所云偽者因胃有痰火以致飲食輸化不清或現惡心吞酸微煩脣暉少寐似飢非飢雖飽食亦不能止此乃痰火為患治宜清胃稍佐降痰苦寒及滯膩之藥不宜多用又有胃陽衰微以致積飲內聚水氣泛濫似有凌心之狀淒淒戚戚似酸非酸似辣非辣飲食減少此屬脾胃陽虛治宜溫通微透飲門而治之此二種乃似餌之偽症若夫所云心餌者誤也心但有煩而無餌胃但有餌而無煩亦不可不辨明之今先生之法僅有四案倘好喜之士更能搜採補入則幸甚不必華岫雲

三消

消病力大症僅列此數家驗書之道漏耶

許四能食善飢渴飲日加癟瘦心境愁鬱內火自燃乃消症大病生地知母石膏麥冬生甘草生白芍王伍肌肉瘦減善飢渴飲此久之煩勞壯盛不覺體衰病發皆內因之症自心營肺衛之傷漸損及乎中下按脈偏於左搏營絡虛熱故苦寒莫制其熱甘補無濟其虛是中上消之病

心火
煖勞
肝陰

犀角三 鮮生地一 元參心鉢 鮮白沙參二 麥冬二 柿霜錢 生甘草分 鮮地骨皮三

肝胃犯

又

固本加甜沙參

楊人肝風厥陽上冲眩暈犯胃為消 石膏 知母 阿膠 細生地 生甘草 生白芍

某液涸消渴是臟陰為病。但胃口不醒。生氣曷振。陽明陽土非甘涼不復。肝病治胃是仲景法。

人參

麥冬

粳米

佩蘭葉

川斛

陳皮

陽動
燥津

腎清

胡五元陽變動為消。與河間甘露飲方。

河間甘露飲

麥冬

生白芍

錢十五陽動消燬甘緩和陽生津 生地 火黑甘草 知母 麥冬 杜仲仁 生白芍

楊六渴飲頻飢渴溺渾濁此屬腎消陰精內耗陽氣上燔舌碎絲赤乃陰不上承非客熱宜此乃臟液無存。蓋是平

常小恙 熟地 菟肉 山藥 茯神 牛膝

車前

生白芍

某脈左數能食 六味加二冬。龍膽女貞旱蓮川斛

麥冬

杜仲仁

生白芍

王四五形瘦脈搏渴飲善食乃三消症也。古人謂入水無物不長。入火無物不消。河間每以益腎水制心火除腸胃激

烈之燥濟身。津液之枯。是真治法。

王六煎

車前

生白芍

腎陰虛胃火旺心虛

姜五經營無有不勞心心陽過動而腎陰暗耗液枯陽愈燔灼。凡入火之物必消燬乾枯。是能食而肌肉消瘡。用景岳五女煎

王七煎

車前

生白芍

三消一症雖有上中下之分。其實不越陰虧陽亢津涸熱溼而已。考古治法惟仲景之腎氣丸。助真火蒸化論助真火蒸化

上升津液本事方之神效。敢取水中鹹寒之物。遂其性而治之。二者可謂其通天手眼。萬世準繩矣。他如易簡

之地黃引子。朱丹溪之消渴方。以及茯苓丸。黃芪湯。生津甘露飲。皆錯雜不一毫無成法可尋。各有至先生則

乾於法而不固於法。如病在中上者。膈膜之地而爲癥病之場。即用景岳之五女煎。六味之加二冬。龍膽女貞

津清熱潤燥養陰。甘緩和陽是也。至於壯水以制陽。則有六味之補三陰。而加車前牛膝導引肝腎。斟酌生

金匱之三消。謂非三消乎。卒之症渴多而小便多。而胃陽及水合認爲胃陰虛而欲使津消。亦味井津消渴矣。以養胃則答矣。

通斯誠善矣。

增醫學

增

消渴之症有數種案中俱未備宜詳考之

中虛
伏熱

脾庫

某無形氣傷熱邪。蠶結不飢不食。豈血分膩滯可投口甘一症。內經稱為脾庫。中焦困不轉運可知。
 川連 淡黃芩 人參 枳實 淡乾薑 生白芍

口甜是脾胃伏熱未清。宜用溫膽湯法。川連 山梔 人參 枳實 花粉 丹皮 橘紅 竹茹 生薑
 口甘一症。內經謂之脾庫。此甘非甘美之甘。庫即熱之謂也。人之飲食入胃。賴脾真以運之。陽以腐之。譬如造酒蒸釀者。然倘一不和。肥甘之疾頓發。五液清華失其本來之真味。則津津然之甜味上泛不已也。胸脘必痞。口舌心臍不飢不食之由。從此至矣。內經設一蘭草湯。其味辛足以散結。其氣清足以化濁。除陳解鬱。利水和營。為奇方之祖也。夾暑夾濕之候。每兼是患。以此為君。參以苦辛之勝。配合瀉心等法。又如胃虛穀少之人。亦有是症。又當宗大半夏湯。及六君子法。速甘益辛可也。邵新甫

脾庫在經言。因歎食甘肥所致。蓋甘性緩。肥性膩。使脾氣過壅。致有口甘內熱中滿之患。故云治之以蘭除陳氣也。陳氣者。即甘肥釀成陳腐之氣也。夫蘭草即為佩蘭。俗名為省頭草。婦人插於髻中。以辟髮中油穢之氣。其形似馬蘭而高大。其氣香。其味辛。其性涼。亦與馬蘭相類。用以醒脾氣。潔甘肥也。今二案中雖未曾用。然用人人參以助正氣。餘用苦辛。東以開氣泄熱。枳實以理氣滯。亦祖蘭草之意也。即所謂除陳氣也。此症久延。即化燥熱。轉為消渴。故前賢有膏梁無厭發。離疽燥熱所致。淡薄不堪。生腫脹寒濕而然之論。余於肥甘生內熱一症。悟出治胃寒之一法。若貧人淡薄。如素。不因外邪。亦非冷飲停滯其本質。有胃寒症者。人皆服良薑丁香畢撤。吳萸乾薑附子等。以溫之。不知辛熱剛燥能散氣。徒使胃中陽氣逼而外泄。故初用似效。繼用則無功。莫若漸以甘肥投之。或稍佐鹹溫。或佐酸溫。疑養胃陽。使胃脂胃氣日厚。此所謂藥補不如食補也。又有腎陽胃陽兼虛者。曾見久服鹿角膠而愈。即此意也。未識高明者以為然否。華岫雲

痘瘡

陰氣先傷。陽氣獨發。猶是伏暑內動。當與金匱癰瘍同例。竹葉 麥冬 生地 玄參 知母 梨汗 薯蓣

前人云何無頭草。況系省頭草。說未確。亦未知。建蘭治胃中淡薄煩。效亦未知。黑石侯再著。

施發熱身痛。咳喘暑濕外因內阻。氣分有似寒濕。皆肺病也。竹葉 連翹 薄荷 杏仁 滑石 銀金汁

又微寒多熱。舌心乾渴。飲曉不爽。有寒邪即非麻症矣。此屬燥瘍治在肺經。杏仁 石膏 竹葉 連翹 半夏 橘紅

程陰氣先傷。陽氣獨發。有暉熱無寒之處。

鮮生地 知母 麥冬 竹葉心 滑石

唐未病形容先瘦。既病暮熱朝涼。猶然行動安舒。未必真正重病傷寒也。但八九日病來。小愈驟食粉糰腥麪。當

宗食餳。發熱。損穀則愈。仲景未嘗立方。此腹痛洞瀉。食滯阻其腸胃。大腑不司變化。究其病根。論幼科體具純陽。

瘦損於病前。亦陽亢為消爛。仲景謂暉瘍者。單熱不寒。本條云。陰氣孤絕。陽氣獨發。熱均煩起。令人消爛肌肉。亦

不設方。但云以飲食消息主之嘉言。主以甘寒生津。可愈重後天胃氣耳。洞瀉既頻。津液更傷。一方也。然則內經所論皆不必有方。不是有一條即付

僵法。當傳藥與救。諒進甘酸。解其煩渴。方有斟酌。

又鼻燥脣裂。舌腐頻與冷連。熱不肖已。此病本暉藥重於攻擊。致流行之氣。結附不行。鬱遏不通。其熱愈甚。上則

不嗜飲。不納食。小溲頗利。便必管痛。三焦皆閉。神昏瘧癓有諸。

連翹心錢 川貝母錢 鮮石膏蒲汁半錢 杏仁 桂二十 射干二錢 淡竹葉錢

又自停狼藥。日有向愈之機。胃困則痞閉。不欲食。今雖未加餐。已知甘美。皆醒之漸也。童真無下虛之理。瘦溺欲

出。尿管心痛。良由肺津胃汁。因苦辛燥熱。烈氣味劫奪枯槁。腸中無以運行。庸醫觀此。必以分利。所謂泉源既竭。

當滋其化源。九竅不和。都屬胃病。

麥門冬錢

甜水梨皮三錢

甜杏仁四錢

蕉漿一水

張吉赤煩汗不寐。肢體忽冷。乃脾腎瘧瘧。著邪深入所致。杏仁 滑石 竹葉 西瓜翠衣 知母 花粉

又熱甚而厥。動搖瘧症皆然。竹葉石膏湯去人參半夏加知母。

丁風溫陽瘧。杏仁 波竹葉 連翹 黃芩 青蒿 滑石

宣化。不飢不食。頻溺短縮。乃熱在氣分。當與溫瘧同例。忌葛朮足六經藥。

桂枝白虎湯加半夏

胡按仲景云。脈如平人。但熱無寒。骨節頑疼微嘔而渴者。病名溫瘧。桂枝白虎湯主之。桂枝白虎湯

蓋今年夏秋久熱。口鼻吸暑。其初暑邪輕小。不致病發。秋深氣涼。外乘裏熱。欬嗽與營衛二氣交行。邪與二氣遇觸。斯為熱起。臨解必有微汗者。氣邪而泄。然邪不盡。則混處氣血中矣。故聖人立法。以石膏主寒。清氣分之。伏熱佐入桂枝。辛甘溫之。輕揚引導涼藥。以通營衛。兼知母專理陽明獨勝之熱。而辛太陰肺亦得秋金肅降之司。甘草粳米和胃陰以生津。此一舉兼備。方下自註云。一劑知。二劑已知者。謂病已知其對症。已者中病當愈之稱耳。

鄧

寒少熱多。胸中痞脹溫邪未解。謾言止截。淡黃芩

炒半夏

薑汁
不熱多

生白芍

草葉

知母

烏梅
不宜

丈

照前方去半夏。並汁加鹽甲。

滑石
病不印

杏仁

白蔻仁

淡黃芩

半夏

蠻金
此非柴胡不可

吳

間日寒熱。目黃口渴。溫邪兼兩濕。外薄為瘧。

滑石
病不印

杏仁

白蔻仁

淡黃芩

半夏

蠻金
此非柴胡不可

又

脈數舌紅。口渴熱邪已入血分。竹葉

石膏

生地

丹皮

知母

青蒿梗

又

飲食不節。腹中不和。瘧邪攻胃。

鮮首烏

烏梅肉
不得輕
用鐵法

生薑

生蘿甲

黃芩

丹皮

草葉

知母

送保和丸二錢

朱

舌黃煩渴。身痛心腹中熱躁。暑熱不解。為瘧經言。暑脈自虛。皆受從前瘧藥之累。猝

人參

生穀芽
枳實汁

茯苓

廣皮

炒半夏

炒半夏

炒半夏

炒半夏

石膏

知母

生甘草
炒梗米

炒梗米
麥冬

竹葉

何

勞倦傷氣。遺洟傷陰。暑邪變瘧。則煩冤。最盛分解。使邪勢輕。來尤淺附。皆固閉邪氣也。

草葉仁

知母

淡黃芩

川貝母

青蒿梗

花粉

馮

暑傷氣分。上焦先受河間法。至精至妙。後醫未讀其書。焉能治病。臻效邪深。則瘧來日遲氣結。必胸中混濛如

瘧無形之熱。漸蒸有形之癥。此消導發散。都是劫津無能去邪矣。

此非
瘧方

石膏

杏仁

半夏

厚朴

知母

竹葉

黃

脈數目皆黃。舌心乾白。黃胎。口中粘膩。胱中痞悶。不思納穀。由於逐次暑風客邪。內侵募原營衛不和。致發瘧

疾。夫暑必兼濕。濕也熱也。皆氣也。氣與邪搏。則清濁交混。升降有阻。古稱濕遏必熱。自生矣。聖帝論病本乎四氣。

其論藥方推氣味理。心苦降。草通斯熱氣痞結。可開。消導攻滯。昏燥泄氣。置暑熱致病之因。於不治不識何解。

飛邪而不以柴胡散少
陽出入之邪不知何解

川連

黃芩

花粉

桔梗

白蔻仁

鬱金

橘紅

六一散

又 苦降能驅熱除濕。享通龍關氣宣濁已經見效。當減其製。仍租其意。

川連 桔梗 白蔻仁 厚朴 茵陳

茯苓皮 銀花

白通草

胡 聞日瘧。疫多脫體。汗多心熱。伏暑內熾。忌與風寒表藥。

此等病非柴胡則寒熱之邪從何而出

滑石 黃芩 厚朴 杏仁 通草

白蔻

半夏

瓜萎皮 知母

又 黃芩 草茱 知母 半夏 生白芍

烏梅

白通草

知母

注民微冷。熱多舌白脫膚。嘔惡。暑穢過暮原為瘧。從出邪何 杏仁 鐮金 滑石 厚朴 黃芩 炒半夏 白蔻仁 橘紅

某 舌白脫膚寒起四末。渴喜熱飲。此濕邪內蘊。脾陽不主宣達。而成濕瘧。

厚朴錢 杏仁錢 草茱錢

半夏錢

茯苓錢

大腹皮

薑皮

廣皮

某

二瘧止而浮漸及脘腹。苡仁 桑白皮 茯苓

大腹皮 薑皮 廣皮

廣皮

某

間瘧寒熱俱微。此屬濕瘧。

杏仁錢 厚朴錢 桂枝木五錢

飛滑石錢 草茱分

炒半夏錢 茯苓皮錢

綿茵陳錢

某

牛四寒來喜飲熱湯。發熱後反不渴。間瘧已四十日。今雖止不飢不思食。五味入口皆變。

初病舌白乾嘔。濕邪中於太陰。脾絡滯鬱氣滞。喜熱飲。暫通其鬱邪。蒸濕中生熱。六腑熱灼。津不運行。至大便較秘。此為氣壅濕結。當薄味

緩調。令氣分清肅。與脾約似同。但仲景氣血兼治此病。却專傷氣分。

此方可以炒黃半夏

通大便

半夏

厚朴

生香附汁

廣皮

厚朴

茯苓皮

接服半碗九錢

○切

某

脈右弦左弱。留邪未盡。大便粘稀。最防轉痛。較七八日。前勢減一二。但去疾務盡。若半寒去其濕。伏而通利小

便。亦不可少。

草茱

知母

厚朴

茯苓

木通

滑石

曹 身痛舌白。口渴自利。此濕溫客氣為瘧。不可亂投柴葛。仲景有濕家忌汗之律。此真柴胡之症。

飛滑石

杏仁

鬱金

淡黃芩

白蔻仁

防已

濕甚為熱。心痛舌白。便溏治在氣分。

非瘧方。竹葉心。麥冬。鬱金。菖蒲。飛滑石。橘紅。化服牛黃丸。

人參。鹿茸。炒當歸。炙草。鹿角霜。官桂。龍甲煎丸。

又。心下觸手而痛。自利。舌白煩躁。都是濕熱阻氣。議開內閉。用瀉心湯。

川連

淡黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

又。神氣稍清。痛處漸下至膝。濕傷在氣。熱結在血。吐咯帶血。猶是上行為逆。熱病於留。必從下出為順。

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

費舌白渴。飲身痛嘔惡。大便不爽。診脈濡小。乃暑濕從口鼻入。濕甚生熱。四肢擾中。瘡發脫瘍。脹脾當以苦辛寒清上散邪。不可謂遺泄而病。斬與溫補助邪。黃芩。知母。白蔻。鬱金。裏皮。厚朴。杏仁。半夏。蓋汁。石膏。

又。脈濡口渴。餘熱尚熾。人參

知母

石膏

竹葉

甘草

麥冬

半夏

白芍

炒白芍

知母

橘紅

五味

半夏麯

曹瘡家癰瘍。忌用表散。

蒼朮。白虎湯加草藥。

人參

炒白芍

人參

枳實

又。瘡緩不欲食。津液受燥。當和胃生津。

人參

知母

石膏

竹葉

甘草

半夏

白芍

炒白芍

知母

橘紅

五味

半夏麯

張瘡家癰瘍。忌用表散。

蒼朮。白虎湯加草藥。

人參

炒白芍

人參

枳實

又。瘡緩不欲食。津液受燥。當和胃生津。

人參

知母

石膏

竹葉

甘草

半夏

白芍

炒白芍

知母

橘紅

五味

半夏麯

曹寒從背起汗泄甚而無津樣。舌色仍白。邪未盡。正先怯心虛。瘦震恐亡。陽厥脫。議用仲景較逆法。加參。

又。舌絳口渴。汗泄瘡來。

邪甚非瘧。胡不治。

日暮寒過。多身中陰氣。大陽剛補勿進。議以何人飲。

人參

欲殺之耶。

何首烏

防風

鹿角霜

董汁

南棗

又。陽虛之體。伏著成瘡。涼藥只宜少用。身麻屬氣虛。作薑瀉心法。

半夏

生薑汁。

伏暑大忌。

茯苓

炙甘草

南棗肉

南棗

沈陽微復瘡。

桂枝

當陽

黃芪

防風

鹿角霜

董汁

南棗

范三勞瘧入陰。夏月陽氣發泄。仍然勞苦經營。以致再來不愈。用藥以辛甘溫理陽為正。但未易驟效耳。

人參

當歸

肉桂

炙草

川蜀漆

生薑

南棗

方寒甚於背陽脈衰也。

此等方邪從。

人參

鹿茸

炒當歸

炙草

鹿角霜

官桂

龍甲煎丸

吳背寒舌白。粉脂如飢食無味。此為無陽。溫中下以托邪。

背寒風邪未淨也。非溫補可無。

人製方之

人製方之

當歸不附子。

草藥仁

茯苓

又

照方去茯苓。加入參炙草生薑。

程寒熱經月不止。屬氣弱留邪。以益氣升陽。

補中益氣湯。

何以肯用柴胡。

人參與柴胡同用則為留邪矣。若人製方之，道竊不附子。

柴胡是
病主深高
根不得立
言

宋都認為
有根木盡
從古無耗
用溫補之
理此平古
何極淺之
難未知也
若缺虛
之實世亦
有補其不
入於虛病
中也。外寒
為外散寒
則有補其
寒者無無
邪而陽虛
之則有溫補
法此老君謂
此理克然
也。金匱作
瘧本亦
瘧入虛
有作杜者
瘧方僅

又 生鹿草

鹿角霜

人參

歸身

茯苓

炙草

生薑

某氏建中法甚安。知營衛二氣交餽。夫太陽行身之背。瘧發背冷。大概不由四肢。是少陰之陽。欺人之語。不營太陽。此汗大泄不已矣。孰謂非柴葛傷陽之咎。故議用桂枝加熟附子湯。人參桂枝湯熟附子。

華氏二十歲天癸始通。面黃汗泄。內熱外冷。先天既薄。瘧傷不復。內經謂陽維為病。瘧與陽維何涉。苦寒熱剛雜。無以振頓。四肢骨節疼痛。通八脈以和補調。輕可以却病。

淡竹茹

鹿角霜

當歸

川芎

杜仲

小茴

茯苓

香附

生薑

火草

煨薑

大棗

火草

大棗

顧氏進護陽方法。諸症已減。寒熱未止。乃久病陽虛。脈絡未充。尚宜通補為法。

北分欲上
寒然耶

人參

生鹿草

當歸

紫石英

茯苓

火草

煨薑

大棗

火草

大棗

火草

大棗

火草

大棗

又 經邪不盡。寒熱未止。緣瘧久營衛。氣傷脈絡。中空乏。屢進補法。僅能填塞。脈絡中空。隙不能驅。誠虛伏之邪。擬進養營法。取其養正邪自却之意。人參。當歸。杞子。生白芍。茯神。桂心。火草。遠志。煨薑。南星。

袁姪

服弦緩。寒戰甚則嘔吐。噫氣腹鳴。溏瀉。是足太陰脾寒也。且苦辛寒屢用不效。

見虛俱不對病。反傷脾胃。

人參

半夏

草藥仁

生薑

新會皮

醋炒青皮

火草

大棗

火草

大棗

火草

又 靈樞經云。中氣不足。溲便為變。况老年人驚恐憂勞。深夜不能安寐。遂致寒戰。瘧發當以病。因而體貼。諦視其氣。宜乎四末先冷。瘧邪傷中為嘔。惡腹鳴矣。用露蓋飲。

又 陽陷入陰。必瞑目欲寐。寢則肉腠筋骨皆疼。其藩籬護衛太怯。杳不知飢。馬得思穀。老年人須血氣充溢。使邪

又 前議勞傷陽氣。當知內損邪陷之理。凡女人天癸既絕之後。其陰經空乏。豈但營衛造偏之寒熱而已。故溫脾

胃。及露蓋。治中宮營虛。但畏寒不知熱。為牝瘧。蓋牝為陰。身體重著。亦是陰氣。此辛甘理陽。鹿草首督脈以煦提

非比蓋附。但走氣分之剛柔。驅邪益虛。却在營分。奇經曰陽維脈為病。發寒熱也。

鹿草

人參

當歸

桂枝

火草

大棗

火草

大棗

火草

大棗

曾公文集卷之二

又 正氣和營。瘧戰已止。當小其製。

人參 鹿茸 當歸 炒杞子 沙苑 茶荳 炎草

某 瘰後脾腎陽虛。便溏畏寒。肢體疲倦。當防腫脹。

附子 白朮 茯苓 淫瀉 沈仁 生薑 大棗

某 陰瘧已亂汗多。桂枝 牡蠣 生黃芪

炎草 歸身 五味(有牡蠣) 威靈 大棗

某 脓沈舌白。呃逆時時煩躁。向係陽虛。痰飲瘧發三次即止。此邪窒不能宣越。並非邪去病解。今已變病陰。泛濶

濶阻塞於中。致上下氣機不相維續。症勢險篤。捨通陽一法無方可擬。必得中陽流運。瘧症復作庶有愈機。

淡附子

錢半

生草藥仁

錢半

生白芍

錢半

茯苓

錢三

生厚朴

錢半

薑汁

五分

一劑

此冷香真武合劑

某 伏暑胃涼發瘧。以羌防蘇葛。辛溫大汗。汗多衛陽。大傷胃津亦被劫。乾致渴飲心煩無寐。誇脈左弱右促。目微

黃。嗜酒心中虛穀少。易於聚濕。蘊熱勿謂陽傷驟補。倣內經。辛散太過。當食甘以緩之。

炒麥冬

生白芍

茯神

南星

又 藥不對症。先傷胃口。宗內經辛苦急急食甘以緩之。仲景謂之胃減。有不飢不欲食之患。議用金匱麥門冬湯。

醒胃汁以開疫飲。仍佐甘藥。取其不損陰陽耳。金匱麥門冬湯去茱萸加茯神橘核根鬚。

又 脈右大間。日寒熱。目眴微黃。身痛。此平素酒濕挾時邪。流行經絡使然。前因辛溫大汗。所以暫養胃口。今脈症

既定。仍從瘧門調治。

草藥

知母

人參

枳實

黃芩

半夏

薑汁

項 瘰已過月。形脈俱衰。平素陽虛。虛則邪難解散。腹脹是太陰見症。治從脾胃。

人參

草藥

知母

人參

茯苓

生於水

草藥仁

淡蓋

人參一錢。腹症宜宣。半夏二錢。生於水二錢。草藥一錢。知母一錢。人參一錢。草藥一錢。知母一錢。杏仁一錢。

陳 邪伏於裏。積久而發。道路已遠。未能日有。寒熱汗出不解。攻裏無謂。平昔肛垂齶痛。必有濕痰阻隨。舌白不喜

飲食在太陰陽明。

炒半夏

厚朴

草藥

知母

杏仁

某 遺泄損陰瘧熱。再傷陰聲嘶火升。乃水源不充。易怒。神躁水不涵木之象。用何人飲。佐清陰火。

方略
嘶火升此
制首烏

人參

天冬

麥冬

知母

淡芩

某氏瘧已半年。今但微熱無汗。身弱自乳。血去傷陰。此頭痛是陽氣浮越。心痛如飢。哺熱都是陰虧。成勞。若不斷乳經去不至。為乾血。則服藥亦無用。

生地鑑 阿膠 鐵 生白芍錢 火麻仁錢 粗桂枝木三分
參半 錢 天冬半 火麻仁錢 粗桂枝木三分

某瘡後心悸氣怯。便後有血。是熱入傷陰。用固本丸。加首烏阿膠。
人參 生地熟地天冬 麥冬 製首烏 阿膠

某陰液消亡。小溲短赤。皆瘡熱所傷。不飢不納。陰藥勿以過膩。甘涼養胃為穩。

人參 生地 天冬 麥冬 參半 川斛 蕃蕷 另服資生丸

鄭自來陰虛。有道泄瘡邪。更傷其陰。寐多盜汗。身動氣促。總是根本積弱。不主飲攝。此養陰一定成法。

熟地 生白芍 炒山藥 有肺者不用此味收瀉 茯神 茶實 湖蓮肉

張脈數虛。來日遞舌乾渴飲。積勞地鬱內傷。居多致邪氣乘虛。漸劫陰氣。熱邪墜於陰。熱來小溲頻數。故汗多不

解。議清陰分之熱。以救津液。活蘆甲 知母 草薢 鮮生地 炒桃仁 花粉

翁脈左弦。暮熱朝涼。汗解渴飲治在少陽。青蒿 桑葉 丹皮 花粉 蘆甲 知母

沈丸用力失血。無非陽乘攻絡。瘡再傷。真陰耗散。食減。自述夏暑汗泄頭顱脹。都是陰虛陽升清火。皆苦寒未

必能和身中之陽也。蘆甲 生白芍 天冬 首烏 火草 茯神

某瘡熱傷陰。小溲淋痛。生地 蘆甲 丹皮 知母 茗芩 淒湯

朱五瘡久後陰傷漏血。炒焦六味加蘆甲黃柏

吳四陰瘡後內熱。清骨散。

項陽氣最薄。暑入為瘡。先由肺病。桂枝白虎湯。氣分以通營衛為正治。今中焦痞阻。冷飲不通。熱邪宜清胃陽亦

須扶護。用半夏瀉心法。半夏 川連 薑汁 茗芩 人參 枳實

王汗出不解。心下有形。自按則痛。語言氣窒不爽。瘡來鼻溼。先寒邪結在上。當開肺脾。醫見瘡治瘡。焉得中病。

桂枝 杏仁 火草 茗芩 乾薑 五味子

又汗少喘緩。肺病宛然。獨心下痞結不通。猶自微痛。非關誤下結胸。陷胸等法。未妥。况舌白渴飲邪。在氣分。仲景

奔堅關痛。生牡蠣 黃芩 川桂枝 薑汁 花粉 炒黑蜀漆

肝結熱邪 痘癰

肝結熱邪

肝結熱邪

卷四

瘡

上卷文益書局印行

又 照前方去花粉加知母草葉

又 薑甲煎丸 一百八十粒

王 舌白不渴。寒戰後熱。神躁欲昏。而心胸飽悶。甚瘧係客邪。先由四肢以擾中宮。疫逆嘔逆。顯是肺胃體虛。邪聚閉塞不通。故神昏煩躁。喘急。汗泄。得以暫解。營衛之邪未清。寒熱漫延無已。此和補未必中寘。按經設法為宜。白蔻仁 太杏仁 焦半夏 蓼汁 黃芩 淡竹葉 又 寒熱瘧邪交會中宮。邪聚必脹悶。嘔逆邪散則安舒。當心胸之間。並無停食之地。夫不正之氣為邪。臟濁迷漫。原非形質可以攻消。苟非芳香。何以開其蒙閉之穢濁。欲少望見效。捨此捷徑。無成法可遵。道中知否耶。牛黃丸二服

藥九熟名香薷。吉達赤舌心黃。煩渴脈弱。是心經熱瘧。醫授發散消導津劫。涼潤瘧厥至矣。

犀角

竹葉

連翹

元參

麥冬

銀花

陳 前方復瘧。昏迷此背陽氣上冒。救逆湯去薑加芍。

又 鎮逆厥止。議養心脾營陰。乃病後治法。

人參

炙草

杞子

桂圓

炒白芍

棗仁

茯神

遠志

某三舌白渴飲。咳嗽寒從背起。此屬肺瘧。

范脈寸大。汗出口渴。伏邪因新涼而發。閉日瘧來。議治手太陰。

桂枝白虎湯加杏仁

波竹葉

大杏仁

滑石

花粉

淡黃芩

橘紅

青蒿梗

金氏肺瘧脫閉

黃芩

白蔻仁

杏仁

橘紅

青蒿梗

白芍

張姬暑風入肺成瘧。

淡黃芩

杏仁

滑石

橘紅

青蒿梗

連翹

陳六歲冷暖不調。夜熱多汗。咳嗽忌葷腥油膩。可免痘勞溫邪。如瘧當治手太陰。

竹葉心

麥冬

粳米

飛滑石

知母

炙草

柳暑濕都傷氣分。不渴多嘔。寒起四肢。熱聚心胸。乃太陰瘧也。仍宜苦辛。或佐宣解裏熱之藥。

川連

黃芩

炒半夏

枳實

白芍

薑汁

煩躁甚。另用牛黃丸一丸。

某寒起嘔。熱久不渴。多煩中焦之邪。仍以太陰脾法。

草葉

知母

生薑

烏梅

炒半夏

桂枝木

早服薑甲煎方

心經
瘧

脾瘧

萬

瘧久舌白。泄瀉太陰脾傷。肌肉微浮。宜補中劫邪。大忌消避發散。人參。草藥。白芍。茯苓。煨老薑。炙草。

王 脰濡不渴。嘔痰不飢。是太陰脾瘧。當辛溫以理中焦之陽。生於水。半夏。草藥。紫厚朴。茯苓。薑汁。

文 太陰脾瘧。必有寒濕凝阻其運動之陽。所防久虛變幻。浮腫腹脹。人參未能多用。權以生術代之。但與絡方少。遂佐以通藥則無礙。生於水。桂枝木。炒常山。茯苓。生鹿角。生薑汁。

某

二寒起四末渴喜熱飲。屬脾瘧狀先當溫散。杏仁。厚朴。草藥仁。知母。生薑。半夏。

金 既成間日寒熱瘧。嘔吐痰涎。其瘧邪大犯脾胃。故不飢不食。脈仍虛。舌白。治在太陰。不必攻表。

人參

半夏。草藥。橘紅。黃芩。知母。生薑。半夏。

沈

齡脈濡寒熱瘧。日連腹微滿。四肢不暖。是太陰脾瘧。用露葷飲以升陽。人參錢。生薑錢。露一宿溫暖服。

華

用勸藥瘧。止新沐瘧。來陽弱。失衛。外邪直侵入裏。試以瘧來不得汗。邪不從外解。大著。

川桂枝

炮黑川烏。生白朮。炒黑蜀漆。全蝎。厚朴。

生白朮

蜜水炒知母。火麻仁。生白芍。

王 五暑濕傷氣瘧。久傷陰食。穀煩熱愈加邪未盡也。病已一月。不飢不飽。大便秘阻。仍有潮熱。全是津液暗傷。胃口

不得甦醒。甘寒清熱。佐以酸味。胃氣愈振。清補可投。

麥冬

乾首烏。烏梅肉。知母。火麻仁。生白芍。

高

陰虛溫瘧。雖止而腰樁痛。先理陽明。胃陰俾得安寧。再商治歸。

北沙參

麥冬。桑葉。木瓜。蜜水炒知母。大麥仁。烏梅。

周

舌白脈小。暑邪成瘧。麻黃劫汗。傷陽遂變瘻症。今疫鹹有血。右脅痛引背部。不知飢飽。當先理胃津。

大沙參

麥冬。茯神。生扁豆。苡仁。

楊

高年瘧熱。刲胃汁。遂不飢不飽。不食不便。渴不嗜飲。味變酸濁。藥能變胃方難。

人參

川連。枳實。杜鵑。淡乾薑。生薑。

胃逆
不降

徐 脈數左寸。大關弦。瘧後食大葷太早。胃氣受傷。不得下降。致痞悶惡心癢。多神躁。大便不利。俱是腑氣不宣之象。擬進溫膽湯法。以和胃氣。炒焦竹茹。炒焦半夏。草藥仁。生枳實。杏仁。橘紅。金斛。花粉。

厥陰
瘧

虛

人參。草藥。白芍。茯苓。煨老薑。炙草。紫厚朴。橘紅。金斛。花粉。

增補本草

卷一百一十五

瘧

瘧

瘧

上海文益書局石印

黃瘡後不飲咽即吐此既隔痰與氣阻略不降則不受納微溫膳湯意佐以苦味降逆。

鮮竹茹 枳實 炒半夏 茯苓 橘紅 川連 苦杏仁 鐘金汁

蔚 胃不飢口渴甜水瘡邪未清肝胃不利 川連 乾薑 枳實 厚姜仁 半夏 廣皮白 薑汁

艾 口渴甜水脾癆 川連 茯苓 厚朴 半夏 生乾薑 廣皮 煎送脾約丸

又 橘半枳术丸

金 寒自背起衝氣由脾下而升清涎上湧嘔逆飢不能食此瘡邪深藏厥陰邪動必犯陽明舌白形寒寒勝都

主胃陽之虛然徒補鈍守無益

此非徒而何

人參 半夏 廣皮白 薑汁 川椒

烏梅 附子 生乾薑

方 先厥而瘡竄蟲下出嘔逆腹鳴脫瘡空寒此厥陰瘡痰勿得亂治

川連 淡乾薑 薑汁 川桂枝

生白芍

烏梅肉

黃芩

秋露水煎

又 陽微寒勝痰久不已理胃陽以壯中宮使四末之邪不令徒犯脾胃

川連 淡乾薑 薑汁 川桂枝

生薑

烏梅

草葉

炒常山

秋露水煎

又 辛酸兩和肝胃已效

人參

草葉

生薑

生白芍

烏梅

炙臘甲

英 體豐色白陽氣本虛夏秋伏暑挾痰飲為瘡寒熱夜作邪已入陰冷汗頻出陽氣益傷今診得脈小無力舌白

虛象已著恐延厥脫之患議進救逆湯法

人參

龍骨

牡蠣

炙草

桂枝木

炒蜀漆

煨薑

南星

又 關產陽氣偏泄今年久熱傷元初瘡發散不能去病便是再劫

胃陽致邪入厥陰晝冒大汗思肝腎同屬下焦

厥陽挾內風冒厥吐涎沫膠痰陽明胃中久寒熱痰擾空虛若谷風自內生

生關醫藥不分經辨症但以稱虛道竅

宜乎鮮有確效但用仲景少安胃泄肝一法

人參 川椒 烏梅 附子 乾薑 桂枝 川連 生牡蠣

又 諸症略減寒熱止尚宜貴陽明泄厥陰為法

人參 炒半夏 淡乾薑 桂枝木 茯苓 生牡蠣

又 天暑冷陽傷泄濁脈得左手似數而堅口微渴舌仍白陰液既虧飲水自救非熟識也議通塞而用其其寒熱

再緩 人參 波附子 桂枝木 茯苓 生牡蠣

蔡 惕進穀食舌乾齶脹不飢不知味宿多寐少皆由瘡汗嘔逆都令諸陽爻升胃氣不降則不食陽不下潛則無

寐肝風內震。則火升心熱法當和胃陽平肝氣。肝平胃醒。必穀進能寢矣。

金五強截瘧疾。裏邪痞結心下水飲。皆嘔吐無餘。病在胃口之上。老年陽衰。防其呃厥。舍瀉心之外無專方。

人參

枳實

乾薑

半夏

川連

黃芩

又

舌白氣衝心痛。噯嘔味酸。嘔吐涎沫。皆胃虛肝乘。倣仲景胃中虛客。氣上逆可與旋覆花代赭石湯。

旋覆花

代赭石

人參

半夏

茯苓

薑汁

粳米

又諸恚向安。寢食頗差。平昔肝木易動。左脈較右脈弦長。味變酸木侮土。秋前宜慎。

馬瘞

代赭石

人參

半夏

茯苓

薑汁

粳米

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

朱女厥陰衝氣上攻眩暈。瘧。安胃丸三錢。板梅湯送。

陳氏瘧母是瘧邪入絡與血氣扭轉。必蹇然不動。今述遇冷勞怒衝氣至脘痛。必嘔逆。必三日氣降痛緩。而復水飲

得入。此厥逆之氣由肝入胃。衝脈不和。則經水不調。

延胡

川棟子

半夏

蓬朮

蒲黃

五靈脂

薑汁

韓信瘧不止。欲吐。

炒半夏

厚朴錢

青皮錢

炒焦知母錢

草朮仁

橘紅錢

臨服調入薑汁一錢。

吳晉寒瘞來漸晏。邪有入陰之意。此伏邪不肯解散。都因久積煩勞。未病先虛也。飲水少腹。如墜院中。痞結不舒。

中焦壅受邪。迫陽氣先已餒弱。議兩和太陰陽明法。

草朮

知母

半夏

厚朴

薑汁

烏梅

黃芩

花粉

又進兩和陰陽。寒熱已止。診脈右濡。明是氣衰。宜和胃生津。使餘邪不攻自散。

又脈左數舌絳苔渴。

炒參子

人參

首烏

白芍

丹皮

茯神

另更衣丸二錢。

陸六口渴清涎。不飢不食。寢食倦怠半年。不肯復元。論理必用參朮益氣。但貧苦貧能久用。然久延不醒。倘腹滿浮腫便難調治。

白朮膏加砂仁末

京三瘡。邪由四末以擾中宮。脾胃受傷無疑。但寒暑更遷。病邪既久。臟腑真氣自衰。兩年來納穀不運。漸覺食微。不耐風冷之侵。並無凝痰。聚氣見症。此心胸中宗氣自餒。致清陽不司轉運。當以仲景苓桂朮甘湯。

文六君子湯去甘草加檀香泥桂枝水

吳瘡已復瘻瀉濁淋痛。稱年脾胃食不消。色黃腹脹。有滯脾胃愈良。東垣云。中氣不足。非東垣語。溲便乃變。初秋交冬。遂加反覆。久則五疳廢。當慎於食物。令脾胃氣靈。可致宗脾胃論升降疏補法。

人參 茶芩 炙草 廣皮 使君子 神曲 查肉 麥芽 澤瀉

桔此勞傷陽氣。更感冷熱不正之邪。身熱無汗。肢冷腹熱。自利舌灰白微紅。顯然太陰受病。診脈小右濡不飢。入夜晝語。但如寐不加狂躁。論脾為柔臟體陰。用陽治法雖多。從未及病。當遵前輩冷香縮脾遺意。

無者各之方 人參 益智仁 茶芩 新會皮 生厚朴 沢仁 木瓜 砂仁

又 脈右弦來去不緩。左小弱弱。舌邊紅舌心白。黃微綿。鼻冷四肢冷熱時微渴不飢。不思食。前議太陰脾臟受病。瘡邪從四末乘中。必脾胃受病。鼻單四肢皆冷。是陽氣微弱。因病再傷。竟日不暖。但形肉消瘦。不敢剛刮攻邪。以宣通脾胃之陽。在陰伏邪。無發散清熱之理。

吳子瘡傷脾胃。腹中不和。脈右濇。食入脹甚。前方通調氣血。住以泄木。服之積滯既下。痛隨利減。仍宜制木安土。不可作陽虛溫補治。生於床 川連 檬目 麥芽 雞肫皮 廣皮 厚朴 炒山楂

陳六瘡邪由四末以擾中。皆陽明厥陰界域。陽明衰則厥陰來乘。津液少。斯內風必動。昔賢以麻屬氣虛。本是濕痰敗血。今或亥頻熱行走。淋汗顯然。液虛陽動風生。脂液不得灌潤。肢末非濕痰氣分之悉。

冬桑葉九蒸 熟首烏 黑芝麻 柏子仁 茶神 當歸 杜子 菊花炭 蜜丸

李 脈左弦。嘔吐發熱。後脫中。疼痛不爽。宜慎。口服清肅。上中二焦。不敢再延成瘡。追苦平法。

杏仁 薑金 山梔 豆豉 白蔻 枳殼

孫高年於瘡寒熱夜作。胸悶不欲食。煩渴熱頻。最慮其邪陷為厥。進陽旦法。

姬瘡膝沈濁。中脫瘡結。此屬裏症。用瀉心法。半夏 川連 橘紅 枳實 黃芩 生薑汁

火 脈沈右關大。瘡木止。寒熱子後。作煩渴。中悶不欲食。醋炒半夏 杏仁 黃芩 花粉 薑葉 生薑

陸瘡截虛氣痞結成身瘡。桂枝 炒焦半夏 薑汁 廣皮白

當歸 茶芩

桂枝 炒焦半夏 薑汁 廣皮白

當歸 薑汁

桂枝 炒焦半夏 薑汁 廣皮白

當歸 茶芩

桂枝 炒焦半夏 薑汁 廣皮白

當歸 茶芩

桂枝 炒焦半夏 薑汁 廣皮白

錢氏暑熱傷氣成癰腳痞結嘔吐痰沫皆熱氣之結。前醫瀉心法極是。

汪

此濕熱與水穀交蒸全在氣分。嘗稱三焦分消清解既成間日瘧。邪正互爭原無大害。初誤於混指傷寒。六經再譯於參水守補致邪瀰漫神昏喘急妄謬痘瘡皆邪無出路內閉則外脫求其協熱下利已不可得。診脈細濡按腹脚滿夫脾濕屬氣燥實在血今洞利後而加腹滿諸氣皆結豈非閉塞而然。清敗決製至此難望挽救。

細葉菖蒲根汁錢

草葉仁五

茯苓皮錢

紫摩朴錢

綿茵陳錢

辰砂益元散

連翹心梗金銀花錢

另用牛黃丸一服用涼開水緩緩以茶匙挑化服

潘氏伏邪發熱厥後成瘧間日一至。咳嗽痰多惡心中痞。其邪在肺胃之絡。擬進苦辛輕劑。

程氏脈右大寒熱微嘔脫痞不納四末瘧邪交於中宮當苦辛泄降酸苦泄熱邪勢再減二三必從清補可愈。

川連

炒半夏

薑汁

黃芩

知母

草葉

炒厚朴

烏梅肉

毛氏用玉女煎寒熱未已渴飲仍然嘔惡已減周身背痛

診脈兩手背數舌色灰白邊赤汗泄不解

擬用酸苦泄

在裏熱邪務以瘧止再調體質

黃芩

黃連

草葉

白芍

烏梅

知母

用秋露水煎藥

又寒邪由四末以擾中宮胃口必當其戕害

熱闊不飢胃傷邪留清熱利瘦固為要法

但有年氣弱兼之病經匝

月清邪之中必佐輔正議半夏瀉心法

人參半夏

黃連

黃芩

枳實

薑汁

天寒邪由四末以擾中宮

胃口必當其戕害

熱闊不飢胃傷邪留清熱利瘦固為要法

但有年氣弱兼之病經匝

月清邪之中必佐輔正議半夏瀉心法

人參半夏

黃連

黃芩

枳實

薑汁

方人參

草葉生薑

烏梅

秋露水煎

天

補中益氣湯加草葉知母薑桑

陳

絡虛則痛陽微則脹

左脇有癰

母邪留正傷此勞瘧

某

瘡未止熱陷下痢中痞不欲食

人參川連

黃芩

生白芍

廣皮

炒當歸

炒山楂

乾薑

枳實

銀花

又瘡後勞復

人參當歸

白芍

桑仁

茯神

廣皮

生薑

南棗

范三脈

小濤病起瘡後

食物不和仍誦讀煩勞

遂至左脇

連及少腹常有厥起

或攻胃脅或聚腹中

凝著脹脹

舌語

云脈不離乎肝膽亦猶咳不離乎肺也蓋肝得邪助

木勢張揚中土必然受侮本氣自怯運納之權自減清陽既

少發舒濁陰日踐漸為痞滿上年溫養半甘久進未見病去其治體之法諒不能却自述靜處病加煩動小安其

從未聞
發生於
中者

為氣血久阻為鬱。議用通絡法以病根由瘧邪留絡中耳。

高瘧發既多邪入於絡。屬血分汗下未能逐邪。仲景製鱉甲煎丸一法。搜剔絡內留伏之邪。五六日必效。

早午暮各服七粒。

某瘧邪經月不解。邪已入絡。絡聚血邪攻則血下。究竟寒熱煩渴。目黃舌膚。溺赤短少。全是裏邪未清。凡腥葷宜禁。疏食不助邪壅。閱醫藥案。葛攻表。消導通便與瘧無與。用仲景鱉甲煎丸。朝十粒。午十粒。黃昏十粒。開水送下。

費瘧邪。追傷津液。胃減不能。腸燥便紅。左脇微堅。有似瘧母結聚。當宣絡熱以肅餘邪。

某氏瘧邪內陷。變成陰瘧。久延成勞。務以月經通爽。不致邪劫乾血。

顧左脇有瘧母。乃氣血交結之故。治宜通絡。鱉甲 桃仁 金鈴子 牡蠣 丹皮 夏枯草

江遠客水土各別。胃受食物未和。更遭嗔怒。動肝木犯胃土。瘧傷腸中有形瘕熱。三年宿恙。氣血暗消。但久必入血。湯藥難取效。宜用緩法以疏通其絡。若不追拔。致陽結陰枯。釀成噎膈難治矣。

生鱉甲 桃仁 膜香 蘆薈 茚白根粉 歸鬱 郁李仁 冬葵子 故骨

吳吐瘧及反覆左脇瘧母。生鱉甲 生牡蠣 炒桃仁 當歸鬱 炒延胡 柴胡梢 桂枝木 炒查肉 青皮

某夏秋濕熱。瘧正虛邪留混。入血絡結成瘕癥。瘧母。夫濕氣熱氣本屬無形。醫治非法。血脈蘊邪。故寒熱間發。

仲景立法。務在緩攻急則變為中滿。慎之。兼服鱉甲煎丸。知母 草薢 半夏 黃芩 烏梅 生薑 秋露水煎

金十經年老瘧。左脇已結瘧母。邪一入絡。氣血交結成形。區區表裏解散之藥。馬得入絡通血脈。攻堅逐血。住以平

香。是終病大旨。生牡蠣 錦歸鬱 雜桃仁 桂枝分 炒蜀漆 錦公丁香桂

某心少陰三瘧已久。當升陽溫經。鹿茸 熟附子 人參 麝桂枝 當歸 炒黑蜀漆

呂四陰瘧一年。方止。羸瘦妨食。食入不運。不飲湯水。四肢無力。診脈微弱。不鼓。屢進六君益氣無效。當溫其裏。通陽

從火生土意。人參 熟附子 生益智 茯神 白芍 生薑

吳三四瘧愈後。反覆塞多。有汗勞則陽泄。致瘧。議護陽却邪。

川桂枝 熟附子 生於术 生薑 南棗肉

某陰瘧汗多。下焦冷。用升陽法。人參 鹿茸 桂枝木 當歸 火甘草 生薑 大棗

三日
虛陽
虛陽

陸四邪深留陰三日。始有瘧發。但熱來必神昏譯妄。是體中震動所致。議定未病而日。日進清心牛黃丸一服。試看

蔡氏三日瘧。一年有餘。勞則欲發。內熱素有結症。今長大。攻走不定。氣逆欲嘔。酸經閉四載。當厥陰陽明同治。

後期瘧至。何如。

半夏

川連

乾薑

吳萸

茯苓

桂枝

白芍

川椒

烏梅

蔡氏三瘧不飢不納。惡心渴喜熱飲。診脈沈細。脾陽困頓。不能逐邪外出。治以四獸飲。

沈氏三瘧腹脹不渴。嘔水。邪在脾胃之絡。溫疎裏邪。勿用表散。

草藥

桂枝

生薑

厚朴

炒蜀漆

厚朴

生薑

炒黑蜀漆

厚朴

茯苓

文氏溫脾通胃得效。生於朮。

淡附子

川桂枝

炒黑蜀漆

厚朴

炒蜀漆

厚朴

生薑

炒黑蜀漆

厚朴

茯苓

某氏三瘧經年。至今復受濕邪。及發日來。舌白。脘悶渴喜熱飲。當溫太陰。

胡氏三瘧脾發。用露華法。寒止熱盛。加入烏梅五分。取其酸味。以和陰。謂其瘧久。陰亦傷耳。

錢氏遇勞瘧發數年初。起即三陰。此傷損已在臟陰之絡。最難速愈。甘溫益氣。久追益氣湯。

某氏三瘧早截中陽。室塞。脘脹不適。督寒肢冷。草茱仁。杏仁。半夏。茯苓。桂枝。厚朴。廣皮。生薑。

某氏脈濱面黃舌白。脘中格拒。湯水皆嘔。三日瘧一至。據色診脈。乃足太陰陽微飲結。當以溫藥和之。

半夏

草茱

丁香柄

草蔻

厚朴

蜜汁

厚朴

蜜汁

厚朴

蜜汁

厚朴

蜜汁

李氏初病勞倦。肺熱。投束垣益氣湯。未嘗背諱。而得湯反劇。聞聲氣微。間日瘧來。渴思涼飲。此必暑邪內伏。致營衛

道流與邪觸者。為寒熱分爭矣。故甘溫益氣。升舉脾臟氣血。與暑熱異歧。胃中熱灼。陽上愈燥。上脫不納。腸結便

閉。其初在經。在氣。其久入絡。入血。由陽入陰。間日延為三瘧。奇脈端維。皆被邪傷。內經謂陽維為病。苦寒熱也。雖

為一員繩維。不謂瘧事。故由四末寒凜而起。但仍是脈絡為病。故參芪木附。不能固陽。以益其虛。歸桂地等無能

養。善以却邪矣。昔軒岐有刺瘧之旨。深慮邪與氣血混成。一折汗吐下。無能分其邪耳。後漢張仲景推廣聖經。

真謂瘧邪經月不解。勢必邪結血中。有瘕瘕瘡毒之患。療製方。鼈甲煎丸。中大意。取用虫蟻。有四意。謂飛者升。走者降。靈動迅速。追其沈泥氣血之邪。蓋散之不解邪。非在表。攻之不驅邪。非者。真補正却邪。正邪並樹。無益故

病乃大症。患者甚多。故內經言之。最詳總之。由風暑入於少陽。陽明在太陽。陽明在少陽。路故先立。聖所立。方單治此。病和天經經此。

卷之三

聖人另闢手眼以搜剔絡中混處之邪治經千百歷有明徵朕十二日干支一週尚未全功當以升其八脈之氣由至陰返於陽也無有不告安之理

某陰瘧兩月。或輕或重。左脇按之痠痛。邪伏厥陰。血絡恐結瘻。母議通絡以逐瘧。邪用仲景蠶甲煎丸。早服三十粒。當寒熱日勿用。

昌嘔三瘡皆邪入陰絡。故汗下為惡經年瘧竈瘕瘍母。仍聚寒腸邪攻血氣之結。攻逐瘀聚升降以通陰陽。乃仲景成法。但診脈細微食減神衰攻法再施恐擾中滿。前綴溫補。通陽頗安然守中之補姑緩為宜。

當歸 淡附子 淡乾薑 茯苓 肉桂 罂甲膠丸 人參

諸瘡由伏邪而成。非旦夕之因為患也。六淫之氣惟燥不能為害。而新涼收束實屬有闢考之聖訓。獨乎三陽十次五卯無其正名。首但解其六氣中所屬可也。風中丙步可也。告小半用專主少陽。瘧疾雖非專主少

辛頤陰却無其症。醫者但辨其六氣中所傷，何氣之氣中病？涉何經？若小兒劫寒主少陽，陽而往來寒熱，當能不竝能舉括也。夫溫瘡痘瘍發食瘡瘍，諸瘡皆有成方，卒不復贅。但此症春月及冬時閑，有惟夏秋暑濕為

患者居多暑必挟濕而傷氣分。第一要分別其上焦中焦之因暑濕二氣何者為重。若暑熱重者而究上焦肺胃。

臟清氣虛來時必熱重而寒微必唇舌必紅赤煩渴而喜涼飲飲多無倦渴之患其脈色自有陽勝之候當求

蓋之類主之必要陽勝於陰而後配和陽之劑。日後方無貽累倘症參兩兼則兩法兼之可也。大凡是症若邪

氣據而正不甚虛者寒熱相等而作止有時邪氣重而正氣怯者寒熱模糊來勢必混而不分又云邪沒則一

日一發升清則陽正一發升最湊則三日一發古稱為三陰大發山用周易三周之氣為本其名真神之氣也盛亦不離仲景治三陰之法無根而可知陽經輕淺之方治之無益也所云移早則邪達於陽移晏則邪陷於

陰陽勝敗復於此可參。若久而不已必有他症之虞。太陰之虛浮脉滿有通補之理。中法開腑之五苓湯少陰

諸瘡由伏邪而成。非旦夕之因為患也。六淫之氣。惟燥不能為害。而新涼收束。實屬有圖考之聖訓。獨手三陽之氣用溫熱。其意故焉。仲景之上。亦不知已。自歸於深。算之中矣。嗚呼。其自歸固不足。而當時。愛其全奉者誠何殊。居易暑必挾濕。而傷氣分。第一要分別其上焦中焦之因。暑濕二氣。何者為重。若暑熱重者。而究上焦肺臟清氣。瘡來時必熱重而寒微。未唇舌必絳赤。煩渴而喜涼飲。飲多無痞滿之患。其脈色自有陽勝之候。嘗宗桂枝白虎法。及天水散。加辛涼之品為治。若濕邪重者。當議中焦脾胃。胃陽氣。瘡來時雖則熱蒸蒸煩。舌必有粘膩之苔。渴喜暖湯。胸胱覺痞脹。噫惡其脈色。自有陽氣不舒之情狀。嘗示正氣散。及二陳湯。去甘草。加杏蔻。生姜。主方如飛。病必有一古聖。凡一病。必有一主方。如飛。病。小柴胡湯。生姜。主方也。同謂以。此方加減。或有別症。則不可愈者。亦可愈者。可用方。亦可蓋不用。然胡指。固有此理。

一則清陰為宜。然而瘧之名目不一而瘧之兼症甚多。若不這權通變而安能一一盡善。即如暑濕格拒三焦而嘔逆不納者。宗半夏瀉心法。穢濁蒙蔽體中。而清靈昧甚。用牛黃清心丸。心陽暴脫有龍蠍之救。逆冒虛嘔呃。有旋覆代赭之成方。如表散和解。通陽補氣滋陰化營。搜邪入絡。動藥劫截。辛酸雨利營氣並補。及陽瘧之後。養胃陰。陰瘧之後。理脾陽之法已全備矣。彙集諸家融通無拘。所謂用藥如用兵。先生不愧良工之名也。卽此老傳人。傳此令言。乃長入傳。余以是說。不主此。此老傳人。傳此令言。乃長入傳。余以是說。不主此。

新甫

皆依樣畫葫蘆之談。

周溫

泄瀉

因長夏濕熱。食物失調。所謂濕多成五泄也。先用胃苓湯分利陰陽。胃苓湯去甘草。

長夏濕勝為瀉。腹鳴潤少。腑陽不司分利。宜用導濕和中。胃苓湯。

又向年陰分傷及陽。位每有腹滿便溏。長夏入秋常有滯下。此中焦氣分積弱。水穀之氣易於聚濕。或口鼻觸入穢邪。遂令脾胃不和。是夏秋調攝最宜加意。擬夏秋應用方。備採天暖承蒸。南方最有中病。痞脹諸恙。未受病前心懷疑慮。即飲芳香正氣之屬。毋令邪入為第一義。藿香梗。白蔻仁。橘紅。桔梗。杏仁。

鬱金

降香 厚朴

夏至後熱勝濕。蒸氣傷神。倦用東垣益氣湯。若汗出口渴。乘生脈散。飲液。

藿香

厚朴 廣皮 茯苓塊

甘草 猪苓 淳瀉 木瓜 滑石

檀香汁

某

秋暑穢濁。氣從吸入。寒熱似瘧。上咳痰下洞泄。三焦壅延。小水短赤。議芳香辟穢分利滲濕。

追藥稍緩。所言穢濁非臘說矣。其陰莖囊腫。是濕熱甚而下墮。入腑與方。書莖欝症有間。識河間法。

厚朴 杏仁 滑石 寒水石 石膏 猪苓 淳瀉 絲瓜葉

絲瓜葉

中 厚朴 藿香 廣皮 茯苓 淳瀉 木瓜 炒扁豆 炒查肉 炒砂仁

蔡二氣短少續為虛。近日腹中不和。泄瀉暑傷先以清暑和脾。預防滯下。

厚朴 廣皮 炒查 茯苓 淳瀉 木瓜 炒扁豆 麦芽 炒查肉 砂仁 又香砂異功散

葉五平素操持積勞。五志之火易燃。上則鼻竇堵塞。下有肛痔漏紅。冬春溫邪。是陽氣發越。邪氣乘虛。內伏夫所仗

此老偏與聖人相傳。此老傳人。傳此令言。乃長入傳。余以是說。不主此。

蔡胡如此。蔡胡如此。此老偏與聖人相傳。此老傳人。傳此令言。乃長入傳。余以是說。不主此。

太陽症不許用。根陽明症不許用。葛根此品無知妄人。當有老名人等議論者。真天下之怪事也。談者作塊。煎一日其味不出。莫

漢然

之邪。非比暴感發散可解。况兼勞倦內傷之體。病經九十日來。足跗日踵。大便日行。五六次其形粘滯。其色黃赤。紫膩。小便不利。大隨大便而稍通。此腎關樞機已廢。二陽陽腑失司。所進水穀脾胃。不主運行。釀濕墮下。轉為瘀腐之形。正當土旺。入夏脾胃主氣。此濕熱內滯。由乎脾胃日傷。不得明理之醫。一誤再誤。必致變現腹滿矣。夫左脈之緩。滯是久病陰陽之損。是合理也。而右脈弦大。豈是有餘形質之滯。即仲景所云。弦為胃減。大則病進。亦由陽明脈絡漸弛。腫自下而上之義。守中治中。有妨食滯滿之弊。大旨中宜通下。宜分利必得。小瀉自利。脾氣開闊。始有轉機。若再綿延月餘。夏至陰生。便難力挽矣。四苓加椒目厚朴益智廣皮白。

又 服分消方法。五日瀉。減滯通足跗浮腫未消。要知脾胃久困。濕熱滯濁。無以運行。所進水穀。其氣蒸鬱為濕。濕多成五滯。欲使濕去。必利小便。然滲利太過。望六年歲之人。又當處及下焦久病。入夏正脾。胃司令時候。脾臟宣補。則健胃腑。宜疏自清。扶正氣。驅濕熱。乃消補兼施治法。

晚服資生丸。炒米湯送下。

附解

朱

口腹不慎。濕熱內起。泄瀉復至此。濕多成五滯。氣瀉則腹脹矣。

陳

脈緩。大腹痛。泄瀉小溲不利。此水穀內因之濕鬱。蒸腸胃致清濁不分。若不清理分消。延為積聚。粘膩滯下。議

張 用冬芍湯。淡黃芩。生白芍。廣皮。茯苓。澤瀉。厚朴。藿香。猪苓。

程 診脈肝部獨大。脾胃緩弱。平昔納穀甚少。而精神頗好。其先天充旺。不待言矣。目今水瀉。少腹滿。脹少腹為厥陰肝位。由陰陽不分。濁歸於下。致肝失疏泄。當以五苓散導水利濕。倣古急關支河之法。

黃 純久瀉。兼發瘡瘍。是濕勝熱鬱。苦寒必佐風藥合乎東垣。脾宜升。胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 廣皮 炒川連 美活 防風 升麻 柴胡 神曲 來芽

朱 三形瘦尖長。木火體質。首上年泄瀉。累用脾胃藥不效。此陰水素虧。酒食水穀之濕。下墜陰弱。不能包涵所致。宜

陳 寒濕已變熱鬱。六腑為室為瀉。生台朮 厚朴 廣皮 白茯苓 益智仁 木瓜 沢瀉 炒查肉

某三酒濕內聚瘦飲餘濕下注五泄常用一味茶水丸 炒半夏 煙芩 茵仁 刺蒺藜 新會皮

王氏頭脹喜冷飲咳嗽心中脹泄瀉不爽此為中暑故止瀉血藥更甚舌色白讓清上焦氣分

石膏 淡黃芩 炒半夏

橘紅

厚朴

杏仁

王二首春徂冬瀉白精至今腹痛小水不利想食物非宜脾胃水寒偏注大腸當分其勢以導太陽胃苓湯主之胡三癥劫哉不效必是陰臟受病血熱渴食入不化痛瀉二者相反思病延已久食物無忌病中勉強進食不能充長精神即為滯濁阻滯先以服瀉調理不必以瘧相混

郁八經營勞心內食違時飢飽勞傷脾胃受病脾失運化夜屬陰晦至天明洞瀉粘膩食物不喜脾胃惡食茶湯之味五苓通膀胱分泄濕氣已足前陰之寢用之小效東垣謂中氣不足瀉便乃變陽不運行濕多成五泄矣

人參

生白朮

茯苓

炙草

炮薑

肉桂

桂枝木

生薑

澤瀉

某人形寒便瀉舌白厚朴

廣皮

半夏

茯苓皮

桂枝木

生薑

澤瀉

程氏寒濕腹痛心泄瀉厚朴

蒼朮梗

益智仁

廣皮

炒朮朮

煨木香

茯苓

澤瀉

吳氏寒凝胃陽腹痛泄瀉草莖

厚朴

茱朮

廣皮

吳萸

炒查肉

程氏瀉後腹脹人參

生薑

炮薑

茯苓

厚朴

廣皮

桂枝木

生薑

陸姬氣滯為脹瀉鬱為瀉主以分消

炒厚朴

大腹皮

茯苓

澤瀉

炮薑

澤瀉

某氏雨濕涼氣乘於脾胃泄瀉之後腹脹減食宜健中運瀉

四苓散加厚朴廣皮

桂枝

生薑

澤瀉

茯苓

澤瀉

程女濕鬱脾陽腹滿肢冷泄瀉部姪濕傷泄瀉小便全少腹滿欲取舌白不飢病在足太陰脾宜溫中佐以分利

一兩 夜服針砂丸

開水送一錢五分六錢

又早服真武丸蓋送二錢五分

附子

枳實

茯苓

乾薑

生白芍

某氏脈沈緩肌肉豐盛是水土烹質陽氣少於運行水穀聚濕布及經絡下焦每有重著病痛食稍不運便易泄瀉

經水色淡水濕交滌總以太陰脾臟調理若不中藏恐防脹病

悅六陽傷濕眩便溏足腫

粗桂枝

生白朮

木防己

茯苓

澤瀉

又脈緊足腫便溏陽微濕

氣不疏暢怕成單脈

煎前方加茵陳

澤瀉

又晨泄肢腫

生白朮

桂枝木

淡附子

厚朴

廣皮

陸一當脾動氣子夜瘕泄晝干首止是陽衰寒濕互凝腑陽不運每瀉則脹減宜通不宜滯

製川烏

生茶末

茯苓

木香

厚朴

廣皮

朱消渴乾嘔口吐清涎舌光赤泄瀉熱病四十日不愈

熟邪入陰厥陽犯胃吞酸不思食久延為病傷感瘧

人參

譚子皮

澤瀉

陶子病由春木正旺中焦受剋先泄漿以腹痛小便不利食不思飲皆是六腑不和所致

大胃為陽土肝屬陰木腑宜通肝寧其涼治胃必主泄利制其勝也閑方不補不知臟腑陰陽故辨反之

川連

烏梅

黃芩

白芍

人參

譚子皮

澤瀉

池液黃芩炒小川連炒廣皮厚朴

生白芍炒烏梅肉

猪苓

澤瀉

楊因驚而瀉腹痛欲亟止當用酸苦忌進甜物

炒半夏人參枳實茯苓炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

唐胃中不和不寐肝風震動頭迷瀉泄高年經月未復

雨和厥陰陽明炒半夏人參枳實茯苓炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

潘入夜咽乾欲嘔食納腹痛即瀉此胃口大傷陰火內熾劫燼津液當以肝胃同治用酸甘化陰方

人參半夏白芍炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

王人參半夏白芍

炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

朱某病後陰傷作瀉

白芍炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

王霍亂後泄瀉已緩心平空洞肢節痿弱此陽明脈虛內風內燼蓋虛乘也

異功去參水加烏梅木瓜白芍

木瓜

澤瀉

朱某上吐下瀉之後中氣大虛身痛肢浮虛風內動以補中為法

異功散加木瓜並起

木瓜

澤瀉

王久病而為飧泄用甘以理胃酸以制肝

人參茯苓烏梅炙草

木瓜

澤瀉

王腹鳴長泄蘋眩脫形質似屬陽不足

診脈小弦非二神四神溫固之症蓋陽明胃土已虛厥陰肝風震動內

火

澤瀉

王起久病而為飧泄

用甘以理胃酸以制肝

人參

澤瀉

王某病後陰傷作瀉

白芍炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

王某病後陰傷作瀉

白芍炒烏梅肉

木瓜

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

某頭痛損目。黎明腸鳴泄瀉煩心。必日刺痛流淚。是木火生風致脾胃土位日成。姑議泄木安土法。

人參

半夏

茯苓

桑葉

丹皮

桑葉湯泛丸

青皮

藜蘆

木瓜

徐六自春季胸腹脹滿。以及腹中疼痛。從治肝小愈。腹鳴泄瀉不止。久風飧泄。都因木乘土位。東垣云。治脾胃必先治肝。倣此。人參。焦朮。炙草。木瓜。烏梅。炒菟絲餅。

程勞損經。年食入腹脹瀉。心中寒涼。膚膝熱蒸。此陽不內潛。脾胃久困。萬無治歟。清降之理。議用戊己湯。扶土制木法。

葉氏左脇氣脹在皮膜之裏。此絡脈中病也。泄肝破氣。久服脾胃受困。而為泄瀉得養。中小愈。然以藥治藥脈絡之。

病仍在半夏

桂枝

茯苓

遠志

歸鬚

橘紅

葛根湯泛丸

張姬腹鳴脹脹。清晨腹泄。先以熄肝風。安脾胃。風

又泄肝醒胃方。吳萸

生白芍

炒烏梅

人參

茯苓

木瓜

炒烏梅

炒菟絲子

某脈右弦。腹鳴響。痛瀉半年不癒。此少陽木火鬱傷脾土。久則浮腫脹滿。當疏泄泄瀉。非草溫燥熱可治。

黃芩

桑葉

丹皮

柴胡

人參

茯苓

木瓜

炒烏梅

炒菟絲子

趙晨泄難忍。臨晚精可冒。易飢善食。仍不易消磨。其故在乎脾胃陰陽不和也。讀東垣脾胃論。謂脾胃宜升則健。

胃而降則和。援引升降為法。

又腸風鳴震。泄利得緩。猶有微痛而下。都緣陽氣受傷。垢滯永不清楚。必以溫通之劑為法。

生茅根

火草分

生地附子

厚朴錢

廣皮錢

製大黃

分

金火能食不化。腹痛瀉。若風冷外乘。肌肉著冷。其病頃刻即至。上年用石膏安腎丸。初服相投。兩旬不效。知是病

在中焦。不必固下矣。自述行走數十里。未覺衰倦。痛處繞脅。議用治中法。足太陰陽明主治。

生於求

生益智

凌乾益

胡蘆巴

茯苓

木瓜

藜蘆

薑根

王五年久損。氣怯神奪。此溫養補益。皆護元以冀却病。原不藉辛桂附辛熟以劫陰液。今胃減咽乾。大便溏泄。

經

月夏三月脾胃主候宜從中治

人參

炒白芍

炙草

煨益智

炒木瓜

茯苓

廣皮

金冲年遺恙先天最薄夏秋瘧傷食少不運痞脹滯都是脾胃因病致虛當導味調和進治中法

人參

益智

廣皮

茯苓

木瓜

炒澤瀉

穀芽

煨蓮

李氏服沈形寒腰痺革腹鳴有形上下攻觸每晨必瀉經水百日一至倣仲景愈

茯苓

炮淡薑

生穀芽

肉桂

烏藥

生於木附汁

某仁陽微濁滯吐瀉心痛當早溫開氣胃陽甦醒乃安

炒半夏

厚朴

廣皮

益智仁

香附子

炮木香

一姑與和中為先

益智仁分

廣皮錢

薑灰分

生穀芽

桂枝木

桂枝木

楊小便不利大便溏泄補脾法中佐以淡瀉分其陰

人參

熟荳

象牙屑

澤瀉

汝仁

白芍

薛王水穀瀉邪內著脾氣不和腹脹不能便溏四肢瘦痺

厚朴

茯苓皮

大腹皮

防己

廣皮

澤瀉

又肢瘦腹脹便溏水防已

生白朮

木瓜

桂枝木

澤瀉

馬一飲酒少數中氣久虛下部冷腎陽脾陽兩憊知飢少納法當理陽酒客性不喜甘膩滋柔之藥

茯苓

桂枝

桂枝

桂枝

桂枝木

桂枝木

朱十四酒濕內因脾胃虛用黑地黃丸蒸餅水煮和丸

徐九晨泄病在腎小腹有瘕亦是陰邪若食葷腥厚味病即煩熱乃陽氣積表誠用四神丸

厚朴

桂枝

桂枝

桂枝木

桂枝木

朱一久瀉無有不傷腎者食減不化陽不用事八味腎氣乃從陰引陽宜乎少致議興升陽

鹿茸

人參

陽起石

肉桂

桂枝

桂枝木

又久瀉必從脾腎主治但痛利必有粘積小腹短縮不爽溫補不應該通腑氣

厚朴

桂枝

桂枝

桂枝木

桂枝木

僧五瘕泄一年食減腹鳴屬脾腎陽衰近腹中微痛兼理氣滯用陳無擇三神丸

澤瀉

川連

澤木香

桂枝

桂枝木

桂枝木

朱一久瀉無有不傷腎者食減不化陽不用事八味腎氣乃從陰引陽宜乎少致議興升陽

鹿茸

人參

陽起石

肉桂

桂枝

桂枝木

又久瀉必從脾腎主治但痛利必有粘積小腹短縮不爽溫補不應該通腑氣

厚朴

桂枝

桂枝

桂枝木

桂枝木

桂枝木

某背部牽掣。入腸晨瀉。苓桂朮甘去甘加鹿角莖棗。

龔五診脈兩關緩弱。尺動下垂。早農未食。心下懊濁。納穀仍不易化。蓋脾陽微。中焦聚滯。則少運腎陰衰。固攝失司。為瘕泄。是中宜旋則還。下宜封乃藏。是醫藥至理。議早進治中法。夕用四神丸。

高氏經來腹脹。肺脊瘦垂。自秋季泄瀉不已。脫痞妨食用。濟生丸不應。

鹿角霜

炒兔絲子 生杜仲

淡竹茹

茯苓

沙苑 焦歸身

炒黑小茴

炒黑小茴

陳氏產育十五胎。下元氣少。固攝晨泄。自古治腎陽。自下涵蒸。脾陽始得運變。王氏以食下不化為無陽。凡腥膩沈

著之物當忌。

早用四神丸。晚服理中去朮草。加益智仁瓜砂仁。

張姪泄瀉脾胃虛得食脈

人參 炒兔絲子

炮薑

炒兔絲子

煨益智

木瓜

炒黃乾薑

茯苓

某瀉五十日。腹鳴渴飲溲溺不利。畏寒形倦寐醒。汗出用溫中平木法。

人參 胡蘆巴

炒兔絲子 胡蘆巴

炒兔絲子 胡蘆巴

炒兔絲子 胡蘆巴

附子

附子

炒黑小茴 炒杞子 茶葉

某脾腎不攝五更瀉

巴戟 菓絲子

五味 烏餘糧石

烏餘糧石

烏餘糧石

烏餘糧石

烏餘糧石

烏餘糧石

某久瀉脈虛

人參 附子

炒兔絲子 附子

炒兔絲子 附子

炒兔絲子 附子

炒兔絲子 附子

炒兔絲子 附子

炒兔絲子 附子

張氏產後不復腹疼痕癥

炒兔絲餅 鹿角霜

生杜仲 淡補骨脂

炒兔絲餅 鹿角霜

生杜仲 淡補骨脂

炒兔絲餅 鹿角霜

炒兔絲餅 鹿角霜

炒兔絲餅 鹿角霜

顧氏問病原是勞損

自三陰及於奇經。第腹中氣升胃痛。暨有形動觸衝任脈之守。補則滯涼潤滑。濕陽久瀉寒

熱最為吃緊。先固攝下為治

人參 炒兔絲子

艾實 湖蓮

赤石脂 茶葉

赤石脂 茶葉

赤石脂 茶葉

某腎虛瘕泄

炒香兔絲子 生杜仲

炒魚補骨脂

茴香

雪茶

雪茶

雪茶

雪茶

又陽微子後腹鳴。前方瘕泄已止

人參 炒兔絲子

炒補骨脂

湖蓮肉

艾實

茯苓

茯苓

茯苓

脾腎瘕泄。腹脹肢腫久病大虛

議通補中下之陽

人參 川熟附

茯苓

澤瀉

炒黃乾薑

炒黃乾薑

炒黃乾薑

某腎虛瘕泄乃下焦不攝

純剛恐傷陰液。以腎恐燥也。

早服震靈丹二十九

晚間米飲湯調服

參苓白朮散二錢

二藥服十二日

食傷

王

災甘草

炒白芍

炒飴糖

茯神

南棗

過食泄瀉。胃傷氣陷。津不上涵。臥則舌乾微渴。且宜薄味。調攝和中之劑。量進二三可安。

人參

葛根

生穀芽

災甘草

廣皮

荷葉蒂

泄瀉注下症也。經云：濕多成五泄。曰飧。曰瀉。曰鶯。曰滑。曰濡。飧，食泄之完穀不化。濕兼風也。瀉，泄之腸垢汚積濕兼熱也。鶯，瀉之澄清弱白濕兼寒也。濡，泄之身重軟弱濕自勝也。滑，泄之久下不能禁固。濕勝氣脫也。是以胃風湯治有血之飧瀉。清六丸療腸垢之熱。瀉鶯瀉便清弱白，中有硬物。選用理中治中滑泄脈微氣脫，洞下不禁急投四柱六柱飲。惟濡泄有虛有實。或以胃苓或以木附。至於脾泄胃泄腎泄。大腸泄小腸泄。大瘕泄痰泄。鬱泄傷酒傷食泄。古方古法條載甚詳。其急則治標必使。因時隨症理固然也。及其緩其治本。惟知燥脾滻濕。義有未盡者乎。蓋脾同坤土，本至靜之體。而有乾健之用。生萬物而役於萬物。從水從火為寒為熱。歷觀協熱下利者十不得一二。從水之寒泄者十常八九。馬言當然者。主治在脾。推所以然者。必求之水火。因思人身水火猶權衡也。一勝則一負。火勝則水負。水勝則火負。五泄多濕。濕水同氣水之盛則火之衰也。於是推少陽為三陽之樞。相火寄焉。風火扇冒而熱腐。五穀少陰為三陰之樞。龍火寫焉。董蒸臟腑而轉輸糟粕。胃之納。脾之輸。皆火之運也。然非雷藏龍馭。何能無燥無濕。勢有胃明燥上之毒。如果土真水安。從此不汎不濫。定無消氣。在下之患矣。吾故曰：五泄之治。平水火者。清其源。崇隄土者。塞其流耳。今觀葉氏診記配合氣味妙在清新縱橫治術。不離規矩。依然下者升滑者固。寒者溫。熱者清。脈弦治風脈濡滲。濕總之長於脾疝立方。因而投劑。自能軌效。所謂讀古而不泥於古。採方而不執於方。化裁之妙。人所難能者。余友吳子翼丈。昔在葉氏門牆。曾言先生洞達人情。諳練時務。使之應世亦人傑也。以故小道居此盛名。又聞其應酬之暇。好讀兩漢出辭。自必高古。惜乎著作長卷。不能一見。令人歎息不忘耳。蔣氏五

治瀉之法。不過分清降潤利水通氣。案中之

方亦平妥重視者七八編書之人。豈欲何為。

凡泄瀉無不有湿。寒有風。散腹內不和。而生此病。案中一味盤補變滯。人參五味方。居其半無邪。而純虛者。或龍有數如正難虛而尚留邪者。則此症永無愈期矣。當時誤人亦不少也。當時此老名重。凡延診者。想必病重而久。故當中補濟之味甚多。而分清降潤者少也。