

重刊儒門事親序



是書也戴人張子和專為事親者著論議淵微調攝有法其術與東垣丹溪並傳名書之義蓋以醫家奧旨非儒不能明藥裏酒食非孝不能備也故曰為人

子者不可不知醫予多失情慈
親在堂論七望八滫髓既具未
嘗不防以藥物每慮當有所饋
委之時醫恐為盡道之累將欲
遍閱方書諸家著述繁雜竊為
皇皇者數載矣近得是書如

獲寶踞執是以証何憲臆說之
餘感惜其板久失傳本多亥豕
之訛因付儒醫閻忠較訂鏤梓
與世之事親者共云

嘉靖辛丑三月戊子復元道人

邵輔序

儒門事親論方目錄

卷之一

七方十劑繩墨訂一

指風痺痿厥近世差玄說二

立諸時氣解利禁忌三

瘧非脾寒及鬼神辯四

小兒瘡疱丹熛癰瘡舊蔽記五

婦人赤白帶下錯分寒熱解六

霍亂吐瀉死生如反掌說七

目疾頭風出血最急說八



過愛小兒反害小兒說九
服藥一差轉成他病誠十

卷之二

偶有所遇厥疾獲瘳記十一
攻裏發表寒熱殊塗箋十二
汗下吐三法該盡治病痊十三
凡在上者皆可吐式十四
凡在表者皆可汗式十五
凡在下者皆可下式十六
推原補法利害非輕說十七

口眼喎斜是經非竅說十八
疝本肝經宜通勿塞狀十九
五虛五實攻補懸絕法二十

卷之三

喉舌緩急砭藥不同解二十一
五積六聚治同辨斷二十二
凡十膈五噎浪分支派疏二十三
飲當去水溫補轉劇論二十四
嗽分六氣毋拘以寒迷二十五
九氣感疾更相為治衍二十六

三消之說當從火斷二十
蟲慝之生濕熱為主訣二十八
補論二十九
水解論三十

卷之四

風一
暑二
濕三
火四
燥五
寒六
解利傷寒七
中風八
痺九
痿十

厥十一
癩十二

瘡十三
泄痢十四

疔痢十五
臟毒下血十六

下痢膿血十七
水泄十八

痔漏腫痛十九
霍亂吐瀉二十

大便澁滯二十一
小便淋瀝二十二

酒食不消二十三
酒食所傷二十四

沉積水氣二十五
諸積不化二十六

骨蒸熱勞二十七
虛積二十八

上喘中滿二十九
一切延嗽三十

風痰三十三

以直亥五三十四

消渴三十五

雷頭風三十六

頭痛不止三十七

兩目暴赤三十八

目腫三十九

病目經年四十

風衝泣下四十一

風蛀牙疼四十二

口瘡四十三

喉閉四十四

癭四十五

背疽四十六

瘰癧四十七

便癰四十八

四十九

下疳五十

卷之五

瘡癰瘤腫五十一

瘡腫丹毒五十二

凍瘡五十三

金瘡五十四

誤吞銅鐵五十五

魚刺菱芒五十六

蛇虫所傷五十七

杖瘡五十八

禁蝎五十九

落馬墜井六十

腰膝疼痛六十三

頭風眩暈六十四

經血暴下六十五

赤白帶下六十六

月事不來六十七

婦人無子六十八

小產六十九

大產七十

產後心風七十一 乳汁不來七十二
 產後潮熱七十三 乳癰七十四
 妊娠大小便下利七十五
 妊娠病瘧七十六 雙身傷寒七十七
 身重瘡痘七十八 懷身入難七十九
 眉煉八十 牙疳八十一
 夜啼八十二 丹瘤八十三
 疳眼八十四 身瘦肌熱八十五
 大小便不利八十六
 久瀉不止八十七 通身浮腫八十八

發驚潮搐八十九 拗哭不止九十
 身熱吐下九十一 風熱涎嗽九十二
 水瀉不止九十三 瘡疥風癬九十四
 甜瘡九十五 白禿瘡九十六
 瘡疾不愈九十七 腫痛氣刺九十八
 赤瘤丹腫九十九 瘡疱癩疹一百

卷之六

十形三療目錄

風形

因驚風搐一

風搐反張二

癩泄三

因風鼻塞四

風痰五

癩六

手足風裂七

胃腕痛八

搐搦九

面腫風十

驚風十一

風濕十二

風水十三

小兒風水十四

腎風十五

勞風十六

中風十七

暑形

中暑十八

瘡瘡十九

火形

馬刀二十

項瘡二十一

伐指痛二十二

瘰癧二十三

咽喉腫痛二十四

舌痛二十五

腰膝痛二十六

狂二十七

痰厥二十八

滑泄乾嘔二十九

笑不止三十

膈食中滿三十一

目盲三十二

小兒悲哭不止三十三

小兒手足搐三十四

目赤三十五

熱形

沙石淋三十六

膏淋三十

二陽病三十八

小兒面部赤

頭熱痛四十一

勞嗽四十一

勞嗽咯血四十二

吐血四十二

嘔血四十四

因藥燥熱四十五

肺癰四十六

痿四十七

口瘡四十八

虛勞四十九

心痛五十

傷寒極熱五十一

夫笑五十二

赤目五十三

...

痘後嘔吐五十五

熱厥頭痛五十六

產前喘五十七

血崩五十八

婦人二陽病五十九

月閉寒熱六十

惡寒實熱六十一

遇寒手熱六十二

嘔逆不食六十三

痊癰六十四

牙痛六十五

淋六十六

口臭六十七

濕形

疝六十八

水疝六十九

留飲七十

黃疸七十一

黃病七十二

病發黃七十三

水腫七十四

涌水七十五

停飲腫滿七十六

濕痺七十七

屈膝有聲七十八

白帶七十九

溫嗽八十

瀉兒八十一

濕癬八十二

溫慝瘡八十三

泄瀉八十四

洞泄八十五

大便少而頻八十六

暑泄八十七

腹滿面腫八十八

卷之七

雜形

臂麻不便八十九

大便燥結九十

孕婦便結九十一

偏頭痛九十二

腰脊痛九十三

寒形

因寒腰強九十四

寒疝九十五

感風寒九十六

凍瘡九十七

寒痰九十八

瀉痢惡寒九十九

內傷形

因憂結塊一百

病怒不食一百一

不寐一百二

驚一百三

見寐不寤一百四

孕婦下血一百五

收產損胎一百六 懷恐脇痛一百七

背疽一百八 肺癰一百九

咽中刺塞一百十

誤吞物咽中一百十一

腸刺下血一百十二

水腫羣丸一百十三

伏驚一百十四

外傷形

厚作病治一百十五

跌打一百十六

落馬發狂一百十七

太陽脛腫一百十八

足閃腦痛一百十九

膝胸跛行一百二十

杖瘡入水一百二十一

卷之八

內積形

傷冷酒一百二十二

心下沉積一百二十三

茶癖一百二十四

腹脹水氣一百二十五

疝氣一百二十六

胸膈不利一百二十七

冷積一百二十八

積塊一百二十九

肥氣積一百三十

伏瘕一百三十一

停飲一百三十二

積氣一百三十三

沉積疑胎一百三十四

是胎非積一百三十五

外積形

瘤一百三十六

膠瘤一百三十七

癭一百三十八

痔一百三十九

卷之九

雜記九門

誤中涌法

嗽

疥

赤目

感風寒

誤中寒涼

經閉

下血

痢

臨變不惑

涌法 涌嗽

當禁不禁

病愈犯禁而死

不忌反忌

不忌口得愈

不可忌口

高技常孤

群言難正

謗吐 謗三法

謗峻藥

病人負德愈後吝財

同類始才

群口誣讟人

卷之十

撮要圖

四因氣致

五鬱風暑濕燥寒主病

六氣主治

五氣風暑濕燥寒主治

大寒初氣至終氣小雪為病

十二經是動為病

風暑濕火燥寒六淫為病并治

六門病治諸方

內經濕變五泄 金櫃十全之法
金櫃十全五泄後論已上之圖改於
篇法

卷之十一

治法雜論

風論 論火熱二門 濕熱門

風門 濕門 寒門

內傷 外傷治法 婦人風門

火類門 濕門 寒門

半產 小兒風門 二火類

卷之十二

三法六門

吐劑

三聖散 菴蒂散 獨聖散

稀涎散 蔚金散 茶調散

獨仙散 碧雲散 常山散

汗劑

通聖散 雙解散 浮萍散

麻黃湯 升麻湯 桂枝湯

下劑

導水丸

禹功散

通經散

神祐丸

琥珀丸

益腎散

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

玉井散
水煮桃紅丸

無憂散

泄水散

牛黃通膈丸

四生丸

內托散

藏用丸

神芎丸

進食丸

牛黃白朮丸

玉燭散

三和湯

丁香化癖散

抵當湯

十棗湯

除濕丹

利膈丸

三一承氣湯
握宣丸

風門

通聖散

防風天麻湯

防風湯

祛風丸

排風湯

小續命湯

消風散

川芎散

搜風丸

當歸川芎散

愈風餅子

疎風丸

通頂散

胃風湯

香芎湯

鐵彈丸

暑門瘧附

白虎湯

桂苓甘露散

化痰玉壺丸

益元散

玉露散

石膏散

辰砂丹

溫脾散

濕門嗽痢附

五苓散

葶藶木香散

白木木香散

大橘皮湯

神助散

桂苓白朮丸

桂苓白朮散

白朮調中湯

寧神散

寧肺散

人參白朮散

白朮湯

薏苡仁湯

六神黃湯

香連丸

火門

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心湯

八正散

調胃散

三黃丸

芍藥蘼皮丸

大金花丸

清涼飲子

黃連清心湯

犀角散

黃連木通丸

燥門

神功丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

寒門

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

大已寒丸

理中丸

平胃散

養脾丸

無治於內者

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡飲子

防風當歸飲子

白朮湯

無治於外者

桂苓湯

麻黃湯

升麻湯

五積散

青金散

獨治於內者

陷胸湯

大黃丸

備急丸

枳殼丸

蓮殼散

木香檳榔丸

道蘇丸

五香連翹散

四物湯

當歸散

又方

葛根散

定志丸

檳榔丸

小檳榔丸

遠麥散治氣積方

獨治於外者

青金散

敗毒散

水澄膏

魚膽丸

金絲膏

生肌散

赴筵散

麝香玉線子

人參化癭丹

通氣丸

又方

煮肝散

枯瘤散

小黃膏

刀箭藥

木香檳榔散

陽起石散

鉛白霜散

雄黃散

化斑湯

調治

無比山藥丸

當歸丸

香薷湯

石薷散

妙功丸

人參散

茴香丸

七宣丸

人參調中湯

烏金散

沉香降氣丹

杞木丸

卷之十三

劉河間先生三消論

猪肚丸

葛根丸

胡粉散

人參散

卷之十四

細論華陀察聲色定死生訣要

病機

卷之十五

世傳神效諸方目錄

瘡瘍癰腫第一

口齒咽喉第二

眼目疾證第三

頭面諸疾第四

解利傷寒第五

腰脚疼痛第六

婦人雜病第七

咳嗽痰喘第八

心氣刺痛第九

小腸疝氣第十

腸風下血第十一

小兒病證第十二

破傷風邪第十三

陰毒傷寒帶附

諸風疾證第十四

水腫第十五

下痢第十六

雜證方藥第十七

閉殺諸藥第十八

太醫先生辭世詩仍附于后

儒門事親論方目錄終

儒門事親卷之一

戴人張子和著

七方十劑繩墨訂一

三十篇

方有七劑有十舊矣雖有說者辨其名而已敢申昔人已辨之意而為之訂夫方者猶方術之謂也易曰方以類聚是藥之為方類聚之義也或曰方謂五方也其用藥也各據其方如東方瀕海鹵斥而為癰瘍西方陵居華食而多頽睡贅癭南方瘴霧卑濕而多痺疝北方乳食而多臧寒滿病中州食雜而多九疸食滂中滿留飲吐酸腹脹之病蓋中州之地土之象

也故脾胃之病最多其食味居處情性壽夭兼四方而有之其用藥也亦雜諸方而療之如東方之藁薤南方之丁木西方之薑附北方之參苓中州之麻黃遠志莫不輻湊而叅尚故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用劑者和也方者合也故方如瓦之合劑猶羹之和也方不對病則非方劑不蠲疾則非劑也七方者大小緩急奇偶複也十劑者宣通補瀉輕重滑澀燥濕也

夫大方之說有二有君一臣三佐九之大方有分兩小而頓服之大方蓋治肝及在下而遠者宜頓服而

數少之大方病有無證而邪不專不可以一二味治者宜君一臣三佐九之大方王太僕以人之身三折之上為近下為遠近為心肺遠為腎肝中為脾胃胞臆膽亦有遠近以予觀之身半以上其氣三天之分也身半以下其氣三地之分也中脘人之分也又手之三陰陽亦天也其氣高足之三陰陽亦地也其氣下成已之陰陽亦人也其氣猶中州故肝之三服可併心之七服腎之二服可併肺之七服也

小方之說亦有二有君一臣二之小方有分兩微而頓服之小方蓋治心肺及在上而近者宜分兩微而

少服而頻之小方徐徐而呷之是也病無兼證邪氣
專可一二味而治者宜君一臣二之小方故腎之二
服可分為肺之九服及肝之三服也

緩方之說有五有甘以緩之之緩方糖蜜棗葵甘草
之屬是也蓋病在胸膈取甘能戀也有丸以緩之之
緩方蓋丸之比湯散其氣力宣行遲故也有品件群
衆之緩方蓋藥味衆則各不得騁其性也如萬病丸
七八十味迺相拘制也有無毒治病之緩方蓋性無
毒則功自緩矣有氣味薄藥之緩方蓋藥氣味薄則
長於補上治上比至其下藥力已衰故補上治上制

之以緩緩則氣味薄也故王太僕云治上補上方若
迅急則上不任而迫走於下制緩方而氣味厚則勢
與急同

急方之說有五有急病急攻之急方如心腹暴痛兩
陰溲便閉塞不通借備急丹以攻之此藥用不宜恒
蓋病不容俟也又如中風牙關緊急漿粥不入用急
風散之屬亦是也有湯散蕩滌之急方蓋湯散之比
丸下咽易散而施用速也有藥性有毒之急方蓋有
毒之藥能上涌下泄可以奪病之大勢也有氣味厚
藥之急方藥之氣味厚者直趣於下而氣力不衰也

故王太僕云治下補下方之緩慢則滋道路而力又微制急方而氣味薄則力與緩等

奇方之說有二有古之單方之奇方獨用一物是也病在上而近者宜奇方也有數合陽數之奇方謂一三五七九皆陽之數也以藥味之數皆單也君一臣三君三臣五亦合陽之數也故奇方宜下不宜汗偶方之說有三有兩味相配之偶方有古之複方之偶方蓋方相合者是也病在下而遠者宜偶方也有數合陰數之偶方謂二四六八十也皆陰之數也君二臣四君四臣六亦合陰之數也故偶方宜汗不宜

下

複方之說有一飭二方三方相合之複方如桂枝越婢一湯如調胃承氣湯方芒硝甘草大黃外參以連翹薄荷苦杏仁以為涼膈散是本方之外別加餘味者皆是也有分兩均劑之複方如胃風湯各等分是也以內經攷之其奇偶四則反以味數奇者為奇方味數偶者為偶方下復云汗者不以奇下者不以偶及觀仲景之制方桂枝湯汗藥也反以三味為奇大承氣湯下藥也反以四味為偶何也豈臨事制宜復有增損者乎攷其大旨王太僕所謂汗藥如不以

偶則氣不足以外發下藥如不以奇則藥毒攻而致
過必如此言是奇則單行偶則併行之謂也急者下
本易行故宜單汗或難出故宜併蓋單行則力孤而
微併行則力齊而大此王太僕之意也然太僕又以
奇方為古之單方偶為複方今此七方之中已有偶
又有複者何也豈非偶方者二方相合之謂也複方
者二方四方相合之方歟不然何以偶方之外又有
複方者歟此複字非重複之複乃反覆之複何以言
之蓋內經既言奇偶之方不言又有重複之方惟云
寸之不去則偶之是為重方重方者即複方也下又

云偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其
病也由是言之複之為方反複亦不遠內經之意也
所謂宣劑者俚人皆以宣為瀉劑抑不知十劑之中
已有瀉劑又有言宣為通者抑不知十劑之中已有
通劑舉世皆曰春宜宣以為下奪之藥抑不知仲景
曰大法春宜吐以春則人病在頭故也况十劑之中
獨不見通劑豈非宣劑即所謂通劑者乎內經曰高
者因而越之木鬱則達之宣者升而上也以君召臣
曰宣義惑同此傷寒邪氣在上宜葦葉散頭痛葱根
豈豉湯傷寒懊憹宜梔子豈豉湯精神昏憤宜梔子

厚朴湯自瓜蒂以下皆湧劑也乃仲景不傳之妙今人皆作平劑用之未有發其秘者予因發之然則為涌明矣故風癰中風胸中諸實痰飲寒結胸中熱蔚化上上而不下久則嗽喘滿脹水腫之病生焉非宣劑莫能愈也

所謂通劑者流通之謂也前後不得洩便宜木通海

金沙大黃琥珀八正散之屬裏急後重數至

便宜通因雖通與瀉相類大率通為輕而瀉為重

凡痺麻蔚滯經隧不滯非通劑莫能愈也

所謂補劑者補其不足也理人皆知山藥丸鹿茸丸

之補劑也然此乃衰老下脫之人方宜用之今往往於少年之人用之其舛甚矣古之甘平甘溫苦溫辛溫皆作補劑豈獨硫黃天雄然後為補哉况五臟各有補瀉肝實瀉心肺虛補腎經曰東方實西方虛瀉南方補北方大率虛有六表虛裏虛上虛下虛陰虛陽虛設陽虛則以乾薑附子陰虛則補以大黃硝石世傳以熱為補以寒為瀉訛非一日豈知酸苦甘辛鹹各補其臟內經曰精不足者補之以味善用藥者使病者而五穀進者真得補之道也若大邪未去方滿方悶心火方實腎水方耗而驟言鹿茸附子庸詎

知所謂補劑者乎

所謂瀉劑者泄瀉之謂也諸痛為實痛隨利減經曰實則瀉之實則散而瀉之中滿者瀉之於內大黃牽牛其遂巴豆之屬皆瀉劑也惟巴豆不可不慎焉蓋巴豆其性燥熱毒不去變生他疾縱不得已而用之必以他藥制其毒蓋百千證中或可一二用之非有果急之疾大黃牽牛其遂芒硝足矣今人往往以巴豆熱而不畏以大黃寒而反畏庸詎知所謂瀉劑者

所謂輕劑者風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜輕劑

消風散升麻葛根之屬也故內經曰因其輕而揚之發揚所謂解表也疥癬瘡痂宜解表汗以泄之毒以薰之皆輕劑也故桂枝麻黃防風之流亦然設傷寒冒風頭痛身熱三日內用雙解散及嚏藥解表出汗皆輕劑之云耳所謂重劑者鎮逆之謂也其藥則朱砂水銀沉香石黃丹之倫以其體重故也久病咳嗽涎潮于上咽喉不利形羸不可峻攻以此逆之故內經曰重者因而減之貴其漸也

所謂滑劑者周禮曰滑以養竅大便燥結小便淋澀皆宜滑劑燥結者其麻仁郁李之類乎淋澀者其葵

子滑石之類乎前後不通者前後兩陰俱閉也此名曰三焦約也約猶束也先以滑劑潤養其燥然後攻之則無失矣

所謂澀劑者寢汗不禁澀以麻黃根防已滑泄不已澀以苳葢枯白礬木賊烏魚骨罌粟殼凡酸味亦同乎澀者收斂之意也喘嗽上奔以壅汁烏梅煎寧肺者皆酸澀劑也然此數種當先論其本以攻去其邪不可執一以澀便為萬全也

所謂燥劑者積寒久冷食已不飢吐利腥穢屈伸不便上下所出水液澄徹清冷此為大寒之故宜用乾

薑良薑附子胡椒輩以燥之非積寒之病不可用也若久服則變血溢血泄大枯大涸溲便癯闕聾鼓聾痿弱之疾設有久服而此疾不作者慎勿執以為是蓋疾不作者或一二誤死者百千也若病濕者則白朮陳皮木香防已蒼朮等皆能除濕亦燥之平劑也若黃連黃蘗梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此內經之本旨也馬世相違久矣嗚呼豈獨薑附之儔方為燥劑乎

所謂濕劑者潤濕之謂也雖與滑相類其間少有不向內經曰辛以潤之蓋辛能走氣能化液故也若夫

硝性雖鹹本屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皴揭之病非獨金化為然蓋有火以乘之非濕劑莫能愈也

指風痺痿厥近世差玄說二

風痺痿厥四論內經言之詳矣今余又為之說不亦贅乎曰非贅也為近世不讀內經者指其差玄也夫風痺痿厥四證本自不同而近世不能辨一槩作風冷治之下虛補之此所以曠日彌年而不愈者也夫四末之疾動而或勁者為風不仁或痛者為痺弱而不用者為痿逆而寒熱者為厥此其狀未嘗同也故

其本源又復大異風者必風熱相兼痺者必風濕寒相合痿者必火乘金厥者或寒或熱皆從下起今之治者不察其源見其手足羸曳便謂之風然左傳謂風淫末疾豈不知風暑燥濕火寒六氣皆能為四末之疾也哉敢詳條于左有意於救物者試擇焉可也夫風之為狀善行而數變內經曰諸風掉眩皆屬肝木掉搖眩運非風木之象乎紆曲勁直非風木之象乎手足掣顫斜目啞口筋急攣搐瘈瘲癇發作無時角弓反張甚則吐沫或泣或歌喜怒失常頓僵暴仆昏不知人茲又非風木之象乎故善行而數變者

皆是厥陰肝之用也夫肝木所以自甚而至此者非獨風為然蓋肺金為心火所制不能勝木故也此病之作多發於每年十二月大寒中氣之後及三月四月之交九月十月之交何以言之大寒中氣之後厥陰為主氣已交之月亦屬厥陰用事之月皆風主之時也故三月四月之交多疾風暴雨振拉摧拔其化為水電九月十月之交多落木發屋之變故風木鬱極甚者必待此三時而作凡風病之人其脉狀如弓弦而有力豈敢以熱藥投之更增其勢哉今人論方者偶得一方間曾獲効執以為能著灸施鍼豈由病

者巧說病人使從已法不問品味剛柔君臣輕重何歲何輕何部何氣凡見風証偏枯口眼喎斜涎潮昏憤便服靈寶至寶清心續命等藥豈知清心之雜以薑桂靈寶之亂以起石硫黃小續命湯歲以附子惟夫至寶其性尚溫經曰風淫於內治以辛涼如之何以金石大熱之藥以治風耶有以熱治熱者一之為甚其可再乎故今之劉河間自制防風通聖散搜風丸之類程叅政祛風丸換骨丹用之者獲効者多矣而謗議百出以誣其實余嘗見內經氣交變論中言五鬱之法鬱極則為病况風病之作倉卒之變生嘗

治驚風癇病屢用汗下吐三法隨治隨愈內經中明
有此法五鬱中木鬱達之者吐之令其條達也汗者
是風隨汗出也下者是推陳致新也此為汗下吐三
法也愈此風病莫知其數如之何廢而不用也余恐
來者侮此法故表而出之昔項開完顏氏風病搐先
右臂并右足約搐六七十數良久左臂并左足亦搐
六七十數不瘥兩目直視昏憤不識人幾月餘求治
于余先逐其寒痰三四升次用導水禹功丸散泄二
十餘行次服通聖散辛涼之劑不數日而瘥故書此
以證之

夫痺之為狀麻木不仁以風濕寒三氣合而成之故
內經曰風氣勝者為行痺風則陽受之故其痺行且
劇而夜靜世俗莫知反呼為走注疼痛虎咬之疾寒
氣勝者為痛痺寒則陰受之故其痺痛且靜而夜劇
世俗不知反呼為鬼忤濕氣勝者為著痺濕勝則筋
脉皮肉受之痺著而不去肌肉削而著骨世俗不知
反呼為偏枯此病之作多在四時陰雨之時及三月
九月太陽寒水用事之月故草枯水寒為甚或頻水
之地勞力之人辛苦失度觸冒風雨寢處津濕痺從
外入况五方七地寒暑殊氣剛柔異稟飲食起居莫

不相戾故所受之邪各有淺深或痛或不痛或仁或不仁或筋屈而不能伸或引而不縮寒則虫行熱則縮緩不相亂也皮痺不已而成肉痺肉痺不已而成脉痺脉痺不已而成筋痺筋痺不已而成骨痺久而不已內舍其合若臟腑俱病雖有智者不能善圖也凡病痺之人其脉沉澁令人論方者見諸痺證遽作脚氣治之豈知內經中本無脚氣之說或曰諸方亦有脚氣統論又有脚氣方藥若止取素問則諸方皆非即曰痺病以濕熱為源風寒為兼三氣合而為痺奈何治此者不問經絡不分臟腑不辯表裏便作寒

濕脚氣烏之附之乳之沒之種種燥熱攻之中脘灸之臍下燒之三里火之蒸之熨之湯之炕之以至便旋澁滯前後俱闕虛燥轉甚肌膚日削飲食不入邪氣外侵雖遇扁華亦難措手若此者何哉胸膈間有寒痰去故也痺病本不死死者醫之誤也雖亦用蒸之法必先涌去其寒痰然後諸法皆効內經曰五臟有俞穴六腑有合穴循脉之本分各有所發之源以砭石補之則痺病瘳此在內經中明白具載如之何不讀也陳下酒監媿德新因赴冬選犯寒而行真氣元衰加之坐卧冷濕食飲失節以冬遇此遂作骨痺

骨屬腎也腰之高骨壞而不用兩膝似折面黑如炭
前後癱痛痿厥嗜卧徧問諸醫皆作腎虛治之余先
以玲瓏竈熨蒸數日次以苦劑上涌訖寒痰三二升
下虛上實明可見矣次以淡劑使白朮除脾濕令茯
苓養腎水貴官桂伐風木寒氣偏勝則加薑附否則
不加又刺腎俞太谿二穴二日一刺前後一月平復
如故僕嘗用治傷寒汗下吐三法移為治風痺痿厥
之法愈者多矣

痿之為狀兩足痿弱不能行用由腎水不能勝心火
心火上燦肺金肺金受火制六葉皆焦皮毛虛弱急
而薄著則生痿躄躄者足不能伸而行也腎水者乃
肺金之子也令腎水衰少隨火上炎腎主兩足故骨
髓衰竭由使內太過而致然至真要論云諸痿喘嘔
皆屬於上者上焦也三焦者手少陽相火也痿喘嘔
三病皆在膈上屬肺金之部分也故肌痺傳為脉痿
濕痺不仁傳為肉痿髓竭足躄傳為骨痿房室太過
為筋痿傳為白淫大抵痿之為病皆因客熱而成好
慾貪色強力過極漸成痿疾故痿躄屬肺脉痿屬心
筋痿屬肝肉痿屬脾骨痿屬腎總因肺受火熱葉焦
之故相傳於四臟痿病成矣直斷曰痿病無寒故痿

之作也五月六月七月皆其時也午者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發此三月之內以為熱也故病痿之人其脉浮而大今之行藥者凡見脚膝痿弱難於行步或一足不伸便作寒濕脚氣治之驟用烏附乳沒自然銅威靈仙之類燔針艾火湯煮袋蒸痿弱轉加如此而死豈亦天乎夫治痿與治痺其治頗異風寒濕痺猶可蒸湯灸燔時或一効惟痿用之轉甚者何也蓋以痿肺熱為本葉焦而成痿以此傳於五臟豈有寒者歟若痿作寒治是不刃而殺之也夫痿病不死死者用藥

之誤也陳下一武弁宋子玉因駐軍息城五六月間暴得痿病腰膝兩足皆不任用蹇而不行求治于予察其兩手脉俱滑大而有力予憑內經火淫于內治以鹹寒以鹽水越其膈間寒熱宿痰新者為熱舊者為寒或宿食宿飲在上腕者皆可涌之宿痰既盡因而下之節次數十行覺神志日清飲食日美兩足漸舉脚膝漸伸心降脊升使繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心湯涼膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷之經曰治心肺之病最近用藥劑不厭頻而少治腎肝之病最遠用藥劑不厭頓而多此法人皆惟之然

余治痿尋常用之如拾遺物予若以此誑人其如獲
罪於天何此宋子玉之證所以不得不書也且示信
於來世故內經謂治痿之法獨取陽明經陽明經者
胃脉也五臟六腑之海也土潤養宗筋宗筋主束骨
束骨在臍下陰毛際上是也又主大利機關機關者
身中大關節也以司屈伸是以陽明虛則宗脉縱宗
脉縱則大脉不伸兩足痿弱然取陽明者胃脉也胃
為水穀之海人之四季以胃氣為本本固則精化精
化則髓充髓充則足能履也陰陽應象論曰形不足
者補之以氣精不足者補之以味味者五味也五味

調和則可補精益氣也五味五穀五菜五菓五肉五
味貴和不可偏勝又曰恬淡虛無真氣從之精神內
守病安從來若用金石草木補之者必久而增氣物
化之常氣增而久天之由也所以久服黃連苦參者
而反化為熱久服熱藥之人可不為寒心哉余嘗用
汗下吐三法治風痺痿厥以其得効者衆其敢誣於
後人乎

厥之為狀手足及膝下或寒或熱也舉世傳脚氣寒
濕之病豈知內經中無脚氣之說王太僕亦云本無
脚氣後世廣飾方論而立此名古之方謂厥者即今

所謂脚氣者也然厥當分二種次分五臟所謂二種者有寒厥亦有熱厥陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥熱厥為手足熱也寒厥為手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣勝足下熱陰氣勝足下寒文曰陽主外而厥在內陰主內而在外若此者陰陽之氣逆而上行故也夫春夏則陽多陰少秋冬則陰壯陽衰人或恃賴壯勇縱情嗜慾於秋冬之時則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽氣既衰真精又竭陽不榮養陰氣獨行故手足寒發為寒厥也人或醉飽入房氣聚於脾胃主行津液陰

氣虛陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則四肢不榮酒氣與穀氣相薄則內熱而溺赤氣壯而慄悍腎氣既衰陽氣獨勝故手足熱發而為熱厥也厥亦有令人腹暴滿不知人者或一二日稍知人者或卒然悶亂無覺知者皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脉不至也腎氣微少精血奔逸使氣促迫上入胸膈宗氣反結心下陽氣退下熱歸陰般與陰相助令身不仁又五絡皆會於耳中五絡俱絕則令人身脉皆動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥有涎如拽鋸聲在喉咽中為痰厥手足搐搦者為風厥因醉

而得之為酒厥暴怒而得之為氣厥骨痛爪枯為骨
厥兩足指攣急屈伸不得爪甲枯結為臂厥身強直
如椽者為肝厥喘而哕者狂走攀登為陽明厥皆氣
逆之所為也今人見茲厥者皆謂之馭著掠著此是
何等語也非徒其名之謬因其名之謬而乖其實也
既言馭著中著掠著必歸之風此清心靈寶至寶又
為先驅矣鼻中喘藥身上病火豈知厥之為病如前
所說者耶頃西華季政之病寒厥其妻病熱厥前後
十餘年其妻服逍遙十餘劑終無寸效一日命余診
一人脉皆浮大而無力政之曰吾手足之寒時時

漬以熱湯漬而不能止吾婦手足之熱終日以冷水
沃而不能已者何也余曰寒熱之厥也此皆得之貪
飲食縱嗜慾遂出內經厥論證之政之喜曰內經真
聖書也十餘年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣
僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者
以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分處二藥
令服之不輟不旬日政之詣門謝曰寒熱之厥皆愈
矣其妻當不過數月而有娠何哉陰陽比和故也凡
尸厥痿厥風厥氣厥酒厥可一涌而醒次服降心火
益腎水通血和氣之藥使粥食調養無不瘥者若其

餘諸厥做此行之慎勿當疑似之間便作風氣相去
邈矣

立諸時氣解利禁忌式三

春之溫病夏之熱病秋之瘧及痢冬之寒氣及咳嗽
皆四時不正之氣也總名之曰傷寒人之勞役辛苦
者觸冒此四時風寒暑濕不正之氣遂成此疾人之
傷於寒也熱鬱於內淺則發早為春溫若春不發而
重感于暑則夏為熱病若夏不發而重感于濕則秋
變為瘧痢若秋不發而重感于寒則冬為傷寒故傷
寒之氣最深然而傷寒及溫熱但發必先發熱惡寒

頭項痛腰脊強者一日在太陽經故也內經中雖言
一日太陽者傳受常也亦有太陽證至了不傳者止
可汗之如升麻湯解肌湯通毒散五積散之類發散
則愈也蓋病人熱甚更以辛溫則病必轉加今代劉
河間先生自製辛涼之劑以通聖益元散相合各五
七錢水一中椀入生薑十餘片葱鬚頭二十餘根豈
豉一撮同煎至五七沸去滓分作二服先以多半服
之頃以釵股於喉中探引盡吐前藥因其一涌腠理
開發汗出周身復將餘藥溫熱而服之仍以酸醋辛
辣漿粥投之可以立愈解利傷寒濕瘟熱病治法有

二天下少事之時人多靜逸樂而不勞諸靜屬陰雖用溫劑解表發汗亦可獲愈及天下多故之時熒惑失常師旅數興飢饉相繼賦役既多火化大擾屬陽內火又侵醫者不達時變猶用辛溫茲不近於人情也止可用劉河間辛涼之劑三日以裏之證十痊八九予用此藥四十餘年解利傷寒溫熱中暑伏熱莫知其數非為衍也將以證後人之誤用藥者也予嘗見世醫用升麻五積解利傷寒溫疫等病往往發狂譫語衄血泄血喘滿昏瞶懊懣悶亂勞復此數證非傷寒更有此狀皆由辛溫之劑解之不愈而熱增劇以

致然也凡解利傷寒時氣疫疾當先推天地寒暑之理以人參之南陸之地多熱宜辛涼之劑解之朔方之地多寒宜辛溫之劑解之午未之月多暑宜辛涼解之子丑之月多凍宜辛溫解之少壯氣實之人宜辛涼解之老者耆氣衰之人宜辛溫解之病人因冒寒食冷而得者宜辛溫解之因役勞冒暑而得者宜辛涼解之病人稟性怒急者可辛涼解之病人稟性和緩者可辛溫解之病人兩手脈浮大者可辛涼解之兩手脈遲緩者可辛溫解之如是之病不可一槩而用偏熱寒涼及與辛溫皆不知變通者夫地有南北

時有寒暑人有衰旺脉有浮沉劑有溫涼服有多少不可差玄病人禁忌不可不知昔有人春月病瘧三日之內以驢車載百餘里比及下車昏瞶不知人數日而殂又有人飲酒過傷內外感邪頭痛身熱狀如傷寒三四日間以馬馱還家六七十里到家百骨節皆痛昏憤而死此余親覩若此之類不容更述假如瘟病傷寒熱病中暑冒風傷酒慎勿車載馬馱搖撼頓挫大忌夫動者火之化靜者水之化也靜為陰動為陽陽為熱陰為寒病已內擾又復外擾是為重擾害人之神詎能當之故遠行得疾者宜舟泛床擡無

使外擾故病不至增劇又若傷寒時氣瘟病嘗六七日之間不大便心下堅硬腹脇緊滿止可大小承氣湯下之其腸胃積熱慎勿用巴豆杏仁性熱大毒之藥雖用一二丸下之利五七行必反損陰氣涸枯津液燥熱轉增發黃譫語狂走斑毒血泄悶亂輕者為勞復重者或至死間有愈者幸矣不可以為法故傷寒新愈之人慎勿食猪魚雜菓醞酒濕麵及沐浴房室事如犯病必再發愛其身者不可不慎又如正二三月人氣在上瘟疫大作必先頭痛或骨節疼與傷寒時氣冒暑風濕及中酒之人其狀皆相類慎勿便

用巴豆大毒之藥治之元光春京師翰林應奉李屏
山得瘟疫證頭痛身熱口乾小便赤澁渠素嗜飲醫
者便與酒癥丸犯巴豆利十餘行次日頭痛諸病仍
存醫者不識復以辛溫之劑解之加之卧於暖炕強
食葱醋湯圖獲一汗豈知種種客熱疊發併作目黃
班生潮熱血泄大喘大滿後雖有承氣下之者已無
及矣至今議者紛紛終不知熱藥之過往往獨歸罪
於承氣湯用承氣湯者不知其病已危猶復用藥學
經不明故也良可罪也然議者不歸罪於酒癥丸者
可責也十瘟論在表不可下况巴豆之丸乎巴豆

不已况復發以辛溫之劑乎必有仲尼方明治長之
非罪微生高之非直終不肯以數年之功苦讀內經
但隨衆好惡為之毀譽若此者皆妄議者也不真知
其理遽加毀譽君子之所不取以予論之凡傷寒之
氣有六禁初病之時甚似中酒傷食者禁大下之一
禁也當汗之時宜詳時之寒暑用衾衣之厚薄禁沐
浴火坑重被熱粥燔針二禁也當汗之時宜詳解脉
之遲數用溫涼之劑禁妄用熱藥三禁也當下之時
宜審詳證下之藥禁巴豆銀粉丸方四禁也遠來之
病人禁車載馬馱五禁也大汗之後禁雜食嗜慾憂

思作勞六禁也故凡有此者宜清房涼榻使不受客熱之邪明窓皓室使易見班出黃生之變病者喜食涼則從其涼喜食溫則從其溫清之而勿擾休之而勿勞可辛溫則辛溫解之可辛涼則辛涼解之所察甚微無拘彼此欲水之人慎勿禁水但飲之後頻與按摩其腹則心下自動若按摩其中腕久則必痛病人獲痛復若有水結則不敢按矣止當禁而不禁者輕則危重則死不當禁而禁者亦然今之士大夫多為俗論先錮其心雖有正論不得而入矣昔陸象先嘗云天下本無事庸人擾之為煩耳余亦曰正氣本

亂庸醫擾之為劇耳

瘡非脾寒及鬼神辨四

夫瘡猶酷瘡之瘡也以夏傷酷暑而成痲瘡也又有瘡瘡連歲不已此肝經肥氣之積也多在左脇之下狀如覆杯是為瘡瘡猶瘡也久而不已令人瘦也內傷既以夏傷於暑而為瘡何後世之醫者皆以脾寒治之世醫既不知邪熱蓄積之深為寒戰遂為寒戰所感又不悟邪熱入而後出於表發為燥渴遂為交爭所惑相傳以薑附硫黃平胃異攻散交解飲子治之百十之中幸其一熱執以為是至使父子弟兄相

傳及其瘡之甚者則歸之崇怪豈可不大笑耶內經歸於鬼神者不可與言至德何世俗之愚而難化也又或因夏日飲冷過常傷食生硬爪菓梨棗之屬指為食瘡此又非也豈知內經之論則不然夏傷於暑遇秋之風因勞而汗玄府受風復遇悽愴之水風閉而不出舍於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行於陰邪熱淺則連日而作邪熱深則間日而作併入於裏則熱併入於表則寒若此而論了不干於脾後世論藥如此之差互也以時言之治平之時常瘡病少擾攘之時常瘡病多治平之時雖用砒石辰砂有

毒之藥治之亦能取效緣治平之時其民夷靜故雖以熱攻熱亦少后患至於擾攘之時其民勞苦不可遽用大毒大熱之藥若以熱攻其熱甚則轉為吐血泄血癰疽瘡瘍嘔吐之疾蓋擾攘之時政令煩亂徭役紛冗朝戈暮戰畧無少暇內火與外火俱動在侯伯官吏尤甚豈可與夷靜之人同法而治哉余親見泰和六年丙寅征南師旅大舉至明年軍迴是歲瘡疔殺人莫知其數昏瞶悞懷十死八九皆火之化也次歲瘡病大作侯王官吏上下皆病輕者旬月甚者彌年夫富貴之人勞心役智不可驟用砒石大毒之

藥止宜先以白虎湯加人參小柴胡湯五苓散之類
頓服立解或不愈者可服神祐丸減用神芎等甚者
可大小承氣湯下之五七行或十餘行峻泄夏月積
熱暑毒之氣此藥雖泄而無損於臟腑乃所以安臟
腑也次以桂苓甘露散石膏知母湯大小柴胡湯人
參柴胡飲子量虛實加減而用之此藥皆能治寒熱
往來日晡發作與治傷寒其法頗同更不愈者以常
山散吐之無不愈者余嘗用張長沙汗下吐三法愈
瘡極多大忌錯作脾寒用暴熱之藥治之縱有愈者
后必發瘡疽下血之病不死亦危余自先世授以醫

方至于今日五十餘年苟不諳練豈敢如是決也又
嘗觀刺瘡論五十九刺一刺則衰再刺則去三刺則
已會陳下有病瘡二年不愈者止服溫熱之劑漸至
衰羸命予藥之余見其羸亦不敢便投寒涼之劑乃
取內經刺瘡論詳之曰諸瘡不已刺十指間出血正
當發時余刺其十指出血血止而寒熱立止感駭其
神余非術術竊見晚學之人不改誥典謬說鬼疾妄
求符籙祈禱辟匿法外旁尋以致病人遷延危殆瘡
病除嵐瘴一二發必死其餘五臟六腑瘡皆不死如
有死者皆方士誤殺之也或曰汝言瘡因於暑者春

發之瘡亦傷暑乎余曰此瘡最深何哉暑伏於秋冬而不發至春始發此瘡之深者內經氣交變大論歲火大過炎暑流行金肺受邪啓玄子云火不以德邪害於肺金也故金肺先病以金氣不及故為病又經口歲火太過大熱先發故民病瘡少氣欬喘血溢血注下嗑燥耳聾中熱肩背熱上應熒惑星見則山澤燔燎雨乃不降燥石消金涸泉焦草火星大而明見注曰火無德令縱熱害金水復制心故心火自病熒惑見則酷法大故瘡常與酷吏之政並行或酷政行于先而瘡氣應于後或瘡氣行于先而酷政應于後

昔有詩云大暑去酷吏此言雖不為醫設亦於醫示一旨有以暗相符者也以前人論瘡者未嘗及于此以予發之及知聖人立瘡之名必有所謂云

小兒瘡疱丹爛癰疹舊蔽記五

曰一在母腹也胞養十月蘊畜濁惡熱毒之氣非一日及歲年而後發雖至賢與至賤莫不皆然輕者稀少重者稠密皆曰胞胎時所感濁惡熱毒之氣有輕重非獨人有此疾凡胎生血氣之屬皆有蘊畜濁惡熱毒之氣有一二歲而發者有三五歲至七八歲而作者有年老而發丹爛癰疹者亦有傷寒中濕毒而

發斑者亦有陽毒發斑者斑有大小色有輕重大者為陰小者為陽均是熱也但色重赤者熱深色輕紅者熱淡凡治者輕者因而揚之重者因而減之內經曰少陽客勝則丹疹外發及為丹燦手少陽者三焦少陽相火也啓玄子云是五寅五申之歲即少陽相火司天故也他歲亦有之但內經獨明瘡疹者少陽相火之所為也俗呼曰癍疹傷寒此言却有理為此證時與傷寒相兼而行必先發熱惡寒頭項痛腰脊強從太陽傳至四五日燦疹始發先從兩脇下有之出於脇肋次及身表漸及四肢故凡小兒瘡疱丹燦

瘡疹皆少陽相火客氣勝也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火豈有寒乎故治瘡疱與治傷寒時氣同法初覺頭痛身熱惡寒此小兒初發瘡疱之候也其脉息皆浮大而有力亦與傷寒時氣冒風驚風宿乳一槩難辨宜先解之有二法遇亢陽炎熱之時以辛涼解之遇久寒凝冽之時以辛溫解之辛涼之劑者涼膈通聖之類是也辛溫之劑者升麻葛根之類是也此二法慎勿互用之既用此二法之後次以白虎湯加人參冷服之勿輟蓋防瘡疹發喘喘者必死人參止喘故也或云立秋之後不宜服白虎湯者非也假如

秋深發瘡瘡者中暑而得之白虎大解暑毒既有白
虎湯證豈可間以秋冬乎瘡疱癰疹丹熨皆是火之
用也是肺金之不及也故曰白虎湯加人參一日不
可闕也瘡疱燦疹或出不均大小如荳黍相親見其
不齊也相天之寒溫以蟬殼燒灰抄半字或一字以
淡酒調少許飲之大人以淡酒溫調之不半日則均
齊如或用百祥丸紫草飲子皆可服之俗以酒醋薰
之者適足增其昏瞶耳至六七日疱疹出全可調胃
涼膈下之同調理傷寒法或言瘡疱首尾俱不可下
者此未奉議公之言也適足使人戰戰兢兢而不敢

用藥也錢沖陽之用百祥丸其間有大戟豈奉議公
獨不見耶自奉議公斯言一出死者塞路矣予家其
親屬故舊小兒有患瘡疱黑陷腹內喘者余以白虎
湯加人參涼膈散加當歸桔梗連進數服上灌下泄
晝夜不止又使睡卧於寒涼之處以新水灌其面目
手足膿水盡去蓋四肢者諸陽之本也兒方為瘡疱
外燔沃以寒水使陰氣循經而入達於心肺如醉得
醒是亦開昏破鬱之端也如此救活者豈啻千數夫
瘡疱黑陷喘而滿者十死八九若依此法尚能活其
六七何世醫與病家至今猶未悟也近年予之庄鄰

沿蔡河來往之舟常鱗於此一日舟師偶見敗蒲一
束沿流而下漸迫舟次似聞啼聲而微舟師疑其人
也探而出之開視之驚見一兒四五歲許瘡疱周匝
密不容隙兩目皎然飢而索食因以粥飽其舟師之
妻怒曰自家兒女多惹瘡疱傳染柰何私料此兒沿
蔡河來其流緩必不遠持兒一鞋逆流而上徧河之
人皆曰無此兒行且二十里至一村落舟師高唱曰
有兒年狀如許不知誰是瘡疱病死棄之河中今復
活矣聞酒邸中飲者喧嘩有人出曰我某村某人也
死四五歲死於瘡疱舟師出其鞋以示之其父泣曰
真吾兒也奔走來視驚見兒活大慟流涕拜謝舟師
喜抱兒歸今二十餘歲矣此兒本死得水而生伏論
來者瘡疱之疾熱耶寒耶經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心
火啓玄子注云心寂則痛微心燥則痛甚百端之起
皆自心生瘡疱之疾豈有寒歟余承醫學於先人閱
病多矣苟誑後人罪將安逃誠如此法則原上之丘
以瘡疱而死者皆誤殺人也故療小兒惟錢仲陽書
中可採者最多但其方為閭孝忠所亂有識者宜擇
而取之

證婦人帶下赤白錯分寒熱解六

君子非好與昔人辨以要譽也蓋昔人有一誤流為千百世之禍者苟不證其非雖曰謙讓其如人命何如精選聖惠方二十三卷論婦人赤白帶下云婦人帶下者由勞神過度損動經血致令身虛受於風冷風冷入於腠絡傳其血之所成也又有巢氏內篇四十四卷論任脉為經之海其任之為病女子則為帶下手太陽為小腸之經也手少陰為心之經也心為臟主於裏小腸為府主於表二經之血在於婦人上為乳汁下為月水衝任之所統也衝任之脉既起於臍陰陽過度則傷腠絡故風邪乘虛而入於臍中

損衝任之經傷太陽少陽之血致令腠絡之間穢與血相兼帶而下冷則多白熱則多赤三家之說皆非也夫治病當先識經絡靈樞十二經中有是動之病有所生之病大經有十二奇經有八脉言十二經之外復有此八道經脉也十二經與八道經脉通身往來經絡共二十道上下流走相貫周環晝夜不息與天同度自手太陰肺經起行陽二十五度行陰亦二十五度復會於手太陰肺經也然此二十道經絡上下周流者止一十九道耳惟帶脉起少腹側季脇之端乃章門穴是也環身一周無上下之源絡臍而過如

束帶之於身難經曰帶之為病溶溶如坐水中衝任者是經脉之海也循腹脇夾臍傍傳流於氣衝屬於帶脉絡於督脉督脉者起於關元穴任脉者女子在養胎孕之所督脉乃是督領婦人經脉之海也衝任督三脉同起而異行一源而三歧皆絡帶脉衝任督三脉皆統於篡戶巡陰器行廷孔溺孔上端衝任督三脉以帶脉束之因餘經上下往來遺熱於帶脉之間熱者血也血積多日不流火則從金之化金曰從革而為白乘少腹間冤熱白物滿溢隨洩而下綿綿不絕多不痛也或有痛者則壅礙因壅而成痛也內

經曰少腹冤熱洩出白液冤者屈滯也病非本經為他經冤抑而成此疾也冤一作客客猶寄也遺客熱于少腹久不去從金化而為白設若赤白痢赤者新積也從心火白者舊積也從肺金故赤白痢不可曲分寒熱止可分新舊而治之假如癰癤始赤血次潰白膿又豈為寒者哉而病者未信也此今之劉河間常言之矣皆云寒多則白以乾薑赤石脂桃花丸治痢雖愈后必生血疾如白帶下病徑以白芍藥乾薑白帶雖愈則小溲必不利治瀉痢與治帶下皆不可驟用峻熱之藥燥之燥之則內水涸內水涸則必煩

渴煩渴則小溲不利小溲不利則足腫面浮漸至不治內經曰思想無窮所願不得意淫于外入房大甚發為筋痿淫衍白物如精之狀男子因溲而下女子綿綿而下左傳曰少男惑長女風落山之象是為惑蠱之疾其文三虫同皿曰蠱乃是思慕色慾内生後蝕甚不可使用燥熱之藥攻之漸至形削羸瘦脉大者必死而不救是亦白痢者是邪熱傳於大腸下廣腸出赤白也帶下者傳於小腸入脬經下赤白也據此二證皆可同治濕法治之先以導水禹功瀉訖次以涼劑降心火益腎水下小溲分水道則自愈矣頃頃

丘一婦人病帶下連綿不絕白物或來已三載矣命予脉之診其兩手脉俱滑大而有力得六七至常上熱口乾眩暈時嘔酢水余知其實有寒痰在胸中以瓜蒂散吐訖冷痰三二升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹功以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈余實悟內經中所云上有病下取之下有病上取之又上者下之下者上之然有此法亦不可偏執更宜詳其虛實而用之故知精選聖惠方帶下風寒之言與巢氏論中赤熱白寒之說正與難素相違公非敢妄

論先賢恐後學又流不明未免從之而行也如其真
學之人不察病人脉息不究病人經脉妄斷寒熱信
用群方暴熱之藥且有失雖悔何追嗚呼人命一失
其復能生乎赤白痢與赤白帶下皆不死人內經惟
腸澀便血血溫身熱者死赤白帶下白液白物蠱病
腎消皆不能死人有死者藥之誤也

霍亂吐瀉死生如反掌說七

巢氏先賢也固不當非然其說有誤者人命所係不
可不辯也今之醫者家置本以為繩墨嗚呼何今之
人信巢氏而不信素問也此予不得不為之說且巢

氏論霍亂吐瀉皆由溫涼不調陰陽清濁二氣相干
致腸胃之阻阻變而為霍亂寒氣客於脾則瀉寒氣客
於胃則吐亦由飲酒食肉腥膾生冷過度或因居處
坐卧濕地當風取涼風之氣歸於三焦傳於脾胃脾
胃得冷水飲不消皆成霍亂其名有三一曰胃反胃
氣虛逆反吐飲食二曰霍亂言其病揮霍之間便致
撩亂也三曰嘔食變逆者也霍亂者脉必代又云七
月間食蜜令人暴下霍亂此皆巢氏霍亂之論也予
以為不然夫醫之治病猶書生之命題如秋傷於濕
冬生欬嗽且獨以濕為主此書生之獨脚題也風濕

暍三氣合而成霍亂吐瀉轉筋此猶書生之鼎足題也風者風木也內應足厥陰肝木濕者雨化也內應於足太陰脾土暍者火熱也內應於手少陰心火此風濕暍三氣之所生也內經曰土氣之下木氣乘之是肝木乘脾土也又曰厥陰所至為脇痛嘔泄少陽所至為嘔涌注云食不下也太陰所至為中滿霍亂吐下太陰所至為濡化也注云濕化也又曰太陰所至為濕生終為注雨故轉筋者風主肝肝主筋風急甚故轉筋也吐者暍也火主心心主炎上故嘔吐也泄注者土主濕濕主脾濕下注故泄注也此三者豈

非風濕暍如書生鼎足題耶脾濕土氣為風木所克土化不行矣无雨火盛過極土怒發焉極則為雷霆驟雨烈風蓋土氣在上木氣乘之故也是以大水橫流山崩岸落石迸沙飛豈非太陰濕土怒發之象耶故人病心腹滿脹腸鳴而為數便甚則心痛脇膜嘔吐霍亂厥發則注下跗腫身重啓玄子云已上病證皆脾熱所生也乃知巢氏所論正與素問啓玄子相違故內經治法病急則治其標緩則治其本先用淡劑流其濕辛涼以退其風鹹苦以解其暍冰水以救其內涸大忌食粟米粥飲者立死偉哉王冰之

言脾熱一句可以為友世俗止知取其頭巾而濯之
以飲其水亦取其黑豆皂礬頭垢寒涼然近似終不
足以制其甚也又有以寒水沃其手足者大非也四
肢已厥更以寒水沃之則益厥矣曷若以寒水沃其
心之為愈也泰和間余親見陳下廣濟禪院其主僧
病霍亂一方士用附子一枚及兩者乾薑一兩炮水
一椀同煎放冷服之服訖嘔血而死頃合流鎮李彥
甫中夜忽作吐瀉自取理中丸而服之醫者至以為
有食積以巴豆下之三五丸藥亦不動至明而死可
不哀哉遂平李仲安携一僕一佃客至郟城夜宿邵

輔之書齋中是夜僕逃仲安覺其時也騎馬與佃客
往臨穎急追之時七月天大熱炎風如箭埃塵慢天
至辰時而還曾不及三時往返百二十里既不獲其
人復宿於邵氏齋忽夜間聞呻呼之聲但言救我不
知其誰也執火尋之乃仲安之佃客也上吐下泄目
上視而不下胸脇痛不可動搖口欠而脫臼四肢厥
冷此正風濕暈三者俱合之證也其婿曾聞余言乃
取六一散以新汲水剉生薑而調之頓服半升其人
復吐乃再調半升而令徐服之良久方息至明又飲
數服遂能調養三日平復而去嗚呼若此三人其生

死豈不如反掌哉彼世醫往往以謂六一散治得其病此無學之輩也可勝恨哉

目疾頭風出血最急說八

內經曰目得血而能視此一句聖人論人氣血之常也後世之醫不達其旨遂有惜血如金之說自此說起目疾頭風諸證不得而愈矣何以言之聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發痛不及則目耗竭而失睛故年少之人多太過年老之人多不及但年少之人則無不及但年老之人其間猶有太過者不可不察也夫目之內眥太陽

經之所起血多氣少目之銳眥少陽經也血少氣多目之上網太陽經也亦血多氣少目之下網陽明經也血氣俱多然陽明經起於目兩傍頰之中與太陽少陽俱會於目惟足厥陰肝經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故血出者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以血養目而已此內經所謂目得血而能視者此也凡血之為物太多則益太少則枯人熱則血行疾而多寒則

血行遲而少此常理也至於目者肝之外候也肝主
目在五行屬木然木之為物太茂則蔽密太衰則枯
痺蔽密則風不疎通故多摧拉枯痺則液不浸潤故
無榮華又况人之有目如天之有日月也人目之有
翳如日月之有雲霧也凡雲之興未有不因蒸騰而
起者雖隆冬之時猶且然耳况於炎夏之時乎故目
暴赤腫起羞明隱澁泪出不止暴寒自瞶皆工藝之
所為也夫目之五輪乃五臟六腑之精華宗脉之所
聚其氣輪屬肺金肉輪屬脾土赤脉屬心火黑水神
光屬腎水兼屬肝木此世俗皆知之矣及有目疾則

又不知病之理豈知目不因火則不病何以言之氣
輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被
翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也能治火者一
句可了故內經曰熱勝則腫治火之法在藥則鹹寒
吐之下之在針則神廷上星顛會前頂百會血之翳
者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可
使立消惟小兒不可刺顛會為肉分淺薄恐傷其骨
然小兒水在上火在下故目明老人火在上水不足
故目昏內經曰血實者宜決之又經曰虛者補之實
者瀉之如雀目不能夜視及內障暴怒大憂之所致

也皆肝主目血少禁出血止宜補肝養腎至於暴赤
腫痛皆宜以銚鍼刺前五穴出血而已次調鹽油以
塗髮根甚者雖至于再至于三可以也量其病勢平
為期少白可黑落髮可生有此神驗不可輕傳人年
四十五十不問男女目暴赤腫隱澁難開者些稜鍼
刺前頂百會穴出血大妙至如年少髮早白落或白
屑者此血熱而太過也世俗止知髮者血之餘也血
衰故耳豈知血熱而寒髮反不茂肝者木也火多水
少木反不榮火至於頂灸上之甚也大熱病汗後勞
之後皆髮多脫落豈有寒耶故年衰火勝之人最

宜出血但人情見出血皆不悅矣豈知出血者乃所
以養血也凡兔雞猪狗酒醋濕麵動風生冷等物及
憂忿勞力等事如犯之則不愈矣惟後頂強間腦戶
風府四穴不可輕用鍼灸以避忌多故也若有誤不
幸令人瘖固宜慎之其前五穴非徒治目疾至於頭
痛腰脊強外腎囊燥癢出血皆愈凡鍼此勿深深則
傷骨唐甄權尤得出血之法世俗云熱湯沃眼十日
明此言謬之久矣火方乘目更以熱湯沃之兩熱相
搏是猶投賊以刃也豈知凉水沃之暫澁而久滑熱
水沃之暫滑而久澁不然曷以病目者忌沐浴或曰

世俗皆言凉水沃眼血脉不行余聞大笑之眼藥中
用黃連礪砂朴硝龍腦熊膽之屬皆使人血脉不行
耶何謬之甚也又若頭風之甚者久則目昏偏頭風
者少陽相火也久則目束小大腸闕澁者目必昏何
也久病滑泄者目皆明惟小兒利久反疳眼_昏極則
反與此稍異其餘皆宜出血而大下之余嘗病目赤
或腫或翳作止無時偶至親息帥府間病目百餘日
羞明隱澁腫痛不已忽眼科姜仲安云宜上星至面
會速以銚鍼刺四五十刺攢竹穴絲竹穴上_兼眉際
一十刺及鼻兩孔內以草莖彈之出血三處出血如

泉約二升許來自愈太半三日平復如故余自嘆曰
百日之苦一朝而解學醫半世尚闕此法不學可乎
惟小兒瘡疱入眼者乃餘熱不散耳止宜降心火瀉
肝風益腎水則愈矣若大人目暴病者宜汗下吐以
其血在表故宜汗以其火在上故宜吐以其熱在中
故宜下出血之與發汗名雖異而實同故錄銅人中
五穴照用

過愛小兒反害小兒說九

小兒初生之時腸胃綿脆易飢易飽易虛易實易寒
易熱方書舊說天下皆知之矣然禮記曲禮所以玉

符潛訣論云天下皆不知曲禮云童子不衣裘裳說云裘大溫消陰氣且人十五歲成童尚不許衣裘今之人養穉子當正夏時以綿袂裹腹日不下懷人氣相蒸見天稍寒即封閉密室睡壇下幕煖炕紅爐使微寒不入大煖不泄雖衰老之人尚猶不可况純陽之小兒乎然君子當居密室亦不當如是之煖也玉符潛訣論云嬰兒之病傷於飽也今人養穉子不察脾胃所容幾何但聞一聲哭將謂飢號急以灌乳納之兒口豈復知量不吐不已及稍能食應口輒與夫小兒初生別無伎倆惟善號泣為強良耳此二者乃

百病之源也小兒除胎生病外有四種曰驚曰疳曰吐曰瀉其病之源止有二曰飽曰煖驚者火乘肝之風木也疳者熱乘脾之濕土也吐者火乘胃膈甚則上行也瀉者火乘肝與大腸而瀉者也夫乳者血從金化而大寒小兒食之肌肉充實然其體為水故傷乳過多反從濕化濕熱相蒸吐痢之病作矣醫者不明其本輒以紫霜進食比金白餅之屬其中皆芭莖杏仁其芭莖大熱有大毒杏仁小熱有小毒小兒陽熱復以熱毒之藥留毒在內久必變生故劉河間先生以通聖涼膈神芎益元治之皆無毒之藥或曰此

大人所服之藥非小兒所宜也余聞笑曰大人小兒雖年壯不同其五臟六腑豈復殊耶大人服多小兒服少其實一也故不可下者宜解毒可下者宜調胃瀉心然有逐濕為之方者故余嘗以牽牛大黃木通三味末之為丸以治小兒諸病皆効蓋食乳小兒多濕熱相兼故也今之醫者多以此藥謗予彼既不明造化難與力辨故予書此方以俟來世知道者然善治小兒者當察其貧富貴賤治之蓋富貴之家衣食有餘生子常夭貧賤之家衣食不足生子常堅貧家之子不得縱其慾雖不如意而不敢怒怒少則肝病

少富家之

得縱其慾稍不如意則怒多怒多則肝

病多矣夫

者木也甚則乘脾矣又况貧家無財少

藥故死少富家有財多藥故死多故貧家之育子雖薄於富家其成全小兒反出於富家之右其暗合育子之理者有四焉薄衣淡食少慾寡怒一也無財少藥其病自痊不為庸醫熱藥所攻二也在母腹中其毋作勞氣血動用形得充實三也母既作勞多易生產四也此四者與富家相反也俚諺曰兒哭即兒歌不哭不倭儻此言雖鄙切中其病世俗豈知號哭者乃小兒所以泄氣之熱也老子曰終日號而不噉余

嘗授人以養子之法兒未坐時卧以赤地及天寒時不與厚衣布而不綿及能坐時以鐵鈴木壺雜戲之物連以細繩置之水盆中使一浮一沉弄之有聲當炎暑之時令坐其傍掬水弄鈴以散諸熱內經曰四肢者諸陽之本也手得寒水陰氣達於心中乃不藥之藥也余嘗告于陳敬之若小兒病緩急無藥不如不用庸醫但恐妻妾恠其不醫宜湯浸蒸餅令軟丸作白丸給其妻妾以為真藥使兒服之以聽天命最為上藥忽歲在丙戌群兒皆病泄瀉但用藥者皆死蓋醫者不達濕熱之理以溫燥行之故皆死惟陳敬之不與藥用余之言病兒獨存噫嗚呼班固真良史嘗云有病不治得中醫除暴得大疾病服藥者當謹熟陰陽無與衆謀若未病之前從予奉養之法亦復不生病縱有微疾雖不服藥可也

服藥一差轉成他病說十

語云子之所慎齊戰疾又曰丘未達不敢嘗此言服藥不可不畏慎也然世有百十年相襲之弊至今不除者敢略數一二使後車改輒不蹈前覆夫傷寒溫疫時氣中暑風溫風瘧與中酒傷食者其初相類此最誤人或先一日頭痛曾傷酒便歸過于酒曾傷食

便歸過于食初覺滿悶醫者不察其脉不言其始勿
用備急丹纏積丹軟金花酒癥丸此藥犯芑荳或出
油不盡大熱大毒走泄五七行或十餘行其人必津
液枯涸腸胃轉燥發黃痰熱目赤口乾恍惚潮熱昏
憤惑狂諸熱交作如此誤死者不可勝舉若其人或
本因酒食致過亦能頭痛身熱戰慄惡寒醫者不察
其脉不究其原反作傷食發之桂枝麻黃升麻之屬
以汗解之汗而不解轉轉疑惑反生他證如此誤死
者可勝計哉又如久病咳嗽形體羸瘦食飲減少且
靜夜劇醫者不察便與烏梅罌粟殼紫苑枯礬如此

峻攻嗽疾未除澁滯之病作矣嗽加之澁飲酒彌減
醫者不察更以熱劑養胃溫劑和脾致令頭面汗出
燥熱潮發形容瘦瘁涎液上出流如湧泉若此死者
不可勝數又如婦人產餘之疾皆是敗血惡物發作
寒熱臍腹撮痛乳澁枯涸食飲稍減醫者不察便謂
產後血出數斗氣血俱虛便用溫熱之劑養血補虛
止作寒治舉世皆然豈知婦人之孕如天地之孕物
也物以陰陽和合而後生人亦以陰陽和合而後孕
偏陰偏陽豈有孕乎此與禾黍瓜菓之屬何異哉若
水旱不時則華之與實俱痿落矣此又與孕而不育

者復何異哉七月立秋後十八日寸草不結者猶天
寒故也今婦人妊娠終十月無難而生反謂之寒何
不察其理之甚也竊譬之治博者炎火在下以水沃
其壑之巔遂成博矣博既出壑壑頓寒耶世俗竟傳
黑神散之屬治產後一十八證非徒其不愈則經脉
滯閉前後淋瀝嘔吐嗽痰凡百熱證生矣若此誤死
者不可計之曷若四物湯與涼膈散對停大作湯劑
下之則以數行惡物俱盡後服淡甘之劑自愈矣
又如小兒腹滿喘嗽痰涎不利醫者不察便用白餅
子之屬夫白餅子苦甘大熱有大毒無用膩粉其後

必生口瘡上喘欬嗽嘔吐不嗜飲食之疾然此治貧
家小兒猶或可効膏梁之家必生他病又何疑哉又
如瀉利之疾歲歲有之醫者不察便用聖散子之屬
乾薑赤石脂烏梅罌粟殼官桂石榴皮龍骨牡蠣之
屬變生小便濇悶甚者為脹又甚者水腫之疾生矣
間有愈者病之微者也甚則必不愈矣又如人病停
飲或因夏月傷冷過多皆為脾胃客氣有餘也宜逐
而去之醫者不可以為脾衰而補之則痞者更痞滿
者更滿復有芭莖丸下之者病雖少解必不嗜食上
燥之病生矣又如人因閃肭膝髀肘腕大痛醫者不

察便用銚針出血如未愈者再三刺血出血既多遂成跛臂內經曰足得血而能步血盡安得步哉若余治閃肭則不然以禹功散或通經二三錢下神祐丸或除濕丹百餘丸峻瀉一二十行則痛出當痒發痛屬夏痒屬秋出則夏衰矣此五行勝復之理也故凡腰膝脇痛杖瘡落馬墜墮打撲莫不同然蓋此痛得之於外非其先元虛元弱古人云痛隨利減宜峻瀉一二十行畢但忌熱酒可一藥而愈勿謂峻瀉輕侮此法昔有齒痛連月不止以鉄鈴鈕取之血不止而死又有人因上下齒痛凡百痛者輒取不數年上下齒盡至五十歲生硬之物皆不能食夫上下齒痛皆由手足陽明二經風熱甚而痛矣可用大小承氣湯截用丸祛風丸等藥瀉之則痛當自止內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火啓玄子云百病之起皆自心生心者火也火生土之故也出牙之誤不可不知又如治水腫痛者多用水銀輕粉白丸子大毒之藥下之水腫未消而牙齒落牙齒落而不進食水盡而立斃復有人於兩足鍼之水出如泉水盡亦斃

儒門事親卷之二

戴人張子和著

偶有所遇厥疾獲瘳記十一

余昔過夏邑西有婦人病腹脹如鼓飲食乍進乍退寒熱更作而時吐嘔且三載矣師覲符呪無所不至惟俟一死會十月農隙田夫聚獵一犬役死磔于大樹根盤遺腥在其上病婦偶至樹根頓覺昏憤眩瞽不知人枕于根側口中垂出其狀如蛇口眼皆具以舌舐其遺腥其人驚見長虫兩袖裹其手按虫頭極力而出之且二尺許重幾斤剖而視之以示諸人其

婦遂愈虫亦無名此正與華元化治法同蓋偶得吐
法耳又有一書生瘡間日一作將秋試及試之日乃
瘡之期書生憂甚誤以葱蜜合食大吐涎數升瘀血
宿食皆盡同室驚畏至來日入院瘡亦不發亦偶得
吐法耳正隆間有聖旨取汴梁諸匠氏有木匠趙作
頭鐵匠杜作頭行次失路迷至大宅乞宿主人不納
曰家中有人重病不敢納君杜作頭給曰此趙公乃
汴梁太醫之家今蒙上司見召迷路至此蓋病者當
愈而遇此公也主人默而入良久復出將邀二人入
室與之食已主人起請曰煩太醫看病何如趙見而

笑曰一藥可愈二人竊議曰來時所携熟藥寄他車
上此中實無柰何杜曰此甚易耳潛出門得牛糞一
塊作三十粒下以溫水少頃病人覺胸中如虫行一
涌而出狀若小蟻娘一二升以手探之又約一升頓
覺病去明日主人出謝曰百歲老人未嘗見此神効
之藥也禮餞二人遂歸嗚呼此二子小人也欲苟一
時之寢遂以穢物治人亦偶得吐法耳又有一婦病
風癘從六七歲因驚風得之自後三二年間一二作
至五七年五七作逮三十餘歲至四十歲日作或一
日十餘作以至昏癡健忘求死而已會與定歲大飢

遂採百草而食於水瀕採一種草狀若葱屬泡蒸而食之食訖向五更覺心中不安吐涎如膠連日不止約一二斗汗出如洗初昏困後三日輕健非曩之比病去食進百脉皆和省其所食不知何物訪問諸人乃慙葱苗也慙葱苗者本草所謂藜蘆苗是也圖經云藜蘆苗吐風病此亦偶得吐法耳又有一婦年三十餘病滑泄經年皆云虛中有積以無憂散五七日服至二十服不効又服纏積丹軟金丸諸藥皆不其入服藥愈速病勢愈甚食飲日減人或謂曰此也宜灸中脘及左右穴臍下氣海及膀胱穴

以三里引之每年當夏至夏至日灸之前後僅萬餘壯忽門外或者曰此病我屢諳蓋大傷飲之故即目桃花正開俟其落時以長棘針刺之得數十莖勿犯人手以白麵和作餅子文武火燒令熟嚼爛以米飲湯下之病人如其言服之不一二時瀉如傾前後瀉六七日僅數百行昏困無所知覺惟索冷水徐徐而飲至六七日少省爾後食日進神日昌氣血日和無數年生二子此人本不知桃花萼有取積之神効亦偶得瀉法耳余昔過株林見一童子誤吞銅鐵之物成疾而羸是不勝身會六七月淫雨不止無薪作食

過飢數日一日隣牛死聞作葵羹粳飯病人乘飢頓
食之良久泄注如傾覺腸中痛遂下所吞之物余因
悟內經中肝苦急食甘以緩之牛肉大棗葵菜皆甘
物也故能寬緩腸胃且腸中久空又遇甘滑之物此
銅鐵所以下也亦偶得瀉法耳頓有老人年八十歲
臟腑澁滯數日不便每臨後時目前星飛頭目昏眩
鼻塞腰痛積漸食減縱得少便結燥如彈一日友人
命食血藏葵羹油滌菠蓀菜遂頓食之日日不之前
後皆利食進神清年九十歲無疾而終圖經云菠菜
利腸胃芝麻油炒而食之利大便葵寬腸利小溲

年老之人大小便不利最為急切此亦偶得瀉法耳
昔一士人趙仲溫赴試暴病兩目赤腫睛翳不能識
路大痛不任欲自尋死一日與同儕釋悶坐於茗肆
中忽鉤窓脫鈎其下正中仲溫額上髮際裂長三四
寸紫血流數升血止自快能通路而歸來日能辨屋
脊次見瓦溝不數日復故此不藥不針誤出血而愈
矣夫出血者乃發汗之一端也亦偶得出血法耳嗚
呼世人欲論治大病舍汗下吐三法其餘何足言哉
此一說讀之者當大笑耳今之醫者宜熟察之可也
人能謹察其真中之誤精究其誤中之真反覆求之

無病不愈余之所以書此者庶後之君子知余之用
心非一日也又有病目不覩者思食苦苣頓頓不關
醫者以為有虫曾不周歲兩目微痛如虫行大眚漸
明俄然大見又如北方貴人愛食乳酪牛酥羊生魚
膾膾脯猪腊海味甘肥之物皆虫之萌也然而不生
虫者蓋筵會中多胡荽蕪荑醬鹵汁皆能殺九虫此
一者亦偶得服食法耳智者讀此當觸類而長之

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

言而可以該醫之旨者其惟發表攻裏乎雖千
言不過在表在裏而已矣欲攻其裏者宜以寒

為主欲發其表者宜以熱為主雖一萬世不可易也
內經言之詳矣今人多錯解其旨故重為之箋發表
不遠熱攻裏不遠寒此寒熱二字謂六氣中司氣之
寒熱司氣用寒時用藥者不可以寒藥司氣用熱時
用藥者不可以熱藥此常理也惟攻裏發表則反之
然而攻裏發表常分作兩塗若病在表者雖畏日流
金之時不避司氣之熱亦必以熱藥發其表若病在
裏者雖堅冰積雪之時不避司氣之寒亦必以寒藥
攻其裏所謂發表者出汗是也所謂攻裏者湧泄是
也王太僕注云汗泄下利皆以其不住於中也夫不

住其中則其藥一去不留雖以寒藥犯司氣之寒熱藥犯司氣之熱亦無害也若其藥留而不出適足以司氣增邪是謂不發不攻寒熱內賊其病益甚無病者必生病有病者必甚若司氣用寒之時病在表而不在裏反以寒藥水其裏不涌不泄堅腹滿痛急下利之病生矣若司氣用熱之時病在裏而不在表反以熱藥燥其中又非發汗則身熱吐下霍亂癰疽瘡疔瘡鬱注下疳瘰腫脹嘔吐衄衄頭痛骨節攣肉痛血泄淋瀝之病生矣以此知非熱不能解表非寒不能解裏是解表常宜熱攻裏常宜寒若反此法是謂

妄造今之用藥者以荆黃湯解表以薑桂藥攻裏此與以水濟水以火濟火何異哉故非徒不効輕者危甚者死夫本草一書不過酸苦甘辛鹹淡六味而已聖人既以辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰又以淡味滲泄為陽是辛甘淡三味以解表酸苦鹹三味以攻裏發表與滲泄非解表而何涌泄非攻裏而何此二者聖人之法盡矣茂以加矣然則醫之法果多乎哉攻裏以寒解表以熱而已矣雖然表病而裏不病者可專以熱藥發其表裏病而表不病者可專以寒藥攻其裏表裏俱病者雖可以熱解表亦可以寒攻

裏此仲景之大小柴胡湯雖解表亦無攻裏最為得
體今之用藥者只知用熱藥解表不察裏之已病故
前所言熱證皆作矣醫者不知罪由已作反謂傷寒
變證以誣病人非一日也故劉河間自製通聖散加
益元散名為雙解千古之下得仲景之旨者劉河間
一人而已然今之議者以為雙解不可攻裏謗議紛
紜坐井小天誠可憾也豈知雙解煎以葱鬚豈鼓涌
而汗之一劑立雪所苦縱不全愈亦可小瘳向所謂
無證亦復不作俟六經傳畢微下而已今醫者不知
一劑物無窮之功乃妄作損胃無窮之謗憤劉河間

有能醫之名設堅白之論以求世譽孰肯剖璞一試
而追悔和氏之刖足哉余之所以屢書此者歎賞音
之難遇也近者余之故人某官不欲斥言其名因病
頭項強狀類傷寒服通聖散雖不得其法猶無害也
醫者見其因通聖散也立毀其非仲景之藥也深不
察其熱已甚矣復以辛熱發之汗出不解發黃血泄
竟如前所言後雖以承氣下之不能已又復下之至
絕汗出其脉猶搏擊然余親見其子言之甚詳至今
士大夫皆不知辛熱一發之過也獨歸罪于通聖散
嗚呼甚矣道之難明也頃余之舊契讀孟堅漢書藝

文志載五苦六辛之說而顏師古輩皆無注解溲特以問余余顧其內經諸書中亦不見其文既相別矣乘蹇且十里外颯然而悟欲復迴以告予之舊契已歸且遠乃今載之以示來者夫五者五臟也臟者裏也六者六腑也腑者表也病在裏者屬陰分宜以苦寒之藥涌之泄之病在表者屬陽分宜以辛溫之劑發之汗之此五苦六辛之意也顏師古不注蓋闕其疑也乃知學不博而欲為醫難矣余又徐思五積六聚其用藥亦不外于是夫五積在臟有常形屬裏宜以苦寒之藥涌之泄之六聚在腑無常形屬表宜以辛溫之藥發之汗之與前五苦六辛亦合亦有表而可用柴胡之涼者猶宜熱而行之裏寒而可用薑附之熱者猶宜寒而行之余恐來者不明內經發表攻裏之旨故併以孟堅五苦六辛之說附于卷末

汗下吐三法該盡治病詮十三

人身不過表裏氣血不過虛實表實者裏必虛裏實者表必虛經實者絡必虛絡實者經必虛病之常也良工之治病者先治其實後治其虛亦有不治其虛時粗工之治病或治其虛或治其實有時而幸中有時而不中謬工之治病實實虛虛其誤人之迹常著

故可得而罪也惟庸工之治病純補其虛不敢治其實舉世皆曰平穩誤人而不見其迹渠亦自不省其過雖終老而不悔且曰吾用補藥也何罪焉病人亦曰彼以補藥補我彼何罪焉雖死而亦不知覺夫粗工之與謬工非不誤人惟庸工誤人最深如鯀湮洪水不知五行之道夫補者人所喜攻者人所惡醫者與其逆病人之心而不見用不若順病人之心而獲利也豈復計病者之死生乎嗚呼世無真實誰能別之今余著此吐汗下三法之詮所以該治病之法也庶幾來者有所憑藉耳夫病之一物非人身素有之

也或自外而入或由內而生皆邪氣也邪氣加諸身速攻之可也速去之可也攬而留之可也雖愚夫愚婦皆知其不可也及其聞攻則不悅聞補則樂之今之醫者曰當先固其元氣元氣實邪自去世間如此妄人何其多也夫邪之中人輕則傳久而自盡頗甚則傳久而難已更甚則暴死若先論固其元氣以補劑補之真氣未勝而邪已交馳橫驚而不可制矣惟脉脫下虛無邪無積之人始可議補其餘有邪積之人而議補者皆鯀湮洪水之徒也今予論吐汗下三法先論攻其邪邪去而元氣自復也况予所論之法

諳練日久至精至熟有得無失所以敢為來者言也
天之六氣風暑火濕燥寒地之六氣霧露雨雹水泥
人之六味酸苦甘辛鹹淡故天邪發病多在乎上地
邪發病多在乎下人邪發病多在乎中此為發病之
三也處之者三出之者亦三也諸風寒之邪結搏皮
膚之間藏于經絡之內留而不去或發疼痛走注麻
痺不仁及四肢腫痒拘攣可汗而出之風痰宿食在
膈或上脘可湧而出之寒濕固冷熱客下焦在下之
病可泄而出之內經散論諸病非一狀也流言治法
非一階也至真要大論等數篇言運氣所生諸病各

斷以酸苦甘辛鹹淡以總括之其言補時見一二然
其補非今之所謂補也文具于補論條下如辛補肝
鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺若此之補乃所以發
腠理致津液通血氣至其統論諸藥則曰辛甘淡三
味為陽酸苦鹹三味為陰辛甘發散淡滲泄酸苦鹹
涌泄發散者歸于汗涌者歸于吐泄者歸于下滲為
解表歸于汗泄為利小溲歸于下殊不知聖人不言補乎曰蓋
人止有三法無第四法也然則聖人不言補乎曰蓋
汗下吐以若草木治病者也補者以穀肉菓菜養口
體者也夫穀肉菓菜之屬猶君之德教也汗下吐之

傳門事類卷之二
屬猶君之刑罰也故曰德教興平之梁肉刑罰治亂
之藥石若人無病梁肉而已及其有病當先誅伐有
過病之去也梁肉補之如世已治矣刑措而不用豈
可以藥石為補哉必欲去大病大瘵非吐汗下未由
也已然今之醫者不得盡汗下吐法各立門墻誰肯
屈已之高而一問哉且予之三法能兼衆法用藥之
時有按有躄有導有減有增有續有止今之醫
者不得予之法皆仰面傲笑曰吐者芫蒂而已矣汗
者麻黃升麻而已矣下者芭荳牽牛朴硝大黃甘遂
芫花而已矣既不得其術從而誣之予固難與之苦

辯故作此詮所謂三法可以兼衆法者如引涎瀝涎
嚏氣追淚凡上行者皆吐法也灸蒸熏漂洗熨烙針
刺砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下乳磨
積逐水破經泄氣凡下行者皆下法也以余之法所
以該衆法也然予亦未嘗以此三法遂棄衆法各相
其病之所宜而用之以十分率之此三法居其八九
而衆所當統一二也或言內經多論鍼而少論藥者
蓋聖人欲明經絡豈知針之理即所謂藥之理即今
著吐汗下三篇各條藥之輕重寒溫于左仍於三法
之外別著原補一篇使不預三法恐後之醫者泥于

補故置之三篇之末使用藥者知吐中有汗下中有
補止有三法內經曰知其要者一言而終是之謂也
凡在上者皆可吐式十四

夫吐者人之所畏且順而下之尚猶不樂况逆而上
之不悅者多矣然自胃已上大滿大實病如膠粥微
丸微散皆兒戲也非吐病安能出仲景之言曰大法
春宜吐蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故宜
吐也涌吐之藥或丸或散中病則止不必盡劑過則
傷人然則四時有急吐者不必直待春時也但仲景
言其大法耳今人不得此法遂廢而不行試以名方

所記者略數之如仲景傷寒論中以葱根白豈鼓湯
以吐頭痛梔子厚朴湯以吐懊懣瓜蒂散以吐傷寒
六七日因下後腹滿無汗而喘者如此三方豈有殺
人者乎何今議予好涌者多也又如孫氏千金方風
論中數方往往皆効近代本事方中稀涎散吐膈實
中滿痰厥失音牙關緊閉如喪神守萬全方以鬱金
散吐頭痛眩暈頭風惡心沐浴風近代普濟方以吐
風散追風散吐口噤不開不省人事以皂角散吐涎
潮總錄方中以常山散吐瘧孫尚方以三聖散吐發
狂神驗方吐舌不正補亡篇以遠志去心春分前服

之預吐瘟疫此皆前人所用之藥也皆有效者何今
之議予好涌者多也惟養生必用方言如吐其涎今
人跛躄校正方已引風門中碧霞丹為證予不須辯
也但內經明言高者越之然名醫錄中惟見太倉公
華元化徐文伯能明律用之自餘無聞乃知此法廢
之久矣今予驟用于千載寂寥之後宜其驚且駭也
惜乎黃帝岐伯之書伊摯仲景之論棄為閑物縱有
用者指為山野無韻之人豈不謬哉予之用此吐法
非偶然也曾見病之在上者諸醫盡其技而不校余
反思之投以涌劑少少用之頗獲微應既久乃廣訪

多求漸臻精妙過則能止少則能加一吐之中變態
無窮屢用屢驗以至不疑故凡可吐令條達者非徒
木鬱然凡在上者皆宜吐之且仲景之論膏上諸實
鬱而痛不能愈使人按之及有涎唾下利十餘行其
脉沉遲寸口脉微滑者此可吐之吐之則止仲景所
謂膏上諸實按之及有涎唾者皆邪氣在上也內經
曰下痢脉遲而滑者內實也寸口脉微滑者上實也
皆可吐之王冰曰上盛不已吐而奪之仲景曰宿食
在上脘當吐之又如宿飲酒積在上脘者亦當吐之
在中脘者當下而去之仲景曰病人手足厥冷兩手

脉乍結以客氣在胃中心下滿而煩欲食不能食者
知病在胃中當吐之余嘗用吐方皆是仲景方中瓜
蒂散吐傷寒頭痛用葱根白豈豉湯以吐雜病頭痛
或單瓜蒂名獨聖加茶末少許以吐痰飲食加全蝎
稍以吐兩脇肋刺痛濯濯水聲者內經所謂濕在上
以苦吐之者其是謂歟今人亦有竊予之法者然終
非口授或中或否或涌而不能出或出而不能止豈
知上涌之法名曰捺痰捺之一字自有擒縱卷舒頃
有一工吐陳下一婦人半月不止延至數斗命懸頃
更倉皇失計求予解之予使煎麝香湯下咽立止或

問麝香何能止吐予謂之曰瓜苗聞麝香即死吐者
瓜蒂也所以立解如藜蘆吐者不止以葱白湯解之
以石藥吐者不止以甘草貫衆解之諸草木吐者可
以麝香解之以本草考之吐藥之苦寒者有豈豉瓜
蒂茶末梔子黃連苦參大黃芩辛苦而寒者有鬱金
常山藜蘆甘苦而寒者有地黃汁苦而溫者有木香
遠志厚朴辛苦而溫者有薄荷芫花辛而溫者有藪
菁草葱根鬚辛而寒者有輕粉辛甘而溫者有烏頭
附子尖酸而寒者有晉礬綠礬釜汁酸而平者有銅
碌甘酸而平者有赤小豈酸而溫者有飯漿酸辛而

寒者有膽礬酸而寒者有青鹽白米飲辛鹹而溫者有皂角甚鹹而寒者有滄鹽甘而寒者有牙硝甘而微溫且寒者有參蘆頭甘辛而熱者有蝎稍凡此三十六味惟常山膽礬瓜蒂有小毒藜蘆荒花輕粉烏附尖有大毒外二十六味皆吐藥之無毒者各對證擢而用之此法宜先小服不滿積漸加之余之撥痰者以釵股雞羽探引不出以藜投之投之不吐再投之且投且探無不出者吐至昏眩慎勿驚疑書曰若藥不瞑眩厥疾弗瘳如發頭眩可飲冰水立解如無冰時新汲水亦可強者可一吐而安弱者可作三次

吐之庶無損也吐之次日有頓快者有轉甚者蓋引之而吐未平也俟數日當再涌之如覺渴者冰水新水瓜梨柿及涼物皆不禁惟禁貪食過飽硬物乾脯難化之物心火既降中脘冲和陰道必強大禁房勞大憂悲思病人既不自責衆議因而噪之歸罪于吐法起謗其由此也故性行剛暴好怒喜淫之人不可吐左右多嘈雜之言不可吐病人頗讀醫書實非深解者不可吐主病者不能辨邪正之說不可吐病人無正性妄言妄從反覆不定者不可吐病勢熾危老弱氣衰者不可吐自吐不止亡陽血虛者不可吐諸

吐血嘔血咯血衄血嗽血崩血失血者皆不可吐吐
則轉生他病浸成不救反起謗端雖懇切求慎勿強
從恐有一失愈令後世不信此法以小不善累大善
也必標本相得彼此相信真知此理不聽浮言審明
其經其絡其臟其腑其氣其血其邪其病決可吐者
然後吐之是予之所望于後之君子也庶幾不使此
道湮微以新傳新耳

凡在表者皆可汗式十五

夫暑濕之氣入于皮膚之間而未深欲速去之莫
如汗聖人之刺熱五十九刺為無藥而設也皆所

以開玄府而逐邪氣與汗同然不若以藥發之使一
毛一竅無不啓發之為速也然發汗亦有數種世俗
止知惟溫熱者為汗藥豈知寒涼亦能汗也亦有薰
漬而為汗者亦有導引而為汗者如桂枝湯桂枝麻
黃各半湯積散敗毒散皆發汗甚熱之藥也如升麻
湯葛根湯解飢湯逼毒散皆辛溫之藥也如大柴胡
湯小柴胡湯柴胡飲子苦寒之藥也如通聖散雙解
散當歸散子皆辛涼之藥也故外熱內寒宜辛溫外
寒內熱宜辛涼平準所謂導引而汗者華元化之虎
鹿熊猴鳥五禽之戲使汗出如傳粉百疾皆愈所謂

薰漬而汗者如張苗治陳廩丘燒地布桃葉蒸之大汗立愈又如許胤宗治許太后感風不能言作防風湯數斛置於牀下氣如煙霧如其言遂愈能言此皆前人用之有驗者以本草校之荊芥香白芷陳皮半夏細辛蒼朮其辛而溫者乎蜀椒胡椒茺藺大蒜其辛而大熱者乎生薑其辛而微溫者乎天麻葱白其辛而平者乎青皮薄荷其辛苦而溫者乎防已秦艽其辛而且苦者乎麻黃人參大棗其甘而溫者乎葛根赤茯苓其甘而平者乎桑白皮其甘而寒者乎防風當歸其甘辛而溫者乎附子其甘辛而大熱者乎

官桂桂枝其甘辛而大熱者乎厚朴其苦而溫者乎桔梗其苦而微溫者乎黃芩知母枳實地骨皮其苦而寒者乎前胡紫胡其苦而微寒者乎羌活其苦辛而微溫者乎升麻其苦甘且平者乎芍藥其酸而微寒者乎浮萍其辛酸而寒者乎凡此四十味皆發散之屬也惟不善擇者當寒而反熱當熱而反寒此病之所以變也仲景曰大法春夏宜汗春夏陽氣在外人氣亦在外邪氣亦在外故宜發汗然仲景舉其略耳設若秋冬得春夏之病當不發汗乎但春夏易汗而秋冬難耳凡發汗欲周身熱熱然不欲如水淋漓

欲令手足俱周遍汗出一二時為佳若汗暴出邪氣
多不出則當重發汗則使人亡陽凡發汗中病則止
不必盡劑要在劑當不欲過也此雖仲景調理傷寒
之法至于雜病復何異哉且如傷寒麻黃之類為表
實而設也桂枝湯之類為表虛而設也承氣陽為陰
虛而設也四逆湯為陽虛而設也表裏俱實者所謂
陽盛陰虛下之則愈表裏俱虛者所謂陰盛陽虛汗
之則愈也所謂陽為表而陰為裏也如表虛亡陽發
汗則死發汗之法辨陰陽別表裏定虛實然後汗之
隨治隨應設若殮泄不止日夜無度完穀下出發汗

可也內經曰春傷於風夏生殮泄此以風為根風非
汗不出昔有人病此者腹中雷鳴泄注米穀不分小
便澁滯皆曰脾胃虛寒故耳豈薤白梅罌粟殼乾薑
附子曾無一効中脘臍下灸已數千燥熱轉甚小溲
涸竭瘦削無力飲食減少命予視之余以謂應象論
曰熱氣在下水穀不分化生殮泄寒氣在上則生膜
脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其兩手脈息
俱浮大而長身表微熱而桂枝麻黃湯以薑棗煎大
劑連進三服汗出終日至旦而愈次以胃風湯和平
臟腑調養陰陽食進病愈又貧家一男子年二十餘

病破傷風搐牙關緊急角弓反張棄之空室無人問者時時呻呼余怜其苦以風藥投之口噤不能下乃從兩鼻竅中灌入咽喉約一中梳死中求生其藥皆大黃其遂牽牛硝石之類良久上涌下泄吐且三四升下一二十行風搐立止肢體柔和旦已自能起口雖開尚未能言予又以桂枝麻黃湯三兩作一服使發之汗出周匝如洗不三日而痊又如小兒之病驚風搐搦涎潮熱鬱舉世皆用大驚丸抱龍丸鎮心丸等藥問有不愈者余潜用瓜蒂赤小豆等分共為細末以猪膽汁浸蒸餅為丸衣以螺青或丹砂以漿水

乳汁送之良久風涎涌出一兩掬三五日一涌涌三五次漸以通聖散稍熱服之汗熱熱然病日已矣頃又治一狂人陰不勝其陽則脉流薄厥陽并乃狂難經曰重陽者狂重陰者癡陽為腑陰為臟非陽熱而陰寒也熱并於陽則狂狂則生寒并於陰則癡癡則死內經曰足陽明有實則狂故登高而歌棄衣而走無所不為是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五六十日下百餘行吐亦七八度如吐時暖室置火以助其熱而汗少解數汗方平又治一酒病人頭痛身熱惡

寒狀類傷寒診其脉兩手俱洪大三兩日不圍余以
防風通聖散約一兩用水一中椀生薑二十餘片葱
鬚根二十莖豈豉一大椽同煎三五沸去滓稍熱分
作二服先服一服多半須臾以釵股探引咽中吐出
宿酒酒之香味尚然約一兩掬頭上汗出如洗次服
少半立愈內經曰火鬱發之發為汗之令其疎散也
又嘗治一稅官病風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛
甚兩足惡寒經五六月間猶綿脛靴足腰膝皮膚少
有汗露則冷風襲之流入經絡其痛轉劇走注上下
淫水無定其痛極處便摩急而腫起肉色不變腠理

間如虫行每遇風冷病必轉增飲食轉減肢體瘦乏
須人扶掖猶能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔
針着灸莫知其數前後三年不獲一愈一日命予脉
之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經散各一服
是夜瀉三十餘行痛減半遂漸服赤茯苓湯川芎湯
防風湯此三方在宣明論中治痺方是也日三服煎
七八錢漿漿然汗出余又作玲瓏竈法薰蒸血熱病
必增劇諸汗法古方亦多有之惟以吐發汗者世罕
知之故予嘗曰吐法兼汗良以此夫

凡在下者皆可下式十六

下之攻病人亦所惡聞也然積聚陳莖于中留結寒熱於內留之則是耶逐之則是耶內經一書惟以氣血通流為貴世俗庸工惟以閉塞為貴又止知下之為瀉又豈知內經之所謂下者乃所謂補也陳莖去而腸胃潔癥瘕盡而榮衛昌不補之中有真補者存焉然俗不信下之為補者蓋庸工妄投下藥當寒反熱當熱反寒未見微功轉成大害使聰明之士亦復不信者此也所以謂寒藥下者調胃承氣湯泄熱之上藥也大小桃仁承氣次也陷胃湯又其次也大柴胡又其次也以涼藥下者八正散泄熱無利小溲洗

心散抽熱蕪治頭目黃連解毒散治內外上下玄明散而不泄者四物湯涼血而行經者也神芎丸解上下畜熱而泄者也以溫藥而下者無憂散下諸積之上藥也十棗湯下諸水之上藥也以熱藥下者煮黃丸纏金丸之類也急則用湯緩則用丸或以湯送丸量病之微甚中病即止不必盡劑過而生愆仲景曰大法秋宜瀉謂秋則陽氣在下人氣與邪氣亦在下故宜下此仲景言其大槩耳設若春夏有可下之疾當不下乎此世之庸工踟躕遷延誤人大病者也皆曰夏月豈敢用過藥瀉脫胃氣嗚呼何不達造化之甚

也內經稱土火之鬱發四之氣以五月先取化源瀉
土補水又曰土鬱則奪之王太僕注云奪謂下之令
無壅礙也然則於五月先防土壅之發令人下奪素
問之言非歟然隨證不必下奪在良工消息之也余
所以言此者矯世俗期不誤大病暴病者耳故土鬱
之為奪雖大承氣湯亦無害也試舉大承氣之藥論
大黃苦寒通九竅利大小便除五臟六腑積熱芒硝
鹹寒破痰散熱潤腸胃枳實苦寒為佐使散滯氣消
痞滿除腹脹厚朴辛溫和脾胃寬中通氣此四味雖
為下藥有泄有補卓然有奇功劉河間又加甘草以

為三一承氣以甘和其中最得仲景之秘也余嘗以
大承氣改作調中湯加以薑棗煎之俗見薑棗以為
補脾胃而喜服不知其中有大黃芒硝也惡寒喜暖
取補故自古及今天下皆然此內經之法抑屈而不
伸者也此藥治中滿痞氣不大便者下五七行殊不
困乏次日必神清氣快膈空食進內經曰脾為之使
胃為之市人之食飲酸鹹甘苦百種之味雜湊于此
壅而不行蕩其舊而新之亦脾胃之所望也况中州
之人食雜而不勞者乎中州土也兼載四象木金水
火皆聚此中故脾胃之病柰何中州之醫不善掃除

倉廩使陳莖積而不能去也猶曰我善補大罪也此藥有奇功皆謂服之便成傷敗乃好母而非素者也或言男子不可久瀉婦人不可久吐何妄論之甚也可吐則吐可下則下豈問男女乎大人小兒一切所傷之物在胃脘如兩手脈遲而滑者內實也宜下之何以別乎蓋傷宿食者惡食傷風者惡風傷寒者惡寒瀉酒者惡酒至易辨也故凡宿食在胃脘皆可下之則三部脈平若心下按之而硬滿者猶宜再下之如傷寒大汗之後重復勞發而為病者蓋下之後熱氣不盡故也當再下之若雜病腹中滿痛不止者此

為內實也金匱要畧曰痛而腹滿按之不痛為虛痛者為實難經曰痛者為實腹中滿痛裏壅為實故可下之不計雜病傷寒皆宜急下之宜大承氣湯或導水丸或泄水丸等藥過十餘行如痛不已亦可再服痛已則止至如傷寒大汗之後發熱脈沉實及寒熱往來時時有涎嗽者宜大柴胡湯加當歸煎服之下三五行立愈產後慎不可作諸虛不足治之必變作骨蒸寒熱飲食不入肌膚瘦削經水不行經曰寒則衰飲食熱則消肌肉人病瘦削皆粗工以藥消礫之故也嗚呼人之死者豈為命乎難經曰實實虛虛損

不足而益有餘如此死者醫殺之耳至如目黃丸疸
食勞皆屬脾土可下之宜茵陳蒿湯或用導水丸禹
攻散瀉十餘行次以五苓散桂苓甘露散白朮丸等
藥服之則愈矣或腰脚胯痛可用甘遂粉二三錢以
積猪腰子薄批七八片搽藥在內以濕紙包數重文
武火燒熟至臨卧細嚼以溫酒或米飲湯調下至平
明見一二十行勿訝意欲止瀉則飲水或新水頓服
之瀉立止次服通經和氣定痛烏金丸躡馬丹之類
則愈矣內經有不因氣動而病生於外者太僕以為
瘴氣賊魅虫毒蜚尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射

剝割撞撲之類至如諸落馬墮井打撲閃肭損折湯
沃火燒車碾犬傷腫發焮痛日夜號泣不止者予尋
常談笑之間立獲大効可峻瀉三四十行痛止腫消乃
以通經散下導水丸等藥如瀉水少則可再加湯劑
瀉之後服和血消腫散毒之藥病去如掃此法得之
睢陽高大明侯德和使外傷者不致癢殘跛蹙之患
余非敢掩人之善意在救人耳曾有鄰人杖瘡發作
腫痛焮及上下語言錯亂時時嘔吐數日不食皆曰
不救余以通經散三四錢下神祐丸百餘丸相併而
下間有嘔出者大半已下膈矣良久大瀉數行穢不

可近膿血涎沫疹毒約一二斗其病人困睡不省一
日一夜隣問予予曰喘息勻停腫消痛減故得睡也
來旦語清食進不數日痊杖瘡欲死者四十年間
二三百余追思舉世杖瘡死者皆枉死也自後凡見
冤人被責者急以導水丸禹功散大作劑料瀉驚涎
一兩盆更無發腫痛焮之難如導水丸禹功散泄瀉
不動更加之通經散神祐丸瀉之瀉訖須息熱物止
可喫新汲水一二頓瀉止立愈至如沉積多年羸劣
者不可便服陡攻之藥可服纏積丹三稜丸之類內
經曰重者因而減之若人年老衰弱有虛中積聚者

止可五日一服萬病無憂散故凡積年之患豈可一
藥而瘡即可減而去之以本草攷之下之寒者有戎
鹽之鹹犀角之酸鹹滄鹽澤瀉之甘鹹枳實之苦酸
膩粉之辛澤漆之苦辛杏仁之苦甘下之之微寒者
有猪膽之苦下之大寒者有牙硝之甘大黃瓜蒂牽
牛苦瓠子藍汁牛膽羊蹄根苗之苦大戟甘遂之苦
甘朴硝芒硝之苦辛下之溫者有檳榔之辛芫花之
苦辛石蜜之甘皂角之辛鹹下之熱者有芑荳之辛
下之辛涼者有猪羊血之鹹下之平者有郁李仁之
酸桃花萼之苦右三十味惟牽牛大戟芫花皂角羊

蹄根苦瓠子苾芾有小毒芭荳其遂膩粉杏仁之有大毒餘皆無毒設若疫氣冒風中酒小兒瘡疹及產後潮熱中滿敗血勿用銀粉杏仁大毒之藥下之必死不死即危且如檳榔犀角皂角皆溫平可以殺虫透關節除腸中風火燥結大黃芒硝朴硝等鹹寒可以治傷寒熱病時氣瘟毒發斑瀉血燥熱發狂大作蕩劑以蕩滌積熱澤瀉羊蹄根苗牛膽藍葉汁苦瓠子亦苦寒可以治水腫遍身腹大如鼓大小便不利及目黃濕毒九疸食癆疳虫食土生米等物分利水然通利大小便蕩滌腸胃間宿穀相搏又若備急丸

以芭荳乾薑大黃三味蜜和丸之亦是下藥然止可施於辛苦勞力貧食葷辣之輩或心腹脹滿脇肋刺痛暴痛不住服五七丸或十丸瀉五七行以救急若施之富貴城郭之人則非矣此藥用砒石治瘡相類止可施之於貧食之人若備急丸治傷寒風溫中酒冒風及小兒瘡疹產後滿悶用之下膈不死則危及夫城郭之人富貴之家用此下藥亦不死則危矣柰何庸人畏大黃而不畏芭荳粗工喜芭荳而不喜大黃蓋庸人以芭荳惟熱而不畏以大黃性寒而畏粗工以芭荳劑小而喜以大黃劑大而不喜皆不知理

而至是也豈知諸毒中惟芭荳為甚去油墮之蠟猶能下後使人津液涸竭留毒不去胸熱口燥他病轉生故下藥以芭荳為禁余嘗用前十餘藥如身之使臂臂之使手然諸洞泄寒中者不可下俗謂休息痢也傷寒脉浮者不可下表裏俱虛者不宜下內經中五痞心證不宜下厥而唇青手足冷內熱深者宜下實者不宜下以脉別之小兒內瀉轉生慢驚及兩目直視魚出氣者亦不宜下若十二經敗甚亦不宜下止宜調養溫以和之如不則必誤人病耳若其餘大瀉大聚大病大秘大涸大堅下藥乃補藥也余嘗曰瀉法兼補法良以此夫

推原補法利害非輕說十七

原補一篇不當作由近論補者與內經相違不得不作耳夫養生當論食補治病當論藥攻然聽者皆逆耳以予言為蔽蓋議者嘗知補之為利而不知補之為害也論補者蓋有六法平補峻補溫補寒補筋力之補房室之補以人參黃耆之類為平補以附子硫黃之類為峻補以苴蔻官桂之類為溫補以天門冬五加皮之類為寒補以芭戟茯苓之類為筋力之補以石燕海馬起石丹砂之類為房室之補此六者近

代之所謂補者也。若施之治病，非徒功效踈濶，至其害不可勝言者。難經言：東方實，西方虛，瀉南方，補北方。此言肝木實而肺金虛，瀉心火，補腎水也。以此論之前，所謂六補者，了不相涉。試舉補之所以為害者：如瘡本夏傷於暑，議者以為脾寒而補之，溫補之則危峻；補之則死傷寒熱病下之後，若以溫辛之藥補之，熱當復作，甚則不救。瀉血血止之後，若溫補之，血復熱，小溲不利，或變水腫霍亂吐瀉，本風濕暍合而為之，溫補之則危峻，補之則死。小兒瘡痍之後，有溫補之，必發癰腫，嫩痛，婦人大產之後，心火未降，腎水

未升，如黑神散補之，輕則危，甚則死。老人目暗耳聾，腎水衰而心火盛也。若峻補之，則腎水彌涸，心火彌茂。老人腎虛，腰脊痛，腎惡燥，腰者腎之府也。峻補之，則腎愈虛矣。老人腎虛無力，夜多小溲，腎主是腎水，虛而火不下，故足痿，心火上乘肺而不入脬囊，故夜多小溲。若峻補之，則火益上行，脬囊益寒矣。老人喘嗽，火乘肺也。若溫補之，則甚峻補之，則危。停飲之人，不可補，補則痞悶；轉增脚重之人，不可補，補則脛膝轉重；男子二十上下而精不足，女子二十上下而血不流，皆二陽之病也。時人不識，便作積冷極憊治之。

以溫平補之夫積溫尚成熱而况燔鍼於臍下火灸手足腕骨內經本無勞證由此變而為勞煩渴咳嗽涎痰肌瘦寒熱往來寢汗不止日高則顏赤皆以為傳尸勞不知本無此病醫者妄治而成之耳夫二陽者陽明也胃之經也心受之則血不流脾受之則味不化故男子少精女子不月皆由使內太過故隱蔽委曲之事各不能為也惟深知涌瀉之法者能治之又如春三月風傷於榮榮為血故陰受之溫傷於衛衛為氣故陽受之初發之後多與傷寒相似頭痛身熱口乾潮熱數日不大便仲景所謂陰陽俱浮自汗

出身重多眠睡目不欲開者是也若以寒藥下之則傷臟氣若以溫藥補之則火助風溫發黃發班溫毒熱增劇矣風溫外甚則直視潮熱譫語撮衣撮空驚惕而死者溫補之罪也內經雖言形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣屬陽天食人以五氣血屬陰地食人以五味者戒乎偏勝非便以溫為熱也又若經云損者補之勞者溫之此溫乃溫存之溫也豈以溫為熱哉又如虛則補其母實則瀉其子者此欲權衡之得其平也又烏在燔鍼壯火煉石燒砒礞石烏附然後為補哉所謂補上欲其緩補下欲其急者

亦焉在此等而為急哉自有酸苦其辛鹹淡寒涼温
熱平更相君臣佐使耳所謂平補者使陰陽兩停是
謂平補柰時人往往惡寒喜温甘受酷烈之毒雖死
而不悔也可勝歎哉余用補法則不_然取其氣之偏
勝者其不勝者自乎矣天之道損有餘乃所以補其
不足也余嘗曰吐中自有汗下中自有補豈不信然
余嘗用補法必觀病人之可補者然後補之昔維陽
府判趙顯之病虛羸泄瀉褐色乃洞泄寒中證也每
聞大黃氣味即注泄余診之兩手脉沉而軟令灸分
水穴一百餘壯次服桂苓甘露散胃風湯白朮丸等

藥不數月而愈又息城酒監趙進道病腰痛歲餘不
愈診其兩手脉沉實有力以通經散下五七行次以
杜仲去麋皮細切炒斷絲為細末每服三錢猪腰子
一枚薄批五七片先以椒鹽淹去腥水搽藥在內裹
以荷葉外以濕紙數重封以文武火燒熟臨卧細嚼
以温酒送之每日以無比山藥丸一服數日而愈又
相臺監酒岳成之病虛滑泄日夜不止腸鳴而口瘡
俗呼為心勞口瘡三年不愈予以長流水同薑棗煎
五苓散五七錢空心使服之以治其下以宣黃連與
白茯苓去皮二味各等分為末以白麵糊為丸食後

溫水下三五十九以治其上百日而愈又汝南節度副使完顏君寶病臟毒下衄血發渴寒熱往來延及六載日漸瘦弱無力面黃如染余診其兩手脉沉而身凉內經寒以為榮氣在故生可治先以七宣丸下五七行次以黃連解毒湯加當歸赤芍藥與地榆散同煎服之一月而愈若此數證余雖用補未嘗不以攻藥居其先何也蓋邪未去而不可言補補之則通足資寇故病蠲之後莫若以五穀養之五菓助之五味益之五菜充之相五臟所宜毋使偏傾可也凡藥有毒也非止大毒小毒謂之毒雖甘草苦參不可不

謂之毒久服必有偏勝氣增而久天之由也是以君子貴流不貴滯貴平不貴強盧氏云強中生百病其知言哉人惟恃強房勞之病作矣何貴於補哉以太宗憲宗高明之資猶陷於流俗之蔽為方士燥藥所誤以韓昌黎无微之猶死於小洩不通水腫有服丹置數妾而死於暴脫有服草烏頭如聖丸而死於鬚瘡有服乳石流黃小洩不通有習氣求嗣而死於精血有嗜酒而死於發狂見鬼有好茶而為癖乃知諸藥而不可久服但可攻邪邪去則已近年運使張伯英病宿傷服硫黃薑附數月一日喪明監察陳威卿

病嗽服腫乳粉數年嘔血而殞嗚呼後之談補者尚
監茲哉

證口眼喎斜是經非竅辨十八

口眼喎斜者俗工多與中風掉眩證一槩治之其藥
則靈寶至寶續命清心一字急風烏犀鐵彈丸其方
非不言治此證也然而不愈者何也蓋知竅而不知
經知經而不知氣故也何謂知竅而不知經蓋人之
首有七竅如日月五星七政之在天也故肝竅目目
為肝之外候肺竅鼻鼻為肺之外候心竅舌舌無竅
舌與腎合而寄竅於耳故耳與舌俱為心之外候俗

工止知目病歸之肝口病歸之脾耳病歸之腎舌病
歸之心更無改張豈知目之內眥上下二綱足太陽
及足陽明起於此目之銳眥足少陽起於此手少陽
至於此鼻之左右足陽明手陽明俠乎此口之左右
亦此兩經環乎此七竅有病不可獨歸之五臟當歸
之六陽經也余曰俗工知竅而不知經者此也何謂
知經而不知氣蓋世之談方藥者不啻千萬止不過
堅勢本草性味其知十二經所出所入所循所環所
交所合所過所注所起所會所屬所絡所上所下所
俠所貫所布所散所結所繞所抵所連所係所約所

同所別千萬人中或見一二名明可謂難其人矣然
而不過執此十二經便為病本將陽經為熱陰經為
寒向本草中尋藥藥燥上檢方而已矣病之不愈又
何訝焉豈知靈樞經曰足之陽明手之太陽筋急則
口目為辟此十二經及受病之處也非為病者也及
為病者天之六氣也六氣者何風暑燥濕火寒是也
故曰俗工知經而不知氣者此也然則口目喎斜者
此何經也何氣也足之太陽足之陽明左目有之右
目亦有之足之陽明手之陽明口左有之口右亦有
之此兩道也靈樞又言足陽明之筋其病頰筋有寒

則急引頰移口熱則筋弛縱緩不勝收故僻是左
右執則左急而右緩右寒左熱則右急而左緩故偏
於左者左寒而右熱偏於右者右寒而左熱也夫寒
不可徑用辛熱之劑蓋左中寒則逼熱於右右中寒
則逼熱於左陽氣不得宣行故也而况風者甲乙木
也口眼陽明皆為胃土風偏賊之此口目之所以僻
也是則然矣七竅惟口目喎斜而耳鼻獨無此病者
何也蓋動則風生靜則風息天地之常理也考之易
象有足相符者震巽主動坤艮主靜動者皆屬木靜
則皆屬土觀卦者視之理也視者目之用也目之上

網則眇下網則不眇故觀卦上巽而下坤頤卦者養之理也養者口之用也口之下頷則嚼上頷則不嚼故頤卦上艮而下震口日常動故風生焉耳鼻常靜故風息焉當思目雖斜而目之睚睚未常斜口之喎而口之輔車未嘗喎此經之受病非竅之受病明矣而况目有風輪唇有飛門者耶余嘗治此證未嘗用世俗之藥非故與世參商方鑿齒圓柄自然齟齬者過頷一長吏病此命予療之目之斜灸以承泣口之喎灸以地倉俱効苟不効者當灸人迎夫氣虛風入而為偏上不得出下不得泄真氣為風邪所陷故宜灸

內經曰陷下則灸之正謂此也所以立愈又嘗過東杞一夫亦患此予脉其兩手急數如弦之張甚力而實其人齒壯氣充與長吏不同蓋風火交勝余調承氣湯六兩以水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前後約瀉四五十行去一兩盆次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬日而愈脉訣云熱則生風君此者不可純歸其病於窓隙之間而得亦風火素感而然也蓋火勝則制金金衰則木茂木茂則風生若東杞之人止可流濕潤燥大下之後使加食通鬱為大靈樞雖有馬膏桂酒雙塗之法此但治其外耳非

治其內也今人不知其本欲以單服熱水強引而行
之未見其愈者也向之用薑附烏桂起石礞黃之劑
者是耶非耶

疝本肝經宜通勿塞狀十九

疝有七前人論者甚多非靈樞素問銅人之論余皆
不取非余好異也但要窮其原耳七疝者何寒疝水
疝筋疝血疝氣疝狐疝癩疝是謂七疝俗工不識因
立謬名或曰膀胱或曰腎冷或曰小腸氣小兒曰偏
氣之名既謬併喪其實何哉蓋醫者既斷為膀胱腎
冷小腸氣又曰虛寒所致其藥之用也不庶葺巴戟

則杜仲菝蓉不附子烏頭則乾薑官桂不練實懷香
則金鈴補骨脂朝吞暮餌曾無殊効三二十年牢不
可去間因微病稍似開通執此微芒浸成大錯標既
不除本必歸甚處處相傳曾無覺者豈知諸疝皆歸
肝經其柰痛流歸之小腸脬囊夫膀胱水府專司滲
泄小腸水道專主通流腎為少陰總統二水人之小
溲自胃入小腸滲入膀胱膀胱者脬囊也氣化則水
出莖端此常道也及其為疝乃屬足厥陰肝經蓋環
陰器而上入小腹者足厥陰肝經也夫肝腎皆屬于
下與衝任督相附然靈樞經言足厥陰肝經病則有

遺溺癆閉孤疝主腎與膀胱小腸三經則不言疝是受疝之處乃肝之部分也且內經男子宗筋為束骨之會也而肝主筋羣者囊中之丸雖主外腎非厥陰環而引之與玉莖無由伸縮在女子則為篡戶其肉外為二其一曰廷孔其二曰窈漏此是厥陰與衝任督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚于陰器其病傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行卧清陰氣故陽明與太陰厥陰之筋皆會于陰器惟厥陰主筋故為疝者必本之厥陰靈樞又言足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽循脛上羣結於莖

其病氣逆羣腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別矣豈非厥陰為受病之處耶靈樞又言邪在小腸連羣係屬於腎貫肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃燻肝散於育結於臍故取之育原以散之刺太陰以平之取厥陰以下之取巨虛下臚以去之按其所過之經以調之此其初雖言邪在小腸至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝關於厥陰可以無疑以脉考之素問云厥陰滑為狐疝少陽滑為肺風疝太陰滑為脾風疝陽明滑為心風疝太陽滑為腎風疝少陰滑為肝風疝凡此六疝雖見於他脉中皆言風疝者

足厥陰肝經之氣也靈樞亦曰心脉微瀯為心疝肝
脉滑甚為癘瘡腎脉滑甚為瘰癧凡此三藏脉之疝
亦以滑為疝也素問又云脉大急皆為疝心脉滑傳
為心疝肺脉沉傳為肺疝三陰急為疝三陽急為瘕
王太僕云太陽受寒血凝為瘕太陰受寒氣聚為疝
此言太陰受寒傳之肝經也可以溫藥逐之不可以
溫藥補之若補之者是欲病去而強挽留之也歷考
素問三陽為病發寒熱其傳為癩疝此亦言膀胱非
受病之處必傳於厥陰部分然後為疝也又言病在
少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒言脉急者

曰疝瘕少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶又
言脾風傳胃名曰疝瘕此謂非肝木不能為風氣名
曰厥疝蓋脾土虛而不能制水又為肝木所凌也又
言督脉為衝疝蓋厥陰與衝二任督俱會於前陰也豈
不明哉至如運氣中又言歲太陽在泉寒淫所勝民
病少腹控辜蓋寒客於小腸膀胱則肝木縮而不得
伸行母傳之子也陽明司天燥淫所勝丈夫癩疝婦
人少腹痛此言肝氣不得上行為金所抑鬼賊故也
又言太陰在泉土勝則寒氣逆滿食飲不下甚則為
疝此亦言寒客太陰濕土土不勝水水傳之肝經也

又嘗徧閱銅人俞穴亦相表裏如背上十三椎俞肝
經言寒疝腹部中行惟陰交一穴言寒疝任脉之所
發也關元一穴言暴疝小腸之募足三陰任脉之會
也中極一穴言疝瘕膀胱之募亦足三陰任脉之會
也曲骨一穴言瘕疝任脉足厥陰之會也其腹部第
二行育淪二穴言寒疝衝脉足少陰之會也四病上
穴言疝瘕衝任脉足少陰腎之會也其腹部第三行
大巨二穴言瘕疝足陽明脉氣之所發也氣衝二穴
言癰疝莖中痛兩丸寒痛亦足陽明脉氣之所發也
其腹部第四行府合二穴言疝痛足六陰厥陰陰維

之交會也亦太陰部三陰陽明支別也衝門二穴言
陰疝足太陰厥陰之會也其在側脇者五樞二穴言
寒疝陰邪上入少腹帶脉下三寸也其在足六經者
足厥陰穴十名言疝者七謂大敦行間太衝中封蠡
溝中都曲泉足少陽穴十四名言疝者一謂丘墟穴
也足太陰穴十一名言疝者一謂陰陵泉也足陽明
穴十五名言疝者一謂陰市穴也足少陰穴十名言
疝者五謂然谷大谿照海交信築賓也足太陽穴十
八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言
疝獨多為疝之主也其穴經穴雖亦治疝終非受疝

之地但與足厥陰相連耳或在臬寒勝木氣攣縮禁
於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀
憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精壅於此
經其病差別如此不知世間之藥多執補從誰而受
其方也信其方則素問靈樞銅人皆非也信素問靈
樞銅人則俗方亦皆非也不知後之君子以孰為是
嗚呼余立於醫四十餘歲使世俗之方人人可療余
亦莫知敢廢也諳練日久因經識病然後不惑且夫
閉瘳陰痿瘳痺精滑白淫皆男子之疝也不可
腎冷血涸不月月罷臨膝上熱足臂噬乾瘳

閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子
之疝也但女子不謂之疝而謂之瘳若年少而得之
不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干腎
腎小腸之事乃是厥陰肝經之職也柰俗方止言腎
腎小腸殊不知肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也
木屬東方為心火之母也凡疝者非肝木受邪則肝
木自甚也不可使言虛而補之難經所謂東方實西
方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自
旺也昔審言為蔡之參軍也因坐濕地疝痛不可堪
諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉三十餘行腫立

消痛立減又項關一男子病卒疝暴痛不任倒于
衢人莫能動呼予救之余引經證之邪氣客于足厥
陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也余急瀉大敦二穴
大痛立已夫大敦穴者乃是厥陰之二穴也殄寇鎮
一夫病瘡瘡發渴痛飲蜜漿劇傷冰水醫者莫知瀉
去其濕反雜進薑附濕為燥執所壅三焦閉溢水道
不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導水百
餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失
痛之所在近穎尾一夫病卒疝赤腫大痛數日不止
諸藥如水投石余以導水一百五十九令三次咽之

次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下臟腑穢積之物
數行痛腫皆去不三日平復如故內經曰木鬱則達
之達謂吐也令條達肝之積本當吐者然觀其病之
上下以順為貴仲景所謂上宜吐下宜瀉者此也敢
列七疝圖于左以示後之君子庶幾有所憑籍者焉
寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控辜丸而痛
得於坐卧濕地或寒月涉水或置雨雪或臥坐磚石或
風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子
水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶
或囊痒而燥出黃水或少腹中按之作水聲得於飲

水醉酒使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中
故水多令人為卒疝宜以逐水之劑下之有漏鍼去
水者人多不得其法

筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或
莖中痛痛極則痒或挺縱不收或白物如精隨洩而
下久而得於房室勞傷及邪術所使宜以降心之劑
下之

血疝其狀如黃瓜在少腹兩傍橫骨兩端約中俗云
便難得於重感春夏大燠勞動使內氣血流溢滲入
疝囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和血之劑

下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣
鬱之而脹怒哭號罷則氣散者是也有一治法以鍼
出氣而愈者然鍼有得失宜以散氣之藥下之或小
兒亦有此疾俗曰偏氣得於父已年老或年少多病
陰痿精怯強方入房因而有子胎中病也此疝不治
惟築賓一穴言之

狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中
狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下
往來正與狐相類也亦與氣疝大同小異今入帶鉤

鈴是也宜以逐氣流經之藥下之
癩疝其狀陰囊腫緝如升如斗不痒不痛者是也得
之地氣卑濕所生故江淮之間秋塘之處多感此疾
宜以去濕之藥下之女子陰戶突出雖亦此類乃熱
則不禁固也不可便謂虛寒而澁之燥之補之本名
曰癩宜以苦下之以苦堅之主水云陽氣下墜陰氣
上爭上爭則寒多下墜則筋緩故畢垂縱緩因作癩
疝也已上七疝下去其病之後可調則調可補則補
各量病勢勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者癩
癩疝也不可不下

五虛五實攻補懸絕法二十

虛者補之實者瀉之雖三尺之童皆知之矣至於五
實五虛豈可與泛泛虛實用藥哉內經明言其狀如
俗工不識何此二證所以見殺於委靡之手也坐視
人之死猶相夸曰吾藥穩以誑病家天下士大夫亦
誠以為然以誑天下後世豈不怪哉夫一身猶一國
也如尋邑百萬圍昆陽此五實證也故蕭王親犯中
堅而篤戰如河內飢而又經火災此五虛證也故汲
黯不避矯詔而發倉此可與達權知變者論不可與
貪常嗜冒頓者說也故曰庸人誤天下庸王誤病人正

一理也內經曰五實者死五虛者亦死夫五實者謂
五臟皆實也五虛者謂五臟皆虛也府病為陽易治
而鮮死臟病為陰而難治多死經明言脈盛皮熱腹
脹前後不通悶瞖者五實也脈盛為心皮熱為肺腹
脹為脾前後不通為腎悶瞖為肝五臟皆實之證也
五虛者反是脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入者
五虛也脈細為心皮寒為肺氣少為肝泄利前後為
腎飲食不入為脾此五臟皆虛之證也夫五實為五
臟俱太過五虛為五臟俱不及內經言此二證皆死
謂必死也謂不救則死救之不得其道亦死也其

儒門事親卷之三

戴人張子和著

喉舌緩急砭藥不同解二十一

咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以喉氣故喉氣通於天咽以嚥物故咽氣通於地會厭與喉上下以司開闔食下則吸而捲氣上則呼而出是以舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交為用闕一則飲食廢而死矣此四者乃氣與食出入之門戶最急之處故難經言七衝門而會厭之下為吸門及其為病也一言可了一言者何曰火內經曰一陰

一陽結謂之喉痺。王太僕註云：一陰者，手少陰君火。心主之脈氣也。手少陽相火，三焦之脈氣也。二火皆主脈，並絡於喉。氣熱則內結，結甚則腫脹。腫脹甚則痺痺甚而不通，則死矣。夫足少陰循喉嚨，俠舌本。少陰上俠咽，此二者誠是也。至於足陽明下人迎，循喉嚨，足太陰俠咽，連舌本。手太陽循咽，下菴足厥陰循喉嚨。之後，此數經皆言咽喉，獨少陽不言咽喉。而內經言一陰一陽謂之喉痺，何也？蓋人讀十二經多不讀靈樞經中別十一篇，其載十二經之正，其文云：足少陽之正，繞脾入毛際，合於厥陰，別者入季脇間，循膏

裏屬膽，散之上肝，貫心。以上俠咽，出頤頷，散於面，繫目系，合少陽於外眥也。又手心主之正，別下淵腋入膏中，別屬三焦，出循喉嚨，出耳後，合少陽完骨之下。是手少陽三焦之氣與手心主少陰之氣相合而行于喉嚨也。推十二經，惟足太陽別項下，其餘皆湊于喉嚨。然內經何為獨言一陰一陽結為喉痺？蓋君相二火獨勝，則熱結正絡，故痛且速也。余謂一言可了者，火是也。故十二經中言嗑乾、嗑痛、咽腫、頤腫、舌本強，皆君火為之也。唯喉痺急速相火之所為也。夫君火者，猶人火也。相火者，猶龍火也。人火焚木，其勢緩。

龍火焚木其勢速內經之言喉痺則咽與舌在其間耳以其病同是火故不分也後之醫者各詳其狀強立八名曰單乳蛾雙乳蛾單閉喉子舌脹木舌脹纏喉風走馬喉閉熱氣上行結薄於喉之兩傍近外腫作以其形似是謂乳蛾一為單二為雙也其比乳蛾差小者名閉喉熱結於舌下復生一小舌子名曰子舌脹熱結於舌中舌為之腫名曰木舌脹木者強而下柔和也熱結於咽項腫遠於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉痺此八症之名雖詳若不歸之火則相去遠矣其微者可以

鹹熨之而大者以辛散之今之醫者皆有其藥也如薄荷烏頭疆蚕白礬朴硝銅礫之類也至于走馬喉痺何待此乎其生死人反掌之間耳其最不誤人者無如砭鍼出血血出則病已易曰血去惕出良以此夫昔余以治一婦人木舌脹其舌滿口諸藥不愈余以鉗鍼小而銳者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈斗又治一男子纏喉風腫表裏皆作藥不能下余以涼藥灌於鼻中下十餘行外以拔毒散傳之陽起石燒赤與伏龍肝各等分細末每日以新水掃百遍三日熱始退腫始消又嘗治一貴婦喉痺

蓋龍火也。雖用涼劑，而不可使令服為龍火。宜以火逐之。人火者，烹飪之火是也。乃使爆於烈日之中，登于高堂之上，令侍婢携火爐坐藥銚于上，使藥常極熱，不至大沸，通口時時呷之，百餘次，龍火自散。此法以熱行寒，不為熱病，杆格故也。大抵治喉痺，用鍼出血最為上策。但人畏鍼，委曲傍求，瞬息喪命。凡用鍼而有鍼創者，宜搗生薑一塊，調以熱白湯，時時呷之。則創口易合。銅人中亦有灸法，然痛微者可用。病速者，恐遲則殺人，故治喉痺之火，與救火同，不容少待。內經火鬱發之，發謂發汗。然咽喉中豈能發汗，故出血者，乃發汗之一端也。及之君子，毋執小方，而曰藥不動臟腑，又妙於出血。若幸遇小疾，而獲功，不幸遇大病而死矣。毋遺後悔可矣。

五積六聚治同，齮斷二十二

先賢說五積六聚，甚明。惟治法獨隱。其言五積曰：肝之積名曰肥，氣在左脇下，如覆杯，有頭，足久不已，令人發欬，逆瘕瘡連歲不已者是也。心之積名曰伏梁，起於臍大如臂，上至心，下久不已，令人病煩，心脾之積名曰痞，氣在胃脘，覆大如盤，久不已，令人四肢不收，發黃疸，飲食不為肌膚，俗呼為食勞黃也。肺之積

名曰息賁在右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘嗽發肺癰腎之積名曰賁豚發于少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣此五積之狀前賢言之豈不分明徧訪醫門人人能道及問治法不過三稜廣茂乾漆硃砂陳皮蒙石芭荳之類復有不明標本者又從而補之豈有病積之人大邪不出而可以補之乎至于世之磨積取積之藥今初學醫時苦曾用之知其不効遂為改輒因考內經驟然大悟內經曰木鬱則達之火鬱發之上鬱奪之金鬱泄之水鬱折之王太僕曰達謂吐發謂

汗奪謂下泄謂利小便折謂折其衝逆此五者五運為司天所刺故立此五法與五積若不相礙然蓋五積者因受勝己之邪而傳於己之所勝適當旺時拒而不受復還於勝己者勝己者不肯受因留結為積故肝之積得於季夏戊己日心之積得於秋庚辛日脾之積得於冬壬癸日肺之積得於春甲乙日腎之積得於夏丙丁日此皆抑鬱不伸而受其邪也豈待司天克運然後為之鬱哉且積之成也或因暴怒喜悲思恐之氣或傷酸苦甘辛鹹之食或停溫涼熱寒之飲或受風暑燥寒火濕之邪其初甚微可呼吸按

道旁寸大而去之。不幸而遇庸醫強補而留之，留而不去，遂成五積矣。肥氣者不獨氣有餘也，其中亦有血矣。蓋肝藏血故也。伏梁者火之鬱也，以熱藥散之則益甚。以火灸之則彌聚。况伏梁證有二名，同而實異，不可不詳焉。其一伏梁上下左右皆有根在腸胃之外，有大膿血，此伏梁義同肚癰。其一伏梁身體髀股胛皆腫環臍而痛，是為風根，不可動，動則為水瀦。瀦之病此二者內經雖言不可動止，謂不可大下，非謂全不可下。恐病去而有害。痞氣者舉世皆言寒則痞內經以為濕則痞，雖因飲冷而得其陽氣為濕所

畜以熱攻之則不散，以寒攻之則濕去而寒退矣。息賁者喘息憤而上行也。此舊說也。余以調賁者賁門也，手太陰之筋結膺裏。賁續賁下抵季脇，其病支轉筋痛甚則成息賁。手心主結於臂，其病臂痛息賁。又云肺下則居賁，迫肝善脇下痛。肝高則止支賁兩脇惋為息賁。若是言之是積氣於賁而不散，此靈樞說五臟處言此賁自是多故。予發之賁脈者賁與奔同。銅人言或因讀書得之，未必皆然也。腎主骨，此積最深難療。大忌吐瀉，以其在下止宜下之。故予嘗以獨聖散吐肥氣，搦以木架必與室中吐無汗也。肝之

積滯言風也吐出數升後必有血一二滴勿疑病當
然也續以磨積之藥調之嘗治伏梁先以茶調散吐
之無汗以禹功導水奪之繼之以降火之藥調之又
嘗治痞氣萬舉萬全先以荻蒂散吐其酸苦黃膠腥
腐之物三二升次以導水禹功下二三十行末以五
苓淡劑等藥調之又嘗治息賁用荻蒂散不計四時
置之煨室中更以火一爐以助其汗吐汗下三法齊
行此病不可逗遛久則傷人又嘗治賁豚以道朮通
經三日一下之一月十下前後百行次用治血化氣
磨積之藥調之此積雖不傷人亦與人偕老若六聚

之物在府屬陽而無形亦無定法倣此而行之何難
之有或言余之治積太峻予曰不然積之在臟如陳
莖之在江河且積之在臟中間多着脂膜曲折之處
區曰之中陳莖之在江河不在中流多在江灣洄蕩
之地遇江河之溢一漂而去積之在臟理亦如之故
予先以丸藥驅逐新受之食使無梗塞其碎着之積
已離而未下次以散藥滿胃而下橫江之筏一壅而
盡設未盡者以藥調之惟堅積不可用此法宜以漸
除內經曰堅者削之今人言塊癖是也因述九積圖
附于篇末以俟來哲知余用心獨苦久矣而世無知

者食積酸心腹滿大黃牽牛之類甚者蒙后芭荳
酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者其遂牽牛
氣積噫氣痞塞木香檳榔之類甚者枳殼牽牛
涎積咽如拽鋸朱砂膩粉之類甚者苾芾其逐
痰積涕唾稠粘半夏南星之類甚者苾芾藜蘆
癖積兩脇刺痛三稜廣茂之類甚者其遂蝎稍
水積足脛脹滿郁李商陸之類甚者其遂芫花
血積打撲胸疼產後不月桃仁地榆之類甚者蟲虫
水蛭

因積癥瘤核癰膩粉白丁香砒刺出血甚者硃砂信
石九積皆以氣為主各據所屬之狀而對治之今人
總此諸藥併為一方曰可治諸積大謬也吾無此病
焉用此藥吾無彼病焉用彼藥十羊九牧何所適從
非徒無益而又害之

斥十膈五噎浪分支派疏二十三

病派之分自巢氏始也病失其本亦自巢氏始也何
者老子曰少則得多則惑且俗謂噎食一證在內經
苦無多語惟曰三陽結謂之膈三陽者謂大腸小腸
膀胱也結謂結熱也小腸熱結則血脉燥大腸熱結
則後不圍膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後闕

塞下既不通必反上行此所以噎食不下縱下而復出也謂胃為水穀之海日受其新以易其陳一日一便乃常度也今病噎者三日五日或五七日不便是乖其度也亦明矣豈非三陽俱結於下廣腸枯涸所食之物為咽所拒縱入太倉還出咽隘此陽火不下推而上行也故經曰少陽所至為嘔涌溢食不下此理豈不曉然又氣厥論云肝移寒於心為狂膈中陽氣與寒相薄故膈食而中不通此膈陽與寒為之也

六節藏象又云人迎四盛以上為格太僕云陽盛之極故膈拒而食不得入正理論

曰格則吐逆故膈亦當為格後世強分為五噎謂氣憂食思勞也後又分為十膈五噎其派既多其惑滋甚人之溢食初未必遽然也初或傷酒食或胃熱欲吐或冒風欲吐醫氏不察本原火裏燒薑湯中煮桂丁香未已荳蔻繼之葷撥未已胡椒繼之雖曰和胃胃本不寒雖曰補胃胃本不虛設如傷飲止可逐飲設如傷食止可逐食豈可言虛便將熱補素問無者於法猶非素熱之人三陽必結三陽既結食必上潮醫氏猶云胃寒不納燔鍼鑢肉炷艾灼肌苦楚萬千三陽熱結分明一句到了難從不過抽薪最為緊要

揚湯止沸愈急愈增歲月彌深為醫所誤人言可下
退陽養陰張眼吐舌恐傷元氣止在冲和閉塞不通經
無來路腸宜通暢是以鳴腸腸既不通遂成噎病世
傳五噎寬中散有薑有桂十膈散有附有烏今予既
斥其方信乎與否以聽後賢或云憂志氣結亦可下
乎余曰憂志壅滯便同大鬱太倉公見此皆下法廢
以來千年不復今代劉河間治膈氣噎食用承氣三
湯獨超

近代今用藥者不明主使如病風狂噎噎不及觀其
猶昧本原既懶問咨妄興非毀今予不恤姑示后

人用藥之時更宜慎重假如悶久慎勿陡攻縱得攻
開必慮後患宜潤養小着湯丸累累加之關局自
透其或咽噎上阻涎痰輕用苦酸微微涌出因而治
下藥勢易行設或不行蜜塩下導始終勾引兩藥相
通結散陽消飲食自下莫將芭荳耗却天真液燥津
枯留毒不去人言此病曾下奪之從下奪來轉虛轉
痞此為芭荳非大黃牽牛之過箕城一酒官病嘔吐
踰年不愈皆以胃寒治之丁香半夏青陳薑附種種
燥熱燒錐燎艾莫知其數或少愈或復劇且十年大
便澁燥小便赤黃命予視之予曰諸痿喘嘔皆屬于

上王太僕云上謂上焦也火氣炎上之氣謂皆熱甚而為嘔以四生丸下三十行燥糞腸垢何啻數升其人昏困一二日類以冰水呷之漸投涼乳酪芝蔴飲時時嚥之數日外大啜飲食精神氣血如昔繼生三子至五旬而卒

飲當去水溫補轉劇論二十四

留飲止證也不過蓄水而已王氏脉經中派之為四痰飲懸飲支飲溢飲千金方又派之為五飲皆觀病之形狀而定名也今予皆不論此論飲之所得其來有五有憤鬱而得之者有困乏而得之者有思慮而

得之者有痛飲而得之者有熱時傷冷而得之者飲證雖多無出于此夫憤鬱而不得伸則肝氣乘脾脾氣不化故為留飲肝主慮久慮而不決則飲氣不行脾主思久思而不已則脾結故亦為留飲人因勞役遠來乘困飲水脾胃力衰因而嗜卧不能布散於脉亦為留飲人飲酒過多腸胃已滿又復增之脾經不及滲泄久久如斯亦為留飲因隆暑津液焦涸喜飲寒水本欲止渴乘快過多逸而不動亦為留飲人若病飲者豈能出此五者之外乎夫水者陰物也但積水則生濕停酒則發燥久則成痰在左脇者同肥氣

在右脇者同息賁上入肺則多嗽下入大腸則為瀉
入腎則為涌水濯濯如囊漿上下無所之故在太陽
則為支飲皆由氣逆而得之故濕在上者目黃面浮
在下者股膝腫厥在中者支滿痞隔痰逆在陽不去
者久則化氣在陰不去者久則成形今之用方者例
言飲為寒積皆用濕熱之劑以補之燥之夫寒飲在
中反以熱藥從上投之為寒所拒水濕未除反增心
火火既不降水反下注其上焦枯其下寒慄內經曰
出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危渠不信夫
况乎留飲下無補法氣方隔塞補則轉增豈知內經

所謂留者攻之何後人不師古之甚也且以白木參
苓飲者服之尚加悶塞况燔鍼艾火其痞可知前人
處五飲丸三十餘味其間有礬石芭荳附子烏頭雖
是下攻終同燥熱雖亦有寒藥相參力孤無援故今
代劉河間依仲景十棗湯製三花神祐丸而加大黃
牽牛新得之疾下三五十九氣流飲去昔有病此者
數十年不愈予診之左手脉三部皆微而小右手脉
三部皆滑而大微小為寒滑大為燥余以葦薈散湧
其寒痰數升汗出如沃次以導水禹功去腸胃中燥
垢亦數升其人半愈然後以淡劑流其餘蘊以降火

之劑開其胃口不踰月而痊夫黃連黃蘗可以清上燥濕黃芪茯苓可以補下滲濕二者可以收後不可以先驅復未盡者可以苦葶藶杏仁桑白皮椒目逐水之藥伏水皆去矣夫治病有先後不可亂投邪未去時慎不可補也大邪新去恐反增其氣轉甚於未治之時也昔河內有人病飲醫者斷為脾濕以木香牽牛二味散之下十餘行因給病人復變散為丸又下十餘行復變丸為散又十餘行病者大困睡幾一晝夜既覺腸胃寬潤惟思粥食少許日漸愈雖同斷為濕但補瀉不同其差至此內經曰歲土太過雨濕

流行腎水受邪甚則飲發中滿太陽司天濕氣變物水飲內畜中滿不食註云此年太陰在泉濕監於地病之原始地氣生焉少陰司天濕土為四之氣民病飢衄飲發又土鬱之發民病飲發注下附腫身重又太陰所至為積飲否隔又太陰所至畜滿又太陰之勝與太陰之復皆云飲發于中以此考之土主濕化不主寒水主寒化不主濕天多齡雨地有積潦皆以為水在內經屬土水霜凝沍風氣凜凜此水之化也故曰丑未太陰濕土辰戌太陽寒水二化本自不同其病亦異夫濕土太過則飲發于中今人以為脾土

不足則軒歧千古之書可從乎不可從乎

嗽分六氣母拘以寒述二十五

嗽與咳一證也後人或以嗽為陽欬為陰亦無考據且內經欬論一篇純說嗽也其中無欬字由是言之咳即嗽也嗽即咳也陰陽應象大論云秋傷於濕冬生咳嗽又五藏生成篇云欬嗽上氣又診要經終云春刺秋分環為欬嗽又示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣之逆也素問惟以四處連言欬嗽其餘篇中此言咳不言嗽乃知咳嗽一證也或言嗽為別一證如傷寒書中說欬逆即咽中作梯磴之聲者是也此一說

非內經止以嗽為欬生氣通天論云秋傷於濕上逆而欬與太象論文義同而無嗽字乃知欬即是嗽明矣余所以若論此者孔子曰必也正名乎嗽之為病自古歸之肺此言固不易也素問言肺病喘欬逆又曰欬嗽上氣厥在胷中過在手太陰陽明靈樞十二經惟太陰肺經云肺脹滿膨膨而喘咳他經則不言素問欬論雖言五臟六腑皆有欬要之止以肺為主素問言皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣註云邪謂寒氣經又曰邪氣以從其合也其寒飲食入胃從脾脉上至于肺則肺寒肺寒則內外合邪因而客之則

為肺欬後人見是言斷嗽為寒更不參較他篇豈知
六氣皆能嗽人若謂欬止為寒邪何以歲火太過炎
暑流行金肺受邪民病欬嗽歲木不及心氣晚治上
勝肺金欬而孰從革之紀金不及也其病嚏欬堅成
之紀金太過也上徵與正商同其病欬少陽司天火
氣下臨肺金上從欬嚏衄少陽司天火淫所勝欬唾
血煩心少陽司天主勝則膏滿欬少陽司天之氣熱
鬱於上欬逆嘔吐三之氣炎暑至民病欬嘔終之氣
陽氣不藏而欬少陽之復枯燥煩執齏瘳欬衄甚則
欬逆而血泄少陰司天熱氣生於上清氣生於下寒

熱凌犯而生于中民病欬喘三之氣天政布大火行
餘火內格腫於上欬喘甚則血溢少陰司天客勝則
孰嚏甚則咳喘少陰之復燥熱內作氣動於左上行
於右欬皮膚痛則入肺欬而鼻淵若此之類皆生於
火與熱也豈可專於寒乎謂欬止於熱與火耶厥陰
司天客勝則耳鳴掉眩甚則欬若此之類乃生於風
豈可專於熱與火也謂欬專於風耶太陰司天濕淫
所勝欬唾則有血太陰之復濕變乃舉飲發于中欬
喘有聲若此之類乃生於濕豈可專於風也謂咳止
於濕耶金鬱之發民病欬逆心脇痛歲金太過燥氣

流行肝木受邪民病欬逆甚而嘔血陽明司天
金火合德民病欬噎塞陽明司天燥淫所勝欬腹中
鳴陽明司天清復內餘則欬衄噎塞心膈中熱欬不
止而目血出者死陽明之勝清發于中噎塞而欬陽
明之復清氣大舉欬噎煩心若此之類皆生于燥豈
可專於濕也謂欬止於燥耶太陽司天客氣勝則育
中不利出清涕感寒則欬若此之類乃生於寒豈可
專於燥也又肺風之狀多汗患風色眇然白時欬短
氣晝日則差夜暮則甚亦風欬也勞風咳出青黃涕
其狀如膿大如彈丸亦風咳也有所亡失所求不得

則發肺鳴鳴則肺熱葉焦亦熱欬也陽明厥逆喘欬
身熱亦熱欬也一陽發病少氣善欬亦火欬也喘欬
者水氣并於陽明亦溫欬也風水不能正偃則欬亦
溫欬也腎氣腹大脰腫喘欬身重亦溫欬也脾痺者
四肢懈墮發咳嘔汗上為大寒亦寒欬也欬之六氣
固然可以辨其六者之狀

風乘肺者日夜無度汗出頭痛涎痰不利非風欬之
云乎

熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦多有
之非暑欬之云乎

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢非火
欬之云乎

燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來
皮膚乾枯細瘡燥痒大便秘澁涕唾稠粘非燥欬之
云乎

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐卧濕地或冒冷風
寒秋冬水中感之嗽急而喘非寒欬之云乎其法治
也風之嗽治以通聖散加半夏大人參半夏丸甚者
汗之暑之嗽治以白虎湯洗心散涼膈散加蜜一日
呷之火之嗽治以黃連解毒湯洗心散三黃丸甚

者加以鹹寒天下之濕之嗽治以五苓散桂苓甘露
散及白朮丸甚者以三花神祐丸下之燥之嗽治以
木香葶藶散大黃黃連阿膠丸甚者以鹹寒天下之
寒之嗽治以寧神散寧肺散有寒痰在上者以苧蒂
散越之此法雖已幾於萬全然老幼強弱虛實肥瘦
不同臨時審定權衡可也病有變態而吾之方亦與
之俱變然則枯槁乾薑烏梅罌粟殼其誤人也不為
少矣嗚呼有人自幼欬至老不愈而亦不死者余
平生見此等無限或小年欬不計男女不數月而
殞者亦無限矣夫寧神寧肺散此等之人豈有不曾

服者哉其不愈而死者以其非寒嗽故也彼執款冬
花佛耳草至死不移者雖與之割席而坐可也曹魏
時軍吏李成苦欬晝夜不寐時吐膿血華佗以謂
欬之所吐非從肺來以苦劑兩錢七吐膿血二升餘
而瘥若此之嗽人不可不知也

九氣感疾更相為治衍二十六

天以氣而燾地以氣而持萬物盈乎天地之間咸以
氣而生及其病也莫不以氣而得且風之氣和平而
當暑熱之氣暄而舒榮火之氣炎暑而出行濕之氣
溽而負盈燥之氣清勁而悽愴寒之氣寒氣而歸

藏此六氣時化司化之常也及其變風之氣飄怒而
反大涼熱之氣大暄而反寒火之氣飄風燔燎而反
霜凝濕之氣雷霆驟注而反烈風燥之氣散落而反
濕寒之氣寒雪霜霰而反白埃此六氣之變也故天
久寒則治之以暑天久涼則治之以暄天久晦則治
之以明天久晴則治之以雨夫天地之氣常則安變
則病而况人稟天地之氣五運迭侵於其外七情交
戰於其中是以聖人嗇氣如持至寶庸人役物而反
傷大和此軒岐所以論諸痛皆因於氣百病皆生於
氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而為九所

謂九者怒喜悲恐寒暑驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣王太僕云恐則傷精却上而不下流下焦陰氣亦迴環而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也新校正云不行當作下行寒則腠理閉氣不行氣收矣王太僕云身涼則衛氣沉故皮膚之理及

滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂于中而不散也炆則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣王太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣王太僕云疲勞役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣王太僕云繫心不散故氣亦停留此素問之論九氣其變甚詳其理甚明然論九氣所感之疾則略惟論嘔血及

殮泄余皆不言惟靈樞論思慮悲哀喜樂愁憂感怒
恐懼而言其病其言曰知者知養生也必順四時而
適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而和剛柔如是則
辟邪不至而長生久視是故怵惕思慮則傷神神傷
則恐懼流淫而不至因悲哀動中者竭絕而失生喜
樂者神蕩散而不藏愁慮者氣閉塞而不行盛怒者
神迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不收怵惕思慮而傷
神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛瘁色天死于冬脾
憂愁而不解則傷意意傷則恍亂四肢不舉毛瘁色
天死于春肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不

正當人陰而攣筋兩脇不舉毛瘁色天死于秋肺喜
樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛
瘁色天死于夏腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘
其前腰脊不可俛仰屈伸毛瘁色天死于季夏恐懼
不解則傷精精傷則骨痠厥精時自下是故五臟主
藏精者也不可傷傷則失守而陰虛虛則無氣無氣
則死矣靈樞論神意魂魄志精所主之病然無寒暑
驚勞四證余以是推而廣之怒氣所至為嘔血為殮
泄為煎厥為薄厥為陽厥為胸滿脇痛食則氣逆而
不下為喘渴煩心為消痺為肥氣為目暴盲耳暴閉

筋解發于外為疽癰喜氣所至為笑不休為毛髮焦
為內病為陽氣不收甚則為狂悲氣所至為陰縮為
筋攣為肌痺為脉痿男為數洩血女為血崩為酸鼻
辛頰為目昏為少氣不足以息為泣則臂麻恐氣所
至為破胭脫肉為骨酸痿厥為暴下綠水為面熱膚
急為陰痿為懼而脫頤驚氣所至為潮涎為目眇為
口喏為癡癰為不省人為僵仆久則為痛痺勞氣所
至為咽噎病為喘促為嗽血為腰痛骨痿為肺鳴為
高骨壞為陰痿為唾血為冥視為耳閉男為少精女
為不月衰甚則潰潰平苦壞都汨汨乎不可止思氣

所至為不眠為嗜酢為昏瞽為中痞三焦閉塞為咽
噎不利為膽痺嘔苦為筋痿為白淫為得後與氣快
然如衰為不嗜食寒氣所至為上下所出水液澄徹
清冷下痢清白吐痢腥穢食已不飢堅痞腹滿急痛
癥瘕癩疝屈伸不便厥逆禁固炆氣所至為喘嘔吐
酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大而鼓之有聲如
鼓瘡疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞽鬱腫脹鼻窒軌
衄血溢血泄淋悶身熱惡寒甚則瞽瘖目昧不明耳
鳴或聾躁擾狂越罵詈驚駭禁慄如喪神守氣逆衝
上噎腥涌溢食不下附腫疼痲暴痞暴注暴病暴死

凡此九者內經有治法但以五行相勝之理治之夫
怒傷肝肝屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木太過
則肝亦自病喜傷心心屬火喜則氣并於心而肺金
受邪火太過則心亦自病悲傷肺肺屬金悲則氣并
於肺而肝木受邪金太過則肺亦自病恐傷腎腎屬
水恐則氣并於腎而心火受邪水太過則腎亦自病
思傷脾脾屬土思則氣并於脾而腎水受邪土太過
則脾亦自病寒傷形形屬陰寒勝熱則陽受病寒太
過則陰亦自病熱傷氣氣屬陽熱勝寒則陰受病熱
太過則陽亦自病凡此七者更相為治故悲可以治

怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以譁浪藝狎
之言娛之恐可以治喜以迫遽死亡之言怖之怒可
以治思以污辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼
志此之言奪之凡此五者必詭詐譎恠無所不至然
後可以動人耳目易人視聽若胸中無材器之人亦
不能用此五法也炆可以治寒寒在外者以焮鍼焮
熨烙灸湯而汗之寒在內者以熱食溫劑平之寒可
以治炆炆在外者以清房涼榻薄衣以清劑汗之炆
在內者以寒飲寒劑平之惟逸可以治勞經曰勞者
溫之溫謂溫存而養之今之醫者以溫為溫之藥差

之久矣岐伯曰以平為期亦謂休息之也惟習可以治驚經曰驚者平之平謂平常也夫驚以其忽然而遇之也使習見習聞則不驚矣此九者內經自有是理庸工廢而不行今代劉河間治五志獨得言外之意謂五志所發皆從心造故凡見喜怒悲恐思之證皆以平心火為主至于勞者傷於動動便屬陽驚者駭于心心便屬火二者亦以平心為主今之醫者不達此旨遂有寒涼之謗群聚而譟之士大夫又從而感之公議何時而定耶昔余治一書生勞苦太過大便結燥欬逆上氣時喝喝然有音唾嘔鮮血余以苦

劑解毒黃連湯加木香漢防已煎服時時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣不月餘而痊余又嘗以巫躍妓抵以治人之悲結者余又嘗以鍼下之時便雜舞忽笛鼓應之以治人之憂而心痛者余嘗擊拍門窓使其聲不絕以治因驚而畏嚮冤氣飛揚者余又嘗治一婦人久思而不眠余假醉而不問婦果呵怒是夜困睡又嘗以酸棗仁丸治人多憂以白虎湯不計四時調理人之暑余又以無憂散瀉人冬月得水中之寒痺次以麻黃湯數兩作一劑煎以棗姜熱服汗出而愈如未愈者以荻蒂散涌之以火助其汗治寒

厥亦然余嘗治大暑之病諸藥無效余從其頭數刺其瘡出血立愈余治此數者如探囊然惟勞而氣耗恐而氣奪者為難治喜者少病百脉舒和故也昔聞山東楊先生治府主洞泄不已楊初未對病人與衆人談日月星辰躔度及風雲雷雨之變自辰至未而病者聽之而忘其匱楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所好之事好碁者與之碁好樂者與之笙笛勿輟又聞莊先生者治以喜樂之極而病者莊切其脉為之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者悲泣辭其親友曰吾不久矣莊知其將愈慰之詰其故莊引素問曰懼勝喜此二人可謂得玄關者也然華元化以怒郡守而幾見殺文摯以怒齊王而竟殺之千萬人中僅得一兩人而反招暴禍若乃醫本至精至微之術不能自保果賤技也哉悲夫

三消之說當從火斷二十七

八卦之中離能烜物五行之中惟火能焚物六氣之中惟火能消物故火之為用燔木則消而為炭焚土則消而為伏龍肝煉金則消而為汁煨石則消而為灰煮水則消而為湯煎海則消而為鹽乾汞則消而為粉熬錫則消而為丹故澤中之潦涸於炎暉鼎中

之水乾於壯火之五臟心為君火正化腎為君火對
化三焦為相火正化膽為相火對化得其平則烹煉
飲食糟粕去焉不得其平則燔灼臟腑而津液竭焉
故入水之物無物不長入火之物無物不消夫一身
之心火甚於上為膈膜之消甚於中則為腸胃之消
甚於下為膏液之消甚於外為肌肉之消上甚不已
則消及於肺中甚而不已則消及於脾下甚而不已
則消及於肝腎外甚而不已則消及于筋骨四藏皆
消蓋則心始自焚而死矣故素問有消瘴消中消渴
風消膈消肺消之說消之証不同歸之火則一也故

消瘴者衆消之總名消中者善飢之通稱消渴者善
飲之同謂惟風消膈消肺消此三說不可不分風消
者二陽之病二陽者陽明也陽明者胃與大腸也心
受之則血不流故女子不月脾受之則味不化故男
子少精皆不能成隱曲之事火伏于內久而不已為
風所鼓消渴腸胃其狀口乾雖飲水而不嚥此風熱
格拒於竇門也口者病之上源故病如是又經曰二
陽結謂之消此消乃腸胃之消也其善食而瘦者名曰
食佻此消乃飢肉之消也膈消者心移熱於肺傳為
膈消王太僕云心肺兩間中有斜膈膜下際內連橫

膈膜故心移熱于肺久久傳化內為膈熱消渴多而飲者此雖肺金受心火之邪然止是膈消未及于肺也故飲水至斗亦不能也其渴也其狀多飲而數澀或不數澀變為水腫者皆是也此消乃膈膜之消也肺消者心移寒于肺肺主氣經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾之精氣上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行以為常也靈樞亦曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆今心為陽火先受寒邪陽火燔灼內傳肺金受制火與寒邪皆來乘肺肺外寒所薄氣不得施內為火所燥亢極水復故皮膚

素澤而群著澀滯積濕而頻并上飲半升下行十合故曰飲一澀二者死膈消不為寒所薄陽氣得宣散於外故可治肺消為寒所薄陽氣自瀆于中故不可治此消乃消及于肺臟者也又若脾風傳之腎名曰疝瘕少腹寬熱而痛出白液名曰蠱王太僕云消燥脂肉如虫之蝕日漸損削此消乃膏液之消也故後人論三消指以為腎消此猶可治久則變瘵不救必死此消乃消及於腎臟者也夫消者必渴渴亦有三有甘之渴有石之渴有火燥之渴肥者令人內熱甘者令人中滿其氣上溢轉為消渴經又曰味厚者發

熱靈樞亦由鹹走血多食之人渴鹹入于胃中其氣
上走中焦注於肺則血氣走之血與鹹相得則凝乾
而善渴血脉者中焦之道也此皆肥甘之渴夫石藥
之氣悍適足滋熱與熱氣相遇必內傷脾此藥石之
渴也陽明司天四之氣嗑乾引飲此心火為寒水所
鬱故然少陽司天三之氣炎暑至民病渴太陽司天
甚則渴而欲飲水行凌火火氣鬱故然少陰之復渴
而欲飲少陽之復嗑絡經槁渴引水漿色變黃赤又
傷寒五日少陰受之故口燥舌乾而渴腎熱病者苦
數飲此皆燥熱之渴也故膏粱之人多肥甘之渴

石藥之渴藜蘆奔走之人多燥熱之渴二者雖殊其
實一也故火在上者善渴火在中者消穀善飢火在
上中者善渴多飲而數溲火在中上者不渴而溲白
液火徧上中下者飲多而數溲此其別也後人斷消
渴為腎虛水不勝火則是也其藥則非也何哉以八
味丸治渴水未能生而火反助也此等本不知書妄
引王太僕之注溢水之源以消陰翳壯火之主以制
陽光但益心之陽寒熱通行強腎之陰熱之猶可豈
知王太僕之意以寒熱而行之也腎本惡燥又益之
以火可乎今代劉河間自製神芩丸以黃芩味苦入

心牽牛大黃驅火氣而下以滑石引入腎
牽牛滑石為君以九黃為臣以芩連薄荷為使
將入坎真得黃庭之秘者也而
白木湯

消痞丸大人參散碧玉雞蘇散數法以調之故治消
渴最為得體昔有消渴者日飲數升先生以生薑自
然汁一盆置之密室中具罌杓于其間使其人入室
從而鑊其門病人渴甚不得已而飲汁盡渴減內經
辛以潤之之旨內經治渴以蘭除其陳氣亦辛平之
劑也先生之湯劑雖用此一味亦必有傍藥助之初
世曰凡渴疾未發瘡瘍使用大黃寒藥利其勢使

大困大虛自勝如發瘡瘍膿血流漓而殮此真俗言
也故巴郡太守湊三黃丸能治消渴余嘗以葶數年
不愈者減去朴硝加黃連一斤大作劑以長流千里
水煎五七沸放冷日呷之數百次以桂苓甘露散白
虎湯生藕節汁淡竹瀝生地黃汁相間服之大作劑
料以代飲水不日而痊故消渴一證調之而不下則
小潤小濡固不能殺炎上之勢下之而不調亦旋飲
旋消終不能沃膈膜之乾下之調之而不減滋味不
戒嗜慾不節喜怒病已而復作能從此三者消渴亦
不足憂矣况靈樞又說心脉滑為善渴經又曰滑者

傷氣勝又言五臟脉心脉微小為消瘴又言五臟脆
為消瘴又言消瘴之人薄皮膚而肉堅固以深長衝
直揚其心剛剛者多怒怒則氣逆上育中畜積血氣
逆流臆皮充肌肉脉不行轉而為執熱則消肌膚故
為消瘴又言五臟皆柔弱者善病消瘴夫柔弱者必
有剛強剛強者多怒柔弱者易傷也余以是遂悟氣
逆之人非徒病消渴若寒薄其外亦為癰腫少氣狂
膈中肺消涌水者執客其臟則亦為驚衄膈消柔痊
虛腸辟死客其府則為癰溺血口糜處瘕為沉於下
類鼻淵衄衄瞑目蓋此二十一證皆在氣厥論中

經曰諸逆衝上皆屬於上一言可了善讀書者以是
求之

虫蠶之生濕熱為主訣二十八

巢氏之衍九虫三蠶詳矣然虫之變不可勝窮要之
皆以濕熱為主不可純歸三氣虛與食生且巢氏之
衍九虫也曰伏虺白肉肺胃弱赤蟻伏虫長四分群
虫之主也虵虫長一尺亦有長五六寸其發動則腹
中痛發種聚街來上下痛有休息亦攻心痛口喜吐
涎及吐清水貫傷心則死診其脉腹中痛其脉法當
沉弱今脉反洪大是虵虫也白虫長一寸相生子孫

轉多長四五尺亦能殺人寸白虫色白頭徧小因飲
白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生栗所成又云食生
魚後即飲乳酪亦生其發動則損人精氣腰脚疼此
虫長一尺則令人死肉虫狀如爛杏令人煩滿肺蟲
狀如蚕令人咳嗽胃蟲狀如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦
弱虫狀如瓜瓣又名萑虫令人多唾赤虫狀如生肉
動則腹鳴蟻虫至微形如菜虫居肚腸中多則為痔
極則為癩因以瘡處以生癰疽癬疥癩瘡疥齧虫無
或人為患亦不盡有有亦不必盡多或偏無者此
諸虫依腸胃之間若人臟腑氣實則不為害虛則侵

蝕隨其虫之動能變成諸疾也三疳者濕疳由脾胃
虛為水濕所乘腹肉蟲動侵蝕成疳若上唇生瘡是
蟲蝕五臟則心煩懊若下唇生瘡是虫蝕下部則肛
門爛開心疳者因虛而動攻食心謂之心疳疳疳者
有五曰白赤蟻疳黑凡五疳白者輕赤者次蟻者又
次疳者又次黑者最重皆從腸裏上食咽喉齒齧並
坐瘡下至穀道傷爛下利膿血嘔逆手足心熱腰脚
痛嗜卧秋冬可春夏甚巢氏之論虫疳為病之狀固
詳矣然虫之變此數者天地之間氣之所至百虫爭
出如厥陰所至為毛化其應春其蟲毛其畜犬其應

夏其蟲羽其畜馬其應長夏其蟲裸其應秋其虫介
其畜雞其應冬其蟲鱗其畜彘其畜犬雞其蟲毛介
其畜彘其蟲羽鱗其畜牛犬其蟲裸毛其畜雞羊其
蟲介羽其畜彘牛其蟲鱗裸其臟肝脾其蟲毛介其
臟心肺其蟲羽鱗其臟脾腎其蟲裸毛其臟肺肝其
蟲介羽其臟腎心其蟲鱗裸地氣制已勝天氣制勝
已天制色地制形色者青黃赤白黑形者毛羽裸介
鱗其生也胎卵濕化其成也跂行飛走故五氣五味
根于中五色五類形于外而有一歲之中互有勝復
厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成居泉毛蟲育

裸蟲耗羽蟲不育少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲不
成居泉羽蟲育介蟲耗不育太陰司天裸蟲靜鱗蟲
育羽蟲不成少陽居泉裸蟲育鱗蟲不成居泉羽蟲
育介蟲耗毛蟲不育陽明司天介蟲靜羽蟲育介蟲
不成居泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天鱗蟲
靜裸蟲育居泉鱗蟲耗裸蟲不育如風勝則裸蟲不
滋此之類也皆五行之相剋也惟濕復則鱗見于陸
為濕土相剋水長則反增水鱗雖灸然見于陸則反
當死故不同也切巢氏言脾胃虛而為水濕所乘者
非也乃脾胃大甚熱為水濕多也以玄珠考之蟲得

木之氣乃生得雨之氣乃化以知非厥陰風木之氣不生非太陰濕土之氣不成豈非風木主熱雨澤主濕所數耶故五行之中皆有蟲惟金之中其蟲寘水之中無蟲且諸木有蠹諸菓有螬諸菜有蟲諸菽有妨五穀有螟螣蚤蠶麥朽蛾翻粟破蟲出草腐而螢蚊糞積而蜉蝣若此者皆木之蟲也烈火之中有鼠爛灰之中有蠅若此者皆火之蟲也土中盤蛇坯中走蚓穴蟻墻蝎田螻崖蟻若此者皆土之蟲也科蚪孕於古池蛭馬躍于荒湫魚滿江湖蛟龍藏海若此者皆水中之蟲也昔有冶者碎一破釜將入火爐其

鑄鑿處窠臼中有一蟲如米中蟲其色正赤此釜烹飪不啻千萬不知何以生不可曉亦金火之氣也惟米之中未嘗見蟲馬北方雖有米鼠止是食米非生于米也乃知木火屬春夏濕土屬季夏水從土化故多蟲金從秋氣水從冬氣故無蟲馬若以生物有被麴有麴蟲醬有醬蟲醢有醢蟲飲食停久皆有蟲若以為動物不生蟲如戶樞不蠹之類然動勞之人亦有蟲豈有不動者耶且文籍衣服故不閱不衣而不蠹然非經季夏陰注或曝乾不待冷納于笥中亦不生蟲蠹也或羗傍地濕鼠婦來明墻下壤乾狗蚤

居中豈均生于濕耶蓋蚤雖不生于濕亦有生于冬
熱則蟲生寒則不生理故然也夫蟲之所居必于脾
胃深處藥之所過在于中流蟲聞藥氣而避之群者
安得取之予之法先令飢甚次以檳榔雷丸為引予
別下蟲藥大下十數行可以搗而空滯上張子政用
此法下蟲數百相啣長丈餘若夫瘡久而蟲蛆者以
木香檳榔散傳之神良別有墜蛆之藥皆具方中此
不具陳也

補論二十九

予幼歲留心于醫而未嘗見其達者貞祐間自沃來

河之南至頓丘而從遊張君仲傑之縣舍得遇太醫
張子和先生誨仲傑以醫而及於游公君寶暨不肖
猗歟大哉先生之學明妙道之淵源造化之根本講
五運之抑鬱發越六氣之勝復淫鬱定以所制之法
配以所宜之方準繩既陳曲直自正規矩既設方圓
自成先生之學其學者之準繩規矩歟雖為人天師
可也望而知之以盡其神聞而知之以盡其聖問而
知之以盡其工切而知之以盡其巧何假飲上池之
水而照見人五臟乎一目而無餘矣至約之法其治
有三所用之藥其品有六其治三則汗下吐其品六

則辛甘酸苦鹹淡也雖不云補理實具焉予恐人之
惑于補而莫之解故續補說於先生汗下吐三論之
後我輩所當聞醫流所當觀而人之所當共知也予
考諸經檢諸方試為天下好補者言之夫人之好補
則有無病而補者有有病而補者無病而補者誰與
上而縉紳之流次而豪富之子有金玉以榮其身芻
豢以悅其口寒則衣裘暑則臺榭動則車馬止則裋
褐味則五辛飲則長夜醉飽之餘無所用心而應致
意于牀第以欲竭其精以耗散其真故年半百而衰
矣然則柰何以藥為之補矣或咨諸庸醫或問諸遊

客庸醫故要用相求以所論者輕輕之則草不而已
草木則從蓉牛膝巴戟天兔絲之類游客以好名自
高故所論者重重之則金石而已金石則丹砂起石
硫黃之類吾不知此為補也而補何臟乎以為補心
耶而心為丁火其經則手少陰熱則瘡瘍之類生矣
以為補肝邪肝為乙木其經則足厥陰熱則掉眩之
類生矣脾為己土而經則太陰以熱補之則病腫滿
肺為辛金而經則姤陰以熱補之病憤鬱心不可補
肝不可補脾不可補肺不可補莫非為補腎乎人皆
知腎為癸水而不知經則子午君火焉補腎之火火

得熱而益熾補腎之水水得熱而益涸既熾其火又涸其水上接于心之丁火火獨用事肝不得以制脾土肺金鬱以制肝木五臟之極傳而之六腑六腑之極遍而之三焦則自病交起萬疾俱生小不足言大則可懼不疽則中不中則暴瘖而死矣以為無病而補之者所得也且如有病而補之者誰歎上而仕宦豪富之家微而農商市廛之輩嘔而補吐而補泄而補痢而補瘡而補欬而補勞而補產而補嘔吐則和胃丸丁沉煎瀉痢豈菘丸御米殼散欬不五味則寧神勞不桂附則山藥產不烏金則黑神吾不知此

為補果何意邪殊不知嘔得熱而愈酸吐得熱而愈暴泄得熱而清濁不分痢得熱而休息繼至瘡得熱而進不能退欬得熱而濕不能除勞得熱而火益煩產得熱而血愈崩蓋如是而死者八九生者一二死者枉生者幸幸而一生憔悴之態人之所不堪也視其寒用熱以補之矣若言其補則前所補者此病何如予請為言補之法大抵有餘者損之不足者補之是則補之義也陽有餘而陰不足則當損陽而補陰陰有餘而陽不足則當損陰而補陽熱則芒硝大黃損陽而補陰也寒則乾薑附子損陰而補陽也豈可

以熱藥而云補乎哉而寒藥亦有補之義也經曰因其盛而減之因其衰而彰之此之謂也或曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味執此溫補二字便為溫補之法惟用溫補之藥且溫補二字特為形精不足而設豈為病不病而設哉雖曰溫之止言其氣雖曰補之止言其味曷嘗言熱藥哉至於天之邪氣感則害人五臟實而不滿可下而已水穀之寒熱感則害人六腑滿而不實可吐而已地之濕氣感則害人皮肉筋脉邪從外入可汗而已然發表不遠熱而無補之意人之所稟有強有弱強而病病而愈愈而後必能復其舊矣弱而病病而愈愈而後不必復其舊矣是以有保養之說然有是說熱藥亦安所用哉慎言語節飲食是矣以日用飲食言之則黍稷禾麥之餘食粳者有幾雞豚牛羊之餘食血者有幾桃李梅之餘食藜者有幾葱韭薤蒜之餘食葵者有幾其助則薑桂椒藜其和則鹽油醯醬常而粥羹別而燠炒異而燒炙甚則以五辣生鮓而薦酒之肴以薑醋羹羊而按酒之病大而富貴北此尤甚小而市庶亦得以享此吾不知何者為寒何物為冷而以熱藥為補哉日用飲食之開已為太過矣嘗聞人之所欲

後必能復其舊矣弱而病病而愈愈而後不必復其舊矣是以有保養之說然有是說熱藥亦安所用哉慎言語節飲食是矣以日用飲食言之則黍稷禾麥之餘食粳者有幾雞豚牛羊之餘食血者有幾桃李梅之餘食藜者有幾葱韭薤蒜之餘食葵者有幾其助則薑桂椒藜其和則鹽油醯醬常而粥羹別而燠炒異而燒炙甚則以五辣生鮓而薦酒之肴以薑醋羹羊而按酒之病大而富貴北此尤甚小而市庶亦得以享此吾不知何者為寒何物為冷而以熱藥為補哉日用飲食之開已為太過矣嘗聞人之所欲

者生所惡者死今反忘其寒之生其於熱之死則何如由其不明素問造化之理本草靈性之源一切委之於庸醫之手醫者曰寒涼之藥雖可去疾柰何臟不可使之久冷脾胃不可使之久寒保養則固可溫補之是宜斯言方脫諸口已深信於心矣如金石之不可變山嶽之不可移以至於殺身而心無少悔嗚呼醫者之罪固不容誅而用之者亦當分受其責也病者之不悔不足怪也而家家若是何難見而難察邪人惟不學故耳亦有達者之論以素問為規矩準繩以本草為斤斧法則矣其藥則寒涼其劑則兩

其丸則百人之聞者如享美饌而見蛆蠅惟恐去之不亟也何哉而所見者丘垤及見談泰山則必駭不取唾而遠則幸矣尚敢冀其言之能從乎茲正之所以難立而邪之所以易行也吾輩實憂之且天下之不知過不在天下而已在醫流尚不知何責於天下哉噫春秋之法責賢不責愚所謂我輩者猶且棄道學之本源而拘言語之末節以文章自富以談辨自強坐而昂昂立而行行濶其步翼翼其手自以為高人而出塵表以天下聰明莫已若也一旦疾之臨身矐然無所知茫若搏風之不可得迷若捕影之不可獲至

於不得已則聽庸醫之裁判疾之愈則以為得人
愈則以為疾之既極無可柰何委之於命而其於泉
下矣嗚呼實與愚夫殆去相遠此吾所以言之喋喋
也然而未敢必其聽之何如耳雖然吾之說非止欲
我輩共知欲醫流共知欲天下共知也我輩共知醫
流共知天下共知恆吾之意滿吾所望矣

水解三十

余昔訪靈臺間太史見銅壺之漏水馬太史召司水
者曰此水已三環過水滑則漏迅漏迅則刻差當易
新水余劃然而悟曰天下之水用之滅火則同濡槁

則同至於恆從地變質與物迥未嘗同焉故蜀江濯
錦則鮮濟源烹楮則滷南陽之潭漸于菊其人多壽
遼東之澗通于復其人多髮晉之山產礬石泉可愈
痘戎之麓伏硫黃湯可浴蘄楊子宜蒔淮菜宜醪滄
鹵能鹽阿井能膠澡垢以汚茂田以苦瘦消于藻帶
之波痰破于半夏之液水咽而霍亂息流水飲而
瘡闕通雪水洗目而赤退鹹水濯肌而癢乾菜之以
為葦鐵之以為槩麴之以為酒蘖之以為醋干派萬
種言不容盡至于井之水一也尚數名焉况其他奢
乎及酌而傾曰倒流出甕未放曰無根無時初出曰

新汲將旦首汲曰井華。夫一井之水而功用不同。豈
烹者之間將行藥。勢獨不擇夫水哉。昔有患小溲澀
者。衆工不能瘥。予易之。長川之急流。取前藥而沸之。
一飲立溲。元疇聞之曰。精乎哉。論也。近讀靈樞經有
半夏湯治不瞑。以流水千里外者八升。揚之萬遍。取
其清五升。炊以葦水火。正與此論合。乃知子和之於
醫。觸一事一物皆成治法。如張長史草書。妙天下得
之。公孫劔器。用心亦勞矣。後之用水者。當以子和之
言為制。余于是乎作水解。

儒門事親卷之四

戴人張子和著

風一

夫風者厥陰風木之主也諸風掉眩風痰風厥涎潮不利半身不遂失音不語留飲飧泄痰實嘔逆旋運口喎搐搦僵仆目眩小兒驚悸狂妄胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通偏正頭痛首風沐風手足攣急肝木為病人氣在頭

- 防風通聖散
- 防風天麻湯
- 防風湯
- 祛風丸
- 排風湯
- 小續命湯

消風散

暑二

夫暑者為少陰君火之主也諸痛痒瘡瘍癰疽腫毒及胃煩熱嗌乾欬喘唾血泄血肘腫肩脾皆內痛心痛肺脹腹脹鬱悶風温病多發風傷于榮温傷於衛血為榮氣為衛其脉兩手多沉自汗出身重多睡必齟三日以裏且宜辛凉解之或辛温解之如不已裏證未罷大不可下如下則胃中虛空四日之外表熱入裏則譫語口乾發疹潮熱直視失溲者十死八九肺金為病人氣在胸及小兒瘡疹

丹熯但發人氣在腹

白虎湯

桂苓甘露散

化痰玉壘丸

益元散

玉露散

石膏散

濕三

夫濕者為太陰濕土之主也諸濕腫滿霍亂泄注肘腫骨痛及腰膝頭項痛風痺痿厥唾有血心懸如飢熱痛始作三陽受之一日太陽二日陽明三日少陽可汗而已如四日太陰五日少陰六日厥陰可下而已或七日不愈再傳至十三日大邪皆去六經悉和則愈矣腎水為病

五苓散

葶藶木香散

白朮木香湯

益元散

大橘皮湯

神助散

桂苓白朮丸

火四

夫火者少陽相火之主也諸暴死發熱惡寒痛病大作傳為水腫面黃身痿泄注膿血赤白為利癰腫疽毒丹熯瘍疹小兒疳瀉腹脹暴下如水心胸中熱甚則孰衄胸脇皆痛耳聾口苦舌乾與臟毒下血米穀不化腸鳴切痛消渴上喘肺金為病

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心散

神芎丸

八正散

調胃散

調胃承氣湯

燥五

夫燥者是陽明燥金之主也諸氣憤鬱腸胃乾涸皮膚皴揭脇痛寒瘡喘咳腹中鳴注泄驚澹脇肋暴痛不可反側嗑乾面塵肉脫色惡及丈夫癩疝婦人少腹痛帶下赤白瘡瘍瘰癧喘咳潮熱大便澀燥及馬刀挾瘦之瘡肝木為病

神功丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

四生丸

寒六

寒者是太陽寒水之主也諸寒冷濕痺肘臂痲急
秋濕既多寒咳為嗽痰厥心痛心中澹澹大動胸
脇胃脘痛不可食食已不飢吐利腥穢屈伸不便
上下所出不禁目盲堅痞色焯渴而飲冷積水足
浮腫囊縮四肢冷爪甲青心火為病

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

大已寒丸

理中湯

解利傷寒七

六月風時氣溫病傷寒三日以裏頭痛身熱惡寒可

用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑一
餘片葱白連鬚者十餘莖豈豉一撮同煎三五沸
去滓稍熱先以多半投之良久用釵子於咽喉中
探引吐了不宜嗽口次用少半亦稍熱投之更用
葱醋酸辣湯投之衣被蓋覆汗出則愈矣如遇世
亂內經曰歲火太過炎暑流行火氣大盛肺金受
邪上應熒惑大而明現若用辛涼之劑解之則萬
舉萬全也若遇治世人安可用升麻湯蒼根湯敗
毒散辛溫之劑解之亦如葱根白豈豉上涌而表
汗內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗發揚

寒熱之邪既吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復作也

又一法或於無藥之處可用酸薑汁一大椀煎三五沸去菜葉猛服訖少間用釵子咽喉中探引吐了如此三次後煎葱酸辣湯投之以衣被蓋覆汗出則解內經曰酸苦涌泄為陰涌者吐也傷寒三日頭痛身熱是病在上也在上者固宜涌之然後以淡漿粥養之一二日則愈矣

又一法可用不卧散解之於兩鼻內啗之連嚏噴三十次以衣被蓋覆用此藥時當於暖室中嚏罷以酸辣漿粥投之汗出如洗嚏噴者同吐法也此法可與雙解散為表裏也

又有道引一法可於一閑處用之先教病人盤脚而坐次用兩手交十指攀腦後風池風府二穴乃是風門也向前叩首幾至于地如此連點一百二十數急以葱醋粥辛辣湯投之汗出立解

傷寒溫疫時氣冒風中暑俱四時不正之氣也人若初感之皆頭痛惡寒身熱及寒熱往來腰脊強是太陽經受之也內經曰可先治內而後治外先用生薑葱白豉煎雙解散上涌及汗出則解如

不解者至五六日或不大便喘滿譫語實熱兩手
脉沉可用調胃大小承氣湯下之慎不可用銀粉
芭荳霜杏仁芫花熱藥下之則必死此先治外而
後治內也如大汗之後慎不可食葵菜蘆菜羊豬
雞犬魚兔等肉惟不先明必致重困後必難治也
傷寒七八日發黃有斑潮熱腹滿者或痰實作止
雖諸承氣湯下過者仲景曰寸口脉浮滑者可用
葶藶散吐之然傷寒寸口脉浮滑者可用雜病寸
口脉沉者可吐叔和云寸脉沉弓胸有痰啓玄子
曰上盛不已吐而奪之是也

風八

夫風中失音悶亂喎斜口眼內經曰風之為病善行
而數變故百病皆生於風也可用三聖散吐之如
不省人事牙關緊閉粥菜不能下者煎三聖散鼻
內灌之吐出涎口自開也次服通聖散涼膈散大
人參半夏丸桂苓甘露散等大忌雞猪魚兔酒醋
蕎麵動風引痰之物吐痰之法在方論中

頭風眩運手足時復麻痺胃脘發痛心腹滿悶按
之如水聲可用獨聖散吐之吐訖可服辛涼清上
之藥仲景曰此寒痰結於胸中之致然也

痺九

夫大人小兒風寒濕三氣合而為痺及手足麻木不仁者可用薺金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之泄訖以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳沒行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

痿十

夫男女年少面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎嗽不止或喘滿面浮此名曰肺痿可用獨聖散吐之吐訖次用人參柴胡飲子小柴胡飲子加當歸桂苓甘露散之類內經曰男女之病皆同也男子

精不足是味不化也女子血不流是氣不月也
曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味是也

厥十一

夫厥之為病手足及膝下或寒或熱也舉世傳為腳氣寒濕之病豈知內經中本無腳氣陽氣衰于下則為寒厥陰氣衰于上則為熱厥熱厥為手足熱寒厥為手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之下陽氣勝則足下熱陰氣勝則足下寒熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火則愈矣若尸

厥痿厥風厥氣厥酒厥可一涌而醒次服降火益
水和血通氣之藥使粥食調養無不瘥者若其餘
諸厥做此行之慎勿當疑似之間便作風氣相去
邈矣

癩十二

夫癩病不至於目瞪如愚者用三聖散投之更用大
盆一箇於暖室中令汗下吐三法俱行次服通聖
散百餘日則愈矣至於目瞪愚者不可治內經曰
神不得守謂神亂也

癩十三

夫富貴膏粱之人病癩或間日或頻日或作熱或作
寒或多寒少熱或多熱少寒宜以大柴胡湯下之
下過三五行次服白虎湯玉露散桂苓甘露散之
類如不愈者是積熱大甚宜以神芩葳用丸三花
神祐丸調胃承氣湯等藥大作劑料下之下訖以
長流水煎五苓散服之或服小柴胡湯數服亦可
如不愈復以常山散吐之後服涼膈散白虎湯之
類必愈矣大忌熱麵及羊肉雞猪魚兔等物如食
之瘡疾復作以至不救

貧賤芻蕘之人病癩以飲食踈糲衣服寒薄勞力

動作不可與膏藥之人同法而治臨發日可用野
夫多効方温脾散治之如不愈用辰砂丹治之則
愈矣如服藥訖宜以長流水煎白虎湯五苓散服
之不宜食熱物及燥熱之藥以瘡疾是傷暑伏熱
之故也內經曰夏傷於暑秋必痲瘧可不信哉忌
物同前

泄痢十四

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也注下者
水瀉也火運太過之病火主暴逆之故也急宜用
水瀉桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎

過放冷服則愈慎不可驟用罌粟殼乾薑薤白聖
散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以
分陰陽利水道而已

痢利十五

夫病痢利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀
出可用導水丸禹功散瀉訖一二日可服胃風湯
不愈則又可與桂枝麻黃湯發汗則愈矣內經曰
久風入中為腸澼飧泄啓玄子云風在腸中上薰
於胃所食不化而出又云飧泄者是暮食不化也
又經云春傷於風夏必飧泄故可汗而愈內經曰

屛隨汗出痛隨利減若服苳菘罌粟殼之類久而
不輟則變為水腫以成不救也

藏毒下血十六

夫藏毒下血可用調胃承氣湯加當歸瀉訖次用芍
藥蘗皮丸黃連解毒湯五苓益元各停調下五七
錢服之內經曰腸癰便血何如荅曰癰者腸間積
水也身熱則死寒則生熱為血氣敗故死寒為榮
氣在則生七日而死者死於火之成數也

下利膿血十七

夫下利膿血腹痛不止可用調胃承氣湯加生薑麥

煎更下藏用七八十九丸量虛實加減瀉訖次用長
流水調五苓散五七錢或加燈心煎調下亦得調
益元散五七錢亦可大忌油膩一切熱物則愈矣
水泄不止十八

夫男子婦人病水濕瀉注不止因服苳菘烏梅薑附
峻熱之劑遂令三焦閉溢水道不行水滿皮膚身
體否腫面黃腹大小便赤澁兩足按之陷而復起
內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如
時月寒涼宜於煖室不透風處用火一盆以藉火
力出汗次以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去

腫減則愈矣是汗下吐三法齊行既汗下吐訖腑臟空虛宜以淡漿粥養腸胃二三日次服五苓散益元同煎燈心湯調下如勢未盡更宜服神助散舊名葶藶散可以流濕潤燥分陰陽利小便不利小便非其法也既平之後宜大將息忌魚鹽酒肉菓木房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

痔漏腫痛十九

夫痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉橫解腸澀為痔痔而不愈變而為漏同治濕法而治之須先用導

水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更加以葵羹菠菜猪羊血等通利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物

霍亂吐瀉二十

夫霍亂吐瀉不止者可用五苓散益元散各停冰水調下五七錢如無冰水可用新汲水調下桂苓甘露散玉露散清涼飲子調下五七錢或香薷湯調下五七錢亦可如無已上諸藥可服地漿三五盞亦可地漿者可於淨地掘一井子用新汲水一桶並於井子攪令渾候澄清連飲三五盞立愈大忌

白朮湯薑桂烏附種種燥熱之藥若服之則必死矣巢氏云霍者揮霍而成疾亂者陰陽亂也皆由陰陽清濁二氣相干故也

大便澀滯二十一

夫老人久病大便澀滯不通者可服神功丸麻仁丸四生丸則愈矣時復食葵菜菠菜猪羊血自然通利也內經云以滑養竅是也此病不愈令人失明也

五種淋瀝二十二

夫大人小兒病沙石淋及五種淋瀝閉癢并臍腹痛

益元散主之以長流水調下八正散石韋散依方服用此三藥皆可加減服之

酒食不消散二十三

夫一切冷食不消宿酒不散亦同傷寒身熱惡寒戰慄頭項痛腰脊強及兩手脉沉不可用双解止可用道飲丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷食宿酒若推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒癥進食丸此藥皆犯芑豈有熱毒之故也

酒食所傷二十四

夫膏粱之人起居閑逸奉養過度酒食所傷以致中
脘留飲脹悶痞膈醋心可服木香導飲丸以治之
夫芻蕘之人飲食餒糲衣服寒薄勞役動作一切
酒食所傷以致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸
治之

沉積水氣二十五

夫一切沉積水氣兩脇刺痛中滿不能食頭目眩者
可用茶調散輕涌訖冷涎一二升次服七宣丸則
愈矣木香檳榔丸導飲丸亦妙不可用芭荳銀粉
等藥

諸積不化二十六

夫諸積不化可服無憂散每月瀉三五次可用桂苓
白朮丸散妙功丸大忌生硬粘滑動風發熱等物
骨蒸熱勞二十七

夫男子婦人骨蒸熱勞皮膚粘乾痰唾稠粘四肢疼
痛面赤唇乾煩燥睡卧不寧或時喘嗽飲食少味
困弱無力虛汗黃瘦等疾內經曰男子因精不足
而成女子因血不流而得也可先以茶調散輕涌
訖次以導水禹功散輕瀉三兩行後服柴胡飲子
桂苓甘露散搜風丸白朮調中湯木香檳榔丸人

參犀角散之類量虛實選而用之如咯血吐血便血此乃亡血也並不宜吐吐之則神昏內經曰血者人之神也故亡血則不宜吐慎不可服峻熱薑附之藥若服之則飲食難進肌肉消削轉成危篤也五勞之病乃今人不明發表攻裏之過也大忌暑月於手腕足外踝上着灸手腕者陽池穴也此穴首肌肉淺薄之處灸瘡最難痊可及胸次中脘臍下背俞三里等穴或有灸數十者及以燔針終無一效病人反受苦可不思之勞疾多饒所恩之物但可食者宜食療本草而與之葠菜葵羹水水

涼物慎不可禁以薑水穀入胃脉道乃行也若遇忌慎則胃口閉胃口閉則形必瘦形瘦脉空乃死之候也諸勞皆可倣此

虛積二十八

夫病人多日虛積無力補之以無比山藥丸則愈矣

上喘中滿二十九

夫上喘中滿醋心腹脹時時作聲否氣上下不能宣暢叔和二氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之吐訖次用道水禹功輕瀉三五行不愈更以利膈丸瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五

苓散益元散桂苓甘露散三和散分陰陽利水道
之藥則愈矣

一切涎嗽三十

夫富貴之人一切涎嗽是飲食厚味熱痰之致然也
先用獨聖散吐之吐訖可服人參散通聖散加半
夏以此止嗽更服大人參半夏丸以之化痰也大
忌酸鹹油膩生硬熱物也

咳嗽三十一

夫貧難之人咳嗽內外感風冷寒濕之致然也內經
曰秋傷於濕冬生咳嗽可服寧神散寧肺散加白

朮之類則愈矣忌法同前

欬逆三十二

夫男子婦人欬逆俗呼曰忤忤乃陰陽不和也乃傷
寒亦有效逆者並可用既濟散治之忌寒熱物宜
食溫淡物以養胃氣耳

風痰三十三

夫風痰酒痰或熱在膈上頭目不清涕唾稠粘或欬
嗽上喘時發潮熱可用獨聖散吐之吐訖可服搜
風丸涼膈散之類內經曰流濕潤燥是也

咯血衄血嗽血三十四

夫男子婦人咯血衄血嗽血效膿血可服三黃丸黃連解毒湯涼膈散加桔梗當歸大煎劑料時時呬之內經曰治心肺之病最近藥劑不厭頻而少時時呬之者是也

消渴三十五

夫三消渴內經曰三消渴者肺消膈消風消也右以繅絲煮蠶湯澄清頓服之則愈或取生藕汁頓服之亦愈

雷頭三十六

夫雷頭懶于乃俗之謬名也此疾是胸中有寒痰多沫之致然也可以茶調散吐之吐訖冷痰三二升次用神芎丸下三五行然後服愈風餅子則愈矣雷頭者是頭上赤腫核或如生薑片酸棗之狀可用錐針刺而出血末除根本也

頭痛不止三十七

夫頭痛不止乃三陽之受病也三陽者各分部分頭與項痛者是足太陽膀胱之經也攢竹痛俗呼為眉稜痛者是也額角上痛俗呼為偏頭痛者是少陽經也如痛久不已則令人喪日以三陽受病皆胸膈有宿痰之致然也先以茶調散吐之後以香

薰散白虎湯投之則愈然頭痛不止可煎葱白鬚
荳豉湯吐之吐訖可服川芎薄荷辛涼清上搜風
丸香芎散之類仲景曰葱根荳豉亦吐傷寒頭痛
叔和云寸脉急而頭痛是也

兩目暴赤三十八

夫兩目暴赤發痛不止可以長流水煎鹽湯吐之次
服神芎丸四物湯之類內經曰暴病皆屬火也又
曰治病有緩急急則治其標緩則治其本標者赤
腫也本者火熱也以草莖鼻中出血最妙

目腫三十九

夫目暴赤腫痛不能開者以青金散鼻內搐之鼻內
出血更捷

病目經年四十

夫病亦目經年不愈者是頭風所加之令人頭痛可
用獨聖散八正散之類赤目腫作是足厥陰肝經
有熱利小便能去肝經風熱也

風衝泣下四十一

夫風衝泣下者俗呼為冷淚者是也內經曰太陽經
不禁固也又曰熱則五液皆出肝熱故淚出風衝
於外火發於內風火相搏由此而泣下也治之以

貝母一枚白膩者胡椒七粒不犯銅鐵研細臨卧點之可也

風蛙牙疼四十二

夫風蛙牙疼久不愈者用針插芭蕉一枚於燈焰上燎煙未及及存性於牙窩根盤上薰之則愈

口瘡四十三

夫大人小兒瘡唇緊用酸漿水洗去白痴臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈貼鈔白霜散則愈矣

喉閉四十四

夫男子婦人喉閉腫痛不能言者刺兩手大拇指去爪甲如韭菜葉是少商穴少商是肺金之井穴也以針刺出血立愈如不愈以溫白湯口中含漱是以執道執也

癭四十五

大癭囊腫悶稽穀夜養生論云頸如險而癭水土之使然也可用人參化癭丹服之則消也又以海帶海藻昆布三味皆海中之物但得二味投之於水釜中常食亦可消矣

背疽四十六

夫背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作藥料下臟腑
一二十行次以錐針於腫焮處亂刺血出如此者
三後以陽起石散傳之不可便服內托散內犯官
桂更用酒煎男子以背為陽更以熱投熱無乃太
熱乎如瘡少愈或口瘡未合瘡痂未斂風痒時作
可服內托散以辟風邪耳

瘰癧四十七

夫人頭自有瘡腫瘰癧及胸臆臑脇之間或有瘡痂
腫核不消及有膿水不止可用滄塩一二兩炒過
以長流水一大椀煎放溫作三五次頓服訖候不

多時於咽喉中探引吐涎三二升後服和血通經
之藥如玉燭散四物湯之類是也內經曰鹹味涌
泄為陰涌者吐也瀉者泄也銅人曰少陽起于目
銳眥行耳後下脇肋過期門瘰癧結核馬刀挾癭
是少陽膽經多氣少血之病也

便癰四十八

天便癰者乃男子之疝也俗呼為便癰言於不便處
害一癰故名便癰也便癰者謬名也難素所不載
也然足厥陰肝之經絡是氣血行流之道路也衝
任督脉亦屬肝經之傍絡也難經曰男子有七疝

是也便癰者血疝也治之以導水丸桃仁承氣湯
或抵當湯投之同瘀血不散而治大作劑料峻瀉
一二十行次以五燭散和氣血通經絡之類則是
也世之多用大黃牡礪而已間有不愈者是不知
和血通經之道也

惡瘡四十九

夫一切惡瘡久不愈者

香櫛榔散貼之則愈

下疳五十

夫下疳久不愈者俗呼

臊疳是也先以導水禹功

先瀉肝經外以木香

取傳之日上三兩度然後服

儒門事親卷之五

戴人張子和著

瘡癰瘤腫五十一

夫大人瘡癰小兒赤瘤腫發之時疼痛不止內經曰
夫諸痛痒瘡瘍皆生於心火可用一呪法禁之法
者是心法呪曰

詩曰

龍鬼流兮諸毒腫

癰瘡膿血甚被痛

忘心稱念大悲呪

三唾毒腫隨手消

右一氣念呪三遍望日月燈火取氣一口吹在瘡
腫丹瘤之上右手在瘡上虛撮虛撮三次左手不

動每一氣念三遍虛收虛撮三次百無禁忌如用之時心正為是此法得於祖母韓氏相傳一百餘年用之救人百發百中若不食葷酒之人其法更靈病瘡腫者大忌雞猪魚兔發熱動風之物此法不得輕侮無藥處可用之

瘡腫丹毒五十二

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止有一法面北端想北海雪浪滔天冰山無際大寒嚴冷之氣取此氣一口吹在瘡腫處立止用法之人大忌五辛之菜五厭之肉所病之人切忌雞猪魚兔酒醋濕麵等物無藥之處可用此法救之

凍瘡五十三

夫凍瘡者因寒月行於冰雪中而得之有經年不愈用陂野中淨土曝乾以大蒜搗如泥和土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小而貼之泥餅子上以火艾灸之不計艾壯多少以泥乾為度去乾餅以換濕餅貼定灸之不問灸數多少有灸一二日者直至瘡痂內覺痒微痛是凍瘡活也然後口含漿水澄清用雞翎一二十莖縛作刷子於瘡口上洗淨以此而洗之後肌膚損痛也用軟帛拭乾次

用木香檳榔散傳之夏月醫之大妙

金瘡五十四

夫一切刀箭所傷有刀箭藥用風化石灰一斤龍骨四兩二味為細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更合杵臼內搗和得所團作餅子若酒麴中心穿眼懸於背陰處陰乾搗羅為細末於瘡口上摻貼亦治裏外腫并諸瘡腫大效

又有呪法 呪曰

今日不祥 正被某傷 一禁不疼

二禁不痛 三禁不膿不作血

急急如律令奉勅攝

又每念一遍以右手收一遍收在左手中如此七遍則放手吹去却望太陽取氣一口吹在所傷處如陰晦夜間望北斗取氣亦得所傷之人大忌雞猪魚兔酒醋熱麵動風之物如食之則瘡必發又一法 默想東方日出始取氣一口日出一半取氣一口日大圓滿取氣一口吹在所傷之處如此三次則其用法之人並無所忌所傷之人禁忌同前可於無藥之處用之

誤吞銅鐵五十五

夫誤吞銅鐵以至羸瘦者宜用肥猪豚與葵菜羹同
殮數頓則銅鐵自然下也神驗如不食葷腥者宜
以調胃承氣湯大作其劑下之亦可也

魚刺麥芒五十六

夫魚刺麥芒一切竹木籤刺咽喉及鬚髮惹伴在咽
噎中不能下者內經曰不因氣動而病生於外可
用道藏經一呪法治之

呪曰

吾請老君東流順

老君奉勅攝攝

攝法毒水吾託大帝尊不到稱吾者各各現帝身
急急如律令奉勅攝一氣念遍又以左手屈中指

無名指作三山印印上坐淨水一盞右手掐
作金鎗印左手在下右手在上左手象地右手象
天虛挽虛卓九次為定左足橫右足豎作丁字立
如作法時望日月燈火取氣一口吹在盞內此法
百無禁忌用法之時以正神氣是也如所傷物下
不可便與米湯米飯喫恐米粒誤入瘡口中潰作
膿也姑以拌麵羹養之數日可也

蛇虫所傷五十七

夫犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒氣
不出也內經曰先治內而後治外可也當先用導

水丸禹功散或通經瀉十餘行即時痛減腫消然後用膏藥生肌散傳貼愈此是先治內而後治外之法也

杖瘡五十八

夫一切虫獸所傷及背瘡腫毒杖瘡熾發或透入裏者可服木香檳榔丸七八十九丸至百丸或百五十丸至二百丸生薑湯下過五七行量虛實加減則可矣

禁蝎五十九

夫蝎有一呪法 呪曰

王女傳仙攝

勅斬蜘蛛

右如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處理而取氣一口默念七遍怒着作法吹在蝎螫處內經曰蜂蠱之毒皆屬於火可用新水一盆浸之如浸不得處速以手帛蘸水搭之則痛止也用法之人大忌五厭肉

落馬墜井六十

夫一切男子婦人落馬墜井因而打撲便生心恙是痰涎發於上也內經曰不因氣動而病生於外可用三聖散空心吐訖如本人虛弱疲痺可用獨聖

散吐之吐訖可服安魂寧魄之藥定志丸酸棗仁
伏神之類是也

婦人月事沉滯六十一

夫婦人月事沉滯數月不行肌肉不減內經曰此名
為痕為沉也沉者月事沉滯不行也急宜服桃仁
承氣湯加當歸大作劑料服不過三服立愈後用
四物湯補之更可用宣明方楨榔丸

血崩六十二

夫婦人年及四十以上或悲哀太甚內經曰悲哀太
甚則心系急心系急則肺布葉舉而上焦不通熱

氣在中故經血崩下心系者血山也如久不愈
面黃肌瘦慎不可與燥熱之藥治之豈不聞血得
熱而流散先以黃連解毒湯次以涼膈散四物湯
等藥治之而愈四物者是涼血也乃婦人之仙藥
也量虛實^加以意消息用之

腰跨疼痛六十三

夫婦人腰跨疼痛兩腳麻木惡寒喜暖者內經曰乃
是風寒濕痺先可服除濕丹七八十九量虛實以
意加減次以禹功散投之瀉十餘行清冷積水青
黃涎沫為驗後以長流水同生薑棗煎五苓散服

之風濕散而血氣和也

頭風眩運六十四

夫婦人頭風眩運登車乘船亦眩運眼澁手麻髮退
健忘喜怒皆胸中有宿痰之使然也可用菖蒲散
吐之吐訖可用長流水煎五苓散大人參半夏丸
無常服愈風餅子則愈矣

經血暴下六十五

夫婦人年及五十以上經血暴下者婦人經血終于
七七之數數外暴下內經曰火主暴速亦因暴喜
暴怒憂結驚恐之致然也慎不可作冷病治之如

下峻熱之藥則死止可用黃連解毒湯以清於上
更用蓮殼灰櫻毛以滲於下然後用四物湯加玄
胡散涼血和經之藥是也

赤白帶下六十六

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服道朮丸禹功
散或單用無憂散量虛實加減瀉訖次用桂苓丸
五苓散葶藶末香散同治濕治瀉法治之或用獨
聖散上涌亦可也室女亦可

月事不來六十七

夫婦人月事不來室女亦可內經曰月事不來者是

胞脉閉也胞脉者屬火而絡於臍中令氣上迫肺
心氣不得下通故月事不來也可用茶調散吐之
吐訖可用玉燭散當歸散或三和湯桂苓白朮散
柴胡飲子量虛實選而用之降心火益腎水開胃
進食分陰陽利水道之藥是也慎勿服峻熱之藥
若服之則變成肺痿骨蒸潮熱咳嗽咯膿嘔而喘小
便澀滯寢汗不已漸至形瘦脉大雖遇良醫亦成
不救嗚呼人之死者豈為命耶

婦人無子六十八

婦人年及二三十者雖無病而無子經血如常或

經血不調乃陰不升陽不降之故也可獨聖散上
吐訖冷痰三二升後用道朮丸禹功散瀉訖三五
行及十餘行或用無憂散瀉十餘行次後喫葱醋
白粥三五日胃氣既通腸中得實可服玉燭散更
助以桂苓白朮丸散二藥是降心火益腎水既濟
之道不數月而必有孕也

若婦人有癥閉遺溺噎乾之諸證雖服藥針灸亦
不能孕也蓋衝任督三脉之病故不治也表證見
內證及熱論中

小產六十九

夫婦人半產俗呼曰小產也或三月或四五六七月皆為半產已成男女故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或因勞力打撲傷損及觸風寒或着暴熱不可用黑神散烏金散之類內犯乾薑之故止可用玉燭散和經散湯之類是也

大產七十

夫婦人大產十月滿足降誕者是也或臍腰痛乃敗血惡物之致然也舉世便作虛寒以燥熱治之誤人多矣難經曰諸痛為實實者熱也可用導水丸禹功散瀉五七行慎不可便服黑神散烏金散燥

之同半產治之則可矣

產後心風七十一

夫婦人產後心風者則用調胃承氣湯一二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈如不愈三聖散吐之

乳汁不下七十二

夫婦人有天生無乳者不治或因啼哭悲怒鬱結氣溢閉塞以致乳脉不行用精猪肉清湯調和美食於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳周回百餘遍則乳汁自下也

又一法猪蹄湯調和美味服之乳汁亦下合用熟猪蹄四枚食之亦効

又一法鍼肩井二穴亦効

產後潮熱七十三

夫婦人產後一二日潮熱口乾可用新汲水調玉露散或米水調服之亦可或服小柴胡湯加當歸及柴胡飲子亦可慎不可作虛寒治之

乳癰七十四

大乳癰發痛者亦生於心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結滯於乳房之間血脉凝注久而不散

潰腐為膿也可用一法禁之

呪曰 謹請東方護司族吹妳是灰妳子

右用之時當先問病人曰甚病病人荅曰吹妳取此氣一口但吹在兩手坎字文上用大拇指緊捏定面北立一氣念七遍吹在北方如此者三遍若作法時以左右二婦人面病人立於病乳上痛操一二百數如此亦三次則愈

雙身大小便不利七十五

夫婦人雙身大小便不利者可用八正散大作劑料除滑石加葵菜子煎服內經曰膀胱不利為癃癃

者是小便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出然後服五苓散三五服則愈矣

雙身病瘧七十六

夫雙身婦人病瘧可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡散微瀉過不可大吐瀉恐傷其孕也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

雙身傷寒七十七

夫雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散一兩水半椀大煎劑料去滓分作二服先一服吐

了後一服不吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱啜之汗出盡頭痛立止

身重瘧瘧七十八

夫婦人身重九月而瘧瘧不言者是胎生絡脉不相接也則不能言經曰無治也雖有此論可煎玉燭散二兩水一椀同煎至七分去滓放冷入蜜少許時時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

懷身入難七十九

夫婦人懷身入難月可用長流水調益元散日三服欲其易產也產後自無一切虛熱血氣不和之疾

如未八月則不宜服也以滑石滑胎故也

眉煉八十

夫小兒眉煉在兩目眉煉在耳目輒耳在足曰靴痒此三者皆謬名也內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火乃心火熱盛之致然也可用銚針刺之而出血一刺不愈當再刺之二刺則必愈矣內經云血實者宜決之決者破其血也眉煉者不可用藥傳之其瘡多痒則必爬若藥入眼則眼必損矣

牙疳八十一

夫小兒牙疳牙疳者齒齲也齲者是牙斷腐爛也上下牙者是手足陽明二經也或積熱於內或服銀粉芭荳大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而上至於齒斷齒斷牙縫為嫩薄之分反為害也可以射香玉線子治之乳母臨卧當服黃連解毒湯一服疳病則愈

夜啼八十二

夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花一枚服罷此藥於淨室中卧一兩日則止也

丹瘤八十三

夫小兒丹瘤浮赤走引或遍身者乃邪熱之毒在於皮膚以磁片擦出血則愈如不愈則以拔毒散搽三二十度必愈矣內經曰丹熛赤瘤火之色也相火之病也

疳眼八十四

夫小兒疳澁眼數日不開者乃肝木風熱之致然也可調服涼膈散數服眼開而愈

身瘦肌熱八十五

夫小兒身瘦肌熱面黃腹大或吐瀉腹有青筋兩脇結硬如椀之狀名乳癰癖俗呼曰炒脾是也乳癰

得之綿帛大厚乳食傷多大熱則病生肌大飽則必傷於腸胃生於肌表者赤眼丹瘤疥癬癰瘡煉赤白口瘡牙疳宣爛及寒熱往來此乳母抱不下懷積熱薰蒸之故兩手脉浮而數也傷於腸胃者吐瀉驚疳噎氣腹脹肌瘦面黃肚大筋直喜食泥土揉鼻竅頭髮作稔乳辨不化此皆大飽之致然也久而不愈則成乳癰兩手脉沉而緊也此其辨也已上諸證皆乳母懷抱奉養過度之罪癖之疾可以丁香化痺散取過數服牛黃通膈丸甘露散益黃散等藥磨之如不愈者有揉脾一法

呪曰 日精月華 助吾手法 勅斬滅消

驅毒勅攝

右用法之人每念一遍望日取氣一口吹在手心自揉之如小兒病在左壁上用法之人亦左手揉之在右壁以右手揉之亦吹在乳脾上令母揉之男孩兒用單日女孩兒用雙日大忌風雨陰晦產婦孝子見之用法之時宜於日中前晴明好日色則可矣

大小便不利八十六

小兒大小便不利通者內經曰三焦約也約者不

行也可用長流水煎八正散時時灌之候大小便利即止

久瀉不止八十七

夫小兒久瀉不止者至八九月間變為秋深冷利瀉泄清白時復撮痛乳瓣不化可用養脾丸丸如黍米大每服二三十丸米飲下日三服則愈若治芻蕘之兒萬舉萬全富家且宜消息

通身浮腫八十八

夫小兒通身浮腫是水氣腫也小便不利者通小便則愈內經曰三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體

否腫是風乘濕之證。也可用長流水加燈心煎五苓散時時灌之。更於不透風暖處頻浴汗出則腫消腫消則自愈。內外無治故也。

發驚潮搐八十九

夫小兒三五歲時或七八歲至十餘歲發驚潮搐涎如拽鋸不省人事目瞪喘急將欲死者內經曰此皆得於母胎中所授悻悻怕怖驚駭恐懼之氣故令小兒輕者為驚吊重者為癩病風搐為腹中積熱為臍風已上證候可用吐涎及吐之藥如吐訖即用朱犀腦射清涼墜涎之藥若食乳之子母亦宜服安魂定魄之劑定志丸之類如婦人類如婦人懷孕之日大忌驚憂悲泣縱得子必有諸疾

拗哭不止九十

夫小兒拗哭不止或一二日或三四日乃邪祟之氣湊于心拗哭不止也有歲經一法以綿絹帶縛手足訖用三姓婦人淨驢槽卧小兒於其中不令傍人知而覷之候移時則拗哭自止也

身熱吐下九十一

夫小兒身熱吐下腹滿不進乳者可急用牛黃通膈丸下過四五行則愈

風熱涎嗽九十二

夫小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少服之
不過三五日愈

水瀉不止九十三

夫小兒水瀉不止可服五苓與益元各停用新水調
下一二錢 服無時

瘡疥風癬九十四

夫小兒瘡疥風癬可用雄黃散加芒硝少許油調傳
之如面上有瘡癬不宜擦藥恐因而入眼則損目
必矣

甜瘡九十五

夫小兒甜瘡久不愈者俗呼曰香瘡是也多於面部
兩耳前有一法令母口中嚼白米成膏子臨卧塗
之不過三五上則愈矣小兒并乳母皆忌雞猪魚
兔酒醋動風發熱之物如治甜指亦可

白癩瘡九十六

夫小兒白癩瘡者俗呼為雞糞禿者是也可用甜瓜
蔓龍頭不以多少河水浸之一宿以沙鍋熬取極
苦汁瀝去瓜蔓以文武慢火熬成如稀錫狀盛於
磁器中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡着河水洗

淨却用熬下苳蔓膏子一水盞加半夏末二錢生
薑自然汁一兩匙狗膽一枚同調不過三兩上立
可大忌雞猪魚兔動風發熱之物

瘡疾不愈九十七

夫瘡疾連歲不愈者可用呪菓法治之菓者謂桃杏
棗梨栗是也

呪曰

吾從東南來 路逢一池水 水裏一條龍

九頭十八尾 問伊食甚的 只喫瘡病鬼

右念一遍吹在菓子上念七遍吹七遍在上令病

人於五更雞犬不聞時面東而立食訖於淨室中
安困忌食苳菓葷肉熱物此法十治八九無藥處
可以救人

腰痛氣刺九十八

夫一切男子婦人或因欬嗽一聲或因悲笑啼泣擡
昇重物以致腰痛氣刺不能轉側及不能出氣者
可用不卧散嚏之汗出痛止如不食可用通經散
道水丸瀉十餘行瀉訖服烏金丸和血丹痛減則
止

赤瘤丹腫九十九

夫小兒有赤瘡丹腫先用牛黃通膈丸瀉之後用陟
起石掃傳則丹毒自散如未散則可用銇鍼砭刺
出血而愈

瘡疱癩疹一百

夫小兒瘡疱癩疹跌瘡丹慄等疾如遇火運勝時不
可使用升麻湯解之升麻湯者是辛溫之劑止可
用辛涼之劑解之太平之時可用辛溫之劑發散
後便可用涼膈加當歸白虎湯化斑湯玉露散煎
服之甚者解毒湯調胃承氣湯投之古人云瘡瘍
者首尾俱不可下此言誤人久矣豈不聞揚湯止

淡粥一二日則止

儒門事親卷之六

戴人張子和著

風形

因驚風搐一

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成
風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則
令人代哺口目張睽唇舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡
每發市人皆聚觀夜卧發熱衣被盡塞遍身燥痒
中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破
其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊

十形三療

戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺膺穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽噎腫傷昏憤如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺是輕顫減熱亦不作是亦能步手能巾擲自持匙筋未至三涌病去如濯病後但覺戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣味復以膏之藥切不可熱劑溫之恐反成他病也

風搖反張二

呂君王之妻年三十餘病風搖目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以天南星雄黃天麻烏附用之殊無少效戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲且動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病先涌風痰二三升次以寒劑下十餘行又以鉋鍼刺百會穴出血二盃立愈

殮泄三

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸

醫以為脾受大寒故併與聖散子葶藶丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不忘口戴人至而笑曰春傷於風夏必飧泄飧泄者米穀不化而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能剋戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脉皆浮數為病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置床之下不令病人見火恐增其熱給之入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶減火一半須臾汗止泄亦止

因風鼻塞四

常仲明常於炎暑時風快處披露肌膚以求爽為風所賊三日鼻塞雖坐於暖處少通終不大解戴人使服通聖散入生薑葱根豈葭同煎三兩服大發汗鼻立通

風痰五

常之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一兩次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一兩盞方已比年發益頻目見黑花發作昏不知人三四

日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一效偶
遇戴人于穩水之南鄉戴人以雙解散發汗次以苦
劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數
次方獲全瘥

癩六

朱葛解家病癩疾求治于戴人戴人辭之待五六月
間可治之時也今春初尚寒未可服藥我已具行裝
到宛立待五六月製藥朱解家以為託辭後戴人果
以六月間到朱葛乃具大蒜浮萍等藥使人召解家
藥已成矣可來就治解為他醫所惑竟不至戴人

日向日我非託也以春寒未可發汗暑月易發汗內
經論治癩疾自眉毛再生針同發汗也但無藥者
用針一汗可抵千針故高俱奉採萍歌曰不居山兮
不在岸採我之時七月半選甚癩風與瘡風此小微
風都不算豆淋酒內下三九鐵撲頭上也出汗噫文
士相輕醫氏相疾文士不過自損醫氏至於害人其
解家之謂與陽夏張主簿病癩十餘年眉鬚皆落皮
膚皴澁如樹皮戴人斷之曰是有汗者可治之當大
發汗其汗出當臭其涎當腥乃置燠室中編塞風隙
以三聖散吐之汗出周身如卧水中其汗果粘臭不

可聞痰皆腥如魚涎兩足心微有汗次以舟車丸瀉
川散大下五七行如此數次乃瘳

手足風裂七

陽夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫戴人曰厥陰所
至為豐又曰鳴紊啓坼皆風之用風厲木木鬱者達
之達謂吐也先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸瀉
之立効

胃脘痛八

一將軍病心痛不可忍戴人曰此非心痛也乃胃脘
心痛也內經曰歲木太過風氣流行民病胃脘當
心而痛乃與神祐丸二百餘粒病不減或問曰此胃
脘有寒宜溫補將軍素知戴人明了復求藥於戴人
戴人復與神祐丸二百餘粒作一服大下六七行立
愈

搖擗丸

黃如村一叟兩手搖擗狀如拽鋸冬月不能覆被適
戴人之舞陽道經黃如不及用藥針其兩手大指後
中注穴上戴人曰自肘已上皆無病惟兩手搖擗左
氏所謂風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈
小指握紋盡處是穴也

面腫風十

南鄉陳君俞將赴秋試頭項偏腫連一日狀若半壺其脉洪大戴人出視內經面腫者風此風乘陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑葱根荳蔻同煎一大盞服之微汗次日以草薢鼻中大出血立消

驚風十一

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也當搦時切戒把捉手足握持太急必半身不遂也氣血偏勝必痺其一臂漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹篾鋪之涼地使小兒寢其上待其搐風力行徧經絡茂極自止不至傷人

風溫十二

陽夏賀義夫病傷寒當三日以裏醫者下之而成結胸未戴人治之戴人曰本風溫證也不可下又下之太早故發黃結胸此已有瘀血在胸中欲再下之恐已虛准一涌可愈但出血勿驚以茶調葦葉散吐之血數升而衄且噎逆乃以巾捲小鍼而使刺其刃不數日平復

風木十三

張小一初病疥爬搔變而成腫喘不能食戴人斷為風木水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘腠理開發就燠室中用酸苦之劑加全蝎一枚吐之節次用藥末至三錢許出痰約數升汗隨湧出腫去八九分隔一日臨卧向一更來又下神祐丸七十餘粒三次嚥之至夜半動一行又續下水者桃紅丸六十九以麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車丸通經散及白朮散以調之愈

右

古與艾妻產後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫大小便如常其脉浮而大此風水腫也先以蠶水擦其痒以火助之發汗次以舟車丸瀘川散瀉數行後四五日方用苦劑涌訖用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車瀘川復下之末後用水煮桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以為倒布袋法耳病再來則必死世俗只見塵中貨藥者用銀粉芭荳塌腫者暫去復來必死以為驚俗豈知此法乃內經治鬱之玄兼此藥皆小毒其毒之藥豈有反害者哉但愈後忌換房室等事况風水不同從水無復來之理

小兒風水十四

鄆之營兵秋家小兒病風水諸醫用銀粉粉霜之藥
亦洩反澁飲食不進頭腫如腹四肢皆滿狀若水晶
家人以為勉強求治于戴人戴人曰此證不與壯年
同壯年病水者或因留飲及房室此小兒纔七歲乃
風水證也宜出汗乃置燠室以屏帳遍遮之不令見
火若內火見外火必昏憤也使大服胃風湯而浴之
浴訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五
分隔一二日仍依前治之汗出腫減七分乃二汗而
全減尚未能食以檳榔丸調之兒已喜笑如常日矣

腎風十五

桑惠民病風面黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫
落作癩醫三年一日戴人到棠谿來求治于戴人戴
人曰非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風
脊痛不能正立其色焔面疣然浮腫今公之病腎風
也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色
矣於是下針自額上下鉞鍼直至顙頂皆出血果如
墨色偏腫處皆鉞之惟不鉞目銳眦外兩旁蓋少陽
經此少血多氣也隔日又鉞之血色乃紫二日外又
刺其血色變赤初鉞時痒再刺則額覺痛三刺其痛

不可任蓋邪退而然也待二十餘日又輕刺一遍方已每刺必以水水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根熱之藥病再作戴人在東方無能治者

勞風十六

戴人見一男子目下腫如卧蚕狀戴人曰目之下陰也水亦陰也腎以為水之主其腫至于目下故也此山房室交接之時勞汗遇風風入皮膚得寒則閉風不能出與水俱行故病如是不禁房則死

中風十七

高評事中風稍緩張令涌之後服鉄彈丸在普濟加減方中或問張曰君常笑人中風服鉄彈丸今以用之何也張曰此收後之藥也令人用之於大勢方來之時正猶蚍蜉撼大樹不識次第故也

暑形

中暑十八

小鄭年十五田中中暑頭痛困卧不起戴人以雙解散汗之又以米醋湯投之未解薄晚又以三花神祐丸大下之遂愈

又

張叟年七十一暑月田中因飢困傷暑食飲不進時
時嘔吐口中常流痰水腹脇作痛醫者槩用平胃散
理中丸導氣丸神効又加鍼灸皆云胃冷乃問戴人
戴人曰痰屬胃胃熱不收故流痰水以公年高不敢
上涌乃使一筋探之不藥而吐之痰涎一升次用黃
連清心散導飲丸玉露散以調之飲食加進惟大便
秘以生薑大棗煎調胃承氣湯一兩奪之遂愈

瘖瘡十九

故息城一男子病瘖求治于戴人診兩手脈皆沉伏
而有力內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣

腸中作痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈禳
避匿無所不至終不能療戴人曰此瘖瘡也以三花
神祐丸五七十九丸以冷水送過五六行次以冷水止
之冷主收斂故也濕水既盡一二日煎白虎湯作頓
啜之瘡猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎
水六七次若翻漿次以柴胡湯和之間用妙功丸磨
之瘡悉除

火形

馬刀二十

襄陵馬國卿病左乳下二脇間期門穴中發癰堅而

不潰痛不可忍醫者皆曰乳癰或曰紅系漏或曰
覷心瘡使服內托散百日又服五香連翹湯數月皆
無驗國卿偃俛而來求治于戴人遇諸市戴人見之
曰此馬刀癰也足少陽膽經之病出靈樞十二經以
示之其壯如馬刀故曰馬刀堅而不潰乃邀之於食
肆中使食水浸湯餅國卿曰稍覺緩次日先以滄鹽
上涌又以涼劑滌去熱勢約數十行腫已散矣

又朱葛黃家妾左脇病馬刀癰增寒發痛已四五日
矣戴人適避暑於寺中來乞藥戴人曰此足少陽膽
經病也少血多氣堅而不潰不可急攻當以苦劑涌

之以五香連翹湯托之既而痛止然癰根未散有一
盜醫過見之曰我有妙藥可潰而為膿不如此何時
而愈既經毒藥痛不可忍外寒內熱嘔吐不止大便
黑色食飲不下號呼悶亂幾至于死諸姑惶懼夜投
戴人戴人曰當尋元醫者余不能治其王母亦來告
至于再三戴人曰脇間皮薄肉淺豈可輕用毒藥復
令洗出以涼劑下之痛立止腫亦消

項瘡二十一

戴人在西華寄於夏官人宅忽項上病一瘡狀如白
頭瘡腫根紅硬以其微小不慮也忽遇一故人見邀

以羊羔酒飲雞魚醢蒜皆在焉戴人以其故舊不能
辭又忘其禁忌是夜瘡疼痛不可忍項腫及頭口發
狂言因見鬼神夏君甚懼欲報其家戴人笑曰請無
慮來日當平乃以酒調通經散六七錢下舟車丸百
餘粒次以熱麵羹投之上涌下泄一時齊作合去半
盆明日日中瘡腫已平一二日腫出而愈夏君見大
奇之

伐指痛二十二

一妻病伐指痛不可忍酒調通經散一錢半夜
而痛減余因嘆曰向見陳五曾病此醫以

為小蟲傷或以草上有毒物手因觸之遷延數月膿
盡方已以今日觀之可以大笑

瘰癧二十三

一婦人病瘰癧延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉
求戴人療之戴人曰火淫所勝治以鹹寒命以滄鹽
吐之一吐而着痂次用涼膈散解毒湯等劑皮肉乃
復如初

咽喉腫塞二十四

一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫不退藥既難
下鍼亦無功戴人以當歸荆芥甘草煎使熱嗽之以

冷水拔其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽
喉之病甚急不可妄用鍼藥

舌腫二十五

南隣朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起
和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大二倍一外科以燔
鍼刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛巖戴人
曰血實者宜決之以銚鍼磨令鋒極尖輕砭之日砭
八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減
腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰
諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔鍼艾火是何義也

腰胯痛二十六

戴人女僮冬間自途來面赤如火至隱陽病腰胯大
痛裏急後重痛則見鬼神戴人曰此少陽經也在身
側為相火使服舟車丸通經散瀉至數盆病猶未瘳
人皆怪之以為有祟戴人大怒曰驢鬼也復令調胃
承氣湯二兩加牽牛頭末一兩同煎服之太過數十
行約一二缶方捨其杖策但發渴戴人恣其飲水西
瓜梨柿等戴人曰凡治火莫如水水天地之至陰也
約飲水一二桶猶覺微痛戴人乃刺其陽陵穴以伸
其滯足少陽膽經之穴也自是方寧女僮自言此病

每一歲須瀉五七次今年不曾瀉故如是也常仲明
悟其言以身有濕病故一歲亦瀉十餘行病始已此
可與智者言難與愚者論也

狂二十七

一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如虫行
兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脉皆洪大如絙
繩斷之曰口為飛門胃為賁門曰口者胃之上源也
鼻者足陽明經起於鼻交頰之中旁納太陽下循鼻
交人中環唇下交承漿故其病如是夫徭役煩擾
火化火乘陽明經故發狂故經言陽明之病登

高而歌棄衣而走罵言不避親疎又况肝主謀膽主
決徭役迫遽則財不能支則肝屢謀而膽屢不能決
屈無所伸怒無所泄心火熾薄遂乘陽明金然胃本
屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發
狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱
則達之火鬱則發之良謂此也又以調胃承氣湯半
斤用水五升煎半沸分作三服次下二十行血水與
瘀血相雜而下數升取之乃康以通聖散調其後

痰厥二十八

一夫病痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而

已戴入見之問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調苧蒂末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中啞然下咽有聲從灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐噦吐膠涎數升頗腥砒石尋常勿用以其病大非如此莫能動然無苧蒂亦不可使用宜消息之大凡中風涎塞往往止斷為風專求風藥靈寶至寶誤人多矣劉河澗治風捨風不論先論二火故令

法貴於火形中

滑泄乾嘔二十九

麻先生妻當七月間病臟腑滑泄以去濕降火之藥治之少愈後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來噎乾嘔逆胃脇痛不能轉側耳鳴食不可下又復瀉余欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請戴人比及戴人至因檢劉河澗方惟益元散正對此證能降火解表止渴利小溲定利安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服之夜半徧身出冷汗如洗元覺足冷如水至此是大燄頭頓輕

肌涼痛減嘔定痢止及戴人至余告之已解戴人曰
益元固宜此是少陽證也能使人寒熱徧劇他經縱
有寒熱亦不至甚既熱而有痢不欲再下何不以黃
連解毒湯服之乃令診脉戴人曰娘子病來心常欲
痛哭為快否婦曰欲如此余亦不知所謂戴人曰少
陽相火凌燻肺金受屈制無所投告肺主悲但欲
痛哭而為快也麻先生曰余家諸親無不敬服脉初
洪數有力自服益元散後已平又聞戴人之言使以
解毒藥以解毒湯中味數服之大瘥矣

笑不止三十

戴人路經古毫逢一婦病喜笑不止已半年矣衆醫
治者皆無藥術矣求治于戴人戴人曰此易治也以
滄塩成塊者二兩余用火燒令通赤放冷研細以河
水一大碗同煎至三五沸放温分三次啜之以釵探
於咽中吐去熱痰五升次服大劑夫黃連解毒湯是
也不數日而笑定矣內經曰神有餘者笑不休此所
謂神者心火是也火得風而成焰故笑之象也五行
之中惟火有笑矣

膈食中滿三十一

遂平李官人妻病咽中如物塞食不下中滿他醫治

之不効戴人診其脉曰此痰膈也內經曰三陽結為膈王啓玄又曰格陽云陽盛之極故食格拒而不入先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食已下又以葶藶散再越之健啖如昔日矣

目盲三十二

戴人女僮至西華目忽暴盲不見物戴人曰此相火也太陽陽明氣血俱盛乃刺其鼻中攢竺穴與頂前五穴大出血目立明。

小兒悲哭不止三十三

一小兒悲哭痛日不休兩手脉弦而緊戴人曰心火甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心燥則痛甚故燥甚悲亦甚令浴以溫湯漬形以為汗也肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉膈中之邪熱

小兒手足搐搦三十四

李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水洒之乾令復洒之令極濕俛卧兒于地上良久渾身轉側泥浣皆滿仍以水洗之少頃

面瘡

目赤三十五

李氏範日常赤至戊子年火運君火司天其年病目者往往暴盲運火炎烈故也民範是年目大發遂遇戴人以菘蒂散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先於左目內眥赤發牽睛狀如鋪麻左之右次銳眥發亦左之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次交亦五次皆涌又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云嘗候秋涼再攻則愈火功旺而在皮膚雖攻其裏無

益也秋涼則熱漸入裏方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜屬木明與動屬火所以不宜見日也蓋民範因初愈後曾冒暑出門故痛連發不愈如此涌泄之後不可常攻使服黍粘子以退翳方在別集。

熱形

沙石淋三十六

酒監房善良之子年十三病沙石淋已九年矣初因瘡疹餘毒不出作便血或豈令服太白散稍止後又因積熱未退變成淋悶每發則見鬼神號則驚隣適

戴人客鄧墻寺以此病請戴人曰諸醫作腎與小腸
病者非也靈樞言足厥陰肝之經病遺溺閉瘕閉謂
小溲不行瘕為淋瀝也此乙木之病非小腸與腎也
木為所抑火來乘之故熱在脬中下焦為之約結成
沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯鹵今夫羊豕之脬吹
氣令滿常不能透豈真有沙石而能漏者邪以此知
前人所說服五石丸散而致者恐未盡然內經曰木
鬱則達之先以荏苒散越之次以八政散加湯鹵等
法頓毀之其沙石自化而下

又屈村張氏小兒年十四歲病約一年半矣得之麥

秋發則小腸大痛至握其鰓跳躍旋轉號呼不已小
溲數日不能下下則成沙石大便秘澁肛門脫出一
二寸諸醫莫能治聞戴人在朱葛寺避暑乃負其子
而哀請戴人戴人曰今日治今日効時日在辰巳間
矣以調胃承氣僅一兩加牽牛頭末三錢汲河水煎
之令作三五度嚥之又服苦末丸如芥子許六十粒
日加哺上涌下泄一時齊出有膿有血涌瀉既覺定
令飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲
新水二三十遍病去九分止哭一次明日困卧如醉
自晨至暮猛然起走索食於母歌笑自得頓釋所苦

繼與太白散八正散等調一日大瘥恐暑天失所養
留五日而歸戴人曰此下焦約也不吐不下則下焦
何以開不令飲水則小溲何以利大抵源清則流清
也

又栢亭劉十三之子年六歲病沙石淋戴人以苦劑
三涌之以益腎散三下之立愈

膏淋三十七

麻邑一閭閻家有子二十三歲病膏淋三年矣鄉中
醫不能治往京師徧訪多作虛損補以溫燥灼以鍼
艾無少減聞戴人僑居隱東見戴人曰惑蠱之疾也

亦曰白淫實由小腹寒熱非虛也可以涌以泄其人
以時暑憚其法峻不決者三日浮屠一僧曰予以有
暑病近覺頭痛戴人口亦可涌願與君同之母畏也
於是涌痰三升色如黑礬汁內有死血并黃綠水又
瀉穢穢數行尋覺病去方其來時面無人色及治畢
次日面如醉戴人慮其暑月路遠又慮數方使歸以
自備云

二陽病三十八

常仲明病寒熱往來時欬一二聲面黃無力懶思飲
食夜多寢汗日漸變削諸醫作虛損治之用二十四

味燒肝散鹿茸牛膝補養二年口中痰出下部轉虛
戴人斷之曰上實也先以涌劑吐痰二三升次以柴
胡飲子降火益水不月餘復舊此證名何乃內經中
曰二陽病也二陽之病發心脾不得隱曲心受之則
血不流故女子不月脾受之則味不化故男子少精
此二證名異而實同仲明之病味不化也

小兒面上赤腫三十九

黃氏小兒面赤腫兩目不開戴人以銚鍼刺輕砭之
除兩目尖外亂刺數十鍼出血三次及愈此法人多
從必欲治病不可謹護

頭熱痛四十

丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布
圍其頭上置水於其中日易數次熱不能已諸醫莫
識其證求見戴人戴人曰此三陽蓄熱故也乃置炭
火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈僧顧從
者曰此神 hands 也

勞嗽四十一

馳口鎮一男子年二十餘歲病勞嗽數年其聲欲出
不出戴人曰問曾服藥否其人曰家貧未嘗服藥戴
人曰年壯不妄服藥者易治先以苦劑涌之次以舟

車濟川大下之更服重劑果瘥

一田夫病勞嗽一涌一泄已減大半次服人參補肺湯臨卧更服檳榔丸以進食

又東門高三郎病嗽一年半耳鳴三月矣嗽膿血面多黑點身表俱熱喉中不能發聲戴人曰嗽之源心火之勝也秋傷於濕冬生欬嗽冬水既旺水濕相接隔絕於心火火不下降反而炎上肺金被燥發而為嗽金燬既久聲反不發醫者補肺腎皆非也戴人令先備西芘冰雪等物其次用涌泄之法又服去濕之藥兩日已矣

勞嗽咯血四十二

潁陽劉氏一男子年二十餘歲病勞嗽咯血吐唾粘臭不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如瘡瘡寢汗如水累服麻黃根敗蒲扇止汗汗自若也又服寧神散寧肺散止嗽嗽自若也戴人先以獨聖散涌其痰狀如雞黃汗隨涌出昏憤三日不省時時飲以凉水精神稍開飲食加進又與人參半夏丸桂苓甘露散服之不經數日乃愈

吐血四十三

岳八郎常日嗜酒偶大飲醉吐血近一年身黃如橘

昏損發作數日不省漿粥不下強直如厥兩手脉皆
沉細戴人視之曰脉沉細者病在裏也中有積聚用
舟車丸百餘粒瀘川散五六錢大下十餘行狀如葵
菜汁中燥糞氣穢異常忽開兩目伸挽問左右曰我
緣何至此左右曰你吐血後數日不省得戴人治之
乃醒自是五六日必以瀉凡四五次其血方止但時
欬一二聲潮熱未退以涼膈散加桔梗當歸各秤二
兩水一大盃加老竹葉入蜜少許同煎去滓時時呷
之同與人參白虎湯不一月復故

拒血四十四

棠谿李民範初病嗽血戴人以調四白湯一兩加當歸
使服之不動再以舟車丸五六粒以過三四行又嘔
血一椀若庸工則必疑不再宿又與舟車丸百餘粒
通經散三四錢大下之過十餘行已愈過半仍以黃
連解毒湯加當歸煎服之次以草薢心鼻中出血半升
臨晚又用益腎散利數行乃愈

因藥燥熱四十五

高燦巡檢之子八歲病熱醫者皆為傷冷治之以熱
藥攻矣欲飲冰水禁而不與肉水涸竭煩燥轉生前
後皆閉口鼻俱乾寒熱往來嗽欬時作遍身無汗又

欲灸之適遇戴人戴人責其母曰重衲厚被煖炕紅
爐兒已不勝其熱矣尚可灸乎其母謝以不明戴人
令先服人參柴胡飲子連進數服下爛魚腸之類臭
氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪凉水連進數杯節
次又下三四十行大熱方去又與牛黃通膈丸復下
十餘行兒方大痊前後約五十餘行無所困冰雪
水飲至一斛向灸之當如何哉

肺癰四十六

武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半
年病愈甚以禮來聘戴人戴人往視之診其兩手脉
尺寸皆潮於關關脉獨大戴人曰癰象也問其乳媪
曾有痛處否乳媪曰無戴人令兒去衣舉其兩手觀
其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身乃避
之按其左脇則不避戴人曰此肺部有癰也非肺癰
也若肺癰已吐膿矣此不可動止可以藥托其裏以
待自破家人皆疑之不以為然服藥三日右脇有三
點赤色戴人連辭云此兒之病若早治者談笑可已
今已失之遲然破之後方驗其死生矣若膿黃赤白
者生也膿青黑者死也遂辭而去私告天祥之友李
簡之曰數月之後即此兒必有一證也其證乃死矣

肺死于已至期而頭眩不舉不數日而死也其改群醫治之斷為骨蒸證戴人獨言其時有癰也心終疑之及其死家人輩以火焚其棺既燃天祥以杖破其脇下果出青黑膿一椀天祥仰天笑曰諸醫誤殺吾兒矣

痿四十七

死丘營軍校二人皆病痿積年不瘥腰已下腫痛不舉遍身瘡赤兩目昏暗唇乾舌燥求療于戴人戴人欲投瀉劑二人不從為他醫溫補之藥所惑皆死其同病有宋子王者俄首曰彼已劫而死我其改之敬邀

戴人戴人曰公之疾服熱藥久矣先去其藥邪然後及病邪可下三百行子王曰敬從教先以舟車丸瀆川散大下一盆許明日減三分兩足舊不仁是日覺痛痒累至三百行始安戴人曰諸痿獨取陽明陽明者胃與大腸也此言不止謂鍼也鍼與藥同也

口瘡四十八

一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗一去其九次服黃連解毒湯不十餘日皆釋

虛勞四十九

西華東茂之病虛勞寢汗面有青黃色自膝以下冷
痛無汗腹中燥熱醫以薑附補之五晦朔不令飲水
又禁梳頭作寒治之請于戴人戴人曰子之病不難
愈難於將護恐愈後陰道轉茂子必不慎束生日不
敢戴人先以舟車丸瀆川散下五七行心火下降覺
渴與水水飲之又令漂浴數日間面紅而澤後以河
水煮粥溫養脾胃河水能利小溲又以活血當歸丸
參柴胡散五苓散木香白朮散調之病大瘥寢汗
止兩足日煖食進戴人常曰此本肺痺當以涼劑
之一物在目為涼在皮為汗在下為小溲穀多
水少為常無水可乎若禁飲水必內竭內竭則燥熱
生焉人若不渴與水亦不肯飲之矣束生既愈果忘
其戒病復作戴人已去乃殂

心痛五十

酒官楊仲臣病心氣痛此人常好飲酒初飲三二杯
必逸走跛懶兩足三五十次其酒稍散方能復席飲
至前量一醉必五七次至明嘔青黃水數日後變魚
腥臭六七日始安戴人曰宜涌乃吐蟲一條赤黃色
長六七寸口目鼻皆全兩目膜瞞狀如蛇類以鹽滌
乾示人

傷寒極熱五十一

戴人之僕常與隣人同病傷寒俱至六七日下之不
過隣人已死僕發熱極投於井中撈出以汲水貯之
檻使坐其中適戴人遊他方家人偶記戴人治法曰
傷寒三下不通不可再攻便當涌之試服葦葉散良
久吐膠涎三椀許與宿食相雜在地狀如一帚頓快
乃知世醫殺人多矣戴人之女僮亦嘗吐一吏傷寒
吐訖使服太白散甘露散以調之

失笑五十二

戴人之次子自出妻之後日瘦語如瓮中此病在中

也常然第三指失笑此心火也約半載日飲冰雪更
服涼劑戴人曰惡雪則愈矣其母懼其大寒戴人罵
曰汝親也吾用藥如鼓之應桴尚惡涼藥宜乎世俗
之謗我也至七月厭永不飲病日解矣

赤目五十三

安喜趙君王目暴赤腫點洗不退偶思戴人語曰凡
病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散
君王歎曰法之妙其速如此乃知法不遠人自遠法
也

目裏五十四

清州王之一子年十餘歲目赤多淚褻工無効戴人見之曰此兒病且亟當得之母腹中被驚其父曰其娠時在臨清被圍戴人令服葶藶散加鬱金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至翌日其目耀然爽明李仲安見而驚曰奇哉此法之入其日又與頭上出血及眉上鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸三十粒投之下十八行病更不作矣

痘後嘔吐五十五

河間劉光濟之子以二歲病痘後嘔吐發昏用丁香葦寇之類不効適麻先生寄其家乃謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰劉河間常言涼膈散可治瘡疱張戴人用之如神况內經言少陽所至為嘔涌少陽者相火也非寒也光濟欣而從之此日利二行適王德秀自外入聞其利之也乃曰瘡疱首尾不可下麻自悔其多言果也已然姑待之此至食時下黃涎一合日午問之兒已索遊于街矣

熱厥頭痛五十六

彭吳張叟年六十餘歲病熱厥頭痛以其用涌藥時已一月間矣加之以火其人先利臍腑年高身困出門見日而仆不知人家人驚惶欲揉撲之戴人戴人曰大不可擾續與西葦凉水蜜雪少頃而蘇蓋病人年老涌泄目脉易亂身體內有炎火外有太陽是以跌自若是擾之便不救矣惟安定神思以凉水投之待之以淨淨便屬水自然無事若他醫必惑足以知戴人之諳練

產前喘五十七

武安胡產祥之妻臨難月病喘以涼膈散二兩四物

湯二兩朴硝一兩分作二服煎令冷服之一服病減大半次又服之病痊効矣產之後第六日血迷又用涼膈散二兩四物湯三兩朴硝一兩都作一服大下紫黑水其人至今肥健戴人常曰孕婦有病當十月九月內朴硝無碍八月者當忌之七月却無妨謂陽月也十月者已成形矣

血崩五十八

孟官人母年五十餘歲血崩一載僉用澤蘭丸黑神散保安丸白薇散補之不効載人見之曰天癸已盡本不當下血蓋血得熱而流散非寒也夫女子血崩

多因大悲哭悲甚則肺葉布心系為之恐血不禁而
下崩內經曰陰虛陽搏之為崩陰脉不足陽脉有餘
數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非
者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以揀香附
子二兩炒白芍藥二兩焙當歸一兩焙三味同為細
末水調下又服檳榔丸不拘日而安

婦人二陽病五十九

一婦月事不行寒熱往來口乾頰赤喜飲旦暮聞欬
二聲諸醫皆云經血不行宜蠶虫水蛭乾漆硃砂
青紅娘子沒藥血竭之類惟戴人不然曰古方中

雖有此法柰病人服之必臍腹發痛飲食不進乃命
止藥飲食稍進內經曰二陽之病發心脾心受之則
血不流故女子不月既心受積熱宜抑火升水流濕
潤燥開胃進食乃涌出痰一二升下泄水五六行濕
水上下皆去血氣自行涕流月事不為水濕所膈自
依期而至矣亦不用蠶虫水蛭之類有毒之藥如用
之則月經縱來小澀反閉他證生矣凡精血不足當
補之以食大忌有毒之藥偏勝而成天關

月閉寒熱六十

一婦年三十四歲經水不行寒熱往來面色痿黃唇

焦頰赤時效三兩聲向者所服之藥黑神散烏金丸
四物湯燒肝散驚甲散建中湯寧肺散鍼艾百千病
轉劇家人意倦不欲求治戴人憫之先涌痰五六升
午前涌畢午後食進益不數日又下通經散瀉訖一二
去痰一二升食進益不數日又下通經散瀉訖一二
升後數日去死皮數重小者如麩片大者如葦膜不
一月經水行神氣大康矣

惡寒實熱六十一

一婦身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以狐帽蒙其
首猶覺寒泄注不止常服薑附礬黃燥熱之劑僅得

平和稍用寒涼其病轉增三年不愈戴人診其兩手
脉皆如絙繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱
生多以涼布世心次以新汲水淋其病處婦乃叫殺
人不由病者令人持之復以冷水淋其三四十桶大
戰汗出昏困一二日而向之所惡皆除此法華元化
已曾用拂無知者

遇寒手熱六十二

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛戴人曰四肢者諸
陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛
以三花神祐丸大下之熱遂去

嘔逆不食六十三

栢亭王論夫本因喪子憂抑不思飲食醫者不察以
為胃冷血燥之劑盡用之病變嘔逆而瘦求治于戴
人一視涌泄而愈愈後忘其禁忌病復作大小便俱
秘臍腹撮痛嘔吐不食一日大小便不通十有三日
復問戴人戴人曰今先食葵羹菠薐菜猪羊血以潤
燥開結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意
飲水水數升繼搜風丸桂苓白朮散以調之食後服
導飲丸三十餘粒不數日前後皆通藥止嘔定食進
戴人臨別又留潤腸丸以防復結又留滌腸散大閱

則用之允服大黃牽牛四十餘日方瘳論夫自嘆曰
向使又服向日熱藥已非今日人矣一僧問戴人云
腸者暢也不暢何以此一句儘多

痊癰六十四

一省掾背項常有痊癰愈而復生戴人曰太陽血有
餘也先令涌泄之次於委中以銚鍼出紫血病更不
復作也

牙痛六十五

澤州李繼之忽病牙痛皺眉不語藥景先見之曰何
不藥也曰牙痛藥曰曾記張戴人云陽明經熱有餘

也宜天下之乃付舟車丸七十粒服畢遇數知交留
飲強飲熱酒數杯藥為熱酒所發盡吐之吐畢而痛
止李大笑曰戴人神仙也不三五日又痛再服前藥
百餘粒天下數行乃愈

淋六十六

戴人過息城一男子病淋戴人令頓食鹹魚少頃大
渴戴人令恣意飲水然後以藥之林立通淋者無水
故澁也

口臭六十七

趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如發
廁雖親戚莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金為火
所煉火主焦臭故如是也久則成腐腐者腎也此極
熱則反無水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而
去其七分夜用舟車丸瀆川散下五七行比旦而臭
斷嗚呼人有病口臭而終其老者世訛以為肺系偏
而與胃相通故臭妄論也

濕形

疝六十八

汝南司候李審言因勞役王事飲水坐濕地乃濕氣
下行流入臍囊大腫痛不可忍以金鈴川練子等藥

不効求治于戴人曰可服泄水丸審言惑之又數日
痛不可堪竟從戴人先以舟車丸瀆川散下青綠沫
十餘行痛止次服茴香丸五苓以調之三日而腫退
至老更不作夫疝者功肝經也下胃沫者肝之色也

水疝六

律科王敏之病寒其法在於寒形中

留飲

郭敬之病留飲四日浮腫不能食脚腫連腎囊痛先
以苦劑瀉之後以舟車丸瀆川散瀉之病去如拾遺
不蒙察張鳳村一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本

留飲諸醫皆以燥劑燥之中腕臍脘以火艾燔鍼刺
之瘡未嘗合戴人以苦劑越之其涎如膠乃出二三
升談笑而愈

黃疸七十一

蔡寨成家一童子年十五歲病疸一年面黃如金遍
身浮腫乏力惟食鹽豉焦物戴人以茶調散吐之涌
涎一盂臨晚又以舟車丸七八十粒通經散三錢下
四五行待六七日又以舟車丸瀆川散下四五行鹽
與焦物見而惡之面色變紅後再以茶調散涌之出
痰二升方能愈矣

又一男子作贅偶病疸善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更適他乎婦翁本農者召婿意欲作勞見其病甚每日辱詬人教之餌膽礬丸三稜丸了不聞涉鍼灸祈禳百無一濟戴人見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命以水水一盃飲之立止次服平胃散等間服檳榔九五七日黃退方生蓋脾疸之證濕熱與宿穀相搏故也俗謂之金勞黃

又朱葛周黃劉三家各有僕病黃疸戴人曰僕役之

職飲食寒熱風暑濕寒尋常觸冒也恐難調攝虛費治功其二家留僕於戴人所從其飲餌其一僕不離主人執役三人同服苦散以涌之又服三花神祐丸下之五日之間果二僕愈而一僕不愈如其言

黃病七十二

蔡寨一女病黃遍身浮腫面如金色困乏無力不思飲餌惟喜食生物灰菘之屬先以苦劑蒸餅為丸涌痰一椀又舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨食散氣不數日肌肉如初

病發黃七十三

安喜趙君玉為掾省日病發遍身黃往問醫者醫云
君乃陽明證公等與麻知幾皆受訓於張戴人是商
議喫大黃者難與論病君玉不悅歸自揣無別病乃
取三花神祐丸八十粒服之不動君玉乃誤曰予之
濕熱盛矣此藥尚不動以舟車丸瀘川散作劑大下
一斗糞多結者一夕黃退君玉由此益信戴人之言

水腫七十四

南鄉張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉戴人令
上涌汗而下泄之去水三四斗初下藥時以草貯囊
高丈兩足而卧其藥之行自腰已上水覺下行自足

以上水覺上行水行之狀如蛇走隧如線牽四肢奔
然涼寒會於臍下而出不旬日間病大減餘邪未盡
戴人更欲用藥竟不能從其言

涌水七十五

李七老病涌水證面黃而喘兩足皆腫按之陷而履
起行則濯濯有聲常欲飲水不能睡卧戴人令上涌
去痰而汗之次以舟車丸瀘川散下之以益腎散復
下之以分陰陽利水道之劑復下之水盡皆瘥

停飲腫滿七十六

涿郡周敬之自京師歸康邑道中渴飲水過多漸成

腫滿或用三花神祐丸俾其太峻或用五苓散分利水道又太緩淹延數多終無一效蓋粗工之技止於此耳後手足與腎皆腫大小便皆秘澁常仲明未治于戴人戴人令仲明付藥比及至已歿矣戴人曰病水之人其勢如長川之溢欲以杯勺取之難矣必以神禹決水之法斯愈矣

濕痺七十七

常仲明病濕痺五七年矣戴人令上涌之後可瀉五七次其藥則舟車瀉川通經神祐益腎自春及秋必十餘次方能愈公之疾不畢鍼灸與令嗣皆宜涌但

臆月非其時也欲俟春時恐子東適令姑屏病之大勢至春和時人氣在上可再瀉之以去其根卒如所論

又一衲子因陰雨卧濕地一半手足皆不隨若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久反大便澁風燥生經歲不已戴人以舟車丸下三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉戴人曰夫風濕寒之氣合而成痺水痺得寒而浮畜於皮膚之間久而不去內舍六腑日用去水之藥可也水濕者人身中之

寒物也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

又息帥病腰股沉痛行步坐馬皆不便或作脚氣寒濕治之或作虛損治之烏附乳沒活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日目赤上熱大小便澀腰股之病如故戴人診其兩手脉皆沉遲沉者為在裏也在裏者泄之以舟車丸瀆川散各一服去積水二十餘行至早晨服薤白粥一二頓與之馬已能矍鑠矣

李崇谿李十八郎病腰脚大不伸偃僂蹇蹇而行已數年矣服藥無效止藥却愈因秋暮涉水病復作醫或使服四斤丸其父李仲安乃乞藥于戴人戴人曰

近日服何藥仲安曰四斤丸公曰昏赤未其父驚曰目正暴發戴人曰宜速來不來則喪明既來則策杖而行目腫無所見戴人先令涌之藥忽下走去二十行兩目頓明策已棄矣比再涌泄能讀官歷日調至一月令服當歸丸健步而歸家矣

又息城邊校白公以隆暑時飲酒覺極熱於涼水池中漬足便其冷也為濕所中股膝沉痛又因醉卧濕地其痛轉加意欲以酒解痛遂以連朝而飲反成赤痛發間止且六十年徃徃斷其寒濕脚氣以辛熱治之不効或使服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作

如前罪囊痒濕且腫硬臍下似有物難於行以此免
軍役令人代之來訪戴人戴人曰余亦斷為寒濕但
寒則陽火不行故為痛濕則經隧有滯故腫先以苦
劑涌之次以舟車丸百餘粒濇川散四五錢微一兩
行戴人曰如激劑尚攻何況于熱藥補之手異
日又用神祐丸百二十九通經散三四錢是用僅得
四行又來日以神祐八十粒投之續見一二行又次
日服益腎散四錢舟車丸百餘粒約下七八行白公已
覺腹裏寒者暖硬者軟重者輕也腫者赤退飲食加
進又來涌之其病全瘳臨別又贈之以疎風丸併以

其方與之此公以其不肯妄服辛熱之藥故治也

屈膝有聲七十八

嶺北李文卿病兩膝臏屈伸有聲剝剝然或以為骨
鳴戴人曰非也骨不鳴馬能鳴此筋濕也濕則筋急
有獨緩者緩者不鳴急者鳴也若用予之藥一涌一
泄上下去其水水去則自無聲矣李文卿乃從其言
既而果然矣

白帶七十九

息城李左衙之妻病白帶如水窈滿中綿綿不絕穢
臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷

起石硫黃薑附之藥重重燥補污水轉多常以初日
易數次或一藥以木炭十斤置藥在鉗鍋中鹽泥封
固三日三夜炭火不絕燒令通赤名曰火龍丹服至
數升污水彌甚炳艾燒鍼三年之間不可勝數戴人
斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固如
此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰水二
三升次日下沃水十餘行三遍汗出周身至明日病
人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一子
內經曰少腹窻熱洩出白液帶之為病溶溶然若坐
水中故治帶下同治濕法瀉痢皆宜逐水利小洩勿

以赤為熱白為寒今代劉河間書中言之詳矣

濕嗽八十

趙君玉妻病嗽時已十月矣戴人處方六味陳皮當
歸甘草白朮枳殼桔梗君玉疑其不類嗽藥戴人笑
曰君怪無烏梅罌粟囊乎夫冬嗽乃秋之濕也濕上
逆而為嗽此方皆散氣除濕解急和經三服帖然効
矣

瀉兒八十一

一婦年三十四歲夜夢與鬼神交驚怕異常及見神
堂陰府舟楫橋梁如此一十五年竟無娠孕巫祈覲

禱無所不至鑽肌灸肉孔穴萬千黃瘦發熱引飲中
滿足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火盛於
上陰火盛于下鬼神者陰之靈神堂者陰之所丹楫
橋梁水之用兩手寸脉皆沉而伏知胸中有痰實也
凡三涌三泄三汗不旬日而無夢一月而有娠戴人
曰余活婦人使有娠此法不誣

濕癬八十二

一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒
時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流痛不可忍灸熨
董樛硫黃藺茹白彊蚕羊蹄根之藥皆不効其人姿

性妍巧以此病不能出嫁其父母求瘡于戴人戴人
曰能從余言則瘡父母諾之戴人以銚鍼磨令尖快
當以痒時於癬上各刺百餘鍼其血出盡煎塩湯洗
之如此四次大病方除此方不書以告後人恐為癬
藥所誤濕淫于血不可不砭者矣

又蔡寨成家童子一歲病滿腹胸濕癬每爬搔則黃
水出已年矣戴人先以苦末作丸上涌涌訖次以舟
車丸瀝川散下三五行次服涼膈加朴硝煎成時時
呷之不數日而愈

濕慙瘡八十三

穎韋韓吉卿自髀至足生濕慙瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類虫行袴靴愈而復生盤痕成凹一餘年不瘥戴人哂之曰此濕慙瘡也田水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃渠素不信戴人之醫至此大服

泄瀉八十四

古鄆一講僧病泄瀉數年丁香荳蔻乾薑附子官桂烏梅等燥藥燔鍼燒臍熯腕無有闕者一日發昏不省禮那贈紙者盈門戴人診兩手脉沉而有力脉訣利微小者生脉洪浮大者無瘥以菴蒂散涌之出寒痰數升又以無憂散泄其虛中之積及燥糞其僅盈斗次以白朮調中湯五苓散益元散調理數日僧已起矣非術精識明誰敢負荷如此

洞泄八十五

一講僧顯德明初聞家遭兵革心氣不足又為寇賊所驚得臟腑不調後入京不伏水土又得心氣以至危篤前後三年八仙丸鹿茸丸燒肝散皆服之不効乃求藥于戴人戴人曰此洞泄也以謀慮久不決而成肝主謀慮甚則乘脾久思則脾濕下流乃上涌痰半盆末後有血數點肝藏血故也又以舟車丸濬川

散下數行仍使澡浴出汗自尔日勝一日常以胃風湯白朮散調養之一月而強實復故矣

又李德卿妻因產後病泄一年餘四肢瘦乏諸醫皆斷為死證當時戴人在朱葛寺以舟載而乞治焉戴人曰兩手脉皆微小乃痢病之生脉况洞泄屬肝經肝木剋土而成此疾亦為腸澼澼者腸中有積水也先以車舟丸四五粒又以無憂散三四錢下四五行寺中人皆駭之病羸如此尚可過耶眾人雖疑然亦未敢誚且更看之復導飲丸又過之渴則調以五苓散向晚使人伺之已起而緝床前後約三四十行

以胃風湯調之半月而能行一月而安健由此闔寺服德卿之昆仲咸大異之

又劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步歌傾面色黧黑舉世治痢之藥皆用之無効適戴人治隱陽往問之戴人乃出示內經洞泄之說雖不已疑然畏其攻劑夜焚香禱神曰某以病久不瘥欲求治于戴人戴人以謂宜下之欲不從戴人名醫也欲從之形羸如此恐不任藥母已老矣無人侍養來日不得已須服藥神其相之戴人先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗喜食後以檳榔丸磨化其滯待數

日病已大減戴人以為去之未盡當以再服前藥德源亦欣然請下之又下五行次後數日更以苦齋麩之往問其家彼云已下村中收索去也忽一日入城面色極佳語言壯健但怪其跛足而立問何故如此德源曰足上患一癩戴人曰此裏邪去而於外病痊之後凡病皆如是也

大便少而頻八十六

太康劉倉使病大便少而頻日七八十次常於兩股間懸半枚瓠蘆如此十餘年戴人見之而笑曰病既頻而少欲通而不得通也何不大大下之此通因通用

也此一服藥之力乃與藥大下二十餘行頓止

暑泄八十七

殷輔之父年六十餘暑月病泄瀉日五六十行自建碓鎮來請戴人于陳州其父喜飲米家人輩爭止之戴人曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勸之少飲比及用藥先令速歸以菜苳鷄卵十餘枚同煮卵熟取出令豆軟下陳粳米作稀粥攪令寒食鷄卵以下之一二頓病減大半蓋粳米雞卵皆能斷痢然後製抑火流濕之藥調順而方愈

腹滿面腫八十八

蕭令腹滿面足皆腫痰黃而喘急食減三年之間醫
者皆盡而不驗戴人以葦蒂散涌之出寒痰三五升
以舟車丸瀘川散下之青黃涎沫幾半正以桂苓白
朮散五苓散調之半月復舊矣

儒門事親卷之七

戴人張子和著

燥形

臂麻不便八十九

鄆城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治于戴人戴人曰左手三部脉皆伏比右手小三倍此枯澁痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其麻立已後以辛涼

之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚麻戴人曰
病根已去此餘烈也方可鍼谿谷谿谷者骨空也一
日睛和往鍼之用靈樞中雞足法向上卧鍼三進三
引訖復卓鍼起向下卧鍼送入指間皆然手熱如火
其麻全去昔劉河間作原病式常以麻與澁同歸燥
門中真知病機者也

大便燥結九十

戴人過曹南省親有姨表兄病大便燥澁無他證常
不敢飽食飽則大便極難結實如鐵石或三五日一
登溷目前星飛鼻中血出肛門連廣腸痛痛極則發

昏服藥則病轉劇烈芭荳芫花甘遂之類皆用之過
多則困瀉止則復燥如此數年遂畏藥性暴急不服
但卧病待盡戴人過診其兩手脉息俱滑實有力以
大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥使食菠菱
葵菜及猪羊血作羹百餘日克肥親知見駭之嗚呼
粗工不知燥分四種燥於外則皮膚皴揭燥於中則
精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便溺結閉
夫燥之為病是陽明化也水液寒少故如此然可下
之當擇之藥之芭荳可以下寒甘遂芫花可下濕大
黃朴硝可以下燥內經曰辛以潤之鹹以契之周禮

曰以滑養竅

孕婦便結九十一

戴人過東杞一婦人病大便燥結小便淋澁半生不
娠惟常服踈道之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽
得孕至四五月間醫者禁踈道之藥大便依常為難
臨圍則力努為之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經
三四月弦望前後溲溺結澁甘分胎墮乃訪戴人戴
人診其兩手脉俱滑大脉雖滑大以其且妊不敢陡
攻遂以食療之用花減煮菠菱葵菜以車前子苗作
羹雜羊血作羹食之半載居然生子其婦燥病方

愈戴人曰余屢見孕婦利膿血下迫極努損胎但曰
前法治之愈者莫知其數也為醫拘常禁不能變通
非醫也非學也識醫者鮮是難說也

偏頭痛九十二

一婦人年四十餘病額角上耳上痛嗚呼為偏頭痛
如此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤色眩運
昏澁不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸
芎犀丸之類連進數服其痛雖稍愈則大便稍秘兩
目轉昏澁其頭上鍼灸數千百矣連年著灸其兩目
且將失明由病而無子一日問戴人戴人診其兩手

脈急數而有力風熱之甚也余諳此四五十年矣遍
察病目者不問男子婦人患偏正頭痛必大便澀滯
結硬此無他頭痛或額角是三焦相火之經及陽明
燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅
氣血壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治以大
承氣湯令河水煎三兩加芒硝一兩煎殘頓令溫分
作三五服連服盡蕩滌腸中垢滯結燥積熱下池如
湯二十餘行次服七宣丸神功丸以潤之菠菱葵菜
猪羊血為羹以滑之後五七日十日但遇天道晴明
以大承氣湯夜盡一劑是痛隨利減也三劑之外目

豁首輕燥澤結釋得三子而終

腰胯痛九十三

一男子六十餘病腰尻脊胯皆病數載不愈晝靜夜
躁大痛往來屢求自盡軼且夕則痛作必令人以手
槌擊至五更雞鳴則漸減向曙則痛止左右及病者
皆作鬼神陰譴白虎齧朝禱暮祝覘巫僧道禁師至
則其痛以減又夢鬼神戰鬥相擊山川神廟無不祭
者淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一
死有書生曰既云鬼神虎齧陰譴之禍如此禱祈何
無一應聞陳郡有張戴人精於醫可以問其鬼神白

虎與病乎彼若術窮可以委命其家從之戴人診其
兩手脉皆沉滯堅勁力如張絙謂之曰病雖瘦難於
食然腰尻脊膂皆痛者必大便堅燥其左右曰有五
七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言
魯令人剉取之僵下一兩塊渾身燥痒皮膚皺揭枯
澁如麩片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以姜
棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞
煖則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此弊非一日
也而况一齊人而傳之衆楚人咻之乎及煎成使稍
稍噍之從少至多累至三日天且晚臟腑下泄四五

行約半盆以燈視之皆燥糞燥痺塊及瘀血雜臟穢
不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至明
日將夕始覺飢而索粥温涼與之又困睡一二日其
痛盡去次令飲食調養日服道欬丸甘露散滑利便
溺之藥四十餘日乃復嗚呼世傳三十六虎書三十
六黃經及小兒三十六吊誰為之耶始作備者其無
後乎古人以醫為師故醫之道行今之人以醫辟奴
故醫之道廢有志之士耻而不學病者亦不擇精粗
一槩待之常見官醫迎送長吏馬前唱諾真可羞也
由是通今博古者少而師傳遂絕靈樞經謂刺與汗

雖久猶可拔而雪結與閉雖久猶可解而決去腰脊
膝痛者是太陽膀胱經也膝痛足少陽膽經之所過
也難經曰諸痛為實內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火
注曰心寂則痛微心燥則痛甚人見巫覡僧道禁師
至則病稍去者心寂也然去其後來者終不去其本
也古之稱痛隨利減不利則痛何由去病者既痊乃
壽八十歲故凡燥證皆三陽病也

寒形

因寒腰強不能屈伸九十四

北人衛德新因之折津冬月飲寒則冷病腰常直不

能屈伸兩足沉重難於行步途中以床舁過程程問
醫皆云腎虛以菝葜芭戟附子鹿茸皆用之大便反
秘潮熱上周將經歲矣乃乞拯於戴人戴人曰此疾
十日之效耳衛曰一月亦非遲戴人曰足太陽經血
多病則腰似折脰如結膈如裂太陽所至為屈伸不
利况腰者腎之府也身中之大關節今既強直而不
利宜鹹以熨之頓服則和柔矣難經曰強力入房則
腎傷而髓枯枯則高骨乃壞而不用與此用同今君
之證太陽為寒所遏血墜下滯腰間也

必有積血非腎也節次以藥可下數百行約去血一

二斗次以九曲玲瓏竈蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否德新曰未也至六日覺鳴七日而起以能揖人戴人曰病有熱者勿蒸蒸則損人目也

寒疝亦名水疝九十五

律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃菘每發遶腰急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散下四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒方舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍

又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病痼發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩羣時腫而冷戴人診兩手脉細而弱斷之曰秋脉也此因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣壅滯不能下榮於羣丸故其寒實非寒也木受金制傳之胃土胃為陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之經曰木鬱則達之土鬱則泄之今涌泄四次

果覺氣和。羣丸痒而暖。戴人曰：氣已入羣中矣。以茴香木茂之藥，使常服之，首尾一月而愈。

感風寒九十六

戴人之常谿也。雪中冒寒入浴，重感風寒，遂病不起。但使煎通聖散，單服之一二日，不食，惟渴飲水，亦不多飲。時時使人槌其股，按其腹，凡三四日不食，日飲水一二十度，至六日有謔語，妄見以調胃。承氣湯出下之汗。而愈。戴人常謂人曰：傷寒勿暖藥，惟飲水最為妙藥。但不可使之傷，常令揉散乃大佳耳。至六七日見有下證，方可下之。豈有變異哉！奈何醫者禁人飲水，至

有渴死者，病人若不渴，強與水飲，亦不肯飲耳。戴人初病時，鼻塞聲重，頭痛，小便如灰，淋汁及服調。胃承氣一兩半，覺欲嘔狀，探而出之，汗出熱熱然，須臾下五六行，大汗一日，乃瘳。當日飲冰水，時水下則痰出，約一二椀，痰即是病也。痰去則病去也。戴人時年六十一。

凍瘡九十七

戴人女僮，足有寒瘍，俗云凍瘡。戴人令服舟車丸，瘡川散，大下之，其瘡遂愈。人或疑之，戴人曰：心火降則寒消，何疑之有。

寒痰九十八

一婦人心下臍上結硬如斗按之如石人皆作病胎
鍼灸毒藥禱祈無數如補風然一日戴人見之曰此
寒痰診其兩手寸脉皆沉非寒痰而何以芫蒂散吐
之連吐六七升其塊立消過半俟數日後再吐之其
涎沫類雞黃腥臭特殊約二三升凡如此者三後以
人參調中湯五苓散調之腹已平矣

瀉利惡寒九十九

東門一男子病瀉痢不止腹鳴如雷不敢冷坐坐則
下注如傾諸醫例斷為寒証乾姜官桂丁香荳蔻之
屬枯礬龍骨皆服之矣何鍼不燔何艾不炷迂延將

二十載矣一日問于戴人戴人曰兩手寸脉皆滑余
不以為寒然其所以寒者水也以茶調散涌寒水五
七升無憂散泄積水數十行乃通因通用之法也次
以五苓散淡劑滲泄利之道又以甘露散止渴不數
日而冷食寒飲皆如故此法王啓玄稔言之矣奈無
人用之哉

內傷形

因憂結塊一百

息城司候聞父死于賊乃大悲哭之罷便覺心痛日
增不已月餘成塊狀若覆杯大痛不住藥皆無功議

用燔鍼炷艾病人惡之乃求于戴人戴人至適巫者在
在其傍乃學巫者雜以狂言以譖病者至是大笑不
忍回面向壁一二日心下結塊皆散戴人曰內經言
憂則氣結喜則百脉舒和又云喜勝悲內經自有此
法治之不知何用鍼灸哉適足增其痛耳

病怒不食一百一

項閔令之妻病食不欲食常好叫呼怒罵欲殺左右
惡言不輟衆醫皆處藥幾半載尚尔其夫命戴人視
之戴人曰此難以藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人
狀其婦大笑次日又令作角觝又大笑其旁常以兩

箇能食之婦誇其食美其婦亦索其食而為一嘗是
不數日怒減食增不藥而瘳後得一子夫醫貴有才
若無才何足應變無窮

不寐一百二

一富家婦人傷思慮過甚二年不寐無藥可療其夫
求戴人治之戴人曰兩手脉俱緩此脾受之也脾主
思故也乃與其夫以怒而激之多取其財飲酒數日
不處一法而去其人大怒汗出是夜困眠如此者八
九月不寤自是而食進脉得其平

驚一百三

衛德新之妻旅中宿于樓上夜值盜劫人燒舍驚墮
牀下自後每聞有響則驚倒不知人家入輩躡足而
行莫敢冒觸有聲歲餘不痊諸醫作心病治之人參
珍珠及定志丸皆無效戴人見而斷之曰驚者為陽
從外入也恐者為陰從內出驚者為自不知故也恐
者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽
傷矣乃命二侍女執其兩手按高椅之上當面前下
置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大
驚戴人曰我以木擊几何必驚乎伺少定擊之驚也
緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人畫背
後之窓徐徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云
驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人擊
其門窓自夕達曙夫驚者神上越也從下擊几使之
下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不
喜戴人至是終身厭服如有人言戴人不知醫者執
戈以逐之

兒寐不寤一百四

陳州長吏一小兒病寐而不寤一日諸醫作睡驚治
之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之
其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病乃問

于戴人戴人診其兩手脉皆平和戴人曰若驚風之
脉當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊其乳母
尔三日前曾飲醉酒否遽然笑曰夫人以煮酒見餽
酒味甚美三飲一罌而睡陳酒味甘而戀膈酒氣滿
乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花硝砂仁貫衆煎汁使
飲之立醒

孕婦下血一百五

劉先生妻有娠半年因傷損下血乞藥于戴人戴人
診之以三和湯一名玉燭散承氣湯四物湯對停加
朴硝煎之下數行痛如手拈下血亦止此法可與智

識高明者言高梁之家慎勿舉似非徒駭之抑又謗
之嗚呼正道難行正法難用古今皆然

收產傷胎一百六

一孕婦年二十餘臨產召穩媪三人其二媪極拽婦
之臂一其媪頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力為
之胎死于腹良久乃下兒亦如血乃穩媪殺之也豈
知放熟自落何必如此乎其婦因茲經脉斷閉腹如
刀剗大渴不止小溲闕絕主病者禁水不與飲口舌
枯燥牙齒齧黑臭不可聞食飲不下昏憤欲死戴人
先以冰雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止次以舟

車丸通經散前後五六服下數十行食大進仍以桂苓甘露散六一散柴胡飲子等調之半月獲安

又一婦人臨產召村媪數人侍焉先產一臂出媪不測輕重拽之臂為之斷子死于腹其母面青身冷汗熱繫不絕時微喘嗚呼病家其于死忽有人曰張戴人有奇見試問之戴人曰命在須臾鍼藥無及急取秤鈎續以壯繩以膏塗其鈎令其母分兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鈎其死胎命一壯力婦倒身拽出死胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以冰水灌之漸蘇二日大醒食進次日四物湯

調血數日方愈戴人常曰產後無他事因侍媪非其人轉為害耳

懷恐脇痛一百七

洛陽孫伯英因誣獄妻子波繫逃于故人是夜覺胃脇痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人適在馬當與公同往時戴人宿酒未醒強呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔牖望見伯英曰此公伏大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青脫色膈受怖也後會赦乃出方告戴人

背疽一百八

一富家女子十餘歲好食紫櫻每食即二三斤歲歲如此至十餘年一日潮熱如勞戴人診其兩手脉皆洪大而有方謂之曰他日必作惡瘡腫毒熱上攻目陽盛陰脫之證其家大怒不肯服解毒之藥不一二年患一背疽如盤痛不可忍其女忽思戴人曾有是言再三悔過請戴人戴人以銚鍼繞疽暈刺數百鍼去血一斗如此三次漸漸痛減腫消微出膿而斂將作加時使服十補內托散乃痊終身忌口然目亦昏終身無子

疔毒一百九

舞水一富家有二子長者年十三歲幼者十一歲皆好頓食紫櫻一二斤每歲須食半月後一二年幼者發肺癰長者發肺痿相繼而死戴人常嘆曰人之死者命耶天耶古人有詩爽口物多終作疾真格言也夫生百菓所以養人非欲害人然富貴之家失教縱欲遂至於是

咽中刺塞一百十

戴人過隱陽強家一小兒約五六歲同隊小兒以蜀黍楷相擊逆芒倒刺於咽中數日不下粥藥腫大發其家告戴人戴人命取水依道經中呪水法以左手

屈中指及無名指作三山印坐木盞于其上右手招印文是金鎗印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一口吹在淨水盞中呪曰吾取老君東流順老君奉勅攝去毒水吾托大帝尊所到稱吾者各各現帝身急急如律令攝念七遍吹在盞中虛攪卓三次為定其兒嚥水下咽曰我可也三五日腫散乃知法亦有不
可侮者

誤吞物咽中一百十一

一小兒誤吞一錢在咽中不下諸醫皆不能取亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙

令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚鬚之狀又別取一箸縛鍼鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕探之覺鈎入於錢竅然後以紙卷納之咽中與尖相抵覺鈎尖入紙卷之端不礙肌肉提之而出
腸痔下血一百十二

棠谿藥彥剛病下血醫者以藥下之默然而死其子企見戴人而問之曰吾父之死竟無人知是何證戴人曰病剉其心也心主行血故被剉則血不禁若血溫身熱者死火數七死必七日治不當下若下之不數企曰四日死何謂痛剉心戴人曰智不足而強謀

力不足而強與心安不得到也藥初與邢爭屋不勝遂得此病企由是大服拜而學醫

水腫羣丸一百十三

霍秀才之子年十二歲羣丸一旁腫腿戴人見之曰此因驚恐得之驚之為病上行則為嘔血下則腎傷而為水腫以琥珀通經散一瀉而消散

伏驚一百十四

上渠十家一男子年二十八歲病身弱四肢無力面黃左脇下身側上下如臂狀每發則痛無時食大便如常小便微黃已二三載矣諸醫計窮求

戴人治之視其部分乃足厥陰肝經無足少陽膽經也張曰甲膽乙肝故青其黃者脾也診膽脉小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎綠水病人曰昔曾屯軍被火自是而疾戴人夜以舟車百五十九瀆川散四五錢加生薑自然汁平日果下綠水四五行或問大加生薑何也答曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之比前藥減三之一又下綠水三四行痛止思食反有力戴人謂卜曰汝妻亦當病卜曰太醫未見吾妻何以知之曰尔感此驚幾年矣卜省曰當被火時我正在草堂中熟寐人驚喚我睡中驚不能言火

已塞門我艾搜出我火中今五年矣張曰汝膽伏火
驚甲木乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食
而殺穀熱雖能化穀其精氣不完汝必無子蓋敗經
反損婦人汝妻必手足熱四肢無力經血不時卜曰
吾妻實如此亦已五年矣他日門人因觀內經言先
瀉所不勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且
如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救于子
巳土能生庚金庚為大腸味辛者為金故大加生薑
使伐木然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先通
其閉塞之路是先瀉其所不勝後用薑汁調瀆川散

大下之次瀉其所勝也大。按陽干剋陽干腑剋腑臟
剋臟

外傷形

孕作病治一百十五

一婦人年四十餘得孕自以為年衰多病故疾復作
以告醫氏醫者不察加燔鍼於臍兩旁又以毒藥致
磨轉轉腹痛食減形羸已在牀枕來問戴人戴人診
其脉曰六脉皆平惟右尺洪大有力此孕脉也無擇
食為孕無疑左右皆笑之不數月生一女子兩目下
各有燔鍼痕幾喪其明凡治病婦當先問娠不可倉

卒矣

杖瘡一百十六

戴人出遊道經故息城見一男子被杖瘡痛癩癩毒氣入裏驚涎堵塞手禁不開粥藥不下前後月餘百治無功甘分於死戴人先以三聖散吐青蒼鷺涎約半大缶次以利膈丸百餘粒下臭惡燥糞又一大缶復煎通聖散數錢熱服之更以酸辣葱醋湯發其汗斯須汗吐交出其人活矣此法可以救死

落馬發狂一百十七

一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而

走罵言涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作問鬼跳巫殊不之顧丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中蕭然不遠二百里而求戴人一往戴人以車輪埋之地中約高二丈許上安之中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛狂病人於其上使之伏卧以軟裯襯之大令一人於下坐机一枚以捧攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝其病人曰我不能任可解我下從其言而解之索凉水與之冰水飲數升狂方罷矣

太傷脛腫一百十八

麻先生兄村行為犬所齧昇至家脛腫如罐堅若鐵
石毒氣入裏嘔不下食頭痛而重往問戴人女僮曰
痛隨利減以檳榔丸下之見兩行不瘥適戴人自舞
陽回謂麻曰脛腫如此足之二陰三陽可行乎麻曰
俱不可行如是何不大下之乃命夜臨卧服舟車丸
百五十粒通經散三四錢比至夜半去十四行腫立
消作胡桃紋反細於不傷之脛戴人曰慎勿貼膏紙
當今毒氣出流膿血水常行又一日戴人恐毒氣未
盡又服舟車丸百餘粒濬川散三四錢見六行病人
十四行易當六行反難何也戴人曰病盛則勝藥

病衰則不勝其藥也六日其膿水盡戴人曰膿水行
時不畏風盡後畏風也乃以念心風餅子旦二服之又
二日方與生肌散一傳成痂嗚呼用藥有多寡
使差別相懸向使不具其則利減之言非也以此
知知醫已難用醫尤難知

足閃胸痛一十七

谷陽鎮酒監張仲溫謁一廟觀匠者砌露臺高四尺
許因登之下臺或一足外踝腫起熱痛如火一醫
欲以錐鍼刺腫出血戴人急止之曰腫已痛矣更加
鍼二痛俱作何以忍也乃與神祐丸八九十九下二

十餘行禁食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常戴人曰吾足此法十治十愈不誑後人

膝腠跛行一百二十

舊塚馮家一小兒七八歲膝被腠跛行行則痛數日矣聞戴人不醫令人問之戴人曰小病耳教來是夜以舟車丸通經散溫酒調而下之夜半涌泄齊行上吐一椀下泄半缶既上床其小兒為母曰膝膾痒不可往來日使服烏金丸壯其筋骨一月疾愈而走矣

杖瘡入木一百二十一

小渠表三因強忍入家傷其兩脰外臙作瘡數年不

儒門事親卷之八

戴人張子和著

內積形

傷冷酒一百二十二

戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人
往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野
有以煮酒饋予者適村落無湯器冷飲數升便覺左
脇下悶漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得效戴
人診其兩手脉俱沉實而有力先以獨聖散吐之一
涌二三升色如煮酒香氣不變後服和脾散去濕藥

五七日百脉冲和始知鍼灸無功增苦楚矣

心下沉積一百二十三

顯慶寺僧應公有沉積數年雖不卧床枕每於四更後心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以為常人莫知為何病以藥請于戴人戴人令涌出膠涎一二升如黑礬水繼出黃綠水又下膿血數升自尔胸中如失巨山飲餌無筭安眠至曉

茶癖一百二十四

一維信好茶成癖積在左脇戴人曰此與肥氣頗同然瘡瘡不作便非肥氣雖病十年不勞一日况兩手

脉沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一飽可享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以木如意搦之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑使服十餘日諸苦悉蠲神清色莹

腹脹水氣一百二十五

感頌張承應年幾五十腹如孕婦面黃食減欲作水氣或令服黃芪建中湯及温補之劑小溲涸閉從戴人療焉戴人曰建中湯攻表之藥也古方用之攻裏

已誤也今更以此取積兩重誤也先以涌劑吐之置
火於其旁大汗之次與猪腎散四錢以舟車丸引之
下六釜殊不困續下兩次約三十餘行腹平軟徒啖
如昔常仲明云向聞人言瀉五六釜人豈能任及聞
張承應渠云誠然乃知養生與攻痼本自不同今人
以補劑療病宜乎不效

疝氣一百二十六

王亭村一童子入門狀如鞠恭而行戴人曰疝氣也
令解衣揣之二道如臂其家求療于戴人先刺其左
如刺重紙刺然有聲而斷令按磨之立軟其右亦然

觀者咸嗟異之或問曰石關穴也

胸膈不利一百二十七

沈丘王宰妻病胸膈不利口流涎沫自言咽下胃中
常雷聲心間作微痛又復發昏胸乳之間灸癥如碁
化痰利膈等藥服之三載病亦依然其家知戴人痰
藥不損來求之一涌而出雪白虫一條長五六寸有
口鼻牙齒走於涎中病者忿而斷之中有白髮一莖
此正與徐文伯所吐宮人髮癥一同虫出立安

冷積一百二十八

戴人過醮都營中飲會隣席有一卒說出妻事戴人

問其故荅曰五婦為室女心下有冷積如覆盃按之如水聲以熱手尉之如水聚來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脉沉而遲尺脉洪大而有力非無子之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不誣

積塊一百二十九

果園劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕諸法無措戴人令一月之內涌四次下六次所去痰約一二桶其中不化之物有如葵菜者爛魚腸之狀涌時以木如意搨之覺病積如刮漸漸而平及積之既盡塊痕反窪如白畧無少損至是而面有童色經水復行若當年少可以有子

肥氣積一百三十

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐卧鍼灸匝矣徒勞人耳乃敬邀戴人而問之既至斷之曰此肥氣也得之季夏戊巳日

在左脇下如覆杯久不愈令人發瘡瘡瘡者寒熱也
也以荏蒂散吐之魚腥黃涎約一二年至夜繼用舟
車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有
積處皆覺痛後用白朮散當歸散和血流經之藥如
斯涌泄凡三四次而方愈

伏瘕一百三十一

汴梁曹大使女年既笄病血瘕數年太醫宜企賢以
破血等藥治之不愈企賢曰除得陳州張戴人方愈
一日戴承語至汴京曹大使乃邀戴人問焉戴人曰
此病遺於大腸為伏瘕故結硬如塊面黃不月乃

用涌泄之法數年之疾不再旬而効女由是得聘
企賢問誰治之曹大使曰張戴人企賢立使人邀之
停飲一百三十二

一婦從年少時因大哭罷痛飲冰水困卧水停心下
漸發痛悶醫氏咸以為冷積治之以溫熱劑及禁食
冷物一聞茶氣病輒內作如此數年燎鍼燒艾瘡孔
數千十餘年後小便赤黃大便秘悶兩目加昏積水
轉甚流於兩脇世謂水癖或謂支飲硃漆稜茂攻磨
之藥竟施之矣食日衰積日茂上至鳩尾旁至兩脇
及臍下但發之時按之如水聲心腹結硬手不可近

者月發五七次甚則欲死諸藥皆厭三十餘年求戴人發藥診其脉寸口獨沉而遲此胸中有痰先以菴蒂散涌痰五七升不數日再越痰水及豨莶數日上涌數升凡三涌三下汗如水者亦三其積皆去以流濕飲之藥調之月餘大瘥

積氣一百三十三

寄西華縣岸山東顏先生有積二十年目視物不真細字不覩當心如頑石每發痛不可忍食減肉消黑點滿面腰不能直因遇戴人令涌寒痰一大盞如片粉夜以舟車丸通經散下爛魚腸葵菜汁七八行病

十去三四以熟藥帶投之復去痰一盆次日又以舟車丸通經散前後約百餘行略無少困不五六日面紅點去食進目明心中空曠遂失頑石所在旬日外來謝

沉積疑胎一百三十四

脩弓杜匠其子婦年三十有孕已歲半矣每發痛則召侍媪待之以為將產也一二日復故凡數次乃問戴人戴人診其脉瀦而小斷之曰塊病也非孕也脉訣所謂瀦脉如刀刮竹形主丈夫傷精女人敗血治之法下有病當瀦之先以舟車丸百餘粒後以調胃

承氣湯加當歸桃仁用河水煎乘熱投之三兩日又以舟車丸桃仁承氣湯瀉青黃膿血雜然而下每更衣以手向下推之揉之則出後三二日又用舟車丸以猪腎散佐之一二日又以舟車丸通經如前數服病十去九俟清明當未食時以鍼瀉三陰交穴不再旬塊已沒矣此與隔腹視五臟者復何異哉

是胎非積一百三十五

鬚王之妻病臍下積塊嘔食面黃肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無效戴人見之曰孕也其人不信再三求治于戴人與之平藥以應其意終不肯下毒藥

後月到果胎也人問何以別之戴人曰尺脉洪大也素問陰陽別論所謂陰搏陽別之脉

外積形

瘤一百三十六

戴人在西華衆人皆訕以為吐瀉一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘤正當目之上網內皆色如灰李下垂覆目之睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與尔取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術焉其人從之乃引入一小室中令倪計一

床以繩束其脰刺乳中大出血先令以手揉其耳瘤
上亦刺出雀薑立平出戶壽之大驚戴人曰人之有
技可盡窺乎

膠瘤一百三十七

郟城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有
瘤一類雞距一類角丸腕不能釧向明望之如桃膠
然夫家欲棄之戴人見之曰在手背為膠瘤在面者
為粉瘤此膠瘤也以銚鍼十字刺破按出黃膠膿三
兩此立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢
用此法矣

瘦一百二十八

新寨婦人年四十餘有瘦三瓣戴人令以鹹吐之三
涌三汗三下瘦色半消次服化瘦之藥遂大消去夫
病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

痔一百二十九

趙君玉常病痔鳳眼草刺蝟皮槐根狸首之類皆用
之或以乾薑作末塗猪肉灸食之大便燥結不利且
痛後數日因病黃大涌瀉數次不立痔作麻先生偶
記而書之君玉自識戴人之後痔軍不發耳

儒門事親卷之九

戴人張子和著

雜記九門

誤中涌法

嗽

張板村麻子春一小兒七八歲夏月病嗽羸甚戴人欲涌之子春以為兒幼弱懼其不勝少難之一日因飲酒家人與之酒傷多乃大吐吐定而嗽止蓋酒味苦苦屬通劑子春乃大悟戴人之言也

疥

貨生藥焦百善云有莧夫來買苦參欲治疥不識藥

性緩急但聞人言可治濃煎一椀服之須臾夫吐涎
一盆三二日疥作痂矣

赤目

一小兒名德孫眼發赤其母買銅碌欲洗兒目前成
家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開

感風寒

焦百善偶感風寒壯熱頭痛其巷人點蜜茶一椀使
啜之焦因熱服之訖偶思戴人語曰凡苦味皆能通
百善兼頭痛是病在上試以筋探之畢其痛立解

誤中寒涼

經閉

一婦人年三十餘歲病經閉不行寒熱往來欬嗽潮
熱庸醫禁切無物可食一日當暑出門忽見賣涼粉
者以冰水和飲大為一食頓覺神清骨健數月經水
自下

下血

一男子臟毒下血當六月間熱不可堪自甘於死忽
思米蜜水猛捨性命飲一大盃痛止血住

痢

一男子病膿血惡痢痛不可忍忽見水浸甜蔗心酷
喜之連皮食數枚膿血皆已人言下痢無正形是何

言也人止知痢是虛冷溫之燥之澁之截之此外無術矣豈知風暑人濕燥寒六者皆為痢此未審甜水所以効也

臨變不惑 涌法

戴人在西華夏公宅其僕鄭驢病法當吐命女僮下藥藥失不製又用之太多涌之不出反悶亂不醒乃告戴人戴人令以薪實馬槽既平昇鄭驢卧其上倒其頭須更大吐吐訖而快戴人曰先宜少進不涌旋加

西華一老夫病法當吐令門人藥景先下藥景先初

學其人不吐反下走二行乃告戴人戴人令取溫薑汁飲二椀再下涌藥一錢以雞翎探之乃吐既藥行方大吐吐訖又安戴人曰凡用吐藥先以薑汁一椀橫截之藥既咽下待少頃其雞翎勿令離口酸苦鹹雖能吐人然不撩何由出也

李仲安宅四婦人病同日下涌劑置燠室中火兩盆其一婦發昏衆人皆驚戴人笑曰內火見外火故然昇之門外使飲冰雪水立醒時正雪晴戴人曰熱見寒則醒衆由是皆服非老手諳練必不能鎮衆人之驚也

涌嗽

楊壽之妻病嗽十餘年法當吐之一日不止以麝香湯止之夜半猶不定再止之明日頗覺惡心更以人參湯止之二日稍寧自下藥丸三來聞戴人不顧謂藥景先曰病久嗽藥已擒病自然遲解涌後調理數日乃止戴人常言涌後有頓快者有徐快者有反悶者病未盡也有反熱者不可不下也大抵三日後無不快者凡下不止者以冰水解之凡藥熱則行寒則止

當禁不禁

病愈後犯禁而死

孟大亨病腫既平當節食及塩血房室等不慎病再適戴人歸家無救之者乃死

郾城董德固病勞嗽戴人曰愈後當戒房事其病愈恃其安觸禁而死死後妻生一子正當病瘥之日也董初堅諱至是乃彰

一宦家小兒病痢自堰頭車載至朱葛寺入門而死戴人曰有病遠行不可車載馬馱病已擾矣又以車馬動搖之是為重擾其即死

陽夏韓氏為犬所嚙大痛不可忍偏痒燥自庄頭載至家二十里一夕而死時人皆不知車之誤也戴人

常言傷寒之後忌葷肉房事勞水腫之後禁房及油
鹽滋味等三年滑泄之後忌油膩此三者決不可不
禁也戴人常曰病久否閉忽得涌泄氣血沖和心腎
交媾陽事必舉尤切戒房室元氣新至犯之則病再
作恐罪於涌泄

不忌反忌

不忌口得愈

一男子病泄十餘年葶藶阿膠訶子龍骨烏梅枯礬
皆用之矣中脘臍下三里歲歲灸之皮肉皴槁神昏
足腫泄如泔水日夜無度戴人診其兩手脉沉且微
曰生也病人忽曰羊肝生可食乎戴人應聲曰羊肝

止泄尤宜服病人悅而食一小盞許可以漿粥送之
病人飲粥數口幾半升續又食羊肝生一盞許次日
泄幾七分如此月餘而安此皆忌口太過之罪也戴
人常曰胃為水穀之海不可虛怯虛怯則百邪皆入
矣或思葷茹雖與病相反亦令少食圖引漿粥此權
變之道也若專以淡粥責之則病人不悅而食減久
則病增損命世俗誤人矣

不可忌口

戴人常曰臧毒酒毒下血嘔血婦人三十已下血閉
六月七月間膿血惡痢疼痛不止婦人初得孕擇食

者已上皆不忌口

高技常孤

戴人常曰人言我不接衆工戴人曰余豈不欲接人但道不同不相為謀醫之善惟素問一經為祖有平生不識其面者有看其文不知其義者此等雖日相親欲何說止不過求一二藥方而已矣大凡藥方前人所以立法病有自變豈可執方設於富貴之家病者數工同治戴人必不能從衆工衆工亦不能從戴人以此常孤惟書生高士推者復來日不離門戴人又曰我之術止可以教書生不能受醫者忽授老書

生曰我是書生豈不知書生書生固多許可以易慢戴人問之曰彼未嘗見予治病故有是言若親見予治病數十人自反思矣凡謗我者皆望風取信於群醫之口也孔子曰浸潤之潛膚受之愬不行焉可謂明也已矣

群言難正 謗吐

或言人有病不可吐人身骨節皆有涎若吐出骨節間涎令人偏枯戴人問之曰我之藥止是吐腸胃間久積或膜言間宿沫皆是胃膈中溢出者天下與一理也但病有上下故用藥有逆順耳

傳門書卷之九
七
謗三法

或言戴人汗下吐三法欲該天下之醫者非也夫古
人醫法未備故立此三法後世醫法皆備自有成說
豈可廢後世之法而從遠古譬猶上古結繩今日可
廢書契而從結繩乎戴人問之曰易之法雖多不離
八卦五行刑章雖多不過筭杖徒流岐伯曰知其要
者一言而終然則岐伯亦誑人乎大抵舉綱則簡計
目則繁

謗峻藥

或言戴人用醫言峻藥乃本草中下品藥也豈可服

哉戴人曰甚矣人之不讀書本草言上藥為君中品
為臣下品為佐使者所以辯其性剛柔也內經言所
謂君臣佐使者非本草中三品之謂也主治之為君
次君之謂臣應臣之為佐使假如大黃能治此病則
大黃為君甘遂能治此病則甘遂為君矣若專以人
參黃芩治人之邪氣此庸工所以常誤人命也李嗣
榮言京中閑人云戴人醫殺二婦遂辭太醫之職而
去又有人云昔曾醫殺穎守私遁而去麻知幾初聞
亦疑之乃載見戴人于隱陽觀其用藥百發百中論
議該贍應變無窮其所治之疾則不三二十年即十

年或五六年應手輒愈群醫之領袖無以養生及其
歸也謗言滿市皆曰戴人醫殺倉使耿四而去時倉
使以病卒與余未嘗通姓名耿四病嗽咯血曾問戴
人戴人曰公病消困不可峻攻宜以調養戴人已去
後而卒矣麻先生乃肖李嗣榮所言皆誣也凡余所
治之病皆衆壞之證將危且死而治之死則當然於
戴人又戴人所論按經切理衆誤皆露以是嫉之又
戴人治病多用峻激之藥將愈未愈之間適戴人去
群醫毀之曰病為戴人攻損急補之遂用相反之藥
如病愈則我藥可久服攻疾之藥可暫用我方攻疾
豈欲常服哉疾去則止藥若果欲養氣五穀五肉五
菜非上藥耶亦安在枯草死木之根核哉

病人負德愈後吝財

南鄉刁鐻工衛氏病風半身無汗已再中矣戴人以
三法療之尋愈恐其求報乃給曰余夜夢一長髯人
針余左耳故愈巫者武媪年四十病勞三年羸瘦不
足觀諸醫枝絕適五六月間求治願奉白金五兩戴
人治之五六日而安止荅曰白金三兩乃曰一道士
授我一符焚而吞之乃痊如此等人不可勝計若病
再作何以求治至有耻前言而不敢復求治療而殺

其耻者此所以世之庸工當正病時以犀珠龍麝丁
沉木乳乘其急而巧取之然君子博愛賢愚亦不當
効若輩也

同類始乎

群口誣戴人

有扶救之功如死我則有攻擊之罪明者不可不察
也麻先生常見他醫言戴人能治奇病不能治常病
能治雜病不能治傷寒他日見戴人問以傷寒事起
然獨出仲景言外之意謂余曰公慎勿殫仲景紙上
語惑殺世人余他日再讀仲景方

常

見傷寒疫氣動時輒避曰夫傷寒多變須時自往觀

若一人病已不能給况闔郡之中皆親故人乎其死
生常在六七日之間稍不往視別變矣以此他醫咸
謂之以為不能治傷寒蓋未常窺其涯涘浪為之訾
云

儒門事親卷之九

儒門事親撮要圖卷之十

難素撮要究治

太易

未見也氣

甲膽

三焦

寅相火
手少陽

乙肝

大腸

卯燥金
手陽明

太初

始之也氣

丙小腸

小腸

辰寒水
手太陽

包絡

巳風木
手厥陰

丁心

心

午君火
手少陰

太

戊胃

肺

未濕土
手太陰

從

是動則病者

其

氣之所感也

氣

天之邪感則害

則

人五藏肝心脾

和

肺腎實而不滿

可

下之而已也

水

穀之寒熱感則害

人

六腑膽胃三焦膀

識病用藥之圖

極		始之形		始之質		始之質	
巳脾	庚大腸	辛肺	壬膀胱	子君火	丑濕土	足少陰	足太陰
膽	胃	膀胱	肝	腎	脾	足少陰	足太陰
申相火	酉燥金	戌寒水	亥風水	子君火	丑濕土	足少陰	足太陰
足少陽	足陽明	足太陽	足厥陰	足少陰	足太陰	病	則
違	其	氣	則	病	則	所生病者血	之所成也
不實可吐之而已也	地之濕氣感則	肌膚從外而入	可汗之而已也	所生病者血	之所成也		

天此屬在天屬

天此屬在天屬	地此屬在土屬	六元論	位無金火德	藏此為金清君主熱	象此為金清君主熱	之添	圖
大虛	天面	風雲	萬物	地面	黃泉	肺上焦	心包
之路	之路	之路	之路	之路	之路	肝中焦	膽次
脾	腎	肝	膀胱	脾	腎	脾下焦	腎
足太陰	足少陰	足厥陰	足太陽	足少陽	足陽明	下絡大腸	下絡小腸
下絡大腸	下絡小腸	下絡膽經	卷終	下絡腎	旁絡膀胱		

外有風寒暑濕屬天之四令無形也
內有飢飽勞逸屬天之四令有形也

一者始因氣動而內有所成者謂積聚癥瘕瘤氣
癭起結核狂瞽癩癘疏曰癥堅也積也瘕氣
血也

二者始因氣動而外有所成者謂癰腫瘡瘍疥癬
疽痔掉瘻浮腫目赤燦症附腫痛痒之類是
也

三者不因氣動而病生于內者謂留飲癖食飢飽
勞損宿食霍亂悲恐喜怒相慕憂結之類是

也

四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣賊魅虫蛇
蠱毒伏尸鬼擊倒薄墜陪風寒暑濕斫射割
刺之類是也

風木鬱之病

故民病胃脘當心而痛四肢不
咽膈不通飲食
不下甚則耳鳴眩轉目不識人善僵仆筋骨強直
而不用卒倒而無所知也

暑火鬱之病

故民病少氣瘡瘍癰腫脇肋背脊向四肢膜膈

臏脹瘍癘嘔逆瘰癧骨痛節疼及有動泄注下濕
瘡腹中暴痛血溢流注精液衰少目赤心熱甚則
昏悶懊惱善暴死也

濕土鬱之病

故民病心腹脹腹鳴而為數後甚則心痛脇臑嘔
逆霍亂飲發注下肘腫身重脾熱之生也

燥金鬱之病

故民病欬逆心腹滿引少腹善暴痛不可反側噎
乾面塵色惡金勝而木病也

三水鬱之病

故民病寒客心痛腰椎痛大關節不利屈伸不便
善厥痞堅腹滿陰乘陽故也

初之氣

自大寒至立春春分厥陰風木之位陽用事而氣
微故曰少陽得甲子元頭常准以大寒交初之氣
分以六周甲子以應六氣下傲一月正月二月少
陽三陰三陽亦同

二之氣

春分至小滿少陰君火之位陽氣清明之間又陽
明之位

三之氣

小滿至大暑少陽相火之位陽氣發萬物俱成故亦云太陽旺其脉洪大而長天氣并萬物人脉盛衰造物造化亦同

四之氣

大暑至秋分自濕土之位天氣吉感夏後陰已用事故曰太旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異矣脉緩而長燥金旺緊細短濇以萬物乾燥明可見矣

五之氣

秋分至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故云金氣旺其脉細而微

終之氣

小雪至大寒太陽寒分之位陰極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也

風木肝酸 達鍼

與膽為表裏東方木也色青外應目主治血芍藥味酸微寒澤瀉鹹平烏梅酸熱

諸風掉眩皆屬於肝木主動治法曰達者吐也其高者因而越之可刺大敦灸亦同

暑火心苦 發汗

與小腸為表裏南方火色外應舌主血運諸經大黃苦寒木香薑溫黃連苦涼沒藥苦熱

諸痛痒瘡瘍皆屬於心火治法曰熱者汗之令其踈散也可刺少衝灸之亦同

脾甘 奪鍼

與胃為表裏中央土也色黃應唇主肌肉應四時蜜其涼其草其平

諸濕腫滿皆屬於脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白灸亦同

燥金肺辛 清鍼

與大腸為表裏西方金也色白外應皮毛鼻亦行氣乾薑辛熱生薑辛溫薄荷辛涼

諸氣憤鬱皆屬於肺金治法曰清者清膈利小便解表可刺少商灸亦同

寒水腎鹹 折鍼

與膀胱為表裏北方水也色黑外應耳主骨髓牡礪鹹寒水蛭鹹寒

諸寒收引皆屬於腎水治法曰折之謂抑之制其衝逆可刺涌泉灸亦同

大寒子上初之氣

初之氣為病多發欬風痰風厥涎潮痺塞口噤
半身不遂失音風癩風中婦人胸中留飲兩臍腹
微痛嘔逆惡心旋運驚悸狂陽心風搖擗顛掉初
之氣病宜以茱萸散吐之在下泄之

春分卯上二之氣

二之氣為病多發風溫風熱經曰風傷於陽濕傷
於陰微頭痛身熱發作風溫之候風傷於衛氣也
濕傷於脾氣也是以風溫為病陰陽俱自浮汗出
身重多眠鼻息語言難出此已上二證不宜下若

與芑苳大毒丸藥熱證併生重者必死二之氣病
宜以桂枝麻黃湯發汗而已

小滿巳上三之氣

三之氣為病多發熱皆傳足經者多矣太陽陽明
少陽太陰少陰厥陰陽者發熱惡寒頭項痛腰脊
強陽明身熱目疼鼻乾不得卧少陽者胸脇痛耳
聾口苦寒熱往來而嘔此三陽屬熱太陰者腹滿
咽乾手足自溫自利不渴或腹滿時痛少陰者故
口燥舌乾而渴厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢
厥冷爪甲青色三之氣病宜以清涼上溫下養不

宜用芭荳丸下

大暑未上四之氣

四之氣為病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉下痢及赤白相雜水穀不分消腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾脹滿氣痞手足無力小兒亦如此四之氣病宜滲泄五苓散之類也

秋分酉上五之氣

五之氣為病多發喘息嘔逆欬嗽及婦人寒熱往

來瘖瘡痺痔消渴中滿小兒斑癰瘡疱五之氣病宜以大小柴胡湯宜解治表裏之類

小雪亥上終之氣

終之氣為病多發風痰風寒濕痺四肢秋收多冬水復旺水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則收則痿厥弱無以運用水液澄清冷大寒之疾積滯瘕塊寒疝血瘕凡氣之疾終之氣病宜破積發汗之類

肝之經足厥陰風乙木

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癘疝婦人少腹

腫甚則噤乾面塵脫色是肝所生病者胸滿嘔逆
飧泄狐疝遺溺閉瘡為此諸病

膽之經足少陽風甲木

是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側其則面
微有塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所
生者病頭痛頷痛目內眦痛缺盆中腫痛腋下腫馬
刀俠瘦汗出振寒瘡胸脇助髀膝外至脛絕骨外
踝前及諸節皆痛小指次指脈為此諸病

心之經手少陰暑丁火

是動則病噤乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所

生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為
此諸病

小腸經手太陽暑丙火

是動則病噤痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是
主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外
後廉痛為此諸病

脾之經足太陰濕己土

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後
與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌
本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛溏瘕泄

水閉黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用
為此諸病

胃之經足陽明濕戾土

是動則病洒洒振寒善呻數欠頰黑至則惡人與
火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖而處
甚則欲上高而歌棄衣而走黃響腹脹是為肝厥
是主血所生病者狂瘡溫淫汗出鼽衄口喎唇脣
頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣衝股伏
兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前
皆熱其有餘于胃則消穀善飢溺色黃氣不足則

身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病

心包絡手厥陰為母血

是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿
心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脉所生
病者煩心心痛掌中熱為此諸病

三焦經手少陽為父氣

是動則病耳聾渾渾焯焯嗑腫喉痺是主氣所生
病者汗出目銳皆痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指
次指不用為此諸病

大腸經手陽明燥庚金

是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口
乾鼻衄喉痺肩前臈痛大指次指痛不用氣有餘
則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病
肺之經手太陰燥辛金

是動則病肺脹滿膨脝而喘欬缺盆中痛甚則交
兩手而脅此為臂厥是主肺所生病者欬上氣喘
渴煩心胸滿臈臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘
則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩
背痛寒少氣不足以息溺色變為此諸病

腎之經足少陰寒癸水

是動則病飢不欲食面如漆紫欬唾則有血喝喝
坐而欲起目眩暈如無所見心如懸若飢狀氣不
足則善恐心惕惕如人將捕之是為骨厥是主腎
所生病者口熱舌乾噤腫上氣喘乾及痛煩心心
痛黃疸腸澀脊股內後廉痛痠痿厥嗜卧足下熱而
痛為此諸病

膀胱經足太陽寒壬水

是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀
不可以曲脰如結踠如裂是為踝厥是主筋所生
病者痔瘡狂癩疾頭顛項痛目黃淚出衄衄項背

腰尻脰脚皆痛小指不用為此諸病

風治法風淫于內治以辛涼佐以甘辛以甘緩之以辛散之

防風通聖散 天麻散 防風湯 祛風湯

小續命湯 消風散 排風湯

暑治法熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

白虎湯 桂苓湯 玉壺丸 碧玉散

玉露散 石膏湯

治法濕淫于內治以苦熱佐以鹹淡以苦燥之以

淡泄之

白朮木香散 桂苓白朮丸 五苓散

葶藶木香散 益元散 神助散

火治法火淫于內治以鹹寒佐以甘辛以酸收之以

苦發之

宣膈散 解毒丸 神功丸

八正散 調胃散 大小承氣湯

燥治法燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以

苦下之

神功丸 麻仁丸 脾約丸

潤體丸

潤腸丸

四生丸

葶藶散

寒治法寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

大戊已丸

附子理中湯

六門病證藥方

風門獨治於內者

防風通聖散

防風天麻丸

防風湯

小續命湯

消風散

祛風丸

承氣湯

陷腦湯

神芩丸

大黃丸

備急丸

暑門獨治於外者

白虎湯

桂苓甘露散

化痰聖靈丸

益元散

玉露散

石膏散

拔毒散

木澄膏

魚膽丸

金絲膏

生肌散

濕門無治於內者

五苓散

葶藶末香散

白朮木香散

益元散

夫橋皮湯

桂苓白朮丸

神助散

大秦胡湯

小柴胡湯

柴胡飲子

防風通聖散

防風當歸飲子

火門無治於外者

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心湯

神芎丸

八正散

調胃散

調胃承氣湯

桂苓湯

麻黃湯

小建中湯

桑麻湯

五積散

燥門先治於內後治於外者

神芎丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

四生丸

謂寒藥攻其裏大黃無牽牛之類

謂熱藥攻其表桂枝麻黃升麻之類

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

寒門先治於外後治於內者

大已寒丸

理中丸

謂熱藥攻其表

謂寒藥攻其裏

內經濕變五泄

六氣屬天無形風暑濕火燥寒

五形濕屬戊己濕入肺經為實

六味屬地有質酸苦甘辛鹹淡

五臟濕屬脾胃濕入大腸為虛

胃泄風濕

夫胃泄者飲食不化完穀出色黃風乘胃也宜化劑之類

脾泄暑濕

夫脾泄者腹脹滿注實則生嘔逆三證宜和劑淡劑甘劑清劑之類

大腸泄燥濕

夫大腸泄者腸鳴切痛先宜寒劑奪之次甘劑分其陰陽也

小腸泄熱濕

夫小腸泄者溲血便膿血少腹痛宜寒劑奪之淡劑甘劑分之

大瘕泄寒濕

夫裏急後重數至圜而不能便先宜清劑寒劑奪之後以淡劑甘劑分之或莖中痛亦同

金櫃十全之法

飧泄春傷於風夏必飧泄春食不化亦成飧泄風而飧泄者先宜發劑次宜淡劑甘劑分劑之類洞泄春傷於風邪氣留連乃為洞泄瀉下褐色治法同上又宜灸分水穴濕氣在下又宜以苦劑

越之

洞泄寒中 洞泄寒中俗呼曰休息痢洞泄屬甲乙風木可灸氣海水分三里慎勿服峻熱之藥小便澁則生足腫腹脹滿者死於庚辛之日如屍臭者不治

霍亂 吐瀉水穀不化陰陽錯亂可服淡劑調以木水令頓服之則愈

注下 火氣太過宜涼劑又宜淡劑調水水令頓服之則愈此為暴下不止也

腫蠱 三焦閉澁水道不行水滿皮膚身體否腫

宜越劑發劑奪劑

臌脹 濁氣在上不散可服木香檳榔丸青皮陳

皮屬大腸為濁氣逆肺金為清氣逆氣化則愈矣

腸鳴 燥濕相搏為腸鳴中有濕亦為腸鳴火濕相攻亦為腸鳴治法同上治之大効

支滿驚漉 上滿而後泄下泄而後復上滿治法同上久則反寒治法同寒中如驚漉而腸寒者亦斯義風濕亦有支滿者

腸澼 大小便膿血治法同上又宜不二丸地榆

散駐車丸及車前子等藥次宜淡劑甘劑分劑
之類

臟毒 下血治法同上又宜苦劑在劑以苦燥之
如酒毒下血同

大小便血 大小便治法同上血溫身熱者死火
之成數七日而死如屍臭者不治

脫肛 大腸熱甚也用酸漿水煎三五沸稍熱滌
洗三五度次以苦劑堅之則愈

廣腸痛 治法同上又大黃牽牛丸散奪之法燥
瀉亦同痔漏廣腸痛腸風下血皆同臟毒治法

乳痔腸風 肛門左右有核內經曰因而飽食筋

脈橫解腸澀為痔屬大腸經可服枳殼之屬大

瘰生腸風乳痔相連

金櫃十全五泄法後論

天之氣一也一之川為風火燥濕寒暑故濕之氣一
之一也相乘而為五變其化在天為雨在地為泥在
人為脾甚則為泄故風而濕其泄也胃暑而濕其泄
也脾燥而濕其泄也大腸熱而濕其泄也小腸寒而
濕其泄也大瘕若胃不化變而為飧泄飧泄不已變
而洞泄洞泄不已變而為泄寒中此風乘濕之變也

若脾泄不已變而為霍亂霍亂不已變而為注下注下不已變而為腫蠱此暑乘濕之變也若大腸泄不已變而為臌脹臌脹不已變而為腸鳴腸鳴不已變而為滿鶩澹此燥濕乘之變也若小腸泄不已變而為腸澼腸澼不已變而為臌毒臌毒不已變而為前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄不已變而為脫肛脫肛不已變而為廣腸痛廣腸痛不已變而為乳痔腸風此寒乘濕之變也凡此二十五變若無濕則終不成疾况脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄之所由生也凡下痢之脉微且小者生浮大者

死水腫之反是浮大者生沉細者死夫病在裏脉沉在表脉浮裏當下之表當汗之下痢而脉浮滑水腫者脉沉細表裏俱受病故不治也凡臌血便兩手脉俱弦者死絕俱滑大者生血温身熱者死王太僕則曰若下血而身熱血温是血去而外逸也血属火故也七日而死者火之成數也夫殮泄得之於風亦汗可愈或伏驚怖則膽木受邪暴下綠水蓋謂戊己見伐於甲木也嬰兒泄綠水素問有嬰兒風理亦如之洞泄者殮泄之甚但殮泄近於洞泄洞泄久則寒中温之可也治法曰和之則可也汗之則不可蓋在腑

則易治入臟則難攻洞泄寒中自腑而入臟宜和解而勿爭水腫之作未遽而然也由濕遍於大腸小溲自瀆水濕既渚腫滿日倍面黃腹大肢體如泥濕氣周身難專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄反陽亦可保形陳莖去而淨府潔矣彼豈菟烏梅罌粟囊勿驟用也設病形一變必致大悞或通而塞或塞而通塞塞通通一法世俗止知塞劑之能塞而不知通劑之能通者於方也凡治濕皆以利小溲為主諸泄不已

宜灸水分穴謂水穀之所別也臍之上一寸半灸五七壯腹鳴如雷水道行之候也凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上涌而下泄表汗而裏攻半在表半在裏則宜和解之表裏俱見隨證滲泄此雖以治傷寒其於治濕也同仍察脉以視深淺問年壯以視虛實所投必如其意矣頃商水縣白堤酒監單昭信病殮泄逾年不愈此邑劉繼先命予藥之為桂枝麻黃湯數劑而愈因作五世圖撫難素本意書錄于上刊而行之誠有望

治法心要

儒門事親卷之十一

戴人張子和著

風論

論曰人之生也負陰而抱陽人居一氣道在其中矣外有八邪之相盪內有喜怒之交侵真氣內弱風邪襲之風之傷人或為寒熱或為疼痛或為偏枯或為拘攣其候不一風者善行而數變此乃風者百病之始萬病之長也蓋內不得通外不得泄此謂之病生於變亂也或失音而昏冒或口目而喎斜可用二聖散吐之或不知人事者或牙關緊急者粥不能下不



能嚥者煎三聖散鼻內灌之吐出涎沫口自開也次服無憂散通解丸通聖涼膈人參半夏丸桂苓甘露散消風散熱除濕潤養液之寒藥排而用之切忌雞猪魚兔油膩酒醋蕎麵動風之物及引痰之食大凡頭風眩運手足麻痺胃脘發痛心酸滿悶按之有聲皆因風風寒濕三氣雜至合而為痺也在上謂之停飲可用獨聖散吐之吐訖後服清上辛涼之藥通聖散加散半夏之辛仲景云此痰結胸中而致也

大凡風癩病發項強直視不省人事此及肝經有熱也或有咬牙者先用葶藶苦酒湯吐之吐後可服瀉青丸下之次服加減通聖散顯咬牙證用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬礞石代赭石發過米飲調之經云重劑以鎮之

大凡人病雷頭懶干俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得之即為首風此因邪風在於胸中熱甚化而為痰風所致也可以茶調散吐之吐訖次用葺用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面熱無汗經云火鬱發之開導之決之可用銚鍼出血則愈靈樞經云奪血者無汗

奪汗者無血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用涼
膈解毒消風散熱為治年壯者可以蕩滌積熱大
黃牽牛氣血宣通便無壅滯而愈

凡人患目腫經年不瘥俗言頭風所注更加頭痛者
豈非頭風者歟此乃足厥陰肝之經于少陰心之
經無五臟俱有大熱也可先用通解丸通利大小
便大黃越桃飲子治肝熱者羌活決明散服之大
有神効矣

凡目有淚出俗言作冷淚者非也內經曰肝液不禁
此大熱薰蒸於肝也熱極生風風衝於外火發於

內風熱相搏此大淚出也內外皆治可以愈也治
外以貝母一枚白膩者加胡椒七枚不犯銅鐵細
研臨卧點之治內者去風散熱之劑可用當歸飲
子服之陽熱極甚者目睛發痛不可忍者可用四
物湯加漢防己草龍膽送下神芎丸五七十九丸利
三五行則愈

凡人病痰發者其證不一蓋有五焉一曰風痰二曰
熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰沫痰諸痰在於膈
上使頭目不能清利涕唾稠粘或咳唾喘滿或時
發潮熱可用獨聖散吐之次服加減飲子或疏風

九間而服之內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡人但冒風邪溫病前三日在表未入於裏其候頭項強痛身熱惡風寒有汗無汗腰痛不得俛仰可用益元散五錢通聖散五錢相合服之名曰雙解散用水一大椀生薑十餘片連鬚葱白五七莖豉一撮煎至三五沸去滓先服大半良久以釵子探咽喉中吐出痰涎不可嗽口次又服少半投之如未汗出更用葱醋酸辣湯再投之衣被蓋覆汗出則愈矣氣交變大論云歲火太過炎暑流行火氣大劇肺金受邪上應熒惑大而明現其病執鬱

可用辛涼之劑萬舉萬全夫擾攘之世藥宜辛涼以解火治世人民安靜如用升麻葛根湯敗毒散辛溫之劑亦無加害亦可加葱白益豉上而越之表而解之內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗之後宜大將息旬日之後不可犯之犯之其病復作也

凡傷寒疫癘一法若無藥之處可用酸薑汁一大椀煎三五沸去菜葉飲訖候少時用釵子咽喉中探吐如此三次再煎葱醋湯投之衣被蓋覆汗出而瘥內經曰酸苦涌泄為陰傷寒三日頭痛身熱病

在上宜涌之涌後以淡粥養之

又一法用鳳凰臺散啗於鼻內連嚏二三十次啗藥時坐于煖室中嚏罷以漿水粥投之衣被蓋之汗出而愈嚏法同吐法用之

一法導引若無藥處用之令人盤兩足而坐以兩手交十指攀頭後風池風府二穴此風之門也向前仰首數至於地如此連折點地一百二十數急以酸醋白湯投之汗出即解

男子婦人小兒手足麻痺肌肉不仁者風寒濕三氣相雜至合為痺先用黃芩芍藥湯吐之吐訖次

用通解丸通經而瀉之瀉訖更用辛甘之劑汗之汗瀉之後可用當歸清涼飲子無烏荆丸除濕丹和血行經之藥則愈矣

凡人病痰證發者比前論更多有三證顯證共成五也一曰風痰二曰熱痰三曰濕痰四曰酒痰五曰食痰諸痰在口上焦毒薰於頭者諸陽之會首也故令病人頭重目溢涕唾稠粘或咳嗽喘滿時發寒熱可用赤小豆湯吐之吐後各隨其證而治之可服消風去熱道濕化痰者可服通聖加半夏導氣之劑豈不妙哉如新暴風痰者形寒飲冷熱痰

者火盛制金濕痰者停飲不散可服加減連翹飲
子除濕丹無憂散亦有酒痰者解毒三聖丸主之
五者食痰可用漢防已丸丹砂選而治之若依法
服之決有神効

論火熱二門

凡傷寒中風溫疫時氣冒暑感四時不正之氣若邪
毒之氣人或感之始于巨陽受之二日陽明受之
三日少陽受之前三日在于表陽也後三日在于
裏陰也內經熱論通謂之傷寒熱病者言一身之
熱氣也傷寒者外感于寒邪也夫傷寒之寒熱者

惡寒為表熱裏和故惡寒脈浮大也發熱為裏
表和故發熱脈滑實也可以吐法而解之用拔雪
湯主之生薑葱白豈豉同煎葶藶苦酒湯上而越
之若病人脈沉實者或不大便喘滿譫語不必拘
日數急攻于裏可用通解丸胃中渴燥者大承氣
湯下之慎不可用銀粉芭豈粉霜杏仁羌花熱性
之藥用之必致危殆仲景云調理傷寒者皆在汗
下之理當明表裏無不愈矣差之毫釐失之千里
深可慎之汗下之後切宜慎口可服淡粥而養之
不然其病復作

又論傷寒七八日潮熱腹滿發黃有班者何臟使
然內經云手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經
手少陰心經此四經受病也仲景云兩寸口脉俱
浮滑胸中有痰攻上者可用葶藶散吐之吐後隨
證調法處藥發黃之證皆因陽明中風太陽中濕
瘀血與宿穀相搏令人發黃煎梔子茵陳蒿湯調
加減五苓散服之後利小便快者如皂角色汁此
為効矣發班者心經受熱故有此證詳班輕重用
藥之理輕者班紅可用越桃飲子重者班紫毒氣
中成也大青四物湯玄參升麻湯主之漸熱腹

滿者謂邪熱在胃中也可以蕩滌邪熱流濕潤燥
宜急治之雜病寸口脉沉實者亦在胸中有啓玄
子注云上盈不愈者吐而奪之此病乃瘵矣班黑
者危而難治也黃病血病問其小便利與不利也
驗又有頭痛數日不止者此乃六陽受病也手之
三陽從手走至於頭足之三陽從下走至於上蓋
六陽之聚會也久痛不愈者令人喪目以胸膈亦
有宿痰故也先以羌活散瀉之以川芎石膏散白
虎湯選而服之則愈矣

又一法治頭痛不愈者可煎連鬚葱白豈鼓湯多

傷寒論卷之二十一
服之後吐為効吐後可服川芎薄荷湯辛涼之劑
清上之藥疎風丸散之類仲景云傷寒頭痛脉寸
口急而頭痛是也

凡男子有病面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧狀更加
涎嗽不止或喘滿面目浮腫者或身體俱熱或有
自汗內經云病名傷寒夾勞之證也治之柰何病
在上者其高者因而越之可用防已散吐之吐後
切用通解丸一服次服人參黃耆散當歸飲子加
減小柴胡湯擇而用之內經謂男女之證皆同類
用其治法也依此調治無不取効矣

凡人病心胸痞悶不欲飲食身體壯熱口燥舌乾大
小便不利有一工治之說下元虛冷便投煖藥十
數服其病不愈又一醫所論與前亦同又投煖藥
五七日其證轉加困弱請余治之診脉而說曰審
問日數飲食大小便何似小便赤色大便黑色便
言傷寒瘀血之證切用大黃芍藥湯二劑次服犀
角地黄湯二服後用通經丸一服換過大便黃色
以為効驗此藥服十餘服方可病瘥矣

凡男子婦人所顯證候皮膚發熱肌肉消瘦四肢倦
怠兼有頭痛頰赤心忪唇乾舌燥日晡潮熱夜有

盜汗涕唾稠粘胸膈不利或時喘嗽五心煩熱睡
卧不安飲食減少多思水漿經脉不通病名曰何
病竒病論曰女子不月血滯之病也男子腎虛精
不足也凡治此證降心火益腎水此之謂也可先
用通解丸瀉三二行次服當歸飲子又用加減五
苓散木香三稜丸人參黃耆散犀角散之類詳其
虛實選而用之若咯膿咯血大小便血但亡血者
不可宣吐勿服酸辛熱物薑附之類藥不可不戒
慎也若犯諸亡血之證者不可發汗不可溫補脾
胃之藥若服之雖進飲食不生肌肉此病轉加危

篤乃成虛勞之病也

凡醫人不明發表攻裏亂投湯劑有誤性命更大忌
夏月燔灸中脘臍下關元氣海背俞三里等燔灸
千百壯者全無一効使病者反受其殃豈不痛哉
虛勞之疾私嗜肉食麵辛酸之物不可食之但可
食者謹按神農食療而與之菠稜葵菜冰水清涼
之物不可禁也且圖寒涼滑利腸胃使氣血並無
壅礙燥澁經曰穀入于胃脉道乃行水入於經其
血乃成若不忌慎致令病人胃口閉澁則形體漸
瘦此乃死之由也諸勞皆倣此但諸人咯膿血衄

血大小便血者可服三黃丸黃連解毒丸涼膈散
加桔梗當歸大黃芍藥犀角地黃湯大作劑料時
時呷之內經曰所謂邪熱傷於肝心之病依此調
治萬舉萬全矣

凡人年四十以上日久多言以致虛損面色黧黑飲
食無味心胸痞悶四肢倦怠肌體餘熱大小便不
利治之奈何內經曰不可熱補之夫男子腎虛水
不足也凡補虛之劑多用烏附天雄之類豈知腎
虛燥也女子陰虛血不足也凡補虛多以陽劑是
知陽勝而陰虧也不可用性熱之藥補之空心

可服加減八物丸當歸飲子減桂五苓散煩渴加
益元名曰淡滲散更服通解丸顯仁丸亦可服之
大有神効

凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝
因而大飽筋脉橫解腸辟為痔故膿血者血隨熱
行參差入于腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱
則為難治身涼者可治也可先調中消血蕩除積
血瀉之三一瀉後服芍藥蘼皮丸黃連解毒湯
五苓散益元散各停新汲水調下五七錢甚者取
地黃汁半盞服之則愈矣

凡下利膿血腹痛不止者何也諸痛痒皆屬於心火
也可用通解丸加減瀉之量其虛實用之次用消
濕散加生薑大棗芍藥服之瀉訖又用新水調五
苓散服之

又一法煎燈心湯調下益元散五七錢此病大忌
油膩腥葷熱物

濕熱門

凡吐嘔而瀉病名曰何也內經熱論云此乃轉筋霍
亂之證也何氣使然此乃邪氣在于中焦使陰陽
二氣不能升降其證心痛而吐吐則先腹痛而瀉

心腹俱痛則吐瀉並作使致揮霍之間自然撩亂
此證喜寒涼之物可用冰水調五苓益元則愈矣
大忌熱物

轉筋之病治之柰何經曰勞者溫之溫者溫存之
意也

又一法生薑湯益元散白朮散禹攻散加水沉冷
細細呷之渴未止者頻頻飲之如無水新汲水亦
得用之大忌白粥米湯桂附種種之燥藥不可服
之服之必死如無藥處可服地漿地漿者掘地作
坑注新水于其中攪渾旋旋取澄清者飲三五盞

立愈

凡大人小兒暴注水瀉不止內經曰此名暴速注瀉久而不愈者為涌泄注下此乃火運太過之病也火注暴速故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散天水散或用井花水煎此藥放冷服之病即瘥矣不可用御米殼乾薑荳蔻聖散子之類縱然瀉止腸胃氣滯不通變為腹脹此法宜分陰陽利水道乃為治法之妙也

古天真論云一陰一陽之謂道故男女有陰陽之質不同則天癸精血之形亦異陰靜而海滿血溢

陽動而應合精泄二者通和故能有子易繫辭曰男女構精萬物化生人稟天地而成形也

風門

凡風中失音悶亂口眼喎斜內經曰風之為病善行而數變感則害人有倉卒之變故百病皆生於風也可用二聖散鼻內灌之吐出涎口自開也如不省人事牙關緊閉粥藥不能下者用此藥如無此證可三聖散吐之次服通聖涼膈人參半夏丸桂苓甘露散等切忌雞猪魚兔酒醋蕎麥動風之物引痰之食吐痰之法在方論中

凡頭風眩連手足麻痺胃脘發痛心腹滿悶按如水聲可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥仲景曰此寒痰結在胸中而致然也

凡癩病至于呆證者用三聖散吐之於煖室中勿令透風可以汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈

凡雷頭懶干俗呼之謬名也此疾胸中有寒痰由多沐之所致也可以茶調散吐訖三二升次用神芎丸下訖三五行然後服愈風餅子則愈矣此雷頭者是頭上有赤腫結核或如酸棗狀可用銚鉞出

血則愈矣

凡赤目經年不愈是謂頭風所注更加頭痛可用獨聖散吐之次服洗心散八正散之類赤目腫作是足厥陰肝經有熱用利小便瀉肝經除風熱之寒藥則愈矣

凡風衝泣下俗呼為冷淚者謬也內經曰太陽不能禁固因風衝于外火焚于內風熱相搏由此泣下內經曰熱則五液皆出熱甚則淚出治之以貝母一枚白膩者佳胡椒七枚不犯銅鐵研細點之臨卧治法曰風宜辛散寒宜甘發氣遇寒則凝血得

熱則散

凡諸痰在於膈上使頭目不能清利涕唾稠粘或欬嗽喘滿時發潮熱可用獨聖散吐之次服搜風丸之類內經曰所謂流濕潤燥之義也

凡冒風時氣溫病傷寒三日已裏頭痛身熱惡寒可用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑十餘片連鬚葱白十餘莖豈豉一撮同煎三五沸去滓先服多半良久以釵子探於咽中吐了不得嗽口次用少半投之更用酸辛葱醋湯投之衣被蓋覆汗出則解夫擾攘之世常與內經歲火太過同

法歲火太過炎暑流行火氣大劇金肺受邪上應榮感大而明顯若用辛涼之劑解之萬舉萬全人民安靜則便同水化可以升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之雖有潮熱亦無加害亦可加荳豉葱白上涌而表汗自出內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗所以發寒熱之邪也吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復作也

凡大人小兒風濕寒三氣合而為痺及手足麻痺不仁內經曰榮虛衛實皮膚不仁痺而不知痒痛可用藹金散吐之次服導水丸輕寒之藥泄之泄訖

次以辛溫之劑發散汗出後常服當歸芍藥烏附
行經和血之藥則愈矣

凡風蛀牙疼久不愈者用針籤芭荳一枚以燈燎之
煙盡存性於牙根盤上煙之則愈

凡泄瀉米穀不化日夜度腹中雷鳴下利完穀可

用導水丸禹功散泄瀉或病人老弱氣虛可用無

憂散泄之再觀病勢強弱之候一二可服胃風湯必

治其風如不愈者更服桂枝麻黃湯汗之則愈內

經曰夫風之中為腸風飧泄啓玄子云風入胃中

上薰於胃故食不化而下泄又云暮食不化為飧

泄又經云

陽於風夏為飧泄故風宜出汗腸中

鳴者風以動之動而有聲慎不可用罌粟豈菟乾

薑太燥之藥漸者燥之去其濕則愈病甚者攻

之不動反能為害經曰其減則漸其加則甚可用

五苓散去猪苓加人參散

凡富貴膏粱之家病瘧或間日或頻日發或熱多寒

少或寒多熱少宜大柴胡湯下過三五行次服白

虎湯或玉露散桂苓甘露散之類如不愈者是積

熱太甚以神芎三花神祐丸調胃承氣湯等大作

劑料下之下後以長流水煎五苓散服之或服小

柴胡亦可或先以常山散吐之後服涼膈白虎之類必愈矣大忌發熱之物猪雞魚兔五辛之物犯之則再發也

凡田野貧寒之家病瘧為飲食簾糲衣服寒薄勞力動作不與膏粱同法臨發日可用野夫多効方中溫脾散治之如不愈服辰砂丹治之必愈矣如喫罷此藥以長流水煎白虎湯服之不服食熱物為瘧疾是傷暑伏熱故也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

凡男子婦人骨蒸熱發皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼

痛面赤唇焦盜汗煩燥睡卧不安或時喘嗽飲食無味困弱無力虛汗黃瘦等證內證經曰男子因精不足女子因血不流而得此證可以茶調散輕瀉訖次以道朮丸禹功散輕瀉三五行後服柴胡飲子桂苓甘露散犀角散之類大搜風丸白朮丸調中湯木香檳榔丸人參散量虛實選而用之或咯血便血諸亡血者並不宜吐不可不知慎勿服峻熱薑附之藥若服之飲食難進肌肉消滅轉加危篤五勞之病令人不明發表攻裏遂悞至此大忌暑月於手腕足踝上著灸以其手足者諸陽之表起

于五指之外內經曰諸陽發四肢此穴皆是淺薄之處灸瘡最難痊也及胸穴中腕臍下背俞三里等穴或有灸數百壯者加以燔針畧無寸効病人反受苦楚可不思之勞疾多饒所思之物但可食者宜照食療本草而與菠菜葵羹水涼物慎不可禁且因水穀入胃脉道乃行也若遇禁則胃口閉而形體漸瘦而脉大乃死之候也諸勞皆倣此凡病人虛勞多日無力別無熱證者宜補之可用無比山藥丸則愈矣

痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉橫解腸癖為痔

而不愈變為漏痔與漏其治同法至

要大論云

太陽之勝凝凜且至非時水冰痔瘡

法注云水

氣太勝陽火不行此言陽火畏水鬱而為痔又少陰之復痺疹瘡瘍癰疽瘰疬痔注云火氣內蒸金氣外拒陽熱內鬱故為痺疹瘡瘍疹其赤為瘡也熱少則外生痺疹熱多則內結癰瘰小腸有熱則中外為痔其熱復之變皆病於身後及外側也又靈樞云太陽經虛則為痔瘡癩疾蓋水虛則火所乘故也可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更以葵羹菠菜通利腸胃大忌房室雞

魚酒醋辛熱之物

凡富貴之人痰嗽多是厚味所致內經云所謂味厚則發熱可服通聖散加半夏以止嗽更服人參半夏丸以化痰墜涎止嗽定喘貧乏之人多感風冷寒濕內經曰秋傷於濕冬生欬嗽可服寧神散寧肺散加白朮之類若欬極面赤煩寃半晌者此火化乘肺也宜詳辨之

凡大人小兒病沙石淋及五種淋澁癢閉并臍腹痛益元散主之以長流水調下蓋因熱在膀胱燥其津液故俗謂冷淋者天下之通弊也五苓散減桂

加益元散名曰淡滲散凡兩目暴赤痛者腫不止睛脹筋肉結成翳膜速宜用稗草左右鼻竅內彈之出血立愈病甚人顙上百會穴攢竹眉間皆可出血則愈矣口噙水緊扣衣領不可便噴水候血盡便吐了水蓋暴赤腫痛乃龍火之疾養成之熱也難經曰目得血而能視不得已而用之血化淚痛而所出經曰本病相傳先以治其氣急則治其標緩則治其本

又一法兩目赤腫發痛不止用長流水煎鹽湯吐之次服神芎丸四物湯之類經曰暴病暴死皆屬

於火也又曰治病有緩急急則治其標緩則治其本標者赤腫也本者火熱也鹽湯鹹寒所以制火兩目赤腫痛不能開者以青金散鼻內噴之嚏之直氣上涌邪氣自出

凡大人小兒口瘡唇緊用酸漿水洗去白痂臨卧貼赴筵散如不愈貼鈇白霜散必愈矣

凡婦人男子喉閉腫痛不能言者刺兩手大拇指爪甲如韭葉少商井穴也以鉗鍼淺刺去血立愈如不愈以溫血湯口中含漱是以熱導熱之法也

凡頭腫痛癩癧及胸臆怯弱之間或有瘡痂腫核不消及膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大椀煎之放溫作三五次頓服訖良久於咽喉中以釵股探引吐之去冷痰三二升次服和血通經之藥內經曰鹹味涌泄為陰銅人記少陽起於目銳眥行耳後下脇肋過期門癰瘰結核馬刀挾瘦足少陽膽經多氣少血之病也

凡瘦袋脹悶養生論云兩山挾水其人多瘦疾土厚水深其人多瘦地勢使然也此可服人參化瘦丹自消瘦藥多用海藻海帶味屬鹹寒

凡背瘡初發便可用葳用丸玉燭散大作劑料下臍

傳門事親者之十一
腑一二十行次用銚針於腫焮處循紅暈周匝內
密刺三層出血盡以溫軟帛拭去血甚者百會委
中皆出後用陽起散傳之不可便服十味內托散
其中犯官桂更用酒煎男子以背為陽更以熱投
熱無乃太熱乎

凡便癰者謬名也乃男子血疝也難素所不載然而
是厥陰肝之經絡是血流行之道路也衝脉任脉
督脉亦屬肝經之旁絡也難經曰男子七疝血疝
者乃七疝之一也治以道水丸桃仁承氣湯或抵
當湯投之同瘀血法聚而不散可以大作劑料大

瀉一二十行次以玉燭散和血通經之類是也世
人多用大黃牡礪間有不愈者是不知和血通經
之道也

凡下疳久不愈者俗呼曰臊疳可以道水丸禹功散
先瀉肝經訖以木香散傳之日主三兩度後服淡
粥一二日止

凡一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈矣
凡男子婦人欬逆俗呼曰吃忒乃陰陽不和之故火
欲上行為寒所抑寒不勝火故作凝滯之聲傷寒
亦有此證並宜既濟散治之

凡男子婦人病水濕瀉注不止因服葶菴烏梅薑附
酸熱之劑經曰陽氣耗減於內陰精損削於外三
焦閉溢水道不行水滿皮膚身體痞腫面黃腹大
小便赤色兩足按之陷而不起內經曰諸濕腫滿
皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月涼寒宜於燠
室不透風處用火一盆藉火力出汗次以導水禹
功量病人虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗
下吐三法俱行三法行畢臟腑空虛先宜以淡漿
粥養腸胃三兩日次服五苓益元同煎或燈心湯

調下亦可如大勢未盡更服神功散可以流濕潤
燥分陰陽利水道既平之後宜大將息慎忌油鹽
酒菓房室等事三年則不復作矣

凡上喘中滿酸心腹脹時時作聲痞氣上下不能宣
暢叔和二云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐
之次用導水禹攻散輕瀉三四行使上下無礙氣
血宣通並無壅滯後服平胃散五苓散益元甘露
散分陰陽利水道之藥則愈矣

凡老人久病大便澁滯不通者可服神功丸麻仁丸
時時服葵羹菠菜自然通利也

凡三消者內經所謂肺消渴等可取生藕汁服之則愈

寒門

經曰寒瘍流水俗呼為凍瘡因冬月行于冰雪中而得此證或經年不愈者用坡野中爭土曬乾以大蒜研如泥土捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以火艾加于餅上灸之不計壯數以泥乾為度去乾餅子再換濕餅灸不問多少直至瘡痂覺痛癢是瘡活也然後口含漿水洗漬用雞翎一二十莖縛作刷子於瘡上洗刷淨以此洗刷不致

肌肉損傷也以軟帛拭乾次用木香檳榔散傳之如夏月醫之更妙

內傷

凡一切冷食不消宿食不散亦類傷寒身熱惡寒戰慄頭痛腰脊強不可用雙解散止可導飲丸木香檳榔丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷物宿酒推盡頭痛病自愈矣次以五苓散生薑棗煎用長流水煎取五六錢不可服酒癥丸進食丸此藥皆犯芭荳有大毒故也

凡膏粱之人起居閑逸奉養過度酒食所傷以致中

院留飲惡悶痞膈醋心可服木香導飲丸治之若
田野蕪蕘之人食疎衣薄動作勞役若酒食所傷
心腹滿悶醋心時時吐酸水可用進食丸以其勝
毒也病甚者每月瀉三五次

凡一切沉積或有水不能食使頭目昏眩不能清利
可茶調散吐之次服七宣丸木香檳榔丸

凡人咳嗽一聲或作悲笑啼泣擡鼻重物忽然腰痛
氣刺不能轉側或不能出氣者可用不計散嚏之
汗出痛止

外傷治法

凡一切刃器所傷用風化石灰一斤龍骨四兩二味
為細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更
合搗和成團子中間穿眼懸於背陰處陰乾搗羅
為末於瘡上摻貼亦得裏外臙瘡并諸雜瘡皆効
凡犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類內經云
先治內而後治外可也先當用導水丸禹攻散之
類可瀉驚恐不散毒氣或瀉十餘行即時痛減腫
消然後可用膏藥生肌散之類傳之則愈矣

凡一切蟲獸所傷及背瘡腫毒杖瘡嫩發或透入裏
者可服木香檳榔丸七八十九或至百餘丸生薑

湯下五七行量虛實加減用之內經曰先治內而後治外是也

凡落馬墜井因而打撲便生心恙是痰涎散於上也內經曰所謂因氣動而病生於外宜三聖散空心吐之如本人虛弱瘦瘁可用獨聖散吐之後服安魄之藥如定志丸之類牛黃人參朱砂之屬

婦人風門

凡婦人頭風眩暈登車乘船眩暈眼澁手麻髮脫健忘喜怒皆胸中宿痰所致可用菖蒲散吐之次以長流水煎五苓散大人參半夏丸

凡婦人腰膝痛兩脚麻木惡寒喜暖內經曰風寒濕合而為痺先可服除濕丹七八十九量虛實以意加減次以禹攻散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎沫為驗後用長流水煎生薑棗同五苓散服之風濕散而氣血自和也

凡婦人乳癰發痛者亦生于心也俗呼吹妳是也吹者風也風熱結于乳房之間血脉凝注久而不散潰腐為膿宜用益元散生薑湯調下冷服或新汲水時時呷之勿輟晝夜可三五十次自解矣或煎解毒湯頓服之

火類門

婦人月事沉滯數月不行肌肉漸減內經曰小腸熱已滿移熱於大腸則伏瘕為沉沉者月事沉滯不行故云伏瘕急宜桃仁承氣湯加當歸大作劑料煎服不過三服立愈後用四物湯補之更服宣明中檳榔丸

凡婦人血崩或年及四十已上或悲哀太甚故然內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺舉而上焦不通熱氣在中故經云血崩下心系者血山也如久不愈則面黃肌熱瘦弱慎不可以熱治之蓋血得熱而散故禁之宜以當歸散等藥治之

凡婦人年五十以上經血暴下婦人經血終于七七之數數外暴下者此乃內經所謂火主暴速亦因暴喜暴怒憂愁驚恐致然慎勿作冷病治之如下峻熱藥治之必死止宜黃連解毒湯以清上更用蓮殼棕毛灰以滲其下然後用四物湯玄胡索散涼血和經之藥

凡婦人月事不來室女亦同內經曰謂月事不來皆是胞脉閉也胞脉者屬心而絡于胞中令氣上通於肺心下不通故月事不來也可用茶調散吐之

次用王燭散芎藭湯三和湯桂苓白朮散之類降
心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥皆是
也慎勿服峻熱有毒之藥若服之變成肺痿骨蒸
潮熱欬咯膿嘔血喘滿小大不利寢汗不止漸
至形瘦脉大雖遇良醫亦成不救嗚呼人之死者
豈命使之然也

凡懷孕婦人病瘡可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等
藥如大便結硬可用大柴胡湯下微利過不可大
吐瀉恐傷其孕也經曰夏傷於暑秋必痲瘧

凡雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散

一兩水半椀大作劑料去滓分作二服先一服吐
了後一服勿吐次以長流水如生薑棗煎五苓散
熱以之汗盡頭痛立止

凡婦人雙身大小便不利可用八正散大作劑料去
滑石加葵菜子煎服經曰膀胱不利為癃癃者小
便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰
膀胱氣化則能出焉然後服五苓散三五服則愈
矣

凡婦人身重九月而瘖瘖不言者是胞之絡脉不相
續也故不能言經曰無治也然有是言不若煎王

燭散二兩水半碗
時呷之令大下降肺金自清故聲復出也肺主聲
音也

凡婦人難產者皆因燥澁緊斂故產戶不得開通宜
先於降誕之月自月之日用長流水調益元散日
三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾
如未入月則不宜服之以滑石滑胎故也

凡婦人大產後或臍腹腰痛乃敗血惡物之致然也
醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤已久矣難經曰
諸痛為實實者熱也可用導水丸禹功散瀉三五

行然後以玉燭散和血通經降火益水之藥治之
獨不可便服黑神散燥熱之藥當同半產治之

凡婦人產後心風者不可便作風治之宜調胃承氣
湯二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓
分作二服大下三五行則愈矣如未愈以三聖散
吐之蓋風狂便屬陽

凡婦人產後一二日漸熱口乾可用新汲水調玉燭
散或水調甘露散亦妙勿作虛寒治之

濕門

凡婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功

散或單用無憂散量虛實加減泄訖服桂苓散五
苓散葶藶末香散同治濕法或用獨聖散上涌亦
是室女白帶下可用茶調散吐之吐訖可服道朮
丸禹功散瀉之次服葶藶末香散四物湯白朮散
之類則愈矣治白帶者同瀉濕法則是也婦人有
濁汚水不止亦同此法也

寒門

凡婦人年二三十無病而無子經血如常或經血不
調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所
滯礙不能為用故也可用獨聖散涌訖寒痰三三

升後用導水丸禹功散泄三五行或十餘行單用
無憂散泄十餘行見虛寒熱虛實用之次服葱白
粥三五日胃氣宣通腸中得實可服玉燭散更助
白朮散茯苓之類降火益水既濟之道當不數月
而有孕內經曰婦人有癥瘕遺溺嗌乾諸證雖服
妙藥針灸亦不能孕蓋衝脉督脉任脉有此病不
能孕故也

半產

凡婦人半產俗呼曰小產或三四月或五六箇月皆
為半產以男女成形故也或因憂恐暴怒悲哀太

其或因勞力撲打損傷及觸冒暑熱慎勿用黑神散以其犯熱藥恐轉生他疾止宜用玉燭散和經湯之類

凡婦人天生無乳者不治或因啼泣暴怒鬱結氣血閉塞以致乳脉不通用精猪肉清湯調和美味於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳房週迴則乳汁自下也

又一法猪蹄調下益元散連服之
又一法針肩井二穴長驗

小兒風門

凡小兒三五歲或七八歲至十餘歲發驚涎潮搐搦如拽鋸不省人事目睛喘急將欲死者內經曰此者得之在母胎胞之所受悸惕驚駭恐懼之氣故今小兒輕者為驚風天吊重者為癇病風搐胎中積熱者為臍風已上諸風證可用吐涎散吐之吐訖宜珠犀龍麝清涼降痰之藥其食乳子母皆宜服之安魂定魄之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲憂驚怖縱得子必有前疾小兒風熱涎嗽者可以通聖加半夏同煎溫服
凡小兒疳澁眼數日不開皆風熱所致可服涼膈散

瀉肝經風熱鬱其鬱結散而自開也

凡小兒通身浮腫是風水腫也小便不通者宜利小便則愈內經曰三焦閉塞水道不行水滿皮膚身體痞腫是乘之故可用長流水加燈心煎五苓散時時呷之更於不透風處浴之汗出則腫消一汗減半再汗減七八分三汗消盡內外俱行也

二火類

凡小兒瘡疱癩疹熱瘡丹熛等疾如遇火運勝時發惑亂行之者不可使用升麻散解之升麻湯味辛性溫內經曰積溫而成熱是謂重火止可以辛涼

之劑解之如遇平時可以辛溫蓋平時無事便同水化然而更宜審察病熱者亦不可以辛溫但發散之後便以涼膈_加當歸及白虎湯玉露散煎服之更甚者解毒湯調胃散下之古人云癩疹瘡疱首尾俱不可下皆悞矣豈不聞揚湯止沸不如抽薪內經曰五寅五申之歲多發此病者蓋明相火之所為也又曰少陽客氣勝丹疹外發又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火玉太關又謂百端之起皆自心生豈可便用辛溫發散乎致熱勢增劇漸成臟毒下血咬牙發搐大熱明矣如白虎湯加人參涼散

加當歸桔梗勿問秋冬但見瘡疹用之神良

凡小兒瘡疱癰疹疔瘡丹熨斑毒之後臙毒下血內經曰少陽客氣勝則丹熨瘡疹發于外也蓋餘熱不解故臙毒下血治以黃連解毒湯白虎湯涼膈散臨證選而用之所謂白虎舊說秋冬勿用皆悞也但有此證便用之蓋其證屬相火故也大人亦同

凡小兒丹瘤浮腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒者可用磁片搬出紫血其病立愈如不愈者後用涼膈散加大黃芒硝利三五行為妙用拔毒散掃三

五度必愈矣經曰丹熨赤瘤火之色也相火主之凡小兒有赤瘤暴腫可先用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石散傳之則腫毒自消如不消可用銚針砭刺血出而愈矣

凡小兒甜瘡久不愈者俗呼為香瘡是也多在面部兩耳前一法令母口中嚼白米成膏子貼塗之不過三上則愈矣小兒并母皆忌雞猪魚兔酒醋動風發熱之物如治甜指亦同此法

凡小兒面上瘡謂眉煉耳上瘡謂之轍耳足上瘡謂靴癬此三者一究其本皆謬名也經曰諸痛瘡瘍

皆屬心火乃血熱劇而致然也或謂內經曰大槩不可使熱以為皆然此不明造化之道也慎勿妄信可用銚鍼刺之出血一刺不愈當復刺之再刺不愈則三刺必愈矣內經曰血實者決之眉煉不可用藥傳之以其瘡多痒痒則爬矣藥入眼則目必損矣

凡小兒牙疳齒齲者是斷腐爛也下牙屬手陽明大腸之經燥金為主上牙屬足陽明胃經濕土上下是腸胃二經也或積熱於內或因服銀粉芭荳大毒之藥入于腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而

至于齒斷牙縫嫩薄之分反內害也可以射香玉線子治之乳母臨卧常服黃連解毒湯一服牙疳病則愈矣

凡小兒身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黃通膈丸下過四五行則自愈矣蓋乳食便屬木甚則成濕以治濕法治之用燥熱之藥非也

凡小兒水泄不止可用五苓散與益元散各停用新水調下三二錢頻服不拘時候若暴速注下甚者屬火涼膈通聖等散治之用者勿輕非深於造化者未易此語

凡小兒大人小便不通內經謂三焦約約者不行也
可用長流水煎八正散時時灌之大小便利則止
若不因熱藥所攻而致此者易治或因多服熱藥
而燥劇至此者非惟難治不幸天耳亦可用蜜水
調益元散送通膈丸

凡小兒久瀉不止至八九月間變為秋深冷痢泄瀉
者清白時時撮痛乳癖不化可用養脾丸如黍米
大每服二三十丸米飲送下日進三服則愈益黃
散亦可

凡治小兒之法不可用極寒極熱之藥及峻補峻瀉
之劑或誤用芫荳杏仁硫黃膩粉之藥若用此藥
反生他病小兒易虛易實腸胃嫩弱不勝其毒若
治之用此陰陽利水道最為急用桂苓甘露散之
類

三法六門
世傳方

儒門事親卷之十二

戴人張子和著

吐劑

三聖散

防風

三兩
去蘆

芫蒂

三兩
博淨碾破以蒂卷定連
紙剉細去紙用羅子羅過

另放末將滓炒微黃次
入末一處同炒黃用

藜蘆 去苗及心加減
用之或一兩或

半兩或
一分

右各為簾末每服約半兩以薑汁三茶盞先用二

盞煎三五沸去薑汁次入一盞煎至三沸却將原

二盞同一處熬二沸去滓澄清放溫徐徐服之不

必盡劑以吐為度

苳蒂散

苳蒂 七十

赤小豆 七十

人參 半兩

甘草 半兩或二錢五分

右為細末每服一錢或半錢或二錢量虛實加減用之空心薑汁調下服之

稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去支弦秤一兩爰用之

礞石

藜蘆 半兩

右為細末每服半錢或一二錢乾開牙關漿水調灌之

麝香

滑石

川芎各半兩

為細末每服一二錢量虛實加減以薑汁調下
心服之

兼調散亦一名二仙散

苳蒂不以多少好茶中停

右為細末每服二錢薑汁調下空心用之

獨聖散

苳蒂不以多少

右為細末每服一錢或二錢薑汁調下服之脇痛

加全蝎頭痛加蔚金

碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬兩半 銅青分一 粉霜錢一 輕粉分一

右研為細末每服一字薄荷湯調下用之如中風用漿水調服

常山散

常山兩二 甘草兩半

右為細末水煎服之空心

青黛散

猪牙皂角箇乙 玄胡索箇乙 青黛少許

右為細末鼻內灌之其涎自出

汗劑

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷

麻黃去根不去節 連翹 芒硝已上各半兩 石膏

黃芩 桔梗已上各兩 滑石錢三 甘草兩二 荆芥

白木 山梔子已上各兩

右為籛末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

雙解散

通聖散與益元散相合中停水一鍾生薑豈鼓

葱白同煎

浮萍散 治癩風

浮萍乙兩 荆芥 川芎 甘草 麻黃去根

已上各一兩或加當歸芍藥

右為簾末每服一兩水二盞煎至七分去滓溫服

汗出則愈

升麻湯

升麻去土 葛根 芍藥 甘草炒 已上各一兩

右為簾末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫

服不 時候

麻黃湯

麻黃乙兩 去根 官桂七錢 桂枝三錢 干炙 杏仁二十箇

去皮尖赴 炒黃色用

右為簾末每服三錢水一中盞煎至七分去滓溫

服汗出自解

桂枝湯

桂枝乙兩 茯苓半兩 芍藥乙兩 甘草七錢

右為簾末每服三錢水一盞生薑棗一同煎去滓

溫服

下劑

導水丸

大黃二兩

黃芩二兩

滑石四兩

黑牽牛

四兩另取頭末用

甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病

則加

白芥子一兩去遍身走注疼痛

加

朴硝一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加

郁里仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯

氣通血脈
樟柳根一兩去腰腿沉重

右為細末滴水丸梧桐子大每服五十九或加至

丸臨卧温水下

禹功散

黑牽牛頭末四兩

茴香炒兩

或加木香乙兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨卧服

通經散

陳皮去白

當歸各乙

甘遂

以麩包不令秀水

冷水浸過去麩焙乾

右為細末每服三錢温淡調下臨卧服

神祐丸

甘遂依前製用

大戟焙浸煮醋乾用

芫花醋浸煮各半兩

黑牽牛兩乙

大黃兩乙

右為細末滴水丸小荳大每服五七十九臨卧温

水下

琥珀丸

右為前神祐丸加琥珀一兩是也

益胃散

甘遂依前製過用

右為細末每服三錢以獾猪腰子細批破以鹽椒等物淹透爛切摻藥在內以荷葉裹燒熟温淡酒

調服

大承氣湯

大黃兩半

厚朴兩乙

枳實一枚

炒

芒硝半兩

右為簾末每服三五錢水一盞煎至七分去滓服以意加減

小承氣湯

大黃

厚朴已上各乙兩

枳實乙枚

右為簾末同煎服

調胃承氣湯

大黃

甘草炙

朴硝已上各半兩

右為齋末每服五七錢火一盞煎三五沸去滓温服食後

桃仁承氣湯

桃仁去皮 乙 官桂 甘草 芒硝

已上各半兩

右剉如麻苳大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓温服

玉井散

瓜蔓根 二兩 甘遂 乙兩製用

右為細末以射香湯調下三錢臨卧服

水煮桃紅丸

黑牽牛頭末兩半 苾芾末二錢 雄黃乙錢水飛過用之

乾烟脂少許

右以黃水調麵為丸以水煮令浮熟取出冷水拔過射香湯下

無憂散

黃耆 木通 桑白皮 陳皮已上各乙兩

胡椒 白朮 木香各半兩 牽牛頭末四兩

右為細末每服三五錢以生薑自然汁調下食後

泄水丸又方歲用丸一料加芒硝半兩商陸半兩為末水丸依前服

大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁里仁

續隨子已上各半兩 樟柳根乙兩

右為細末水煮棗肉為丸如小葶大每服五七十

丸水下

牛黃通膈丸

黑牽牛 大黃 木通已上各半兩各另取末

右為細末水丸如黍粒大量兒大小三五十九或

百丸水下

四生丸一名潤腸丸

黑牽牛 大黃 朴硝 皂角去皮絃蜜炙

已上各等分

右為細末水丸如梧桐子大每服七八十九食後

溫水下

內托散

大黃 牡礪已上各半兩 甘草錢三 蒺藜二箇

右為末水一大盞煎三五沸去滓露冷服

截用丸

大黃 黃芩已上各二兩 滑石 黑牽牛各四兩

右為末水丸桐子大每服五七十九食後溫水下

神芎丸

藏用丸一料內加黃連薄荷川芎各半兩水丸
桐子大水下

進食丸

牽牛配 芭荳 三箇去油心膜

右為末水丸每服二三十丸食後隨所傷物送下

牛黃白木丸 治腰脚濕

黑牽牛末 大黃已上各二兩 白木乙兩

右為末滴水丸桐子大每服三十丸食前生薑湯
下要利加至百丸

土燭散

以四物湯承氣湯枳硝各等分水煎去滓食前
服

三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

丁香化癖散 治小兒脾

白丁香 蜜陀僧 舶上硫黃 已上各乙錢

硃砂錢半 輕粉少許

右研細末每兒一歲服半錢男病女乳調女病男
乳調後用通膈泄

抵當湯

水蛭十箇

盲虫十箇去翅足

大黃兩

桃仁七枚去皮尖

右判如麻豆作一服水二盞煎至七分去滓溫服

抵當丸

盲虫五箇

桃仁七枚

大黃兩

水蛭五箇

右為細末只作一丸水一大盞煮一丸至七分頓服

十棗湯

紫芫花醋浸

大戟

甘遂製

已上各等分

右為末每服半錢水一盞棗十枚同煎取半盞服

陳皮丹

檳榔

甘遂

威靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶藶

已上各二兩

乳香別

沒藥別

已上各一兩

黑牽牛末半兩

陳皮四兩去白

大戟三兩炒

右為細末麵糊和丸如桐子大每服三五丸水下

利膈丸

牽牛四兩

槐角子炒

木香兩

青皮兩

皂角酥炙

半夏先各

右為細末生薑麵糊為丸桐子大每服四五丸

水下

三一承氣湯

大黃 芒硝 厚朴去 枳實 已上各半兩

甘草配

右剉如麻豆大每服半兩水一大盞生薑三片煎至六分入硝去滓熱服

大陷胸湯

大黃乙兩 芒硝乙兩八錢半 甘遂末一字

右為水一盞煮大黃至八分去滓入硝一沸下甘遂末溫服

小陷胸湯

半夏湯洗乙錢半 黃連分 芩藎實一枚用四分之一

右剉麻豆大水二盞先煮芩藎實至一盞半下諸藥取八分去滓溫服未利再服

握宣丸

檳榔 肉桂 乾薑 附子 甘遂 良薑

萘子 芭荳 已上各等分 入硃黃乙錢

右為細末軟米和丸桐子大早晨先椒湯洗手放溫揩乾用生油少許泥手心男左女右磨令熱握

一九宣一二行

風門

防風通聖散 方在汗門中附

防風天麻散

防風 天麻 川芎 羌活 白芷 草烏頭

荆芥 當歸_焙 甘草 滑石 白附子 已上

各半兩

右為末熱酒化蜜少許調藥半錢加至一錢少時覺藥行微麻為度如作丸煉蜜和彈子大熱酒化下一丸或半丸

防風湯

防風 麻黃 獨活 秦艽_去 黃芩 石膏

當歸 白朮 已上各半兩

右為簾末入半夏片子今攪勻每服四錢水二中盞入生薑七片煎至一盞去滓取清汁六分入射香少許帶熱食後服

祛風丸

川烏_{炮去皮臍} 草烏_炮 天南星 半夏_{薑製}

蒸豆粉 甘草 川芎 疆蚕 蘼香

苓苓香 地龍_去 蝎_{稍炒} 已上各一兩

川薑_{半兩}

右為細末藥末一兩用蒸豆粉一兩以白麵二兩
滴水和丸如桐子陰乾細嚼茶清下三五丸至五
七丸食後初服三丸以漸加之

排風湯

當歸去 杏仁去皮尖 防風去 白蘚皮

白朮 芍藥 官桂去 川芎 甘草炒

三兩 獨活 麻黃去 茯苓去皮各

右為簾末每三錢水一盞半入生薑四片同煎至
八分去滓溫服不計時候

小續命湯

麻黃去節 人參去 黃芩 芍藥 川芎

甘草炙 杏仁湯炮去皮尖炒 防已 官桂去皮

防風去 各一兩 附子半兩去

右除附子杏仁外合搗為簾末後入二味攪勻每
服三錢水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓少
熱服食後

消風散

川芎 羌活去 人參去 白茯苓去

白僵蚕炒 蟬殼去 已上各一兩 陳皮去

厚朴去蘆皮 已上各半兩

右為細末每服二錢茶清調下

川芎散

川芎 荆芥 甘菊 薄荷 蟬殼 蔓精子

己上各二兩 甘草乙兩

右為細末茶酒任下三二錢食後

搜風丸單名人參半夏丸

人參 茯苓 南星 己上各半兩 半夏

乾生薑 白礬生 凝水石 己上各一兩

粉二兩 薄荷兩半 藿香

末與截用丸末各中停水丸如豌豆大每

服三十九生薑湯送下

當歸川芎散

當歸 川芎 己上各半兩 甘草二兩

黃芩四兩 薄荷乙兩 確砂仁一分

右為細末溫水調下一二錢

愈風餅子

川烏半兩 炮烈 川芎 甘菊 白芷 防風

細辛 天麻 羌活 荆芥 薄荷

甘草炙 己上各一兩

右為細末水浸餅子為劑捏作餅子每服三五餅

子細嚼茶酒送下不計時候

疎風丸

通聖散一料加天麻羌活獨活細辛甘菊首烏
各半兩

右為細末煉蜜和丸彈子大朱砂為衣每服一九
細嚼茶酒下

通頂散

石膏 川芎 瓜蒂 已上各等分

藜蘆少許

右為細末鼻內噴

胃風湯

人參去 茯苓去 川芎 官

芍藥 白朮

右件各等分為末每服三錢水一盞入陳
空心服之

香芎散

香附子炒 貫芎 石膏飛 白芷 甘草

薄荷 已上各一兩 川烏半兩炒去皮臍

右為細末每服二錢温酒茶清調下無時

鐵彈丸

地龍去土 防風 白膠香 沒藥 木鱉去皮

草烏頭水浸炮 白芷 五苓脂 當歸

已上各用一兩 細墨三錢 射香另 乳香另

升麻各二錢

右末糯粥丸彈子大每服一丸生姜酒下

暑門 瘧附

自虎湯

知母乙兩半 去皮 甘草乙兩

石膏四兩 亂紋者另為末

右剉如麻豆大粳米拌勻另水一盞煎至六分去

滓溫服無時日三四服或眩嘔者加半夏半兩薑

製

桂苓甘露散

官桂兩半 人參 藿香 已上各半兩 茯苓

白朮 甘草 葛根 澤瀉 石膏

寒水石 已上各一兩 滑石二兩 木香乙分

右為細末每服三錢白湯點下新水或生薑湯亦

可

化痰玉壺丸

南星 半夏並生用 天麻 已上各半兩

白麪 三兩

右為細末滴水丸如桐子大每服三十九用水一大盞先煎令沸下藥煮候浮即熱濾出放溫別用生薑湯下不拘時服

益元散

滑石 六兩

甘草 乙兩

右為細末每服三錢蜜水新水調下

玉露散 治暑

寒水石 滑石 石膏 菴藁根

已上各四兩

甘草 二兩

右為細末每服五錢重新水調下

石膏散

石膏 乙兩

人參 去芦

甘草 炙

各半兩

右為細末新水蜜水調三錢生薑湯亦可

辰砂丹 治瘡

信 乙錢

雄黑豆 六十箇或二兩重

右為細末朱砂為衣端午日合不令雞犬婦人見每服一丸無根水下

溫脾丸

信 乙錢

甘草 二錢

紫何車 三錢

豆粉 四兩

右為末滴水丸每服半錢作十九臨卧無根水下
温脾散

紫何車 藜蘆 已上各一兩 甘草半兩

砒乙錢別研

右為細末後入砒研勻每服半錢新水盪調下如
是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌
葷酒魚兔等

濕門嗽附

五苓散

官桂 澤瀉 猪苓去黑皮 茯苓去皮 白朮各半兩

右為細末每服二錢熱湯或新水調下

葶藶木香散

苦葶藶 茯苓去皮 猪苓去皮 已上各一分

木香半錢 澤瀉 木通 甘草 各半兩

官桂一錢 滑石三錢

右為細末每服三錢生薑湯調下食前服

白朮木香散

白朮 猪苓 澤瀉 赤茯苓 各半兩

木香 檳榔 各三錢 陳皮二兩去白 官桂乙錢

滑石三兩

右為細末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分溫服食後

大橘皮湯

橘皮乙兩

木香乙兩

滑石六兩

檳榔三錢

茯苓乙兩

猪苓去黑皮澤瀉

白木 官桂

已上各半兩

甘草二錢

右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服食後

神助散

苦參一兩

黑牽牛

三兩半微炒取頭末用

澤瀉二兩

猪苓二兩

椒目半兩

右為細末每服葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半盞調藥三錢絕早面東服之

桂苓白朮丸

官桂 茯苓 半夏 已上各一兩 白朮

乾生薑一分 橘皮去白 澤瀉 黃連

各半兩 黃栢二兩

右為末麵糊為丸如小豆大每服三五十丸姜湯下食後

桂苓白朮散

官桂 茯苓 白木 已上各半兩 甘草
澤瀉 石膏 寒水石 已上各一兩 滑石
二兩

右為細末熱湯調三錢新水生薑湯亦可食後服
白木調中湯

白木 茯苓 橘皮去白 澤瀉 已上各半兩
甘草乙兩 乾薑炒 官桂 硝砂仁 藿香

已上各一分

右為末白湯化蜜少許調下二錢無時煉蜜每兩
作十丸名曰白木調中丸

寧神散 治嗽

御米殼二兩 蜜炒 人參 苦苣藤 已上各一兩

右為末入烏梅同煎三五沸去滓稍熱服食後

寧肺散

御米蜜炒 去穢 甘草 乾薑 當歸 白礬

陳皮 已上各一兩

右為末煎薑汁調三錢

人參補肺散

人參 麻黃節去 白木 防已 防風

各等分 桑白皮 倍加

右剉咀咀以漿水一椀煎至半去滓溫服每用半兩各秤過

白朮湯

白朮 甘草 當歸 陳皮 桔梗 枳殼 各等分

右為簾末水煎去滓溫服三五錢

薏苡仁湯

桔梗乙兩 甘草 二兩 薏苡仁 三兩

右剉如麻苳大每服五錢水煎入糯米為引米軟為度食後

益黃散 治小兒痢

陳皮配 青皮 柯子肉 甘草 已上各半兩 丁香 二錢

右為細末每服二錢水煎食前服

香連丸

木香 柯子肉炒 黃連炒 已上各半兩 龍骨 二錢

右為細末飯丸如黍米大每服二十九米飲湯下

火門

涼膈散

大黃 乙兩

連翹 四兩

甘草

黃芩

薄荷

朴硝

山梔子

已上各一兩

右窠末每服三五錢水一盞入蜜竹葉煎三五沸
去滓溫服無時

黃連解毒湯

黃連

黃蘗

黃芩

大梔子

已上各等分

右剉為麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓

溫服

瀉心湯

大黃

甘草 炙

當歸

芍藥

麻黃

荊芥

已上各一兩半

白木 二錢半

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷少許同煎
至七分去滓溫服

八正散

大黃

蘆麥

木通

萹竹

車前子

甘草

山梔子

已上各一兩

滑石 二兩

加木香

一兩尤佳

右為窠末每服三五錢水一盞入燈心煎至七分
去滓溫服

調胃散

治傷寒吐逆四肢厥冷

水銀 舶上硫黃 各半兩

右二味先研硫黃極細次入水銀同研至深黑每服一錢病重者二錢温米飲調服不拘時

三黃丸

大黃 黃芩 黃栢 已上各等分

右為末水丸每服三十丸水下

又方去黃芩用黃連

芍藥蘚皮丸

芍藥 白者 黃蘚 去皮 各一兩 當歸 黃連

各半兩

右為末水丸桐子大每服三十丸水下食前

大金花丸

黃連 黃蘗 黃芩 大黃 各等分

右為末水丸新水下三十丸加梔子減大黃名梔子金花丸

清涼飲子

大黃 蒸 赤芍藥 當歸 甘草 炒 已上各

等分

右為末每服一二錢水一盞煎至七分去滓温服食後以意加減

黃連清心湯

涼膈散加黃連半兩是也

犀角散

黃連 大黃 芍藥 犀角 甘草 各等分
右為齋末每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服
無時

黃連木通丸 治心經畜熱夏至則甚

黃連 二兩 木通 半兩

右為末生薑汁打麵糊和丸每服三十丸食後
心湯下日三服

燥門

神功丸

大黃 麵裹

訶子皮

麻子仁 另搗

人參 去

已上各一兩

右為細末入麻子仁搗研勻煉蜜丸如桐子大每
服二十九丸溫水下或酒或米飲下食後臨卧如大
便不通加服

脾約丸

麻仁

一兩二錢半

枳實 炒

厚朴 去麩

芍藥

已上各二兩

大黃

四兩

杏仁

去皮尖炒黃

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二十九臨卧温
水下

麻仁丸

郁里仁去皮另搗 火麻子仁搗 二味各二兩

大黃二兩半生半蒸 檳榔兩半 乾山藥 防風去芦

枳殼炒去穰七錢半 菴活 木香各五錢半

右為細末入另搗者三味攪勻煉蜜丸如桐子大
每服二十九至三十九温水下食後牽牛滑石少

潤體丸

郁里仁 大黃 桂心 黑牽牛 當歸

黃蘗並生用各半兩 輕粉少許

右為細末滴水丸如桐子大每服三十九至四十
丸温水或生薑湯下

寒門

薑附湯

乾薑二兩另為末 附子乙兩生用去皮臍細切

右二味攪勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓

温服食前

四逆湯

甘草三兩 乾薑半兩 附子半兩生用去皮臍切片子

右為竅末每服三五錢木一盞半煎至一盞去滓
溫服無時

二薑湯

良薑 乾薑炮 二味各三兩

右為細末酒煮糊為丸桐子大每服三十九空心
米飲湯下

木附湯

黑附子重乙兩 白木乙兩半 甘草七錢半

右為細末每服三五錢木一盞半生薑五片棗二
枚劈破同煎至一盞去滓溫服食後

大已寒丸

附子炮去臍皮 川烏頭炮去皮臍剉 乾薑炮剉

良薑炒 官桂去麋皮 吳茱萸丸 已上各二兩

右為細末醋糊為丸桐子大每服五七十九米飲
下食前

理中丸

人參去芦 白木 乾薑 甘草炙 附子炮去皮臍

已上各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作十九彈子大每服一
丸以水一盞化破煎至七分稍熱服空心

平胃散

厚朴薑製

陳皮

二味各三兩

蒼朮

五兩 泔浸

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓食前溫服

養脾丸

乾薑炮

硝砂

各二兩

茯苓去

人參

去

麥蘖炒

各一兩

白朮兩半

甘草炒

乙兩半

右為細末煉蜜和丸每兩作八九每服一丸細嚼生薑湯下

無治於內者

大柴胡湯

柴胡

四兩

黃芩

赤芍藥

各一兩半

半夏

乙兩二錢半

枳實

二錢半

大黃

乙兩

右為簾末入半夏片子每服三錢水一盞半入生薑五片棗一枚煎至一中盞瀘去滓溫服食後

小柴胡湯

柴胡

四兩 去芦

黃芩

人參

半夏

湯洗七次切

甘草

已上各一兩半

右為簾末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚

劈破同煎至七分去滓温服不計時候

柴胡飲子

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 當歸

芍藥 已上各半兩

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分

去滓温服

防風當歸飲子

柴胡 人參 黃芩 防風 甘草 芍藥

大黃 當歸 滑石 已上各一兩

右為麤末每服三五錢生薑三片水一盞煎至七

分去滓温服不拘時候

白朮湯 治孕婦痢嘔吐血

白朮 黃芩 當歸 各等分

右為末每服二三錢水煎食前服

無治於外者

桂苓湯 麻黃湯 升麻湯

已上三方在前汗法中附

五積散

蒼朮 二兩 桔梗 乙兩 枳殼 炒 陳皮 二味各

白芷 川芎 當歸 甘草 官桂 去麤皮

半夏 湯浸 茯苓 各三錢 麻黃 乙錢 去節 厚朴

乾薑 各四錢

右除官桂正殼別為末外以慢火炒令黃色為末
與官桂等攪勻每服三錢水一盞半入生薑五
片葱白三寸鹽豉七粒同煎至七分去滓溫服
無時

青衿散 治咽喉

益元散加薄荷青黛生蜜丸如彈子大噙化
獨治於內者

大黃 二兩 半 芒硝 乙兩八 錢半 甘遂 乙字另為末

右以水三盞先煮大黃至一盞去滓下芒硝令沸
次下甘遂末放溫服之

大黃丸

大黃 黑牽牛 枳殼 木通 已上各一兩

右為末滴水丸如桐子大每服三十九食後生薑
湯下

備急丸

巴豆 去皮 油 大黃 乾薑 炮 已上各一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服三丸溫水下不拘

時服

根殼丸

商枳殼

乙兩 越炒

牽牛頭末

四兩

右為細末水丸如桐子大每服三十九食前溫酒

或生薑湯下

蓮殼散 治血崩

梭毛

燒灰

蓮殼

燒灰存性 二味各半兩

香附子

三兩炒

右為末米飲調下三四錢食前

香檳榔丸

木香

檳榔

青皮

陳皮

廣茂

燒

黃連

麩炒已上各一兩

黃栢

大黃

各三兩

香附子炒

牽牛各四兩

右為細末水丸如小豆大每服三十九食後生薑

湯下

道飲丸

青皮

陳皮

京三稜炮

廣茂

炮

黃連

枳殼麩炒已上各一兩

大黃

黃蘗

已上

各三兩

香附子炒

黑牽牛

已上各四兩

右為細末桐子大用水丸每服三五十九食後生

薑湯下

五香連翹散

丁香 青木香 沉香 熏陸香 麝香

木通 連翹 桑寄生 獨活 升麻 大黃

已上各等分

右為麤末以竹瀝煎五七錢未利加大黃去滓稍熱以利為度

四物湯

川芎 當歸 熟地黄 芍藥 已上各等分

右為麤末每服三四錢水一盞煎三五沸去滓溫服空心加草龍膽防已名一醉散治目暴發加蒲

黃治娠婦漏血

當歸散 治血崩

當歸 乙兩 龍骨 二兩 炒赤 香附子 三錢 炒

稜毛灰 五錢

右為末米飲調三四錢空心服

又一方當歸白芍藥香附炒各等分為末米飲湯調下食前服

又當歸散 行經

當歸 杜蒺藜 各等分

右為末米飲湯調服食前

葛根散 解酒毒

甘草 乾葛花 葛根 確砂仁 貫衆

各等分

右為簾末水煎三五錢去滓服

定志丸

栝子仁 人參 茯苓 遠志去心 茯神

酸棗仁

右為末酒糊丸小豆大每服五七十九生薑湯下

續命丸

續命丸乙錢 陳皮兩乙 木香二錢半 牽牛半兩

右為末醋糊丸桐子大每服三十九生薑湯下

小續命丸

枳殼 陳皮 牽牛 已上各等分

右為細末水丸食後生薑湯下三四十丸

蘧麥散 治酒積

甘遂半兩製 蘧麥 葛根 麥蘖已上各一兩

右為末每服二錢酒調服

治氣積方 香附子為末生薑湯調下三三錢

獨治於外者

青金散

芒硝半錢 青黛半錢 乳香 沒藥 各少許

右為細末鼻內啗

拔毒散

寒水石不以多少燒令赤

右研為末以新水調雞翎掃痛處

水浴膏

雄黃水飛三錢 黃連兩 蔚金二錢 黃栢半兩

大黃半兩 黃丹半兩 水飛

右為細末量所腫處用藥多少新汲水半盞炒藥
在內須更藥沉慢去其澄者水盡然後用槐柳

枝攪藥數百餘轉如麵糊相似勻以小紙花子
攤藥塗腫處更以雞翎捺涼水不住掃之

魚膽丸

草龍膽 青鹽 腦子 已上各半兩 黃連

乙兩 硃砂 南硼砂 麝香 鯉魚膽

已上各二錢

右除草龍膽鯉魚膽外同為細末先將草龍膽同

微研破以河水三升浸春秋二宿夏一宿冬三

宿將浸者病揉極爛用絹袋濾去滓於石器內

慢火熬成膏子點於水內不散用指頭捏開有

絲乃膏子成然後入魚膽拌勻將膏和上件藥末作劑丸如粟米徐徐點可視之

金絲膏

黃丹 伐赭石 玄精石 已上各半兩

爐甘石乙兩 腦子半錢 黃連 麩仁去皮

二味各三錢 白丁香 南硼砂二味各一錢

右除硼砂腦子外同為細末以河水一升白砂蜜

三兩同熬三五沸然後入藥末再熬至半茶盞

以上用綿子濾過去滓次入硼砂腦末攪勻定

磁器內放徐徐點眼大有神効

生肌散

黃連錢三 蜜陀僧兩半 乾胭脂錢二 雄黃乙錢

菜豆粉錢二 輕粉錢乙

右為細末以溫漿水洗過用無垢軟帛搨淨藥貼

之

赴筵散

五倍子 蜜陀僧 已上各等分

右為細末先入漿水漱過乾貼

麝香玉線子

豆粉兩半 信錢乙 枯白礬乙錢半

右三件同研入麝香半錢再研為細末滴水和於
手背上撚作線如用時先以漿水嗽了口用毛翎
了縫中淨臨卧乾貼或為線子住於縫中

人參化瘦丹 治贅

海藻 海藻 海蛤 昆布 已上四味皆焙

澤瀉炒 連翹 已上並各等分 猪廩膏

羊靨 各十枚

右為細末蜜丸如雞頭大臨卧噙化一二丸

通氣丸 同上所治

海藻 海藻 昆布 木通 甘草 已上各

一兩 訶子 薄荷 已上各半兩 杏仁炒

浸

右為細末煉蜜和丸每夜噙化一丸忌油膩物

又方

海藻 海藻 昆布 澤瀉 木通 猪靨

羊靨 各五枚 海蛤 連翹

右為細末研靨為丸如雞頭大每服一丸臨卧噙
化

消毒散 治喉腫

當歸 荆芥 甘草 各等分

右為末水煎三五錢去滓熱嗽

煮肝散 治雀目

青蛤粉 夜明砂 穀精草 已上各等分

右為細末每服五七錢猪肝內煮熟細嚼茶清下

枯瘤方

硃砂 粉霜 雄黃 已上各二錢 輕粉

沒藥 乳香 已上各一錢 土黃錢三 射香

許少

右為細末以津調塗瘤頂外邊歌一菲葉先花紙

貼之上以小黃膏貼之

小黃膏

黃栢 黃芩 大黃 已上各等分

右為細末以水調為糊比前藥大一遭三日一易

至八九上不取直候可取

剪刀藥

石灰一斤陳 龍骨兩 刺薊一小束

右為末杵作泥為餅子或為散貼端午日合

木香檀榔散

木香 檀榔 黃連 乳香 輕粉 密陀僧 已上各等分

右為細末乾摻之先以口噙漿水洗

又方加 黃柏 麝香

陽起石散

陽起石燒

右研末新水調塗腫痛處

鉛白霜散

鉛白霜 乾胭脂 寒水石 已上各等分

腦子 輕粉各少許

右為末 摻之

雄黃散

雄黃 乳香 沒藥 麝香少許

右為末量瘡大小乾貼

化班湯

紫草 升麻 甘草炙 各半兩

右剉麻豆大水一盞糯米二十粒煎至一盞去滓

溫服

調治

無比山藥丸

乾山藥二兩 肉蓯蓉四兩剉 五味子六兩揀

兔絲子三兩酒浸 杜仲三兩去 牛膝乙兩酒浸

澤瀉兩 熟地黄兩 山茱萸兩 茯苓去

兩 巴戟去心 赤石脂兩

右為細末煉蜜和丸桐子大每服二三十九食前
温酒下米飲亦可

當歸丸

當歸 香附子炒 杜蒺藜 芍藥 各等分

右為末酒糊為丸如小豆大每服三五十九米飲
下

香薷湯

香薷五錢 厚朴五錢 白扁豆二錢 半生炒

右為末每服三錢水一盞入酒煎去滓服

石葦散

石葦去毛 木通 各分二兩 當歸 甘草

王不留行 已上各一兩 滑石 日杵

蘧麥 葵子 芍藥 已上各三兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下

妙功丸

京三稜兩 川烏四錢 生 大黃兩 已上同

為細末好醋半升熬膏不破積水丸

神麩 麥蘖 已上各一兩 乾薑二錢 炒

芭荳

兩箇去皮油心

半夏

兩半

茴香

乙兩炒香

官桂

牽牛

三兩揀淨

右為細末用膏丸小荳大生薑湯下十九十五丸
溫涼水亦可以意加減以利為度

人參散

石膏

甘草

已上各一兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

人參

半兩

右為末每服二錢溫水調下食後

茴香丸

茴香

八兩炒

川練子

炒

川烏

炮去

臧苓仙

洗去土

防風

陳皮

已上各三兩

地龍

乙兩去土微炒

烏藥

五兩

赤小豆

八兩

右為末酒糊為丸每服三五丸茶酒下

七宣丸

大黃

濕紙裹煨

枳實

炒

木香

柴胡

去

訶子皮

各五兩

桃仁

六兩炒去皮尖

甘草

四兩炒

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸酒下

人參調中湯

沉香

二兩

木香

白荳蔻

乙兩用仁

甘草

乙分

腦子

乙錢

射香

半錢

人參

半兩

石為細末每服半錢用沸湯點服或入生薑焙少許食後服

烏金散

當歸乙兩

自然銅金色者為

烏金石鉄炭是

大黃乙兩童子小便浸

右為末每服二錢紅花酒半盞童子小便半盞同調下食前日二服

沉香降氣湯

沉香 木香 硝砂仁 白芷蕊仁 青皮白

陳皮白去 廣茂煨 枳實煨 已上各一兩

蘿白子另末乙兩 黑牽牛末二兩 大黃二兩炒

右為末生薑汁浸蒸餅為丸如桐子大每服三十

丸橘皮湯下

枳朮丸 治氣不下降胸膈滿悶

枳實煨 白朮 各半兩

右為細末燒飯為丸如桐子大每服五十九諸飲

送下

儒明事親卷之十三

劉河間先生三消論

因在前此書未傳於世恐為沉沒故刊而行之

易言天地自太虛至黃泉有六位內經言人之身自頭至足亦有六位今余又言人胸腹之間自肺至腎又有六位人與天地造化五行同一爐備知彼則知此矣故立天之氣曰金與火立地之氣曰土與水立人之氣曰風與火故金火合則熱而清水土合則濕而寒風火合則溫而炎人胸腹之間亦猶是也肺最在上為金主燥清心次為君火主熱肝又次之為風木主溫膽又次之為相火主極熱脾又次之為濕土



主涼腎又次之黃泉為寒水主寒故心肺

象地肝膽象人不知此者不可與論人之病

為萬物之本水為萬物之元水土合德以陰居陰

處乎下以立地為氣萬物根於地是故水土濕寒若

燥熱陽實則地之氣不立萬物之根索澤而枝葉枯

矣五常政大論曰根於中者命曰神機是為動物根

本在於中也根本者脾胃腎也食入胃則脾為布化

氣味榮養五藏百骸故酸入肝而養筋膜苦入心而

養血脉甘入脾而養肌肉辛入肺而養皮毛鹹入腎

而養骨髓五氣亦然故清養肺熱養心溫養肝濕養

脾寒養腎也凡此五味五氣太過則病不及亦病惟

平則常安矣故六節藏象論曰五味入口藏於腸味

有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生是

其理也又太陰陽明論云脾病而四肢不用者何也

岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾

乃稟也今脾病不能為胃行其津液不得稟水穀氣

日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用

焉帝曰脾不主時何也岐伯曰脾者土也治中央常

以四時長四臟各十八日寄治不得獨主於時也脾

藏者常着胃土之精也土者生萬物而法天地故上

下至頭足不得獨主於時也帝曰脾與胃以相連爾而能行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脾胃屬脾絡嗑故太陰為之行氣於三陰足陽明者表也五臟六腑之海也亦為行氣於三陽臟腑各因其經而受氣以益陽明故為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉不用者謂不能為之運用也由是觀之則五臟六腑四肢百骸皆稟受於脾胃行其津液相與濡潤滋養矣後之醫者欲以燥熱之劑以養脾胃滋土之氣不亦外乎况消渴之病者本濕寒之陰氣極衰燥

熱之陽氣太甚更服燥熱之藥則脾胃之氣竭矣世不分五運六氣之虛實而一槩言熱為實而虛為寒彼但知心火陽熱一氣之虛實而非臟腑六氣之虛實也蓋肺本清虛則溫心本熱虛則寒肝本溫虛則清脾本濕虛則燥腎本寒虛則熱假若胃冷為虛者乃胃中陰水寒氣實甚而陽火熱氣衰虛也非胃中濕氣之本衰故當溫補胃中陽火之衰退其陰水寒氣之甚又如胃熱為實者乃胃中陽火實而陰水虛也故當以寒藥瀉胃中之實火而養其虛水然此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪非胃為濕者之本

馬司管見卷之三

其餘例同法夫補瀉脾胃濕土之水氣者潤其濕者
是補濕燥其濕者是瀉濕土本濕故也凡臟腑諸氣
不必腎水獨當寒心火獨當熱要知每臟每腑諸氣
和同宣而平之可也故余嘗謂五常之道陰中有陽
陽中有陰孤陰不長獨陽不成但有一物皆備五行
遞相濟養是謂和平交互克伐是謂衰興變亂失常
患害由行故水少火多為陽實陰虛而病熱也水多
火少為陰實陽虛而病寒也其為治者瀉實補虛以
平為期而已矣故治消渴者補腎水陰寒之虛而瀉
心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟身津液之衰使

道路散而不結津液生而不枯氣血利而不溢則病
日已矣况消渴者本因飲食服餌失宜腸胃乾涸而
氣液不得宣平或耗亂精神過違其度或因大病陰
氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱鬱其之所成也故
濟衆云三消渴者皆由久嗜鹹物恣食炙燻飲酒過
度亦有年少服金石丸散積久石熱結于胸中下焦
虛熱血氣不能制石熱燥甚於胃故渴而引飲若飲
水多而小便多者名曰消渴若飲食多而不甚渴小
便數而漸瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦
而小便有脂液者名曰腎消如此三消者其燥熱一

也但有微甚耳余聞世之方多一方而通治三消渴者以其善消水穀而喜渴也然叔世論消渴者多不知本其言消渴者上實熱而下虛冷上熱故煩渴多飲下寒故小便多出本因下部腎水虛而不能制其上焦心火故上實熱而下虛冷又曰水數一為物之本五行之先故腎水者人之本命之元不可使之衰弱根本不堅則枝葉不茂元氣不固則形體不榮消渴病者下部腎水極冷若更服寒藥則元氣轉虛而下部腎水轉衰則上焦心火亢甚而難治也但以暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦火則自

然渴止小便如常而病愈也若此之言正與仲景相反所以巧言似是於理實違者也非徒今日之誤誤已久哉又如蔣氏藥證病原中論消渴消中消腎病曰三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷似冰又曰腰腎虛冷日增重又曰膀胱腎臟冷如泉始言三焦五臟俱虛熱惟有膀胱冷似冰復言五臟亦冷且腎臟水冷言為虛其餘熱者又皆言其虛夫陰陽興衰安有此理且其言自不相副其失猶小至於寒熱差殊用藥相反過莫大焉或又謂腎與膀胱屬水虛則不能制火虛既不能制火故小便多者愈失之遠矣彼謂水

氣實者必能制火虛則不能制火故陽實陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多豈知消渴小便多者非謂此也何哉蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅塞而水液不能滲泄浸潤於外榮養百骸故腸胃之外燥熱太甚雖復多飲于中終不能浸潤於外故渴不止小便多出者如其多飲不能滲泄於腸胃之外故數溲也故余盡言原病式曰皮膚之汗孔者謂泄汗之孔竅也一名氣門者謂泄氣之門戶也一名腠理者謂氣液之隧道紋理也一名鬼門者謂幽冥之門也一

名玄府者謂玄微之府也然玄府者無物不有人之腑臟皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙至於萬物悉皆有之乃出入升降道路門戶也故經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老非升降則無以生長化妝藏是知出入升降無器不有故知人之眼耳鼻舌身意神識能為用者皆由升降出入之通利也有所閉塞則不能用也若目無所見耳無所聞鼻不聞香舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣怫鬱玄府閉塞而致津液血脈榮衛清氣不能升降

出入故也各隨鬱結微甚而有病之大小焉病在表則怫鬱腠理閉密陽氣不能散越故燥而無汗而氣液不能出矣叔世不知其然故見消渴數澀妄言為下部寒尔豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也予之所以舉此世為消渴之證乃腸胃之外燥熱痞閉其滲泄之道路水雖入腸胃之內不能滲泄於外故小便數出而復渴此數句足以盡其理也試取內經凡言渴者盡明之矣有言心肺氣厥而渴者有言脾痺而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有言小腸痺熱而

渴者有因病瘧而渴者有因肥甘石藥而渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇大熱而渴者有因傷寒胃乾而渴者有因腎熱而渴者有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所遇各異其功燥熱一也

所謂心肺氣厥而渴者厥論曰心移熱於肺傳為膈消注曰心熱入肺久而傳化內為膈熱消渴多飲也所謂肝痺而渴者痺論曰肝痺者夜卧則驚多飲數小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿

所謂腎熱而渴者刺熱論曰腎熱病者先腰痛脰酸苦渴數飲身熱熱論曰少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴叔世惟言腎虛不能制心火為上實熱而下虛冷以熱藥溫補腎水欲令勝退心火者未明陰陽虛實之道也夫腎水屬陰而本寒虛則為熱心火屬陽而本熱虛則為寒若腎水陰虛則心火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱明矣故氣厥論曰腎氣衰陽氣獨勝宣明五氣論曰腎惡燥由燥腎枯水涸藏氣發時論曰腎苦燥急食辛以潤之夫寒物屬陰能養水而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎水

既不勝心火則上下俱熱柰何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不絃哉又如胃與大腸熱結而渴者陰陽別論二陽結為之消注曰陽結胃及大腸俱熱結也腸胃藏熱善消水穀又氣厥論曰大腸移熱於胃善食而瘦脉要精微論曰痺成為消中善食而瘦如腸痺而渴者數飲而不得中氣喘而爭時發飧泄夫數飲而不得中其大便必不停留然則消渴數飲而小便多者止是三焦燥熱佛鬱而氣衰也明矣豈可以燥熱毒藥助其強陽伐衰陰乎此真實實虛虛之罪也夫消渴者多變變龍首瘡癰瘰癧之類皆腸胃燥熱

佛鬱水液不能浸潤於周身故也或熱甚而膀胱佛鬱不能滲泄水液妄行而面上腫也如小腸瘴熱而渴者舉痛論曰熱氣留于小腸腸中痛瘴熱焦渴則便堅不得出矣注曰熱滲津液而小便堅矣如言病瘴而渴者瘴論曰陽實則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲冷也然陽實陰虛而為病執法當用寒藥養陰瀉陽是謂瀉實補衰之道也如因肥甘石藥而渴者奇病論曰有口甘者病名為何岐伯曰此五氣之所溢也病名脾瘴瘴為熱也脾熱則四臟不稟故五氣上溢也先因脾熱故曰脾瘴又經曰

五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉而為消渴通平虛實論曰消瘴什擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴之人膏粱之疾也或言人惟胃氣為本脾胃合為表裏脾胃中州當受溫補以調飲食今消渴者脾胃極虛益宜溫補若服寒藥耗損脾胃本氣虛乏而難治也此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道故妄言而無畏也豈知腹中論云帝曰夫子數言熱中消中不可服芳草石藥石藥發癩芳草發狂注言

多飲數溲謂之熱中多食數溲謂之消中多喜曰癩
多怒曰狂芳美味也石謂英乳乃發熱之藥也經又
曰熱中消中皆富貴人也今禁膏粱是不合其心禁
芳草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰芳草之味美
石藥之氣悍二者之氣急疾堅勁故非緩心和人不可
服此二者帝曰何以然岐伯曰夫熱氣慄悍藥氣
亦然所謂飲一溲二者當肺氣從水而出也其水穀
澀竭矣凡見消渴便用熱藥誤人多矣故內經應言
渴者皆如是豈不昭晰歟然而猶有惑者諸氣過極
反勝也者是以人多誤也如陽極反似陰者是也若

不明標本認似為是始終乖矣故凡見下部覺冷兩
膝如水此皆心火不熄狀類寒水宜加寒藥下之三
五次則火降水升寒化自退然而舉世皆同執迷至
如易素二書棄如朽壤良可悲夫故處其方必明病
之標本達藥之所能通氣之所宜而無加害者可以
制其方也已所謂標本者先病而為本後病而為標
此為病之本末也標本相傳先當救其急也又云六
氣為本三陰三陽為標蓋為病臟病最急也又云六
氣為胃之本假若胃熱者胃為標熱為本也處其方
者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以甚者為

邪衰者為正法當瀉甚補衰以平為期養正除邪乃
天之道也為政之理補賤之義也大凡治病明知標
本按法治之何必謀於衆陰陽別論曰謹熟陰陽無
與衆謀標本病傳論知標知本萬舉萬當不知標本
是謂妄行至真要大論曰知標知本用之不殆明知
逆順正行無問不知是者不足以謔適足以亂經故
大要曰粗工嘻嘻以為可知言熱未已寒病復起同
氣異形迷論亂經此之謂也夫標本之道要而博小
而大可以言一而知百言標與本易而弗損察本與
標氣可令調明知勝復為萬民式天之道畢矣天元

紀大論曰至數極而道不惑可謂明矣所謂藥之巧
能者溫涼不同寒熱相反燥濕本異云云前已言之
矣斯言氣也至於味之巧能如酸能收甘能緩辛能
散苦能堅鹹能軟酸屬木也燥金主於散落而木反
之土濕主於緩而水勝之故能然也若能燥濕而堅
火者苦也易曰燥萬物者莫熯乎火凡物燥則堅也
甘能緩苦急而散結甘者土也燥能急結故緩則急
散也辛能散抑散結潤燥辛者金也金主散落金生
水故也况抑結散則氣液宣行而津液生也藏氣發
時論曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣

也鹹能軟堅鹹者水也水潤而柔故勝火之堅矣此
五臟之味也其為五味之本也淡也淡胃土之味也
胃土者地也地為萬物之本胃為一身之本天元紀
大論曰在地為化化生五味故五味之本淡也以配
胃土淡能滲泄利竅夫燥能急結而甘能緩之淡為
剛土極能潤燥緩其急結令氣通行而致津液滲泄
也故消渴之人其藥與食皆宜淡劑至真要大論曰
辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味
滲泄為陽六者或散或收或緩或急或燥或潤或堅
或熯所以利而行之調其氣也本草云藥有三品上

品為君主養命小毒以應天中品為臣主養性常毒
以應人下品為佐使主治病大毒以應地不在三品
者氣毒之物也凡此君臣佐使者所以明藥之善惡
也處方之道主治病者為君佐君者為臣應臣之用
者為佐使適其病之所根有君臣佐使奇偶小大之
制明其歲政君臣脉位而有逆順正主療之方隨病
所宜以施用其治法多端能備所用者良工也寒者
熱之熱者寒之溫者清之清者溫之結者散之散者
收之微者逆而制之甚者從而去之燥者潤之濕者
燥之堅者熯之熯者堅之急者緩之客者除之留者

却之勞者温之逸者行之驚者平之衰者補之甚者
瀉之吐者下之摩之益之薄之劫之開之發之灸之
制之適足為用各安其氣必清必淨而病氣衰去臟
腑和平歸其所宗此治之大體也陰陽應象論曰治
不法天之紀不明地之理則災害至矣又六節藏象
論曰不知年之所加氣之所衰不可以為功也今集
諸經驗方附于篇末

神白散

治真陰素被損虛多服金石等藥或嗜炙

燻鹹物遂成消渴

桂府滑石

六兩

甘草

乙兩生用

右為細末每服三錢温水調下或大渴欲飲冷者

新汲水尤妙

猪肚丸

治消渴消中

猪肚

乙枚

黃連

五兩

括蘆

四兩

麥門冬

四兩

知母

四兩如無以
茯苓代之

右四味為細末納猪肚中線縫安置甌中蒸極爛

熟就熟於木臼中搗可丸如硬少加蜜丸如桐

梧子大每服三十九漸加至四五十丸渴則服

之如無木臼以沙盆中用木杵研亦可以爛為

妙矣

葛根丸 治消渴消腎

葛根 三兩 栝蒌 三兩 鈎丹 二兩 附子 乙兩
者炮去皮臍

右四味搗羅為細末煉蜜為丸桐子大每服十丸

日進三服治日飲碩水者春夏去附子

胡粉散 治大渴白方療不瘥者亦治消腎

鈎丹 胡粉 各半兩 栝蒌 乙兩 甘草 二兩

半灸 澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂

各半兩

右八味為細末水服方寸七日二服壯者一七半

一年病一日愈二年病二日愈渴甚者二服腹

痛者減之如丸服亦妙每服十丸多則腹痛也

三黃丸 主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉

婦人帶下手足發寒熱者

春三月 黃芩 四兩 大黃 二兩 黃連 四兩

夏三月 黃芩 六兩 大黃 一兩 黃連 一兩

秋三月 黃芩 六兩 大黃 二兩 黃連 三兩

冬三月 黃芩 三兩 大黃 五兩 黃連 三兩

右三味隨時加減搗為細末煉蜜和丸如大莖大

每服五丸日三服不去者加七丸服一月病愈

嘗試有驗

大參白朮散

治胃膈瘴熱煩滿不欲食或瘴成為消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致脾胃真陰血液損虛肝心相搏風熱燥甚三焦腸胃燥熱佛鬱而水液不能宣行則周身不得潤濕故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注為小便多也叔世俗流不明乎此妄為下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱

燥鬱或為目瘡癰疽瘡瘍上為喘嗽下為痿痺或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數洩為渴多食數洩為消中肌肉消瘦小便有脂液者為消腎此世之所傳三消病也雖無所不載以內經者之但燥熱之微甚者也此藥兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃澁滯壅塞瘡癰痿痺并傷寒雜病煩渴氣液不得宣通并宜服之

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子

澤瀉 已上各半兩 連翹 苾蓼根 乾葛
 茯苓 已上各乙兩 官桂 木香 藿香
 各一分 寒水石二兩 甘草二兩 石膏四兩
 滑石 盆硝 各半兩
 右為簾末每服五錢水一盞生薑三片同煎至半
 盞絞汁入蜜少許溫服漸加十餘錢無時日三
 服或得臟腑疏利亦不妨取效更妙後却常服
 之或兼服消痞丸似覺腸胃結滯或濕熱內甚
 自利者去大黃芒硝

人參散

治身熱頭痛或積熱黃瘦或發熱惡寒畜熱寒戰
 或膈痰嘔吐煩熱煩渴或燥濕瀉痢或目疾口
 瘡或咽喉腫痛或風昏眩或蒸熱虛汗肺痿勞
 嗽一切邪熱變化真陰損虛並宜服之

石膏二兩 寒水石二兩 滑石四兩 甘草二兩

人參半兩

右為細末每服二錢溫水調下或冷水亦得

三消之論劉河間之所作也因麻徵君寓汴梁暇日
 訪先生後裔或舉教醫學者即其人矣徵君親詣其
 家求先生平昔所著遺書乃出三消論氣宜病機三

書果傳于世者又多不全止取三消論於卷首增寫六位藏象二圖其餘未遑潤色即付友人穆子昭子昭乃河間門人穆大黃之後也時覓官于京師方且告因徵君欲因是而惠之由是余從子昭授得一本後置兵火遂失其傳偶於鄉人虞司承君祥處復見其文然傳寫甚誤但依倣而錄之以符後之學者詳為刊正云時甲辰年冬至日綿溪野老書且續方栢亭東久亭寺僧悟大師傳經驗方

治飲水百盃尚猶未足小便如油或如杏色服此藥三五日小便大出毒歸于下十日永除根本此

三復指迷

儒門事親卷之十四

戴人張子和著

扁鵲華陀察聲色定死生訣要

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫謔語者不可治

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可

治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者至期而死重出在下文

病人面黃目赤不死赤如衄血者死

病人面黃目白者不死白如枯骨者死

病人面黃目黑者不死黑如苔死

病人面黑目青者不死

病人面目俱黃者不死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒

當風邪入胃經膽氣妄泄目則為青雖天
救亦不可生

病人面赤目白者十日死憂恚思心氣內索

面色反好急棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空

索

病人面黑目白八日死腎氣內傷病因留損

病人面青目白五日死

病人着床心痛短氣脾氣內竭後百日復愈

能起傍徨因坐於地其上倚床能治此者

也

病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死

病人目無精光若土色不受飲食者四日死

病人目精光及牙齒黑色者不治

病人耳目及顴頰赤者死在五日中

病人黑色出于額上髮際直鼻脊兩顴上者

亦死在五日中

病人黑色出天中下至上顴上者死

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死

在三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之

如黑者死

病人面黑直視惡風者死

病人面黑唇青者死

病人面青唇黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目不回直視者一日死

病人頭日久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目睛脫恍惚者死

病人陰陽竭絕目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者
死

病人卧遺尿不覺者死

病人尸臭者不可治

肝病皮黑肺之日庚辛死

心病目黑腎之日壬癸死

脾病辰戌肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死

腎病面腫唇黃脾之日戊己死

青欲如蒼壁之澤不欲如藍

赤欲如帛裹朱不欲如赭

白欲如鵝羽不欲如枯骨

黑欲如黑漆不欲如炭

黃欲如羅裹雄黃不欲如土

目赤色者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃
色不可名者病在胸中

診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病
也從外入內者少陽病也

診寒熱瘰癧目中有赤脉從上下至瞳子見一脉一

歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈半
二歲半死見三脈三歲死

診牙齒痛按其陽明之脈來太過者獨熱在右右熱
熱在左左熱熱在上上熱熱在上下下熱

診血者脈多赤多熱多青多痛多黑多黃多痺多赤
多黑多青皆見者寒熱身痛面色微齒垢黃爪甲上
黃疸也安卧少黃赤脈小而濇者不嗜食

診百病死生訣第七

診傷寒熱盛脈浮大者生沉小者死傷寒已得汗脈

浮大者死

溫病三四日已下不得汗脈大疾者脈細小難得者
死不治

溫病穰穰大熱其脈細小者死千金穰穰作特行

溫病下利腹中痛甚者死不治

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗出脈堅強急者

生虛緩者死

溫病二三日身體熱腹滿頭痛食如故脈直而疾者

八日死四日頭痛腹痛而吐脈來細強十二日死八

九日頭不疼身不痛目不變色不變而反利脈來喋

喋按之不彈手時時心下堅十七日死

熱病七八日脉不軟一作喘不散一作數者當有瘖
瘖後三日温汗不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌
焦乾黑者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥

熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治

熱病已得汗大熱不去者亦死

熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治

熱病發熱熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必

下利

診人被風不仁痿癱其脉虛者生堅急疾者死

診癩病虛則可治實則死

診癩病脉實堅者生脉沉細者死

又癩疾脉得大滑者久而自已其脉沉小急實不
可療小堅急者亦不可療也

診頭痛目痛久視無所見者死

診人心腹積聚其脉堅強急者生虛弱者死又實強

者生沉者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形

長者死腹脹滿便血脉大時絕極下血小疾者死

腸澀便血身執則死寒則生

腸澼下白沫脉沉則生浮則死

腸澼下膿血脉懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身執脉不懸絕滑大者生懸澹者死以臟

期之

腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死

洞泄食不化不得留下膿血脉微小連者緊急者死

洩注脉緩時小結者生浮大數者死

蝨蝕陰注其脉虛小者生緊急者死

欬嗽脉沉緊者死浮直者浮軟者生小沉伏匿者死

欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者死

欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絕者死

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死

汗若衄其脉小滑者生大躁者死

吐血脉緊強者死滑者生

吐血而欬上氣其脉數有熱不得卧者死

上氣脉數者死謂損形故也

上氣喘息低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者

死

上氣面浮腫肩息其脉大不可治加利必死

上氣注液其脉虛空伏匿者生堅疆者死

寒氣上攻脉實而順滑者生實則逆而者死太素云寒氣在

上脉滿實何如一實而滑則生實而逆則死矣其形盡滿何如曰舉形盡滿者脉急大堅尺滿而不應知是者順則生逆則死何謂順則生逆則死所謂順者手足温也逆者手足寒也

病瘴脉實大病久可治脉弦小堅急病久不可治

消渴脉數大者生細小浮短者死

消渴脉沉小者生實堅大者死

水病脉洪大者可治微細不可治

水病脹閉其脉浮大軟者生沉細虛小者死

水病腹大如鼓脉實者生虛者死

卒中惡咯血數升脉沉數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死

緊細而微亦生

瘡腰脊疆急瘕瘕皆不可治

寒熱瘕瘕其脉代絕者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沉小者生浮大者死

斫瘡出血一二升脉來大二十日死

斫刺俱有病多少血出不自止者其脉來大者七日死滑細者生

從頭頓仆內有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死人為百藥所中傷脉澁而疾者生微細者死洪大而遲者生千金遲作速

人病甚而脉不調者難治脉洪大者易瘥

人內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死脉實滿手足寒頭熱春秋生冬

夏死

脉微陽羸陰強者生脉大而加加者死陰弱陽

彊脉至而代期月而死

尺脉濇而堅為血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血成結瘕得病以冬時忝當赤而死

尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不充病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸至關關至尺三部之位其脉動各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落而死

右手寸口脉偏沉伏乍小乍大朝浮大而暮沉伏浮

大即太過上出魚際沉伏即下不止關中往來無常時復來者榆華枯而死

右手尺部脉三十動一止有須臾還二十動止乍動乍踈連連相因因不與息數相應其人雖食穀猶不愈繫草生而死

右手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循張弓弦絀絀然然如兩人共一索至立冬死

病機

諸風掉眩皆屬於肝甲乙木也木鬱達之諸寒收引皆屬於腎壬癸水也水鬱泄之

諸氣膈鬱皆屬於肺庚辛金也金鬱折之

諸濕腫滿皆屬於脾戊己土也土鬱奪之

諸痛痒瘡瘍皆屬於心丙丁火也火鬱發之

諸熱瞽瘕皆屬於火

諸厥固泄皆屬下

下謂下焦肝腎氣也夫守司於下腎之氣也門戶束要肝之氣也故

厥固泄皆屬下也厥謂氣逆也固謂禁固也滿氣逆上行反謂固不禁出入無度燥濕不恒皆由下

焦主

諸痿喘嘔皆屬於上上謂上焦心肺氣也炎熱

承熱分化肺之氣也熱鬱化上故病屬上焦

諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火熱之內作

諸頸項強皆屬於濕太陽傷濕

諸逆衝上皆屬於火炎上之性用也

諸脹腹大皆屬於熱熱鬱於內肺脹所生

諸躁狂越皆屬於火熱盛於胃及四末也

諸暴強直皆屬於風陽內鬱而陰行於外

諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱

諸熱附腫疼酸驚駭皆屬於火

諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱反戾筋轉也水液小

便也

諸病水液澄徹清冷皆屬寒上下所出及吐瀉出

也

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無

者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其

血氣令其調達而致和平此之謂也五勝謂

五行更勝也

標本運氣歌

少陽從本為相火太陰從本濕土坐厥陰從中火是
家陽明從中濕是我太陽少陰標本從陰陽二氣相
包裹風從火斷汗之宜燥與濕無下之可萬病能將

火濕分徹開軒岐無縫鑊

辨十二經水火分治法

膽與三焦尋火治肝和包絡都無異脾肺常將濕處
求胃與大腸同濕治惡寒表熱小膀胱溫惡熱表寒心
腎熾十二經最端的四經屬火四經濕四經有熱有
寒時攻裏解表細消息濕同寒火同熱寒熱到頭無
兩說六分分來半分寒寒熱中停真浪舌休治風休
治燥治得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時
莫解表表裏如或兩可攻後先內外分多少敢謝軒
岐世恩爭奈醯雞笑天小

治病

不讀本草焉知藥性專沉藥性決不識病假饒識病
未必得法識病得法工中之甲

六陳

藥有六味陳久為良狼棗半橘枳實麻黃

十八反

本草名言十八反半萸自欬及攻烏藻戟遂芫俱戟
草諸參辛芍叛藜蘆

運氣歌

病如不是當年氣看與何年運氣同只向其年求治

法方知都在至真中

五不及

坎一丁三土五中一七癸九是災宮勝復都來十一位誰知臟腑與宮同

斷病人生死

靈樞經云人有兩死而無兩生陽氣前絕陰氣後竭其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭其人死身色必赤故陰竭則身青而冷陽竭則身赤而溫

四因

六病生之類其有四焉一者始因氣動而內有所成

二者始因氣動而外有所成三者不因氣動而病生於內四者不因氣動而病生於外

因氣動而內成者謂積聚癥瘕癰氣癭起結核癩癩之類是也

不因氣動而病生於內者謂流飲癖食飢飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類

不因氣動而病生於外者謂瘴氣賊魅蟲蛇蠱毒蜚食鬼擊衝薄隊墮風寒暑濕斫射刺割撻朴之類也如此四類有獨治內而愈者有無治內而愈者有獨治外而愈者有無治外而愈者有先治內後治外而

愈者有先治外後治內而愈者有須解毒而攻擊者
有須無毒而調引者凡此之類方法所施或重或輕
或緩或急或收或散或潤或燥或喫或堅方士之用
見解不同各擅己心好丹非素故復問之

五苦六辛

五苦六辛從來無解蓋史家闕其疑也一日麻徵君
以此質疑于張先生先生亦無所應行十五里忽然
有所悟欣然迴告于麻徵君以為五苦者五臟為裏
屬陰宜用苦劑謂苦涌泄為陰六辛者六腑為表屬
陽宜用辛劑謂辛甘發散為陽此其義也徵君大服

其識鑒深遠鑿昔人不傳之妙故曰知其要者一言
而終不知其要者流散無窮

儒門事親卷之十四

儒門事親卷之十五

戴人張子和著

瘡瘍癰腫第一

治螻蛄瘡

良薑 白芨 瀝青 已上各等分

右為細末嚼芝蔴水同熬為膏入冷水共定用緋
絹片火熨斗作膏藥貼瘡上

又方千年石灰 苗根燒灰

右為細末用水調雞翎塗上

水沉金絲膏 貼一切惡瘡

瀝青 白膠 已上

春秋宜用油

夏宜油臍二錢半

油蠟四錢

右件鎔開油蠟下瀝

用槐枝攪勻綿子濾

過入冷水中扯一千餘遍好瘡透了喫數丸作

劑於瘡口填者亦妙攤紙上貼勿令火炙

乳香散 治下疳

乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龍骨 烏魚骨

黃連 黃芩 銅碌 已上各等分 麝香許

右為細末先以溫漿水洗過貼疳瘡上

治下傷方

右用蒲公英科根作溼貼于傷處用白麵膏藥貼之

紫金丹 治疔瘡

白礬四兩 黃丹二兩

右用銀石器內鎔礬作汁下丹使銀釵子攪之令

紫色成也用文武火無令太過不及如有瘡先

以週圍挑破上藥用唾津塗上數度着無令瘡

乾其瘡潰動取疔出也無瘡顏色紅赤為効如

藥末成就再杵碎炒令紫色

治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡週迴用竹鍼刺破然後用瘡藥於瘡上攤之用緋絹甚覆如人行二十里覺疔出然後以熱醋湯洗之

千金托裏散 治一切發背疔瘡

連翹 乙兩

黃耆 乙兩

厚朴 乙兩

川芎 乙兩

防風 乙兩

桔梗 乙兩

白芷 乙兩

芍藥 乙兩

官桂 乙兩

木香 三錢

乳香 三錢

當歸 半兩

沒藥 三錢

甘草 乙兩

人參 半兩

右為細末每服三錢用酒一椀盛煎三沸和滓溫

服膏子貼之

二聖散 治諸瘡腫

黃丹 二兩

白礬 二兩

右為細末每服乾摻瘡口上後用保生錠子捏作餅子貼之

保生錠子

芫荽

四十九箇另研文武火燒熟

金脚信 二錢

雄黃 三錢

輕粉 半兩

硃砂 二錢

麝香 二錢

右件為末用昔蠟一兩半化開藥將和成錠子冷水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭

撥破每用貼一餅子次用神聖膏藥封貼然後
服托裏散若瘡氣透裏危者服破棺散用神聖
膏

神聖膏藥 貼治一切惡瘡

當歸兩半 沒藥錢三 白芨二錢半 乳香三錢

藁本兩半 琥珀二錢半 黃丹兩四 木鱉子五箇去皮

膽礬乙錢 粉霜乙錢 黃蠟兩二 白膠三兩

芭荳二十五箇去皮 槐柳枝一百二十條各長一尺 清油斤

右件一處先將槐柳枝下油內煮焦取出次後下
其餘藥物煮行極焦亦撈出却將油澄清再熬

成膏子用緋絹上攤

破棺丹

大黃乙兩半 甘草兩二 荆三稜乙兩 山梔子

二兩半 牽牛末二兩半

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服半丸食後酒
半盞研化服之忌冷水

三聖散 治臙瘡疔瘡搭手背疽等瘡

葱白一斤 馬莧一斤 石灰一斤

右三味濕搗為團陰乾為細末貼瘡如有死肉者

宜先用潰死肉藥

潰死肉藥方

炊飯尖

半兩各三等

一等半兩入芭荳二箇

一等半兩

入芭荳三箇

一等半兩入芭荳五箇

子錠

右先用二芭荳納瘡如不潰再用納三芭

潰用五芭荳者更用丹砂炒紅色摻瘡

清水其惡肉未盡至追出赤水是惡肉

三聖散貼上用膏藥傳之

膿瘡久不愈者

以川烏頭黃蘗各等分為末用唾津調塗紙上

貼之

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之或為細末貼之亦妙

又方 用臍月人中白燒灰油調塗瘡疥上

又方 以瓦松不以多少陰乾為末先用槐枝葱白

湯洗之過摻之立効灸瘡久不斂者更妙

又方 以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺

替針丸 治一切惡瘡

川烏錢二

草烏錢二

五靈脂錢二

輕粉分

粉霜分

又方 加班菹二十箇去足翅用

芭荳二十箇去皮用

右將三件為末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班菹芭荳以水調糊為錠子如作散是謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡

懸蔓一箇 大黃兩乙 金銀花兩乙 當歸半兩

皂角刺兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加黍粘子

治附骨癰及一切惡瘡

當歸兩半 甘草兩乙 山梔子十二箇 木鱉子乙

右為細末每服三五錢冷酒調服之

治諸惡瘡

白疆蚕蝟 大黃二味各等分

右為細末生薑自然汁與蜜同和為劑丸如彈子大每服一丸細嚼

治惡瘡死肉錠子

芭荳乙錢去 五靈脂兩半 黃丹二錢

加枯白礬錢乙

右為細末以糊和丸錠子入瘡內用之

當歸活血散治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人產

前後腹痛

當歸二錢

沒藥半錢

乳香半錢

白芍藥二錢

瘡瘍者加人參木香婦人加赤芍藥

右為細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫

服日二服婦人酒煎瘡既發不須用

薰惡瘡方

紫花地丁一名米布代收

右取根曬乾用四箇半頭磚壘成爐子燒着地丁

用絡埴磚一枚蓋了使令磚眼內煙出薰惡瘡

出黃水自愈

治蛇瘡

用蒲公英科根作涎貼于傷處用白膏藥封之

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣乙

金色自然銅

半兩燒紅醋碎研為細末不用之

乳香

二錢為細末用之

銅錢

重半兩者取一二文或燒紅醋碎研細

金絲水蛭

乙錢半每箇作三截在上溲去氣道為度

沒藥

三錢研細

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得

出膿先用簾藥末少許小油少半匙同打勻再

入少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都

用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止

痛天明一宿自破便効如打折骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜苓末半錢同好酒一大盞熱調連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了藥立便止住疼痛此方屢經効驗不可具述服藥觀可以食前服食後服又外用接骨藥

陳爛麻根

兩把羊耳
孕乙對

亂絲 一握多者更妙

右取肥松節劈碎約量多少先放三兩根於新瓦上都於上外三味在上燒着存性就研為末如生再燒研為度後入五靈脂或半兩如疼入好

乳香少許和藥如茶褐色為度用布條子約細一遭先攤小黃米粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用軟帛三五重上又竹篔子細勒得緊慢得中初三日換上一次再後五日換一次又七日再換上一次無有不接者

赤龍散 消散一切腫毒

野葡萄根紅者去籬皮為末新水調塗腫上頻掃新水

便癰方 本名血疔

牡礪 大黃 甘草 已上各半兩

照靈薑 乙箇

右酒浸露一宿服之以利為度

又方 冬葵子為末酒調下三兩服

又方 皂角不蛀者燒過陰乾為末酒調服立効皂

角子七箇水服之亦効

又方 胡桃七箇燒過陰乾研為末酒調服之不過

三服

又方 生蜜米粉調服休喫飯利小便為度

治瘡無頭者 蛇退皮於腫處貼之

又方 皂角刺燒灰陰乾

右為末每服三錢酒調嚼葵菜子三五箇前藥送

下

生肌歛瘡藥 白歛 定粉各等分 黃丹少許

右同為細末洗淨瘡口乾貼之

治諸瘡水度腫者 生白礬末水調塗之自消

接骨藥

銅錢半兩醋 木香乙錢 自然銅乙錢

麝香少許

右為極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一

枚乳香一粒無灰酒一小盞在下食前如不折

其藥反出服罷其痛不可當勿疑待一日如骨

未接再服如前老者十餘日少者不過五七日
萬聖神應丹出箭頭

菘岩科

一名天仙子取着中一科
根本枝葉花實全者好

右於端午日前一日持不語尋見菘岩科言道先生你却在這裏那道罷用柴灰自東南為頭圍了用木楔子攔取了根週迴土次日端午日未出時依前持不語用鑊口一鑊取出土用淨水洗了不令雞犬婦人見於淨室中以石臼搗為泥丸如彈子大黃丹為衣以紙袋封了懸於高處陰乾如有人着箭不能出者用緋絹盛此藥

訖放臍中用細綵肚繫了先用象牙末於瘡口上貼了後用前藥如瘡口生合用刀子利開貼之

治凍瘡

臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡口上

又方以正黃蘗為細末用乳汁調塗瘡口上

又方山藥少許生於新瓦上磨為泥塗瘡口上

治手足裂

白芨不以多少為末水調塗裂處

治面上瘡

用鐵子底黑煤於小油中以匙打成膏子攤在紙上瘡上貼之

治金瘡血不止

白薇末貼之立止

善應膏藥

黃丹二斤

南乳香別研

沒藥別研

當歸

木鱉子生用

白欵生用

白礬生用

官桂三寸

杏仁生

白芷已上各一兩

新柳枝各長一斤

右除黃丹乳沒等外八件用芝麻油五斤浸一宿用鐵鍋內煎令黃色藥不用次入黃丹鍋內柳

條攪令黃色方可撥下用柳枝攪出大煙入乳沒勻令冷傾在磁盆內候藥硬用刀子切作塊子油紙封裹

接骨丹

五靈脂配 茴香錢

右二味為細末另研乳香為細末於極痛處搽上用小黃米粥塗了後用二味藥末搽於上再用帛子裹了用木片子纏了少壯人二日効老者五六日効

治癬如聖丸

黃蘗 黃芩 黃連 防風 已上各半兩

白疆蚕 乙兩 全蝎 分 輕粉 半錢

右為細末羊蹄根汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二三十丸嚼羊蹄根汁送下隨病人上下分食前後又羊蹄汁塗癬

治小兒癬雜瘡

白膠香 黃蘗 輕粉

右為細末羊骨髓調塗癬上

治瘰癧方

斑蝥 去頭 赤小豆 白疆蚕 苦丁香

白丁香 磨刀泥

右各等分為細末十歲已上服一錢二十已上服二錢五更用新汲水一盞調下比至辰時見効女人小便見赤白色三兩次男子於大便中見赤色白色為効當日服白粘粥不得喫別物大忌油膩患三四者只一服七八年者再一服

玉餅子 治瘰癧一切惡瘡軟癬

右用白膠一兩磁器內鎔開去滓再於磁關後以萆薢子六十四箇作泥入膠內攪勻入小油半匙頭挂點水中試硬軟添減膠油如得所量瘡

大小以緋帛攤膏藥貼之一膏藥可治三五癩

又方治瘰癧

小龍肚腸乙條

鱉殼裙爛炮

川練子五箇

牡礪

大黃

牛旁子燒存性

右為細末蒸餅為丸如菜苔大每服十五丸食後

艾湯下日三服

又方將臘月獾新瓦兩箇合在內外用塩泥

固濟燒成灰以小油調塗瘡口上

又方取小左盤龍不以多少為末陳米飯搜和得

所丸如梧桐子大每服三五丸却用陳米湯

送下

治眉煉頭瘡

小麥不以多少燒冷黑色存性為末以小油調

塗瘡上

治小兒疥瘡

羊蜚熬湯洗去痂用屋懸燥炒羅為末以小油

塗瘡上

聖靈丹 治打撲胸損痛不可忍者

乳香三錢

烏梅五箇去核細切焙乾為末

白蒿子二兩

八錢炒黃

白米一捻別研細末

右再入乳鉢內研數百下煉蜜為丸如粟大細嚼
熱湯下病在上食後在下食前

出麝方

右用蕎麥楷一擔不爛者燒灰存性入石炭半斤
同灰一齊過令火減然後以熱水霖灰窩林下
灰水用鐵器內煮以潦起攪成膏子於麝上點
自出或先以草莖刺破亦可

又方桑柴灰石灰淋汁熬成膏草莖刺破點以新
水沃之忌油膩等物

燒湯火方

多年廟上物與走獸為末小油調塗燒湯火瘡
立効

又方生地黃汁入小油蠟同熬成膏磁器內盛用
雞翅掃湯火處

又方培上青苔燒灰小油調塗燒湯火處

治燒燙方

生地黄旋取新者攪搗取自然汁入小油黃蠟
少許銀石器中熬成膏子用雞翎掃瘡上

又方血餘灰用臘猪脂調塗

又方寒水石燒過為細末水調塗之

枯榴方

砒 硃砂 黃丹 雄黃 粉霜 輕粉

已上各等一錢 班猫二十箇 朱砂乙錢

乳香錢三 沒藥錢三

同研為末粥糊為丸捏作碁子樣爆乾先炙破瘤頂三炷為則上以瘡藥餅蓋上用黃蘗末以水調貼之數日自然乾枯洛下

又方以銅碌為末草刺破瘤摻在上以膏藥塗之
治頭面生瘤子用蛛絲勒瘤子根三二日自然退落
乳香散 貼杖瘡腫痛

大黃 黃連 黃蘗 黃芩 已上各三錢

乳香研另 沒藥研另 已上各一錢 腦子少許

右四味為末後入三味冷水調勻攤於緋絹上貼杖瘡上

治疔瘡

馬明退燒灰錢三 輕粉許 乳香許

右研為細末先以溫漿水洗淨乾摻之

治疔瘡久不愈者

海浮石 燒紅醋碎數次 金銀花

右海石二停金銀花一停同為細末每服二錢半

如簽茶一般日用二服瘡在上食後在下食前服如病一年服藥半年則愈

瀉肺湯 治肺癰喘急坐卧不安

桑白皮剉燒 甜葶藶隔紙焙各乙兩

右二味罌末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後溫服以利為度

桔梗湯 治肺癰吐膿

桔梗剉炒乙兩半 甘草炙剉半兩

右為罌末每服六七錢水二盞煎至半盞去滓空心服須臾吐膿立愈

黃蘗散 治鵝窠微腰等瘡

黃蘗 白芨 白歛 已上各等分 黃丹少

右為細末凉水調塗

口齒咽喉第二

地龍散 治牙痛

地龍去土 玄胡索 葶撥 已上各等分

右為細末每用一字用綿子裹隨左右痛於耳內塞之

牙宣藥

葶撥 胡椒 良薑 乳香研 麝香 細辛

青鹽 雄黃 已上各等分

右為細末先以溫漿水刷淨後用藥末於痛處擦
追出頑涎休吐了嗽數十次痛立止已忌油膩一
二日

仙人散 刷牙

地骨皮

二兩酒浸

青鹽

配 黍粘子

乙兩半炒

細辛

乙兩酒浸

右為細末入麝香少許每用一字臨卧擦牙茶酒
漱良久吐出

又方 石膏 細辛 柳椹 已上各等分

右為末擦之

治牙疳

米二停 鹽一停 盆減 麝香少 白礬

右相合水伴勻紙包裹燒黑焦為末貼瘡上立止
治牙痛

口噙米水一口用大黃末紙摺隨左右痛處鼻
內任之立止

又方

韶腦 二錢 好朱砂 乙錢

右為末每用少許擦痛處

又方 好紅苳二錢 花減少許

右為末隨牙痛處左右鼻內噴之

又方 華細辛去苗 白茯苓去皮 川升麻

華撥 青鹽 明石膏 川芎 不蛀皂角皮去

弦酥炙 黃色 已上各等分

右為細末早晚刷牙溫水嗽之牙痛處更上少許

又方

以芭苳去皮用針刺於燈焰上炙令煙出薰牙

痛處薰三五上

又方 高良薑一塊 全蝎一隻

右為細末先用酸漿水嗽牙次用藥木擦之流下

涎水即愈

又方 治牙疼

花減填牙坑痛立止

又方 枯白礬熱水嗽之

治走馬咽痺

右用芭苳去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中之

透如左右俱有者用二枚

又方

用生白礬研細塗於綿針上按於喉中之破綿

針用榆條上用綿纏作棗大是也

又一法如左右喉痺於頂上分左右頭髮用手挽
援之剥然有聲立効此法年幼時常見鄭六嫂
救人甚多不得其訣近與子正話及方得其傳
又一法以馬勃吹咽喉中立止

治喉痺

大黃 朴硝 白芷 蚕

右件同為細末水煎量虛實用以利為度

口瘡方

白礬 乙兩飛 至半兩 黃丹 乙兩少 紅色放下 每少紫色為度

右二味為細末摻瘡上立愈

目疾證第三

治倒睫拳毛

將川山甲以竹篔子刮去肉用羊腰窩脂去皮
膜仍將川山甲於炭上炙令黃色用脂擦去山
甲上如此數遍令酥為末隨左右眼噙水鼻內
嚙一字一月餘見効

又方

木鱉子 三箇 乾炒 木賊 乙百二 十節 地龍 二條 去土
赤龍爪 乙百二十箇 則勾刺針也

右為細末摘去倒睫每日以紙撚蘸藥嚙之一日
三五次

又方

穿山甲炮 地龍去 蟬殼 五倍子
已上各等分

右為細末如用藥時先將拳毛摘盡後用藥一字
隨左右鼻內嚙之次日目下如線樣微腫是驗
也

貼赤眼

取青泥中蛆淘淨曬乾為末赤眼上乾貼之甚

妙

貼赤瞎

蘆甘石兩二 密陀僧兩 黃連 朴硝

右方先將黃連用水熬成汁入童子小便再同熬
後下硝又熬少時用火煨爐甘石紅黃連汁內
淬七次與密陀僧末同為末臨卧貼之

貼赤眼

銅碌 輕粉 牙硝 腦子炒 麝香
右研細末乾貼之

截赤眼方

黃連 綠礬 杏子 甘草 銅碌 各等分

右為麻末水煎洗甚効

碧霞丹 治赤眼暴發并治赤瞎

銅碌 白土 芒硝

右件各分為末丸如皂子大每用白湯研化一丸

洗之立効

汾州郭助教家神聖眼藥

麩仁配 金精石兩二 銀精石兩二 爐甘石兩四

燒赤石脂兩乙 滑石兩二 密陀僧兩二 高良

薑兩三 秦皮兩乙 黃丹兩乙 飛過兩 銅碌錢三 硃砂

錢三 硃砂乙錢 乳香錢三 盆硝少 青鹽

腦子 麝香 已上并少用之

右用東流水三升先入麩仁次下餘味等白沙蜜

一斤熬至二升以線絹細濾過澄清入前藥攪

之勻點

視星膏

白沙蜜一斤 棟去蜜滓可 稱十四兩 蜜陀僧乙兩 金色者 研極細

水淘可得 新柳筭子 四兩去皮心 半乾半炒

右用臘雪水五升與蜜筭子同貯

於磁瓶中以柳木塞瓶口油絹封勒於黑瓦鍋

中熬從朝至暮仍用柳捧閣瓶防傾側用文武
火另搯一鍋苧水滾下旋於另鍋中取水添之
熬成用重綿濾淨却入瓶中用井水浸三兩日
埋在雪中更妙頻點為上

復明膏 治外障

白丁香 臘月收者九佳
水飛秤八錢

揀黃連 乙兩

防風 去蘆

劉一指
詳一兩 新柳枝 方一寸
者三片

右好四味用新水一升半雪水更妙春秋兩三時
冬月一宿以銀石器內熬至六分濾去滓另用
蜜一斤蜜陀僧研極細末三字入蜜攪勻另熬

以無漆匙擦點下蜜中急攪候沸湯定一人攪
蜜一人旋又攪藥汁都下在內攪勻再熬三兩
沸色稍變用新綿三兩重濾去滓盛器內點眼
如常本方每藥半合用片腦一麥粒大不用亦
可

錠子眼藥

黃丹 乙兩
飛

黃蘗 半兩
去皮

黃連 半兩
去鬚

枯白礬

半兩 爐甘石 半兩用
黃連製

銅礬 半兩

硃砂 三錢

川烏 三錢
炮

乾薑 二錢

蝎稍 乙錢

信 半錢
火燒

乳香 少許

沒藥 少許

右為細末入荳粉四兩澆蜜和就如大麥許饑子
於眼大眦頭待藥化淚出為効

治冷淚目昏

密蒙花 甘菊花 杜蒺藜 石決明 木賊

銼 白芍藥 甘草

右件各等分為細末茶清調下一錢服半月後加

至二錢

又方 乾薑肥者為末每用一字洗湯點洗

又方 貝母一枚膩白者胡椒七粒為末點之

治目昏

荆芥穗 地骨皮 楮實 已上各等分

右為細末煉蜜為丸桐子大每服二十九米飲湯

治一切目昏

川椒 乙斤微炒搗取 甘菊花 四兩末之 生地黄 斤

取新者拌作泥極爛

右將地黃泥與前藥末同和作餅子透風處陰乾
再為末以蜜為丸桐子大每服三十九食後茶

清送下

洗眼黃連散

當歸 赤芍藥 黃連 黃蘗 各等分

右細剉以雪木或甜水濃煎汁熱洗治一切風毒

赤目

諸物入眼中

好墨清水研傾入眼中良久即出

點攀睛瘵肉

黃丹 乙兩二錢水 飛過渣乾

白礬 乙兩銀器內化成汁

右將白礬於銀器內化成汁入黃丹末在內以銀匙兒攪勻更入乳香沒藥各一錢慢火不住手攪令枯乾為粉候冷研極細熟絹羅過後入鷹条一錢半血竭二分麝香少許輕粉三分粉霜

二分共研極勻如粉再以熟絹羅過細末點之

大有神效

青金散

芒硝配 螺青 沒藥 乳香 已上各少許

右為細末每用少許鼻內啗之

治雀目

真正蛤粉 炒黃色為細末

右油蠟就熱和為丸如皂子納於猪腰子中麻纏蒸熟食之可配米粥

頭面風疾第四

治黥黯風刺方

苦參_斤 紅芍藥 冬朮 二味各四兩
玄參_配

右為末每用一字用手洗面上

猪蹄膏洗面上黥藥

右用猪蹄一副刮去黑皮切作細片用慢火熬如膏粘用羅子濾過再入鍋內用蜜半盞又用

白芷 黑荳_{皮去} 苡蓂_配 白芨 白欵
苓苓香 藿香 各一兩 鵝梨_{二箇細切}

右將七味藥為末同梨入藥一處再熬滴水不散

方成以絹濾過臨卧塗面次日用漿水洗面

治面風

益母草灰麵湯和燒七遍洗面用之

治面黥黑斑點方

白附子_{乙兩} 白芨 白欵 密陀僧 白茯苓
胡粉 已上各等分

右為細末洗淨臨卧以乳汁調一錢塗面但洗光
淨牛乳亦可

治頭風

苦丁香 川芎 藜蘆 各等分

右為細末噲水鼻內噲之

芎黃湯 治頭目眩運

大黃 荆芥穗 貫芎 防風 已上各等分

右為釐末大作劑料水煎去滓服之以利為度

耳龍耳方 草麻子五十箇去皮

右與熟棗一枚同搗丸如棗子大更入小兒乳汁就和每用一丸綿裹納於龍耳內覺熱為度一日一易如藥難丸日中曝乾

又方 口噲甘草一枚耳中塞二塊用綿果塞之

腦官方

皂角不蛀者去皮弦子蜜炙鎚碎水中揉成濃汁熬成膏子鼻內噲之口中咬筋良久涎出為度

治耳底方

以枯白礬為末填於耳中之効

治鼻中肉螻蛄

赤龍爪 苦丁香 已上各三十箇

苦葫蘆子不以多少 麝香少許

右為末用紙撚子點藥末用之

臍臭方

烏魚骨三錢 枯白礬三錢 密陀僧乙錢

右為末先用漿水洗臭處後用藥末擦之

又方 蜜陀僧不以多少研細先以漿水洗臭處乾

擦

烏頭藥

細針沙炒 蕎麵炒 已上各一盞

大麥亦同 醱醋半升與前二味打糊

凡用先使皂角水熱洗淨時前二味糊稀稠得所
於髭鬚上塗之均勻先用荷葉包次用皮帽裹
之三五時辰用溫漿水洗了却收取元針沙其

髭髮淨後用黑藥塗之黑藥方

沒食子 石榴皮 乾荷葉搗 已上各二兩

五倍子 訶子皮 百藥煎 金絲礬 碌礬

另研旋
點諸藥

右將七味為細末炒熟麵五六匙入好醋打麵糊
和藥末再塗髭鬚又用荷葉封裹後用皮帽裹
之二三五時間洗淨甚黑若更要黑光用猪膽漿
水澤洗如鴉翎

又方

酸石榴 五倍子 芝蔴葉

右同杵碎用絹袋盛之於鐵器內水浸掠髮自黑
治大頭病兼治喉痺方歌曰

人間治疫有仙方 一兩疆蚕二大黃

薑汁為丸如彈大 井花調蜜便清涼

又法 以砭針刺腫處出血立效

治時氣

馬牙硝 寒水石 黍粘子 兎曰 川大黃

鬼箭草 已上各等分 腦子少許

右六味為細末用新井花木一盞藥末一二錢入

腦子喫外一半留用新水得稠雞翎掃在腫處

有風涼處坐

解利傷寒第五

雙解丸

芭荳六箇去皮油 天麻二錢半 胭脂少許

右將芭荳天麻為末滴水丸如秫米大胭脂為衣

一日一丸二日二丸三日三丸已外不解先喫

冷水一口後用熱水下如人行十里以熱湯投

之

又一法無藥處可用兩手指相交緊叩腦後風府穴

向前禮百餘拜汗出自解

又一法適於無藥處初覺傷寒傷食傷酒傷風便服
太和湯百沸避風處先飲半椀或以藜蘆汁亦妙
以手揉肚覺恍惚更服半椀又用手揉至恍惚
更服以至厭飢心無所容探吐汗出則已
不卧散

川芎二兩 石膏七錢 藜蘆半兩 甘草二錢

右為細末口噙水鼻內各啗之少時喫日湯半椀
汗出解

川芎湯 解利一切傷寒

川芎 藜蘆 蒼朮

右三味為細末沸湯點二錢須臾覺嘔道便解如
不解再服

諸腰脚疼痛第六

皂角膏

右用醇酒二大椀皂角一斤去皮弦搗碎熬至一
半沸去滓再煎前汁入銀石器熬為膏字隨痛
處貼之

治腰脚疼痛方

天麻 細辛 半夏 已上各二兩

右用絹袋二箇各盛藥三兩煮熱交牙慰痛處汗

出則愈

牛黃白朮丸 治腰脚濕

黑牽牛 大黃 各二兩 白朮 乙兩

右為細末滴水丸桐子大每服三十九食前生薑

湯下如要快利加至百丸

婦人病證第七

如聖丹 治婦人赤白帶下月經不來

枯白礬 蛇床子 已上各等分

右為末醋麵糊丸如彈子大以胭脂為衣綿子裹

納於陰戶如熱極再換

洗洗丸療婦人無子

當歸 熟地黃 已上各二兩 延胡索

澤蘭 已上各一兩半 川芎 赤芍藥

白薇 人參 石斛 牡丹皮 已上各一兩

右為末醋糊為丸每服五十九丸桐子大空心酒下

當歸散 治月經欲來前後腹中痛

當歸以米醋微炒 延胡索生用 沒藥另研 紅花生用

右為末温酒調下二錢服之

治產婦橫生 草蘇子三十箇

研爛婦人頂上剃去髮少許以上藥塗之須臾
覺腹中提正便刮去藥却於脚心塗之自然順
生也

治血崩 蚕沙不以多少

右為末每服三五錢熱酒調下服

又方 管仲去須剉碎

或用酒醋煎三錢煎至七分去滓溫服一服立止

白歸散 治血崩

當歸配 龍骨燒赤 香附子炒

櫻毛灰半兩

右為細末空心米飲調下三四錢忌油膩雞猪魚

兔等物

蓮殼散

乾蓮蓬燒灰存性 櫻櫚皮及毛各燒灰已上各半兩

香附子炒 三錢

右為細末每服三四錢空心米飲湯調下服之

治婦人血枯 川大黃

右為末醋熬成膏就成雞子大作餅兒酒磨化之
三分散 治產後虛勞不進飲食或大崩後

白朮 茯苓 黃耆 川芎 芍藥 當歸

熟乾地黄 已上各一兩 柴胡 人參

已上各一兩六錢 黃芩 半夏洗 甘草炙

已上各六錢

右為釐末每服一兩水一大盞煎至半盞去滓溫

服日二服

治產後惡物上潮痞結大小便不通

芒硝 蒲黃 細墨 各等分

右為末用童子小便半盞水半盞調下服之

治婦人產後虛弱和血通經

當歸乾兩 芍藥二兩 香附子三兩炒

右為細末每服一二錢米飲調下服無時

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝 竈底焦土研細

用酒調三五錢瀉出惡物立止

治娠婦下痢膿血及咳嗽

白朮 黃芩 當歸 各等分

右為末每服三五錢水煎去滓食前加桑白皮止

嗽

百花散 治婦人產中咳嗽

黃蘗 桑白皮 用蜜塗慢火炙黃為度用 二味各等分

右為細末每服一二錢水一盞入糯米二十粒同煎至六分以款冬花燒灰六錢攪在藥內同調溫服之

治婦人吹妳

以樺皮燒灰存性熱酒調下三錢食後服之

又方 以馬明退燒灰五錢輕粉三錢麝香少許

右為細末每服二錢熱酒調下服之

又方 以皂角燒灰蛤粉和熱酒將來調數字下得

喉嚨笑呵呵

方 以淘米木杓上砂子七箇酒下以吹簫枝透

乳孔

效嗽痰涎第八

九仙散

九尖葶藶子葉三錢 飛過白礬二錢

右用猪肉四兩薄批其盤利開摻藥二味荷葉裹

文武火煨熟細嚼白湯送下後用乾食壓之

止嗽散

半夏乙兩半湯
洗七次 枯白礬四兩

右二味為末生薑打麵糊和丸桐子大每服三三

十九空心溫酒送下

八仙散

款冬花 佛耳草 甘草 鍾乳 鵝管石

白礬 官桂 井泉石 已上各等分

右為細末每服三錢水煎服之又一方摻咽喉中

三才丸 治嗽

人參 天門冬去心 熟乾地黄 已上各等分

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大含化服之

三分茶

茶二錢 蜜二兩 蕎麥麵四兩

右以新水一大碗約打千餘數連飲之飲畢良久

下氣不可停人喘自止

石膏湯 治熱嗽

石膏亂文者二兩 人參半兩去蘆 甘草半兩炙

右為末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可

三生丸 治嗽

胡桃仁乙兩 生薑乙兩去皮細切 杏仁乙兩

右二味同研為泥就和作劑可得十三四丸臨卧

爛嚼一丸可數服即止

化痰延壽丹

天麻半兩 枸杞子半兩 白礬乙兩半生

信門...

...

半夏乙兩半湯洗七次用 乾生薑乙兩半 人參乙兩

右為細末好糯酒拌勻如砂糖用蒸餅劑蒸熟去

皮杵臼搗四五十杵便丸如乾入酒三點丸如

小荳大每服三五十九生薑湯下

半夏湯 治噦欲死者

半夏乙兩洗 生薑二兩

右二味細切水二盞煎至八分去滓作二服食後

治肺痿喘嗽 漢防已

右為細末每服三錢漿水一盞同煎至七分和滓

溫服

治年高上氣喘促睡卧難禁

右蘿蔔子搗羅為末白湯浸調五七錢食後服之

或炒或用糖蜜作劑為丸服之

麻黃湯 治因風寒衣服單薄致嗽

麻黃不去節 甘草生 杏仁生用

右為簾末每服三二錢水煎食後溫服

心氣疼痛第九

失笑散 治急心痛并男子小腸氣

五靈脂半兩 蒲黃半兩炒

右為末每服三錢醋半盞煎二沸再入水半盞再

煎二沸空心食前和滓温服之

又方 醋一盞加生白礬一小塊如皂子大同煎至

七分温服之愈

又方

高良薑 半兩

山梔子 兩

蔚金 兩半

又方

以新嫩槐枝一握切去兩頭水二盞煎至一盞去滓分二服熱服

又方

沒藥 乳香 薑黃 玄胡索 已上各等分

右為末每服三錢水煎食後服之

小腸疝氣第十

抽刀散

川練子

乙兩破四分 芭芭三箇 同炒黃色去芭芭用之

茴香 乙兩 炒黃色

去鹽 用之

右為細末每服三錢葱白酒調下空心服之

治陰痛不可忍

吳茱萸

二兩洗七遍 焙乾微炒

檳榔 乙兩

茴香 乙兩

右為細末醋糊為丸熱酒送下十九食前服之

治偏腫

茴香

甘遂

右二味各等分為末酒調二錢食前服

又方 巴戟法 川練炒 茴香炒

等分為末温酒調二錢服之

治小兒疝氣腫硬

地龍不去土 為末唾津調塗病處

治小腸氣痛

全蝎兩 茴香乙兩炒黃

右為細末醋糊和丸如梧桐子大如發時每服五

七十九温酒送下食前

治小便渾濁如精之狀

沒藥 木香 當歸 已上各等分

右為末以刺棘心自然汁為丸如桐子大每服五

七丸食前鹽湯下

治小便頻滑數不禁

知母 黃蘗 已上各等分

右剉碎酒浸透炒微黃為末水丸梧桐子大如服

藥前一日休喫夜飯來日空心立服米飲湯下

一百丸只服一服効後喫淡白粥一頓

蕩疝丹

川練子炒 茴香炒 破故紙炒 已上各半兩

黑牽牛錢二 青皮 陳皮已上各 廣茂錢四

木香四錢

右八味為細末用好酒打麵糊為丸如桐子空心
食前温酒下三十九

灸疝法放疝邊堅絞左右交弦灸七壯

腸風下血第十一

神應散 治腸風痔漏

牛頭角腮乙隻酌中者

猪牙皂角疔

穿山川十四

九片或圓取或四步取或乙字取

蝟皮乙兩

蛇退皮乙條

右五味錘碎盛在小口磁器內鹽泥固定日中曝

乾瓶口微露出煙用文武火燒紅赤煙微少取

出於冷為細末如服藥日先一日臨卧細嚼胡

桃仁半箇如糊用温醇糯酒一盞送下不語便

睡至次日交五更服藥驗病年月遠近或秤三

錢五七錢用水半大碗醇糯酒半大盞相合熱

和藥服之至辰時再服

又一服再依前服藥不須用胡桃仁久病不過七

服忌油膩魚鱉雞兔猪犬等物大有神效

温白丸 治臟毒下血

椿根白皮凡引者去蘆皮酒浸晒乾服

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服三五十九淡

酒送或酒糊丸

治脫肛痔瘻

胡荽子和 乳香抄 粟糠半升或乙升

右先泥成爐子止留一小眼可抵肛門大小不令透煙火薰

治脫肛

蔓佗羅花子 連殼剉 橡椀十六箇

右搗碎水煎三五沸入朴硝熱洗其肛自上

治痔漏下血不止

皮蒜十箇獨科者妙 大椒六十箇 荳豉四兩

右搗爛為泥丸彈子大空心細嚼一丸 鹽湯下日

三服

治痔漏

白牽牛頭末四兩 沒藥乙錢

右同為■細末如欲服藥先一日不食晚飯明日

空心將獾猪精肉四兩燒令香熟薄批摻藥末

在內裹之漸又細嚼食盡然後用宿蒸餅壓之

取下膿血為効量病大小虛實加減服之忌油

膩濕麵酒色三日外不忌一服必効或用淡水

煮肉熟用上法亦可又云服前一日不食午飯

并夜飯明日空心用之

又方 黑白牽牛一合炒黃為末猪肉四兩切碎炒

孰與藥末攪勻只作一服用新白米飯三二是

壓之取下白虫為効

又坐藥 鯉魚鱗二三甲以薄編篋裹如棗柱樣納

之用即止

淨固丸 治痔漏下血痒痛

槐花炒 枳殼去穢 已上各一兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九米

飲湯下空心食前十服見効

黃連貫衆散 治腸風下血

黃連 雞冠花 貫衆 大黃 烏梅 已上

各一兩 甘草三錢 枳殼炮 荆芥 已上

各一兩

右為細末每服二大錢温火飲調服食前

槐荆丸 治痔漏

荆芥 槐花 等分為末水煎一大椀服丸亦

可

又方 荳豉炒 槐子炒 各等分

右為末每服一兩水煎空心下

薰漂藥 鳳眼草 赤皮葱 椒

三味搗麩同漿水滾過坐盆令熱氣薰痔但通手
漂之如此不過三次愈矣

小兒病證第十二

治小兒脾疳 蘆薈 史君子 已上各等分

右為細末未飲調下一二錢服之

玉筋散 治小兒馬脾風

甘草一寸煎水 甘遂末一字

右同油蜜生薑銀釵兒攪調下後用冷水半盞調

奪命散

奪命散 治小兒胸膈喘滿

檳榔 大黃 黑白牽牛 各等分比白當各半

生熟用之

右為細末蜜水調服

治小兒斑瘡入眼

麩炒蒺藜炙甘草 羌活防風等分搗

每服二錢漿水下 撥雲見日直到老

治瘡疹黑陷

鐵腳威靈仙乙錢 腦子乙

右為末用溫水調下服之取下瘡痂為効

治小兒黃瘦腹脹

乾雞糞兩乙

丁香末錢乙

右為末蒸餅為丸如小菝大每服二十九米飲湯

送下

黃連散 治小兒頭瘡

川黃連 黃蘗去皮

草決明

輕粉

已上

各等分

右為細末用生小油調藥於瘡上塗之立愈

治斑瘡倒壓方

胡桃乙箇燒灰存性

乾胭脂三錢

右為末用胡荽煎酒調下一錢服之

又方 人牙燒灰存性研入麝香少許每服三錢温

酒調下少許服之無時

又方 小猪兒尾尖取血三五點研入腦子少許新

水調下食後與服之

又方 人中白臘月者最佳通風處以火煨成煤水

調三五錢陷者自出

消毒散 治瘡疹已未出咽喉腫痛

牛旁子二兩

甘草半兩

荆芥乙分

右為簾末每服三錢水一盞半煎至七分去滓温

服無時

治小兒斑瘡入眼

猪懸蹄甲

二兩甘鍋內鹽泥固濟燒焦為末

蟬殼

二兩去土取末乙兩

羚羊角

鎊為細末用研之

右二味為末研入羚羊角細末一分拌勻每用一

字百日外兒服半錢三歲已上服三錢新水或

溫水調下日三四服夜一二服一年已外則難

治之

又方 透耳藥

朱砂 乙錢

粉霜 八分

右研為細末水調少許用匙杓頭傾一兩點於耳

內中後用

白菊花 菘荳皮 穀精草 夜明沙

右四味為末用米泔半碗熬成去滓入乾柿十餘

箇再同熬每日喫三兩箇仍飲煮乾柿湯

又方 治小兒斑瘡入眼

朱砂 腦子 水銀 麝香 已上各等分

右四味研為細末用水銀調滴入耳中

發斑藥

珠子七箇 研碎用新水調勻服之

破傷風邪第十三 陰毒傷寒亦附于此

辰砂奪命丹

鳳凰臺

川烏頭

生已上各二錢

麝香

少許

朱砂

右為細末棗肉和為丸如彈子大朱砂為衣鱧酒

送下量病人年甲虛實加減用之小兒半丸以

吐為度不止以葱白湯解之

治破傷風

病人耳塞并爪甲上刮末唾津調塗瘡口上立效

無瘡口者難用

治破傷風

烏梢尾

節 兩頭尖

四箇

全蝎

四箇

右三味為細末另用石灰

五升

柴灰

五升 沸湯

升林灰水澄清下藥熬之鐵鑊器內攪成膏子

如稠用唾津調先用溫漿水洗淨瘡口後塗藥

即時藥行吐黃水一日以新水漱口即愈

又方

天南星

半生半熟

防風

去蘆

二味各等分

右為末清油調塗瘡上追出黃水為驗

又方

白芷

生用

草烏頭尖

生用去皮

二味等分

右為末每用半錢冷酒一盞入葱白少許同煎服

之如人行十里以葱白熱粥投之汗出立愈甚

者不過二服

又方蜈蚣散

蜈蚣頭 烏頭尖 附子底 蝎梢 四味各
等分

右為細末每用一字或半字熱酒調下如噤了牙
閑用此藥幹開灌之

治陰毒傷寒破傷風

草烏頭

七箇文武火燒熟去牙頭

麝香

半錢

朱砂

乙錢

右為細末每服一字以熱酒調下食前服之汗出
為度忌猪兔魚鱉粘殺肉

治陰毒傷寒

用芥末以新水調膏藥貼臍上汗出為効

又方

以牡礪乾薑末新水調塗手心握外腎汗出
為効

諸風疾證第十四

不老丹 治一切諸風常服烏髭注顏明目延年

蒼朮四斤

米泔浸軟竹刀子刮去皮切片子一斤用椒三兩去白炒黃去椒一斤

斤鹽三兩炒黃去鹽一斤好醋一升煮盡一斤好酒一升煮令泣盡

何首烏二斤

米泔浸軟竹刀子刮去皮切片子用瓦甌蒸先鋪黑豆三升乾棗

二升上放何首烏上更鋪棗二升黑豆三升用炊單復著上用盆合定候葶棗香熟取出不用

葶棗

地骨皮

去簾皮秤二斤

右件於石臼內搗為細末候有椹汁搜和如軟麵

劑相似磁盆內按平上更用椹汁藥上高三指
用紗綿帛覆獲之晝取太陽夜取太陰使乾再
搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒
下六十九忌五辛之物

四仙丹

春甲乙採祀葉

夏丙丁採花

秋庚辛採子

冬壬癸採根皮

右為細末以桑椹汁為丸每服五十九茶清酒任
下

起死神應丹 治癱瘓四肢不舉風痺等疾

麻黃

去根節河水五升煮
去滓可成膏子五斤

白芷

二兩 桑白皮

二兩

蒼朮

二兩

甘松

二兩

川芎

三兩

苦參

三兩

加浮萍

二兩

已上各為細末用膏子和丸如彈子大每服一丸
溫酒一盞化下臨卧服之微汗出勿慮如未安
隔三二日再服手足即時輕快及治卒中風邪
涎潮不利小兒驚風服之立効

愈風丹

芍藥

川芎

白僵蚕

炒

桔梗

細辛

去葉

羌活

已上各半兩

麻黃

去節

防風

去蘆

白

芷 天麻 金蝎各乙巳上 甘草三錢 南星兩半

生薑 朱砂半兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒吞下

香芎散 治偏正頭風

貫芎 香附子炒 石膏亂紋者 白芷 甘草

薄荷 已上各一兩 一方川烏頭半兩炮去臍皮用之

右為細末每服二錢温酒或茶清調下服之

功十一丸 治癩

丁香 木香 沉香 乳香 麝香 荆三稜

炮廣茂炮 黑牽牛微 黃連 雷丸炒 鶴虱

炒胡黃連 黃芩 大黃焙 陳皮 青皮

雄黃 熊膽 甘草炙 各二錢半 赤小豆三

六十粒煮 白丁香直尖者三錢 輕粉四錢 芭荳七箇

右二十三味為細末赤小豆爛煮研泥同蕎麵打

糊和作十一丸朱砂為衣陰乾服時水浸一宿

化一丸大便出隨病各有形狀取出為驗或作

化一番不可再服曾經火灸者不治遠年愈効

朱砂滾涎散 治五癩

朱砂水飛 白礬生 赤石脂 消石 已上各

等分

右同為細末研蒜膏如丸菜荳大每服二十九食
後荆芥湯下

又方 末砂不以多少水飛研為細末
右用猪心血浸蒸餅為丸如菜荳大每服二十九
空心金銀湯下之

治諸風疥癬及癩

浮萍配 荆芥 川芎 甘草 麻黃 已上
各半兩 或加芍藥 當歸
右為釐末每服一兩水一椀入葱白根荳豉同煎

至一半無時服汗出為度

治癩塗眉法

半夏性 羊糞燒 已上各等分

右為末生薑自然汁調塗

五九散 治癩

地龍去 蟬殼 白僵蚕 凌霄 金蝎

已上各等九箇

右同為末只作一服熱酒調下浴室中汗出粘吳
氣為効

苦參散 治癩風

苦參

取頭末
秤二兩

猪肚

乙箇
脂

右以苦參末摻猪肚內用線縫合隔宿煮軟取出
洗去元藥先不喫飯五頓至第二日先飲新水
一盞後將猪肚食之如吐了再食之食罷待一
二時用肉湯調無憂散五七錢取出小虫一二
萬為効後用皂角一斤不蛀者去皮弦及子搥
碎用水四碗煮至一碗用生絹濾去滓再入苦
參末攪熟稀麵糊膏子相似取出放冷後入餘
藥相和藥附于后

何首烏

二兩

防風

乙兩

芍藥

五錢

人參

三錢

當歸

乙兩

右為細末入皂角膏子為丸如桐子大每服三五
十丸温酒或茶清送下不計時候日進三服後
用苦參荆芥麻黃煎湯洗冷

水腫黃疸第十五

治通身黃腫

菘蒂焙乾三四錢

右為細末每用半字於鼻內吹上日一慶併吹三
日如不愈後用黃芩末之前煎湯五錢下

治蠱氣

取環腸草不以多少曬乾水煎利小便為度
治黃疸面目遍身如金色

菘蒂 一十四箇

母丁香 乙箇

黍米 四十九粒

右先搗菘蒂為末次入二味同為細末每用半字
夜卧令病人先噙水一口兩鼻內各半字吐了
水令病人便睡至夜或明日取下黃水旋用熟
帛搵了直候取木定便服黃連散病輕者五日
重者半月

黃連散 治黃疸大小便秘澁壅熱

黃連

三兩

川大黃

一兩剉碎醋拌炒過用之

黃芩

甘草

灸各一兩

右為細末每服二錢食後溫水調下一日三服

治水腫不利小便非其法也故內經云濕氣在上
以苦吐之濕氣在下以苦瀉之吐瀉後長服益
元散加海金沙煎以長流水服之則愈矣大忌
脚膝上針刺出水取一時之効後必死矣尤忌
房室濕麪酒醋鹽味犯之必死

木通散 治水腫

海金沙 舶上茴香 巴戟 大戟 甘遂

芫花 木通 滑石 通草 已上各等分

右為細末每服三錢以大麥麵和作餅子如當二錢大爛嚼生姜湯送下

下痢世瀉第十六

治痢

紫苑 桔梗 赤芍藥 白朮 已上各等分
右為細末每服三五錢細切羊肝拌之作麵角兒
燒服之後用白湯送下食前

治痢

桂枝藜蘆炒爆為末酒調下三兩服

香豉丸 治痢

蒜為泥 豉為末

右二味相和作丸如梧桐子大米飲湯下五七十丸食前

治大人小兒吐瀉腹脹胸膈痞閉

五靈脂 青皮 陳皮 硫黃 芒硝 已上各等分

右將硝黃於銚子內以文武火鎔開用匙刮聚自然結成砂子取出研碎與前三藥同末麵糊為丸如芡苳大小兒麻子黃米大每服二十九量
虛實加減未飲湯送下無時

又方治瀉 車前子不以多少

右為細末每服二錢米飲湯調下服之木穀分吐瀉止

諸雜方藥第十七

治消渴 揀黃連 二兩八九節者

右剉如咬咀以水一椀煎至半椀去滓頓服之立止

日日還丹

佛茄子 樟柳根 已上各等分

右為末枸杞汁和為丸如雞頭大每服十九新水

送下

酒撒丸

芭荳 十六箇 全蝎 十五箇 雄黃 一塊 白麴 五

右為末研勻滴水丸如棗豆大每服一丸如痛飲者二丸

立應丸 治臟腑泄痢膿血不止腹中疼痛

乾姜 乙兩炮 百草霜 乙兩 連皮芭荳 乙兩炒

杏仁 乙兩同芭荳和皮炒 黑皮并為泥後入膏研

右用黃臘四兩鎔開蠟次入前四味用鐵器攪勻旋丸桐子大每服三五丸甘草湯下白痢用乾

姜湯下食前若水瀉溫水下

反胃 黃蘗末熱酒調三五錢食後服之

治小便多 滑數不禁

金剛骨為末以好酒調下三錢服之

又方 白茯苓去黑皮

乾山藥去皮白礬水內湛
過慢火焙乾用

右二味各等分為細末稀末飲調下服之

治卒淋痛

芫花散 三錢 茴香 二錢微炒黃

右為細末水煎服之

治疝方