



聚者何不得散而積成矣○帝曰人之善病腸中積
而滯濯如此則腸胃惡則邪氣留止積聚乃成
腸胃之間寒溫不次邪氣稍至邪積留止積聚乃成
起○內經曰寒氣客於小腸膜原之間絡血之中
血滯不得注於大經血氣稽留不得行故痛昔而
成積矣

論五積六聚

積名曰積氣之所聚也故陰沉而伏之然積者陰氣之所聚
六府所成積者陰氣也其始聚者有五處者陽氣之所聚
其部上無根本終始無所聚者有五處者陽氣之所聚
其始發無根也終始無所聚者有五處者陽氣之所聚
是別積聚也○終始無所聚者有五處者陽氣之所聚
師曰積聚者病也○終始無所聚者有五處者陽氣之所聚
展轉痛移為積聚也○終始無所聚者有五處者陽氣之所聚
為氣痛移為積聚也○終始無所聚者有五處者陽氣之所聚
有心頭之積久不愈伏梁○終始無所聚者有五處者陽氣之所聚

至心下久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
碗發黃疸食不為肌膚○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
收發黃疸食不為肌膚○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
熱喘上發肺至心○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
發於小腹逆骨下○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
已令人喘逆骨下○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
細作定在左脇下○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
下○脾積面黃脈大○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
積面黃脈大○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
口大實而沉○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○
定在小腹沉○久不愈令人頭心作○久不愈令人頭心作○

伏梁有二證

血居腸胃之外不可治○伯盛曰上下左右皆伏梁裏大膿
曰人有身體之病不可治○伯盛曰上下左右皆伏梁裏大膿
伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於腸而着於
育曰病名伏梁此風根也其氣溢於腸而着於
水尿之原在臍下故環臍而痛不可動之着於
同名而實異也○

醫方類聚卷之六

二

脉法

弦鬱脉多沉伏或結或促或積氣代... 其結微則積微則積... 在胃腕即關瘕積聚... 可強急難治一弦緊在... 本位聚無死虛弱... 附骨結弦痼則浮沉... 聚為積強者生... 痛氣瘕疾弦前若堅... 弱鬱死... 網者死

六鬱為積聚瘕瘵癖之本

不食散鬱而成熱鬱... 滯食不消而成熱鬱... 常六鬱之病見矣... 法鬱不順氣為風寒... 鬱總解諸鬱泄之... 也吐之奪其條達也... 泄解表利小大便... 此治五鬱之大小... 加丸散... 味麩麩丸

醫家寶鑑卷之六

三

六鬱湯

通治六鬱香附子二錢川芎蒼朮各一錢半
陳皮半夏製各一分右判作一貼薑三片煎服
縮砂甘草木香檳榔烏藥紫蘆葉○薑濕鬱加白朮
氣鬱加木香檳榔烏藥紫蘆葉○薑濕鬱加白朮
活防己○熱鬱加黃連連翹○痰鬱加南星瓜蒞
仁海粉○血鬱加桃仁牡蠣皮韭汁○食鬱加山
揸子神麩
麥芽神麩

六鬱湯

開諸鬱火便香附蒼朮神麩
川芎赤茯苓貝母枳殼紫蘆葉各一錢
薑三分右判作一貼

麩麩丸

解諸鬱末便香附川芎神麩炒
等分右為末細麩丸如菜豆大溫水
十丸寡婦僧道之類名剎子遂或先富後貧或久
遂如寡婦僧道之類名剎子遂或先富後貧或久
病不愈者皆宜服此丸

麩麩保和丸

開鬱行氣消積散熱白朮三兩山揸肉
二兩蒼朮川芎神麩炒便香附陳皮半

加味麩麩丸

解諸鬱開胃附神麩炒食蒼朮炒各四兩
陳皮去末白朮炒黃芩炒各一兩半山揸肉蒸二
兩右為末稀糊和丸梧子炒五錢右為末薑汁
膏滿脇痛脉沉宜用香附燕芎蒼朮二陳湯煎水
木香調氣散解鬱調胃湯麩丸○二陳湯煎水
吞下交感丹

濕鬱

周身關節痛如物蒙足重遇陰寒便發脈沉
濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓隊○宜服參濕湯
散內觀胃

熱鬱

目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附
蒼朮川芎梔子枳殼○宜服升陽散火湯火鬱湯左

醫方類聚卷之六

四

加味麩麩丸

解諸鬱開胃附神麩炒食蒼朮炒各四兩
陳皮去末白朮炒黃芩炒各一兩半山揸肉蒸二
兩右為末稀糊和丸梧子炒五錢右為末薑汁
膏滿脇痛脉沉宜用香附燕芎蒼朮二陳湯煎水
木香調氣散解鬱調胃湯麩丸○二陳湯煎水
吞下交感丹

濕鬱

周身關節痛如物蒙足重遇陰寒便發脈沉
濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓隊○宜服參濕湯
散內觀胃

熱鬱

目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附
蒼朮川芎梔子枳殼○宜服升陽散火湯火鬱湯左

醫方類聚卷之六

四

身醫寶錄卷之六

消塊丸

名白芥積丸今
消積丸治瘰癧
瘰癧大黃四兩
陳醋三升
置磁器內
先納甘草
大黃煎不
住手攪使
微沸盡一
升下餘藥
末煎至
可丸則丸
如梧子
六朱飲下
三十九
當利如雞
肝

加味柴平湯

名惡硝石丸
各七分
薑三分
甘草五分
水煎服
柴積塊有熱
柴胡黃芩
枳殼神麴
三稜蓬朮
貼入薑三分
棗二水煎服
細作一

消積保中丸

下八
九
魏各三錢
右為末
以薑汁
酒糊和
丸梧子
大木香
白湯
乾漆炒五錢
右為末
以薑汁
酒糊和
丸梧子
大木香
白湯
檳榔七錢
神麴炒
蓬朮三錢
薑汁炒
各八錢
麥芽炒
六錢
芥子炒
兩散
半除塊
白茯苓
香附炒
醋炒
兩陳皮
去白
消積保中丸
散痞除塊
白茯苓
香附炒
醋炒
兩陳皮
去白

開懷散

香附子
三稜
蓬朮
並醋炒
青皮
陳皮
半夏
白茯苓
各一
七分
右到作
一貼
薑三
煎服
或
陳皮
半夏
白茯苓
各一
七分
赤

柴香散

芍藥
厚朴
香薷
連翹
玄胡
煎服
或
陳皮
半夏
白茯苓
各一
七分
赤

保和丸

連翹
香薷
附子
陳皮
半夏
積聚
痞塊
久服
自消
白

化痞丹

香附子
夜消積塊
專攻之劑
大黃
四兩
醋
二兩
木鱉子
去油
右為末
將大黃
和桃仁
各一兩
糊和
九葉
豆大
茅根
分

身醫寶錄卷之六

七

牛○心積加黃芩三錢肉桂神丹
 蒲五分○肺積加桔梗三錢天門冬
 黃芩各一錢砂胡各二錢澤瀉茵陳各一錢
 一○錢澤瀉加玄胡各二錢肉桂全蠍
 消積正元散 治痰飲氣鬱食積不升積聚
 素海粉各一錢赤茯苓陳皮青皮縮砂麥芽炒
 植肉甘草各七分右判作一貼薑三水煎服○山
 名開胃正元散

肥氣丸 治肝積柴胡一兩黃連七錢厚朴五錢川椒
 角白茯苓各一錢半乾薑巴豆霜各五分川烏二
 分右為末蜜丸梧子大初服二九日加一分九二日
 加二九復始塊減半勿服漸減服
 伏梁丸 治積黃連半斤乾薑半斤參各一斤厚朴人參各五錢黃芩
 桂枝茯苓神丹參各一斤厚朴人參各五錢黃芩

痞氣丸 治脾積黃連湯下服如法
 錢茵陳乾薑各四分白朮一錢半川烏末蜜丸
 豆霜各四分白朮一錢半川烏末蜜丸
 湯下服如法
 急責丸 治肺積黃連一兩三錢厚朴八錢川烏桔梗
 白茯苓末蜜丸梧子大黃連湯吞下服如法
 分右為末蜜丸梧子大黃連湯吞下服如法

奔豚丸 治腎積厚朴七錢黃連五錢川椒一錢
 附子獨活各一錢梧子大黃連湯吞下服如法
 桂二分獨活各一錢梧子大黃連湯吞下服如法
 通玄二八丹 治積聚黃連八兩雄豬肚一具入藥於內
 以線縫之鋪韭菜二斤於空鍋內蒸之七日以藥熟
 為度取出搗丸梧子大空鍋內蒸之七日以藥熟

一二次以
奔豚湯 治腎積牛夏二錢川芎當歸各一錢甘草七分右

散聚湯 治厚朴聚及癥瘕隨氣上下心腹刺痛二便不

香稜丸 治五積六聚氣塊三積檳榔各三兩山楂肉

大七氣湯 治五積六聚心腹脹二便不利三積蓬

桂方加草各一錢檳榔各一錢治諸脈痞積面色萎黃

四肢無力皆緣內有虫積或食生米或壁土或
心溫服後不得些少飲食不然而藥力減而虫積不
行矣服後心腹痛當下物如魚凍虫驚至日午

潰堅湯 治五積六聚諸般痞塊當歸白朮半夏陳皮

潰堅丸 治積實山楂肉香附子厚朴縮砂各一錢木香

真人化鐵湯 治五積六聚肉神麩香附子枳實厚朴黃

癥瘕癖證 治飲食積死血而不移癥者聚而能移皆因痰

糊和九梧子大薑湯下七十九〇凡人養正積病除
氣滯而餒此方攻補兼施真得古人養正積病除
心之服宜研

腸覃石瘕血盡證治
結腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏
或如雞卵氣病而懷胎未病也宜推之移月如事時下或積
蓬少此氣如血未病也宜推之移月如事時下或積
久則堅硬如石醋少於石瘕用如懷孕事下成
先感寒氣而後血壅於門大如懷中傷損血結乃
經九疔氣而後血壅於門大如懷中傷損血結乃
硬如石疔氣而後血壅於門大如懷中傷損血結乃
萬病九疔氣而後血壅於門大如懷中傷損血結乃

晞露丸
兩治腸覃散抱丸玄九
豆乾漆炒青皮去雄黃另研各錢三
香鹽炒青皮去雄黃另研各錢三
錢麝香五分輕粉酒另研錢三
糊和九梧子大薑湯下七十九〇凡人養正積病除

石莢散
治石瘕紫肉各五錢
節各三錢
濃煎蘇木酒調下二錢
桃仁煎
各治婦人血蟲炒五錢
醇醋一升二合銀石炒五錢
仁大黃一升二合銀石炒五錢
之九取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即
五九取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即
針藥

石莢散
治石瘕紫肉各五錢
節各三錢
濃煎蘇木酒調下二錢
桃仁煎
各治婦人血蟲炒五錢
醇醋一升二合銀石炒五錢
仁大黃一升二合銀石炒五錢
之九取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即
五九取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即
針藥

桃仁煎
各治婦人血蟲炒五錢
醇醋一升二合銀石炒五錢
仁大黃一升二合銀石炒五錢
之九取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即
五九取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即
針藥

醋煮三稜丸
治血蟲三稜四兩醋煮竹刀切晒乾川
糊和九梧子大薑湯下七十九〇凡人養正積病除
氣滯而餒此方攻補兼施真得古人養正積病除
心之服宜研

三稜煎元
治婦人血積塊血大黃八兩為末三
令稠和九葉豆大白
湯下三和五十九

更醫寶鑑卷之六

二

更

萬病丸

治室女月經不通臍下堅結大如盃升寒熱
膝酒浸一宿各一兩六錢生地黃四兩八錢取汁
右銀石器內下地黃汁入二藥末慢火熬九如梧
子大酒卽止

桃奴散

治血蟲及疥血停積經水不通桃奴鼠糞
三錢以溫酒調下每
仁各等分

抱甕丸

治血蟲及婦人鬼胎如抱一甕花吳茱萸
愈未蜜丸梧子大每七九蜜酒吞下惡物立出而
愈明

斑玄丸

治鬼胎惑於妖魅狀似癩癧及一切血疔
九胎墮
為效

息積病

帝曰人有病脇下滿氣逆二妨於食不己是為何
積病

磨積元

治腸胃積因虛氣滯行導引法得
宜服為導引元氣滯行導引法得
一木朝敗濁難積月頻年醫所不治久則榮衛停凝
木香二錢半全蠲十箇右為末粟米飯和九菜豆

化氣湯

治積癖於腹脇之下偏脹滿不妨飲食
苗香炒甘草各一錢五縮砂桂心木香各二錢以生薑
胡椒沉香各一錢五縮砂桂心木香各二錢以生薑
煎湯調下

導引法

治息積以兩手拇指壓無名指一息嚥氣三
口再屏息坐卽齒三十六屏氣二十息嚥氣三
通再效遇子午卯酉時則行

加巴豆在印神保元法心腦
痛收痛血痛腎氣痛腸下
痛大便不通氣噎痰食不
消方見氣門心腦

寬中怡膈痞悶停
滯飲食山查不以多少
蒸熟舂乳為末作丸服

諸物傷成積 凡人脾胃虛弱或飲食過常或生冷過度

吞酸積面青肌瘦一食積二日果積七曰茶積八曰

食積 附食不消化積成痞 宜用平胃散 煎服 效 加縮砂香

酒積 宜用神效 紅元子 佐安丸 連蘇九 蘇葉煎服 效 加縮砂香

麵積 仙錢方暴以宜子酒 功保子不 日積九 積曰血 積

麵積 仙錢方暴以宜子酒 功保子不 日積九 積曰血 積

香元 入巴豆 肉積 積以橘皮 湯下三粒 更研白和勻 蒸餅為丸 菜豆大 以生

魚蟹積 元食小肉 過紫蘇 濃煎三粒 宜用阿膠 泥服即散 粉

果菜積 鹽多食香 煎果菜 服日成積 用平胃散 加丁香 麝香 丸 妙應丹

茶積 喜吃糖茶 成積成癖 及吃乾茶 者石膏 黃茶 升麻 為

水積 積宜用大 茶清下 十丸 磨積元 癩 聲宜十 棗湯 丸

水積 積宜用大 茶清下 十丸 磨積元 癩 聲宜十 棗湯 丸

血積

元黃痰血成積或因打撲或墮落以致蓄于膏腹面

蟲積

煎元增味四物湯三稜見

保和丸

二錢右為末神麩糊五兩神麩糊各一兩右未

大安丸

皮別以神麩子連麩麥芽炒各一兩服

紅圓子

醋煮麩糊和皮陳積酒積脾積血氣諸般癥塊

麩積元

子巴大豆右為末湯下五錢

酒積丸

錢巴豆大酒積丸錢積丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

阿魏元

錢神麩丸神麩丸神麩丸

佐脾丸

大溫水吞下

麩積元

子巴大豆右為末湯下五錢

酒積丸

錢巴豆大酒積丸錢積丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

阿魏元

錢神麩丸神麩丸神麩丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

阿魏元

錢神麩丸神麩丸神麩丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

阿魏元

錢神麩丸神麩丸神麩丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

阿魏元

錢神麩丸神麩丸神麩丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

阿魏元

錢神麩丸神麩丸神麩丸

烏白丸

神麩丸神麩丸神麩丸

董湯下生果菜傷以麩香湯用麩
阿魏丸治肉積及食積成塊阿魏一兩醋煮軟山檀
兩右為末六錢半連和九服五錢右為末醋糊和丸服各一
兩黃連六錢半連和九服五錢右為末醋糊和丸服各一
魏九小可

三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
神麩麥芽並炒各三兩青皮乾漆炒蘿蔔子炒各
二兩杏仁稠砂飛研各一兩右為末以三稜膏和

妙應丹治飲食中蠱毒或宿食留飲結為癥瘕附子腹
筒七錢重者生去皮臍刻作瓮入礪砂共一兩七
錢重麩果煨熟去麩不用草撥木香青皮破故紙
各三兩半右為末麩糊和丸服
子大生薑橘皮為末下三十九丸

桂香丸治多食雜芥果子成積腹脹氣急桂心一兩
麩香一錢右為末飯九菜豆大白湯吞下十

磨積元治茶積飲食減少面黃腹痛陳倉米半升巴
各二兩右為末好醋搜和為丸
醜豆大淡薑湯下二醋搜和為丸

勝紅元治血積酒積及婦人脾血積氣三稜蓬朮並
子醋炒二兩青皮陳皮乾薑炮良薑炒各一兩香附
梧子醋炒大薑湯下三為末醋糊和丸

增味四物湯治血積四物湯等分煎服蓬朮
三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
火煨令乾取糊和丸將荒花以醋五盞浸之封口共
焙乾為末蓬朮各二兩青皮大薑湯下五炒各一

三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
火煨令乾取糊和丸將荒花以醋五盞浸之封口共
焙乾為末蓬朮各二兩青皮大薑湯下五炒各一

三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
火煨令乾取糊和丸將荒花以醋五盞浸之封口共
焙乾為末蓬朮各二兩青皮大薑湯下五炒各一

三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
火煨令乾取糊和丸將荒花以醋五盞浸之封口共
焙乾為末蓬朮各二兩青皮大薑湯下五炒各一

三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
火煨令乾取糊和丸將荒花以醋五盞浸之封口共
焙乾為末蓬朮各二兩青皮大薑湯下五炒各一

三稜煎元治肉積脾虛為肉食所傷腹滿膨痛三稜
火煨令乾取糊和丸將荒花以醋五盞浸之封口共
焙乾為末蓬朮各二兩青皮大薑湯下五炒各一

荊蓬煎元

消痞塊冷熱積聚破痰消食
內三十八粒石香器內同炒黃皮苗香妙已豆取用湯浸
去白各二兩木和丸葉殼青皮苗香妙已豆取用湯浸
右薑湯下麩三糊五十九九葉殼青皮苗香妙已豆取用湯浸
大薑湯下麩三糊五十九九葉殼青皮苗香妙已豆取用湯浸

秘方化滯丸

消暴積一切氣化導一切積久堅沉痼磨之自
之功調陰陽有補瀉之妙三皮蓬木並煨有通塞
八分半夏麩木香丁香青皮陳皮並去白煨各錢
二錢半巴豆肉醋浸一宿熬乾六錢為梅肉焙乾
細末五錢右為末以烏梅末入白麵少許煮作糊
和丸黍米磨積則以陳皮湯下欲止九欲通利則以
湯下欲磨積則以陳皮湯下欲止九欲通利則以

三稜化積丸

治諸般積聚三稜酒煮六兩山植肉四
香青皮陳皮香附子醋炒枳實厚朴縮砂神麩炒
麥芽炒南星薑湯泡半夏薑製厚朴子縮砂神麩炒
桃仁乾漆星薑湯泡半夏薑製厚朴子縮砂神麩炒
糊和丸梧子甘草各一兩四十五丸末醋

寬中丸

治七癥八瘕五積六聚痰癖氣塊胃腹脹痛
子各二兩三稜蓬術並醋煮焙青木陳皮乾薑炮
良薑炮五梧子炒神麩炒麥芽炒各一兩右為末醋
湯下五十九丸

萬應丸

破一切積散一切氣腫痰癖等證癥積聚食
阿魏醋研大黃吳茱萸青礞石與煨同煨肉桂
木香沒藥當歸蒲香皂角乾漆炒檳榔陳皮枳殼
乳香沒藥當歸蒲香皂角乾漆炒檳榔陳皮枳殼
三稜蓬術並醋煮焙青木陳皮乾薑炮
黃各二錢半巴豆霜下錢半右為末醋
糊和丸梧子甘草各一兩四十五丸末醋

延年護命丹

治三般積生四般氣及血積蟲
黑丑頭末一兩蓬木三稜並醋炒
五錢陳皮二錢半與花同醋浸一宿焙乾
乳香輕粉各一錢右為末蜜和搗千每取兩分
作四九細嚼一丸溫水送下

桃溪氣寶丸

將物為效三三日只喫白粥
將息忌生冷油膩
治一切積聚腹痛如抱一危瘦瘠靈骨
丑頭末二兩大黃一兩半積大便秘澀寒熱往來黑
川芎陳皮茵蒿香炒木香當歸各五錢右為末熬皂
角膏和九薑湯
下五七十九丸

外貼法

凡積聚塊塊用藥外貼令消散可用
三聖膏貼積塊塊用藥外貼令消散可用

三聖膏

色貼積塊塊用藥外貼令消散可用
妙候熱減入桂心末減次下大黃末一兩就燼外
醋熬成黑膏匣紙攤開貼患處

琥珀膏

治一切痲疾大黃皂角生薑生葱
和勻作片貼之
黃膏

五仙膏

治一切痲疾大黃皂角生薑生葱
大蒜各半斤右共搗爛水煎取汁去渣再熬

貼痞膏

成青黑色為度
以鍼刺患處後貼膏藥上
塊上再用湯塊子錢大黃朴硝山梔石灰各一錢
後塊起肉黑如墨是效也
吳菜更炒碎之酒和煮布裹
慰癥法

握藥宣積

巴豆乾薑芥子良薑硫磺黃甘遂積柳各等分
右為末飯九如中指頭大早朝先以川椒湯
洗手了麻油塗手掌中揉藥一團移
時便瀉欲止瀉即動者難治必死
難治證

難治證

蓋復還止皆從驚恐得之越日驚者神上越也
論之醫為病上衝咽者陰虛之難久積之謂也
王山自倒陰虛之謂也養陰虛之難久積之謂也
之懼此二患者
可不懼哉

黍米泔汁患驚癢者以新熟赤黍米淘取泔

白頸蚯蚓汁服之癢取

桃花萼和麩作燒餅食之

桃奴三治伏梁氣在酒下調二錢服之

大蒜一握水煎空心服

白馬尿治諸癢取飲之即消

雄雀屎主癩瘡以米飲吞下

人尿一升積滿腹中痛飲

鍼灸法之仍灸氣海關元期門章門各百壯中極

壯百壯中癢癢灸足踝後宛癢中癢積塊先於塊上灸氣
海百壯中癢癢灸足踝後宛癢中癢積塊先於塊上灸氣
壯百壯中癢癢灸足踝後宛癢中癢積塊先於塊上灸氣
壯百壯中癢癢灸足踝後宛癢中癢積塊先於塊上灸氣
壯百壯中癢癢灸足踝後宛癢中癢積塊先於塊上灸氣

浮腫之因

謂下焦溢為水註曰下焦為分注之氣化為水

脾肺皆屬脾主納寒熱氣所鍾聚也

謂之水註曰諸濕腫滿

浮腫

晚夕覺腹中響動是也

左壯神效○非葉許於足後第一

至左後跟中○往將此用三寸半灸左足大指處五分

則為者至陰也○問曰少陰何主腎者太陰以主水對
 曰腎者至陰也○問曰少陰何主腎者太陰以主水對
 者何冬以能聚水而從其類也○下者胃之積水也○問曰
 腎利何故聚水而從其類也○下者胃之積水也○問曰
 腫不附腫者聚水而從其類也○下者胃之積水也○問曰
 按之陷下者聚水而從其類也○下者胃之積水也○問曰
 閉塞三焦不瀉津液不化○穀陽行氣道不通四海
 于迴腸留于下焦不得滲勝則下焦脹胃之通則
 為水脹留于下焦不得滲勝則下焦脹胃之通則
 行故通身面目手足皆浮腫而皮薄閉滲道水漬妄
 窟舉手即滿是也或腹大如鼓而面四肢不腫
 者名曰脹○滿又名鼓脹○脾熱主四肢盛熱為病腫輕而
 張重也○脾熱主四肢盛熱為病腫輕而
 而加喘者制腎也○脾熱主四肢盛熱為病腫輕而
 若加喘者制腎也○脾熱主四肢盛熱為病腫輕而
 心火久勝肺何以為然○腎水故而身皆腫○脾主四肢盛熱為病腫輕而
 久喘久勝肺何以為然○腎水故而身皆腫○脾主四肢盛熱為病腫輕而
 浮腫微兆○諸有岐伯曰水腫者陰也○目下亦陰也○帝曰何至

陰腫之所居故水在腹者必使目下腫也○動喘疾○目裏
 水腫○起足脛腫○其曰水腫○動視之○脈動也○目裏
 垂起者風水大膚脹也○鼻動時咳之○其目窠上微壅而
 腰脊者身中之機關也○鼻動時咳之○其目窠上微壅而
 莖節喜怒不時津液內溢乃下流於道也○故飲通
 不節喜怒不時津液內溢乃下流於道也○故飲通
 日大不病榮然有也○翹翹
 不能此病榮然有也○翹翹
 浮腫形證○本病下為肺腫大腹腎為水腫呼肺為逆野者標
 五種○濕勝則濡泄自浮外證○骨節腫痛○惡風○有
 二日皮水○渴亦發汗○三腫○按之沒指○不惡風○外
 腹如鼓○不渴○亦發汗○三腫○按之沒指○不惡風○外
 證自汗○四曰石水○其脈沉遲○身熱自沉○外證○腹滿
 五日黃汗○其脈沉遲○身熱自沉○外證○腹滿
 不愈○必致癰膿○又藏水○心久水者○其肉潰爛○而少氣不得
 出○不愈○必致癰膿○又藏水○心久水者○其肉潰爛○而少氣不得

明朝內腹如傳為甜水上海陽按浮冷大苦者側時
寬令腹如石故又易身及體水成腫而臍重身脇頰
暮腹故石云石大便利飽勞○便房渴小便赤澁大
急漸不云石水者渴大○便房渴小便赤澁大
虛動亦不渴肺水者流溢水毒之氣結聚於
寬有聲常欲飲水皮毒之氣結聚於
朝急氣虛朝暮急血氣俱虛
○

脈法

者脈可得治諸微細當責有不可治身體腫重
生虛者死則宜○沉細則愈而脈復作○此陰脈也
水氣浮大則宜○沉細則愈而脈復作○此陰脈也
滑可安微細難療○陰水腫脈多沉伏○氣浮腫○
沉伏相搏必沉數病陰水腫脈多沉伏○氣浮腫○
虛陰實搏必沉數病陰水腫脈多沉伏○氣浮腫○

水腫治法

使通氣下肝木君蒼大矣陳宜補中茯苓黃芩麥冬
木通氣下肝木君蒼大矣陳宜補中茯苓黃芩麥冬
○治浮腫宜濕以辛散之謂之鬼門○潔淨以淡湯
上○治浮腫宜濕以辛散之謂之鬼門○潔淨以淡湯
謂發汗之氣滲透府經流注也○夫為腫之血亦
乃發汗之氣滲透府經流注也○夫為腫之血亦
因之而化水欲藉脾胃之氣以導之○氣以導之○
不知之病則金氣衰木寡於畏而氣以導之○氣以導之○
化之職得矣下法宜清心通經之敗濁之氣稍清者

水腫治法

二二三

身重

二二三

水腫

防己茯苓湯 治皮水 上體腫 赤茯苓 一錢 右剉作一黃芪

實脾散 治陰水 發腫 先實脾 土厚 朴白 木香 乾薑 炮

復元丹 能夫心腎真火 故土不制水 水液妄行 三焦不

香炒 兩肉 椒獨活 厚朴 白朮 略炒 橘皮 吳茱萸 桂心

使與造物同妙 當屏去諸藥 一日三服 且禁慾絕

導滯通經湯 赤茯苓 澤瀉 各二錢 陳皮 桑白皮 白朮

魯齋因霖 胃所傷 肢體浮腫 大便澹腹脹 腸鳴時

退腫塌氣散 治積水 驚水 或飲水 過多 積於脾 故各

分氣飲 治腫脹 喘急 桔梗 蘇子 炒 蘇葉 各一錢 草果 甘

葶藶丸 治肺氣 喘促 兩日 浮腫 葶藶 子防己 木通 杏

加味腎氣丸 治腎虛 不能行 水以致 浮腫 附子 炮

藥山 茱萸 杜仲 白茯苓 澤瀉 肉桂 牛膝 車前子 炒 山

黃米丸 治水蠱乾絲瓜一棒去皮剪碎和巴豆肉十粒水同炒以巴豆色黃為度去瓜朱為末水丸梧子大每湯下百九數服却愈蓋絲瓜如人豚米如絲瓜之每湯下百九數服却愈蓋絲瓜如人豚

漆雄丸 治水蠱真生漆一兩獨內熔化麻布絞去滓和丸梧子大每湯下百九數服却愈蓋絲瓜如人豚

三花神佑丸 治中滿腹脹喘淋開一切水濕浮腫腎丸錢治脾虛邪水注腰膝浮腫而痛甘遂生五

煨腎丸 治脾虛邪水注腰膝浮腫而痛甘遂生五

五皮散 治他病變作水腫浮虛大腹皮茯苓皮生薑

赤小豆湯 治年少氣血俱熱在瘡疥變為腫滿赤小

葶藶木香散 治水腫腹脹小便赤澀滑石三

大橘皮湯 治便濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利

十水證 一曰青水先從腰舌根起腫根在肝用葶藶子

二曰赤水先從腰舌根起腫根在脾用葶藶子

三曰黃水先從腰舌根起腫根在肺用葶藶子

四曰白水先從腰舌根起腫根在腎用葶藶子

五曰青水先從腰舌根起腫根在肝用葶藶子

腫起根在骨用澤瀉○八日高水先從小腹腫起根在

十水丸

或衰腸用巴豆○十氣水或盛
小腸根在大腸用赤小豆
腫起根在骨用澤瀉○八日高水先從小腹腫起根在

結陽證

散亦佳
生以赤茯苓湯吞下三九或五九二日○服神助
大以赤茯苓湯吞下三九或五九二日○服神助
氣衰少致邪代正氣不宣通故四維發腫諸陽受

犀角湯

草各五分芒硝麥門冬各四分
分右對作一服水煎服門冬各四分

氣分證血分證

氣分紅腫則曰血分皆宜桂枝湯所由也
氣分紅腫則曰血分皆宜桂枝湯所由也

桂枝湯

桂枝湯治血分桂皮赤芍藥當歸川芎赤芍藥蓬朮
皮甘草各五分一貼入薑五片水煎服

桂枝湯

皮甘草各五分一貼入薑五片水煎服

婦人產前後浮腫

詳見婦人門

不服藥自去水方

丹房奇術
丹房奇術
丹房奇術

丹房奇術

用新綿一片六錢上以餅掩之外用帛縛如人
行三五里許自然瀉下惡水待下三五次去藥以

粥補住醫○久患者隔日取水一餅爛臍上以

人帶○一治水盡商陸根赤者并爛臍上以

塗臍膏

治小兒便絕火地龍生研猪苓甘遂鐵砂

消河餅

治三錢右研成餅貼臍中以帕縛之少時尿

浮腫通治藥

飲沉加減香琥珀元三仁九椒豉元海金沙散

加減胃苓湯

治浮腫茶木瓜各一錢半陳皮澤瀉白朮赤

煎一團水

四苓五皮湯

治浮腫桑白皮陳皮地骨皮茯苓皮生

集香湯

治虛腫先用此以透開絡然後審證療之木

實脾飲

治水腫膨脹蒼朮白朮厚朴赤茯苓猪苓

沉香琥珀丸

治兩半琥珀杏仁蘇子炒郁李仁沉香各

三仁元

治各一兩右為末糊丸梧子大杏仁薏苡

良方集腋卷之六

二八

十九

椒鼓元治浮腫神方椒百一錢鼓二七粒巴豆一箇

下三九或五九以微注為度氣

海金沙散治脾濕太過腫脹喘急黑丑頭末一兩半

沙三錢右為末每二錢煎

一方治外腎腫大莖物調下鹽煎通明方木香流氣飲

效隨百粒

又方腫滿後作瘡或發水疱成瘡是脾土崩壞宜平

可治不治證以手浮腫細末清油調付濕則乾糝立愈

從上而腫下女從男從脚腫上腫而女久旋利腫退

陰而陽微妙如治此男從大脚虛腫先起於腹而後為

於四肢者可活先起於四肢而後歸於大便滑泄

心久瘡而轉作虛浮有青筋而腹滿而大便滑泄

證或肉硬或手足心平傷腎背平傷肺皆為不治之

腫凸出者死而或蒼黑者死○掌腫無紋者死○

盈凡腫行大喘氣腫者死○足跌○陰囊如斗者死

禁忌法凡水腫惟忌後宜以醋少許調和飲食不能為

蓋勿服藥果欲去病腫極忌甘藥助濕作滿刺犯

單方飲二氣散雞醴飲皮

宜病之流及水而死○凡水腫極忌甘藥助濕作滿刺犯

桑柴灰汁

桑柴灰汁 桑柴灰水 煎取汁 煮赤小

桑白皮

桑白皮 桑白皮 煎取汁 煮赤小

白朮

白朮 白朮 煎取汁 煮赤小

澤瀉

澤瀉 澤瀉 煎取汁 煮赤小

葶藶子

葶藶子 葶藶子 煎取汁 煮赤小

商陸

商陸 商陸 煎取汁 煮赤小

牽牛子

牽牛子 牽牛子 煎取汁 煮赤小

草麻子

草麻子 草麻子 煎取汁 煮赤小

郁李仁

郁李仁 郁李仁 煎取汁 煮赤小

鯉魚

鯉魚 鯉魚 煎取汁 煮赤小

蟻

蟻 蟻 煎取汁 煮赤小

桑柴灰汁

桑柴灰汁 桑柴灰水 煎取汁 煮赤小

桑白皮

桑白皮 桑白皮 煎取汁 煮赤小

白朮

白朮 白朮 煎取汁 煮赤小

澤瀉

澤瀉 澤瀉 煎取汁 煮赤小

葶藶子

葶藶子 葶藶子 煎取汁 煮赤小

商陸

商陸 商陸 煎取汁 煮赤小

牽牛子

牽牛子 牽牛子 煎取汁 煮赤小

草麻子

草麻子 草麻子 煎取汁 煮赤小

郁李仁

郁李仁 郁李仁 煎取汁 煮赤小

鯉魚

鯉魚 鯉魚 煎取汁 煮赤小

蟻

蟻 蟻 煎取汁 煮赤小

治下皆為末空

黑豆 酒治五升更煮取三升去滓分三服不差再合服

之

赤小豆 治水腫小豆五合葫蘆一頭生薑三錢並碎白

細色商陸一腹切同水煮豆爛湯成去葫蘆商陸只

冬瓜 水病初得危急服冬瓜不限多少任

苦瓠 煮治一淨者不爾有苦瓠須擇

雞屎 酒治三升氣腫濕腫皆效乾雞糞一升炒黃好清

作中 緞起其腫漸消病未盡再服一劑以田螺二枚

滾酒淖熟飲之即

青頭鴨 治十種水病垂死青頭鴨一隻治如食法和

水好而涼血故也利

蝦蟆 入其口腫鼓腹如神大蝦蟆一箇以縮砂七粒推

通紅烟盡取出候冷去泥研為末作

陳皮湯送下候撒尾多乃效雄豬肚內酒煮下其

腫脹滿癩將肚與酒食盡大便如雷或水

猪肝 蒜治浮腫脹滿猪肝一具細切以醋洗

獐肉 三升十種水葱薑豉作粥食之斤切作羹臠食之

治下皆為末空

三

鍼灸法

得四肢及面皆浮腫灸之水分氣海即消○水腫惟
鍼灸法得四肢及面皆浮腫灸之水分氣海即消○水腫惟
分如水不使妄行有人患水腫灸水分氣海即消○水腫惟
矣如劑

脹滿

脹滿之源

帝曰常然並馬生何因而有歧伯曰順陰陽相隨
乃得天和五臟更始四時有真邪相攻乃化然後
氣在下榮衛氣止寒氣逆上真邪相攻乃化然後
循分合為膚脹也榮氣循脈七情內傷六淫外侵飲食
失節房勞致虛脾土之陰傷轉輸之官失職不
受水穀不能運化故陽自升陰降而天地不
交之熱留於是清濁相混濕道壅塞氣化濁血滯
為熱熱留於是清濁相混濕道壅塞氣化濁血滯
其病膠固難治以療外故堅滿中空若虫侵似有蠱

脹滿形證

之義○飲食不節起居不時者陰受之
則入五臟○曰濁氣謂之寒氣也寒氣在
則成脹○曰濁氣謂之寒氣也寒氣在
亦腹脹○曰濁氣謂之寒氣也寒氣在
無陽則不能化五穀乃大寒為脹脾為
中寒則比水腫更難蓋水腫○凡脹初起是氣久則
成水治比水腫更難蓋水腫○凡脹初起是氣久則
不及常病根深痼必補中三行五年而後消導更斷
行濕足矣治根深痼必補中三行五年而後消導更斷
音樂妄想全不責速
效乃可萬全
水但腹支膈肢不其面
滿腹脹四肢不其面
○脹有虛實虛脹為邪利不食時乾常脹內痛
則陷而軟○實虛脹為邪利不食時乾常脹內痛
按之陷而軟○實虛脹為邪利不食時乾常脹內痛
實可下之○而腹硬脹時減復如故此為寒宜溫之○

東坡醫案卷之六

三十一

脈法

腹言須當不減不足
其脈大弦以濡者
脈則中實浮則可治
滿則遲或浮而數皆
則內脹或浮而數皆
而遲或浮而數皆
氣脹滿浮大而數皆
脹病有七

脹病有七

水脹是氣脹血脹
面黑是氣脹血脹
血鼓是氣脹血脹
厥冷瀉去清氣作酸
是酸飽悶腹脹是食
脹滿有塊如鼓者

寒脹

利者腹冷宜濡時減
成是痞散
熱者必陽并陰則陽
實陰虛則為熱陰虛
不能食是為行故

穀脹

飲者食如故腹中脹
滿者為熱脹中脹
能食者為寒脹中脹
不能食者為行故

水脹

脾土受濕水漬於
腸胃而溢於皮膚
水脹身腫有聲怔忡
喘息是為水脹下
氣脹身腫有聲怔忡
喘息是為水脹下

血脹

多煩燥便溺黑入
驚狂有痛是為血
脹小難便
血脹多煩燥便溺黑
入驚狂有痛是為血
脹小難便

脹滿治法

而熱脹少也
必須遠音樂
必須遠音樂
必須遠音樂
必須遠音樂

胃中不和

三三

行利藥以求一時之快殊不知寬得一日半日其
脹愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不得遠此病之起
固非與語此也○九腹脹須用薑製厚朴初得
者可與語此也○九腹脹須用薑製厚朴初得
是氣脹久則成水腫宜行氣導之劑香檳榔枳殼青皮陳
皮之類久則成水腫宜行氣導之劑香檳榔枳殼青皮陳
茯苓澤瀉石澤瀉○之類○腹○肥人腹是熱宜茯苓連梔子厚
○中滿比人稍輕虛宜人腹是熱宜茯苓連梔子厚
○有穀脹水脹氣脹血脹
穀脹宜雞矢醴散
又有穀脹水脹氣脹血脹
穀脹宜雞矢醴散

雞矢醴散治穀脹朝食則不能暮食又治氣脹水脹
為末每二錢薑湯調服○者大黃挑仁各等分右
黃細末百沸湯三升服以
平為期各名曰雞矢醴飲以

六異香散治穀脹亦治氣脹三稜蓬朮青皮陳皮藿
蘇甘草二分半右煎服

水脹宜防已椒蘆丸治水脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃
香散椒蘆丸

防已椒蘆丸治水脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃
各一兩右為末蜜丸梧子

木香散治水脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃
熟空細嚼溫酒送下如未全愈則於肚上滿塗

氣脹宜三和湯治氣脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃
草湯則便去飲甘

三和湯治氣脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃
擯榔紫蘇葉各七分半白朮陳皮厚朴各一錢

三和湯治氣脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃

和殼海金沙甘草各五分右剉作一餅

氣鐵元專治氣膨薑黃青皮各一兩木香丁香胡椒

爛子和勻用紅酒生薑汁各少許煮糊和

金蟾散治氣鼓如神大蝦蟆一箇以縮砂推入其口

或陳皮湯調下候泥細研未為一服或酒

血脹宜入參芍歸湯挑奴丸

人參芍歸湯治血脹是瘀血凝聚成脹滿也川芎二

烏藥甘草各一錢八參桂皮五靈脂各五分

散血消腫湯治血脹同而無烏藥有芍藥耳

挑奴丸治血壅病同挑奴丸鼠糞玄胡索肉桂香附子

五靈脂或縮砂桃仁各等分右為末每三錢溫酒調
寒脹宜中滿分消湯厚朴橘皮煎
中滿分消湯治中滿赤茯苓升麻各七分半川芎人參
青皮當歸柴胡各五分薑乾薑華澄茄黃連黃芪吳茱
萸草豆蔻厚朴各五錢右剉作一餅

溫胃湯治胃氣虛冷厚朴人參陳皮甘草灸當歸各

一錢二分半川椒炒厚朴一錢

順氣木香散治寒脹心腹刺痛面黃氣瘦或泄瀉

桔梗茵香炒蒼朮炒各一錢甘草灸五分右剉作

一貼入薑三棗二水煎服或為末鹽沸湯點服

厚朴橘皮煎治傷冷腹脹如覆拷喘息奔急

厚朴三兩枳殼乾薑良薑各一兩二錢

二錢

三十五

消湯四聖丸木香檳榔元四炒枳殼元九木香
分氣九消脹元木香檳榔元四炒枳殼元九木香

半夏厚朴湯通治六分蘇木紅花各五分錢厚朴八分神
猪苓升麻各四分肉桂蒼朮白茯苓澤瀉柴胡陳

皮生黃芩草連乾生薑各一分桃仁
分吳茱萸少許右剉作生薑各一分桃仁

廣木潰堅湯便治中滿腹脹一貼水煎服
智仁草豆蔻當歸各七分陳皮青皮神翹澤瀉柴

胡甘草各五分蓬朮升麻吳茱萸各三分紅花二
滿減半止有積塊乃服半煎服此藥中

濟生紫蘇子湯治憂思傷脾心腹膨脹喘促背滿
二錢蘇子人參各一錢大腹皮草果一貼入薑三片

香陳皮枳殼甘草各五分右剉作一貼煎服
煎服二枚水

大正氣散治風寒暑濕所傷成脹滿白木檳榔各七分
桂枝乾薑甘草各五分煎服

四香散治脾氣血香乳香甘肅水蠱石蠱腫脹似
陳皮人參白朮各五兩右為細末每二錢薑縮米飲調下

撞關飲子治脹滿用此衝開格使一錢自消香附子
三錢白豆蔻三草各五分丁香沉香各三錢調下

沉香飲治腹脹氣喘坐卧不得藟藟子炒研二錢沉
水煎服

分消湯治中滿成鼓脹滿悶痞未白米陳皮厚朴枳
實茯苓各一錢香附子猪苓澤瀉大腹皮

本草綱目卷之六

三十一

各八分縮砂六分木香三分右煎

四聖丸 治小兒心腹虛脹全蠲炒一兩和作胡椒木香青

木香檳榔丸 治腹脹通利大便神效小使下濕痰凝滯則

四炒枳殼丸 治氣血凝滯成脹積聚枳殼米泔浸

木香消脹元 治腹脹通利大便神效小使下濕痰凝滯則

取汁好醋末用一椀打麩糊和丸梧子大米飲下七九

木香分氣丸 治脾胃不和腹脹膨脹痰嗽喘急飲食

消脹元 治腹脹通利大便神效小使下濕痰凝滯則

木香消脹元 治腹脹通利大便神效小使下濕痰凝滯則

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

五錢木香二錢半右為末麩糊和丸梧子大

麩糊和九桂皮丁香各三錢七分五十九為末
濁氣在上則生臌脹在內經曰清氣在下則生飧泄濁氣

寒在上焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而為
脹滿○一焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而為
脹滿○一焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而為
脹滿○一焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而為
脹滿○一焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而為

木香順氣湯

厚朴白茯苓陳皮各六分半夏各一分
柴胡五分甘草益智仁吳茱萸各三分
○經曰留者行之結者散之氣運以柴胡升麻
行少陽陽明二經發散清氣運以柴胡升麻
薑半夏厚朴木香蒼朮青皮之辛甘大熱消散中寒為
臣以厚朴木香蒼朮青皮之辛甘大熱消散中寒為
當歸人參陳皮之陰茯苓甘草調理榮衛滋養中氣
之薄者湯中陰茯苓甘草調理榮衛滋養中氣

陰之氣自天而下故以為佐濁氣不降以苦泄之
吳茱萸苦熱泄之使清濁

吳茱萸湯

一薑各一錢白朮陳皮不飲吳茱萸厚朴官桂乾
薑各一錢白朮陳皮不飲吳茱萸厚朴官桂乾
薑各一錢白朮陳皮不飲吳茱萸厚朴官桂乾
薑各一錢白朮陳皮不飲吳茱萸厚朴官桂乾
薑各一錢白朮陳皮不飲吳茱萸厚朴官桂乾

沉香交泰丸

錢白茯苓澤瀉當歸木香青皮各八錢右為末
湯浸蒸餅和丸梧子大溫水下一錢丸
傷寒熱病腹脹滿寒詳門見
傷寒熱病腹脹滿寒詳門見
傷寒熱病腹脹滿寒詳門見
傷寒熱病腹脹滿寒詳門見
傷寒熱病腹脹滿寒詳門見

脹滿乃真臌病也

真臌不病則五行相生相制以適於平雖不服藥
而自愈如火極傷金則有水以制之有土以生之
如木極克土則有金以制之有火以生之所謂亢
則害承迺制也雖然亦有惡藥忌醫而誤之所謂亢

正氣而與病邪不相兩立一勝則一負久則病劇正

脹滿泄瀉為腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃

外敷法宜治積聚脹滿血盡等病

外敷神膏每大黃朴硝各四兩麝香一錢為末

外敷藥大戟荒花甘遂海藻等分為末醋調遍塗腹

可治不可治證脹滿得之未久或脹或消腹皮稍軟不

○腹脹身熱喘大息不得安名曰腹鳴而滿四肢

清泄其脉大是二逆也○腹脹便血其脉大時四末清脫形也
甚是不治○腹脹便血其脉大時四末清脫形也
並下泄○腹脹便血其脉大時四末清脫形也
而可治心突起或下利頻頻未見一愈者耳
單方四種

厚朴治腹脹乃結者散之神藥也

大戟治大脹取大戟不用旋斗置鍋內與大戟同煮熟

鷓鴣屎即治腹脹○雷公屎必黃色作末每錢溫水調下

蝦蟆新治蓋脹取焦乾為末糊丸酒服

雞屎黃湯漬之取清汁服之

厚朴同煎服者蓋其味辛能散以氣聚上焦故也

黑豆 下和桑柴灰汁煮服

赤小豆 水煎作粥常服

紫蘇莖葉 飲心如腹脹滿作

蔓菁子 治心腹脹取一合搗爛水一升和研取汁

蘿蔔子 治腹滿取子研水煮如茶常服亦佳

大麥麵 治腹脹常食最好

桑枝茶 下氣消脹常服亦良

烏牛尿 治久患氣脹取尿空服

椒目 治水腫能行水之末

鍼灸法 上腹中左各取二寸二分

八二寸半或灸五壯
九脹皆取三里是脈之要穴也
或鍼或灸

消渴

消渴之源 內經曰二陽結謂之道

膏熱瘴入兩不也皆血液手
梁中成間治嗽燥中不陽
之為肺二治嗽燥中不陽
疾多食消久有也熱伏足明
也數中久斜也熱火也大
此洩註傳化膜心移熱於燥
人謂曰化膜心移熱於燥
因之瘴謂曰化膜心移熱於燥
數消謂曰化膜心移熱於燥
食中消謂曰化膜心移熱於燥
甘納熱病也渴而多飲
美○病也渴而多飲
而凡消瘴肥其貴氣上則

生津養血湯黃芩湯皆治上消○中消者善食而
 瘦自汗大便硬小便利散三黃丸成○中消者善食而
 調胃承氣湯甘露湯順氣散入參散耳連猪肚丸香
 飲子生津可用○下消者煩燥引飲者焦乾小便
 如膏腿膝枯細所謂焦煩燥引飲者焦乾小便
 黃丸主之○九補腎地黃元鹿茸九○八味元地
 火生血烏宜分上中下治之○三消多屬血虛
 不生津液以四物湯下之○主消多屬血虛
 五味子麥冬天花粉煎○牛乳汁生地黃汁生
 藕汁酒客生葛根汁調服○中消加知母石膏寒
 水石滑石○下消加黃柏知母熟地黃五石膏寒
 氣丸○主消病小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎
 主氣丸○主消病小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎

加味錢氏白朮散 治消渴不能食又治消中善飢乾
 草各一分錢木香柴胡枳殼五味子
 各五分右剉作一貼水煎服

麥門冬飲子 治肺消麥門冬二錢知母天花粉一錢
 葉十片作一貼水煎服

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消
 黃芪蜜炒五錢入棗二水煎服

入參石膏湯 治肺消七分甘草一錢知母二分右剉作一貼

清心蓮子飲 治心火上升口乾煩渴小便赤澀蓮子
 前子炒麥門冬錢赤茯苓入參黃芪各一錢黃芩車
 七分右剉作一貼水煎服

和血益氣湯 治酒消渴小便便數舌上赤脈肌體枯瘦黃
 活酒洗各五分當歸稍四分柴胡麻黃根生甘草

東醫寶鑑卷之六

草各一分紅花少許右

生津養血湯

治上消當歸白芍藥生地黃麥門冬各一錢川芎黃連各八分天花粉七分知

黃芩湯

治上消片芩一貼烏梅煎荷甘母黃相並蜜炒蓮肉一貼水煎眼甘

蘭香飲子

治消渴善食而瘦二便結數石膏三錢知參蘭香葉連翹白豆寇桔梗升麻各五分半夏二

生津甘露湯

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

順氣散

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

人參散

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

黃連猪肚丸

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

藕汁膏

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

取徐徐

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

湯送徐徐

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

取徐徐

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

湯送徐徐

治消中飽食而瘦大便燥小便數石膏知母酒蒸已生地黃生甘各三分杏仁升麻四

四三

四三

取徐徐

四三

四三

人參茯苓散 治腎消尿濁如膏滑石寒水石各一錢
黃各五分連翹三分人參白朮澤瀉桔梗子天
花粉縮砂各二分右到作一貼水煎服

加減腎氣丸 治腎消口燥煩渴兩脚枯瘦熟地黃二
鹿茸山藥各一兩肉桂沉香各五錢右為
末蜜丸梧子大空心鹽湯下七八十丸為

補腎地黃元 治腎消能降心火益腎水止消渴明耳
斤酒浸二日蒸爛一斤剉同地黃曬乾生地黃半
兩熟地黃天門冬入參甘菊各二兩條乾白茯苓四

鹿茸丸 治腎虛消渴小便無度麥門冬二兩鹿茸熟
水丸梧子大空心鹽酒下七八丸為末

山菜地黃破故紙炒五錢石為末蜜丸梧子大空心

食併證 內經曰大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食併
易而過不生肌膚也
治法與消中同

消渴小便甜 推之者淋虛所致每發則小便必甜以物
人之食後滋味皆甜流入骨髓其若腰腎氣盛則上

蒸化穀氣盡則為小味故味甘不
蒸其色清冷則肌膚枯槁也

消渴由坎火衰少 潤肺為五藏華蓋若下有煖氣蒸則肺
湯易乾上坤下其卦為否陽無陰不降陰無陽不

升此煖氣上騰故板能潤者腰腎強盛常須煖補腎

良醫堂蓋非尋常

四十五

消渴與脚氣相反
氣飲宜服八味則腎氣上而易消亦免乾渴
之患
五六月衰於七八月消渴始發於七月八月盛於十月
消渴宣疾也春夏陽氣上故壅疾發則壅疾愈審此二者疾可理
冬陽氣下故宣疾發則壅疾愈審此二者疾可理

消渴通治藥
滋陰養榮湯
滋陰養榮湯治消渴亡津液口燥咽乾當歸二錢人
母黃柏並黍黍水炒各一錢甘草五分
味子十二粒右剉作一貼水煎服

滋陰養榮湯
滋陰養榮湯治消渴亡津液口燥咽乾當歸二錢人
母黃柏並黍黍水炒各一錢甘草五分
味子十二粒右剉作一貼水煎服

活血潤燥生津飲
通治消渴天門冬麥門冬五味子
黃天花粉一貼甘草各一錢
右剉作一貼水煎服

桑白皮湯
治三消渴疾童根桑白皮
草五分右剉作一貼水煎服

梅花湯
治三消渴利神效糯穀旋炒作曝桑根白皮
厚者細切各五錢右作一貼水煎渴則飲之
不拘時

大黃甘草飲子
治一切消渴大黃一兩半甘草大者
右用井水一桶同煮爛令病人
食豆飲汁無時不三劑病去

清神補氣湯
消渴證纔愈止有口乾此藥主之升麻
泥各一錢黃柏酒洗柴胡當歸身荆芥穗防己桃仁
分石膏熟地黃各四分生地黃細辛各二分杏仁

東醫寶鑑
消渴通治藥
滋陰養榮湯
活血潤燥生津飲
桑白皮湯
梅花湯
大黃甘草飲子
清神補氣湯

黃芪湯

六箇川椒二粒紅花少許右剉作一貼水煎服
治諸渴生乾地黃二錢黃芪茯苓神天花粉麥門冬各一錢五味子甘草各五分右剉作一貼

天花散

治消渴天花粉生乾地黃各二錢乾葛麥門冬五味子各一錢甘草五分右剉作一貼

黃連地黃湯

治三消黃連生地黃天花粉五味甘草各一錢右剉作一貼

生地黃飲子

治消渴人參生乾地黃熟地黃黃芪天冬麥門冬枳殼石斛一錢五分右剉作一貼
此方乃二黃元合甘草五分右剉作一貼
渴利肺經潤澤則天府流暢宿熱既消其渴自止

造化精深妙無喻此

門冬飲子

治老虛人消渴麥門冬二錢五味子一錢右剉作一貼

玉泉散

治消渴之聖藥天花粉二錢右剉作一貼

玄菟丹

治三消渴利神藥禁遺精止白濁延年菟絲子三十兩酒浸製五味子七兩茯苓蓮子肉所浸酒煮糊和丸梧子大空心米飲下五七十九丸亦煉蜜和

三消丸

治消渴黃連淨為細末不以多少冬瓜搗丸取自然汁和作餅陰乾再為末再浸乾至七次即下五七十九丸

東醫寶鑑卷之六

四十一

一貼入薑五

五豆湯

以水五斗五升臘八日初八明大鍋熬至熟濾去滓盛磁器封口春夏月開用隨意飲之大人湯後生倉最妙酒

朱砂黃連元

後湯尤好酒 朱砂一兩右為末蜜丸梧子大燈心

蟲渴

苦練湯

成消渴宜苦練湯 治虫渴苦練根皮一握切焙入麝香少許水

強中證

飲多因耽嗜色慾或服丹石真氣既脫熱邪獨盛

石子薺芫湯

方盛不交精泄三消之中最為難治 治強中證薺芫石知母乾葛黃芩甘草各

黃連猪肚丸

兩麥門冬二兩右為末入猪肚中封口安甌中蒸爛搗爛作丸梧子大米飲下 九中封口安甌中蒸

消渴傳變證

潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯 點觀主之或加減白虎湯不飲食而渴者錢氏白

平不復傳下消矣

四十九

火邪勝也其瘡痛甚而消不潰或赤水者是也未傳
 中滿者何也如瘡上消中消不制之太急寒傷胃久
 而或中滿之疾所謂上熱未除中寒復生也明
 消渴久而病變成痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲
 消渴甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹為腫滿而證火自
 炎留於分肉則發為痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲痲
 者制也水液故隨飲者謂隨飲也小便也其內熱故小便
 能制水液則津液竭即熱氣留滯故成痲痲痲痲痲痲痲痲
 小便利則津液竭即熱氣留滯故成痲痲痲痲痲痲痲痲
 衛不行則津液竭即熱氣留滯故成痲痲痲痲痲痲痲痲
 加減白虎湯 石玄膏二錢半知母五分一錢人參黃耆各七
 百粒水煎服 粳米
 加減白朮散 乾葛二錢人參白朮各五分茯苓各一錢木
 香知母黃柏甘草各五分五味子九粒
 右對作一貼 水煎服 醫一貼
 消渴須預防癰疽 消渴之入常須慮患大癰之宜於骨節
 加減

忍冬元 花葉皆可用右對酒浸糠火煨不以多小根莖
 乾入甘草少許搗為末以所浸酒亦能止渴
 大酒飲任下百丸此不特治癰疽亦能止渴
 不治證 內經曰肺消者飲一澗而津液不治蓋肺藏氣肺
 筋者亦隨澗下故飲一澗而津液不治蓋肺藏氣肺
 微者亦隨澗下故飲一澗而津液不治蓋肺藏氣肺
 脫未不能榮養故漸形瘦焦乾也或問云飲一澗未
 二死不能榮養故漸形瘦焦乾也或問云飲一澗未
 至洩二者病尚淺復用八味丸治之何也曰飲一澗未
 一升小便亦病尚淺復用八味丸治之何也曰飲一澗未
 矣○消渴之餘傳為脹滿發
 烏癰疽及強中證皆不治
 加減八味元 渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加止
 服八味元黃芪六一散湯煎觀井水調服
 加減八味元 渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加止
 忍冬元 花葉皆可用右對酒浸糠火煨不以多小根莖
 乾入甘草少許搗為末以所浸酒亦能止渴
 大酒飲任下百丸此不特治癰疽亦能止渴
 不治證 內經曰肺消者飲一澗而津液不治蓋肺藏氣肺
 筋者亦隨澗下故飲一澗而津液不治蓋肺藏氣肺
 微者亦隨澗下故飲一澗而津液不治蓋肺藏氣肺
 脫未不能榮養故漸形瘦焦乾也或問云飲一澗未
 二死不能榮養故漸形瘦焦乾也或問云飲一澗未
 至洩二者病尚淺復用八味丸治之何也曰飲一澗未
 一升小便亦病尚淺復用八味丸治之何也曰飲一澗未
 矣○消渴之餘傳為脹滿發
 烏癰疽及強中證皆不治

禁忌法內經曰熱中消中不可服膏梁芳草石藥○消
能慎此三者雖不服藥亦可自愈○凡消渴大
忌飲酒房事及食炙燥辛熱鹹藏之物○凡消渴以
而不可飲○鍼灸則瘡中出膿水不
單方十種

石膏和粳米煮取汁飲之

竹葉煮汁飲之

滑石調下即益元散也一名神白散

地漿一治熱渴心悶

竹瀝公治消渴不拘時宜飲之

麥門冬去心煮湯飲之

黃栢主消渴水煎服之
黃連末消渴九白湯下
黃芪而後消渴宜多取黃芪煮湯服之
葛根又主消渴取生者搗汁飲之
瓜蒌根即天花粉也治消渴之甚佳藥也
漬芋汁煮取汁飲之
地骨皮取葉作飲之
蚊蛤即末沸湯調下
忍冬草汁四時長服
桑枝茶常服為佳

桑根白皮 主熱渴 水煎飲之 〇黑椹 搗去滓 入石 器中 入蜜 熬膏 每取二 匙 沸湯 點服 止

神渴生精

牡蠣肉 治酒渴 和薑醋 生食 或石 花 鞋

蚌蛤 薑醋 生食 並佳 鞋

鮎魚涎 主三消 湯下 五十九 黃連末 作丸

田螺 水飲之 渴小 便數 取螺 五升 水一 斗 浸經宿 取

生藕 分取三 服一 盞 入蜜 一 晒合

紅柿 啖之 渴取

烏梅 療和 少乾 常消 渴作

梨 啖之 最治 心熱 渴常 鞋

獼猴桃 止消渴 取霜後 熟者 常啖

五味子 止消渴 久服 生津 止渴 鞋

麻仁 三消 渴取 汁溫 涼任 服鞋 水

粟米 泔飲 之者 止消 渴甚 良常 取

菘豆 研取 汁服 並佳 鞋 或

青粱米 主消渴 或煮 粥或 作飯 常食 佳鞋

糯米 差為 度淘 糯米 稗灰 淋汁 飲之 甚妙 一入 病渴

中殆 燒作 灰每 取一 合湯 水一 掬沃 浸良 久澄 去滓

冬瓜 取清 漿如 神飲 之即

又主 三消 渴糞 作糞 常食 佳鞋

本草綱目卷之六

五十二

尊主消渴作羹作

菘菜或取汁飲亦可

雄雞湯之治三消渴疾退雄雞湯登清飲

白鵝汁主消渴煮取

黃雌雞主消渴煮取汁

牛乳又作酪粥常食亦佳

猪肚薑醋食之

黃疸

黃疸之因

便自利蓋熱結下焦則熱但耗血不耗津液故小便不利

○發黃譬如面黃目暈及瓜甲身熱蓋濕熱熏蒸也

○食勞疸者濕熱與宿穀故也俗謂之食勞黃

○八日為期食勞黃者夫宿病也至有久不愈

○凡病當汗而食勞黃者則生黃當利小便而

○主濕熱與內熱相合故

○利亦生黃蓋脾是濕熱終無寒熱之異

○渴飲水不得小便屬黃家必發黃時行感胃及伏暑未

○解宿食未消皆能發黃○凡時行疫癘亦能發黃

○太過氣不往及故多變此疾太

○黃疸有五身痛而色微黃齒垢黃瓜甲上黃皆黃疸也

○黃赤也○尿黃赤安臥者曰黃疸二日酒疸三日穀疸

○四日女勞疸

○五日黃汗

東醫寶鑑卷之六

五十三

足腫滿面黃赤斑
黃黑者酒疸也

黃疸者小便黃赤如金因暴熱用冷水洗浴
但欲安臥小便如黃
熱留胃中故食已善飢安臥動則熱用冷水洗浴

酒疸也酒疸心懊憹或熱中欲吐名曰酒
疸也酒疸心懊憹或熱中欲吐名曰酒疸

穀疸也穀疸之為病寒熱不食已頭眩腹脹因胃熱久
穀疸之為病寒熱不食已頭眩腹脹因胃熱久

女勞疸便溺自利黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小
便溺自利黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小

黃汗如黃汗之病身腫黃汗如黃汗之病身腫黃汗如黃汗之病身腫
如黃汗之病身腫黃汗如黃汗之病身腫黃汗如黃汗之病身腫

脉法五疸實熱脈必洪數其或微澁證屬虛弱
五疸實熱脈必洪數其或微澁證屬虛弱

黃疸治法○諸疸小便赤色者為濕熱當作濕熱治之
○諸疸小便赤色者為濕熱當作濕熱治之

小半黃湯治黃疸小便世不果
欲自利腹滿而喘者不可除熱
必噦方○半復生薑各半斤石
二味以水七升煎取一升五合
分再服有人常積氣結而死其
心上煖以此湯少許入口遂活

為積者則出滲利重則大黃相汁退矣
○黃疸與濕病相
積者則出滲利重則大黃相汁退矣
○黃疸與濕病相

黃連散治黃連散治黃連散治黃連散治黃連散治黃連散治黃連散
治黃連散治黃連散治黃連散治黃連散治黃連散治黃連散

麻黃醇酒湯治黃疸麻黃醇酒湯治黃疸麻黃醇酒湯治黃疸
治黃疸麻黃醇酒湯治黃疸麻黃醇酒湯治黃疸麻黃醇酒湯治黃疸

東醫圖書集成卷之六
五十五

黃疸宜茵陳五苓散加減茵陳湯三物湯陶

茵陳五苓散為治濕熱黃疸茵陳一兩五苓散五錢右煎服亦可

茵陳三物湯治黃疸小便不利茵陳三錢煎服之

陶氏茵陳湯治黃疸熱盛大便不利茵陳二錢甘草各一錢右煎服亦可

加減胃苓湯治黃疸飲食無味行步倦怠脈濡而濡

茵陳散治濕熱黃疸茵陳厚朴滑石各一錢右煎服亦可

山楂子羅菖子三稜蓬朮青皮各五分

茵陳散治濕熱黃疸茵陳厚朴滑石各一錢右煎服亦可

燈心一厘同煎服

酒疸宜半溫半熱湯後犯房成疸宜葛朮湯酒蒸黃連

半溫半熱湯治酒疸大戟廿草各七分黃芩當歸茵陳

梔子大黃湯治酒疸一合右判作二錢水煎服

葛朮湯治酒疸葛根一合右判作二錢水煎服

當歸白朮湯治酒疸有飲癖心青堅滿不進飲食小

前胡茵陳各五分甘草各一錢半夏七分當歸黃

穀疸宜茵陳湯小溫中茵陳湯牛黃散子紫金

茵陳梔子湯治實各一錢茵陳三錢大黃二錢煎服

茵陳湯治穀疸茵陳三錢大黃二錢煎服

東醫圖書集成

五十五

牛黃散子

治穀疸酒疸及水氣蠱脹黑丑頭末春
分夏九分秋四分冬七分
秋七分冬四分
南并華水調服每服三錢五分夏九分秋七分冬八分

穀疸丸

治暑熱食穀不消熱鬱發黃苦參三兩
末牛膽汁一兩入參七錢半以仁五錢右為
飲下五錢

小温中丸

治積疝白朮三兩山楂肉毒皮蒼朮神
右為末醋糊和丸梧子大空心鹽湯下
八十九丸

大温中丸

治陳皮黃疸黃腫香附子一兩半錢砂
參白朮各五錢生甘草二錢製法服法同
借此為制肝燥脾之用○鐵砂代以青礬亦妙

鐵砂丸

治兩香附子童便製蒼朮各四兩神麴炒茵
八兩

藤薑汁炒麥芽炒各二兩考藥當歸生地黃川芎
青皮各一兩半三稜蓬木並醋煮陳皮各一兩
醋炒和九梧子大薑湯下六錢右為末

紫金丹

治食勞氣通身黃腫欲變成水膽礬入好
醋三升先下二時如膏入臘茶末二兩和丸
每服二錢無膽礬用綠礬○一礬入患酒疸下
妙服○無膽礬用綠礬○一礬入患酒疸下

女勞疸宜礬散石膏湯

宜礬散石膏湯
礬散石膏湯
宜礬散石膏湯

石膏散

治女勞疸身黃額黑日晡發熱小腹急足下
熱石膏煨滑石各等分右為末每二錢大麥

下粥飲調

秦艽飲子

治女勞疸秦艽當歸芍藥白朮桂皮赤茯苓各五分右剉作一貼煎服

腎疸湯

治腎疸目黃尿赤蒼朮一錢升麻羌活防風各二分右剉作一貼煎服

黃汗

宜黃芪湯桂枝黃芪湯

芪陳湯

治黃汗石膏二錢黃芪赤芍藥茵陳麥門冬各一錢右剉作一貼煎服

桂枝黃芪湯

治黃汗黃芪二錢半桂枝芍藥各一錢右剉作一貼煎服

枝湯煎服

一名黃芪散

初服當心煩也至二七日稍自除心煩者苦酒阻也

千金云治諸病黃疸宜利小便假令脈浮當以汗解方○右方加薑棗水煎溫服發微汗須臾不汗者飲稀熱粥以助湯

酒疸最重

性量不同惟酒疸變證最多蓋酒之為物適亂已溢于皮膚為黑為腫流於清氣道中則眼黃

黑疸難治

脾與腎俱病為黑疸時當發熱而反惡寒此為女勞因得之癆腹脹如小腹痛大便黑或時下大便正

陰黃

治陰黃身面俱黃肢體沉重背寒身冷心下痞硬也或過太陽入六方及茵陳附子乾薑湯

中茵陳湯亦效

黃疸難治

五十二

茵陳茯苓湯治陰黃小便利不利煩燥而渴茵陳三錢

服一錢煎

茵陳橘皮湯治陰皮黃白未生薑半夏茯苓各一錢也湯加

茵陳附子湯治陰子黃乾肢體逆冷自汗茵陳一錢也湯加

茵陳四逆湯治陰子黃乾汗不止茵陳一錢也湯加

茵陳薑附湯治陰子黃乾汗不止茵陳一錢也湯加

茵陳吳茱萸湯治陰子黃乾汗不止茵陳一錢也湯加

茵陳附子乾薑湯治陰子黃乾汗不止茵陳一錢也湯加

茵陳附子乾薑湯治陰子黃乾汗不止茵陳一錢也湯加

夏澤瀉各五分白朮四分茯苓煎各三分右剉作一貼薑五分水煎

疫癘發黃天行疫癘亦能發黃謂之瘟黃殺人最急

瘴疸丸治天行瘴毒亦能發黃謂之瘴疸

茵陳瀉黃湯治時氣發熱變為黃疸所謂瘟黃葛根

赤茯苓白芍藥厚朴木通人參各一錢煎赤茯苓白芍藥厚朴木通人參各一錢煎

濟生茵陳湯治時行熱鬱通身發黃茵陳四錢煎

苦參散治人無故忽熱除寒皮黃麴塵出小便赤澀

苦參黃連米飲調服苦參黃連米飲調服

茵陳瀉黃湯

茵陳瀉黃湯

搗鼻退黃法 凡黃疸由濕熱毒氣侵入清氣道中宜納藥鼻中滴出黃水即愈宜搗鼻瓜蒂散如

神散

搗鼻瓜蒂散 治黃疸身如金色瓜蒂二錢丁香一分

臨時先含水一口却於兩鼻孔搗半字便睡不可明取下黃水便服黃連散或茵陳五苓散慎不可

吹入

如神散 治酒毒發黃苦梔子苦葫蘆子各三七箇黃

字搗入鼻中滴盡黃水若過多則以黍稷燒灰麝香末各少許搗入鼻中立止

黃疸通治藥 黃疸之疾脾胃受濕熱毒而不行亦多有腹

中宜胃苓湯之候治法大要疎導濕熱於大小便之散一清飲石膏茵陳散茵陳大黃湯必效散退黃

九綠菴丸並可燒棗

茯苓滲濕湯 治濕熱黃疸茵陳二錢赤茯苓澤瀉猪

不陳皮青皮枳實各五分右判作一

退黃散 治黃疸身面如金小便如黃柏汁柴胡升麻

各一錢甘草五分右判作一

一清飲 治黃疸柴胡三錢赤茯苓二錢川芎桑白皮

各一錢甘草五分右判作一

石膏茵陳散 治黃疸一身皆黃食已即飢石膏二錢

分瓜蒌實一箇右判作一

茵陳大黃湯 治傷寒大熱發黃疸茵陳子柴胡五分

右對作一貼

水煎服法

必效散

黃疸通用葶藶子炒草龍膽子煎黃芩各

退黃丸

治黃疸入陳黃腫四升醋等青礬二兩鍋內

生冷

每胃散六兩同炒少頃去火毒烏糯米醋糊丸

銅之精

液用醋製以平肝愈於鐵砂丸也服鐵砂必

綠礬丸

治黃腫病最捷五倍子炒黑神麴炒黃各八

不飲酒

米飲下終身食蕎麥麩犯之再發難治

褪金丸

治黃腫絕妙砂煨紅醋香附子便浸各

大一兩

飲下五七十九忌魚腥濕麩生冷和九有

醋加三稜蓬朮並
塊煮各一兩半
棗子綠礬丸治厚黃疔陳皮神麴各煨紅醋淬綠礬炒蒼
為末蒸棗肉和九梧子大米飲下五七九
切忌蕎麥羊肉母猪肉食之惡死無醫

疳癖愛喫土炭生米茶葉

治宜用四方寶丹及

四寶丹

治黃病喫生米茶葉黃土黑炭等物食生

製各一兩

星薑製各一兩者茶葉一斤使君子肉二兩

君肉二兩

使君子肉二兩薑製各一兩者茶葉一斤使君子肉二兩

黑炭一斤

使君子肉二兩薑製各一兩者茶葉一斤使君子肉二兩

晨砂末

下蜜丸梧子大早

一方

治黃疸愛喫星陳皮各一兩薄荷七錢石膏白砂

糖水

煮神麴作糊和九子大

砂糖水

煮神麴作糊和九子大

本草綱目卷之六

二十一

六

一方治黃疸喜喫生米白米一錢半蒼木一錢三分

一方治白芍藥陳皮神麴麥芽山楂肉白茯苓石膏各

一斤炒過○契用麥芽一斤炒過○契用茶葉一兩

一斤炒過○契用麥芽一斤炒過○契用茶葉一兩

一斤炒過○契用麥芽一斤炒過○契用茶葉一兩

可治不治證黃疸之病當以十日為期治之不渴者可

治人振寒而發熱難於陰部其人必嘔發於陽

無脈口鼻冷絕色並不可治○形體如煙直

視搖頭為心絕口並不可治○形體如煙直

煩渴面黑者死○八日為期十日更斷厚味則可治

病傷酒色黑黃作渴腹者難治○實更斷厚味則可治

單方酒煮茵陳湯

臘雪水溫飲之

車前草取汁服之

茵陳蒿亦良○通身發黃小便赤以水煎服名酒煮

葛根取酒煎服

瓜蒌根水煎服

酸漿草取汁飲之

萱草根又主嫩苗煮食

王瓜根心酒服一變小升當有黃水隨小便出取汁空

服 千金作土瓜根先酒量病人
力不得多服力乘則起不得

青蒿 取汁熱飲之 痛搗

篇蓄 頓服熱黃搗取汁

黃蘗 煎服黃疸水

梔子 水煎飲之 食疸

小麥苗 服治酒疸 搗取汁 千金云絞取汁飲六

大麥苗 取汁服 黃疸

鮒魚 置水中常看之日一易最效者

鯉魚 治法用之如常法

鱉 治酒疸 數箇愈 常法

桃根 二治黃疸 身面如金色 取東引桃根一握細切水

蔓菁子 水服二黃疸 及內黃腹結不通 取子搗細和

甜瓜蒂 中出黃疸 初發及時氣惡 溫水服得吐黃水便

絲瓜 麵得病 麵湯調下 因酒得病 酒調下 燬服即愈

水芹 治五種黃病 取汁飲之 作蘆菹

生葱 心治傷寒 發出汁 蘸香油 點兩目 大小皆立明 又取

生葱 心治傷寒 發出汁 蘸香油 點兩目 大小皆立明 又取

酒噴之其眼自明

苦瓠 鼻中出黃煎取汁滴

絲蓴 治熱疸作羹作

冬葵 又治時行黃病常煮汁飲

白烏雞 傷寒發黃胃心腸尿以刀爛切鋪心頭上少

項印

熊膽 少療天和黃疸取

猪糞 水治同清頓服糞漬

猪脂 取三五合日三服大有乾屎發黃煎猪脂

東醫寶鑑雜病篇卷之六

