



重廣補注黃帝內經素問卷第十五

啓玄次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脉為

紀者諸經皆然


循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十二經脉也十二經脉皆同

陽明之陽名曰

害蜚

蜚生化也害殺氣也殺氣行則生化弭故曰害蜚

上下同法視其部中有浮絡者





皆陽明之絡也上謂手陽明下謂足陽明也其色多青則痛多黑則痺

黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入

客於經陽主外陰主內陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之也手足身分所見經絡比皆然少陽之

陽名曰樞持樞謂樞要持謂執持上下同法視其部中有浮絡者皆

少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰

者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞關司外動以靜

鎮為事如樞之運則氣和平也上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之

絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒儒順也守要而順陰陽開

闔之用也上下同法視其部中有浮絡者皆少陰

之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經

其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩心主脉入掖下氣不和則

妨害肩掖之動運上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡

也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蟄關閉蟄類使順行藏新校正

云按甲乙經蟄作執上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也

絡盛則入客於經部皆謂本經絡之所部分浮謂浮息也凡十二經絡脉者皮

之部也列陰陽位部主於皮故曰皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛

邪中之則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入

於經留而不去傳入於府廩於腸胃廩積也聚也邪之始入

於皮也泝然起毫毛開腠理泝然惡寒也起謂毛起豎也腠理皆謂皮空及文理也其入

於絡也則絡脉盛色變盛謂盛滿變謂易其常也其入客於經也則感



虛乃陷下

經虛邪入故曰感虛  
脈虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間寒多則筋

攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍脰破毛直而敗

攣急也  
弛緩也

消爍也鍼經曰寒則筋急熱則筋緩寒勝為痛熱勝為氣消脰者肉之標故肉消則脰破毛直而敗也

帝曰夫子言皮之

十二部其生病皆何如歧伯曰皮者脉之部也

脉氣留  
行各有

陰陽氣隨經所過而  
部主之故云脉之部

邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡

脉絡脉滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也故

皮者有分部不與而生大病也

脉行皮中各有部分脉受邪氣  
隨則病生非由皮氣而能生也

新校正云按甲乙經不與作不愈全元起本作不與元起云  
氣不與經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病也

帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本  
在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑

不同其故何也歧伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故色見常應於時絡  
主血故受邪則變而不一矣

帝曰經之常色何如歧伯曰心赤

肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡

之陰陽亦應其經乎歧伯曰陰絡之色應其經陽絡

之色變無常隨四時而行也

順四時氣  
化之行止

寒多則凝泣凝

泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之

無病五色具見者謂之寒熱

淖濕也澤潤液  
也謂微濕潤也

帝曰善

氣穴論篇第五十八

新校正云按全元  
起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其

所願卒聞之歧伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非



聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處孰誰也帝捧手

逡巡而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞

其數而目以明耳以聰矣目以明耳以聰言心志通明迥如意也歧伯曰此所

謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也

世言真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未

足以論也開氣穴真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論深微之意也然余願聞夫子溢志

盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出言其處謂穴俞處所歧

伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十椎及上紀天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脈之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼

若灸者可灸三壯按今甲乙經經脈流注孔穴圖經當脊十椎下並無穴目恐是七椎也此則督脈氣所主之上紀之處次如下說新校正云按甲乙經天

突在結喉下五寸 **上紀者胃脘也**謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身寸之一寸居心蔽骨與齊之中手太陽少陽足陽

明三脈所生任脈氣所發也刺可入同身寸之一寸二分若灸者可灸七壯 **下紀者關元**也開元者少陽募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脈之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯

**背脊邪繫陰**陽左右如此其病前後痛瀆胃脇痛而不得息不得

**卧上氣短氣偏痛**新校正云按別本偏一作滿 **脉滿起斜出尻脉絡胃**

**脇支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下**尋此支絡脉

悉是督脉支絡自尾骶出各上行斜絡脇支心貫鬲上加天突斜之肩而下交於七椎 **新校正云詳自背與心相控而痛至此疑是骨空論文簡脫誤於此**

**藏俞五十六**藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四形藏也俞謂井榮俞經合非

衝也經中封也合曲泉也大敦在足太指端去爪甲角如韭葉及三毛之中足厥陰脉之所出也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯行間在足

大指之間脉動應手陷者中足厥陰脉之所流也 **新校正云按甲乙經留作**

流餘所流並作留 **刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯太衝在**

寸經十一寸



足大指本節後同身寸之二寸陷者中 新校正云按刺腰痛注云本節後內  
間同身寸之二寸陷者中動脈應手 足厥陰脈之所注也刺可入同身寸之  
三分留十呼若灸者可灸三壯中封在足內踝前同身寸之一寸半 新校正  
云按甲乙經云一寸 陷者中仰足而取之伸足乃得之足厥陰脈之所行也  
刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯曲泉在膝內輔骨下大筋上  
小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也刺可入同身寸之六分留十  
呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也榮勞宮也俞太陵也經間使也合曲  
澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中手心主脈之所出也刺可  
入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯勞宮在掌中央動脈手心主脈之  
所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯太陵在掌後骨兩筋  
間陷者中手心主脈之所注也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三  
壯間使在掌後同身寸之三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也刺可入同  
身寸之六分留七呼若灸者可灸七壯 新校正云按甲乙經云灸三壯 曲  
澤在肘內廉下陷者中屈肘而得之手心主脈之所入也刺可入同身寸之三  
分留七呼若灸者可灸三壯脾之井者隱白也榮大都也俞太白也經商丘也  
合陰陵泉也隱白在足大指之端內側去爪甲角如韭葉足太陰脈之所出也  
刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯大都在足大指本節後陷者  
中足太陰脈之所流也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太白  
在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也刺可入同身寸之三分留七呼  
若灸者可灸三壯商丘在足內踝下微前陷者中足太陰脈之所行也刺可入

同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中  
伸足乃得之足太陰脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸  
三壯肺之井者少商也榮魚際也俞太淵也經經渠也合尺澤也少商在手大  
指之端內側去爪甲角如韭葉手太陰脈所出也刺可入同身寸之一分留一  
呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經作一壯 魚際在手大指本節後  
內側散脈手太陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三  
壯太淵在掌後陷者中手太陰脈之所注也刺可入同身寸之二分留二呼若  
灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脈之所行也刺可入同身寸之三  
分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脈手大陰脈之所入也刺可  
入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者涌泉也榮然谷也俞大  
谿也經復溜也 新校正云按甲乙經溜作留餘復溜字並同 合陰谷也涌  
泉在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也刺可入同身寸之三  
分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之  
所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血令人立  
饑欲食太谿在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也刺可入同  
身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者  
中 新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脈 足少陰脈之所行  
也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後  
大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也刺可入同身  
寸之四分若灸者可灸三壯如是五藏之俞藏各五穴則二十五俞以左右脉



具而言之  
則五十穴  
**府俞七十二穴**  
府謂六府非兼九形府也俞亦謂井榮俞原經  
合非背俞也肝之府膽膽之井者竅陰也榮俠

谿也俞臨泣也原丘虛也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去  
爪甲角如韭葉足少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼  
新校正

云按甲乙經作三呼  
若灸者可灸三壯俠谿在足小指次指歧骨間本節前  
陷者中足少陽脉之所流刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯臨

泣在足小指次指本節後間陷者中去俠谿同身寸之一寸半足少陽脉之所  
注也刺可入同身寸之三分  
新校正云按甲乙經作二分  
留五呼若灸者

可灸三壯丘虛在足外踝下如前陷者中去臨泣同身寸之三寸足少陽脉之  
所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯陽輔在足外踝上

新校正云按甲乙經云外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前同身寸之三分所  
去丘虛同身寸之七寸足少陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留七呼若

灸者可灸三壯陽陵泉在膝下同身寸之一寸筋外廉陷者中足少陽脉之所  
入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯脾之府胃胃之井者厲

兌也榮內庭也俞陷谷也原衝陽也經解谿也合三里也厲兌在足大指次指  
之端去爪甲角如韭葉足陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若

灸者可灸一壯內庭在足大指次指外間陷者中足陽明脉之所流也刺可入  
同身寸之三分留十呼  
新校正云按甲乙經云作二十呼若灸者可灸三壯

陷谷在足大指次指外間本節後陷者中去內庭同身寸之二寸足陽明脉之  
所注也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯衝陽在足跗上同身

寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸足陽明脉之所過也刺可入同  
身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半  
新

校正云按甲乙經作一寸半刺瘡注作三寸半素問二注不同當從甲乙經之  
說腕上陷者中足陽明脉之所行也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可

灸三壯三里在膝下同身寸之三寸筋骨外廉兩筋肉分間足陽明脉之所入  
也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯肺之府大腸大腸之井者

商陽也榮二間也俞三間也原合谷也經陽谿也合曲池也商陽在手大指次  
指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼

若灸者可灸三壯二間在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所流  
也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間在手大指次指本節

後內側陷者中手陽明脉之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可  
灸三壯合谷在手大指次指歧骨之間手陽明脉之所過也刺可入同身寸之

三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕中上側兩筋間陷者中手陽明  
脉之所行也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池在肘外輔

屈肘兩骨之中手陽明脉之所入也以手拱臂取之刺可入同身寸之五分留  
七呼若灸者可灸三壯心之府小腸小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也

原腕骨也經陽谷也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下同身寸之一分  
陷者中手太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯  
前谷在手小指外側本節前陷者中手太陽脉之所流也刺可入同身寸之一  
分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之



所注也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽谷在手外側腕中銳骨之下陷者中手太陽脉之所行也刺可入同身寸之二分留三呼新校正云按甲乙經作二呼若灸者可灸三壯少海在肘內大骨外去肘端同身寸之五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸五壯心包之府三焦三焦之井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池也經支溝也合天井也關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯液門在手小指次指間陷者中手少陽脉之所流也刺可入同身寸之二分若灸者可灸三壯中渚在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉之所注也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯陽池在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯支溝在腕後同身寸之三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯天井在肘外大骨之後同身寸之一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯腎之府膀胱膀胱之井者至陰也榮通谷也俞束骨也原京骨也經崑崙也合委中也至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯通谷在足小指外側本節前陷者中太陽脉之所流也刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太陽脉之所注

也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脉之所過也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後腿骨上陷者中細脉動應手足太陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯委中在臍中央約文中動脉新校正云詳委中穴與甲乙經及刺瘡篇注痺論注同又骨空論云在膝解之後曲脚之中背面取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處足太陽脉之所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如熱俞是六府之俞府各六穴則三十六俞以左右脉具而言之則七十二穴

五十九穴水俞五十七穴

並具水熱論中新校正云按熱俞又見刺熱篇注

頭上五行

行五五五二十五穴

此亦熱俞之五十九穴也

中脘兩傍各五凡十穴

謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩傍心俞在第五椎下兩傍肝俞在第九椎下兩傍脾俞在第十一椎下兩傍腎俞在第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去同身寸之一寸半並足太陽脉之會刺可入同身寸之三

兩傍各一凡二穴

今甲乙經經脉流注孔穴圖經並不載未詳何俞也新校正云按大椎上傍無穴大椎下傍穴名大杼後有

目瞳子浮白二穴

瞳子膠在自外去皆同身寸之五分手太陽手足少陽三脉之會刺可入同身寸之三分若灸者

故王氏云未詳



可灸三壯浮白在耳後入髮際同身寸之一寸足太陽少陽二脉之  
會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯左右言之各二為四也

**分中二穴** 謂環鈹穴也在髀樞後足少陽太陽二脉之會刺可入同身寸  
之一寸留二十呼若灸者可灸三壯新校正云按王氏云在髀

樞後按甲乙經云在髀樞中後  
當作中灸三壯甲乙經作五壯

**犢鼻二穴** 在膝髓下筋上俠解大筋中足  
陽明脉氣所發刺可入同身寸  
之六分若灸者可灸三壯

**耳中多所聞二穴** 聽宮穴也在耳中珠子大如赤小豆手  
者可灸三壯

**眉本二穴** 攢竹穴也在眉頭陷者中足太  
陽脉氣所發刺可入同身寸之  
寸之一分若灸者可灸三壯

**完骨二穴** 在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少陽之  
會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸  
三分留六呼若灸者可灸三壯

**頂中央一穴** 風府穴也在頂上入髮際同身寸之  
一寸大筋內宛宛中督脉陽維二經  
之會疾言其肉立起言休其肉立下刺可入  
同身寸之四分留三呼灸之不幸使人瘖

**枕骨二穴** 竅陰穴也在完骨上  
枕骨下搖動應手足  
太陽少陰之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三  
壯

**上關二穴** 鍼經所  
謂刺之  
則故不能欠者也在耳前上廉起骨關口有空手少陽足陽明之會刺  
可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞

**大迎**

**二穴** 在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷者中動脉足陽明脉  
氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

**下關二穴** 鍼經所謂刺之則欠不能故者也在上關下耳前動脉下廉合口有空張口而  
閉足陽明少陽二脉之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯耳  
中有乾擗之不得灸也

**天柱二穴** 在俠項後髮際大筋外廉陷者  
正云按甲乙經擗之作擗抵  
中足太陽脉氣所發刺可入同  
身寸之二分留六呼

**巨虛上下廉四穴** 上廉足陽明與大腸合也在膝  
若灸者可灸三壯

**下關二穴** 足陽明脉氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯下廉足陽明與小  
腸合也在上廉下同身寸之三寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分若  
灸者可灸三壯

**曲牙二穴** 頰車穴也在耳下曲頰端陷者中開口有空足陽明脉  
氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯也

**天**

**突一穴** 已前  
釋也

**天府二穴** 在腋下同身寸之三寸臂臑內廉動脉手太陰  
脉氣所發禁不可灸刺可入同身寸之四分留  
三寸此云擗鼻下六寸者蓋三里在擗鼻下三寸上廉又在三里下三寸故云  
六寸

**天牖二穴** 在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脉  
氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

**扶突二穴** 在頸當曲頰下同身寸之一寸人迎後手陽明脉氣所  
發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯



在曲頰下扶突後動脈應手陷者中手太陽脈氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯

上大骨前手足少陽陽維之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經灸五壯

再注今委陽二穴 三焦下輔俞也在膈中外廉兩筋間此足太陽之別絡刺可入同身寸之七分留五呼若灸者可灸三壯

而取之 肩貞二穴 在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽脈氣所發刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯

穴 在項髮際宛宛中入係舌本督脈陽維二經之會仰頭取之刺可入同身寸之四分不可灸灸之令人瘖 新校正云按氣府注云去風府一寸

一穴 齊中也禁不可刺刺之使人齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍 齊中惡瘍

廊左右則十二穴也俞府在巨骨下俠任脈兩傍橫去任脈各同身寸之二寸陷者中下五穴遞相去同身寸之一寸六分陷者中並足少陰脈氣所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯

背俞二穴 大杼穴也在脊第一椎下兩傍相去各四分若灸者可灸五壯

膺俞十二穴 謂雲門中府周榮胃鄉天谿食竇左右則十二穴也 新校正云按甲乙經作周榮胃鄉 雲門在巨骨下俠任脈傍橫去任脈各同身寸之六寸 新校正云按水熱穴注作胃中行兩傍與此文雖異處

所無別 陷者中動脈應手雲門中府相去同身寸之一寸餘五穴遞相去同身寸之一寸六分陷者中並手太陽脈氣所發雲門食竇胃鄉取之餘並仰而取之雲門刺可入同身寸之七分太深令人逆息中府刺可入同身寸之三分留五呼餘刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯 新校正云詳王氏以此

十二穴并手太陽按甲乙經雲門乃手太陽中府乃手足太陰之會周榮已下乃足太陰非十二穴並手太陽也

分肉二穴 在足外骨之端同身寸之三分筋肉分間陽維脈氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經無分肉穴詳處所疑是陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分所又按刺腰痛注作

絕骨之端如後二分刺入五分留十呼與此注小異 踝上橫二穴 內踝上穴也交信去內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間足陰陽之郄刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯外踝上附陽穴也附陽去外踝上同身寸之三寸太陽前少陰後筋骨間陽蹻之郄刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經附陽作付陽

陰陽蹻 陰蹻穴在足內踝下是謂照海陰蹻所生刺可入同身寸之四分留六呼若灸者可灸三壯陽蹻穴是謂申脈陽蹻所生在外踝下陷者中

新校正云按刺腰痛篇注作在外踝下五分繆刺論注云外踝下半寸 容瓜甲刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經留

七呼作六呼刺腰 水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之

水俞在諸分 分謂肉之分理 熱俞在氣穴 寫熱則痛篇注作十呼 問治水取之



寒熱俞在兩骸厭中二穴骸厭謂膝外俠大禁二十五在天府下

五寸謂五里穴也所以謂之大禁者謂其禁不可刺也鍼經曰迎之五里中道而上五至而已五注而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其俞矣蓋謂此也又曰五里者尺澤凡三百六十五穴鍼之所由行也新校正云詳自藏俞前五十

之後五里與此文同至此并重複共得三百六十九穴通前天突十椎上紀下紀共三百六十五穴除重複實有三百一十三穴

帝曰余已知氣穴之處遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎孫絡小絡也謂絡之支別者岐

伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通榮

衛榮衛稽留田衛散榮溢氣竭血著外為發熱內為少氣

疾寫無怠以通榮衛見而寫之無問所會榮積衛留內外相薄者見其血絡當即寫

之亦無問其脈之俞會帝曰善願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會為谷

肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣

新校正云按甲乙經作以舍大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿內

銷骨髓外破大脰熱過故致是留於節湊必將為敗若留於骨節之間津液所湊之處則

骨節之間髓液皆潰為膿故必敗爛筋骨而不得屈伸矣積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋新校正云云元起本

按全元起本助肘不得伸內為骨痺外為不仁命曰不足大

寒留於谿谷也邪氣盛甚其氣不榮髓溢內消故為是也不足謂陽氣不足也寒邪外薄久積淹留陽不外勝內消筋髓故曰不足

大寒留於谿谷之中也谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循

脈往來微鍼所及與法相同若小寒之氣流行淫溢隨脈往來為痺病用鍼調者與常法相同爾帝乃

辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出

乃藏之金蘭之室署曰氣穴所在岐伯曰孫絡之脈別經

者其血盛而當寫者亦三百六十五脈並注於絡傳注十



二絡脉非獨十四絡脉也十四絡者謂十二經絡兼任脉督脉之絡也脾之大絡起自於脾故不并言之也

內解寫於中者十脉解謂骨解之中經絡也雖則別行然所受邪亦隨注寫於五藏之脉左右各五故十脉也

氣府論篇第五十九新校正云按全元起本在第二卷

足太陽脉氣所發者七十八穴兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七十八穴也正經脉

會發者七十八穴浮薄相通者一十五穴則其數也 兩眉頭各一謂攢竹穴也所在刺灸分壯與氣穴同法 入髮至項

三寸半傍五相去三寸謂大杼風門各二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法 新校正云按別本云入髮至項三寸又

注云寸同身寸也諸寸同法與此注全別此注謂大杼風門各二穴所在灸刺分壯與此氣穴同法今氣穴篇中無風門穴而注言與同法此注之非可見此

非王氏之誤誤在後人詳此入髮至項三寸半傍五相去三寸蓋是說下文浮氣之在皮中五行行五之穴故王都不解釋直云寸為同身寸也但以項誤作

項剩半字耳所以言入髮至項者目入髮顙會穴至頂百會凡三寸自百會後至後頂又三寸故云入髮至頂三寸傍五者為兼四行傍數有五行也相去三

寸者蓋謂自百會頂中數左右前後各三寸有五行行五共二十五穴也後人誤認將頂為項以為大杼風門此其誤也况大杼在第一椎下兩傍風門又在

第二椎下上云髮際非止三寸半也其誤甚明 其浮氣在皮中者凡五行行五五

二十五浮氣謂氣浮而通之可以去熱者也五行謂頭上自髮際中同身寸之二十寸後至頂之後者也二十五者其中行則顙會前頂百會後頂

強間五督脉氣也次俠傍兩行則五處承光通天絡却玉枕各五本經氣也又次傍兩行則臨泣目窓正營承靈腦空各五足少陽氣也兩傍四行各五則二

十穴中行五則二十五也其 項中大筋兩傍各一謂天柱二穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

風府兩傍各一謂風池二穴也刺灸分壯與氣穴同法 新校正云按甲乙經風池是少陽陽維之會非太陽之所發也經言

風府兩傍乃天柱穴之分位此亦復明上項中大筋兩傍穴也此注 俠背以

刺出風池二穴於九十三數外更刺前大杼風門及此風池六穴也 下至尻尾二十節十五間各一十五間各一者今中誥孔穴圖經所存者十三穴左右共二十六謂附分魄戶

神堂諱諱鬲關魄門陽綱意舍胃倉育門志室胞育秩邊十三也附分在第二椎下附項內廉兩傍各相去俠脊同身寸之三寸足太陽之會刺可入同身寸

之八分若灸者可灸五壯魄戶在第三椎下兩傍上直附分足太陽脉氣所發下十二穴並同正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者如附分法神堂在第五

五椎下兩傍上直魄戶刺可入同身寸之三分灸同附分法諱諱在第六椎下兩傍上直神堂 新校正云按骨空論注云以手厭之令病人呼諱諱之聲則



指下動矣 刺可入同身寸之六分留七呼灸如附分法鬲關在第七椎下兩傍上直意謔正坐開肩取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經可灸五壯 魄門在第九椎下兩傍上直鬲關正坐取之刺灸分壯如魂門法意舍在第十一椎下兩傍上直陽綱正坐取之刺灸分壯如陽綱法胃倉在第十二椎下兩傍上直意舍刺灸分壯如意舍法育門在第十三椎下兩傍上直胃倉刺同胃倉可灸三十壯 新校正云按育門灸三十壯與甲乙經同水穴注作灸三壯志室在第十四椎下兩傍上直育門正坐取之刺灸分壯如魄戶法胞育在第十九椎下兩傍上直志室伏而取之刺灸分壯如魄戶法新校正云按志室胞育灸如魄戶五壯甲乙經作三壯水穴注亦作三壯熱穴法志室亦作三壯袂邊在第二十一椎下兩傍上直胞育伏而取之刺灸分壯如魄戶法

### 之俞各六

肺俞在第三椎下兩傍俠脊相去各同身寸之一寸半刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯心俞在第五椎下兩傍相去及如肺俞法留七呼肝俞在第九椎下兩傍相去及刺如心俞法留六呼脾俞在第十一椎下兩傍相去及刺如肝俞法留七呼腎俞在第十四椎下兩傍相去及刺如脾俞法留七呼膽俞在第十椎下兩傍相去如肺俞法正坐取之刺可入同身寸之五分留七呼胃俞在第十二椎下兩傍相去及刺如脾俞法留七呼三焦俞在第十三椎下兩傍相去及刺如膽俞法大腸俞在第十六椎下兩傍相去及刺如肺俞法留六呼小腸俞在第十八椎下兩傍相去

### 五藏之俞各五六府

及刺如心俞法留六呼膀胱俞在第十九椎下兩傍相去及刺如腎俞法留六呼五藏六府之俞若灸者並可灸三壯 新校正云詳或者疑經中各五各六以各字為誤者非也所以言各者謂左右各五各六非謂每藏府而各五各六也

### 六俞

謂委中崑崙京骨束骨通谷至陰六穴也左右言之則十二俞也其所刺灸如氣穴法經言脈氣所發者七十八穴今此所有兼止者九十三穴由此則大數差錯傳寫有誤也 新校正云詳王氏云兼止者九十三穴今兼大杼風門風池為九十九穴以此王氏撝數計之明知此三穴後之妄增也

### 委中以下至足小指傍各

### 足少陽脈氣所發者六十二穴兩角上各二

謂天衝曲鬚左右各二也天衝

在耳上如前同身寸之三分足太陽少陽二脈之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯曲鬚在耳上入髮際曲陽陷者中鼓額有空是太陽少陽二脈之會刺灸分壯如天衝法

### 上髮際內各五

謂臨泣目窓上營承靈腦空左右是也臨泣在直目上入髮際同身寸之一寸正營在自窓後同身寸之一寸承靈在正營後同身寸之一寸半腦空在承靈後同身寸之一寸半俠枕骨後枕骨上並足少陽陽維二脈之會刺可入同身寸之四分餘並刺可入同身寸之三分若灸者並可灸五壯

新校正云按腦空在枕骨後枕骨上甲乙經作玉枕骨下

耳前角上

各一 謂額厭二穴也在曲角下顛顛之上廉手足少陽足陽明三脈之會刺可入同身寸之七分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞



耳前角下各一

謂懸釐二穴也在曲角上顛顛之下廉手足少陽陽明四脉之交會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可

灸三壯 新校正云按後手少陽中云角上此云角下必有一誤

銳髮下各一

謂和膠二穴也在耳前銳髮下橫動脉手足少陽二

脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經云手足少陽手太陽之會

客主人各一

客主人穴一名也在耳

前上廉起骨開口有空手足少陽足陽明三脉之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經及氣穴注刺禁注云手少陽

足陽明之會與此異

耳後陷中各一

謂翳風二穴也在耳後陷者中按之引耳中手足少陽二脉之會刺可入同身寸之三分若灸

者可灸三壯

下關各一

下關穴名也在耳前

耳下牙車之後各一

謂頰車一穴也

刺灸分壯

缺盆各一

缺盆穴名也在肩上橫骨陷者中足陽明脉氣所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯太

深令人逆息 新校正云按骨空注作手陽明

掖下三寸脇下至臑八間各一

掖下三寸同身寸也掖下謂淵掖輒筋天池脇下至臑則日月章明帶脉五樞維道居膠九穴也左右共十八穴也淵掖在掖下同身寸之三寸足少陽脉氣所發舉臂得之

刺可入同身寸之三分禁不可灸輒筋在掖下同身寸之三寸復前行同身寸之一寸搓脇 新校正云按甲乙經搓作者下同 足少陽脉氣所發刺可入

同身寸之六分若灸者可灸三壯天池在乳後同身寸之二寸 新校正云按

甲乙經作一寸掖下三寸搓脇直掖掖助間手心主足少陽二脉之會刺可入同身寸之三分 新校正云按甲乙經作七分 若灸者可灸三壯日月膽募

也在第三肋揣橫直心蔽骨傍各同身寸之二寸五分上直兩乳 新校正云按甲乙經云日月在期門下五分 足太陰少陽二脉之會刺可入同身寸之

七分若灸者可灸五壯章門脾募也在季肋端足厥陰少陽二脉之會側卧屈上足伸下足舉臂取之刺可入同身寸之八分留六呼若灸者可灸三壯帶脉

在季肋下同身寸之一寸八分足少陽帶脉二經之會刺可入同身寸之六分若灸者可灸五壯五樞在帶脉下同身寸之三寸足少陽帶脉二經之會刺可

入同身寸之一寸若灸者可灸五壯維道在章門下同身寸之五寸三分足少陽帶脉二經之會刺灸分壯如章門法居膠在章門下同身寸之四寸三分髀

骨上 新校正云按甲乙經作監骨 陷者中陽躄足少陽二脉之會刺灸分壯如維道法所以謂之八間者髀樞中傍各一 謂環銚二穴也刺灸分

自掖下三寸至季肋凡八助骨髀樞中傍各一 壯氣穴同法 新校正云按氣穴論云兩髀厭分中王注為環銚穴又甲乙經注環銚在髀樞中今云

髀樞中傍各一者蓋謂此穴在髀樞中也傍各一者謂左右各一穴也非謂環銚在髀樞

中傍也 膝以下至足小指次指各六俞 謂陽陵泉陽輔丘虛臨泣俠谿竅陰六穴也左

右言之則十二俞也其所

足陽明脉氣所發者六十八穴額顛

在刺灸分壯氣穴同法

右言之則十二俞也其所

足陽明脉氣所發者六十八穴額顛

在刺灸分壯氣穴同法



髮際傍各三

謂懸顛陽白頭維左右共六穴也正面髮際橫行數之懸顛在曲角上顛顛之中足陽明脉氣所發刺入同身寸之三分

留三呼若灸者可灸三壯陽白在眉上同身寸之一寸直瞳子足陽明陰維二脉之會刺可入同身寸之三分灸三壯頭維在額角髮際俠本神兩傍各同身寸之一寸五分足少陽陽明二脉之交會刺可入同身寸之五分禁不可灸

新校正云按甲乙經陽白足少陽陽維之會今王氏注云足陽明陰維之會詳此在足陽明脉氣所發中則足陽明近是然陽明經

不到此又不與陰維會疑王注非甲乙經為得矣 面軌骨空各一 謂四白

目下同身寸之一寸足陽明脉氣所發刺可入同身寸之四分不可灸 新校正云按甲乙經刺入三分灸七壯 大迎之骨空

各一 大迎穴名也在曲頰前同身寸之一寸三分骨陷者中動脉足陽

各一 人迎穴名也在頸俠結喉傍大脉動應手足陽明脉 缺盆外骨空各

一 謂天膠二穴也在肩缺盆中上伏骨之陷陷者中手足少陽陽維三脉之會刺

膺中骨間各一 謂膺窻等六穴也膺窻在胷兩傍俠中行各相去同身寸

所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯此穴之上又有氣戶庫

分庫房在氣戶下同身寸之一寸六分屋駁在氣戶下同身寸之二寸二分下

即膺窻也膺窻之下即乳中也乳中穴下同身寸之一寸六分陷者中則乳根

穴也並足陽明脉氣所發仰而取之乳中禁不可灸刺灸刺之不幸生蝕瘡瘡

中有清汁膿血者可治瘡中有瘻肉若蝕瘡者死餘五穴並刺可入同身寸之

四分若灸者可灸三壯 新 俠鳩尾之外當乳下三寸俠胃脘

各五 謂不容承滿梁門關門太一五穴也左右共一寸也俠腹中行兩傍相

不容在第四肋端下至太一各上下相去同身寸之一寸並足陽明脉氣所發

刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯 新校正云按甲乙經不容刺入五

分此云並入八 俠齊廣三寸各三 廣謂去齊橫廣也廣三寸者各如

天樞外陵也滑肉門在太一下同身寸之一寸天樞在滑肉門下同身寸之一

寸正當於齊外陵在天樞下同身寸之一寸並足陽明脉氣所發天樞刺可入



可灸五壯水道在大巨下同身寸之三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之二寸半若灸者可灸五壯歸來在水道下同身寸之二寸刺可入同身寸之八分若灸者可灸五壯也

### 氣街動脈各一

氣街穴名也在歸來下鼠鼯上同身寸之一寸脈動應手足陽明脈氣所發刺可入同身

寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云詳此法與甲乙經同刺熱注及熱穴注云氣街在腹臍下橫骨兩端鼠鼯上刺禁論注在腹下俠齊兩傍相去四寸鼠鼯上骨空注云在毛際

### 伏菟上各一

謂髀關二穴也在膝上伏菟後交分中刺可入同身

寸之六分若灸者可灸三壯 三里以下至足中指各八俞分之所

### 空

謂三里上廉下廉解谿衝陽陷谷內庭厲兌八穴也左右言之則十六俞也上廉足陽明與大腸合下廉足陽明與小腸合也其所在刺灸分壯與氣穴

同法所謂分之所

### 手太陽脈氣所發者二十六穴目內

皆各一 謂睛明二穴也在目內眦手足太陽足陽明陰陽蹻陽蹻五脈之會刺而不於所會刺脈下言 目外各一 謂瞳子膠二穴也在目外去眦同身寸之者出從其正者也

可入同身寸之三分 若灸者可灸三壯

### 顛骨下各一

謂顛膠二穴也顛頰也頰面顛也在面頰骨下陷者中手太陽少陽二脈之會

刺可入同身寸之三分

### 耳郭上各一

謂角孫二穴也在耳上郭表之中間上髮際之下開口有空手太陽手足少陽三脈之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

新校正云按甲乙經手太陽作手陽明

### 耳中各一

謂聽宮二穴也在耳中

### 巨骨穴各一

巨骨穴名也在肩端上行兩叉骨間陷者中手陽明蹻脈二經之會刺可入同身寸之一寸半若灸者可灸三壯 新校正

### 曲掖上骨穴各一

謂臑俞二穴也在肩臑後大骨下腓上廉陷者中手太陽陽蹻維蹻三經之會舉臂取之

刺可入同身寸之八分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經作手足太陽

### 柱骨上陷者各一

謂肩井二穴也在肩上陷

解中缺盆上大骨前手足少陽陽維三脈之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯

### 上天窻四寸各一

謂天窻四穴也所在刺灸分

### 肩解各一

謂秉風二穴也在肩小髃骨後舉臂有空手太陽陽明手足少陽四脈之會舉臂取之

刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經灸五壯

### 肩解下三寸各一

謂天宗二穴也在秉風後大骨

下陷者中手太陽脈氣所發刺可入同身寸之五分留六呼若灸者可灸三壯 肘以下至手小指本各六



**俞** 六俞所起於指端經言至小指本則以端為本言上之本也下文陽明少陽同也六俞謂小海陽谷腕骨後谿前谷少澤六穴也左右言之則十二俞也其所在刺灸分壯氣穴同法 新校正云後此手太陽陽明少陽三經各言至手其指本王注以端為本者非也詳手三陽之井穴盡出手其指之端爪甲下際此言本者是遂指爪甲之本也安得以端為本哉

**手陽明脉氣所發者二十二穴** 鼻空

**外廉項上各二** 謂迎香扶突各二穴也迎香在鼻下孔傍手足陽明二脉之會刺可入同身寸之三分扶突在曲頰下同身寸

**大迎骨空各一** 大迎穴名也在曲頰前同身寸之一寸入迎後手陽明脉氣所發仰而取之

**柱骨之會各一** 謂天鼎二穴也在頸缺盆上直扶突氣

**髃骨之會各一** 謂肩髃二穴也所

**肘以下至手大指次指本** 謂三陽脉氣所發者三十二穴

**各六俞** 謂三陽脉氣所發者三十二穴

**手少陽脉氣所發者三十二穴** 臑骨

**下各一** 謂臑骨二穴也所在刺灸分壯與手太陽脉同法此穴中手

**眉後** 謂絲竹空二穴也在眉後陷者中手少陽脉氣所發刺可入同身寸之三

**角上各一** 謂懸壺二穴也此與足少陽脉中同以是二脉

**項中足太陽之** 謂天牖二穴也所在刺

**前各一** 謂風池二穴也在耳後陷者中按之引於耳中手足少陽脉之會刺

**俠扶突各一** 謂天窗二穴也在曲頰下扶突後動脉

**肩貞各一** 肩貞穴名也在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷

**肩貞下三寸分間各一** 謂肩髃膈會消灤各二穴也其穴各

**若灸者可灸三壯** 謂肩髃膈會消灤各二穴也其穴各

**臂取之手少陽脉氣所發刺可入同身寸之七分** 若灸者可灸三壯膈會在臂

曲池手陽明之合也此誤出三里而遺曲池也

謂臑骨二穴也所在刺灸分壯與手太陽脉同法此穴中手

謂絲竹空二穴也在眉後陷者中手少陽脉氣所發刺可入同身寸之三

謂懸壺二穴也此與足少陽脉中同以是二脉

謂天牖二穴也所在刺

謂風池二穴也在耳後陷者中按之引於耳中手足少陽脉之會刺

謂天窗二穴也在曲頰下扶突後動脉

肩貞穴名也在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷

謂肩髃膈會消灤各二穴也其穴各

謂肩髃膈會消灤各二穴也其穴各

謂肩髃膈會消灤各二穴也其穴各



者可灸五壯消灤在肩下臂外關掖斜肘分下行間手肘以下至手小

少陽脉之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯

**指次指本各六俞** 謂天井支溝陽池中渚液門關衝六穴也左右

**脉氣所發者二十八穴** 今少一穴 新校正云按會陽二穴為項

**中央二** 是謂風府瘖門二穴也悉在項中餘一穴今亡風府在項上入髮際

分留三呼不可妄灸灸之不幸令人瘖瘖瘖瘖在項髮際宛宛中去風府同身寸

之一寸督脉陽維二經之會仰頭取之刺可入同身寸之四分禁不可灸灸之

令人瘖 新校正云按王氏云風府瘖門悉在項中餘一穴今亡者非謂此二

十八穴中亡其一穴也王氏蓋見氣穴論大椎上兩傍各一穴亦在項之穴也

今亡故云餘 **髮際後中八** 謂神庭上星額會前頂百會後頂強間腦戶八

穴也其正髮際之中也神庭在髮際直鼻督脉

足太陽陽明脉三經之會禁不可刺若刺之令人顛疾目失睛若灸者可灸三

壯上星在顛上直鼻中央入髮際同身寸之一寸陷者中谷豆額會在上星後

同身寸之一寸陷者中前頂在額會後同身寸之一寸五分骨間陷者中百會

在前頂後同身寸之一寸五分頂中央旋毛中陷容指督脉足太陽之交會後

頂在百會後同身寸之一寸五分強間在後頂後同身寸之一寸五分腦戶在

強間後同身寸之一寸五分督脉足太陽之會不可灸此八者並督脉氣所發

也上星百會強間腦戶各刺可入同身寸之三分上星留六呼腦戶留三呼餘

並刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯 新校正云按甲乙經腦戶不可

灸骨空論注 **面中三** 謂素膠水溝斷交三穴也素膠在鼻柱上端督脉氣所

去不可妄灸 之督脉手陽明之會刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯斷交在

唇內齒上斷縫督脉任脉二經之會可逆刺之入同身寸之三分若灸者可灸

三壯此三者正居 **大椎以下至尻尾及傍十五穴** 脊椎之間有大



八分餘並刺可入同身寸之五分陶道神道各留五呼陶道身柱神道筋縮可灸五壯大椎可九壯餘並可三壯新校正云按甲乙經無靈臺樞陽關三  
**至骶下凡二十一節脊椎推法也**通項骨三節**任脉之氣所**

**發者二十八穴**今少一穴**喉中央二**謂廉泉天突二穴也廉泉在頷下結喉上舌本下陰維任脉之會刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛

寸之三分留三呼若灸者可灸三壯天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

**膺中骨陷中各一**謂旋機華蓋紫宮玉堂膺中中庭六穴也旋機在天突下同身寸之一寸華蓋在旋機下同身寸之一寸紫宮玉堂膺中中庭各相去同身寸之一寸六分陷者中並任脉氣所發仰而取之各刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯**鳩尾下**

**三寸胃脘五寸胃脘以下至橫骨六寸半**一新校正云詳一字疑誤

**腹脉法也**鳩尾心前穴名也其正當心蔽骨之端言其骨垂下如鳩鳥尾形故以為名也鳩尾下有鳩尾巨闕上脘中脘建里下脘水分

齊中陰交臍臑丹田關元中極曲骨十四俞也鳩尾在臆前蔽骨下同身寸之五分任脉之別不可灸刺人無蔽骨者從歧骨際下行同身寸之一寸**新校正云按甲乙經云一寸半為鳩尾處也下次巨闕上脘中脘建里下脘水分遞相云同身寸之一寸上脘則足陽明手太陽之會中脘則手太陽少陽足陽明**

三脉所生也齊中禁不可刺若刺之使人齊中惡瘍潰矢出者死不治陰交在齊下同身寸之一寸任脉陰衝之會臍臑在齊下同身寸之一寸丹田三焦募也在齊下同身寸之二寸關元小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會也中極在關元下一寸足三陰之會也曲骨在橫骨上中極下同身寸之一寸足厥陰之會凡此十四者並任脉氣所發建里丹田並刺可入同身寸之六分留七呼**新校正云按甲乙經作五分十呼**上脘陰交並刺可入同身寸之一寸二分下脘水分並刺可入同身寸之一寸半留七呼餘並刺可入同身寸之一寸二分若灸者關元中脘各可灸七壯齊中中極曲骨各三壯餘並可五壯自鳩尾下至陰間並任脉主之腹脉法也**新校正云據此注云餘並刺入一寸一分關元在中與甲乙經及氣穴骨空注**刺入二寸不同當從甲乙經之寸數**下陰別一**謂會陰一穴也自曲骨下至陰陰之下兩陰之間則此穴也是任脉別絡俠督脉者衝脉之會故曰下陰別一也刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經七呼作留三呼**

**目下各一**謂承泣二穴也在目下同身寸之七分上直瞳子陽蹻**下脘**謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

**斷交一**斷交穴名也所在刺**衝脉氣所發者二十二穴俠鳩**

寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**

謂承漿穴也在頤前下脣之下足陽明脉任脉之會開口取之刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯**新校正云按甲乙經作留六呼**



尾外各半寸至齊寸一

謂幽門通谷陰都石關商曲腎俞六穴左右則十二穴也幽門俠巨關兩傍相去各同身

寸之半寸陷者中下五穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經之會各刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯

甲乙經云幽門通谷刺入五分

俠齊下傍各五分至橫骨寸一腹脉法也

謂中注髓府胞門陰關下極五穴左右則十穴也中注在背俞下同身寸之五分上直幽門下四穴各相去同身寸之一寸並衝脉足少陰二經之會各刺可入同身寸之一寸

若灸者可灸五壯

足少陰舌下厥陰毛中急脉各

足少陰舌下二穴在人迎前陷

中動脉前是日月本左右二也足少陰脉氣所發刺可入同身寸之四分急脉在陰髦中陰上兩傍相去同身寸之二寸半按之隱指堅然甚按則痛引上下

也其左者中寒則上引少腹下引陰丸善為痛為少腹急中寒此兩脉皆厥陰之大絡通行其中故曰厥陰急脉即畢之系也可灸而不可刺病疝少腹痛即

可灸 新校正云詳舌下毛中之穴甲乙經無

手少陰各

謂手少陰郄穴也在腕後同身寸之半寸手少陰郄也刺可入同身寸之

三分若灸者可灸三壯左右二也

陰陽蹻各

陰蹻一謂交信穴也交信在足內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄

刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯陽蹻一謂附陽穴也附陽在足外踝上同身寸之三寸太陽前少陽後筋骨間謹取之陽蹻之郄刺可入同

身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯左右四也

手足諸魚際脉氣所發者凡三百六

十五穴也

經之所存者多凡一十九穴此所謂氣府也然散穴俞諸經脉部分皆有之故經或不言而甲乙經經脉注多少不同

此者以

### 重廣補注黃帝內經素問卷第十五

皮部論蜚

扶沸切 腠

氣穴論蔽

必寐切 擿

氣府論顛

音信 諛

顛

上音衣 顛

上如轉切 頰



重廣補注黃帝內經素問卷第十六

啓孝次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

骨空論

水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺齊篇末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之柰何

始初也

岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

風中身形則腠理閉密陽氣內拒寒復外勝勝拒相薄榮衛失所故如是治在風府

風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸宛宛中督

脉足太陽之會刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯新校正云按風府注氣穴論氣府論中各已注與甲乙經同此注云督脉足太陽之會可灸五壯

者乃是風門熱府穴也當云督脉陽維之會留三呼不可灸乃是調其陰陽不足則補有餘則寫

用鍼之道必法天常盛寫虛補此其常也大風頸項痛刺風府風府在上椎

上椎謂大椎上



入髮際同身寸之一寸 大風汗出灸譙譙譙譙在背下俠脊傍三寸

所厭之令病者呼譙譙譙譙應手 譙譙穴也在肩髀內廉俠第六椎下兩傍各同身寸

之三寸以手厭之令病人呼譙譙之聲則指下動矣足太陽脉氣所發刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸五壯譙譙者因取為名爾 **從風**

**憎風刺眉頭** 謂攢竹穴也在眉頭陷者中脉動應手足太陽脉氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯 **失枕在**

**肩上橫骨間** 謂缺盆穴也在肩上橫骨陷者中手陽明脉氣所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯刺入深令人逆息

新校正云按氣府注作足陽明此云手陽明詳二經俱發於此故王注兩言之 **折使榆臂齊肘正灸脊中**

榆讀為搖搖謂搖動也然失枕非獨取肩上橫骨間乃當正形灸脊中也欲而驗之則使搖動其臂屈折其肘自項之下橫齊肘端當其中間則其處也是曰陽關在第十六椎節下間督脉氣所發刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯 **眇絡季脇引少**

**腹而痛脹刺譙譙** 眇謂俠脊兩傍空軟處也少腹齊下也 **腰痛不可以轉搖急**

**引陰外刺八膠與痛上八膠在腰尻分間** 八或為九驗真骨及中誥孔穴

經正有八膠無九膠也分謂腰尻筋肉分間陷下處 **鼠痿寒熱還刺寒府寒府在附膝**

**外解營** 膝外骨間也屈伸之處寒氣喜中故名寒府也解謂骨解營謂深刺而必中其營也 **取膝上外者使**

**之拜取足心者使之跪** 拜而取者使膝穴空開也跪而取之者令足心宛宛處深定也 **任脉者起**

**於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤**

**循面入目** 新校正云按難經甲乙經無上頤循面入目六字 **衝脉者起於氣街並少陰**

**之經** 新校正云按難經甲乙經作陽明 **俠齊上行至胃中而散** 任脉衝脉皆奇經也任脉當齊中而

上行衝脉俠齊兩傍而上行然中極者謂齊下同身寸之四寸也言中極之下者言中極從少腹之內上行而外出於毛際而上非謂本起於此也關元者謂齊下同身寸之三寸也氣街者穴名也在毛際兩傍鼠鼯上同身寸之一寸也

言衝脉起於氣街者亦從少腹之內與任脉並行而至於足是乃循腹也何以言

之鍼經曰衝脉者十二經之海與少陰之絡起於腎下出於氣街又曰衝脉任脉者皆起於胞中上循脊裏為經絡之海其浮而外者循腹各行會於咽喉別

而絡唇口血氣盛則皮膚熱血獨盛則滲灌皮膚生毫毛由此言之則任脉衝脉從少腹之內上行至中極之下氣街之內明矣 新校正云按氣街與氣府

東

東

東



論刺熱篇水熱穴篇刺禁論等注重任脉為病男子內結七疝女

子帶下痲聚衝脉為病逆氣裏急督脉為病脊強反

折督脉亦奇經也然任脉衝脉督脉者一源而三歧也故經或謂衝脉為督脉

折也何以明之今甲乙及古經脉流注圖經以任脉循背者謂之督脉自少腹

直上者謂之任脉亦謂之督脉是則以背腹陰陽別為各目爾以任脉自胞上

過帶脉貫齊而上故男子為病內結七疝女子為病則帶下痲聚也以衝脉俠

齊而上並少陰之經上至胃中故衝脉為病則逆氣裏急也

督脉者起於少腹以下骨中央女子入繫廷孔

起非初起亦猶任脉衝脉起於胞中也其實乃起於腎下至於

少腹則下行於腰橫骨圍之中央也繫廷孔者謂窈其孔溺孔之端也

其孔溺孔之端也其絡循陰器合纂間繞纂後

督脉別絡自溺孔之端分而各行下循陰器乃合纂間也所謂

後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉

貫脊屬腎別謂別絡分而各行之於焦也足少陰之絡者自股內後廉貫

脊屬腎足太陽絡之外行者循滑樞絡股陽而下其中行者下

貫腎至膈中與外行絡合故言至少陰與巨陽中絡合少陰上

股內後廉貫脊屬腎也新校正云詳各行於焦疑焦字誤與太陽起

於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髃

內俠脊抵腰中入循脊絡腎其男子循莖下

至纂與女子等其少腹直上者貫齊中央上貫心入

喉上頤環唇上繫兩目之下中央自與太陽起於目內眥下至

直行者自尻上循脊裏而至於鼻人也自其少腹直上至兩目之下中央並任

脉之行而云是督脉所繫由此言之則任脉衝脉督脉名異而同體也

此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝

尋此生病正是任脉經云為衝疝者正明督脉以別主而異目也何者若一脉一氣

其女子而無陰陽之異主則此生病者當心背俱痛豈獨衝心而為疝乎

不孕瘞痔遺溺嗌乾亦以衝脉任脉並自少腹上至於咽喉又以督

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔

脉循陰器合纂間繞纂後別繞臀故不孕瘞痔



遺溺嗑乾也所以謂之任脉者女子得之以任養也故經云此病其女子不孕也所以謂之衝脉者以其氣上衝也故經云此生病從少腹上衝心而痛也所以謂之督脉者以其督領經脉之海也由此三督脉生病治督脉治用故一源三歧經或通呼似相謬引故下文曰

**在骨上甚者**在齊下營

此亦正任脉之分也衝任督三脉異名同體亦明矣骨上謂腰橫骨上髻際中曲骨穴也

任脉足厥陰之會刺可入同身寸之一寸半若灸者可灸三壯齊下謂齊直下同身寸之一寸陰交穴任脉陰衝之會刺可入同身寸之八分若灸者可灸五

壯 **其上氣有音者**治其喉中央在缺盆中者

中謂缺盆兩間之中天突穴在

頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

**其病上衝喉者**

**治其漸漸者**上俠頤也

陽明之脉漸上頤而環脣故以俠頤名為漸也

分陷中動脉足陽明脉氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

**蹇膝伸不屈**治其捷

蹇膝謂膝

痛屈伸蹇難也捷謂髀輔骨上橫骨下股外之中側立搖動取之筋動應手

**坐而膝痛**治其機 機謂骨兩傍相接處立

**而暑解**治其骸關

暑熱也若膝痛立而膝骨解中熱者治其骸關骸關謂膝解也一經云起而引解言膝痛起立痛引

膝骨解之中也暑引二字其義則異起立二字其意頗同

**膝痛痛及**拇指治其臑

臑謂膝解之後曲脚之中委中

穴背面取之脉動應手足太陽脉之所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯

**坐而膝痛**如物隱者

**治其關**

關在臑上當捷之後背立按之以動搖筋應手

**膝痛不可**屈伸治其背內

謂大杼穴

也所在灸刺分壯與氣穴同法

**連筋若折**治陽明中俞膠

若膝痛不可屈伸連筋痛如折者則鍼陽明脉

中俞膠也是則正取三里穴也

**若別治**巨陽少陰榮

若痛而膝如別離者則治足太陽少陰之榮也足太陽榮通谷

也在足小指外側本節前陷者中刺可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯足少陰榮然谷也在足內踝前起大骨下陷者中刺可入同身寸之三分

留三呼若灸者可灸三壯

**淫灑脛痠**不能久立治少陽之維

新校正云按甲乙經外踝上五

寸乃足少陽之絡此云維者字之誤也

**在外上**五寸

淫灑謂似酸痛而無力也三寸一云四寸中誥圖經外踝上四寸無穴五寸是

光明穴也足少陽之絡刺可入同身寸之七分留十呼若灸者可灸五壯

**輔骨上橫骨**

**下為捷俠**髓為機膝解為骸關俠膝之骨為連骸骸



下為輔輔上為腦腦上為關頭橫骨為枕由是則謂膝輔骨上腰髖骨下

為捷捷上為機膝外為骸關捷後為關關下為腦腦下為輔骨輔骨上為連骸連骸者是骸骨相連接處也頭上之橫骨為枕骨水俞五十

七穴者尻上五行行五伏菟上兩行行五左右各一

行行五踝上各一行行六穴所在刺灸分壯具水熱穴論中此皆是骨空故氣穴篇內與此重言爾

髓空在腦後三分在顛際銳骨之下是謂風府通腦中也一在斷基

下當頤下骨陷中有穴容豆中誥名下顛一在項後中復骨下謂瘖門穴也在項髮際宛宛中入系舌本督脉陽維

之會仰頭取之刺可入同身寸之四分禁不可灸一在脊骨上空在風府上上謂腦戶穴也在枕骨上大羽

後同身寸之一寸五分宛宛中督脉足太陽之會此別腦之戶不可妄灸灸之不幸令人瘖刺可入同身寸之三分留三呼新校正云按甲乙經大羽者強

間之別名氣府注云脊骨下空在尻骨下空不應主療經闕其名

若灸者可灸五壯強在脊骶端正端正在尻骨下主氏云不應主療經闕其名得非誤乎數髓空在面俠鼻謂顛膠等穴經不二指陳其處小小者爾

或骨空在口下當兩肩謂大迎穴也所在刺灸分壯與前俠頤同法兩膊骨空在

膊中之陽近肩髃穴經無名臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨空之

間在支溝上同身寸之一寸是謂通間新校正云按甲乙經支溝上一寸名三陽絡通問豈其別名歟股骨上空在股

陽出上膝四寸在陰市上伏菟穴下在承捷也髀骨空在輔骨之上端謂犢鼻穴

也在膝髓下斷骨上俠解大筋中足陽明脉氣所發刺可入同身寸之六分若灸者可灸三壯耳股際骨空在毛中動

下經闕其名尻骨空在髀骨之後相去四寸是謂尻骨八膠穴也扁骨有

滲理湊無髓孔易髓無空扁骨謂尻間扁尻骨也其骨上有滲灌文理歸湊之無別髓孔也易亦也骨有

孔則髓有孔骨若無孔髓亦無孔也灸寒熱之法先灸項大椎以年為壯數如患

年尾窮謂次灸檪骨以年為壯數背脊骨視背俞陷者灸之際有陷

也舉臂肩上陷者灸之肩髃穴也在肩端兩骨間手陽明躡脉之會刺可入同身寸之六分留六呼若灸者可灸三壯



兩季脇之間灸之

京門穴腎募也在髀骨與腰中季脇本俠脊刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯外踝

上絕骨之端灸之

陽輔穴也在足外踝上輔骨前絕骨之端如前同身寸之三分所去丘虛七寸足少陽脉之所行也刺可

入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯

足小指次指間灸之

俠谿穴也

新校正云按甲乙經云在外踝上四寸在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脉之所流也刺可入同身寸之三留三呼若灸者可灸三壯

陷脉灸之

承筋穴也在腓中央陷者中足太陽脉氣所發也禁不可刺若灸者可灸三壯新校正云按刺腰痛篇注云腓中央如外陷

者外踝後灸之

崑崙穴也在足外踝後跟骨上陷者中細脉動應手足太陽脉之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可

灸三壯 缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之

經關其名當隨其所有而灸之膺中

陷骨間灸之

天突穴也所在灸刺分壯與前缺盆中者同法

掌束骨下灸之

陽池穴也在手表腕上陷者中

手少陽脉之所過也刺可入同身寸之二分留六呼若灸者可灸三壯

齊下關元三寸灸之

正在齊下同身寸之三寸

也足三陰任脉之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯新校正云按氣府注去刺可入一寸二分者非

毛際動脉灸之

以脉動應手為處即氣街穴也

膝下三寸分間灸之

三里穴也在膝下同身寸之三寸筋骨外廉兩筋肉分間足陽明脉

之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯

足陽明跗上動脉灸之

衝陽穴也在足跗上同身

寸之五寸骨間動脉足陽明脉之所過也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經及全元起本足陽明下有灸之二字并跗

上動脉是二穴今王氏去灸之二字則見二穴今於注中却存灸之二字以闕疑之

巔上一灸之

百會穴也在頂中

督脉足太陽脉之交會刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯

犬所嚙之處灸之三壯即以犬

傷病法灸之

大傷而發寒熱者即以犬傷法三壯灸之

凡當灸二十九處傷食灸之

傷食為病亦發寒熱故灸新校正云詳足陽明不別灸則有二十八處疑王氏去上文灸之二字者非

不已者必視其經

之過於陽者數刺其俞而藥之

水熱穴論篇第六十一

新校正云按全元起本在第八卷

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水歧伯對曰腎



者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也

陰也水王於冬故云至陰者盛水也腎少陰脉從腎上貫肝鬲入肺中故云其本在腎其末在肺也腎氣上逆則水氣客於肺中故云皆積水也帝曰

腎何以能聚水而生病歧伯曰腎者胃之關也關門

不利故聚水而從其類也

關者所以司出入也腎主下焦膀胱為府主其分注關竅二陰故腎氣化則二

陰通二陰閱則胃填滿故云腎者胃之關也關閉則水積水積則氣停氣停則水生水生則氣溢氣水同類故云關閉不利聚水而從其類也靈樞經曰下

焦溢為水此之謂也上下溢於皮膚故為跗腫跗腫者聚水而生病

也

上謂肺下謂腎肺腎俱溢故聚水於腹中而生病也帝曰諸水皆生於腎乎歧伯曰腎

者牝藏也

牝陰也亦主陰位故云牝藏地氣上者屬於腎而生水液也

故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不

得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏

傳為跗腫本之於腎名曰風水

勇而勞甚謂力房也勞勇汗出則玄府開汗出逢風則玄府復

閉玄府閉已則餘汗未出內伏皮膚傳化為水從風而水故名風水所謂玄府者汗空也

汗液色玄從空而出以汗聚於裏故謂之玄帝曰水俞五十七處者是何主也歧伯曰腎

俞五十七穴積陰之所聚也水所從出入也尻上五

行行五者此腎俞

背部之俞凡有五行當其中者督脉氣所發次兩傍四行皆足太陽脉氣也故水病

下為跗腫大腹上為喘呼

水下居於腎則腹至足而跗腫上入於肺則喘息賁急而大呼也不得

卧者標本俱病

標本者肺為標腎為本如故肺為喘呼腎為水

腫肺為逆不得卧

肺為喘呼氣逆不得卧者以其主呼吸故也腎為水腫者以其主水故也分為相輸俱

受者水氣之所留也

分其居處以名之則是氣相輸應本其俱受病氣則皆是水所留也伏菟上各



二行行五者此腎之街也

街謂道也腹部正俞凡有五行俠齊兩

兩傍則胃府足陽明脉氣所發此四行穴則伏菟之上也

三陰之所交結於脚也踝上各一

行行六者此腎脉之下行也名曰太衝

腎脉與衝脉並下行循足合而盛大故曰

太衝凡五十七穴者皆藏之陰絡水之所客也

經所謂五十七者然尻上五行

行五則背脊當中行督脉氣所發者脊中懸樞命門腰俞長強當其處也次俠督脉兩傍足太陽脉氣所發者有大腸俞小腸俞膀胱俞中脘內俞白環俞當其處也又次外俠兩傍足太陽脉氣所發者有胃倉育門志室胞育秩邊當其處也伏菟上各二行行五者腹部正俞俠中行任脉兩傍衝脉足少陰之會者有中注四滿氣穴大赫橫骨當其處也次俠衝脉足少陰兩傍足陽明脉氣所發者有外陵大巨水道歸來氣街當其處也踝上各一行行六者足內踝之上海交信築賓三穴陰蹻既足少陰脉之別亦可通而主之兼此數之猶少一穴脊中在第十一推節下間俠而取之刺可入同身寸之五分不可灸令人僂懸樞在第十三推節下間伏而取之刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯命門在第十四推節下間伏而取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯腰俞在第二十一推節下間刺可入同身寸之二分 新校正云按甲乙經及繆

刺論注并熱穴注俱云刺入二寸而刺熱注氣府注并此注作二分宜從二分之說 留七呼若灸者可灸三壯長強在脊骶端督脉別絡少陰所結刺可入

同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯此五穴者並督脉氣所發也 新校正云詳王氏云少一穴按氣府論注十二推節下有陽關一穴若通數陽關則

不少矣 次俠督脉兩傍大腸俞在第十六推下俠督脉兩傍去督脉各同身寸之一寸半刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯小腸俞在第十

八推下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞膀胱俞在第十九推下兩傍相去及刺灸分壯法如大腸俞中脘內俞在第二十推下兩傍相去及刺灸分壯法

如大腸俞俠脊脂肺起肉留十呼白環俞在第二十一推下兩傍相去如大腸俞伏而取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經

云刺可入八分不可灸此五穴者並足太陽脉氣所發所謂腎俞者則此也又次外兩傍胃倉在第十二推下兩傍相去各同身寸之三寸刺可入同身寸之

五分若灸者可灸三壯育門在第十三推下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉志室在第十四推下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉正坐取之胞育在第十

九推下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉伏而取之秩邊在第二十一推下兩傍相去及刺灸分壯法如胃倉伏而取之此五穴者並足太陽脉氣所發也次

伏菟上兩行中注在齊下同身寸之五分兩傍相去任脉各同身寸之五分 新校正云按甲乙經同氣府注云俠中行方一寸文異而義同 四滿在中注

下同身寸之一寸氣穴在四滿下同身寸之一寸大赫在氣穴下同身寸之一寸橫骨在大赫下同身寸之一寸各橫相去同身寸之一寸並衝脉足少陰之



會刺可入同身寸之一寸若灸者可灸五壯次外兩傍穴外陵在齊下同身寸之一寸新校正云按氣府論注云外陵在天樞下一寸與此正同兩傍去衝脉各同身寸之一寸半大巨在外陵下同身寸之一寸水道在大巨下同身寸之三寸歸來在水道下同身寸之三寸氣街在歸來下新校正云按氣府注刺熱注熱穴注云在腹齊下橫骨兩端鼠鼯上一寸刺禁注云在腹下俠齊兩傍相去四寸鼠僕上一寸動脉應手骨空注云在毛際兩傍鼠鼯上諸注不同今備錄之鼠鼯上同身寸之一寸各橫相去同身寸之二寸此五穴者並足陽明脉氣所發水道刺可入同身寸之二寸半若灸者可灸五壯氣街刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯餘三穴並刺可入同身寸之八分若灸者並可五壯所謂腎之街者則此也踝上各一行行六者太鍾在足內踝後街中新校正云按甲乙經云跟後衝中刺瘡注刺腰痛注作跟後街中動脉此云內踝後此注非足少陰絡別走太陽者刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯復溜在內踝上同身寸之二寸陷者中足少陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯照海在內踝下刺可入同身寸之四分留六呼若灸者可灸三壯交信在內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯築賓在內踝上腓分中陰維之郄刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脉之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯所謂腎經之下行名曰太衝者則此也

**帝曰春取絡脉分肉何**

**也岐伯曰春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脉常深其氣少不能深入故取絡脉分肉間帝曰夏取盛經分腠何也岐伯曰夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱陽氣留溢新校正云按別本留一作流熱熏分腠內至於經故取盛經分腠絕膚而病去者邪居淺也絕謂絕破令病得出也所謂盛經者陽脉也帝曰秋取經俞何也岐伯曰秋者金始治肺將收殺三陰已升故漸將收殺金將勝火陽氣在合金王火衰故云金將勝火陰氣初勝濕氣及體以漸於雨濕霧露故云濕氣及體陰氣未盛未能深入故取俞以寫陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合新校正云按皇甫士安云是謂始秋之治變帝曰冬取井榮何也岐伯曰冬**



者水始治腎方閉陽氣衰少陰氣堅盛巨陽伏沈陽

脉乃去去謂下去故取井以下陰逆取榮以實陽氣新校正云按全元起

本實作遣甲乙經千金方作通故曰冬取井榮春不軌衄新校正云按皇甫士安云是謂未冬之治變

此之謂也新校正云按此與四時刺逆從論及診要經終論義頗不同與九卷之義相通帝曰夫子言治

熱病五十九俞余論其意未能領別其處願聞其處

因聞其意歧伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱

逆也頭上五行者當中行謂上星顙會前頂百會後頂次兩傍謂五處承光通天絡却玉枕又次兩傍謂臨泣目窓正營承靈腦空也上星在顙上

直鼻中央入髮際同身寸之一寸陷者中容豆刺可入同身寸之三分顙會在

上星後同身寸之一寸陷者中刺可入同身寸之四分前頂在顙會後同身寸

之一寸五分骨間陷者中刺如顙會法百會在前頂後同身寸之一寸五分頂

中央旋毛中陷容指督脉足太陽脉之交會刺如上星法後頂在百會後同身

寸之二寸五分枕骨上刺如顙會法然是五者皆督脉氣所發也上骨留六呼

若灸者並可灸五壯次兩傍穴五處在上星兩傍同身寸之一寸五分承光在

五處後同身寸之一寸通天在承光後同身寸之一寸五分絡却在通天後同

身寸之一寸五分玉枕在絡却後同身寸之七分然是五者並足太陽脉氣所

發刺可入同身寸之三分五處通天各留七呼絡却留五呼玉枕留三呼若灸

者可灸三壯新校正云按甲乙經承光不灸玉枕刺入二分又刺兩傍臨泣

在頭直目上入髮際同身寸之五分足太陽少陽陽維三脉之會目窓正營遞

相去同身寸之一寸承靈腦空遞相去同身寸之一寸五分然是五者並足少

陽陽維二脉之會腦空一穴刺可入同身寸之四分餘並大杼膺俞缺盆

背俞此八者以寫胃中之熱也

大杼在項第一推下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督

脉別絡手足太陽三脉氣之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸五

壯新校正云按甲乙經并氣穴注作七壯刺瘡注刺熱注作五壯膺俞者

膺中之俞也正名中府在胃中行兩傍相去同身寸之六寸雲門下一寸乳上

三肋間動脉應手陷者中仰而取之手足太陽脉之會刺可入同身寸之三分

留五呼若灸者可灸五壯缺盆在肩上橫骨陷者中手陽明脉氣所發刺可入

同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯背俞即風門熱府俞也在第二推下

兩傍各同身寸之一寸三分督脉足太陽之會刺可入同身寸之五分留七呼

若灸者可灸五壯今中誥孔穴圖經雖不名之既曰風門熱府即治熱之背俞

也新校正云按王氏注刺熱論云背俞未詳何處注此指名風氣街三里

門熱府注氣穴論以大杼為背俞三經不同者蓋亦疑之者也



巨虛上下廉此八者以寫胃中之熱也

氣街在腹齊下橫骨兩端鼠鼯上同身寸之一

寸動脈應手足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯

壯新校正云按氣街諸注不同具前水穴注中三里在膝下同身寸之三寸斷外廉兩筋肉分間足陽明脈之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下同身寸之三寸足陽明

脈氣所發刺可入同身寸八分若灸者可灸三壯巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下同身寸之三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可

灸三壯也雲門髃骨委中髓空此八者以寫四支之熱也

雲門在巨骨下

胃中行兩傍相去同身寸之六寸動脈應手足太陰脈氣所發新校正云按甲乙經同氣穴注作手太陰刺熱注亦作手太陰舉臂取之刺可入同身寸

之七分若灸者可灸五壯驗今中誥孔穴圖經無髃骨穴有肩髃穴在肩端兩骨間手陽明躡脈之會刺可入同身寸之六分留六呼若灸者可灸三壯委

中在足膝後屈處臑中央約文中動脈足太陽脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯按今中誥孔穴圖經云腰俞穴一各髓空在脊中第二十一椎節下主汗不出足清不仁督脈氣所發也刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸三壯

新校正云詳腰俞刺入二寸當作二分以具前水穴五藏俞傍五此十者以寫五藏之熱也

俞傍五者謂魄戶神堂魂門意舍志室五

穴俠脊兩傍各相去同身寸之三寸並足太陽脈氣所發也魄戶在第三椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸五壯神堂在第五椎下兩

傍刺可入同身寸之三分若灸者可灸五壯魂門在第九椎下兩傍正坐取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯意舍在第十一椎下兩傍正坐取之

刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯志室在第十四椎下凡此五十

九穴者皆熱之左右也帝曰人傷於寒而傳為熱何

也岐伯曰夫寒盛則生熱也

寒氣外凝陽氣內鬱腠理堅緻元府閉封緻則氣不宣通封則濕氣

內結中外相薄寒盛熱生故人傷於寒轉而為熱汗之而愈則外凝內鬱之理可知斯乃新病數日者也

### 重廣補注黃帝內經素問卷第十六

骨空論膊捷鬻水熱穴論菟闕

溜力救髌音緻馳二



重廣補注黃帝內經素問卷第十七

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

調經論篇第六十二

新校正云按全元起本在第一卷

黃帝問曰余聞刺法言有餘寫之不足補之何謂有餘何謂不足歧伯對曰有餘有五不足亦有五帝欲何問帝曰願盡聞之歧伯曰神有餘有不足氣有餘有不足血有餘有不足形有餘有不足志有餘有不足凡此十者其氣不等也

神屬心氣屬肺血屬肝形屬脾志屬腎以各有所宗故不等也

帝曰

人有精氣津液四支九竅五藏十六部三百六十五節乃生百病百病之生皆有虛實今夫子乃言有餘



有五不足亦有五何以生之乎

鍼經曰兩神相薄合而成形常先身生是謂精上焦開發宣五

穀味熏膚充身澤毛若霧露之漑是謂氣腠理發泄汗出湊理是謂津液之滲於空竅留而不行者為液也十六部者謂手足二九竅九五藏五合為十六部也三百六十五節者非謂骨節是神氣出入之處也鍼經曰所謂節之交三百六十五會皆神氣出入遊行之所非骨節也言人身所有則多所舉則少病生之數何以論之岐伯曰皆生於五藏也謂五神藏也夫心藏神肺藏氣肝

藏血脾藏肉腎藏志而此成形

言所以病皆生於五藏者何哉以內藏五神而成形也志

意通內連骨髓而成身形五藏

志意者通言五神之大凡也骨髓者通言表裏之成化也言五神通泰骨

髓化成身形既立乃五藏互相為有矣

五藏之道皆出於經隧以行

血氣血氣不和百病乃變化而生是故守經隧焉

潛

道也經脈伏行而不見故謂之經隧焉血氣者人之神邪侵之則血氣不正血氣不正故變化而百病乃生矣然經脈者所以決死生處百病調虛實故守經

隧焉新校正云按甲乙經經隧作經渠義各通

帝曰神有餘不足何如岐伯曰神有

餘則笑不休神不足則悲

心之藏也鍼經曰心藏脈脈舍神心氣虛則悲實則笑不休也悲一為憂誤也

新校正云詳王注云悲一為憂誤也按甲乙經及太素并全元起注本並作憂皇甫士安云心虛則悲悲則憂心實則笑笑則喜夫心之與肺脾之與心互相成也故喜發於心而成於肺思發於脾而成於心一過其節則二藏俱傷楊上善云脾之憂在心變動也肺之憂在肺之志是則肺主秋憂為正也心主於

夏變而生憂也

血氣未并五藏安定邪客於形洒淅起於毫毛

未入於經絡也故命曰神之微

并謂并合也未與邪合故曰未并也洒淅寒自也始起於毫毛

尚在於小絡神之微病故命曰神之微也

新校正云按甲乙經洒淅作淅厥太素作洒淅楊上善云洒淅毛孔也水逆流曰洒謂邪氣入於腠理如水逆流於

帝曰補寫奈何岐伯曰神有餘則寫其小絡之血出

血勿之深斥無中其大經神氣乃平

邪入小絡故可寫其小絡之脈出其血勿深推

鍼鍼深則傷肉也以邪居小絡故不欲令鍼中大經也絡血既出神氣自平斥推也小絡孫絡也鍼經曰經脈為裏支而橫者為絡絡之別者為孫絡平謂平

調也新校正云詳此注引鍼經曰與三部九候論注兩引之在彼云靈樞而此曰鍼經則王氏之意指靈樞為鍼經也按今素問注中引鍼經者多靈樞之文



但以靈樞今不全 神不足者視其虛絡按而致之刺而利之

故未得盡知也 無出其血無泄其氣以通其經神氣乃平

但通經脈令其和利抑按虛絡 令其氣致以神不足故不欲出血及泄氣

新校正云按甲乙經按作切利作和 帝曰刺微奈何

覆前初起於毫毛未入於經絡 者 岐伯曰按摩勿釋著鍼勿斥移氣於不足神氣乃得

復 按摩其病處手不釋散著鍼於病處亦不推之使其人神氣內朝於鍼移其 素云移氣於足無不字楊上

善云按摩使氣至於踵也 帝曰善有餘不足奈何岐伯曰氣

有餘則喘欬上氣不足則息利少氣

肺之藏也肺藏氣息不利則喘鍼經曰肺氣虛 則息利少氣實則 喘喝胃憑仰息也

血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白 氣微泄

肺合脾其色白故皮膚微泄 帝曰補寫奈何岐伯曰氣有餘

則寫其經隧無傷其經無出其血無泄其氣不足則

補其經隧無出其氣

氣謂榮氣也鍼寫若傷其經則血出而榮氣泄脫故不欲出血泄氣但寫其衛氣而已鍼補則 又宜謹閉穴俞然其衛氣亦不欲泄之

新校正云按楊上善云經隧者手太陰之別從手太陰走手陽明乃是手太陰向手陽明之道欲道藏府陰陽故補 寫皆從正經別走之絡寫其陰

經別走之路不得傷其正經也 帝曰刺微奈何

覆前白氣微泄者 岐伯曰按

摩勿釋出鍼視之曰我將深之適人必革精氣自伏

邪氣散亂無所休息氣泄腠理具氣乃相得

亦謂按摩其病處也革皮也我將深之適人必革者謂其深而淺刺之也如是脇從則人懷懼色故精氣 潛伏也以其調適於皮精氣潛伏邪無所據故亂散而無所休息發泄於腠理

也邪氣既泄具氣乃與皮腠相得矣 新校正云按楊上善云革改也夫人聞樂至則身心忻悅聞痛及體情必改異忻悅則百體俱縱改革則情志必拒拒

則邪氣消伏 帝曰善血有餘不足奈何岐伯曰血有餘則怒 不足則恐

肝之藏也鍼經曰肝藏血肝氣虛則恐實則怒 新血氣未 并五藏安定孫絡水溢則經有留血

絡有邪盛則入於經故云孫絡水溢則經有留血



帝曰補寫柰何岐伯曰血有餘則寫其盛經出其血不

足則視其虛經內鍼其脉中久留而視新校正云按甲乙經云久留之血至太素

同脉大疾出其鍼無令血泄脉盛滿則血有餘故出之經氣虛則血不足故無令血泄也久留疾出是謂補

之鍼解論曰徐而疾則實義與此同帝曰刺留血柰何岐伯曰視其血絡刺出

其血無令惡血得入於經以成其疾血絡滿者刺按出之則惡色之血不得入於經

帝曰善形有餘不足柰何岐伯曰形有餘則腹脹溼

溼不利不足則四支不用脾之藏也鍼經曰脾氣虛則四支不用五藏不安實則腹脹溼溼不利溼大便

溼小便也新校正云按楊上善云溼作經婦人月經也血氣未并五藏安定肌肉蠕動命

曰微風邪薄肉分衛氣不通陽氣內鼓故肉蠕動新校正云按全元起本及甲乙經蠕作溢太素作濡帝曰補寫柰

何岐伯曰形有餘則寫其陽經不足則補其陽絡普胃之經絡

帝曰刺微柰何岐伯曰取分肉間無中其經無傷其

絡衛氣得復邪氣乃索衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔故肉蠕動即取分肉間但開肉分以出其邪故無中其經無傷其絡衛氣復舊而邪氣盡素散盡也帝曰善志有餘不足柰何岐伯

曰志有餘則腹脹殮泄不足則厥腎之藏也鍼經曰腎藏精精含志腎氣虛則厥實則脹脹

謂脹起厥謂逆行上衝也足少陰脉下行令氣不足故隨衝脉逆行而上衝也

血氣未并五藏安定骨節有動腎合骨故骨有邪薄則骨節段動或骨節之中如有物鼓動之也帝曰補寫柰何岐伯曰志

有餘則寫然筋血者新校正云按甲乙經及太素云寫然筋血者出其血楊上善云然筋當是然谷下筋再詳諸處

不足則補其復溜然謂然谷足少陰榮也

引然谷者多去然骨之前血者疑少骨之二字前字誤作筋字

之下陷者中血絡盛則泄之其刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯

壯復溜足少陰經也在內踝上同身寸之二寸陷者中刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯



邪所乃能立虛

不求穴俞而直取居邪之處故去即取之  
新校正去按甲乙經邪所作以去其邪

帝曰善矣

已聞虛實之形不知其何以生歧伯曰氣血以并陰

陽相傾氣亂於衛血逆於經血氣離居一實一虛

故氣亂於衛血行經內故血逆  
於經血氣不和故一虛一實

血并於陰氣并於陽故為驚狂

氣并於陽則陽氣  
外盛故為驚狂

血并於陽氣并於陰乃為炅中

氣并於陰則  
陽氣內盛故

為熱中  
炅熱也

血并於上氣并於下心煩惋善怒血并於下氣

并於上亂而喜忘

上謂鬲上  
下謂鬲下

帝曰血并於陰氣并於陽如

是血氣離居何者為實何者為虛歧伯曰血氣者喜

溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去之

泣謂如雪在水  
中凝住而不行

也是故氣之所并為血虛血之所并為氣虛

氣并於血則血  
少故血虛血并

於氣則氣  
少故氣虛

帝曰人之所有者血與氣耳今夫子乃言血

并為虛氣并為虛是無實乎歧伯曰有者為實無者

為虛

氣并於血則血无  
血并於氣則氣无

故氣并則無血血并則無氣今血與

氣相失故為虛焉

氣并於血則血失其氣血并於氣  
則氣失其血故曰血與氣相失

絡之與孫脉

俱輸於經血與氣并則為實焉血之與氣并走於上

則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死帝曰實

者何道從來虛者何道從去虛實之要願聞其故歧

伯曰夫陰與陽皆有俞會陽注於陰陰滿之外陰陽

勻平以充其形九候若一命曰平人

平人謂平  
和之人

夫邪之生

也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑



其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒帝曰風雨之傷人柰何岐伯曰風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脉孫脉滿則傳入於絡脉絡脉滿則輸於大經脉血氣與邪并客於分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛帝曰寒濕之傷人柰何岐伯曰寒濕之中人也皮膚不收新校正云按全元起云不收不仁也甲乙肌肉堅緊榮血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛聶謂聶經及太素云皮膚收無不字帝曰善陰之生實柰何實謂邪氣盛也岐伯曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣

走之故曰實矣新校正云按經云喜怒不節則陰氣上逆疑剩喜字帝曰陰之生虛柰何

虛謂精氣奪也岐伯曰喜則氣下悲則氣消消則脉虛空因寒

飲食寒氣熏滿新校正云按甲乙經作動藏則血泣氣去故曰虛矣帝

曰經言陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒余已聞之矣不知其所由然也經言謂上古經言也岐伯曰

陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄慄謂振慄也

帝曰陰虛生內熱柰何岐伯曰有所勞倦形氣衰少

穀氣不盛上焦不行下脘不通新校正云按甲乙經作下焦不通胃氣熱熱

氣熏胃中故內熱甚用其力致勞倦也貪帝曰陽盛生外熱



柰何歧伯曰上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄

府不通新校正云按甲乙經及太素无玄府二字衛氣不得泄越故外熱外傷寒毒內薄諸陽寒外

盛則皮膚收皮膚收則腠理密故衛氣稽聚无所流行矣寒氣外薄陽氣內爭積火內燔故生外熱也帝曰陰盛生內寒

柰何歧伯曰厥氣上逆寒氣積於胃中而不寫不寫

則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脉不通新校正云按甲乙經作腠理不

通其脉盛大以瀦故中寒溫氣謂陽氣也陰逆內滿則陽氣去於皮外也帝曰陰與

陽并血氣以并病形以成刺之柰何歧伯曰刺此者

取之經隧取血於營取氣於衛用形哉因四時多少

高下營主血陰氣也衛主氣陽氣也夫行鍼之道必先知形之長短骨之廣狹循三備法通計身形以施分寸故曰用形也四時多少高下具在下帝曰血氣以并病形以成陰陽相傾補寫柰何歧伯

篇

曰寫實者氣盛乃內鍼鍼與氣俱內以開其門如利

其戶鍼與氣俱出精氣不傷邪氣乃下外門不閉以

出其疾搖大其道如利其路是謂大寫必切而出大

氣乃屈言欲開其穴而泄其氣也切謂急也言急出其鍼也鍼解論曰疾而徐則虛者疾出鍼而徐按之也大氣謂大邪氣也屈謂退屈也帝

曰補虛柰何歧伯曰持鍼勿置以定其意候呼內鍼

氣出鍼入鍼空四塞精無從去方實而疾出鍼氣入

鍼出熱不得還閉塞其門邪氣布散精氣乃得存動

氣候時新校正云按甲乙經作動無後時近氣不失遠氣乃來是謂追之言但密閉

穴合則勿令其氣散泄也近氣謂已至之氣遠氣謂未至之氣也欲動經氣而為補補者皆必候水刻氣之所在而刺之是謂得時而調之追言補也鍼經曰追而濟之安得無實則此謂也帝曰夫子言虛實者有十生於五藏五藏



五脉耳夫十二經脉皆生其病新校正云按甲乙經云皆生百病太素同今夫子

獨言五藏夫十二經脉者皆絡三百六十五節節有

病必被經脉經脉之病皆有虛實何以合之歧伯曰

五藏者故得六府與為表裏經絡支節各生虛實其

病所居隨而調之從其左右經氣支節而調之病在脉調之血脉者血之府脉實血實脉虛血

虛由此脉病而調之血也 新校正云按全元起本及甲乙經云病在血調之脉病在血調之絡血病則絡脉易故調之於絡也

病在氣調之衛衛主氣故氣病而調之衛也病在肉調之分肉候寒熱而取之病在

筋調之筋適緩急而刺熨之病在骨調之骨察輕重而調之燔鍼劫刺其下

及與急者調筋法也筋急則燒鍼而劫刺之病在骨燔鍼藥熨調骨法也燔鍼火鍼也

病不知所痛兩躄為上兩躄謂陰陽躄脉陰躄之脉出於申脉申脉在足外踝下陷者躄之脉出於申脉申脉在足外踝下陷者

中容爪甲 新校正云按刺腰痛注云在踝下五分 刺可入同身寸之三分 留六呼若灸者可灸三壯照海在足內踝下刺可入同身寸之四分留六呼若

灸者可灸三壯身形有痛九候莫病則繆刺之莫病謂無病也繆刺者刺絡脉左痛刺右右痛刺左

刺痛在於左而右脉病者巨刺之巨刺者刺經脉左痛刺右右痛刺左必謹察

其九候鍼道備矣

### 重廣補注黃帝內經素問卷第十七

調經論隧音遂殞音孫燔音燔煩音煩





重廣補注黃帝內經素問卷第十八

啓享次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

繆刺論

四時刺逆從論

標本病傳論

繆刺論篇第六十三

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞繆刺未得其意何謂繆刺

繆刺言所刺之穴應用如紕繆

也岐伯對曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留而

不去入舍於孫脉留而不去入舍於絡脉留而不去

入舍於經脉內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃

傷此邪之從皮毛而入極於五藏之次也如此則治





其經焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閉塞不通不得入於經流溢於大絡而生奇病也病在血絡是謂奇邪新

校正云按全元起云大絡十五絡也夫邪客大絡者左注右右注左上下左右與

經相干而布於四末其氣無常處不入於經俞命曰

繆刺四末謂四支也帝曰願聞繆刺以左取右以右取左柰何

其與巨刺何以別之歧伯曰邪客於經左盛則右病

右盛則左病亦有移易者新校正云按甲乙經作病易且移左痛未已而右

脉先病如此者必巨刺之必中其經非絡脉也先病者謂彼痛

未止而此先病以承之故絡病者其痛與經脉繆處故命曰繆刺絡謂正經

之傍支非正別也亦兼公孫飛揚等之別絡也新校正云按王氏云非正別也按本論邪客足太陰絡令人腰痛注引從髀合陽明上絡嗑貫舌中乃太陰

之正也亦是兼脉之正安得謂之作正別也帝曰願聞繆刺柰何取之何如歧伯

曰邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胃脇支滿

以其絡支別者並正經從腎上貫肝鬲走於心包故邪客之則病如是無積者刺然骨之前出血如

食頃而已然骨之前然谷穴也在足內踝前起大骨下陷者中足少陰榮也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見

血令人立飢欲食不已左取右右取左言痛在左取之右痛在右取之左餘如此例病新發者

取五日已素有此病而新發先刺之五日乃盡已邪客於手少陽之絡令人喉

痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭以其脉循手表出臂外上肩入缺盆布臆

中散絡心包其支者從臆中上出刺手中指次指爪甲上去端如

韭菜各一痛謂關衝穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯左右手皆刺之故言各一痛痛瘡也新校正

去按甲乙經關衝穴出手小指次指之端今言中指者誤也壯者立已老者有頃已左取右右



取左此新病數日已邪客於足厥陰之絡令人卒疝

暴痛以其絡去內踝上同身寸之五寸別走少陽其支別者循脛上辜結於莖故今人卒疝暴痛辜陰丸也刺足大指爪

甲上與肉交者各一疔謂大敦穴足大指之端去爪甲角如韭葉厥陰之井也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯

男子立已女子有頃已左取右右取左邪客於足太

陽之絡令人頭項肩痛以其經之正者從腦出別下項支別者從臑入絡腦還出別下項王氏云經之正者正當作支刺足小指爪甲上與

肉交者各一疔立已謂至陰穴太陽之井也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯新校正去按甲乙經云在足

小指外側去爪謂金明穴足太陽郄也在外踝下刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯邪客於手陽明之絡

頃已謂金明穴足太陽郄也在外踝下刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯邪客於手陽明之絡

令人氣滿胃中喘息而支脰胃中熱以其經自肩端入缺盆絡脈其支別者從缺盆中直

而上頸故病如是刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一疔左

取右右取左如食頃已謂商陽穴手陽明之井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯新校正去

按甲乙經去商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉邪客於臂掌之間不可得屈刺其

踝後新校正去按全元起云是人之本節踝也先以指按之痛乃刺之以月死

生為數月生一日一疔二日二疔十五日十五疔十六

日十四疔隨日數也月半已前謂之生月半以後謂之死虧滿而異也邪客於足陽蹻之脉

令人目痛從內眦始以其脉起於足上行至頭而屬目內眦故病令人目痛從內眦始也何以明之八十一難經曰

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池鍼經曰陰蹻脉入軌屬目內眦合於太陽陽蹻而上行尋此則至於目內眦也刺外踝之下

半寸所各二疔謂申脉穴陽蹻之所生也在外踝下陷者中容爪甲刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯新校

正云詳血脉痛注去外踝下五分左刺右右刺左如行十里頃而已人有所

木二

木二

木二

木二



隋墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上

傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之

前血脉出血此少陰之絡也 新校正云 詳血脉出血脉字疑是絡字刺足跗上動脉謂衝陽 穴胃之

原也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯主腹大不嗜食以腹脹滿故爾取之不已刺三毛上各一

痛見血立已左刺右右刺左謂大敦穴厥陰之井也善悲驚不樂刺

如右方善悲驚不樂亦如上方刺之邪客於手陽明之絡令人耳聾時不

聞音以其經支者從缺盆上頸貫頰又其絡支別者入耳會於宗脉故病令人耳聾時不聞聲刺手大指次指爪

甲上去端如韭葉各一疳立聞亦同前商陽穴不已刺中指爪

甲上與肉交者立聞謂中衝穴手少陰之井也 甲如韭葉陷者中刺可入同身寸之一分留三

呼若灸者可灸三壯古經脫簡無絡可尋之恐是刺小指爪甲上與肉交者也何以言之下文去手少陰絡會於耳中也若小指之端是謂少衝手少陰之井

刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯新校正云按王氏云恐是小指爪甲上少衝穴按甲乙經手少陰之正上循喉嚨出耳後合少陽完骨之

下如是則安得不刺中衝而疑為少衝也其不時聞者不可刺也不時聞者絡氣已絕故不可刺耳中

生風者亦刺之如此數左刺右右刺左凡痺往來行

無常處者在分肉間痛而刺之以月死生為數用針

者隨氣盛衰以為疳數針過其日數則脫氣不及日

數則氣不寫左刺右右刺左病已止不已復刺之如

法言所以約月死生為數者何以隨氣之盛衰也月生二日一疳二日二疳漸多之十五

日十五疳十六日十四疳漸少之如是刺之則無過數無不及也邪客於足

陽明之經令人軌衄上齒寒以其脉起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤

後下廉出大迎循頰車上耳前故病令人軌衄上齒寒也復以其脉左右交於面部故舉經脉之病以明繆處之類故下文云 新校正云按全元起本與甲



乙經陽明之經 刺足中指次指爪甲上與肉交者各一疔

左刺右右刺左 中當為大亦傳寫中大之誤也據靈樞經孔穴圖經中指次指爪甲上無穴當言刺大指次指爪甲上乃厲充

穴陽明之井不當更有次指二字也厲充者刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯 新校正去按甲乙經去刺足中指爪甲上無次指二字蓋以大指次指為中指義與王注同下文去足陽明中指爪甲上

亦謂此穴也厲充在足大指次指之端去爪甲角如韭葉 邪客於足少

陽之絡令人脇痛不得息欬而汗出 以其脉支別者從目銳眦下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫 刺足小指次指爪甲上與

肉交者各一疔 謂竅陰穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯 新校正去按甲乙經竅陰在足小指次

指之端去爪甲角如韭葉 不得息立已汗出立止欬者温衣飲食一日

已左刺右右刺左病立已不已復刺如法邪客於足

少陰之絡令人嗌痛不可內食無故善怒氣上走賁

上 以其經支別者從肺出絡心注胃中又其正經從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故病令人嗌乾痛不可內食無故善怒氣上走賁上也賁謂氣奔也

新校正云詳王注以賁上為氣奔者非按難經胃為賁所楊玄操云賁鬲也是氣上走鬲上也經既云氣上走安得更以賁為奔上之解邪 刺足

下中央之脉各三疔凡六刺立已左刺右右刺左 謂勇泉穴

少陰之井也在足心陷者中屈足蹠指宛宛中刺 嗌中腫不能內唾時

不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右右刺左

亦足少陰之絡也以其絡並大經喉嚨故爾刺之此二十九字本錯簡在邪客

手足少陰太陰足陽明之絡前今遷於此 新校正云詳王注以其絡並大經

循喉嚨差互按甲乙經足少陰之絡並經上走心包少陰之

經循喉嚨今王氏之注經與絡交互當以甲乙經為正也 邪客於足太

陰之絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰息 足太陰之絡從髀合陽明上貫

尻骨中與厥陰少陽結於下膠而循尻骨內入腹上絡賸貫舌中故腰痛則引

少腹控於眇中也眇謂季脇下之空軟處也受邪氣則絡拘急故不可以仰伸

而喘息也刺腰痛篇中無息字 新校正云詳王注云足太陰之絡按甲乙經乃太陰之正非絡也王氏謂之絡者未詳其旨 刺腰尻之



解兩脾之上是腰俞以月死生為疝數發鍼立已左

刺右右刺左要尻骨間曰解當中有腰俞刺可入同身寸之二寸 新校

分熱穴篇注作二寸甲乙經作二寸 留七呼主與經同中誥孔穴經云左取

右取取左穴當中不應爾也次腰下俠尻有骨空各四皆主腰痛下膠主與經

同是足太陰厥陰少陽所結刺可入同身寸之二寸留十呼若灸者可灸三壯

脾謂兩髀脾也腰俞髀伸皆當取之也 新校正云按此邪客足太陰之絡并

刺法一項已見刺腰痛篇中彼注甚詳此特多是腰俞三字耳別按全元起本

舊無此三字王氏頗知腰俞無左右取之理而注之而不知全元起本舊無

邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脇而痛以其經

左右別下貫脾合膈中故病令人拘攣背急引脇而痛 新校

正云按全元起本及甲乙經引脇而痛下更云內引心而痛

始數脊椎俠脊疾按之應手如痛刺之傍三疝立已

從項始數脊椎者謂從大椎數之至第二推兩傍各同身寸之一寸五分內循

脊兩傍按之有痛應手則邪客之處也隨痛應手深淺即而刺之邪客在脊骨

兩傍故言 邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不可

刺之傍也

舉以其經出氣街繞髮際橫入髀厭中故痛令

人留於髀樞後痛解不可舉也樞謂髀樞也

久留鍼以月死生為數立已髀樞之後則環銚也正在髀樞後

氣所發刺可入同身寸之二寸留二十呼若灸者可灸三壯毫鍼者第七鍼也

新校正云按甲乙經環銚在髀樞中氣穴論云在兩髀厭分中此經云刺樞中

而王氏以謂髀

樞之後者誤也

治諸經刺之所過者不病則繆刺之

王言也

則邪在絡故繆刺之若經所過

有病是則經病不當繆刺矣

耳聾刺手陽明不已刺其通脉

經不病

出耳前者手陽明謂前手大指次指去端如韭葉者也是謂商陽據中誥

孔穴圖經手陽明脉中商陽合谷陽谿偏歷四穴並主耳聾今

經所指謂前商陽不謂此合谷等穴也耳前通脉手陽明

脉正當聽會之分刺入同身寸之四分若灸者可灸三壯

齒齲刺手陽明

據甲乙流注圖經手陽明脉中商陽二

間三間合谷陽谿偏歷温留七穴並主

不已刺其脉入齒中立已

齒痛手陽明脉貫頰入下齒中

足陽明脉循鼻外入上齒中也

邪客於五藏之間其病也脉引

而痛時來時止視其病繆刺之於手足爪甲上

各刺其 井左取



取右視其脉出其血間日一刺一刺不已有血脉者則刺之如此數

取左視其脉出其血間日一刺一刺不已有血脉者則刺之如此數

繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背脉血者去之若病繆傳而引

上齒齒唇寒痛者刺手背陽明絡也足陽明中指爪甲上一疔手大指次指爪甲

上各一疔立已左取右右取左謂第二指厲兌穴也手大指次指謂商陽穴手陽明井也鍼經曰齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明新校正云詳前文邪客足陽明刺中指次指爪甲上是誤刺次指二字當如此只言中指爪甲上乃是也

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於

耳中上絡左角手少陰真心脉足少陰腎脉手太陰肺脉足太陰脾脉足陽明胃脉此五絡皆會於耳中而出絡左額角也

五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或

曰尸厥言其卒冒悶而如死尸身脉猶如常人而動也然陰氣盛於上則下氣熏上而邪氣逆邪氣逆則陽氣亂陽氣亂則五絡閉結而不通故其狀若尸也以是從厥而生故或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉謂隱白穴

足太陰之井也刺可入同身寸之後刺足心也刺同前取涌泉穴法後刺

一分留三呼若灸者可灸三壯

足中指爪甲上各一疔謂第二指足陽明之井也刺同前取厲兌穴法後刺手大指內

側去端如韭葉謂少商穴手太陰之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯後刺手心

謂中衝穴手心主之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯

主謂中衝穴手心主之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一壯新校正云按甲乙經不刺手心主詳此五絡之數亦不及手心主而此刺之

是有六絡未會玉冰相隨注之不為明辨之旨也少陰銑骨之端各一疔立已謂神門穴在掌後銑骨之

端陷者中手少陰之俞也刺可入同身寸之三三分留三呼若灸者可灸三壯

不已以竹管吹其兩耳言使氣入

耳中內助五絡令氣復通也當內管入耳以手密撮之勿令氣泄而極吹之氣

蹙然從絡脉通也新校正云按陶隱居云吹其左耳極三度復吹其右耳三

度髮易其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者

灌之立已左角之髮是五絡血之餘故鬚髮之燔治飲之以美酒也酒者所以行藥勢又灸上而內走於心心主脉故以美酒服之凡刺之數先視其經脉切而從之審其虛實而調之不



調者經刺之有痛而經不病者繆刺之因視其皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也

四時刺逆從論篇第六十四 新校正去按厥陰有餘至筋急目痛全元起本在第六卷春氣在經脉至

篇末全元起本在第一卷

厥陰有餘病陰痺 痺謂痛也陰謂寒也有餘謂厥陰氣盛滿故陰發於外而為寒痺 新校正云詳王氏以痺為痛未通

不足病生熱痺 陰不足則陽有餘故為熱痺 滑則病狐疝風溼則病少

腹積氣 厥陰脉循股陰入髦中環陰器抵少腹又其絡支別者循脛上鞞結於莖故為狐疝少腹積氣也 新校正云按楊上善云狐夜不得尿

日出方得人之所病與狐同故曰狐疝 一曰狐疝謂三焦孤府為疝故曰狐疝 少陰有餘病皮痺隱軫不

足病肺痺 腎水逆連於肺母故也足少陰脉從腎上貫肝 滑則病肺

風疝溼則病積澁血 以其正經入肺貫腎絡膀胱故為肺疝及積澁血也 太陰有餘病肉

痺寒中不足病脾痺 脾主肉故如是 滑則病脾風疝溼則病積

心腹時滿 太陰之脉入腹屬脾絡胃其支別者復從胃別上膈注心中故為脾疝心腹時滿也 陽明有餘病脉

痺身時熱不足病心痺 胃有餘則上歸於心不足則心下痺故為是 滑則病心風疝

溼則病積時善驚 心主之脉起於胃中出屬心包下膈歷絡三焦故為心疝時善驚 太陽有餘病

骨痺身重不足病腎痺 太陽與少陰為表裏故有餘不足皆病歸於腎也 滑則病腎風

疝溼則病積善時顛疾 太陽之脉交於顛上入絡腦下循脊絡腎故為腎風及顛病也 少陽有餘

病筋痺脇滿不足病肝痺 少陽與厥陰為表裏故病歸於脾 滑則病肝風疝

溼則病積時筋急目痛 肝主筋故時筋急厥陰之脉上出額與督脉會於顛其支別者從目系下頰裏故目痛

是故春氣在經脉夏氣在孫絡長夏氣在肌肉秋氣

在皮膚冬氣在骨髓中帝曰余願聞其故岐伯曰春



者天氣始開地氣始泄凍解冰釋水行經通故人氣  
在脉夏者經滿氣溢入孫絡受血皮膚充實長夏者  
經絡皆盛內溢肌中秋者天氣始收腠理閉塞皮膚  
引急引謂牽引以縮急也冬者蓋藏血氣在中內著骨髓通於五  
藏是故邪氣者常隨四時之氣血而入客也至其變  
化不可為度然必從其經氣辟除其邪除其邪則亂  
氣不生得氣而調故不亂帝曰逆四時而生亂氣柰何岐伯曰春  
刺絡脉血氣外溢令人少氣血氣溢於外則中不足故少氣新  
校正云按自春刺絡脉至令人目不  
明與詆要經終論義同文異彼注甚詳於此彼分四時此分五時然此有長夏  
刺肌內之分而逐時各闕刺秋分之事疑此肌肉之分即彼秋皮膚之分也  
春刺肌肉血氣環逆令人上氣血逆氣上故上氣新校正  
云按經闕春刺秋分春

刺筋骨血氣內著令人腹脹內著不散故脹夏刺經脉血氣乃竭

令人解休血氣竭少故解休然不可名之也解休謂寒不寒熱不熱壯不壯弱不弱故不可名之也夏刺肌肉血

氣內却令人善恐却閉也血氣內閉則陽氣不通故善恐夏刺筋骨血氣上逆

令人善怒血氣上逆則怒氣相應故善怒新校正云按經闕夏刺秋分秋刺經脉血氣上逆

令人善忘血氣上逆滿於肺中故善忘秋刺絡脉氣不外行新校正云按別本作血氣不行

令人目不明以血氣無所營故也冬刺絡脉內氣外泄留為大痺冬刺

血氣內散令人寒慄血氣內散則中氣虛故寒慄冬刺經脉血氣皆脫

肌肉陽氣竭絕令人善忘陽氣不壯至春而竭故善忘新校正云按經闕冬刺秋分凡此四

時刺者大逆之病新校正云按全元起本作六經之病不可不從也反之則生亂



氣相淫病焉

淫不次也不次而行如  
浸淫相滌而生病也

故刺不知四時之經病之

所生以從為逆正氣內亂與精相薄必審九候正氣

不亂精氣不轉

不轉謂不  
逆轉也

帝曰善刺五藏中心一日死其

動為噫

診要經終論曰中心者環死  
刺禁論曰一日死其動為噫

中肝五日死其動為語

診要  
經終

論闕而不論刺禁論曰中肝五日死其  
動為語

新校正去按甲乙經語作欠

中肺三日死其動為欬

診要  
經終

論曰中肺五日死刺禁論  
曰中肺三日死其動為欬

中腎六日死

新校正去按甲  
乙經作三日死

其動為噦欠

診要經終論曰中腎七日死刺禁論曰中腎六  
日死其動為噦

新校正去按甲乙經無欠字

中脾十日死

新校正去按  
甲乙經作十

五其動為吞

診要經終論曰中脾五日死刺禁論曰中脾十日死其動  
為吞然此三論皆歧伯之言而死日動變不同傳之誤也

傷人五藏必死其動則依其藏之所變候知其死也

變謂氣動變也中心下  
至此並為逆從重文也

標本病傳論篇第六十五

新校正去按全元起本  
在第二卷皮部論篇前

黃帝問曰病有標本刺有逆從柰何歧伯對曰凡刺

之方必別陰陽前後相應逆從得施標本相移故曰

有其在標而求之於標有其在本而求之於本有其

在本而求之於標有其在標而求之於本故治有取

標而得者有取本而得者有逆取而得者有從取而

得者

得病之情知治大體則  
逆從皆可施必中焉

故知逆與從正行無問知標本

者萬舉萬當

道不疑惑識既深明則  
無問於人正行皆當

不知標本是謂妄行

識猶  
褊淺

道未高深舉且  
見違故行多妄

夫陰陽逆從標本之為道也小而大言一

而知百病之害

著之至也言別陰陽知逆順法明著見精微觀其所舉  
則小尋其所利則大以斯明著故言一而知百病之害



少而多淺而博可以言一而知百也

言少可以貫多舉淺可以料大者何法之明故

非聖人之道孰能至於是耶故學之者猶可以言一而知百病也博大也

以淺而知深察近而知遠言

標與本易而勿及

雖事極深立人非咫尺略以淺近而悉貫之然標本之道雖易可為言而世人識見無能及者

反為逆治得為從先病而後逆者治其本先逆而後

病者治其本先寒而後生病者治其本先病而後生

寒者治其本先熱而後生病者治其本先熱而後生

中滿者治其標先病而後泄者治其本先泄而後生

他病者治其本必且調之乃治其他病先病而後先

中滿者治其標先中滿而後煩心者治其本人有客氣有

同氣

新校正去按全元起本同作固

小大不利治其標小大利治其本

本先病標

後病必謹察之

病發而有餘本而標之先治其本後治其標病

發而不足標而本之先治其標後治其本

本而標之謂有先病復有後病

也以其有餘故先治其本後治其標也標而本之謂先發輕微緩者後發重大急者以其不足故先治其標後治其本也

謹察間甚以

意調之

間謂多也甚謂少也多謂多形證而輕易少謂少形證而重難也

間

者并行甚者獨行先小大不利而後生病者治其本

并謂他脉共受邪氣而合病也獨為一經受病而先異氣相參也并其則相傳傳急則亦死

夫病傳者心病先心

痛

藏真通於心故心先痛

一日而欬

心火勝金傳於肺也肺在變動為欬故爾

三日脇支痛

肺金勝木傳於肝也

以其脉循脇肋故如是

五日閉塞不通身痛體重

肝木勝土傳於脾也脾性安鎮木氣乘之故閉塞不通身

痛體

三日不已死

以勝相伐唯弱是從五藏四傷豈其能久故為即死

冬夜半夏日中

謂正子午之時

也或言冬夏有異非也晝夜之半事甚昭然

新校正云按靈樞經夫氣入藏病先發於心一日而之肺三日而之肝五日而之脾三日不已死冬夜半夏日



中甲乙經曰病先發於心心痛一日之肺而欬五日之肝肋支痛五日之脾閉塞不通身病躄重三日不已死冬夜半夏日中詳素問言其病靈樞言其藏甲乙經及并素問靈樞二經之文而病與藏兼舉之

肺病喘欬藏真高於肺而主息故喘欬也三日而脇支滿痛肺傳一日身重體痛於脾五日而脹自傳十日不已死冬日入

夏日出孟冬之中日入於申之八刻三分仲冬之中日入於申之七刻三分季冬之中日入於申與孟月等孟夏之中日入於寅之八刻一分仲夏之中日入於寅十刻三分季夏之中日入於寅與孟月等也

肝病頭目眩脇支滿藏真散於肝肋內連目脇故如

是三日體重身痛於肺五日而脹自傳三日腰脊少腹痛脛

痠謂胃傳於腎以其脉起於足循膈內出胸內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱故如是也腰為腎之府故腰痛三日不已死冬

日入新校正云按甲乙經作日中夏早食日入早晏如冬法也早食謂早於食時則卯正之時也脾病身痛

體重藏真濡於脾而主肌肉故爾一日而脹自傳二日少腹腰脊痛脛痠胃傳

三日背脇筋痛小便閉自傳於府十日不已死冬人定夏

晏食人定謂申後二十五刻晏食謂寅後二十五刻腎病少腹腰脊痛脛痠藏真下於腎故如是

三日背脇筋痛小便閉自傳於府新校正云按靈樞經云

三日兩脇支痛府傳於藏新校正云

日腹脹膀胱傳於小腸新校正云按靈樞經云三日之上之心心脹

三日不已死冬大晨夏

晏晡大晨謂寅後九刻大明之時也晏晡謂申後九刻向昏之時也胃病脹滿以其脉循腹故如是五日少

腹腰脊痛脛痠胃傳三日背脇筋痛小便閉自傳於府及之脹也

五曰身體重膀胱水府傳於脾也新校正云按靈樞經及甲乙經各云五日上之心是膀胱傳心為相勝而身體重今王氏

言傳脾者誤也六日不已死冬夜半後夏日昝夜半後謂子後八刻丑正時也日昝謂午後八

時也膀胱病小便閉以其為津液之府故爾五日少腹脹腰脊痛

時未正膀胱病小便閉於小腸一日身體痛小腸傳於脾新校正云按靈樞經云一日上



之心是府傳於藏也甲  
乙經作之脾與王注同  
二日不已死冬雞鳴夏下晡雞鳴謂早

之分也下晡謂日下於  
晡時申之後五刻也  
諸病以次是相傳如是者皆有死期

不可刺五藏相移皆如此有緩傳者有急傳者緩者或一歲二歲三歲而

而死則此類也尋此病傳之法皆五行之氣考其日數理不相應夫以五行爲

紀以不勝之數傳於所勝者謂火傳於金當云一日金傳於木當云二日木傳

於土當云四日土傳於水當云三日水傳於火當云五日也若以已勝之數傳

於不勝者則木三日傳於土土五日傳於水水一日傳於火火二日傳於金

四日傳於水經之傳日似法三陰三陽之氣王機真藏論曰五藏相通移比有

次不治三月若六月若三日若六日傳而當死此與同也雖爾猶當臨病詳視

日數方悉是非爾閒一藏止新校正云按甲及至三四藏者乃可刺

也閒一藏止者謂隔過前一藏而不更傳也則謂木傳土土傳水水傳火火

傳金金傳木而止皆閒隔一藏也及至三四藏者皆謂至前第三第四藏

也諸至三藏者皆是其已不勝之氣也至四藏者皆至已所生之父母也

不勝則不能爲害於彼所生則父子無剋伐之期氣順以行故刺之可矣

### 重廣補注黃帝內經素問卷第十八



