

詳校官助教臣李麗  
臣紀昶覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十九

痾渴門

虛熱渴

附論

明周王未楠撰

夫五臟六腑皆有津液也若五臟內虛而生熱者熱氣  
在內則津液竭少故為渴也夫渴者喜水其人必煩目  
眩背寒而嘔皆因內虛故也診其心脉滑甚者為喜渴

也人因勞傷腑臟或大病後未復氣血不足陰虛內熱  
熱則津液燥少故渴而飲引飲不能多多則腹滿不消  
氣虛不勝於水故也

方

腎瀝湯出聖濟總錄 治臟氣不足內燥發渴

生乾地黄洗剉 澤瀉剉 遠志去心 桂心去粗皮 當歸切

龍骨 甘草剉 五味子 赤茯苓去皮 芍藥 人參

黃芩去心 麥門冬去心焙

右粗搗篩每用羊腎一隻去筋膜切開先用水一盞  
半煮羊腎一盞去腎入藥末三錢再煎七分去滓溫  
服不拘時

黃耆湯出聖濟總錄 治氣虛燥渴引飲

黃耆剉 栝蒌根剉 麥門冬去心焙 赤茯苓去皮 人參

甘草炙剉 黃連去鬚 知母剉 生地黄焙 兔絲子酒浸

一宿焙乾 肉蓯蓉酒浸一宿去 石膏煨赤各

右咳嗽每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

木香湯 出聖惠方 治虛熱渴飲水不已心腹脹滿

木香 枳殼 去麩炒 芍藥 檳榔 生剉各半兩 桑根白皮

剉 黃耆 剉細 草豆蔻 去皮 枇杷葉 拭去毛炙 黃連 去鬚各二兩 桂

心 去粗皮 人參 一兩半

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

鹿茸丸 出千金方 治虛渴煩燥不眠

鹿茸 去毛塗酥炙 黃耆 剉細 人參 土瓜根 山茱萸

杜仲 去粗皮切炒 桑螵蛸 炙各一兩 栝蔞根 兔絲子 酒浸一宿

別 雞臍 十枚炙乾 肉蓯蓉 酒浸一宿去皮

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九酒下不

拘時溫服

人參湯 出聖濟總錄 治虛渴飲水過多身體浮滿

人參 黃耆 細研各二兩 旋覆花 桑根白皮 剉各二兩 紫

蘇葉 犀角 鎊屑各半兩 赤茯苓 去黑皮 陳橘皮 湯洗去白皮焙

五味子 去梗 澤瀉 各一兩半



右呔咀每服三錢水一盞半煎一盞去滓温服不拘時

黃芪丸 出聖惠方 治虛燥渴不已

黃芪 細對 五味子 各二兩 烏梅 茯神 去木各一兩半 附子 炮製

去皮臍大者二枚 澤瀉 醋石榴皮 生乾地黄 焙各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九漿水下不拘時服之

人參湯 出聖濟總錄 治瘡渴飲水無節

人參 二兩 五味子 二兩 大腹皮 各三兩 赤茯苓 去黑皮 桑根

白皮 剉炒 黃芪 細對各一兩半 芍藥 黃苓 去黑皮 葛根 剉各一兩

枳殼 去瓢麩炒三分

右呔咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘時

黃連丸 出聖惠方 治熱渴不止心神煩燥

黃連 去鬚 枯萎根 各等分

右為末以麥門冬去心煮熟爛研和丸梧桐子大每



服煎小麥湯下三十九食後服

雞蘇丸出危氏方治病後虛羸發渴

右雞蘇丸以北五味子煎湯吞下後服安腎丸雞蘇丸方

見諸血門鼻衄類安腎丸方見虛勞門虛勞類

薏苡仁湯出聖濟總錄治虛不止渴

薏苡仁 五味子各一兩 覆盆子 生乾地黄剉

枸杞各一兩 紫蘇莖葉 黃芪剉 木通各一兩 白茯苓

去黑皮 三兩

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

清心蓮子飲出危氏方治心中蓄熱時常煩燥因而思慮勞

力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢泄遺瀝澁

痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金

受尅口舌乾燥漸成痲渴睡卧不安四肢多倦怠男子

五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心

煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋

養神補虛滋

潤腸胃調順血氣

黃芩去心半兩 黃芪去蘆頭蜜炙 石蓮肉去心 白茯苓去皮 人參

去蘆頭各七分 麥門冬去心 甘草 地骨皮 車前子去土炒各

兩半

右剉散每服三錢麥門冬十粒去心水一盞半煎取

八分去滓水中浸冷空腹服發熱加柴胡薄荷煎

茯苓湯出聖惠方 治心脾熱渴不止小便難宜服此

赤茯苓一兩 蘆根一兩 黃芩一兩 知母一兩 栝蔞根一兩 藿

麥穗一兩 麥門冬去心一兩 甘草一兩 木通一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時溫服

地黃丸出聖濟總錄 治臟虛舌本燥渴引飲不已

熟乾地黃剉 山茱萸 山茅 澤瀉 牡丹皮

白茯苓去黑皮 附子炮製去皮 桂心去粗皮

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫水下

不拘時



天竺黃散 出聖 患方 治熱渴

天竺黃 一兩 細研 黃連 一兩 去鬚 茯神 一兩 甘草 一兩 炙 微赤剉 川芒

硝 一兩 犀角屑 栝蔞根 一兩 川升麻 一兩

右為散入研了藥令勻每於食後煎淡竹葉湯調下

一錢

黃芪散 出聖 患方 治脾胃中熱煩渴不止

黃芪 一兩 剉 茯神 一兩 生乾地黄 一兩 地骨皮 一兩 栝蔞 一兩

麥門冬 一兩 去心 黃芩 一兩 甘草 半兩 炙 微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉二

十七片煎至六分去滓不計時候溫服

猪膽黃連丸 出聖 患方 治脾胃熱渴不止羸瘦困乏

猪膽 一枚 淨洗 黃連 三兩 去鬚 別搗為末 栝蔞根 一兩 白糧米 一合 淨淘

柴胡 一兩 去苗 茯神 一兩 知母 一兩 麥門冬 二兩 去心 焙

右為末先將黃連末及米入膽內縫合蒸爛熟砂盆

內研如膏入藥末和令勻丸如梧桐子大不計時以

清粥飲下三十九



知母散 出聖惠方 治心脾實熱煩渴不止

知母 一兩 蘆根 一兩半 栝蒌根 一兩 麥門冬 一兩 黃芩 三分

川大黃 一兩 甘草 半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

赤茯苓散 出聖惠方 治脾胃中熱引飲水漿煩渴不止

赤茯苓 栝蒌根 黃芩 麥門冬 去心 生乾地黄

知母 各一兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分小麥半合

淡竹葉二十七片煎至五分去滓不計時候溫服

人參散 出神效方 治身熱頭痛或積熱黃瘦或發熱惡寒蓄

熱寒戰或膈熱嘔吐燥熱煩渴瀉痢或目赤口乾或咽

喉腫痛或風熱昏眩或蒸熱虛汗肺痿勞嗽一切邪熱

脾胃肺腎不調及真陰損虛並宜服之

石膏 一兩 寒水石 二兩 滑石 四兩 甘草 一兩 人參 半兩 或

右為細末每服二錢溫水調下或冷水亦得早晚食

後兼服梔子金花丸一名既濟解毒丸

茯神丸 出聖惠方 治心脾壅熱煩渴口乾宜服此

知母 各一兩  
栝萎根 各一兩  
麥門冬 二兩去心  
黃連 去鬚  
茯神 各一兩

石為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時

以清粥飲下三十九

人參竹葉湯 出千金方 治熱病後虛熱渴四肢煩疼

葛根 一斤  
人參 一斤  
甘草 各一兩  
竹葉 一把

石叟咀水一斗五升煮取五升渴飲之日三夜一

龍硃散 出聖惠方 治心脾熱渴面赤口乾宜服之

馬牙硝 半斤  
川芒硝 四兩  
寒水石 四兩  
石膏 三兩

右件藥以水五升浸三日用銀器中煎至水盡後去寒水石及石膏陰乾別入龍腦半兩硃砂一兩同研為末不計時候蜜水調下一錢兼治喉痺腫痛甚妙

石膏湯 出聖惠方 治熱極渴不止

麥門冬 一兩  
石膏 二兩  
蘆根 一兩



右件為散每服半兩水一盞煎至五分去滓不計時  
候溫服

黃連膏

出聖惠方

治熱渴不止心神燥煩宜服此

黃連

五兩去鬚搗為末

地黃汁

一兩合

右件藥於銀器中以慢火煎成膏收于瓷器中每於  
食後煎竹葉麥門冬湯計彈子大服之

黃連散

出聖惠方

治心肺壅熱煩渴口乾宜服之

豉一兩黃連一兩

去鬚

右為散每服半兩水一大盞煎至五分去滓每於食  
後溫服

麥門冬湯

出聖惠方

治證同前

黃連

半兩去鬚

麥門冬

一兩去心

右為散每服半兩水一盞煎至五分去滓每于食後  
溫服

浮萍丸

出聖惠方

治熱渴不止心神煩燥

浮萍



右洗淨曝乾為末以牛乳汁和丸如梧桐子大每服三十丸不計時候以粥飲下

麥門冬丸

出聖濟總錄

治臟虛乾燥發渴飲水

方見本門病渴口乾燥類

參朮白朮散

出如宜方

治病後脾虛津液燥少或有餘熱虛

渴

白扁豆

薑汁浸炒去皮

茯苓

山藥

人參

甘草

蓮

肉

砂仁

桔梗

薏苡仁

炒各二兩

右為末加烏梅天花粉煎上膈熱宜雞蘇丸

治中熱酒渴疾

出本草

生葛

右冬月取以水中揉出粉澄成塊先煎湯使沸後摩

成塊下湯中良其色如膏其體甚紐以蜜湯中拌食

之擦少生薑尤佳多食行小便亦能使人利

治虛熱渴

出本草

葶草

右以煮汁及生汁服之

治熱渴心悶

草 出本

地漿

右掘地作坎以水一大盞沃其中攪其濁俄頃取飲之

解熱渴

草 出本

酢漿草

右取食之

治虛熱渴

草 出本

桃膠

右如彈丸含之佳

治下虛上熱而渴

出永類  
鈴方

菝葜根

右每服一兩水二盞半煎減半日三服渴減只二服

治熱渴心悶

橘皮 甘草

右等分煮飲時服嚙之勿煩使多喫但以熱土及熬

熟灰土壅其臍上為佳以溫湯喫飲之亦可  
治熱渴心悶

麩

右取一兩以溫水一中盞攪和服之

胃熱渴

附論

夫胃氣實則生熱熱則土氣內燥津液不通咽膈煩滿  
故渴而引飲內經謂脾氣熱則胃乾而渴蓋藏津濡于  
脾胃合為胃行其津液者也脾既受熱津液不濡于胃

胃乾則渴不止也

方

黃連湯

出聖  
患方

治脾胃中熱煩渴身漸消瘦宜服此

黃連

一兩  
去鬚

川升麻

一兩

麥門冬

一兩  
去心

黃芩

一兩

栝蔞根

一兩

知母

一兩

茯苓

半兩

梔子仁

一兩

甘草

一兩  
微炙

石膏

二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

茯苓湯

出子  
金方

洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴



茯神 二兩外臺作茯苓

栝萎根

生麥門冬

各五兩 姜蕤

知母 各四兩

生地黄 六兩

小麥 二升 大棗 二十枚

淡竹葉 三切

升

右咬咀水三斗煮小麥竹葉取五升去滓下藥煮取四升分四服服時不問早晚但渴即進非但止胃渴通治渴患熱者

枸杞根湯

出聖濟總錄

治胃乾渴不止飲水

枸杞根

栝萎根

麥門冬

生去心

黃連

去鬚各一兩半

土

瓜根

乾者

知母

車前子

去土各一兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生地黄半兩同煎至八分去滓溫服三日

開胃解熱渴飲子

出廣南四時攝生論

大黃

甘草

各半兩

半夏

十筒

生薑

三兩

好棗

五七筒

右為劑用水一大銚同煎至八分旋取溫服之不拘

時候

栝萎湯

出千金方

治痼渴胃熱

栝蔞根 生薑 各五兩 生麥門冬汁 蘆根 切二升 茅

根 切三升

右以咀水一斗煮取三升分三服

茯神湯 出聖濟總錄 治胃渴引飲泄熱

茯神 去木 二兩 栝蔞根 麥門冬 去心 各五兩 知母 剉 姜 麩

各四兩

右粗搗篩先以水三盞淘小麥一匙淡竹葉五十片洗切同煮至一盞半去滓下藥末四錢棗三枚擘破

生地黃半分同煎至一盞去滓溫服日三

甘草湯 出聖濟總錄 治胃熱乾渴

甘草 剉 栝蔞根 各二兩 麥門冬 去心 焙 二分 半夏 湯洗去滑七遍

曝乾 麩炒 二兩半

右粗搗篩水二盞淘小麥半合煎至盞半去麥下藥末五錢大棗三枚擘破生地黃半錢生薑一片再煎至八分去滓溫服日再服

栝蔞根湯 出聖濟總錄 治胃中乾渴

欽定四庫全書

卷一百七十九

桔萎根 三兩 知母 二兩 甘草 炙 人參 各一兩

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓下白蜜少

許攪勻不拘時候服日可數服

黃芪湯 出聖濟總錄 治胃乾渴 方同

洗心飲子 出廣南四時攝生論

甘草 芍藥 山梔 杏仁 去尖研入 黃芪

右等分為散每服三錢水二盞煎至八分夜後溫服

冷湯 出廣南四時攝生論

甘草 二分 大棗 五箇 竹葉 十四片 熟附子 未少許 人參 少許

右微剉碎用水煮放冷時時服之

治胃中熱痛渴利小便 出本草

陳粟米

右炊飲食之

暴渴 附論

夫暴渴緣熱甚腠理開汗大泄而津液暴燥故渴而引飲小便利者不能為害若三焦不和心肺壅熱胃中乾



燥渴而小便不利者須變飲證不可不察喜渴者由心熱也心主於便汗便汗出多則腎中虛燥故令渴也凡夏月渴而汗出多則小便少冬月不汗故小便多此皆是平人之候名曰暴渴也

蘆根散 出聖惠方 治暴渴飲水多或乾嘔

蘆根 一兩半 人參 半兩 百合 三分 麥門冬 一兩 桑根

白皮 三分 黃芪 三分 赤茯苓 三分 黃芩 三分 葛根 三分

赤對

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉二十片煎六分去滓不計時候溫服

地骨皮湯 出聖惠方 治脾虛熱暴渴不已

地骨皮 栝蒌根 黃連 去鬚 麥門冬 去心 黃芩 去黑

心各 茯苓 去木 遠志 去心 甘草 炙 石膏 碎

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

蘆根湯 出聖惠方 治暴渴煩熱

蘆根剉 麥門冬焙 括蕒根 地骨皮各一兩 黃芩

去黑心 白茅根剉 石膏碎各二兩 人參三分 甘草炙半兩

右以咀每服五錢水一盞半生薑半分棗三枚大拍

碎小麥半合淡竹葉二十七片煎至八分去滓食後

溫服

桑根白皮湯出聖濟總錄 治暴渴飲水不止頭面虛浮

桑根皮剉 麥門冬焙 石膏碎各二兩 赤茯苓去黑皮 黃

芩去黑心 括蕒根各一兩半 梔子仁半兩 土瓜根一兩

右以咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時

括蕒根散出聖惠方 治暴渴心神煩悶體熱食少

括蕒根一兩 蘆根剉一兩 麥門冬去心一兩 知母一兩 人參一兩

去蘆頭 地骨皮一兩 黃芩一兩 甘草一兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分小麥半合

淡竹葉二十七片煎至五分去滓不拘時候溫服

茯苓湯出聖濟總錄 治心脾壅滯暴渴引飲



赤茯苓去黑皮 澤瀉 白朮 黃連去鬚 桂心去粗皮 甘

草炙判各一兩 大黃生用半兩

右以咀每服三錢水一盞半入小麥半匙煎至一盞

去滓溫服不拘時

地骨皮湯出聖濟總錄 治暴渴

地骨皮 栝蒌根各一兩半 黃連 土瓜根 麥門冬

去心焙 車前子各一兩 知母焙半兩

右以咀每服三錢水一盞半入生地黃半分切煎至

八分去滓溫服不拘時

黃連散出聖濟總錄 治心脾壅盛暴渴飲水

黃連 葛根判炒各半兩 大黃判炒半兩 枇杷葉拭去毛炙一兩 麥

門冬去心焙一兩半

右搗羅為散每服二錢溫水調下不拘時服

黃芪湯出聖惠方 治暴渴飲水過多煩渴不止

黃芪判 栝蒌根各一兩 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩 麥門

冬去心焙一兩半



右以咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時或為末煎竹葉湯調下

枳實湯 出聖濟總錄

治內熱暴渴不止

枳實

去瓤 楚炒

茯苓

去木

葛根

剉

石膏

各二兩半

右以咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

麥門冬湯

出聖濟總錄

治暴渴煩燥飲水

麥門冬

去心 二兩

知母

焙三兩

凝水石

一兩半

青竹茹

如雞

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

子二塊 碎切

烏梅散 出聖濟總錄

治虛燥暴渴

烏梅肉

焙一兩半

麥門冬

去心 焙一兩半

生乾地黄

焙三兩

甘草

右為散每服二錢溫熟水調下不拘時

柴胡散 出聖惠方

治暴渴心煩口舌乾燥

柴胡去苗 烏梅肉炒各二兩 甘草炙一兩 麥門冬去心焙一兩半

右以咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時

黃連散出聖惠方 治暴渴心神煩悶口舌乾燥

枇杷葉一兩拭去毛炙微黃 蘆根三兩剉 甘草三分炙 黃連一分

去鬚

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓每於食

後溫服

赤茯苓散出聖惠方 治胸膈氣壅滯暴渴不止

赤茯苓一兩 訶梨勒皮三分 龍腦一錢細研 人參三分去蘆頭

右為散入龍腦研令勻不拘時候以粥飲下一錢

烏梅湯出十便良方 治暴渴心神煩悶口舌乾燥

烏梅肉七枚微炒 生薑一分搗碎 白沙糖三分

右件藥以水二大盞煎至一盞二分去滓分三服食

後溫服

酥蜜煎出聖惠方 治暴渴除煩熱

酥蜜合五白蜜五川芒硝兩二

右件藥於銀器中以慢火熬成膏收瓷器中不計時  
候服半匙嚙津

秦朮湯出聖治暴渴咽燥口乾引飲

秦朮去苗土甘草炙半

右以咀每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘  
時一方生薑半分煎

治胸膈氣壅滯暴渴不止

蘿蔔二

右取大者搗爛取汁入蜜二合生薑半兩取汁酥一  
兩令勻渴即旋少飲之

麥門冬散一名蘆治暴渴煩熱不退少得睡卧方在

治大渴熱中暴疾出本

邪蒿

右煮令熟和醬醋食之

久渴附論



夫痛渴之病由於腎水不足下焦虛熱若病久愈者邪熱蘊積榮衛澁滯精血衰微病多傳變宜加慎忌凡忌有三一飲酒二房室三鹹食及麪又痛渴病經百日上者當忌灸刺則瘡上漏水變成癰疽疾

方

澤瀉丸 出聖惠方 治腎虛燥久痛渴不止

澤瀉 酒浸切焙 肉蓯蓉 酒浸切焙 五味子 禹餘糧 煨醋滓 巴

戟天 去心 當歸 切焙 地骨皮 洗焙各一兩 磁石 煨醋滓二七偏 人參

赤石脂 韭子 白龍骨 甘草 炙 牡丹皮 各一兩 生乾地黄 焙二兩半 右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九以牛乳汁下不拘時候服之

麥門冬丸 出聖濟總錄 治痛渴

麥門冬 去心焙 赤茯苓 去黑皮 黃連 去鬚 黃芩 去黑心 石膏

煨 姜蕤 人參 升麻 龍膽 栝萋根 枳殼

去蘘 生薑 切焙 枸杞根皮 洗切各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九漿水飲下不拘時

腎瀝湯 出聖濟總錄 治久痛渴飲水不絕

遠志 去心 人參 澤瀉 熟乾地黄 焙 桂 去粗皮 當歸

切 赤茯苓 去黑皮 龍骨 黃芩 去黑心 芍藥 各二兩 五味

子 麥門冬 去心焙

右以咀每服五錢水三盞先煮羊腎一具取二盞去腎入藥并大棗三枚擘破生薑半分切同煎取一鍾

半去滓温分二服不拘時

臍脰散 出聖濟總錄 治久渴旬日見効

雞臍脰黃皮 雞腸 各五具炙乾 白龍骨 鹿角膠 炙燥

白石脂 漏蘆 去蘆頭炙 土瓜根 三兩 黃連 去鬚 苦參

牡蠣粉 各二兩半 桑螵蛸 二七箇

右為散每服一錢米飲調下日三夜一

白石英丸 出聖濟總錄 治痛渴經年飲水不止

白石英 別研 芒硝 別研 凝水石 別研各二兩 赤茯苓 去黑皮 人



參 地骨皮 澤瀉 苦參 甘草 炙剉各 麥門

冬 去心焙

右除別研外搗羅為末合研勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十九溫水下不拘時服

升麻丸 出聖濟

治痛渴久不止

升麻 黃芩 去黑心 麥門冬 去心焙 栝蔞根 七生 地

黃 焙三 苦參 八 黃連 去鬚 黃蘗 去粗皮剉 人參 三

右為末生牛乳汁和衆手速丸如梧桐子大曝乾每

服三十九粟米飲下不拘時候服加至五十九

苦參丸 出聖濟 治久痛渴飲水不絕

苦參 二 黃連 去鬚 栝蔞根 知母 焙 麥門冬 去心 人

參 牡蠣 煨 黃芪 剉 生乾地黃 焙各

右為末以牛乳汁和衆手速丸如梧桐子大每服三十丸漿水下不拘時

水銀丸 出聖濟 治久痛渴經年飲水無度

水銀 鉛 醋淬各 柳絮礬 三分先細研次入水銀



盒盛外用紙筋泥固濟安反  
內養半日取出候冷再研細  
鉛丹 研 豉 炒 白僵蠶

炒黃連 去鬚各半兩

右四味為末與前三味再研勻用糯米糊丸如梧桐

子大每服二十九溫水空心日午夜卧服

竹葉湯 出聖濟總錄 治積年痛渴好食冷物

青竹葉 剉碎 白茯苓 去黑皮 地骨皮 剉 栝蔞根 各一桂

去粗皮 甘草 炙剉各半兩 麥門冬 去心焙二兩

右吹咀每服五錢水一盞半入小麥一撮煎至八分

去滓食後溫服日二

黃連散 出聖濟總錄 治久痛渴內燥引飲不已

黃連 去鬚 白石脂 研各一兩半 鉛丹 研一兩 栝蔞根 三兩

右為細散每服二錢漿水調下日三服

楮葉散 出聖濟總錄 治痛渴疾久不愈

蝸 焙乾半兩 蛤粉 龍膽 去土 桑根白皮 剉炒各一分

右為散每服一錢煎楮葉湯調下不拘時

莎草根散 出聖惠方 治痛渴累年不愈者

莎草根 去毛 白茯苓 去黑皮

右為散每服三錢陳粟米飲調下不計時

葵根湯 出聖濟總錄 治久痛渴飲水不絕

冬葵根皮 經霜者不拘多少細切焙

右呔咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

黃連丸 出聖方 治痛渴久不瘥體瘦心煩

黃連 半兩 黃芪 半兩 梔子仁 一分 苦參 半兩 人參 二分

去蘆頭 葳蕤 一分 知母 二分 麥門冬 一分 栝萸根 半兩

草 一兩 地骨皮 一分 赤茯苓 一分 生乾地黃 一分 鐵粉 一分

研

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計

時以粥飲下三十丸

黃連丸 出聖方 治痛渴久不止心神煩壅眠卧不寧宜服

此

黃連 皂莢樹鷲 微炒 白石英 研各一兩 苦參 知母



栝萎根 赤茯苓 各二兩 金箔 各五片 銀箔 各五片

右為細末入石英金銀箔相和研勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不拘時候煎小麥湯下三十丸竹葉湯下亦得

黃連丸 出千金方 治痛渴久不瘥喫食少心神煩亂宜服

黃連 一斤 去鬚 生地黃 五斤 爛研 布絞取汁

右絞地黃取汁浸黃連出曝燥復納汁中令汁盡乾搗末蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前後日三

無蜜可為散以酒服方寸匕一方清粥飲下

痛渴飲水過度 附論

夫痛渴飲水過度者由腎虛心熱三焦不和上熱下冷故也凡人好食熱酒炙肉或服乳石壅滯之藥熱毒在內不得宣通關脉閉塞血脉不行熱氣蒸於臟腑津液枯竭則冷心肺煩熱咽喉乾燥故令渴不止而飲水過度也

方



羚羊角散 出聖惠方 治痛渴飲水過多不止心神恍惚卧

不安穩

羚羊角屑 知母 黃芪 劉 栝蔞根 麥門冬 去心

茯神 地骨皮 人參 去蘆頭 防風 去蘆頭 酸棗仁 各三

分微炒 甘草 半兩 石膏 一兩 黃芩 半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分淡竹葉

二十七片小麥半合煎至五分去滓每於食後溫服

麥門冬丸 出聖濟總錄 治痛渴飲水過多

麥門冬 去心焙 栝蔞根 大麻仁 研 大黃 蒸二度切焙 苦

參粉 鐵粉 各三兩 黃芩 去黑心 澤瀉 各一兩半 龍腦 研土

瓜根 知母 焙 石膏 研各二兩 銀箔 三百片和龍腦研 雞朮

脛黃皮 炙七枚一兩半

右為散末煉蜜丸如梧桐子大每食後煎生地黃湯

下二十五丸日二服

土瓜根丸 出聖惠方 治痛渴飲水過度煩熱不解心神恍惚

眠卧不安

土瓜根分三栝蒌根 麥門冬去心鐵粉研細石膏研細川

大黃剉碎大麻子各一兩知母分三苦參分一子苓分三

雞胍脰七枚龍齒 澤瀉各三金箔 銀箔各五

研細

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每於食後煎竹葉小麥湯下三十九

神仙減水法名斬龍劊子手專治三焦虛熱三痛渴疾

不問日夜飲水無度此藥主之不可輕用其效如神可

通仙術師云止渴在第三味住水神妙不可輕用

人參 知母 天花粉 苦參 宣連 扁豆

浮萍 麥門冬 黃丹少許

右八味各一兩加黃耆一兩為細末每服一錢新汲

水調下妙不可言

鐵粉丸出聖治痛渴飲水過度渴尚不止口舌乾燥心

神煩亂坐卧不安鎮心止渴

鐵粉研細 苦參 牡蠣 土瓜根各一 黃連 麥門



冬 各二兩 去心 焙

金箔

銀箔

各五片 細研

栝蒌根

二兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵九如梧  
桐子大不拘時候以清粥飲下三十九

麥門冬丸 治痛渴飲水不止

麥門冬

去心 焙

升麻

黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮

黃芩

去黑心 各

五兩 生乾地黄

焙 人參

各三兩

栝蒌根

七兩

苦參

八兩

右為末以牛乳和衆手丸如梧桐子大每服三十九  
食前米飲下

黃丹散

出聖惠方

治痛渴飲水過多煩熱不解

黃丹

胡粉

各一兩

栝蒌根

石膏

各一兩

澤瀉

白

石脂

各三兩

甘草

半兩 炙

麥門冬

去心 焙 二兩

右為末每服一錢不計時候以清粥飲調下

麥門冬散

出聖惠方

治痛渴日夜飲水過度口乾燥小便數

麥門冬

去心

栝蒌根

知母

黃芪

各一兩 炙

甘草

半兩 炙

赤壯蠣 燒為粉 對

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六



分去滓不計時候溫服

竹葉湯 治痢渴飲水不輟多至數斗

甘竹葉 切 大麻仁 炒 赤秫米 各一升 淘淨 白茯苓 去黑皮一

兩 薤白 二兩 切 鹿角 四隻 湯浸去皮 細研粉

右判分作八服每服先以水三盞煎麻仁竹葉取二

盞去滓澄清入諸藥鹿角又煎去滓取一盞微微飲

之渴止為度

黃連散 出聖濟總錄 治痢渴飲水過多不知足限

蜜陀僧 細研 蠟面茶 黃連 去鬚 滑石 栝萋根 各半兩

右為散每服一錢不計時候以清粥飲調下

楮葉丸 出千金方 治痢渴減食飲水不休

乾楮葉 炒 桑根白皮 剉炒 白茯苓 去黑皮 人參 定粉

各一兩

右為細末取楮汁和丸如梧桐子大每服二十九煎

人參湯下不計時

又方 治痢渴飲水過多不知足限

黃丹一分 栝萋根半兩 檳榔一分 菜豆一兩

右都研令勻用麩三兩相和作餅既用生薑蔥薤白頭汁煮熟和汁溫食

又方 治證同前

黃連去鬚 栝萋根 蜜陀研細 人參去蘆頭

右為散入蜜陀僧研令勻每於食後以溫漿水調下漢防已散 治痛渴飲水過多不知足限

栝萋根 漢防已 黃連去鬚 黃丹各半兩

右為散入黃丹研令勻每服於食後以溫水調下一錢

絳雪散出聖惠方 治痛渴飲水無度小便數者大有神驗

黃連 黃芩 黃丹 漢防已 栝萋實

右為末每服二錢溫漿水調下臨卧併三二服即妙

鉛黃丸一名栝萋根丸 治三痛渴飲水過多不知足限

鉛丹 黃連去鬚 乾葛粉 栝萋根各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大冷水下二十九



葛根丸 治痛渴日飲水數斗不止

葛根 剉 栝萋根 剉 附子 炮製去皮臍 鉛丹 炒令紫研

右為散入鉛丹同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎茅根湯下日三米飲亦得春夏去附子

栝萋根丸 治痛渴飲水不止

栝萋根 剉 黃連 去鬚 知母 焙 麥門冬 去心各五兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下

神效散 治渴疾飲水不止

白浮石 蛤粉 蟬殼 各等分

右為末用鯽魚膽七箇調三錢服不拘時神效

古方驗錄論痛渴有三種一者渴而飲水多小便數似脂麩片甜者痛渴疾也二者喫食多不甚渴小便少似有油而數者痛中病也三者渴飲水不能多便腿腫脚先瘦少陰痿弱小便數此腎病也特息房勞千金云痛渴病所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麵能慎此不須服藥亦自可痛渴之人愈與未愈當須慮患大癰



必於骨節間忽發癰疽而卒予親見友人邵任道患渴數年果以癰疽而死唐祠部李郎中論痲渴者腎虛所致每發則小便甜醫者不知其疾故古今亦闕而不言洪範言稼穡作甘以物理推之淋餽醋酒作脯法須臾即皆能甜也是明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸精氣則下入骨髓其次以為脂膏其次以為血肉也其餘則為小便故小便色黃血之餘也痿氣者五臟之氣鹹潤者則下味也腰腎既虛冷則不能

蒸於穀氣則盡下為小便故味甘不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上泄皆為乳汁痲渴病者下泄為小便皆精氣不實於內則小便數瘦弱也又肺為五臟華蓋若下有煖氣蒸則肺潤若下冷極則陽氣不能升故肺乾則渴易於否卦乾上坤下陽無陰而不降陰無陽而不升上下不交故成否也譬如金中有水以火煖之其金以板覆之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不能至此板則終不得潤也火力者則是

腰腎強盛常須暖補腎氣飲食得火力則潤上而易痛亦免乾渴也故張仲景云宜服腎氣八味丸此疾與脚氣雖同為腎虛所致其脚始發于二三月盛于五六月衰于七八月凡痛渴始發于七八月盛于十一月十二月衰于二三月其何故也夫脚氣壅疾也痛渴宣疾也春夏陽氣上故壅疾發則宣疾愈秋冬陽氣下故宣疾發則壅疾愈也審此二者則疾可理也猶如善為政者寬以濟猛猛以濟寬隨事制度爾仲景云足太陽者是

膀胱之經也膀胱者腎之腑小便數此為氣盛氣盛則消蔽大便硬衰則為痛渴也男痛渴飲一斗小便亦得

一斗宜服八味腎氣丸 方見痛渴類

菽藟飲 出聖惠方 治痛渴飲水無休

菽藟 剉炒 湯瓶內釀 各一兩 烏梅 二兩并核搥碎焙乾

右粗搗篩每服二錢水一盞瓦器煎七分去滓稍熱

細呻

又方 治痛渴飲水過多不知足限



括萋根一兩黃連二兩甘草一兩  
去鬚 微赤判

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

又方

地骨皮一兩甘草三分桑根白皮三兩  
微赤判

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服

生津丸 治痛渴飲水日夜不止

青蛤粉 白滑石

右研為細末用黃頰魚涎和為丸如梧桐子大每服三十九丸煎陳粟米飲下不拘時

神應散 治痛渴飲水不休

滑石研各半兩寒水石研各半兩

右研為散用生雞子一枚鑿破去黃留青調和藥末令如稠膏却納在雞殼內以紙封口用鹽泥固濟曝乾灰火內燒令通赤放冷去土并殼取藥研令絕細



為度每服大人二錢小兒半錢米飲調下

玉壺丸 治痛渴飲水無度

人參 栝萋根 各等分

右末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九麥門冬湯下

沃焦散 治痛渴飲水無度

泥鱸魚 一十頭陰乾去頭尾燒灰研細為末 乾荷葉 研細為末

右等分每服各二錢新水調下遇渴時服日三候不

思飲即止

治痛渴飲水過甚并小兒渴疾方

黃狗膽 一枚 獾猪膽 一枚

右以狗膽併入猪膽內陰乾候可丸即丸如梧桐子

大每服以麝香湯下一丸小兒半丸

黃連丸 出聖惠方 治渴疾飲水不止

黃連 不拘多少

右為末入猪脂蒸爛同搗丸如梧桐子大每服三四

十九飯飲下一方用猪膽汁和勻蒸食

栝萋根散 治痛渴飲水不止

熟乾地黄 生乾地黄 葛根 栝萋根

右件各等分焙乾為細末每服二錢温米湯飲下不

拘時候

文蛤散 出聖濟總錄 治痛渴飲水而不止者

文蛤 即五倍最能回津本草在海蛤文下甚失其性識者當自知之

右為末以水飲任調方寸匕不拘時服

三痛丸 一名瓜連丸 治渴疾飲水不止骨蒸

黃連 淨剉用冬瓜汁浸一宿晒乾凡七次

右為末用冬瓜自然汁搜成膏子陰乾再為末再用

冬瓜汁作餅如此七遍為末用冬瓜汁為丸如梧桐

子大每服三四十九冬瓜汁煎大麥湯吞下尋常湯

只一服炒米飲亦可

甘露散 出千金方 治渴飲水不止

乾猪胞 十箇

右剪破出却氣去却繫著處用乾盆子一隻燒胞煙



盡取出所令極細每服一錢溫酒調下不拘時候

薑魚丸 治同前

乾生薑 一兩 一錢

右用鯽魚膽汁和丸如梧桐子大每服七丸米飲下

不拘時候服之

水骨丸 治同前

湯瓶內水釀 一兩

右研為細末燒粟米飯和丸如梧桐子大每服十五

丸人參湯下不拘時候服一方研如粉或沸湯或井

華水調服

治痛渴飲水過多小便不利方

葵根葉 五兩 切

右件藥以水三大盞入生薑一分豉一合煮取二盞

去滓食後分溫三服

治痛渴飲水過多不瘥方

凌霄花 一兩



右搗碎以水一盞半煎至一盞去滓分三服

又方

人參一兩去蘆頭搗細羅為散

右用雞子清調下一錢日四五服

治痛渴飲水無度小便多口乾渴

雞一隻

右細切和鹽豉作羹食

治痛渴煩燥飲水無度

七家井索用近罐口結處燒為灰

右不拘時候以新汲水調服二錢不過二五服效

人參湯出干金方 治痛渴發作有時心脾有熱飲水無度

人參 桑根白皮剉炒各二兩 麥門冬去心焙 知母 枳

杷葉拭去毛炙 黃連去鬚微炒 葛根剉 白茯苓去黑皮 地骨皮

淡竹葉各一兩

右剉如豆每服五錢用水一盞半煎至八分去滓温

服

天花粉九 治痛渴飲水多身體瘦

天花粉 黃連去鬚各一兩 茯苓 當歸各半兩

右末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九茅根煎湯下

黃連九出千金方 治痛渴飲水絕多身體黃瘦

黃連半兩去鬚 黃丹半兩炒令色紫 豆豉半兩炒乾

右為末入黃丹研令勻用軟飯和丸如梧桐子大每

於食後以溫水下五十九

栝蒌丸出聖惠方 治痛渴飲水絕多身體黃瘦

栝蒌根 黃連去鬚 鐵粉細研各等分

右為末入鐵粉研令勻煉蜜丸如梧桐子大不計時

煎茅根湯下二十九

治痛渴飲水不知足

兔頭具一

右以水煮取汁飲之

治痛渴飲水多身體黃瘦

窰突上黑煤結乾似鐵原者半斤



石搗取末更以生薑四兩同搗絹袋盛以水五升浸

取汁不拘時候冷飲半合

蘭香飲子一名甘露膏治痲渴飲水極甚善食而瘦自汗大

便結燥小便頻數

石膏 防風 生甘草各一兩 知母酒浸一錢半 半夏二分

湯洗炙甘草 人參 蘭香 白豆蔻仁 黃耆

桔梗 升麻各半錢

右同為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作薄片子日中

曝半乾碎如米每服二錢食後淡生薑湯送下

牛黃甘露丸出聖濟總錄治三焦渴疾飲水無度舌上皴裂

肌肉黃瘦精神減退小便多腹腸脹

硃砂一兩成塊者 牛黃 麝香各一分 鐵粉 梧桐津

犀角剉 丁香 鉛白霜 葳蕤 地龍 知母

檳榔 麥門冬去心 牡蠣 苦參 石膏 甘草炙

錫蘭脂 白扁豆各半兩慢火炒 宣黃連 生栝蔞根一兩

細研銀箔 五十 金箔 一百二十片不用北地者



右除括蕒根別搗外同為細末煉蜜和丸臨和時即  
 入金箔及生括蕒根一處和勻為丸如豌豆大空心  
 金箔三片銀箔二片碎研米飲下十九漸加至二十  
 九飯後臨卧各一服日近輕者當日止重者三日二  
 十日後只空心一服夜一服用金銀箔各一片一月  
 外只用溫漿水下十五丸其藥合時二月至九月即  
 用生括蕒根九月後只用煉蜜為丸亦得忌鹹酸炙  
 燂魚酒等

治暑月渴而飲水過多乾嘔復渴不思飲食

乾葛一兩 甘草一兩 陳粟米二匙

右以咀每服二錢水一盞煎至六分去滓食上溫服  
 一日二三次

痛渴飲水腹脹 附論

夫痛渴飲水腹脹者由水氣流行在於脾得濕氣不能  
 消穀得過經絡否溢氣血行則水不得宣通停聚流溢  
 於膀胱之門故令脹滿也脾土制水通調水道下輸於

膀胱痛渴飲水過多內漬脾土土不制水故胃脹則為腹滿之疾也內經謂水為陰腹者至陰之所居是以水飲之證先見於腹滿

方

人參湯 一名木香湯又名桑白皮湯出聖惠方 治痛渴飲水過多心腹脹

滿不能食

人參 一兩去蘆頭 桑根白皮 半兩 黃芪 三分 陳橘皮 一兩

湯浸去白皮 半夏 湯浸七遍去滑半兩 木香 赤芍藥 草豆蔻

去粗皮 桂心 去粗皮 檳榔 剉 枇杷葉 以上各半兩去毛炙

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服一方用枳殼無陳橘皮

人參湯 出聖濟總錄 治痛渴飲水過多心腹脹滿或脇肋間

痛腰腿沉重

人參 白芍藥 大腹子 二枚慢火內煨切 葛根 剉 黃苓

去黑心 知母 焙 桑根白皮 剉 赤茯苓 去黑心各一兩半 葳蕤

一兩 枳殼 去瓤麩炒三分



右以咀每服三錢水一盞入生薑如棗子大拍破煎

至七分去滓空心温服食後夜卧再服

桂心湯散 出聖惠方 治痛渴飲水傷冷太過致脾氣虛腹脇

脹滿不思飲食

桂心 人參 去蘆頭 白茯苓 訶黎勒皮 甘草 炙

赤枳殼 麩炒微黃去瓢 前胡 去蘆頭 白朮 大腹皮 剉各半兩 厚

朴 一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓每於食前温服

赤茯苓湯 出聖惠方 治痛渴飲水太過胃氣不和不思飲食

宜服此

赤茯苓 人參 去蘆頭 赤芍藥 以上各半兩 白朮 檳榔

桂心 前胡 去蘆頭 厚朴 各三分去粗皮塗生薑汁炙令香熟 枳殼

半兩麩炒 甘草 半兩炙微黃去瓢 微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓每於食前温服



陳橘皮散

出聖惠方

治痛渴飲水過多心腹脹滿或脇肋間

痛腰腿沉重

陳橘皮

一兩去白

訶黎勒皮

赤茯苓

桂心

大腹

皮剉芎藭

枳殼

炒黃去瓢

赤芍藥

各半兩

甘草

一兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓食後溫服

半夏散

出聖惠方

治痛渴飲水腹脹煩熱嘔吐不思飲食

半夏

半兩湯洗七遍去骨

赤茯苓

人參

各一兩去蘆頭

白朮三分木

香甘草

半兩炙微赤剉

陳橘皮

一兩湯浸去白瓢焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分又竹茹一分同煎去滓不計時候溫服

檳榔湯

出聖惠方

治痛渴飲水不止小便復澁心腹連膀胱

脹悶胸膈煩熱

檳榔剉桑根白皮

剉赤茯苓

去黑皮木通

剉紫蘇莖

葉 麥門冬

去心焙各一兩

右以咀每服四錢水一盞入生薑半分切蔥白七寸

煎至六分去滓不計時溫服

赤茯苓丸

出聖濟總錄

治久患痛渴小便數服止小便藥多

渴猶不止小便復澁兩脇連膀胱脹滿急防心胸煩熱

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉防風

麥門冬

去心焙各一兩

半 郁李仁

湯浸去皮焙乾研

木香

各一兩

右先搗前五味為細末與郁李仁研勻煉蜜和為劑更于石臼內杵酥令勻熟丸如梧桐子大每日空腹煎木通棗湯下三十九至晚再服漸加至五十九

旋覆花湯

出聖濟總錄

治痛渴腹脇虛脹心下滿悶

旋覆花

淨擇去莖葉微炒

桑根白皮

剉陳橘皮

湯浸去白微炒各一

兩半 紫蘇

并嫩莖乾者

犀角

鎊各半兩

赤茯苓

去黑粗皮三分

右以咀每服七錢水三盞入棗三枚擘生薑半分拍破鹽豉半匙同煎至一盞半去滓分溫三服每食後一服如人行十五里以來更一服

大黃丸

出聖惠方

治痛渴腹脹利大小腸

川大黃

三兩剉碎微炒

栝蒌根

檳榔

枳殼

麩炒去瓢微黃各一



兩 芎藭 分 桂心 分 三

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下

三十丸

麥門冬湯 治痛渴喉乾不可忍飲水不止腹滿急脹

麥門冬 焙去心 烏梅 去核取肉 炒各二兩

右以咀每服三錢水一盞煎至半盞去滓食後溫服

日三

桂苓甘露散 治飲水不消嘔吐瀉利流濕淤注宣通

氣液水腫腹脹泄瀉不能止者兼治霍亂吐瀉下痢赤

白止煩渴解暑毒大有奇效兼利小便

桂心 去粗皮 白茯苓 猪苓 並去皮 白朮 寒水石

別研澤瀉 各一兩 甘草 一兩 滑石 別研二兩

右為細末或煎或水調二三錢任意服之或入蜜少

許亦得一方有石膏一兩無猪苓

欽定四庫全書

卷一百七十九

普濟方卷一百七十九

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官檢討臣李鼎元

謄錄監生臣張鵬程