



聖愈方去酒積酒毒

南星 一斤 端正者淨洗

先於淨地上濕罈潤五寸深一尺五寸取土用刪炭於罈中燒過半除去灰令淨以煮酒一斗澆之將南星於其中覆以瓦盆用所搥土泥封盆縫勿令透氣一宿米早取出用酒并水各二升和洗淨切作片子焙乾 右為末飛朱砂一兩姜糊丸如梧桐子大朱砂為衣每服五十九至百丸姜湯下

積氣丹

聖惠方治一切新久沉積氣塊面黃羸瘦項氣無力癥瘕積聚口吐痰

抵擲二个

莞花

三稜

黃連

牛膝

章柳根

廣茂各一两

礪砂一錢

肉豆寇

青皮

陳皮

石薑蒲

巴豆生

木香各二錢半

大戟

大黃

其遂

白牽牛

乾姜

青磁石

乾漆各五錢

積聚

右為末醋糊丸如梧桐子大每服一九臨臥燒棗子湯下每夜一九有積者肚內作声病退為度

木香通氣丸

聖惠方

治痰癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽順氣消痰進飲食消痞

人參 木香各一兩半 玄胡索 一兩 陳皮
 黑牽牛 各六兩 枳榔 丁香各半兩 三稜炮
 廣茂炮 各三兩 半夏製炒 茴香炒炒 木通
 神麩 麥蘖各二兩 青皮

右為未水糊丸如小豆大每服三四十九生薑湯下食後日二服

限黃丸 秘方

香附末 四兩 針沙 四兩炒三吹平胃散 四兩方見脾胃門

右件為未醋糊丸量大小加減白湯下

丹車丸 聖惠方

大黃 二兩 其遂 麩裏煑 大戟 醋炒 莞花 醋炒各一兩

青皮 去白 枳榔 陳皮 去白 木香 各五錢

牽牛頭末 四兩 輕粉 一錢 一方取蠶加蕪荑 半兩

右為未水丸如梧桐子大每服三五十九臨卧温水下以利為度

木香化滯丸 聖惠方 治小兒宿食不消心腹滿脹嘔吐壯熱

木香 三稜 青皮 破破紙 各一兩

黑牽牛 四兩炒取二兩

右為未水丸如黃米大每服一二十九温水下

宿食

人之有身籍五穀以生故胃以納之脾以尅化之脾胃喜煖不宜以生冷傷之
 体虛者不善調養飢飽失時或過食飲食并一切生冷之物脾胃怯弱不能尅
 化停蓄胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔惡心滿噎噎或泄或痢其臭如抱壞雉子
 或米谷不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之須究其源又須量入氣體虛實
 痼証法深投以藥餌病之淺者則消化之甚者必須推利而後調補脾胃或有
 因挾寒暑之氣而泄者又當以脉證辨而料理之

下 和劑方 方載氣門治食積心腹膨脹不得尅化

感應丸 和劑方 治男子婦人小兒停積宿食冷物不能尅化有傷脾胃或泄瀉

臭如抱壞雉子或下痢膿血並宜服此通

百草霜 用村家鐵底上者細末二兩 肉豆蔻 二十个 乾姜 炮 一兩

杏仁 去皮尖取仁要肥者百四十枚 南木香 二兩半 丁香 一兩半

巴豆 七十粒 去皮心膜出油研如粉

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味并為細末與前三味同拌研令細

宿食

用蠟置先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾粗更以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩秋冬用清油一兩半於銚內熬令香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末成劑分作小錠子以油單紙裹之旋丸服餌每服三十丸空心姜湯吞下

和劑方

方載脾胃門 壯脾胃消宿食去膨脹

三因方

治宿食留飲積聚中脘噎真吞酸心腹刺痛

巴豆 去皮心別研 縮砂仁

胡椒

丁香

烏梅 去核

右件各一百個為細末炒餅糊為丸如棗豆大每服五七丸熟水臨臥送下

聖方

治中脘有宿食不消吞酸惡心口吐清水或心腹刺痛食泄

杏仁 去皮尖別研 巴豆 去殼油二枚 百草霜 二錢

烏狗肉 七個

砂仁 各三七枚 半夏 泡七次九枚

右為末和勻煮麪糊丸如黍米大每服二十九姜湯下

意方

治氣虛積冷停食不消心下堅痞噎宿腐氣及霍亂吐瀉米穀

消一切食癥之疾並皆治之

巴豆 三十七粒連殼用同煎藥醋煮 枳殼 去白

枳殼

陳皮 乾姜 黃連 去須

蓬朮

三稜 半夏 湯洗七次各二兩

右除巴豆外剉如豆大用好醋煮乾去巴豆余藥焙為末薄糊丸如棗豆大

每服十九加至二十九用茶清姜湯任下食後溫服孕婦不宜服之

何穉道

濟生方 治脾胃怯弱過食肉麪生果之物停滯中焦不能消化以致腹

脹刺痛嘔惡不食或利或秘並皆治之

阿魏 酒浸化 官桂 不見火 蓬朮 炒 麥蘖 炒

神麪 炒 青皮 去白 蘿蔔子 炒 白朮

乾姜 炮各半兩 百草霜 三錢 巴豆 去殼油七個

右為末和勻用薄糊丸如棗豆大每服二十九不拘時姜湯送下麪傷用麪

湯下生果傷用麪香湯下

海元部山房神效感應丸

集成秘方 常服消食除積滯不動藏府

里角沉香 不見火 木香 檀香 丁香

陳皮 青皮 黃連 砂仁

香附子 去毛 莪朮 十分大者用熟裏煨 三稜 煨

宿食

半夏水浸去面衣

已上藥各一兩淨研為細末

肥烏梅有肉者一百文重巴豆三百粒肥白者去皮膜心右用磁器一隻盛巴豆上以烏梅肉蓋之却用陳米醋浸過與烏梅肉平於甌上蒸至極熟以巴豆紅色為度却搗二件令極爛次用糯米粽和前件諸藥搜勻搗千百杵以黑為度衆手丸如蘿蔔子大每服十九宿食不消陳皮湯下氣滯回香湯下酒後嘔吐痰羹湯下

香櫚散

按粹方治食傷大陰又治卒心胃痛

其松三錢去土研丁香一錢

縮砂仁三錢 益智仁三錢

香附子半兩 木香五錢

右為細末湯浸餅為丸如粟豆大每服二十九白湯送下

香丸 按粹方治一切心下痞悶及積年久不愈

黃連去須煉 神曲五錢

白木各一兩 人參四錢

橘皮四錢 乾生姜二錢

一方加澤瀉 厚朴各三錢 半夏湯浸七次五錢

木香枳木丸

按粹方破滯氣消飲食開胃進食

木香一兩 枳實炒一兩 白木二兩

三稜散

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十九溫水送下

神麴散

按粹方治為人所勉勸強食之物致心腹滿悶不快

神麴炒 麥蘖炒 枳實各一兩 白木二兩

三黃枳木丸

按粹方治傷肉食溫麪辛辣味厚之物填塞悶乱不快

黃芩二兩 黃連酒洗 大黃濃 神麴炒各一兩

枳實炒五錢 白木 橘皮各一兩

厚心鮮醒湯

按粹方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩乱胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻

縮砂仁 葛花各五錢 木香半錢

宿食

橘紅一錢半

白木

乾生姜各二錢

青皮三錢

白茯苓

猪苓

人參各一兩半

澤瀉

神麴炒各二錢

右為末每服三錢白湯調得微汗酒病自去矣

木香消痞丸

木香

郁李仁

砂仁各三錢

甘草

杏仁 去皮尖炒仁四兩

桔梗各半兩

右為末宿蒸餅丸如梧桐子大每服五丸細嚼姜湯下

四聖丸

秘方治男子婦人酒食所傷

皂角 去皮二兩

黑牽牛末三兩

大黃三兩

朴硝少許

羅蔔 三斤煮軟去粗用汁

右為末羅蔔汁打糊為丸如梧桐子大每服三五丸茶下一宣明論不用

蔓蔔汁滴水和丸名四生丸

大枳殼丸

御藥院方治一切酒食傷胸膈悶疼飲食不消兩脇刺痛嘔逆

惡心并皆治之

枳殼 麸炒去核

茯苓 去皮

厚朴 去粗皮生薑製人參 去芦

木香

青皮

陳皮 二味各湯浸去核焙乾秤

檳榔

蓬義茂 照香熟

神麴炒黃

麥蘖 微炒

白木 各一兩

黑牽牛 煉淨微炒

大黃 各二兩錦文者

半夏 泡七次

三稜 各一兩

一方有乾生薑 五錢

右為末姜糊丸如梧桐子大每服三四丸姜湯下常服美食不拘時候

○自汗

心之所藏在内者為血發於外者為汗蓋汗乃心之液而自汗之因未有不由心腎但虛而得之者故陰虛陽必濇發熱而自汗陽虛陰必乘發厥而自汗此固陰陽偏勝所致又有傷風中暑病濕兼以驚怖房室勞極歷節腸癰痰飲產厚等疾亦能令人自汗如睡中不覺汗出者是名盜汗亦心虛所致其脈多微而滑濡而虛治之宜斂心氣溢腎水使陰陽調和水火升降其汗自止自汗之証又兼以他病又當各類求之

和劑方

和劑方

方載諸虛門治真氣不足上盛下虛面赤自汗小便頻數如

汗不斂如肉桂黃耆

和劑方

和劑方

治諸虛不足及大病後體虛津液不固體常自汗

黃耆 去苗土

府黃根 中洗

牡蠣 米泔浸去土火殿通赤各二兩

右咬咀每服三錢水一盞小麥百餘粒同煎八分不拘時服

中湯

和劑方

方載諸虛門治男子婦人血氣不足體常自汗

麥煎散

和劑方

方載溫門治風濕相搏不嘔不渴時或自汗

知母

石膏

甘草 炙

滑石

白茯苓

人參

地骨皮 淨洗

赤芍藥

黃連

杏仁

去皮尖麩炒各半兩

麻黃根 一兩半

右為末每服一錢浮麥煎湯調服

黃耆湯

和劑方

方載溫門治風濕相搏時自汗出

黃耆湯

濟生方

治喜怒驚恐房室震勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止

並宜服之

白茯苓 去皮

熟地黃 酒蒸

肉桂 不見火

天門冬 去心

麻黃根

龍骨 各一兩

五味子

小麥 炒

黃耆 去苗蜜糖炙一兩半

防風 去苗

當歸 去苗酒浸

甘草 炙各五錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時發厥自汗加熟地黃

發熱自汗加石斛

止汗散

和劑方

方載諸虛門治下元氣虛心腹脹滿夜常自汗

撫芎

治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白木 去油畧炒

橘紅 各一兩

甘草 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎八分溫服

桂枝湯

和劑方

方載傷寒門治傷風脈浮自汗惡風

黃耆湯

濟生方

治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆 去苗蜜炙

附子 炮去皮臍各等分

當歸

聖惠方

治盜汗之聖藥也

當歸

生地黃

熟地黃

黃柏

黃耆

黃連 各一分

黃耆 加一倍

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓臨臥通口服

木令湯

聖惠方

治虛汗盜汗

黃耆 炙

防風

白茯苓

白木

麻黃根 各五錢 甘草 炙 二錢

右咬咀每服一兩水二盞小麥一百粒加牡蠣亦得煎至一盞去滓臨臥服

牡蠣散

御藥院方 治虛汗不止玄府不閉 牡蠣一兩用鉗錫內盛鹽泥固濟服一盃夜定五錢

右為末綿裹捺患處

愈盜汗

百一選方 心液為汗此藥收斂心經

右二味等分每服拜五錢先用猪心一枚破作數片并心肉血煎湯澄清汁

煎藥服

治脾虛人盜汗

百一選方

右咬咀每服一兩水一盞生姜三片棗一枚煎八分去滓溫服食前

珍首湯

秘方 治虛盜汗

- 人參
- 茯苓
- 山藥
- 甘草 炙
- 陳皮
- 半夏 洗 各等分
- 白扁豆 炒
- 白朮
- 乾葛
- 黃耆

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

石斛散

秘方 全前

- 柴胡
- 防風
- 北五味
- 黃耆
- 小草 遠志
- 官桂
- 石斛
- 白朮 炒
- 甘草 炙
- 茯苓 各等分

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓食前溫服

又秘方 用阿首烏末唾調付脐中即止

○虛煩

虛煩之疾非止一端究其大槩多是體虛者攝養有乘榮衛不調使陰陽二氣有所偏勝或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛素問云陽虛則外寒陰虛則內熱所盛則外熱陰盛則內寒此固不易之論而今虛煩之病多是陰虛生內熱所致虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之証却無霍亂瀉病之際又宜審之治法宜用少平和之藥清心實下不可峻補又若婦人產後去血過多虛煩發熱又當以各類求之竹葉石膏湯和劑方方見傷寒門治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁

及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗下者

溫湯 簡易方 方見傷寒門治大病後虛煩不得睡卧及心膽虛怯觸事易

驚短氣悸之或復自汗並宜服之

人參竹葉湯 三因方 治汗下後表裏虛煩不可攻者

竹葉二把 人參 甘草各一兩 半夏二兩半

石膏 麥門冬各五兩 濟生方除石膏加茯苓小麥

右咬咀每服四升水盞半姜五片粳米一撮煎去滓空心服

摘皮湯 三因方 治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩

惡寒食反嘔逆穀不得入宜服此

橘皮一兩半 甘草炙半兩 人參二升半 竹茹半兩

右剉細每服四升水一盞姜三片棗一枚煎空心服活人書加生姜一兩棗

八枚作六味

小草湯 濟生方 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小章 黃耆各五兩 當歸酒浸 麥門冬去心

酸棗仁炒去殼 石斛各一兩 人參 甘草冬各半兩

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎八分不拘時候溫服

地山散 濟生方 方見諸虛門治大寒煩熱不安及一切虛勞煩熱並宜服之

人參竹葉湯 三因方 治胃口有熱嘔吐咳逆虛煩不安

人參半兩 半夏一兩 竹茹一團

右作六服用水一盞半姜十片竹茹一團煎溫服一方加橘紅一兩

辰砂妙香散 和劑方 方見健忘門治心氣不足精神恍惚虛煩少睡

健忘

健忘者徒然而忘其返也雖曰此証皆由憂思過度損其心胸以致神舍不清

遇事多忘然過思傷脾亦能令人健忘治之須兼理心脾神凝意定其証自除

寧志膏 和劑方 治心神恍惚一時健忘 方見心痛門

定志丸 和劑方 治心氣不定恍惚多忘常服安神定志

遠志去心苗 菖蒲 白茯苓各二兩 人參三升

右為末煉蜜丸如梧桐子大以朱砂為衣每服二十九米飲下

畫星丸 和方 治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄語如有所見

天南星 一斤先用炭火三十片燒地坑通紅去炭以酒五升傾坑內候

參酒盡下南星在坑內以盆覆坑周回用灰排定勿令走氣次

日取出為末 朱砂別研二兩 琥珀別研一兩

右用生薑汁麪糊為丸如梧桐子大每服三十九丸加至五十九丸前石菖蒲人參湯食後送下

歸脾湯 濟生方 治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神去木

黃耆去皮

龍眼肉

酸棗仁去殼

人參各一兩

木香半兩

甘草炙二兩半

朱集丸

百一遺方 治心神不定事多健忘心火不降腎水不升

茯神 一兩去皮

沉香半兩

右為細末煉蜜丸如小豆子大每服三十九丸食後人參湯下

二丹丸

後祥方 治健忘養神定志和血以安神外華廢理

熟地黃

天門冬

丹參各一兩

人參

珠砂為衣五兩

麥門冬 去心一兩

遠志去心

茯苓

甘草各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸至百丸空心煎愈風湯下愈湯方見風門

和劑方

方見心痛門治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲

憂慘感虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食无味頭目昏眩常服補益氣血安神鎮心

聖惠方

治心氣不安驚悸恍惚神思不寧

人參

遠志去心

酸棗仁

黃耆各五兩

桔梗

丹砂

官桂去皮各二兩半

天門冬去心

白茯苓

菖蒲各七兩半

右為末蜜丸如豆大每服二十九至三十九丸米飲下

癩癩

癩癩之疾諸方所載並作一證治之愚謂癩與癩雖以一既而論故癩者全歸於心癩者歸乎五臟所謂癩者神不守舍狂言妄語如有所見動經年歲不得即愈若心經有損是為真病如心經畜熱則當清心除熱如痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人因血氣迷心或因產後惡露上衝而言語錯亂神志不守者各當隨其證治所謂五癩馬癩羊癩雞癩猪癩牛癩是也其為証也卒然之際旋暈顛倒口眼相引手足搐搦背脊強直口吐涎沫食頃乃甦原其所

因五臟之間或為七情之氣鬱結或為六淫之邪氣所傷閉塞諸經一時痰涎
壅併心膈致有此証馬癩作馬嘶者應乎心羊癩作羊吼者應乎脾雞癩作雞
聲者應乎胃猪癩作猪叫者應乎腎牛癩作牛吼者應乎肺此又以五癩合五
臟而言須詳考其因施以治法大抵當以祛痰順氣為先然後辨其有無風寒
暑濕之氣方可補其五臟又有在母腹中受驚及幼小時有所感觸而成此証
又當辨之

碧霞丹 和劑方 治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視時作搐搦并五種癩疾並皆
治之

石綠 細研九度飛過十兩
附子尖 七十個
烏頭尖 七十個
蝎梢 七十個

右為末入石綠令勻麪糊丸如雞頭大每服用薄荷汁半盞化下一丸更以
酒半合溫服之須更吐出痰涎然後隨証治之如牙關緊急幹開灌之

牛黃清心丸 和劑方 方載風門治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡
當發狂顛言語錯亂

六珍丹 三因方 治風癩卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪嗥并舌府藏相
引氣爭掣繼吐沫流涎久而方蘇

通明雄黃 兼子雄黃 朱鑽真珠 各一兩 附砂半兩
水銀 一兩半 黑鉛 一兩 熬成膏

右為末研令極細蜜和杵二三萬下丸如梧桐子大每服五丸姜湯吞下
五癩丸 楊氏家藏方 治癩癩發作不問久年新舊並宜服之

全蝎 二兩 去毒炒 昆角 四兩 搥碎 水半升 將汁與白丸一同熬乾研
半夏 二兩 湯洗七次 烏蛇 一兩 酒浸一伏 去皮骨焙乾 天南星 炮一兩

雄黃 一兩 半別研 蜈蚣 半條 去頭尾炙 白附子 半兩 炮 白礬 一兩
朱砂 二兩 半別研 麝香 三兩 別研 白姜蚕 一兩 半炒去糸

右為末姜汁煮麪糊丸如梧桐子每服三十九姜湯下
瘰癧丸 楊氏家藏方 治癩疾發作涎朝搐搦精神恍惚時作謔語

犀角屑 一兩 虎睛 一對 微炒 大黃 一兩 梔子仁 半兩
遠志 去心 一兩

右為末煉蜜丸如棗豆大每服二十九溫酒食後送下
瘰癧丹 濟生方 治諸癩久不愈者頑涎結聚交生諸証並宜治之

全蝎 二兩 去毒 鐵粉 三兩 其遂 二兩 半夏
生川烏 去皮 姜蚕 三兩 炒對碎 生薑汁 浸一伏 各半兩

右為末姜汁打糊丸如棗且大硃砂為衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草
百一選方治一切驚風愛思慮或夢思恍惚作事多忘但是一切心氣不
足顛癲狂亂悉皆治之

顆塊朱砂二兩 續猪心二寸 燈心三兩

右將猪心切開入硃砂燈心在內麻線繫合在銀石器內煮一伏時取出不
用猪心及燈心只將朱砂研極細用真茯苓末二兩酒煮薄糊和朱砂為丸
如梧桐子大每服九九至十五丸加至二十一丸用去心麥門冬煎湯下顛
癲至甚者乳香人參湯下夜寢不安或多亂夢炒酸枣仁湯下

金露丸 和劑方治痰迷心竅恍惚狂言婦人痰血上衝或談或笑言語狂亂並
皆治之

生乾地黄 貝母去心各一兩 草烏頭炮用二兩 黃連洗焙二兩

巴豆去心膜醋煮三十佛焙乾取一兩過其數无方 枯梗去芦

柴胡去芦 吳茱萸湯洗七次 防風去芦 紫苑去苗

菖蒲米泔浸一夕乾姜炮 白茯苓去皮 蜀椒去目出汗

厚朴去皮姜炒 枳殼去青越炒 欒甲米醋煮黃 人參去芦

甘草炙 甘松淨洗各一兩 桂心不見火各一兩 一方用甘草

芎藭去芦

右為末以麪糊丸如梧桐子大每服五丸心中痰患姜湯下心痛酸石獨皮
湯下口瘡蜜湯下頭痛石膏湯煮茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣傷陳皮
湯下赤白痢甘草乾姜湯下朋膈噎悶通草湯下婦人血氣當歸酒下疝氣
嵐氣小腸氣及下墜附子湯下湯冷腹痛酒食所傷酒疸黃疽結氣痞塞鶴
膝並用鹽湯鹽酒下

空疔 三因方治痰迷竅狂言如有所見

甘遂去心 紫大戟去皮 白芥子 真者各等分

右為末煮麪糊丸如梧桐子大晒乾臨臥淡湯或熱水下三十九一以下利
去痰飲為愈

牽牛頭末 一錢 茴香 二錢半

右為末用生薑自然汁調藥少許噀之入鼻中立醒一方用黑牽牛木香妙

龍腦安神丸 後粹方治男子婦人五種顛癲無間遠年日近發作無時

茯苓 三兩 人參 地骨皮 甘草 各二兩

麥門冬 去心二兩 龍腦 別研 射香 各一錢 牛黃 五錢

朱砂 牙硝 各二錢 桑白皮 明犀末 一兩

金箔十五片

右十二味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫水化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁舌強日進三服

朱砂安神丸

按辨方

朱砂

四錢半

黃連 五錢

甘草生 二錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十九丸噎津送下

牛黃清心湯

藥方

治心經邪熱狂語精神不爽

腦子 研

牛黃 研

朱砂各一錢半 研 大黃生一兩

右研為末每服三錢涼生薑蜜水調下

○陰癩

陰癩之証其種有四一曰腸癩二曰氣癩三曰外腎浮腫四曰水癩是也究其所因皆是腎經虛寒或為勞役所復或為風濕之氣所侵結而不散久則腎氣虛橫而成此證外腎腫脹者偏有大小或堅硬如石或臍腹絞痛甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水病而至此未易治也腸癩亦然惟氣癩水癩關元名之可也

朱更方消丸

和劑方

方見氣門

治腎虛為邪氣所搏結成寒痞仗留不去

射香臭成丸

和劑方

治陰癩腫脹并小腸氣

葫蘆巴 炒四兩

大戟 去皮炒黃十兩 檳榔 別去底細切不見火一兩

麝香 別研一錢

川練子 六兩

訶子 炮去核酒浸蒸焙各一兩

附子 炮去皮臍

茴香 舶上者六兩 木香 一兩

右為末獨留川練子以好酒二升葱白七枚長四寸者川練子去核取肉和藥杵丸如梧桐子大空心姜酒下十九丸

續命丸

濟生方

治四種癩病卵核腫脹有小大或堅硬如右痛引臍腹甚則膚

囊腫脹成瘡時出黃水或癰潰

橘核 炒

海藻

昆布

海帶 各洗

川練子 取肉炒

桃仁 麩炒各一兩

厚朴 去皮姜炒

木通

枳實 炒

玄胡索 炒去皮

桂心 不見火

木香 不見火各

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九丸空心鹽酒鹽湯任下虛寒甚者加熟川烏一兩堅脹久不消者加硃砂二錢醋煮旋入

濟生方治小兒外腎偏墜

防風 去芦

牡丹皮 去木各等分

右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒益湯點服亦可

活人書 療交接勞役陰囊腫脹痛入腹中

刮竹青皮一升以水三升

煮一半去滓分服立愈

治小腸氣并外腎腫痛 方見氣門

痼冷

人之一身貴乎陰陽升降平和無偏若有偏勝是即為病痼冷之証皆以人身真陽耗散脾胃虛弱加以食痰冷物有傷其脾胃痼結其冷於臟腑不散以致乎足厥逆畏冷增寒飲食不化嘔吐涎沫或大腑洞泄或小便頻數其為証也尤多治之須煖下元兼理脾胃若又有脾虛而畏寒者令人咳嗽又當於咳嗽門求之

姜附湯 和劑方 方載寒門治一切沉寒痼冷諸證

沉香畢澄如丸 和劑方 治內絞積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃臟腑自利

小便滑數小腸一切氣痛並皆治之

附子 炮去皮

萆澄加

沉香

葫蘆巴

肉桂 去皮

補骨脂 炒

茴香

巴戟天 去心

桃仁 去皮尖及仁炒二兩

川練子 炮去核各四兩

木香

川烏 炮去皮臍半兩

右以咀每服三錢水一盞入鹽少許煎八分空心熱服

三建湯 和劑方 方載諸虛門除痼冷扶元氣

洞陽丹 濟生方 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰証悉皆治

川烏 去皮四兩炮

天雄 炮去皮二兩

附子 炮去皮臍

陽起石 火煨四兩

朱砂 煨別研一兩

右為末酒煮神麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯下

和劑方 方載諸虛門治內絞積冷臍腹弦急痛引腰背時有盜汗小

便滑數心腹脹滿

附子圓香散 濟生方 治氣虛積冷心腹絞痛

肉豆蔻 煨

茴香 炒

白木炒

木香

人參

白茯苓

乾姜 炮各一兩

丁香

附子 大者一枚炮去皮臍

甘草 炙各半兩

右咬咀每服三錢水一盞鹽少許煎七分空心服

寒痰

治風寒積冷伏滯陰氣心腹膨脹兩脇疼痛

阿魏 酒半升研化及沉香 煉蜜半斤別研 沒藥 鳩碎酒半升化及入上酒

硫黃 滴水研極細 巴豆霜 一錢半用酒半升先入銀石器內煮之

硃砂 各一兩酒半升煮去石入巴豆酒內熬如稀糊入沉香煎項

一蒙熬成膏 枳榔

青皮

丁香

木香 不見火

胡椒

官桂 不見火

人參 各二兩

乾姜 七錢半

朱砂 半兩別研

良姜 一兩水煮五六沸日乾

右為末次入朱砂硫黃二味研勻入前膏於臼內杵三千下丸如梧桐子大

每服三十九陳皮湯下

朱丹

百一選方 治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變為癆瘵

朱砂

雄黃 各二兩

以上用沙合一箇先以杜丹皮二兩內外薰黃入藥於內以嚴醋和膏茶作餅蓋定合口以赤石脂固濟合縫又用赤石脂泥裹合子一重再用黃泥紙筋又裹一重先以草火燒令乾次以炭火五斤漸又添至一秤候火力漸消取出掘地坑一尺埋一宿去火毒取研入後藥

附子 炮製為末

胡椒

赤石脂

官桂

丁香

葷撥

木香

沉香

白朮 各一兩

乳香 半兩與前赤石脂同研細

右為末入前藥研勻以清酒二升三分熬去二分入附子末煮糊丸如梧桐子大每服十九空心溫酒鹽湯任下

積熱

積熱者熱毒蘊積於其內也夫人固有躰氣素實一時感觸熱毒之氣或鬱積臟腑之間或在心肺之內令人苦咽乾涎唾稠粘眼澁多淚口舌生瘡大小便秘結又有陰盛血衰三焦已燥服餌酒炙之物并丹石之藥愈助其熱結滯於內亦能令人變生諸証治之須詳其脈証若在心膈者清之結于臟腑者湯滌之更量人氣壯虛實輕重用藥

三黃湯

和劑方 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連 去戶須

黃芩 去戶

大黃 煨各十兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分空心服

刑黃湯

和劑方 治風熱結滯或生瘡癩

荆芥 四兩

大黃 一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分空心服

涼膈散 和劑方 方見傷寒門治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩

燥多渴腸胃秘泄便溺不利

防心散 和劑方 治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小便澁

白朮 一兩半

麻黃 和劑

當歸 去芦洗

荆芥穗

芍藥

甘草 炙

大黃 麩裹煨去面切焙各八兩

右為末每服二錢水一盞生姜薄荷各少許同煎溫服

八正散 和劑方 方見淋門治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤疳積臍腹

秘結小便赤澁

黃丸 和劑方 治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澁大便秘

結並宜服之

黃連 去芦須

黃芩 去芦

大黃 煨各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九粒熱水吞下一方用腦射為衣丸如

大豆大夜間含化一兩丸亦好

龍腦散 和劑方 治蘊積邪熱咽喉腫痛心煩鼻衄及痰熱咳嗽中暑煩燥傷寒

餘獨發熱並宜服之

宿砂仁

瓜蒌根 各三兩

藿香葉 二兩四錢 石膏 四兩

甘草 蜜炙十六兩 梔子仁 十二兩

右為末每服二錢用新水入蜜調下傷寒餘毒潮熱虛汗除蜜入竹青煎服

龍腦散 和劑方 消煩渴涼上膈解毒除邪熱并治咳嗽唾血鼻血吐血

諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾疽口甜膽疽口苦並宜服之

黃耆 去芦一兩

麥門冬 去心四兩阿膠炒

蒲黃 炒各二兩

生乾地黄 六兩另研細末

甘草 炙一兩半

人參 去芦一兩

木通 二兩同柴胡浸柴胡 銀州者二兩和木通以湯半升浸一二宿取汁後入膏

雞蘇淨葉 一斤即薄荷

右除別研藥外並搗為末將好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黄末不

住手攪令勻取木通柴胡汗慢火熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為

丸如黃豆大每服二十九粒破熱水下虛寒煩熱消渴驚悸人參湯下咳嗽

唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟諸淋用車前子煎湯下

中藥散 和劑方 治胃中客熱牙宣齲腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經受溫伏熱

在裏身黃如赤亦能治之

枳殼去白麩炒 石斛去毒 枇杷葉淨去毛 甘草

乾熟地黃 黃芩 天門冬去心焙 麥門冬去心焙

山茵陳 生乾地黃

消毒犀角散 和劑方 治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項結核遍生瘡具已出未出並宜服之

鼠粘子炒 十四兩 防風去芦 八兩 甘草炙 十六兩 荆芥穗二斤

右吹咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

碧璽 和劑方 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝 青黛 石膏煨 各研末飛 寒水石 朴硝 滑石 甘草煎湯 二升 馬牙硝各等分

右將其草湯入諸藥再煎用柳木篦不住手撓令消溶入青黛和勻傾砂盆內候冷結凝成霜研為末每用少許含化熱津如喉閉不能嚥下用竹筒吹藥入喉中

薄荷 御藥院方 治口舌生瘡癰疽壅塞咽喉腫痛 川芎半兩 取末二錢 腦子半錢

縮砂仁半兩 取末二錢 甘草半兩 取末一錢半

右為末入腦子和勻煉蜜成劑任意嚥嚼和劑方無腦子有桔梗

神言 御藥院方 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癩咽膈不利小便閉澀一切風熱之証並宜服之

大黃生 黃芩各一兩 牽牛生 滑石各四兩 黃連 薄荷 川芎各半兩

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九丸溫水食後下

酒蒸黃連丸 御藥院方 治膈熱解酒毒厚腸胃 黃連半斤 淨用酒二升浸以瓦器置甌中累蒸至火取出晒乾

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九丸食前溫水吞下

玄明粉 御藥院方 此藥大治邪熱疔干膈上氣滯五臟秘澀 以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用磁罐子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂大一煨便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處撓勻臨睡對量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下

白湯下

此朴硝本性寒燒過性溫無毒

清氣散 本事方治氣壅痰涎上膈煩熱

枳殼

川芎

柴胡

前胡

茯苓

甘草

獨活

羌活

青皮

白朮

人參

各等分

天竺散

右為末每服二錢水一盞荆芥一穗煎七分服
經驗方治臟腑積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子

連翹

甘草

雞冠雄黃

瓜蒌根

鬱金

用皂角水煮切片焙乾三錢

桂腎丸

右為末每服一錢食後臨卧新汲水調服
按粹方治不渴小便閉邪熱在血分也

知母

肉桂

黃藥

一兩細剉酒拌陰乾

右上二味氣俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂與火邪同體故曰寒

天門冬散

經驗方治肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀卧眠心燥

天門冬

大黃

升麻

桑白皮

枳殼

甘草

荆芥

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後溫服

人參瀉肺湯

秘方治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰多大便澀滯

黃芩

梔子

枳殼

甘草

薄荷

連翹

甘草

杏仁

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

金真子

聖惠方治五臟積熱洗滌腸垢潤利溲澀風毒攻疰手足浮腫或頑痺

不仁痰涎不利涕唾稠粘胸膈痞塞脘腹脹滿飲食減少困倦無力傷內並宜服之

川大黃 三兩用米泔水浸過三日每日換取出切片焙乾為細末

黑牽牛 八兩淨慢火炒四兩生用四兩同取頭末四兩

右以皂角一兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿八羅蔔一兩切作片子同皂

角一處熬至半碗去滓再熬至兩盞攪和上件藥末乾濕得所丸如梧桐子

大每服二三十丸至五六十丸諸飲下不拘時候隨証加減任意如能通變

無病不治

含化三黃丸 秘方

大黃

黃芩

黃連 各二兩半

黃藥子

白藥子 各一兩半

射香 少許

黃連

苦參

山豆根 各一兩

明砂 一兩

腦子 一錢半

京墨 三錢

冬加知母

右為細末用猪膽汁調勻攤在碗內甑上蒸二次露一宿後入腦子射香明砂為丸如豆大每服一九食禽化下一方有甘草

大金花丸

宣門方 治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳衄血瘦弱頭

痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又名既濟解毒丸

黃連

黃柏

黃芩

大黃 各等分

自利去大黃加梔子

右為末滴水丸如小豆大每服二三十丸新汲水下

四生丸

宣明方 治一切熱痰常服潤肌膚養老諸熱証皆可服

大黃

牽牛

皂角 各二兩

朴硝 半兩

右為末滴水丸如梧桐子大每服三十九丸食後自湯下

四順清涼散

宣明方 治血熱蘊結壅滯

大黃 米上蒸日乾 赤芍藥

當歸

甘草

右等分水二盞煎至八分去滓食後通口服

黃連湯

聖惠方 治一切積熱血熱服熱酒熱並用

黃連淨不以多少井水浸之良久碗盛於鍋內煮取清汁服之

清心丸

治經絡中熱夢漏心忪恍惚膈熱夢不可全作虛冷亦有經絡熱

而得之者

黃柏 生二兩

龍腦 二錢

右為末蜜丸如梧桐子大每服十九臨臥煎麥門冬酒下

清心湯

方見傷寒門 涼膈散料內加黃連五錢煎一方用蜜竹葉固煎

宣利積熱金花丸

大黃 二兩微炮 黑牽牛末 三兩牽牛半熟

右為末薄荷為丸如梧桐子大每服五十九食後熟水下

黃芩湯

治心勞實熱口瘡心寒腹滿小便不利

澤瀉

梔子仁

黃芩

麥門冬 去心

木通

生地黃

黃連

甘草 各等分

右咬咀每服一兩水二盞姜五片煎至一盞去查食前溫服

當歸黃芩湯

治熱上攻頭目渾身胸背發熱

當歸 酒浸一錢 黃芩 五錢

右以咀水一盞半煎至八分去查食後溫服

諸血

人身之血猶水行地中百川皆理則無壅決之患一身之間榮衛失調七情四氣相干氣血逆亂然後發生吐血咳血諸証夫血之妄行固由積熱所致然其証多端難以一槩而論有因飲食過飽負重傷胃而吐者有思慮傷心並積熱而吐血衄血者有勞傷心肺又為七情所干而咳血吐血者心主血肝藏之而脾為之統過思傷脾亦能令人吐血治之消究其因傷胃者調胃安血勞心者補益其心志熱則清之氣鬱則順之傷脾則安之吐血之脈宜沉細不喜浮數吐而不咳者易治唾中帶紅線者難治為其有所損故也病之淺者惟有早灸膏肓而已致若肺生疽瘡從高墜下一應傷血皆能吐血傷寒汗後不解鬱熱經絡隨氣湧地吐血衄血又當從各類求之入之滋養一身惟氣與血七為榮氣為衛榮行脈中衛行脈外故心主血肝藏之而脾為之統貴為氣順則血調若內因七情并酒食所傷外為血氣相干則血氣逆亂榮衛失度皆能令人吐

血者風入腸胃者其脈浮下血必在糞前是名近血傳積于大腸者其脈沉滯血在糞後又名遠血臟寒者其脈沉微下血無痛積熱者其脈洪數純下鮮血甚則急痛傷濕者脈沉而遲下血如豆汁又有因氣鬱結酒色過度并過食炙膾因毒生蟲亦能令人下血又當以五臟所傷辨其証治風濕則祛之寒則溫之熱則清之傳滯則疎滌之氣則調之有毒者解之下血之証非止一端大槩得熱而行得黑而止用藥當審之

大日膠

和劑方

治肺虛各熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血勞傷肺胃吐血

嘔血並皆治之

麥門冬 去心半兩 乾山藥

杜仲 去皮炒各五錢 遠志 去心二錢

具母 炒 茯神 去木

人參 去芦 阿膠 炒各七錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九水一盞煎六分去滓服

龍腦雞筋丸

方見積熱門

治膈熱咳嗽或吐血衄血

必勝散

和劑方

治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血並皆治之

小薊 并根用

人參 去芦

蒲黃 炒

當歸 去芦

熟乾地黃 各一兩 五味子

丹參

百部根

茯苓 三錢

栝子仁

防風 去芦各半兩

熟乾地黄

川芎

烏梅去核各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

枇杷葉散

和劑方

方見暑門治暑毒攻心嘔吐鮮血

鵬砂散

和劑方

治大人小兒喉閉生瘡風痰熱毒鼻衄出血

山藥六斤生

腦子七兩別研

牙硝一十四兩

甘草二十兩

射香四兩研

鵬砂二十兩生別研

三黃丸

和劑方

方見積熱門治積熱吐血咽膈不利

龍骨散

三因方

治鼻衄過多龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九

天冬補心湯

三因方

方見心痛門治心虛為邪氣所傷吐血

射香散

御藥院方

治鼻不止

白礬括過別研

射香別研半兩

白龍骨粘舌者別研各半兩

右三味拌和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以

西梅丸

本事方治衄血無時

羌草根

艾葉各一兩

烏梅肉炒乾半兩

天門冬丸

本事方

治吐血路血大能潤肺止咳

天門冬一兩

甘草

白茯苓

阿膠

杏仁炒

貞母各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一九熱津含化日夜可十丸

白木二兩

人參去芦

白茯苓去皮

黃耆蜜浸各一兩

柴胡二錢半

山藥

百合去心各七錢半

甘草炙半兩

前胡去芦二錢半

醫國固本散

簡易方

治吐血便血

白芷半兩

真蒲黃炒一兩

甘草一錢半

地榆去芦一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎六分溫服

醫國黃氏散

簡易方

治咳血成勞退情痛四肢倦脚無力肌躰消瘦常服此散

鮮肌熱

黃芪 蜜炙

白芍藥 各半兩

麥門冬 去心

甘草 炙二錢半

熟地黄

桔梗 炒

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分溫服

歸脾湯 濟生方 方見健忘門治思慮傷脾不能統攝心血以致反行或吐血下血

犀角地黄湯 濟生方 治傷寒汗下不解鬱于經結隨氣湧泄為衄血或清道閉

寒流入胃脘吐清血如鼻中血不盡余血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之 方見傷寒門如潮熱發狂加黃芩大黃

茜根散 濟生方 治鼻衄不止

茜根

生地黄 各一兩

剉柏葉

甘草 炙半兩

阿膠 焙粉炒

黃芩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

天門冬湯 濟生方 治思慮傷心吐血衄血

遠志 去心甘草水煮

黃芪 去芦

白芍藥

藕節

天門冬 去心

阿膠 焙粉炒

麥門冬 去心

沒藥

當歸 去芦

生地黄 各一兩

人參

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

大薊散 生方 治飲啖辛熱傷於肺經嘔吐出血名曰肺疽

大薊根 洗

犀角 鎊

升麻

桑白皮 炙

蒲黃 炒

杏仁 去皮尖各二兩

甘草 炙半兩

桔梗 炒一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

加味理中湯 濟生方 治飲酒傷胃遂成吐血

乾姜 炮

人參

白朮 各二兩

乾葛

甘草 炙各半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服不拘時

雞蘇散 濟生方 治勞傷肺經唾內有血咽痰不利

雞蘇葉

黃耆 去芦

生地黄 洗淨

阿膠

貝母 去心

白茅根 各一兩

麥門冬 去心

桔梗 去芦

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎七分溫服

藕汁飲 濟生方 治吐衄血不止

生藕汁

生地黄汁

大煎汁各三合

生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小盞不拘時服

赤芍藥湯

濟生方治瘀血壅胃心下脹滿食入即嘔名曰血嘔

赤芍藥一兩

半夏一兩半

陳皮一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分溫服

四生丸

良方治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行宜服此藥

生薄荷

生艾葉

生栢葉

生地黄各等分

右爛研丸如雞子大每服一九水三盞煎至一盞瀝過溫服

黃芩芍藥湯

活人書治鼻衄

黃芩

芍藥

甘草各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎六分溫服

治鼻衄

百一方用局方四物湯加側栢葉煎服

麥門冬飲子

按粹方治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參五錢

黃耆一錢

五味子五錢

芍藥

甘草一錢

紫苑一錢半

當歸身

麥門冬各五分

右咬咀分作二服水煎食後服之

黃芩芍藥湯

按粹方治虛家不能飲食衄血吐血

黃芩

芍藥

甘草各等分

一法加生薑黃耆

右二藥治傷寒衄血吐血嘔血

雲岐子犀角地黃湯

按粹方○乳血在上焦

生地黄二兩

黃芩一兩半

黃連一兩

大黃半兩

右咬咀水三盞秤一兩煎至一盞去滓食後服

生地黄湯

按粹方治鼻衄昏迷不省

生地黄

三五斤如不暇取汁使患者生喫吸汁又以粗冲塞鼻頂血上

敗毒散

和劑方

方載傷寒門治風熱流入大腸經下血不止若因酒食毒加

巴豆炒黃連去巴不用

胃風湯

和劑方

方載痢門治風溫乘虛入于腸胃或下瘀血

腸風果散

和劑方

治腸風下血或在糞前後並皆治之

荆芥二兩

亂髮

槐花

槐角各一兩燒

甘草灸

蝟皮炒各兩半

枳殼去白二兩燒一兩

右將所燒藥同入瓷瓶內盛泥固濟燒存三分性出火氣同甘草枳殼搗羅為末每服三錢水一盞煎七分空心服

黃連香薷散

和劑方

方載暑門治伏暑純下鮮血

黑玉丹

和劑方治腸風積熱下血不止

刺蝟皮 十六兩制

猪懸蹄 一百个

敗壞到八兩

苦練根 五兩

雷丸 四兩

牛角腮 十二兩剉

脂麻 四兩

亂髮 皂角水洗净焙八兩

右剉碎用瓷罐內燒存性研為細末入乳香二兩射香八錢研和令勻用酒打麪糊為丸如梧桐子大每服二十粒先細嚼胡桃一枚空心以温酒吞下多進得効

香蓮丸

和劑方

方載痢門治冷熱不調下血如痢

槐角丸

和劑方治五種腸風下血痔瘻脫肛下血並宜服之

槐角 去枝梗炒一兩地榆

黃芩

防風 去芦

當歸 去芦酒浸一宿焙乾

枳殼 去白麩炒各半斤

三黃丸

和劑方

右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十九空心米飲下

方載積熱門治三焦蘊熱下瘀血者

龍肝散

三因方治先糞後血謂之遠血兼治吐衄

伏龍肝 半斤

甘草 炙

白朮

阿膠

黃芩

乾地黄 各三兩千金方作乾姜

右以咀每服四錢水一盞煎空心服虛者加附子

槐花散

本事方治腸風臟毒下血

槐花 炒

栢葉 爛杵焙

荆芥 穗

枳殼 各等分

右為末每服二錢空心米飲調下

槐角散

本事方治腸胃不調脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼 各一兩

槐角 二兩

甘草

烏梅 各半兩

右以咀每服五錢水二盞煎服

聚金丹

楊氏家藏方治腸胃積熱或因酒毒大便下血腹中熱痛傷渴尿米

黃連 四兩一兩水浸晒乾一兩炒一兩灰火炮一兩生用黃芩

防風 去芦各一兩

右為末煮麪糊丸如梧桐子大每服五十九米泔浸枳殼水下不拘時冬月宜入大黃一兩

赤連丸 濟生方治臟毒下血

鷹爪黃連去鬚不拘多少

右為末用獨頭蒜一箇煨香熟研和入白芥極爛丸如梧桐子大每服四十丸空心陳水飲下

烏梅丸 濟生方治大便下血不止

烏梅 三兩燒存性

右為末用好醋打米糊丸如梧桐子大每服七十九空心米飲下

加成四物湯 濟生方治腸風下血不止

側柏葉

生地黄

當歸 去芦酒浸

川芎 各一兩

枳殼 去白炒

荆芥穗

槐花 炒

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片烏梅少許同煎空心服

香梅丸 濟生方治腸風臟毒下血

烏梅 同核燒存性 香白芷 不見火

百藥煎 燒存性 各等分

右為末米糊丸如梧桐子大每服七十九空心米飲下

節紅丸

濟生方治臟腑虛寒下血不止面色萎黃日久羸瘦

側柏葉 炒黃

鹿茸 火去毛醋煮附子 炮去皮脂

川續斷 酒浸一

黃耆 去芦

阿膠 蛤粉炒成珠 當歸 去芦用酒浸各一兩

白礬 沽半兩

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十九空心米飲下

黃連散 昏明方治腸風下血疼痛不止

黃連

雞冠花

貫衆

川大黃

烏梅 各一兩

甘草 炙三錢

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不拘時

黃連貫衆散

張子和方治腸風下血

黃連

雞冠花

貫衆

大黃

烏梅 肉各二兩

甘草 炙三分

枳殼 炮

荆芥 各一兩

右為末二大服溫米飲下食前

當歸和血散

後粹方治腸僻下血濕毒下血

槐花

青皮 各六錢

當歸 身

升麻 各二錢

荆芥 穗六分

川芎 四分

熟地黄

白木 各六分

右為末每二三錢清米飲調下食前

升陽去熱和血湯

後粹方治腸僻下血依派其血啣出有方而遠射四散如篩

春二月中下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈

生地黃

牡丹皮

生甘草各五錢

熟甘草

黃耆各一錢

當歸身

熟地黃

蒼朮

秦艽

肉桂各三分

橘皮

升麻七分

白芍藥一錢半

右咬咀都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱空心服

結陰丹

按粹方治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼 麸去糠

威靈仙

黃耆

陳皮 去白

椿根白皮

何首烏

荆芥穗 已上各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五七十九陳米飲入醋少許煎過要放溫

水送下

黃連湯

按粹方治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連

當歸各五錢

甘草炙二錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前服

方藥黃連湯

保命集治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥

黃連

當歸各五錢

淡桂半錢

甘草炙二錢

大黃一錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前如痛甚調水香換

末一錢服

木香烏梅湯

聖惠方治大便前後下血不止

烏梅肉

二斤溫水浸一宿取半四一片

水香

百草霜

絲瓜灰

燒存性各二兩

黃連

栝皮

黃芩

梔子

當歸各一兩

大黃

半夏製各五錢

枳殼炒一兩

陳皮八錢

右為末用炒麩四兩入煎藥一同白內杵千餘下丸如梧桐子大每服五十

加至七八十九空米飲下如硬入梅水和之

口膠湯

按粹方治傷寒熱毒入胃下利膿血

梔子仁半兩

阿膠炒令燥

黃蘗要去粗皮炙各一兩

黃連炒二兩

右為粗末每服四錢水一盞煎服不拘時

地骨皮散

按粹方治腸風痔瘻下血不止

地骨皮

鳳眼根皮 並用懸葦者好去土不用

右二味各等分勻同炒微黃色搗為細末每服三錢空心溫酒調服忌食油膩等物

雞蘇丸

後祥方治虛熱昏胃倦急下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉八兩

黃耆

防風

去芦各一兩

桔梗

甘草

川芎各五錢

荆芥一兩

菊花

片腦半錢

生地黃五錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九用麥門冬去心煎湯爵下又治肺損吐血日漸乏力弱衰行步不得促救痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯爵下

團參丸

治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參

黃耆

飛羅麴各一兩

百合五

山梔散

朱氏集驗方治鼻衄不止

山梔子不以多少

錦節膏

濟生方治吐血嘔血

真錦灰

藕節灰各五錢

滴乳香一錢別研

右為末煉蜜丸如龍眼大每服一九食後即時嚥化下

白散

三因方治鼻衄

白及不以多少

右為末冷水調貼鼻竅中

槐花散

朱氏集驗方治咯血失

槐花炒

右為末每服二錢糯米飲下仰卧

雙荷散

聖惠方治卒暴吐血

藕節七個

荷葉頂七個

右同家細水二盞煎八分去滓溫服或研末調下

生肌散

後祥方主脈浮皮脈乳浮乳相合血積胸中熱之甚也血在二焦

此藥治之

生地黃二兩

黃芩一兩

黃連一兩

大黃五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

辰膠散

經方治大人小兒吐血

阿膠炒

蛤粉各一兩

辰砂少許

右為末藕節搗汁和蜜調下食後服

調經散

經驗方治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄行其出如湧泉

口鼻皆流須臾不救服此安一治男子婦人九竅出血

栢葉一兩半蒸乾人參去芦一兩 荆芥穗一兩燒灰

右為末每服三錢入飛羅麵三錢拌和汲水調稀糊相似服

止血散

御藥院方治腸風下血或在糞前或在便後在便前者見血近腎肝血

也在便後者心肺血也其血遠此藥並主之

皂角刺燒灰二兩 胡桃仁去皮 故紙炒 槐花三兩半

右為末每服二錢米飲調下酒亦可

治瘰癧湯

後料方下血調氣洩而便膿血知氣行而血止行血則便愈命調氣則

後重除

芍藥一兩 當歸 黃連 黃芩各五錢

肉桂二錢半 檳榔三錢 大黃三錢 甘草炙

木香各二錢

右咬咀每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服如痢不減漸加大黃如汗後

臟毒加黃栢半兩依前服

京山黃湯

按粹方如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五

臟則填滿閉塞下為食泄久為腸癖夫腸癖者水穀與血另作一泓即出也今

時值長夏溫熱大盛正當客氣勝而主氣弱也故腸癖之証甚以此藥主之

熟地黃半錢 知母剉炒一錢 青皮半錢 槐花炒

當歸各半錢 黃栢去皮剉炒一錢

右咬咀都作一服水一盞煎至七分去滓溫服如小便澀臍下悶或大便則

後重調木香檳榔細末各半錢稍熱空心服或食前如裏急後重又不去者

當歸之如有傳變隨証加減

黃連阿膠丸

直指方治肺熱或咯血 方在痢門用赤茯苓能抑心火

芎藭湯

齊生方治一切失血過多眩暈不甦

芎藭 當歸去芦酒浸各等分

右咬咀每服四錢水二盞煎至七分去滓溫服不拘時候甚者加附子

經効阿丸

齊生方治勞嗽并嗽血唾血 方見癆瘵門

當歸地黃湯

宣明方治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多帶嗽

方見癆瘵門

生地黃湯 直指方治上熱衄血

生地黃二兩淨 阿膠炒一兩 川芎 桔梗 蒲黃

右以咀每服八錢水一盞半入生姜汁二匙煎至八分去滓溫服

麥門冬散 直指方治鼻衄 白芍藥 蒲黃各二錢 生姜一錢 生地黃 麥門冬 去心各三錢

右以咀蜜一合水一盞半煎至八分溫服分兩服

川芎三黃散 直指方治實熱衄血 川芎 黃連 黃芩各等分 大黃 溫紙裹蒸

右為末每服二錢并水調下食後

救脈湯 履粹方治吐血 升麻 柴胡 人參 蒼朮 當歸稍 熟地黃 白芍藥 黃耆各二錢 蘇木五錢 甘草 陳皮各半錢

右以咀子服八錢水二盞煎至八分去滓溫服

治吐血 秘方

馬尾包

右為末砂糖丸如彈子大每服半丸冷水下

黃根散 經驗方治大人小兒吐血

右茜根不以多少為末新水調下大人二錢小兒大小各量分兩

治勞心吐血 經驗方

蓮心二十一个 糯米二十一粒生用

右為末酒調二錢食後服

生地黃湯 經驗方治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切丹毒

生地黃 赤芍藥 當歸 川芎各等分

右以咀水二盞煎至一盞去滓食後溫服若鼻衄加蒲黃生瘡加黃芩丹毒

加防風 **清肺飲** 試効方治衄血吐血久不愈者

五味子 十个 麥門冬 各去心 當歸身 人參 生地黃 各五分 黃耆 二錢

右以咀作一服水二盞煎至一盞去滓食後溫服用三稜針氣衝出血立愈

地黄飲 後將方治衄血往來久不愈甚効

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮 各等分

麥門冬飲子

濟生方 治衄血不止

麥門冬

生地黄 各等分

右剉每服一兩水煎

又衄血先硃砂蛤粉次木香黃連大便結下之大黃

芒硝甘草生地黄唐軟梔子黃芩黃連可選而用之

生地黄散

後將方 治諸見血無寒衄血下血吐血弱血

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮

天門冬 去心

黃耆

白芍藥

甘草 灸

黃芩 各等分

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服脈微身涼加減每一兩加官桂半錢

治吐血便血咯嘔等症 秘方

乾葛

青鹽

梔子

槐花

甘草

烏梅炒各等分

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後溫服

四聖散

經驗方 治咳嗽有血 方見咳嗽門

果神散

經驗方 治大人吐血及傷酒食飽低頭擗損吐血至多汗血妄行口鼻

血出但舌末尖者投之無不効者

百草霜

不以多少研 吐血時用糯米飲調下 一二錢止佳

鼻衄 一草吹入鼻中立効

皮肉破處及灸瘡出血百般用藥不止搽半錢或一字立止

右用鄉外人家百草霜為妙即鍋底上黑灰

黃連散

經驗方 治大人小兒熱氣盛熱乘於血上隨氣散溢於鼻者謂之鼻衄

血得寒則凝溢結聚得熱則流散妄行

黃連

栢葉

甘草 各等分

豆豉 三十粒

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

痔漏

痔之五種牡痔腸痔血痔牝痔脉痔是也究其所因皆由是素熱毒或過食燒

灸新酒父坐血脉不流或因七情之氣鬱結于臟腑之間其毒不能消散然而為痔或藏於肛門之內或突出於外大者如蓮花雞冠桃核之狀小者如牛妳雞心鼠尾櫻桃之類名實更多其實皆由臟毒所致故蘊毒深者其狀大蘊毒小者其形小或流膿水或出鮮血行坐之間病者殊為之苦久而不治血氣衰弱必然成漏今之治法多用刀線割剔其痔雖有藥可以封固然其毒在內無由而去必有再作之理否則成漏轉而為難治之証諸方多有服食敷貼之藥今入用之少見有效揆度其理其病既有形於外非服藥之能愈必須用去毒消痔之藥點之候其毒盡痔消方可為愈功不可用砒霜等毒藥恐致人奄忽慎之慎之又有無痔者肛門左右別有一竅流出膿血名為筆漏治之須用溫暖之藥補其內又以生肌肉之藥敷於外其竅在皮膚者易愈臟腑有損而生竅者未易治也

槐角丸

和劑方

方載諸血門治五種痔瘡遠近近日並皆治之

槐白皮膏

和劑方治內外諸痔久年不愈者

槐白皮

枳實各五錢

赤小豆二合

桃仁六十枚

當歸三兩

甘草

白芷各二兩

右以咀以煎成猪膏一片做大煎至黃色藥可成膏以貼瘡

御藥院方

治腸癖下血痔漏結核疼痛

楸藤子

一個重七錢者酥炙和皮用

皂角刺燒存性

麝香沙

枯白礬

枳殼去白麩炒

樗皮焙乾各半兩

白附子炮

乳香二錢半

蝟皮燒存性五錢

右為末醋麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心溫酒下如痔瘡痛醋研五七九塗患處

五灰散

三因方治五種痔不問內外並宜服之

蟹甲治壯痔

蝟皮壯痔

蜂房脈痔

蛇蛻氣痔

猪左足懸蹄甲治腸痔各等分

右燒存性隨證倍用一分為末并花水調二錢空心卧時服

黃鹿痔

本事方

枳殼不拘多少

右為末每服二錢水一大碗沙瓶內煎百沸先以薰蒸而後洗之

噴皮丸

濟生方治五種痔漏

猪左懸蹄

黃牛角腮

蝟皮一枚同上二藥燒灰存性

防風去芦

貫衆

槐角子炒

蟹甲醋煮

枳殼 去白生用 雞冠花 槐花 黃耆 去芦

雷丸 黃連 去須 當歸 去芦酒浸 香白芷

右為末米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心米飲湯送下年高并虛弱者不宜服之

弱牛膏 濟生方 敷痔有效用蝸牛一枚射香少許用小砂合子盛蝸牛以射香糝之次早取汁塗痔處

五灰膏 危氏方 治臟腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近日形似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外並皆治之此方親傳之瘡科劉叔茂累試皆驗不敢自秘

養麥 灰半斗許 荆柴 老杉枝 薊柴 山白竹

右以上四般柴竹截作二尺許長以斧劈破成片各取一束置極內為灰防為風所化俟盡燒却以水於窩內煮用炭汁又用酒漏以布帛實其竅置養麥灰於酒漏內以所煮四般炭汁淋之然後取汁於窩內慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰用酒調和成膏以瓦瓶貯之上用石灰傳之面上不冷走氣臨用時却去石灰以冷水調開令病者以水洗上淨痔瘡仰臥於起一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹筒挑藥塗痔上須臾痛息用紙拭去藥再塗如此三四遍要痔瘡如墨樣黑方止以水洗淨每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五遍六七日後膿穢出盡其瘡自消

果丸 危氏方 專治久年痔漏下血用之累驗

乾姜 百草霜 一兩 木饅頭 二兩 烏梅 敗後 栢葉 油髮 各五錢

以上七味各燒灰存性却入後藥 桂心 三錢 白芷 五錢 各不火

右九味為末醋糊丸如梧桐子大空心米飲下二十九

寬腸丸 醫方大成 五灰膏塗瘡之後或臟腑秘結不通者用此藥寬腸

黃連 枳殼 各等分 右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

養液丸 宣明論方 治濕熱內甚因而飽食腸癖為諸痔久而成瘻 水香 黃蘗 各三錢 枳殼 去穢炒 厚朴 各半兩 黃連 一兩 蝟皮 一个 燒灰 當歸 四錢 荆芥穗 三錢 右為末麪糊丸如梧桐子大每服二三十丸溫水下食前日二服

黃耆薑花丸 宣明論方治腸中久積熱痔瘻下血疼痛

黃耆 薑花 生地黄焙 黃芩 當歸各三錢 黃赤小豆化 一兩

大黃 赤芍藥 黃芩 當歸各三錢

蠟皮一个 柝榔 白茯苓 皂角子仁炒各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十九煎桑白皮湯又用面香槐子煎湯下亦可

蒲黃散 後齊方治下部痔漏 蒲黃一兩 血竭半兩

右為細末每用少許拈患處

調腸丸 和劑方治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門出脫出宜服

括萎二枚燒存性 蠟皮二个燒存性 雞冠花微炒五兩 綠礬枯

白礬枯二兩 胡桃仁取仁十五兩不去油錫內燒存性 白附子生用

天南星生用 枳殼去穢炒 附子去皮生用 半夏二兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十九空心臨卧温酒送下

人參散 宣明論方治腸風下血疼痛不止

雞冠花 黃連 貫衆 川大黃

烏梅各一兩 甘草七錢半

右為末每服二錢用温米調下日三服不拘時

枳殼散 御藥院方治腸風痔瘻便血無數疼痛不可忍者 枳殼麩炒去穢 槐子微炒黃色 荆芥穗各五錢

右為末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二里地再以粥壓下日進二服

治腸風散 經驗方 右用茄蒂燒存性為末米飲調下二錢小兒服半錢

治痔漏方 秘方 右用蛻蝦不以多少焙乾為末先用礬水洗淨貼之

辰砂各五錢 人言一錢 白礬二錢 蜜陀僧 辰砂各五錢

右件先研人言細鋪鍋底次用礬鋪人言上枯烟盡為度次將陀僧辰砂研細白糕和作尖錠如小麥大每用一粒頑漏納瘡口上去敗肉盡後貼生肌

生肌散 秘方

寒水石煨一錢 龍骨煨五錢 乾胭脂三分 輕粉一錢

右件研末乾貼瘡嫩寒水石乾胭脂加龍腦瘡老止依方

辰砂膏 秘方

瓜蒂三錢末 蜜陀僧研二錢 硃砂半錢 片腦少許

右件為末乾津調貼溫乾貼

五寶散 秘方

礞砂二兩先燒礞砂在鍋內次用白礬末放上枯烟灰為度白礬二兩

硃砂四錢

右件為末敷痔乾用津唾調貼

代針膏 秘方

巴豆五子去皮 枳殼二个大者去穰

右件將豆粒在枳殼內綿縛確內盛醋煮乾枳豆晒乾研細用絲綿蘸濕轉藥敷痔根上去痔不用止用生肌散如頑漏日久不可用津調代針膏敷瘡頭尖敗肉自去

薰痔法 秘法

右用全蝎不以多少或三二箇初發痔瘻用此燒薰

痔瘻 經驗方

右用韭菜不以多少洗燒熱湯以盆盛湯在內盆上用器具蓋之留一竅却以韭菜於湯內泡之以穀道坐竅上令氣蒸薰候溫用韭菜輕上洗瘡數次自然脫体

又秘方

先用乾馬齒莧煎湯次用螺螄活搗敷瘡紙封口空心食前鹽湯調枳殼服
烏玉丸 秘方治男子婦人又血腸風痔漏者夜痒不可忍者服此三四次見効初得此病或痒或疼穀道周迴多生硬核是痔破者是漏下血是風皆因酒色過度即成此疾人多以外醫敷洗病在腸中有蟲若不去根者其病難除

槐角六兩 雷丸四兩 敗稜八兩 苦練根五兩

芝麻四兩 牛角膠對十一兩 乱髮皂角水洗八兩

痔漏

右件剉碎用磁器內燒存性碾末入乳香二兩射香八錢研勻酒糊丸如梧桐子大每服五十九細嚼胡桃一枚溫酒送下空心晚二服甚者三服忌別藥房室醋魚雞諸般發風動氣毒物并坐濕地

雲臺散 秘方

雲臺子 蔓青子 蘿蔔子 荆芥子

芫荽子

蒿苴子

蒼蓮子

葱子

右件等分用鯽魚不用鱗尾將肚持淨抹乾裝藥縫合銀石器內放石器蓋之上下放火煉之熟乾放冷搗末每服二錢米飲下空心日進二服

治男婦翻花痔漏 秘方

草麻子帶殼

天南星

防風各半兩

右件為粗末盆內燒烟上用器具蓋之留一孔坐孔上薰之

四效散 聖惠方 治鼻衄痔漏

蜜陀僧二錢 射

片腦各半錢

銅綠一字

右件為末先用漿水洗拭乾敷

治痔疾疼痛

枳殼半錢

朴硝二錢半

薄荷半兩

荆芥

乾蓮蓬各一兩

右件為粗末用水三碗煎至二碗半乘熱薰洗

又方 用冬瓜湯洗即愈

又方 治腸風下血

乾穉根白皮

人參去芦

右件等分為末每服二錢空心用酒或米飲送下

又方

槐花

枳殼

右等分炒存性為末新井水為丸飲下

○脫肛

肺與大腸為表裏故肺臟蘊熱則肛門閉結肺臟虛寒則肛門脫出此三因之論又有婦人產育用力過多及小兒久痢後臟寒皆能使肛門突出治之必須溫肺臟補腸胃久則有能收矣

釣腸湯

和劑方

治內外諸痔及肛門腫痛或下膿血腸風下血以致肛門脫出

並宜服之

苳葵一个燒存性 白礬枯

半夏

天南星各五錢

胡桃仁十五个不油者就罐內燒存性

綠礬枯

白附子

雞冠花炒各五兩 蝟皮两个

附子去皮生用

枳殼去白麩炒

訶子煨去核各二兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下

漏痔

乳香丸 和劑方治諸痔并腸風下血肛邊或生結核腫痛或已成瘡大便艱難
肛腸脫出

枳殼去白麩炒半兩 牡蠣煨半兩

乳香研

白丁香各二錢

萹澄茄

大黃蒸焙

完青去頭足糯米炒各半兩

鶴風沙

右為末粟米糊丸如梧桐子大每服二十九丸腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯
下諸漏煎鉄屑湯下並空心食前

蝟皮散 三因方治肛門或因洞泄或因用力太過脫出不收

蝟皮一个燒存性 磁石煨

桂心各半兩

香劑散 三因方治肛門脫出大入小兒悉皆治之

香附子

荆芥穗各等分

右為末每服三匙水一大碗煎十數沸熱淋洗

又方 三因方用五倍子為末每用三錢入白礬一塊水一碗煎洗立効

又方 三因方用水賊不以多少燒存性為細末糝肛門上按入即愈

聖散子 三因方治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少許為細末乾貼患處

治脫肛 百一還方以槐花槐角各等分炒黃為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒

送下以猪膠去皮蘸藥炙食亦可

紫散膏 治臟熱肛門脫出以紫背散一大握又名魚腥草研爛如泥先用

朴硝水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用藥於臀下貼坐自然收

靈散 治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨煨五錢

木賊燒存性二錢半

右為末糝托之

遺尿失禁

人之遊氣藉心腎二氣之所傳送蓋心與小腸為表裏腎與膀胱為表裏若心
腎氣虧陽氣衰冷傳送失度則必有遺尿失禁之患故經云膀胱不利為痿不
約為遺是也治之宜補煖下元清心寡欲又有產後不順致傷膀胱及小兒胞
冷俱能令人遺尿失禁又當隨証施治

氣丹 和劑方治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小數不禁

硫黃細研

肉桂去皮為末各二錢半

乾姜炮為末

硃砂研為末各三錢附子一枚大者炮去皮臍為末半兩

右以麵糊為丸如梧桐子大每服五十九鹽湯空心下

秘方

御藥院方治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨 三兩

訶子 十個去核

宿砂 一兩去皮

灵砂 二兩

右為末煮糯米粥丸如梧桐子大每服五十九空心鹽酒下

家韭子丸

三因方治大人小兒下元虛冷小便不禁或成白濁常服補養元氣

進美飲食

家韭子 六兩炒

鹿茸 四兩酥炙

茯苓酒浸

牛膝酒浸

熟地黄

當歸 各二兩

杜仲 去皮炒

石斛 去苗

乾姜炮

桂心 各一兩

鬼絲子用酒浸各一兩半

巴戟 去心

右為末酒糊丸如梧桐子大每服一百丸空心鹽湯温酒任下小兒須作小

丸服之

茯苓丸

三因方治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁

赤茯苓

白茯苓 各等分

右為末以新汲水接先澄去新沫控乾別取地黄汁與好酒同於銀石器內

熬成膏搜和丸如彈子大空心鹽酒爵一九

雞內金散

三因方治遺尿失禁

雞胗一具并腸淨洗燒為灰男子用雄女○用雄者

右研為末每服二錢酒飲調下

鬼絲子丸

濟生方治小便多或致失禁

鬼絲子

淘淨酒蒸兩壯礪取粉

附子 炮去皮

五味子

鹿耳酒炙各一兩

肉苁蓉 二兩酒浸

雞胗 炙

桑螵蛸酒炙二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯鹽酒任下

治小便遺失

澹寮方

阿膠炒珠子

牡蠣

鹿茸酒炙

桑螵蛸酒炙各

右為末糯米糊丸如梧桐子大每服五十粒空心鹽酒下

桑螵蛸散

澹寮方

方見赤白濁門治男子小便頻數如稠米泔色此由勞心

胸得之有服此藥不終劑而愈夫能安神定志

分清飲

簡易方治思慮過度清濁相干小便白濁

益智仁

酒醋浸二日白茯苓 去皮

石菖蒲 去皮毛

川草薢

天台烏藥 各一兩甘草 四錢

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓入鹽少許食前服

雜方附諸香

神仙解毒萬病丸

百一選方一丸又各神授冊又名神仙治毒丸

能解一切毒如被狐狸毒鼠毒惡菌河狹毒食疫死牛馬肉毒或蛇犬惡蟲所傷又治癰疽發背及癩魚腦瘡人多不識喚作癰疽致命殺人者及治諸風癱瘓赤腫疔等

文拾一名五倍子隨破洗焙淨秤三兩 千金子去殼研去油取霜一兩

射香研二錢

紅芽大戟去芦洗焙乾一兩半

山慈菘去皮淨焙二兩

右除千金子射香外三味未却入二味研藥勻用糯米濃飲為劑杵千餘下分為四十粒每服一粒研生姜薄荷汁并花水研服乾薄荷濃煎湯冷磨服亦佳通利一兩行無妨只用溫粥止住合時宜端午七夕重陽日合或遇天德月德日亦佳合時要在淨室焚香至誠脩製母令婦人雞犬見之効驗不可具述珍藏之

○喻良能云葛丞相傳此方以為濟世衛生之寶凡人居家或出入不可無此藥若遊宦領表毒藥最多總竟意思不快便要服之即安二廣等處山谷間有草曰胡蔓草又名斷腸草若以毒入急水吞之急死急水吞之緩死又取

毒殺之以草覆上以水灌之數日菌生其上取為末調酒以毒人姑亦無慮再飲酒即毒發立死其俗淫婦人多自配合比人與之情分相好多不肯放比人回陰以藥置食中比還即戒之曰子其來若從其言即復以藥解之若過期不往必死矣名曰定年藥比人屆彼亦宜誌之若竟中毒四大不調即便服之立愈或於雞豚魚羊鵝鴨等肉內下藥再食此物即觸發其毒急服此藥一粒或吐或下隨手便瘥昔有一女子父患勞瘵命在旦夕為血尸蟲所噬磨一粒服之一時間吐下小蟲千餘條一大者正為兩段後更服蘇合香丸半月遂愈

湯數于後

菌障蒜子金石砒每喫死牛馬肉河狹魚毒時行瘟疫山嵐瘴氣急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼癆癰衝胃寒暑熱毒上攻自溢溺水打折傷死但心頭微暖未隔宿者已上並用生姜蜜水磨一粒嚥之須臾復甦○癰疽發背未破魚臍癰諸般腫毒湯火所傷百蟲犬鼠蛇傷已上並用東流水磨塗并服一粒良久竟瘳即消○打撲損傷折炒松節酒磨下半粒仍以東流水磨塗○男子婦人顛邪鬼氣鬼胎煖酒磨下一粒可分二服有毒即吐下

宋參議方湯使不同今錄于後

癰疽發背未破之時用水磨塗痛處并磨服良艾煎立消○陰陽二毒傷寒心悶狂言亂蓋因胸膈滯邪毒未發及瘟山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷小葉同研下○急中及顛邪唱叫亂走鬼胎鬼氣並用煖無灰酒下○自縊落水死心頭煖者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下○蛇大蜈蚣傷並冷水磨塗傷處○諸般瘧疾不問新久臨發時煎桃柳湯磨下○小兒急慢驚風五疳五痢蜜水薄荷小葉同磨下○牙關緊急磨塗一九分作三服如丸小分作二服量大小與之○牙痛酒磨塗及含藥少許吞下○湯火傷東流水磨塗傷處○打撲傷損炒松節無灰酒下○年深日近頭疼太陽疼用酒入薄荷雜磨紙花貼太陽穴上○諸般癩疾口眼喎斜吞服掣一夜多睡涎言語蹇澁卒中風口禁牙關緊急筋脉挛縮骨節風腫手脚疼痛行止艱辛應是風氣疼痛並用酒磨下○有孕婦不可服

秘傳利金丹 秘方

- | | | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 丁香 | 木香 | 藿香 | 當歸 |
| 人參 去芦 | 白茯苓 去皮 | 官桂 去皮 | 大黃 |
| 白朮 | 乾姜 炮 | 桔梗 | 菝葜 酒浸 |
| 柴胡 去芦 | 檳榔 | 黃連 去芦 | 防風 去芦 |

皂角 去皮弦醋炙 陳皮
 天門冬 川烏 炮
 黃耆 防己
 巴豆 去皮心炒 紫苑
 熟地黄 厚朴 姜製
 石菖蒲 酒浸 射香 少許
 已上各等分為細末煉蜜和勻搗千餘下油紙裹之用則旋丸如梧桐子大每服五九量虛實與之

○傷寒汗後惡寒陳皮湯下不止當歸湯下○汗後有熱杏仁湯下○熱多寒少艾湯下不止甘草湯下○乾嘔乾吃三九○不下汗姜湯下又不汗好酒下○大便不通及小便閉竹葉湯下不利燈心湯下○頭痛川芎湯下○腹脹陳皮湯下○戰汗不止木香湯下○破傷風角弓及張先用生姜湯下後用木香湯下如疹乳香沒藥湯下○傷寒結胸先用姜湯下不止酒下再不
 止小柴胡加枳實生姜湯下○盜汗用陳麥麩湯下○左癱右瘓用木香湯下○骨節疼痛藥貼○寒溫脚氣用木香湯下膏藥貼肋下刺痛生姜湯下後二日用膏藥貼○酒積好酒下○氣積甘草湯下不止陳皮湯下○飲食

- | | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 皂角 | 陳皮 | 車前子 | 吳茱萸 |
| 天門冬 | 川烏 炮 | 砂仁 | 肉豆蔻 炮 |
| 黃耆 | 防己 | 鱉甲 醋炙 | 羌活 |
| 巴豆 去皮心炒 | 紫苑 | 川楝 去目 | 蓬義木 |
| 熟地黄 | 厚朴 姜製 | 川芎 | 香附 |
| 石菖蒲 酒浸 | 射香 少許 | 小茴香 | 甘草 少許 |

無味桂皮湯下。○面上風瘡生薑湯下。○脹腮用好醋墨收然後却用生薑湯下。○反食病先用生薑湯進二服後用粥一碗又方用好醋一碗生薑十兩花耕一合同煮乾細生薑汁同服。○風癰用小茴湯下。○瘡子好酒下。○湯湯用雞彈白金銀釵同調膏藥用紙上貼瘡上用藥三九薄荷湯下。○眼疾用黃連湯下不止薄荷湯下。○癰疥大痒生薑湯下連進三服。○跌傷血攻心用童子小便下。○火燒瘡與湯盪同治。○小腸氣木香湯下常服。○心疾生薑湯下。○口眼喎斜先用當歸湯下然後用木香湯下。○眼有冷淚黃連湯下常服。○冷氣攻心熱酒下。○停食所傷熱酒下。○裹急後重先用姜湯下後用訶子湯下不止甘草湯下。○陰証用黑豆炒炒餅酒熱服。○血勞口吐血先用猪膽後用羊膽溫水調服。○黃病先用川芎湯後用芍藥湯。○脾胃用姜湯下後用膏藥貼。○便毒用墨姜猪膽調膏藥貼姜湯下。○五九。○風狗咬葵菜湯下。○狗咬用米泔水洗芍藥湯下。○嘔吐用乳香湯下乾嚼三五丸亦可。○傷力口吐血先用猪膽後用羊膽溫水調服。○氣喘木香湯下。○嘔嗽杏仁湯下不止丁香湯下。○痰飲生薑湯下不止用膏藥貼心頭。○身腿浮腫先用生薑湯下後用鹽湯下。○痒漏先用姜湯下後用醋煮香附子湯下常服亦好用當歸湯下。○年老臍下疼人參湯下常服。○

脫肛好酒下常服。○牙疳葱白湯下。○搥頭風川芎湯下後用人參湯下。○心風發狂辰砂湯下後用姜湯下。○邪熱雄黃湯下。○赤痢生薑湯下不止訶子湯下。○白痢甘草湯下後用葱白湯下。○膿痢米泔水下不止訶子湯下。○口舌生瘡先用生薑湯下後用芍藥湯下。○受瘴氣發寒熱先用姜湯下後用木香湯下次用膏藥貼瘡處。

膏藥方 与前方兼用

木香

蒼朮米泔水浸

蛇床子

甘草

馬蘭花

大附子 一个

鹽水浸炮

茱萸

官桂

車前子 已上各一兩

右為細末每用藥一匙麵一匙生薑汁調煮成糊調灘紙上熱貼患處即愈

益脾丸

御藥院方治飲酒不醉又益脾胃

葛花 二兩

小豆花 一兩

萊豆花 五錢

木香 二錢半

一方加草豆蔻 去皮一兩

右件為末蜜丸如梧桐子大紅花湯下十九或夜飲津液下五丸不醉妙

膏藥方

御藥院方治飲酒令人不醉

葛花

小豆花 各一兩

右件為末每服三錢飲服仍進薑汁及枇杷葉飲倍能飲酒又九月九日菊花臨飲服方寸又小豆花葉陰乾百日未服之

丁香丸

丁香

人參各五錢

沉香

白豆蔻

訶子

白木各三錢

右以甘草膏子為丸紫豆大

沉香丸

沉香

硃砂

木香各五錢

右以甘草膏子為丸硃砂為衣

烏梅丸

烏梅

神麩

麥蘖

龍腦葉

右以甘草膏子為丸

和氣丸

木香五錢

陳皮

藿香

縮砂

右以甘草膏子為丸硃砂為衣

縮砂丸

砂仁七

日松

益智各五錢

香附子一兩

右以甘草膏為丸

糊砂丸

糊砂三錢

腦子半錢

射香半錢

薄荷葉二錢

右以甘草膏子為丸硃砂為衣

不醉方

菘豆

赤豆

葛粉等分

右為末當未飲酒之前用冷水調一匙或二匙服之痛飲不醉

治酸酒

石灰飛過二升

黃丹飛過一小錢

右和勻入酒內

消酒藥

雞腔脰

乾葛

右為末等分麵糊丸如梧桐子大每服五十九酒送下

又方

寒食麵

白牽牛麵一錢半 黑牽牛末三錢

右為末通作一服姜湯下

又方

右取山豆根藥洗淨搗細以無灰酒攪勻瀝去滓微溫服即愈

華陀十件危病方

經驗方 漢神醫華陀字元化嘗云人有危病急如風雨命醫

不及須臾不救觀其橫天實可哀憐予因暇日選十件危病處三十妙方以救橫天詳錄于後不可不知

一霍亂吐瀉始因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉不止令人下瀉吐瀉併作遂成霍亂頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用葱熨緩須不救

吳茱萸

木瓜

食鹽各五錢

右三味同炒焦用磁瓶盛水三升煮令百沸却尺煎藥同煎至一二升已下頃一盞隨病人意冷熱服之藥人即醒如倉卒無藥用枯白礬末每服一錢用百沸湯點服如無白礬只用鹽一撮醋一盞同煎八分溫服或焙稱鹹酸皆可煮服

二纏喉風喉閉其証先兩日胸膈氣緊取氣短促驚然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通須臾刻不治

巴豆 七粒三生四熟主者去殼生研熟者去殼妙上燒存性

雄黃 皂子大明者研鬱金一个婢肚者研為末

右三味研每服半字茶調兩呻如口噤咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒如無前藥用川升麻四兩剉碎水四椀煎一椀灌服又無升麻用皂角三錠搗碎接水一盞灌服或吐或不吐即安

三吐血下血其証皆因內損或因酒色勞損或心肺脉破血氣妄行血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉 蒸乾

人參 各一两焙乾

右二味為末每服二錢入飛羅麵二錢新水調和如稀糊服如前藥荆芥一握燒過蓋地上要出火毒碾如粉陳米飲調下三錢不過二服如無荆芥用釜底墨研如粉服三錢米飲下連進三二服

四中砒霜毒其証煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面口青黑四肢逆冷命在須臾

黑鉛四兩磨水一椀灌之如無前藥青藍兩握研并水調一椀灌之如無藍用清油二升許灌服其毒即解又無油掘地用水作漿濃吃一二碗土用黃色者好

五尸厥其証奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣去如雷鳴

燭硝 五錢

硫黃 二兩

右研如粉作三服每服用好舊酒一大盞煎黃燭硝起傾於盞內蓋着溫服如人行五里又一服不過三服即醒兼灸百會穴四十九壯臍下氣海丹田三百壯身溫止如無前藥用附子七錢重炮熱去皮臍為末分作二服每服用酒三盞煎一盞服又無附子生姜自然汗半盞酒一盞同煎令百沸併灌二服仍前灸

六中忤中惡鬼氣其証暮夜或登廁或出郊野或遊冷屋或人所不至之地忽然眼見鬼物鼻口吸着惡鬼氣羸欬倒地四肢逆冷兩手握拳鼻口出清血性命遂巡須臾不救此証與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖凡中惡羸欬倒地切勿移動其屍即令親戚眾人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香蘇合香樟木之類直候醒記人事方可移歸

犀角 末五錢

麝香

硃砂 各二錢半

右為末每服二錢井水調下如無前藥用雄黃末服一錢煎桃枝葉湯調灌又無雄黃用故汗衣或觸衣汗衣者着在身上多時久遭汗者佳觸衣者以着內衣襯衣也婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調下

七脫陽其証或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不醒人事或傷寒新誤與婦人交其証小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽証須臾不救先以葱白數炒令熱熨臍下次用附子一枚重一兩剉八片

白朮

乾姜 各五兩

木香 二兩半

右四味各研末用水二椀煎八分椀放冷灌服須臾又進一服合滓併服如無前藥用桂皮二兩好酒二升煎一升分作二服灌之又無桂皮用葱白連須三七根細剉沙盆內研細用酒五升煮至二升分作二服灌之陽氣即回先用炒鹽熨臍下氣海勿令氣冷又無葱白用生姜二七片亦好衣前法服八鬼魘鬼打其証初到客舍館驛及久無人居冷房睡中覓鬼物魘打但其人吃七作聲便令人叫喚如叫不醒此乃鬼魘也不救即死

牛黃 一兩

雄黃 一兩

硃砂 半兩

右研為末和勻每挑一錢床下燒次挑一錢酒調灌之如無前藥用桃柳枝東邊者各折七十煎湯灌下又無桃柳枝用竈心土搥碎末服二錢井水調灌更挑半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中次并灸兩脚大拇指內離甲一非葉各灸七壯

九孕婦逆生其証孕婦欲產時遇腹痛不肯舒伸行動多西腰眠卧忍痛其兒

在腹中不得轉動故脚先出謂之逆生須更不救子母俱亡

烏蛇退 一條

蟬退 十四个

血餘胎髮 一个

已上各燒灰服二錢酒調下併進二服仰臥霎時兒即時順生如無前藥用槐子二七粒新并準水吞下又無槐子用小絹針於兒脚心刺三五針急用鹽少許塗脚心刺處即時順生子母俱活

十胎衣不下惡血湊心其証心頭迷悶胎衣一逆衝心須更不治其母即亡

乾漆 五斗為末

大附子 一枚炮去皮脐為末

已上用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味為丸梧桐子大每服三九淡醋湯吞下須更又進二服胎衣立下此藥可預先合下妙如無前藥用赤小豆一升炒過用水三升煮二升去豆取汗温服其胎衣立下又無豆用婦人自己手足指甲燒灰酒調須更又進一服更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下妙

神效萬應剪金丹

秘方

詩曰 天数五地數五金木水火土若人欲血氣能救世間苦

老陽子 江子三十粒不去皮油

老陰 子杏木去皮炭 陳皮 全去白

青皮木 各三牙去根半夏 水洗七次九粒 烏梅 七个全用

檳榔 字一个

丹火 二兩水飛過七次去粗用一兩 枳殼 羅去根

粟米 五錢

黃連 羅去須各三錢 黃蠟 生用二兩落水沉去粗用一兩半 木香 蒸二錢

乳香

沒藥 炙各二錢

右將黃蠟溶開入衆藥和勻作一處杵千百下作一塊再分一半藥末忌雞犬婦人用油單紙收臨用旋丸服十九如梧桐子湯使于後○紅痢用甘草湯○白痢用乾姜湯○紅白痢草姜湯○赤痢椿根皮湯○禁口痢蓮肉山藥防風粟米湯○落馬拆傷血悶酒○霍乱吐瀉乾姜湯○水瀉五苓散方見暑門○一切風疾用升麻湯○咳嗽杏仁桔梗湯○刺魚腦膿汁養臟湯方載痢門加附子一片○寸白虫換榔湯○心疼用酒○頭痛腰痛打傷冷氣衝心下元虛並用酒○疔氣井水下○大小便不通木通茶湯○脐下疼芥菜湯○五勞七傷猪膽湯○一切瘡癩羅蔔湯○氣痛宿食不消並生姜湯○產後痢當歸湯○小兒吊驚風漢防已湯○血風勞史君子湯○口吐清水訶子湯○腹痛葱白湯○回虫咬心換榔湯○陽毒傷寒梔子黃連湯○陰毒附子棗兒湯○渾身壯熱砂糖水○虛熱柴胡竹茹湯○寒熱虛梅子湯○上焦虛熱大黃湯○脾胃寒痛熱酒

諸香

零之一斤五兩八錢霍香八兩

丁香獨活

南木香一兩四錢檀香四兩一錢

丹皮 辛夷
大黃各三錢六分茅香七兩二錢
白芷十一兩 甘松五兩二錢

○諸蟲

萬應丸 秘方

檳榔五兩末 大黃八兩末 黑牽牛四兩末 苦練根皮一斤

皂角十定把不姓者

右先以皂角苦練根皮二味用水一大碗熬成膏子一處搜和前藥三味為丸如梧桐子大後用雷丸沉香木香各一兩已上三味碾細末為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三九四更時分用沙糖水送下

取寸白魚 秘方

紫接榔十個 向陽石榴皮七十片

右水煎露一宿以下虫為度

○咽喉

