

精校外科大成

上海錦章書局
出版

太醫院祁廣生輯註

外科大成

上海錦章書局出版

新秤藥量表

本書所載用藥量均爲老秤。現在藥店均用新秤，但以市新秤合老秤一兩，應升爲一兩一錢七分三厘。因老秤八錢五分二厘半卽市秤一兩。恐閱者誤會，故將新老比較表附列如下：

老 秤	新 秤
五 分	合五分八厘強可用六分
一 錢	合一錢一分七厘強可用一錢二分
一錢五分	合一錢七分五厘強可用一錢八分
二 錢	合二錢三分四厘強可用二錢四分
二錢五分	合二錢九分三厘強可用三錢
三 錢	合三錢五分一厘強可用三錢五分
四 錢	合四錢六分九厘強可用四錢七分
五 錢	合五錢八分六厘強可用六錢
六 錢	合七錢零三厘強可用七錢
七 錢	合八錢二分強可用八錢二分
八 錢	合九錢三分八厘強可用九錢五分
九 錢	合一兩零五分五厘強可用一兩零五分
一 兩	合一兩一錢七分三厘可用一兩二錢
一兩以上	照前類推

外科大成目錄

卷之一

總論部

癱疽原委治脈法經絡總不外乎此

癱疽之脈

癱疽半陰半陽歌

內消內托法

砭法

桑柴烘法

症治次第

論汗

論飲食

潰瘍治法

臉膜

腫瘍附餘類方

去腐類方

雜忌須知

卷之二

分治部

癱疽之原委症治首卷已詳今之分部位者甚為別經絡認穴次定名色耳其症治不外乎首卷之提綱然間有稍異於總治者有

頭部

經絡

額疽一名赤疽

太陽疽一名赤疽

髮疽

王頂發

透腦疽

銳毒

癱疽之原

癱疽五善歌

虛實症治法

灸法

神燈照法

虛實治法

論下

論藥禁忌

論膿

陰症變陽

腫瘍敷治類方

生肌類方

試百病生死法

癱疽之別

癱疽七惡歌

經絡大略

取穴灸法

牛膠蒸法

順逆看法

論咽

辨瘡暈

論血

陽症變陰

腫瘍洗滌類方

潰瘍外治附餘

癱疽陽症歌

癱疽生死法

補瀉藥品

烙法

藥筒拔法

標本治法

論寒熱

辨舌

論瘡口

腫瘍主治方

腫清膏藥類方

家傳西聖膏方

癱疽陰症歌

察形色順逆法

鍼法

黃蠟灸法

症治總訣始末辨症用藥之次第如此

標使治宜

論痛

辨內陷

論生肌

潰瘍主治方

麻藥類方

調理須知

乳勞

乳岩

下乳回乳法

腹部

幽癰

齧癰一名胃疽

衝疽

臍癰

小腹疽

腹皮癰

發肚及于肚足肚

緩疽

腹胸總論

附小兒臍症

腋部

經絡

腋癰一名火癰

米疽附火癰瘰癧

黥疔

腋氣

肋部

經絡

肋疽

脇疽一名敗癩

淵疽

內發丹毒

下部後

顴口疽一名銳疽

坐馬癰

腎癰

上馬癰

下馬癰

附風疔俗名生

懸癰

湧泉疽

穿襠發

跨馬癰

臍毒

痔瘡附起真子

漏瘡附痔漏

截腸症

下部前

便癰即便毒一名魚口

橫痃

疔瘡一名妬精瘡

陰濕瘡

婦人陰瘡

陰挺

陰草

陰腫一名疔

陰蝕

陰脫

陰癰俗名瘻

囊癰附印子

腎囊風

腎臟風瘡

肩部

經絡

肩疽

肩癰

過肩疽一名乾疽一名疔疽

大陰疽一名肩

蜂窩疽

膈部自肩至

經絡

膈癰一名橫

膠疽

樂疽

肩風毒

臂部

臂癰

魚肚發

石榴疽

肘癰

腕部

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨蠹疽

蝶蛄串

臂癰

手部

經絡

合谷疔一名虎口疽了又一名虎口疔

蛇眼疔

代指

手發背

蛇背疔

僵蠅疔

手心毒一名掌毒

手叉

蛇腹疔一名魚肚疔

癩瘡

鵝癰一名穿

調疽一名核疽

蛇節疔一名地節疔

狐狸刺

病蝦

蛇頭疔一名天蛇毒

泥鰱疔

鵝掌風

股部

經絡

肚門癰

咬骨疽

股陰疽

箕門癰

腿遊風

陰疽

股陽疽

醫案

玄疽

環跳疽

伏兔

附骨疽

膝部

經絡

石疽

疵疽

緩疽

膝癰

委中毒

膝眼風

上水魚

遊膝風

脛部

三里發

附陰疽靈樞為

爪膝纏靈樞為

四騰風

腓脛發

內踝疽一名鞋帶癰靈樞為走履

腎氣遊風

黃猷癰一名腫陰疽

外踝疽

血風瘡一名爪風瘡

青蛇毒

穿踝疽

膝瘡一名補風瘡

接骨發

濕毒流注

鱗漏

足部

經絡

甲疽

牛程瘻

肉刺俗名

足發一名足發背

足跟疽一名

土粟

補道

足心癰一名湯泉疽

厲癰

冷疔

脫疽

四淫

腳氣瘡

敦疽一名足

臭田螺

田螺泡

分治部

此條頭面小疵及眼耳口鼻喉舌等部位因其症治多歧不可紊亂於大毒之內故另立之以便檢閱

頭部

頭痛頭風

油風

白屑風

禿瘡

蝟蟻瘡一名蝟

髮際瘡

癩瘡

面部

黃水瘡

眉癩

肺風酒刺

蠶黑斑

雀癩

黑子痣也

鼻隱瘡

羊鬍子瘡

眼部 風火雲翳等眼目有專科姑不錄

眼胞菌毒

眼丹

針眼

眼胞痰核

眼胞內椒瘡粟瘡

脾齒疔

漏睛

大小眼皆出膿出血

耳部

經絡

耳底痛

黑疔

耳疔

耳釘

耳痔附耳根耳垂

耳發瘡一名月蝕瘡又名鴉喙瘡

耳痒

耳聾

蝨入耳

凍耳成瘡

鼻部

經絡

鼻淵一名腦崩腦漏又名控腦砂

鼻鼽

鼻齇

鼻衄

酒皸鼻

鼻痔

鼻疔

鼻瘡

唇部

經絡

反唇疔鎖口疔

唇疽

唇唇

唇風

口部

經絡

口瘡

舌部

紫舌脹

痰包

舌劬

重舌附痰氣重舌

弄舌舒舌

牙齒部

經絡

牙癰

咽喉部

經絡

弄舌喉風

不分部位大毒

不分部位者蓋為隨處可生不按穴次也故另分之

內癰總論

肺癰

肝癰

疔瘡症治總訣共計四十七名

多骨疽一名刺骨疽
又名朽骨疽

倒發梅毒

卷之四

不分部位小疵

無名腫毒

諸痛

紫白癩風

瘰癧

火赤瘡

天蛇瘡

血痣

牙痛

走馬牙疳

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

喉癰

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

牙釘

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

措齒疳

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

牙疔

破傷風

類破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

骨哽喉_{針快}

竹刀刺入肉

人咬傷

風犬傷

蟲獸傷

小兒部

赤遊丹毒

胎毒瘡痒

熱毒瘡瘍

垂癰_{附重舌重唇}

胎風

胎赤

胎瘤

臍瘡臍突

陰腫_{脫囊一名}

脫肛

肛門作痒

遺毒

葡萄疫

痘風瘡

痘復便膿

痘裡瘡瘍

發丹_{痘細} 夾瘡_{痘細} 損傷_{痘細} 痘疔

痘後癰

痘風瘡

痘復便膿

煉取諸藥法

封罐口法

煉玄明粉法

取紅鉛法

煉金頂砒法

丹打靈藥固罐法

取蟾酥法

取金汁法

製大附子法

製寒食麵法

煉硝石法

針灸人神歌訣

五戒

後跋

製炒諸藥法

針灸人神歌訣

五戒

後跋

製寒食麵法

外科大成目錄終

大醫氏神醫吳越抄

轉者

總論部

脈源

卑稽爰農御世而醫之名始立夫醫者濟世之統名也名雖一而寔有內外科之異也科之分有內外蓋因人之疾有內外故也因其疾以命醫神而明之則因內可以推外由外可以測內精微之理豈易言哉胡為乎今之重於內者精其內而瘡科或有所道高於外者精其外而方脈或有未諳斯二者誠未合乎中庸之道不幾失先正之新傳乎故惟仁者之心深長周密思欲兼之而無遺內遺外之憾者必先以脈為首務也靈樞經云見其色知其病命曰明按其脈知其病命曰神嗟嗟神其難言也夫誠以病在臍腑不能以告人而脈告之脈不能以接人而指接之則是脈也者乃天真委和之氣非圖可狀非言可傳維空人之會心而已獨不見王叔和之脈經乎王忠佐彼越肯乎學頡湖之脈學戴同父之刊誤等書乎寓之於目悟之於心措之於指運之於意於是乎病之淺深不彰明較者也哉是以診脈之道不易精也因其不易精而竟忽之其誤天下也多矣爰採脈學歌訣辯脈之形象並遵外科腫潰脈法辯症之順逆願之卷首聊補學者上達之功云爾

脈歌

浮如木在水中浮浮大中空乃是孔拍拍而浮是洪脈來時雖盛去悠悠 浮脈輕平似捻葱虛來遲大豁然空浮而柔細為濡

脈散似楊花無定踪 腫瘍為虛為風潰瘍為虛宜補

沉 沉幫筋骨自調勻伏則維筋着骨尋沉細如綿真弱脈弦長實大是牢形 腫瘍為邪氣深潰瘍為遺毒在內

遲 遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉分表裡消陰須益火之源 脈來三至號為遲小駛於遲作緩持遲細而難知是滯

浮而遲大以虛推 腫瘍為寒為虛潰瘍亦為寒為虛

數 數脈息間常六至陰微陽盛必狂煩浮沈表裡分虛實惟有兒童作吉看 數比平人多一至緊來如數是彈繩數而時止名為促

數見關中動脈形 數脈為陽熱可知只將君相火來醫寒宜涼瀉虛宜補肺病秋深却畏之 腫瘍為熱數而洪者欲膿潰瘍為

病進數甚者難醫

滑 滑脈如珠替替然往來流利却還前莫將滑數為同類數脈惟看至數間 腸瘍為熱為痰潰瘍為熱為虛為邪氣未退

男 嘉錫 嘉銘 正生

瀉 細遊短瀉往來難散止稀稀應指間如雨沾沙容易散病食華慢而報 參伍不調名曰瀉輕刀刮竹短而難微似抄芒微與甚
浮沉不別有無間 腫瘍為氣實氣滯潰瘍為血虛為脈病相應

虛 舉之進大按之鬆脈狀無涯間谷空莫把扎虛為一例扎來浮大是慈慈 腫瘍宜內托潰瘍宜大補
實 浮沉皆得大而長應指無虛幅強熱蘊三焦成壯大通腸發汗始安康 實脈浮沉有力強舉來彈索轉無常須知牢脈幫筋骨

腫 實大微弦更帶長 腫瘍為邪氣太盛潰瘍為邪氣不
長 過於本位脈名長弦則非然似滿張弦脈與長爭較速良工尺度自能量 腫瘍為有餘宜內消潰瘍為氣治則易愈

短 兩頭縮縮名為短瀉短連連細且難短瀉而浮秋喜見三春為賊有邪干 腫瘍為元氣不足潰瘍為大虛宜大補
洪 脈來洪盛去還衰滿指瀉瀉應夏時若在春秋冬月分升陽散火莫狐疑 洪脈來時拍拍若去去來感似波瀾欲知實脈參差處

微 舉按弦長幅愞堅 腫瘍為熱感宜宣熱拔毒壯實者下之潰瘍為邪感藥之不退者難愈
病脈相應 微脈輕微瞥瞥乎按之欲絕有如無微為陽弱細陰弱細比於微畧較處 腫瘍為虛脈藥漸充者佳潰瘍亦為虛若微而勻者為

緊 舉如轉索切如繩脈象因之得緊名總是寒邪來作寇內為腹痛外為疼 腫瘍脈浮緊發熱惡寒或有痛處是為癰疽潰瘍主氣
沉滯為有外寒 沉滯為有外寒 腫瘍脈浮緊發熱惡寒或有痛處是為癰疽潰瘍主氣

緩 緩脈阿阿四至通柳稍長長颯輕風欲從脈裡求神氣只在從容和緩中 腫瘍為虛潰瘍為有胃氣為脈病相應
扎 中空旁實乃為扎浮大而連虛脈呼扎更帶弦名曰革血亡扎革血虛虛 腫瘍為血虛潰瘍為脈病相應

弦 弦來端直似絲弦緊則如繩左右彈緊言其力弦象牢脈弦長沉伏間 腫瘍主血氣不和為痛潰瘍為血虛復弦為賊邪侵脾
加數則危矣 加數則危矣 腫瘍主血氣不和為痛潰瘍為血虛復弦為賊邪侵脾

革 革脈形如按鼓皮扎弦相合脈寒虛女人半產並崩漏男子營虛或夢遺 腫瘍為邪盛潰瘍為邪氣不退
牢 弦長實大脈牢堅牢位常居沈伏間革脈扎弦自浮起革虛牢實要詳看 腫瘍為邪盛潰瘍為邪氣不退

濡 浮而柔細知為濡沈細而柔作弱持微則浮微如欲絕細來沈細近於微 瘡象同雲弱脈 腫瘍宜托裡潰瘍為脈病相應宜補
弱 弱來無力按之柔柔細而沈不見浮陽陷入陰精血弱白頭猶可少年愁 腫瘍宜托裡潰瘍為脈病相應宜補

散 散似楊花散慢飛去來無定至難齊產為生兆胎為墮久病逢之不必醫 散脈無拘散漫然濡來浮細水中綿浮而遲大為虛脈
扎脈中空有兩邊 腫瘍為氣虛不收清場獨見者死 散脈無拘散漫然濡來浮細水中綿浮而遲大為虛脈

細 細來蒙蒙細如絲應指沉沉無絕期春夏少年俱不到秋冬老弱却相宜 細為氣聚血少有此症者逆

伏 伏脈推筋着骨尋指間統動隱然深傷寒欲汗陽將解厥逆臍疼症屬陰 腫瘍為陰中伏陽邪潰瘍為陽伏陰中為內蝕為流注

浸淫難治宜溫補

動 動脈搖按數在關無頭無尾豆形圓其原本是陰陽搏虛者搖兮勝者安 動主痛陽動汗之陰動溫之

促 促脈數而時一止此為陽極欲亡陰三焦鬱火熾熾進必無生退可生 腫瘍為熱為病進潰瘍為熱不退漸進者死

結 結脈緩而時一止獨陰偏勝欲亡陽浮為氣滯沉為積汗下分明在主張 腫瘍為氣結潰瘍為氣不調則危

代 動而中止不能還復動因而作代有病者得之猶可療平人却與壽相關 數而時止名為促緩止須將結脈呼止不能回方是代

結生代死自殊途 兩動一止三四日三四動止應六七五六一止七八朝次第推之自無失 腫潰俱不利

脈數不時見當生惡瘡 脈數身無熱內有癰膿 脈數應當發熱而反惡寒若有痛處當發癰 脈數而浮城腫在外宜先托裡恐

邪入內脈沉而實宜先疎通以絕其源脈不浮不沉無內外症知其所在經宜和營衛 脈數發熱而痛者發於陽脈不數不發熱而痛

者發於陰 癰脈宜洪大而數若沉緊者死疽脈宜沉而實若浮洪而散者死 癰疽無脈者氣閉也宜行氣其脈自見

癰疽之源

人身之氣與天地同流人身之經絡與晝夜同度或六淫之感七情之傷飲食不時房勞不節致使陰陽乖錯營衛纏結而成癰者

總不出此二因故以三因首列

外因運氣癰疽有四

一火熱助心為瘡瘍經曰少陰所至為瘍疹又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣鬱

炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至為瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘡瘍初之氣候乃太溫

其病膚腠中瘡二之氣火反鬱其病熱鬱於上瘡發於中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣候乃太溫肌腠瘡瘍此

皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝其則瘡瘍又云少陰司天客勝甚則瘡瘍又云少陰之復病痲疹癰疽瘰癧痔又云火太過曰

赫養其病瘡疽血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此是邪變病之甚也

二曰寒邪傷心為瘡瘍經曰太陽司天寒淫所勝血變於中發為癰瘍病本於心又云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰

疽注下又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也

三曰燥邪傷肝為瘡瘍經曰木不及曰委和上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘡瘍瘰癧病

本於肝是也

四曰濕邪瘡瘍經曰太陰司天濕氣變物其則身發癰又云太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外是也

右四條天行時氣也此由外感故曰外因然外來之因則肌肉血脈筋骨受之其見症多寒熱交作筋骨疼痛及濕痰流注風濕風溫時毒等類治宜發之如蒼朮復命散紺珠丹之類經云汗之則瘡已使榮衛通行邪氣不得干於內也 又云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大僕又云此寒氣之種八風之變四時之病以其勝者治之此亦外因也

內因

經云氣宿於經絡與血俱溢而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後成癰者為由七情內鬱而成或兼竭力房勞陰虛所致又云形樂志苦病生於內 此由內傷故曰內因然內傷之因則五臟受之其見症瘡多堅硬根蒂深固二便不調飲食少進外軟內堅平陷無膿表實裡虛毒多難出治宜托裡以培其本禁用驅熱拔毒汗下之劑書云纔得腫痛泰之脈症但有虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉經云肺乘肝則為癰又云腎移寒於肝癰腫少氣肝移寒於肝癰腫筋掣此藏腑之變亦屬內因也藏腑之變乃八風之變皆寒癰例也其形堅硬如石或皮不變色或捻之不痛治宜溫補以回其陽如參附者木之類是也

不內外因

經云膏粱之變足生大疔又曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫榮氣胃氣也蓋飲食入胃先輸於脾而朝於肺腑百脈次及於皮毛先行陽道下歸臟腑而氣口成寸矣夫膏粱之變者則榮氣太過不能走空竅而行皮毛反行陰道逆於腠里而生癰腫此肌肉實滯而然也飲食之虧者則榮氣不及不能走空竅而充皮毛短而不盈凝於腠裡而生癰腫此肌肉虛澁而然也

或兼房勞不節者則腎水虧損腎水虧損則反從濕化而上行其瘡多生於胸背書言太疔者癰之最重者也不屬內外兩因故曰不內外因然不內外因則脾胃二經受之外無六經之形症內無便溺之阻隔治宜審症脈之虛實辨形色之順逆知所從用以補瀉如榮氣太過者治宜大瀉以奪氣壅如貴金丸排膿散之類

榮氣不及者治宜大補以滋氣少如異功散十全大補湯之類 真陰虧損者治宜托裡補虛如神效托裡散內固黃耆湯之類禁用五

有奇藥復損其陰

其有癰瘵痰注氣痞癭瘤之屬生於肉裡膜外者亦屬不內外因也治宜養氣血調經脈行痰開鬱健胃和中之法為善

癰疽之別

癰發於六腑為表為陽為熱為實其發迅速暴如燎原之火故熱痛高腫侵長廣大皮薄光軟以澤多有林眼或作便閉發為發逆以拒之由正氣內固不能下陷是以五臟終不傷也

疽之發於五臟為裡為陰為冷為虛其發停蓄如陶室之火內消骨髓故無熱無腫無痛形如痞癩色淡而堅甚則如牛領之皮見七惡逆症者死七惡逆症 陽中之陰者似熱非熱雖腫而虛赤而不燥痛而不膿浮而復消外感而內腐其人多肥肉緊而內虛也陰中之

陽者似冷非冷不腫而實赤微而燥痛而有膿外不感而內煩問其人多瘦肉緩而內實也

陽症變而為陰者草醫涼劑之過也陰症變而為陽者大方熱藥之驟也然陽變為陰為猶可返於陽也其症多生陰變為陽為不久復歸於陰矣其症多死 陽症有熱則氣血行而生肌陰症無熱則氣血滯而不斂故云有熱無熱為死生之訣觀此則知癰疽有陰陽表裡虛實之分而無大小之別也但恐猶有未悉者再續陰陽善惡生死順逆等歌內消內托虛實等治便一見了然庶無舛誤

癰疽陽症歌

癰疽不論上中下惟在陰陽二症推發背雖有止與偏要取高低兩樣看純陽初起必焮腫更兼身熱有微寒頂如尖字高突起腫似蟹弓根有藍七日之間多焮痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調勻無瀉乾腫消膿清精神爽脫腐生新氣血完五善自然臻並至七惡全無半點干痛便隨膿減腫退自肌寬新肉已生紅艷腐皮自斂白漫漫一身多爽快五藏盡和歡此屬純陽俱易治百人百可保全矣

癰疽陰症歌

純陽初起不知瘡粟米之形疔瘡僅不紅不腫不知痛少熱少焮少隄防七朝之後身體倦瘡根平大喜澆湯頂不高兮根不活色不光兮腐不積陽軟無膿空結聚脈浮散大細飛颺飲食不餐身戰戰嘗湯止許意忙忙瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多臭穢身難便舉動惶惶韻不長瘡形成紫黑面色變青黃精神昏潰多野睡言語無人自發揚口乾多古強痰喘定身亡此屬純陰俱不治百人百可到泉鄉

癰疽半陰半陽症歌

陰陽之症兩相交生死同兼事可招微熱微寒微赤腫半昏半英半平高脈來雖數多無力飲食雖復便不消腫而不潰因脾弱滑而不腫為膿饒大便多洩小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡未全逃口渴喜茶腸腹痛面浮唇飲足心高心煩不穩睡神亂怕音焦投方應病方為妙陰轉為陽始可調心真造化爾命堅牢達之任是神仙手半死餘生定莫逃

癰疽五善歌

心善精神爽言清舌潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安然肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康脾善唇滋潤衾幃蘭麝香凡瘡俱有味膿厚更肥黃肺善聲音響無痰韻更長肌膚多滑潤大便自尋常腎善誠為要水深火自降口和兼不渴小水得稀長

癰疽七惡歌

一惡神昏憤心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呢喃二惡腰身強目睛邪視人瘡頭流血水驚悸是肝逆三惡形消瘦膿清臭穢生瘡疔多軟陷脾敗不知疼四惡皮膚腐爛聲嘶韻不長痰多兼喘急鼻動肺將亡五惡成消渴隨飲即隨乾亦容多慘黑囊縮腎家端六惡身浮

重腸鳴嘔餓頻大腸多滑泄藏腑並將傾七惡瘡倒陷形如刺鱗同四肢多冷逆污水自流通

善屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食則勿藥亦愈惡屬臟症多因元氣虛弱或汗下失宜胃氣受傷或寒涼剋伐以致邪氣愈實也法當純補胃氣多有可生者宜於潰瘍主治諸方內對症施治此外更有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不寧牙關緊急或

頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲投水中其脈浮大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也 手足逆冷肚腹疼痛泄瀉腸鳴飲食不入呃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡症也 有汗而不惡寒或無汗而惡寒口

噤足冷腰背反張頸項動強此氣血虛極變症之惡症也俱急用參耆歸朮附子以救之聞有得生者不可因其症惡遂棄而不治 癱疽生死法

初生如粟裡可容谷外面如麻裡大如瓜外面如錢裡可容拳起勢大終無害未老先白頭無膿軟陷休瘡從死瘡起有膿生方許腫潰氣昂昂不治自安康根高頂又高八十壽還饒痲腫易腐爛任大終無恙瘡高熱焮疼難苦必然生瘡軟無神氣應補方為益肉腫瘡不腫必竟生疑恐膿穢不進食泄瀉黃泉客瘡色猪肝紫無膿必定死綿清不腐爛內怕葡萄散仰卧不知疼陰症命難生腐盡有敗氣笑裡終生崇根散瘡平塌神仙無治法久病目露神必竟命難存面忽似塗脂十日後分離敗中有紅肉雖重生門路新肉如板片不食終須變手足皮枯槁血敗生難保唇白眼無神腹脹瀉將傾醜氣不瀉氣雖重多生意眼眶黑氣濃癩疽怕此逢房中香體穢是病終為福瘡熱身微熱輕病何須說生死此中求片言一可決

察形色論逆

凡閱人之病必先視其形色而後與脈病相參誠識於始以決其終百無一失矣曷言之陰病見黃色肥頰紅厭陽病見陰色指甲呈青此二者俱死又身熱脈細唇吻反青目珠直視者死面如塗脂色似土黃油膩黑氣塗抹者死唇舌乾焦鼻生烟煤眼神透露者死形容憔悴精神昏短身形縮小者死喘粗氣短真脈暗露語言謬妄者死循衣摸床遺尿失禁撮空者死頭低項軟眼視無神呼吸短氣者死皮破無血肉紋爛斑麻木不知痛痒者死齒黃色如煮豆唇白反裡無紋耳黑枯焦不聽人中縮而坦平口張氣出無回閉鼻煽相隨呼吸行出汗如珠不散痰若膠而凝堅自血紅如肺色指甲營而滯青神昏神浮神亂神離縞衣生滿面黑氣吞天庭逢之都沒命法在此中許

內消內托

內消 消者滅也於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之劑必分之以虛實如脈症俱實者汗利之脈症俱虛者滋補之次分評位佐以引經消毒之藥使氣血各得其常則可內消也再如熱瀉便閉邪在裡也則疎導之寒熱焮痛邪在表也則發散之無表裡症邪在經也則和解之

內托 托者起也已成之時不能突起亦難潰膿或堅腫不赤或不痛或大痛或得膿根散或膿少濃清或瘡口不合者皆氣血虛也主

以大補佐以活血祛毒之品或加以芳香行其鬱滯或加以溫熱禦其風寒如托裡消毒散隨時加減之候膿出腫消腐淨用參耆歸木大補之甚加附子使氣血滋茂則新肉易生是為內托也 又云治癰以寒是為內消治疽以熱是為內托乃從正治之義也

虛實

腫潰諸症須辨虛實隨行補瀉如或稍差關係甚大假如腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也瀉利腸鳴食少嘔吐手足足冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澹飲食如故腸滿脹悶肢節疼痛口苦咽乾煩渴身熱脈大神昏者悉藏腑之實也膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫高色赤寒熱疼痛膿稠壯熱頭目昏重者氣血之實也 頭疼鼻塞目赤心驚喉古生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑便利腰脚沉重睡卧不寧者下虛也 肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶聲敗四肢浮腫者真氣虛也 歎腫痛甚日久不清寒熱往來二便淋秘心神煩悶者邪氣虛也 又曰真氣奪則虛邪氣盛則實諸瘡為虛諸痛為實脈微細弱者為虛洪大而數者為實也 脈症俱虛虛則補之和其氣托裡也脈症俱實實則瀉之導其氣疎利也脈症俱緩緩則治本用平和之藥徐治之也治之法如 腫高癰痛者神投衛生散解之次用托裡消毒散漫腫微痛者用托裡散女不應加姜桂 膿出反痛氣血虛也宜八珍湯 不作為膿不腐潰陽氣虛也宜四君子湯加歸芪肉桂 不生肌不收斂脾氣虛也宜四君子湯加芍藥木香 惡寒憎寒陽氣虛也宜十全大補湯加姜附 肺熱內熱陰血虛也宜四物湯加參朮 欲嘔作嘔胃氣虛也宜六君子湯加炮姜 自汗盜汗五藏虛也宜六味九加五味子 食少體倦脾氣虛也宜補中益氣湯加茯苓半夏 喘促咳嗽脾肺虛也宜補中益氣湯加五味麥冬 欲嘔食少脾胃虛也宜人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也宜附子理中湯 小腹痛足脛腫脾腎虛也宜十全大補湯加山藥山茱 泄瀉足冷脾腎虛寒也宜十全大補湯加附子 熱瀉淋秘 虛陰火也宜加減八味九 喘嗽淋秘肺腎虛火也宜補中益氣湯加減八味九 大凡怯弱之人不必分其腫潰惟宜先補胃氣或疑參耆滿中或泥於氣質素實或為有疾勿服補劑或間有用者又加發散敗毒等藥致使所補不償所損多致有誤殊不知瘡瘍之作緣陰陽已虧膿血既瀉元氣已憊斯時也不行溫補將何以恃書云纔得腫痛泰之脈症見有虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉此古今不易之確論也

經絡

人生之有經絡猶地理之有界分治病不知經絡猶捕盜不知界分其能無誤伐無過之咎乎岐黃問答以經絡為主惟經絡一明然後知症見何經用何經之藥以治之了然無誤如古之善射御者自有得心應手之妙焉假如腹之中行係任脈一經開兩旁係足少陰腎經又開兩旁係足陽明胃經又開兩旁係足太陰脾經此皆在腹中者其乳之在上在旁係手太陰肺經手少陰心經手厥陰心包經絡也又開兩傍則在兩肋係足厥 肝經又肋之後背之旁係足少陽胆經其脊之兩旁各兩行係足太陽膀胱經若脊之中行係督脈一經

手之外廉係手三陽經手之內廉係手三陰經足之外廉係足三陽經足之內廉係足三陰經頭乃手足六陽經所會如耳前後係手足少陽經顛之上下係手足陽明經兩毗旁係手足太陽經其鼻之上行仍係督脈一經又凡各經支別交會與手足三陰皆循喉龍挾古本又足厥陰隨督脈會於巔雖未得備陳分寸起止寔乃十四經之大略也內經所謂分肉者正指此耳至於奇經八脈亦皆有起止病患也假如肋痛便知其為肝經不分內外男婦大小皆可識症用藥稍近後便知其為陽明經則又當隨症加減矣由此言之則凡十四經所在皆可類推也

沈云癰疽之作其行也有處其主也有歸如心之發於喉舌肺之發於皮膚脾之發於肌肉肝之發於筋助腎之發於骨髓是也陰毒發於下陽毒發於上腑之發於外臟之發於內發於下者得之緩發於上者得之速感於腑者易治感於臟者難療故內曰環外曰潰上曰從下曰逆 近骨者多冷久而不愈化血生蟲蟲則多痒少疥或先痒後疹近膚者多熱久而不愈傳氣成漏漏則多疹少痒或不疼不痒 發於虛處者多險 發於節而相應者不治 應為內外通潰也

手足十二經有血氣多少之分歌曰多氣多血君須記手經大腸足經胃多氣少血有六經三焦膽腎心脾肺多血少氣心胞絡膀胱小腸肝所異 治以氣多者行其氣血多者破其血氣少者難於起發補托之血少者難於收斂滋養之雖然厥陰經有相火難治少陽經有相火而更難治故足少陰當作氣血兩虛治也用藥之道如東垣之處方別有兼風兼痰兼濕兼氣兼血兼陰虛等症病本不同治當求備較之世俗圖人形瘡樣而不分經絡者大相徑庭矣

十二經補瀉藥品

手少陰心經

補 當歸 生地黃 茯神 遠志 酸棗仁 麥門冬 柏子仁 山藥 蓮肉 圓眼肉 人參 紅藍花

瀉 黃連 枳實 木香 貝母 天竺黃 鬱金 赤茯苓 元胡索

溫 石菖蒲 藿香 沉香 木香 桂枝 麻黃

涼 連翹 丹參 石蓮子 枝子 犀角 牛黃 硃砂 石膏

引經獨活 細辛 燈心 圓眼

手厥陰心包經絡

補 人參 黃芪 肉桂 沉香 兔絲子 破故紙

瀉 大黃 朴硝 枝子 烏藥

溫 大附子 肉桂 乾姜 沉香 川芎 白芷 菖 柏子仁 烏藥

涼 黃連 枝子 丹皮 柴胡 薄荷 滑石

引經柴胡桂佐 川芎 青皮

手太陽小腸經

補 石斛 牡蠣 甘草梢

瀉 木通 赤茯苓 車前子 紫蘇 羌活 藜蘆 檳榔 大黃 瞿麥

溫 巴戟天 茴香 烏藥 砂仁 益智仁

涼 滑石 木通 枝子 茅根 車前子 豬苓 澤瀉 芒硝

引經羌活 藜蘆 黃柏

足厥陰肝經

補 當歸 熟地黃 酸棗仁 阿膠 木瓜 沙參 薏苡仁 枸杞子 兔絲子 山茱萸 白木 蓮肉 甘草 蒺藜

瀉 白芍藥 赤芍藥 柴胡 青皮 枳實 青黛 羌活 木賊 甘菊 蒲黃 桃仁 蔓荊子 常山 五靈脂 益母

煎胡

溫 木香 肉桂 香附子

涼 黃連 黃柏 胡黃連 龍胆草 草決明 牛黃 羚羊角 車前子 甘菊花 地榆

引經川芎上行青皮下行 柴胡 烏枝

足少陽膽經

補 當歸 酸棗仁 山茱萸 五味子

瀉 柴胡 青皮 黃連 白芍藥 川芎 貝母 瓜罌 鉤藤 天竺黃

溫 乾姜 肉桂 陳皮 半夏

涼 黃連 黃芩 柴胡 竹茹 甘草

足太陰脾經

補 人參 白朮 茯苓 甘草 白芍藥 山藥 蓮肉 白扁豆 木瓜 蒺藜 當歸 黃芪 薏苡仁 芡實 陳皮

大棗 圓眼肉

瀉 枳實 大腹皮 山查 麥芽 神曲 半夏 南星 檳榔 三稜 萊菔子 升麻 防風 石膏 豬苓 玄胡索

交正小斗大茂

卷一

五

秦寄生

温 砂仁 白豆蔻 藿香 破故紙 黑乾姜 官桂 大附子 蘇葉 肉果 木瓜 蒼木 吳茱萸 丁香

涼 黃連 玄明粉 竹瀝 連翹 大黃

引經白芍 麻黃 大棗 蓮米

足陽明胃經

補 人參 白木 黃芪 石斛 山藥 蓮子 芡實 薏苡仁 糯米 白糖

瀉 枳實 厚朴 大腹皮 前胡 三棱 莪木 檳榔 大黃 石膏 礞石

温 肉桂 肉果 大附子 砂仁 藿香 半夏 蒼木 白芷 薏苡仁 川芎 香附 乾姜

涼 葛根 知母 石蓮子 枝子 滑石 竹茹 胡黃連

引經升麻 葛根 白芷

手太陰肺經

補 人參 沙參 黃芪 麥冬 阿膠 五味子 紫苑 百部 知母 款冬花 木瓜 山藥 茯苓 蒺藜

瀉 防風 蘇梗 羌活 前胡 生薑 桑白皮 蘇子 橘紅 石膏 杏仁 貝母 瓜戛 南星 枳壳 薄荷 白芥

子 白芍 玄胡索 葶藶 鼠粘子 萊菔子 香薷 荆芥

温 乾姜 生薑 半夏 白芷 薏苡仁 礞石 木香 藿香 桂枝 香附 麻黃

涼 枯芩 竹葉 竹瀝 童便 羚羊角 馬兜鈴 山梔 天門冬 玄參 桔梗 藕節 枇杷葉 玄明粉 地骨皮

引經白芷 升麻 葱白 生薑

手陽明大腸經

補 蓮肉 糯米 白砂糖 薏苡仁 粟殼 木香 肉苳蔻 龍骨 牡蠣

瀉 大黃 芒硝 枳實 桃仁 檳榔 葱白 麻仁

温 人參 乾姜 半夏 肉桂 吳茱萸

涼 黃芩 槐花 大黃 地榆 胡黃連 連翹 石膏 秦艽

引經葛根 升麻 白芷

足少陰腎經

補 杜仲 兔絲子 蒺藜 破故紙 山茱萸 山藥 石斛 巴戟天 人參 白朮 當歸 熟地 枸杞 五味 牛膝

龜板 淫羊藿 何首烏 鱉甲 鹿茸 鹿角 龍骨 牡蠣 續斷 肉從容 韭子 覆盆子

瀉 澤瀉 猪苓 知母 玄胡索 甘草 茯苓 木通

溫 大附子 桂心 破故紙 黑乾姜 縮砂 仙茅 沉香

涼 黃柏 知母 丹皮 天門冬 地骨皮 山梔 玄參 竹瀝

引經獨活 肉桂 牛膝 鹽 酒

足太陽膀胱經

補 龍骨 續斷 益智仁 橘核

瀉 猪苓 澤瀉 滑石 車前子 木通 瞿麥 茯苓

溫 茴香 烏藥 沉香 山茱萸 桂枝 麻黃 縮砂

涼 胆草 石蓮子 防風 羌活 蔓荊子 茵陳 葶藶 大黃 黃柏 石膏

引經藥本 羌活 黃柏

手足太陽三焦經

補 人參 黃芪 白朮 藿香

瀉 柴胡 枳殼 枳實 青皮 山茨菰

溫 大附子 厚朴 乾姜 沉香

涼 連翹 滑石 胆草 地骨皮

引經柴胡 川芎 青皮

散品

凡藥之性輕虛者諸臟腑皆能發散是以不屬經絡也

羌活 獨活 升麻 防風 荆芥 藜蘆 細辛 麻黃 秦艽 防己 牛蒡子 香薷 夏枯草 山豆根 五靈脂

走品

射干 青蒿 葱白頭 漏蘆 蟬蛻

凡藥之體重濁者諸臟腑皆能走瀉是以不屬經絡也

川烏 草烏 三棱 義木 威靈仙 穿山甲 葶藶 海藻 昆布 五加皮 撫芎 常山 青黛 巴豆 益母草
桑寄生

針砭火烙烘炮蒸拔等法

疽之發也所患者惟內攻與外潰耳蓋毒不能外發勢必內攻急宜護膜以托裡不能中出勢必旁潰必外兼針灸等法以提其毒
此外科之首務也

針法

夫用針者譬之救火火在屋下必穴其頂不爾則延及盡焚之矣故曰毒氣中隔內外不通不行針灸藥無全功又曰血實者決之先診其脈緊而數者其膿未成緊去但數者其膿已成若膿未成而用針氣血已瀉膿反難成膿已成而不針潰壞愈深瘡口難斂 次輕按熱痛者膿淺而稠重按微痛者膿重而稀按之不痛俱硬者瘀血也俱軟者濕水也 再按之陷而不起者膿未成按之軟隨手而起者膿已成按之四畔俱軟者膿大成矣

手法針鋒宜隨經絡之橫豎否則難於收口部位宜下取便於出膿腫高而軟者在肌肉針四五分腫下而堅者在筋脈針六七分腫平肉色不變者附於骨也針寸許毒生背腹肋脇等處宜扁針斜入以防透膜之害入針在好肉之處則磁實而難進針至膿潰之處則虛軟而無阻針既透膿即視針口必有膿意如珠斯時也欲大開口則將針斜出欲小其口則將針直出所謂迎而奪之順而取之也隨以綿紙燃醜玄珠膏度之使膿會齊二三時取出拭則膿水速乾矣瘡口貼呼膿膏四圍致潰膿散 元氣虛者必先補而後針膿一出則諸恙悉退若膿出反痛腫仍不消或煩燥嘔逆者胃氣虛也治宜大補之

神妙拔根法 凡背疽腦疽陰症者初起不腫高不炊熱灸之不疼者必致壞人於十日已前用披針當頭插入至知痛方止出其惡血通其瘡竅隨用蟬蛻條插入直至孔底服蟬酥丸紺珠丹發其大汗如元氣虛者隨以內托之藥大補之每日插兩條以膏蓋之三日後加添插藥其根高腫作痛外用神燈照法桑根灸法助陰為陽插換七日其瘡裂縫流膿至十三日其根自脫如日多根深蒂固不能脫者披針取之玉紅膏搽之不脫者自脫不斂者自斂 如半月後不作膿腐者用披針品字樣三孔開之不問深淺以知痛為佳隨用藥筒拔法拔之視其膿血鮮明謂氣血交粘用藥可痊若紫黑氣穢謂氣敗血衰神仙嘆哉若拔後大膿當出而反少必內有頑膿宜取去寸餘雖微痛血出無妨隨用兩手輕重得宜從瘡根嫩處漸捺捺至中間剪去膿管聚膿自然湧出以黃厚為吉其膿日漸多者為輕反此則為慮矣

又有不宜針者如疽生於筋脈及骨節膺門並癰瘤再結核推之不動者俱不宜針 冬月閉藏水冰地折只宜用藥托裡而火針石者益謂善行水者不能注水善穿地者不能擊凍善用針者亦不能取四厥也所謂寒徹腠理以苦發之以辛散之如托裡溫中湯之類也

蟬針一法 為開門發毒之捷徑然恐過於外不能及於內即皮膚之疾恐血去而氣不能獨居也禁之

針委中穴法 治癱疽發背紅腫疼痛及脚膝風濕疼痛即拄杖跛足者針之有功 又中風痰厥牙關緊急不知人事者針之立效

其法令患者雙手倚壁上雙脚挺直用三角披針將紙找差露半米粒許尖頭針時以中指抵住針頭看委中穴有細青紫脈俱是濕

毒惡血者準於紫脈上刺之凡青脈俱刺任出血無妨看血出淡黃色方以紙輕手按片時以小膏藥貼之三四日不可洗浴放血

後令人將員棍於手足腰背腰上如轆轤即卸葉杖而行百發百中針家不宜出血惟腫偏宜出血也

針少商穴法 治喉風喉痺顛顛大頭也懸癰乳蛾等症危急者刺之立效

穴在大指端內側去爪甲角一韭葉許白肉際間用三稜針刺出血立瘥此穴能泄諸藏之熱但不宜灸

內托黃芪丸 治誤傷經絡白膿赤汗運流不止者 ○生黃芪八兩當歸三兩肉桂 木香 沉香 乳香各兩 為末用豕豆粉四

兩生姜自然汁煮糊丸桐子大每服四五十丸白湯下

砭法

扁鵲云病在血脈治宜砭石此藥素問血實者決之也非止丹毒及紅絲疔走散但見紅腫色赤遊走不定者或時毒血壅盛等症並宜

砭之忌其太深內經所謂刺皮無傷肉也法用細磁器擊碎取其有鋒芒者一塊用筋一根劈開頭尖之縛之用二指輕捺筋稍以磁鋒

對患處懸十許再用重筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出如丹毒數貼見小兒赤遊丹毒門黍致至次日腫未全消再重行砭之以

腫消紅散為率

灸法

灸乃開結破硬之法蓋火性暢達引拔內毒有路而發外也凡瘡之初起七日已前隨毒勢之大小灸艾壯之多寡如赤腫紫黑者取蒜

片三錢厚置瘡頂上着艾艾之三壯一換蒜片初灸覺痛以不痛似痒為止初灸不痛以知痛痒為止初灸全然不覺痛痒宜去蒜明艾

之方能速潰艾數宜多有漫腫無頭者以濕紙覆其上視其先乾處置蒜艾之兩三處先乾兩三處瘡艾之有一點白粒如粟四圍紅

腫如錢者即於白粒上艾之有陰瘡日數多者艾挂不及其事以蒜搗爛鋪於瘡上艾鋪蒜上艾之蒜散再易以知痛甚者為效 癰疽

流注鶴膝風等 每日灸二三十壯頑疽陰瘡癩發等艾數必多宜先服護心散以防火氣入內灸小兒先將蒜置大人臂上燃艾候蒜

溫即移於小兒毒上易艾照前凡腫瘍初起用此艾之一不開大二不內壞三易收口誠瘍科之首法也如七日已後毒已成形宜隨經

絡取穴次艾之或騎竹馬法艾之或用錠子藥餅蠟餅等類艾之至其要論云陽氣痿裏寒化為熱熱感則肉腐為膿是毒乃鬼邪所傷

艾火攻之求其本也

經曰陽者天之陽症似不必灸也頭為諸陽之首凡生瘡腫由元陽所致艾之必加大腫痰動必死腎俞穴發瘡由腎水枯竭而成艾之

痛不能伸齒齧痛爛齒寒頭痛胸風肢疽一名曲節穴在肘內廉後大骨外去肘五分 神門穴穴在背第五椎上取之 治免疽穿骨疽穴在掌下腕 少商穴

治喉疰宜針忌灸見針門 心俞穴 治喉毒懸癰穴在各開一寸五分

手太陽小腸經

支正穴 治侵腦疽穴在腕後五寸 陽谷穴 治鳳眉疽穴在手外側腕中 後谿穴 治黑疔穴在手小指外側本 腕骨穴 治鼻疔穴在手外側腕中 治發背穴在廉約兩

前起骨下陷中 天宗穴 治頂疽穴在東風後 肩貞穴 治肩風穴在背下陷中 掌後五寸五分 治馬口瘡秘法

足厥陰肝經

陰包穴 治咬骨疽穴在膝下四寸股內廉兩筋間 膝關穴 治透腦疽穴在積鼻下 中都穴 治陰疽陽癰積疔穴在內踝上

蠱溝穴 治玄疽穴在足內 章門穴 治氣癰穴在直季脅肋端上二寸兩旁九寸側肘 中都穴 治陰疽陽癰積疔穴在內踝上

足少陽膽經

劍巨穴 治馬刀穴在掌後三寸二分秘法 肘尖穴 治瘰癧三次除根取穴令患者端坐又手平胸肘後笑出共骨是均丈人須立於患人後 金門穴 治瘰癧寸五分秘法 陽陵泉穴 治

共之旁小肘尖仰手與小指對直者是也按此骨尖小指即麻為驗此穴與 淵疽此穴多取不真惟此等取法最重故重按而出之宜珍之勿忽勿忽 懸鐘穴 治附骨疽穴在足外踝上 膝眼穴 治鶴膝風穴在膝頭骨 環跳穴 治腿股

風居膠二穴認真攻委中毒血更出盡愈見醫科神聖功也穴在脾經中側肘伸丁尺屈上足以手摸穴在掛腋取之足少陽太陽之會 足少陰腎經

陰谷穴 治心口疽穴在膝下內輔骨後大筋下 築賓穴 治幽癰赫癰穴在內踝

足太陽膀胱經

風門穴 治玉枕疽又能宣通背上諸陽熱氣一名熱府穴穴在背脊第二椎下陷中兩旁相去脊同 心俞穴 治發背穴在五

旁各開一寸五分 委陽穴 治五發穴在足小腸中外廉兩筋間屈伸取之一云在承扶下一寸六 會陽穴 治腎疽血崩穴在廉約兩

崑崙穴 治附陰疽風疹風熱冷脾穴在足外踝後取手 任脈經此經會陰而行腹

百會穴 治龍泉疽虎鬚毒穴在顛頂中 督脈經此經會陽而行背

神闕穴 治對口穴在兩手虎骨 右分經取穴 治疰灸法終

交王卜斗大茂

卷一

穴在兩手虎骨

右分經取穴

治疰灸法終

凡灸先用蒜片擦穴則着艾不落 灸瘡不發則疾不除用葱艾薄荷煎湯洗之 灸瘡已發潰爛疼痛者用柳枝胡荽黃連煎湯洗之 灸瘡出血以百草霜罨之 灸瘡不收口用槐枝葱白煎湯洗之瓦松陰乾為末搽之 灸瘡貼膏宜頻換使膿血出多而疾速愈

騎竹馬灸法

治諸發背及痔漏陽風是症由心火留滯而生此穴乃心脈所過之處灸之則心火調暢血脈流通其毒頓減其法男左女右於患人曲池穴起用薄篋一條量至中指尖與肉平齊截斷次令患者騎竹馬兩人前後扛起離地五寸兩旁扶定以前篋豎馬上從尾骨貼脊量至篋盡以墨記之兩邊各開同身寸一寸五分盡處是穴各灸二七壯

代火針烙法 陽燧錠子

古有烙法今罕用之益使患者駭然亦懼粗工之誤用耳余以陽燧錠子代之治癰疽發背一切諸毒未成者立消已成立潰已潰立穿又易於收斂并災瘰癧便毒蛇頭疔瘡塊及風寒濕氣疼痛各症悉皆神效勿忽陽燧錠子方 ○蟬酥 硃砂 川烏 草烏 各五分

直姜蚕 為末 各

和勻次用石硫黃五錢置碗內微火炮化入前蟬酥等未攪勻離火再入當門子麝香二分水片一分攪勻即傾入濕磁盤內速盪轉成片俟冷取收於磁罐內用時取甜瓜子大一塊要上尖下平先用紅棗肉擦灸處粘葯於上用油燈草火點之灸五壯或七壯九壯畢即飲米醋半酒鍾隨用小膏藥貼之出黃水些需其毒即消如風氣痛者用筋子於骨縫中擊之酸痛處以墨記灸之如腿痛膝痛於兔眼穴灸之再肩担成瘡於腫處各灸一壯立瘥

黃蠟灸法

凡癰疽發背諸毒惡瘡先以濕紙隨腫根作圈高寸餘定貼皮上勿令滲漏圈外圍布數重以防火氣烘皮膚圈內鋪蠟屑三四分厚次以銅漏杓盛炭火懸蠟上烘之令蠟化至滾再添蠟屑隨化隨添以井滿為度皮不痛者毒淺灸至知痛為度皮痛者毒深灸至不知痛為度去火杓即噴冷水少許於蠟上俟冷起蠟蠟底之色青黑此毒出之徵也如漫腫無頭者以濕紙試之於先乾處灸之初起者一二次即消已成者二三次速消久潰頑硬者即於瘡口上灸之蠟從孔入愈深愈妙其頑腐痰膿盡化收斂甚速

一法灸頑瘡腫瘡亦作麵圈圍瘡口次取黃蠟隨瘡并大捻錢厚一餅蓋瘡口上上鋪艾令滿着艾艾着蠟化滲入瘡口內先痒後痛俟艾燼盡去之則瘡癩盡化如鎖口未盡挑去之則新肉生矣若犯房勞必須再灸

桑柴火烘法

背疽初起腫痛重若石堅而不潰者用之能解毒止痛消腫散瘀出毒水即能內消若潰而不腐新肉不生疼痛不止者用之補陽氣散餘毒生肌骨遺深居法用新桑樹根劈成條或桑木棧長七寸劈如指粗一頭燃着吹滅用火向患處烘片時火盡再換每次烘三四枝每

日烘二三次以腫潰肉腐為度若腐已去而新肉生遲者則於瘡四畔烘之凡陰瘡癰癩流注腫瘡惡瘡久不愈者俱宜烘之書云火有拔山之力惜乎治者之不用耳

神燈照法

治發背初起七日前後未成者自消已成者自潰不起發者即發不腐者即腐誠良法也用○硃砂 雄黃 血竭 沒藥各一錢 麝香

分為末每用三分綿紙裹約為撫長七寸麻油浸透灼火離瘡半寸許自外而內周圍徐徐照之火頭向上藥氣入內瘡毒隨火解散自不侵臧臍初用三根漸加至四五根候瘡勢漸消漸減薰後隨用數約如已潰大膿瀉時不必用此其數約原方草約難覓

余以稀餐草一味代之將草杆爛加陳小粉再加食鹽少許研如糊數半寸厚留口比瘡大二三分為率瘡口用大芴葉以滾水泡熟

扯開貼之如乾及有眼用豬蹄湯潤之洗之

一法前方加輕粉二錢姜愈三錢露蜂房十個作摺薰照如前照畢用真生桐油調銀硃如膏貼之

再黃照冷疔結毒漏蹄風等症各錄本門條下

牛膠蒸法

癰疽發背痔漏惡瘡頑腫跌撲等症用牛皮膠熬至稀稠得所攤毛頭紙上每用一塊貼瘡腫上次用醃醋煮軟布兩塊趁熱層膠紙上

蒸之稍溫再易直至瘡群膿出將盡即濃煎貫仲湯洗去膠紙貼膏次日照前直至膿盡瘡乾為度隨用生肌散貼膏次日換膏仍照前

法蒸

藥筒拔法

陰發背於十五日前後堅硬不潰不膿不得外發必致內攻乃生煩燥重如負石非此法拔提毒氣不出誠有回天之功為瘍醫者不可

缺也法用 鮮菖蒲 羌活 獨活 紫蘇 斬文 白芷 甘草各五錢 連鬚葱二兩 用清水十碗煎數十滾聽用次用鮮嫩竹一段長七

寸徑口一寸二三分一頭留節刻去青留白厚約分許靠節鑽一小孔以杉木條塞之放前約水內煮數十滾取筒傾出藥水仍浸於

汁內候用次用披針於瘡頂吐一寸之內品字放開三孔深入寸許將藥水盒置患人榻前取筒傾去藥汁乘熱急合瘡眼上擊擊

自然吸住待片時筒已溫拔去塞孔木條其筒自落倒筒內之物於器內視其膿血相粘鮮明紅黃者可治純是敗血稀水氣穢

紫黑者不治此家傳屢驗之法勿忽之如陽瘡則不必用此恐傷氣血慎之

症治絕訣

凡看大瘡先以見標日為始至今幾日看瘡與日期可否次看受病之源出何部位屬何臟腑再辨陰陽老幼并氣血之盛衰再次方於

脈之虛實順逆以決其終

凡毒先視其頂高起者為氣感根東者為血感又視其色量要交會分明為元氣感而邪無散慢也高腫者為陽原無深毒治宜托裡以速其膿忌用內消反難作清漫腫平塌者元氣本虛急宜溫補催毒出外忌用汗下庶無變症

初起頂平根散色黯微腫不熱不疼身體倦怠者逆已成腫堅色紫不作膿不腐潰惟口乾多煩燥者逆已潰皮爛內堅不潰腫仍不消痛仍不減心煩者逆清後膿水清稀腐肉雖脫新肉不生色敗穢臭者死

初起元氣未虛症脈俱實者治當逆刃而解若懼悍懶定不能決於危急之時惟在中病則已所謂藥不瞑眩厥疾不瘳久病元氣虛者縱有餘症壞症又當先固其本而後調之和之散之所謂勢孤則守本立而道生也經云腎脈經虛從項出膀胱經虛從背出陽明

經虛從髀出是知瘡瘍諸毒由虛而出也治惟藉熱以發之雖陽熱疔痛亦宜溫藥稍助微涼以濟之斯為穩當腫瘍諸症不論首尾但見腫赤煩燥引冷使閉作渴脈洪實數者為之五寶此邪氣在裡治宜攻利如內疎黃連湯之類以杜其源如

身涼肢冷瀉利腸鳴嘔吐食少脈細者謂之五虛此元氣不足治宜滋補如托裡消毒散十全大補湯之類以培其本五寶者雖在嚴寒之時必用大苦寒之藥瀉其陽以救其陰五虛者雖在盛夏之時必用大辛熱之藥散其陰以回其陽經云用寒遠寒用熱遠

熱有假者反之雖違其時必從其症又云治病必察其下為時下之宜也初起七日之前或已受之後未服他藥者宜蟬酥丸或紺珠丹汗之如汗之不出由毒氣感表裡閉密之故則外兼神燈照法桑柴烘法

能使之成者自潰不脫者自脫助湯劑合表裡以成功烘後以膏蓋頂上提膿拔毒以禦風寒其根腳發腫又在數貼之力以東根本若潰後者則用鐵桶膏圍束瘡口庶不開大如陽瘡腫痛七日已後自有黃色稠膿相粘膏上每日用芴湯洗之換膏貼之其正

膿出在十一日前後如未經受者內膿將結之際皮厚無頭而難穿者用玄珠膏塗頂上黑膏蓋之三五日膿自毛孔吸出久之列界其腐成片而落其肉已平則換生肌藥已潰而腐不去者塗之去腐如割且無痛苦勝於他藥多矣然必賴內托之功方獲捷效

毒至十日以外瘡雖不腐而紅腫焮痛者由元氣不能充足或失於補托或誤用寒涼或蓋覆不煖所致治宜托裡大補以得膿為效若瘡口出黑血遍身汗出乃補托之微也如期不作腐潰形尚堅硬乃瘡根閉固為陰陽相半之症必用神妙拔根法不致內攻倘內有膿又便易出又以十五日至二十一日為期過此外者縱有稀膿誠難歸結若無膿為純陰不治故陽瘡以十四日為關陰瘡以二

十一日為節斯時務要膿出勢定不可過醜候膿出方自腐脫腐脫方自生肌生肌方自收斂收斂方自瘡平此瘡之關節次第也如期不得膿者後必多變用約之法初起以散腫內消為主已潰以排膿斂毒為主膿盡以去腐內塞為主腐盡以生肌斂毒為主此

治瘡之定例也夫症之有標本如五運為本六氣為標五藏為本六腑為標初病為本傳染病為標元氣為本病氣為標治宜本而標之如有嘔吐泄瀉

食少不寐等症宜先治之所謂內症愈而外症易瘥是標而本之也仍兼外治

食少不寐等症宜先治之所謂內症愈而外症易瘥是標而本之也仍兼外治

標使治宜 如瘡瘍初發審症處方必以一藥為標使如神效衛生散用金銀花當歸蒼木獲煎散用蒼木十全大補丸用夏枯草蟻卷

丸用薊花湯通聖散用漏蘆之類每用一兩煎湯復煎群藥其應如响此飛霞子之秘訣也 漢云阿膠飲牛膠丸屬金屬土補肺

氣實大腸壯胃止瀉 黃蠟丸入大腸有補國老膏化毒行經遠志酒金銀花酒俱有補性歸血歸心善用者以之配入瘡瘍之散結

潰瘍之補虛亦奏提效宜觸類而長之可也又如諸毒生於顛頂者諸藥俱宜酒浸酒炒酒煎酒服為使為因所為在上者因而射之

也 汗書云汗之則瘡已為外有六經之形症內無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裡也左脈洪緩關脈帶弦外感客邪也故宜

汗之使榮衛通邪氣去矣如冬月寒凝膠理必用辛溫之劑以托之如托裡溫中湯紺珠丹之類 又云助表不以取汗為功如蟬

酥珠砂雄黃等解毒之類乃取汗之峻劑也 又云瘡家雖不疼痛不可發汗汗之則瘡為無表症也即有表症然亦不可大汗大

汗則表虛不膿後必難治 汗出不利小便汗止則陽氣復小使自利也

下 瘡瘍時見五實者為邪氣在裡宜寒涼攻利之如內疎黃連湯之類次以托裡排膿之藥補之潰瘍時雖有口乾便閉等症由內忘

津液所致必脈細而數口和而乾食少喜熱乃虛火也惟補氣血養津液健脾胃則二便自和庶無變症如小便閉雖瘡瘍時不必

猪苓澤瀉以導水唯用參芪歸木及托裡消毒散消息之自效 瘡瘍面赤火鬱也發之見風脈風症者散之大便燥急者潤之鬱

胃者為昏迷也俱宜汗之以上之症慎不可下是瘡瘍惟在閉而不結通而不瀉為規

嘔 瘡瘍作嘔不問已潰未潰惟以脈實而數喜飲冷者為毒氣內攻下之脈弱而喜溫者為陽氣不足補之

熱 身熱而欲衣者血在皮毛寒在骨髓溫之身不熱而欲去衣者寒在皮也熱在骨髓清之

痛 寒熱虛實俱能為痛止痛之法殊非一端如熱毒熾痛者下之使閉作痛者導之瘀血作熱者和之更以桑柴烘之寒邪作痛者溫

散之濕腫強痛者滲導之燥橋掣痛者滋潤之勞而作痛者益之脹膜作痛者針之膿出反痛者虛也補之痰腐蝕痛者去之穢氣

觸痛者和之風寒逼痛者溫散之隨症施之其痛自止不必拘拘於乳沒也 又瘡瘍不可不痛不痛為胃氣虛極也不治不可大

痛兼煩悶者不治再麻痒更為惡候

飲 腫時不食為痛傷胃氣潰後痛止自能食也垣云瘡瘍食肉反補胃氣乃自棄也此禁之膏梁丹石之變非黎藿及虛弱者之通論

也若脾胃弱者有所禁忌亦當少與之不與則道其胃氣反不思食禁忌之要在生冷傷脾硬物難化肥膩滑腸惟在斟酌與之可

也又服藥後忌飲冷方見之效連服必再作 用藥之法如執權衡如大勢已退仍用悍霸之藥為誅伐無過失內經之旨矣 如敗毒散有表症者宜之多則損氣 流氣飲氣

結胸滿者宜之多則敗血 內補十宣散在冬月可助內拊之功能移深居淺爍燥榮瀉衛之藥太多在夏月及虛之甚者勿用

五香散腫瘍時用之似有暢達之理清湯時用之則犯重虛之戒 護心散能解丹石之毒若不因此及年老病深症應者忌用
柳酥等丸皆有砒烟之輩乃取汗之峻劑也治初起寒熱拘急疼痛脈沉細者為毒氣內陷也宜用如身熱脈洪及已潰者禁與
王臨丹為下毒之藥無取膿之功而體虛已成者勿用 垣云一經受病止責其一經不可干授餘經如流氣飲通行十二經則諸
經皆為所損矣禁之

辯暈 非腫脹也真暈生於瘡口之旁如紅筋之狀乃銳毒也二暈暈猶可四五暈難醫
辯古 舌紅濕潤如常者吉青黃赤白黑胎者重乾燥碎裂疼痛者死

內陷 始則高腫至十數日內外忽平塌者此內攻之候也宜急托裡

潰瘍 腫瘍之作由腎氣不從既已潰時則氣血不足故托裡者必養脾胃益因清由胃氣腐化斂由腎氣榮養法當純補之也 如
發熱惡寒膿多自汗作痛者十全大補湯 虛熱少睡飲食不甘者黃芪人參湯 皮寒虛熱咳嗽有痰者托裡清中湯 四肢怠

料 瑣疾面黃氣短者人參養榮湯 膿多心煩食少發熱不睡者聖愈湯 脾虧氣弱身涼脈細大便溏瀉者托裡溫中湯飲食
不甘惡心嘔吐者香砂六君子湯 脾虛下陷食少虛熱間作者補中益氣湯 腎虛作渴不能相制心火者加減八味丸煩熱作

渴起居如常者胃火也竹黃黃芪湯 再如潰時虛弱甚者參朮膏八仙糕 防虛自汗命少者人參膏或六君子湯加木香砂仁
甚者加大附子 泄瀉腸鳴胃虛嘔逆者參苓白朮散加豆蔻山藥木香柿蒂 脾虛下陷冷瀉及肛門重墜者補中益氣湯加山

藥山萸五味子隨症增減觸類而長之也
膿 肥人膿多如少是肉未腐瘦人膿少如多是由收壞也 膿出多身大熱不休者難治蓋毒之得膿如傷寒之得汗汗已而反太熱
者為壞傷寒矣 膿成體弱者必先補之如出膿一碗須服參三錢元氣虛弱更須大補若損大補小尚生變症况無補乎故云若
無補養之功其禍多在結加之後 先出稠白膿次流挑花膿再次流淡紅水方為膿盡生肌之兆 膿腐作臭者惟補氣血腐盡

則臭自止忌用止臭藥

血 瘡口出血或漸大而不斂者氣不守血也故云潰而出血不作膿者死

肉赤而不斂及膿多而帶者為血虛有熱宜八珍湯加丹皮 肉黑而不斂者為湯氣虛寒宜十全大補湯加白斂 瘡口皮白綻

而不收者及久不合口肉多膿少者再瘡無血色四圍血暈不散者皆由風寒外襲或涼藥太過致使血氣不潮俱用參芪補之桂
附溫之文湯滌之神燈照之桑柴烘之 瘡口開大膿清不生肌者裡虛也峻補之恐生變症再瘡口開大由七情勞傷穢氣所致

者用白鹽兒角燒存性為末發熱茶清調敷不發熱姜醋調敷四圍立效由砒礪蝕藥所致者用皮硝靛花水敷 瘡口緊硬貼膏

無膿者風毒也蝎蚣散瘡之見去腐門瘡口發痒用細茶食鹽湯洗之或以細鹽厚口四圍自止 肉雖長其色紫者遺毒也地榆

湯活血散敷之 瘡口已合誤犯房勞或暴復崩潰者仍助氣血 瘡口易收乃熱毒所致必防流注之患

肌肉者脾胃之所主收斂遲速由氣血之盛衰惟補脾胃此內治也腐不盡不可以言生肌驟用生肌反增潰爛務令毒盡則肌自生加以生肌藥此外治也 肌生如榴子紅艷或有白膜為善若肌白而平且無紋理或膿清穢氣為毒連五臟氣血枯竭也危

瘰癧瘡膜用軟薄綿紙封瘡口令患者用意呼吸之紙不動者未透膜也忌用噴法恐破膜不致

陽症變而為陰者草噴涼藥之過也於十一日之前未有膿時投溫中健脾之藥不應為純陰不治至十五日之後已出膿時投托

溫中湯及十二味異散散輕者十全大補湯倍加參芪桂附以救之須得瘡熱作痛膿出食進身溫脈起為吉所原本於陽者故生

陰症變而為陽者大方熱藥之驟也雖得微腫微紅微痛微膿終不似真陽紅活亦不得稠厚黃膿其瘡不久復歸陰矣所為原本

於陰者故死

腫瘍主治方

神授衛生湯

治癰疽發背疔瘡疽對口丹瘤瘰癧惡毒疔瘡濕痰流注及外科一切瘡症但未成者即消已成者即潰能宣熱散風行瘀活血解毒

消腫疎運臧腑且藥性平和功效甚速誠外科首用之方也

羌活八分防風 白芷 川山甲研沉香 紅花 連翹 石決明服各六分金銀花 皂角刺 歸尾 甘草節 花粉各一乳

香五分大黃二錢 酒拌炒脈虛便利者不用

水兩碗煎八分病在上部先服藥隨後飲酒一盃病在下部先飲酒一盃隨後服藥以行藥勢

內消活血湯

治發背並五臟內癰尻臀諸腫大小腸癰肛門臧毒初起但未出膿堅硬疼痛不可忍者並服

靑皮 陳皮 乳香 沒藥 連翹 黃芪 當歸 甘草節 白芷 射干 天花粉 川山甲 貝母 白芍 金銀花

皂角刺各八木香四分大黃二錢

水酒各一碗煎至八分量病上下食前後服之

內疎黃連湯

治癰疽腫硬發熱作嘔大便秘澀煩燥飲冷噦皖心煩舌乾口苦六脈沉實有力此邪毒在臟也急宜服此以內除之使邪氣不得

傳變經絡

木香 黃連 山梔 當歸 黃芩 白芍 薄荷 檳榔 桔梗 連翹各一甘草五分大黃二錢

水二茶鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

立應紺珠丹

治癰疽疔毒對口發頤風濕風溫濕痰流注附骨陰疽 膝風症左癱右瘓口眼喎斜半身不遂氣血凝滯偏身走痛步履艱辛偏
墜疝氣偏正頭風破傷風牙關緊閉截解風寒無不應效

茅朮八兩 全蝎 石斛 明天麻 當歸 甘草炙 川芎 羌活 荆芥 防風 麻黃 北細辛 川烏湯洗去皮 草烏湯洗去皮

何首烏各一兩 雄黃六錢

右為細末煉蜜為丸彈子大每藥一兩分作四九一兩作六九一兩作九九三等做下以備年歲老壯病勢緩急取用預用硃砂六錢研細為衣磁礮收貯如惡瘡初起二三日之間或癰疽已成至十日前後但未出膿者狀若傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱又治傷寒四時感冒傳變疫症但惡寒身熱表症未盡者俱宜服之連頓大芎白九枝煎湯一茶鍾將藥一丸乘熱化開通口服盡蓋被出汗為效如服後汗連再用芎白湯催之後必汗如淋洗漸漸退下覆蓋衣物其汗自收自斂患者自然爽快其病如失但病未成者隨即消去已成者隨即高腫潰膿如諸疾無表症相兼不必發散者只用熱酒化服此方原載於諸風癱瘓門予每用之發散瘡毒其功甚捷故移錄於此詳觀此方治腫瘍甚效者何也凡瘡皆起於榮衛不調氣血凝滯乃生癰腫觀此藥性專發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開之况瘡毒入乃日積月累結聚所發尚非甘溫辛熱發泄以汗疎通安能得效所謂發散不遠熱正合此方之意無謬也服後避風當食稀粥忌冷物房事孕婦勿服

雙解復生散

治癰疽發背諸般腫毒初起憎寒發熱四肢拘急內熱口乾大小便秘宜此藥發表攻裡並效

荆芥 防風 川芎 白芍 黃芪 麻黃 甘草五分 薄荷 山梔 當歸 連翹 滑石 金銀花 羌活 人參 白木

各八 大黃 芒硝各二錢

水二碗如表症甚者加姜三片芎頭二錢裡症甚者臨服加生蜜三匙和服此發表攻裡為雙解藥也

內消散

治癰疽發背對口疔瘡乳花百種無名腫毒一切疔瘡此藥能令內消化毒為黑水從小便而出勢大者雖未全愈亦可轉重就輕

移深居淺

金銀花 知母 貝母 天花粉 白芨 半夏 川山甲 兒角針 乳香各一錢

水酒 各一碗煎八分隨病上下食前後服之留藥渣搗爛加秋芙蓉葉細末一兩白蜜五匙同渣調敷瘡上一宿自消重者再

用一服忌口効

清熱消風散

治癰疽諸毒瘡腫已未成之間外不惡寒內無便秘紅赤高腫有頭掀痛宜服此藥和解之

防風 川芎 當歸 黃芩 白芍 天花粉 金銀花 連翹 紅花 柴胡 蒼朮 陳皮 黃芪 角刺各一錢 甘草五分

右水兩茶鍾煎八分食遠服婦人加香附童便炒以上七方癰疽七日之前瘡勢未成形體壯實表裡之症相合者宜服病退則已如過七日以後形勢已成便宜用托裡等藥催毒在外以速其膿其前表下之藥損傷元氣致生多變矣

內固清心散

治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩燥飲冷有此症者可預防毒氣內攻當服此藥庶不變症

茯苓 辰砂 人參 玄明粉 白芷 甘草 乳香 明雄黃各二錢 冰片 一錢 真豆粉 二兩

右為細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時候

護心散

治瘡毒內攻口乾煩燥惡心嘔吐者宜用此藥

真豆粉 一兩 乳香淨末一錢 硃砂 一錢 甘草 末一錢

右共研細末每服二錢白滾湯調服早晚二次

琥珀蠟卷丸

治癰疽發背已成未膿之時恐毒氣不能外出必致內攻預服此丸護心護膜散血散毒未消能消已消即合並治粉瘤癰癧瘰癧疾核及遍身瘡如蛇頭楊梅結毒痔漏鼻痔能祛毒化膿生肌補漏

白礬 二錢 黃蠟 一兩 雄黃 二錢 硃砂 二錢 琥珀 一錢 蜂窠 一錢 或再加滴乳石 二錢 杜貝母 六錢 麻油 二錢

右為末將蠟溶化離火候四邊稍凝時入藥攪勻乘熱搓成粗條懸火上烘軟丸之安巨大確收或以硃砂為衣每服三錢白滾水

黃酒任下甚者早晚各進一服 癰疽勢甚者特白礬末入蜂房孔內令滿紙包泥固服黃色為末和蠟為丸 熱毒甚者用嫩槐

枝三十寸分三次入蠟內燥枯去枝取蠟和礬等為丸 痛不可忍者加乳香沒藥各一錢 膿出不乾者加芋麻灰五錢 諸毒

先吃芎一口隨用黃酒下或芎湯下只瘡上出汗消腫止痛 疔毒用菊花一兩煎湯下 肺癰蜜湯下 咳嗽卧時淡姜湯下

虛者人參五味子湯下 泄瀉米湯下

托裡消毒散

交王卜斗大戒

卷一

十一

治癰疽已成不得內消者服此以託之未成可消已成者即潰腐肉易去新肉易生此時不可用內消泄寒涼等藥致傷脾胃
人參 黃芪 白朮 茯苓 川芎 金銀花 當歸各一錢 白芷 兒角刺 甘草 桔梗各五分 脾弱者去白芷倍用人參
右方水二鍾煎八分食遠服

治癰疽腦項諸發等瘡已潰流膿時宜服

人參 白朮 當歸各二錢 川芎 白芍 黃芪 陳皮 茯苓各一錢 香附 肉桂各八分 甘草五分 白芷項之上三分 背之上五分
牛膝下部加五分 姜三片水二鍾煎八分食遠服

乳香定痛散

治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗腐膿毒不假刀砭其惡自然脫下及治打扑傷損筋骨疼痛
俱宜服之 乳香 沒藥各五分 黃芪 人參 甘草 歸身 川芎 白芍 陳皮 熟地黃 粟壳去粉膜各一錢

水二鍾煎八分隨病上下服之

神功內托散

治癰疽腦項諸發等瘡至十四日後當腐潰流膿時不作腐潰更煎瘡不高腫脈細身涼者用之 當歸二錢 人參 白朮 黃芪 各一錢 大附子 陳皮 茯苓 白芍 川芎 各一錢 川山甲八分 炙甘草 木香各五分 煨姜三片 太棗二枚 水二鍾煎至八分

食遠服

透膿散

治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之即破 黃芪四錢 川芎三錢 當歸二錢 皂角刺一錢五分 川山甲一錢 右用水二鍾煎至一鍾
隨病上下服之或加酒一盃服

竹葉黃芪湯

治癰疽發背諸般疔腫表裡熱甚口乾大渴者 黃芪 甘草 黃芩 川芎 當歸 白芍 人參 半夏 石膏 麥冬各八錢 生地一錢 淡竹葉十片 燈心二十根 生姜三片 水二鍾煎八分食遠溫服

回陽三建湯

治陰疽發背初起不疼不腫不熱不紅硬若牛皮堅如頑石十日外脈細身涼肢體倦怠色似土硃粟頂多生孔孔流血根腳平散軟陷無膿又皮不作腐手熱足涼者俱急服之 大附子 人參 黃芪 當歸 川芎 茯苓 枸杞 陳皮 黃肉

錢各一 木香 甘草 紫草 厚朴 蒼木 紅花 獨活各五分 兒角樹根上白皮二錢 煨姜三片 水二碗煎八分入酒

一杯隨病上下食前後服之用綿帛蓋煖瘡上預不得大開瘡孔走泄元氣為要 愚按凡背疽屬陰者俱由藏腑先壞而內毒

不得發越於外也猶有難忍血滴於疽上者有醋爇雄文敷用者猪腦熱藥敷數者神燈火氣灼照者此數法皆治陰疽之用予

雖常用但未見其實效但陰疽不起者如樹木之根壞強力培植枝葉而終無發生之氣藥因有得其生者十中三四

譬如先要疎其穢土通其地脈助其根本回其陽氣此四者缺一不可用 蒼木厚朴茯苓陳皮疎其土 川芎當歸紫草紅花通

其脈 人參黃芪枸杞山芫助其本 附子木香甘草獨活回其陽 如此用之但根本內有一脈未絕之氣服之俱可得其生又

驗其手足溫暖瘡便發熱漸作焮腫復生疼痛色暗得活動硬得腐胃氣得回此是藥之效必在三服中應之為吉外兼照法接助

回陽此通治陰疽之大法也

黍米寸金丹 二名追魂丹三名再生丸四名追命丹五名延壽丸六名求甦圓七名知命丸八名得道丸此方皆出異人所傳常有暴

中急症忽然猝倒者敲開牙關研灌三九其人即活又能治發背腦疽遍身墮腫附骨癰等症 初起增寒壯熱四肢倦怠沉重者

無分表裡老幼輕重並宜服之 射香五分 乳香 沒藥 雄黃 烏金石 狗寶 輕粉各一錢 蟾酥 礞砂各二錢 黃蠟三錢 狗胆

乾用白粉霜三錢 鯉魚胆三個 白丁香九粒 金頭蜈蚣七條 全者 右為末將黃蠟乳汁熬成膏和藥為丸棗豆大

大人三九小兒一九病重五九冷病用芫湯熱病用新汲水送下蓋卧避風出汗為度諸病如失然後食粥調理 此間原載數

貼烘照黃洗等方今各立一門於本卷之後庶無紊亂

潰瘍主治方

十全大補湯

治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或膿淡或自汗盜汗及遍身流注瘰癧便毒諸瘡久不作膿或膿成不潰潰而不斂若氣血不

足之人結腫未成膿者宜加陳皮香附半夏連翹服之自消 人參 黃芪 白朮 當歸 白芍 川芎 熟地 茯苓 肉桂

錢各一 炙甘草五分 水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服

八珍湯

治潰瘍諸症調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食和表裡退虛熱為氣血俱虛之上藥也 當歸 川芎 白芍 熟地 白朮 人參 茯苓 炙甘草各五分 水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服

補中益氣湯

治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脈洪大而無力或頭痛而惡寒或聲高而喘或身熱

而煩俱宜服此 黃芪五分錢 炙甘草 人參 當歸 白木各一錢 升麻 柴胡 陳皮各三分 麥門冬六分 五味子五分
右水二鍾姜三片棗二枚煎一鍾空心熱服

人參養榮湯

治潰瘍發熱惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃或發短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不治收斂若大瘡愈後多服之
不變他症 白芍五分錢 人參 陳皮 黃芪 桂心 當歸 白木 甘草各一錢 熟地 五味子 茯苓各八分 遠志五分
水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服

人參黃芪湯

治潰瘍虛熱食少不睡或穢氣所觸而作痛者 黃芪 人參 白木 麥冬 歸身 蒼朮 甘草 陳皮 升麻 神曲
各五 五味子五分 黃柏酒拌炒 水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服

內補黃芪湯

治癰疽發背諸瘡已破後虛弱無力體倦懶言精神短少飲食無味自汗口乾脈瀯不睡並效 黃芪 人參 茯苓 川芎 歸身 白芍 熟地 肉桂 麥門冬 遠志各一錢 甘草五分 水二鍾姜三片棗二枚煎一鍾食遠服

托裡清中湯

治癰疽脾胃虛弱咳嗽痰氣不清飲食少思者 人參 白木 桔梗 陳皮 半夏 茯苓各一錢 麥門冬 五味子 甘草各五分 水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服

托裡和中湯

治癰疽中氣虛弱飲食少思腫不消清不斂者 半夏 白木 人參 茯苓 陳皮 煨姜各一錢 木香 甘草各五分 水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服

托裡建中湯

治癰疽元氣素虛或因寒涼損胃傷脾飲食少思凡食無味或作嘔泄瀉各等症急服之以健中氣 人參 白木 茯苓各一錢 半夏 炮姜各一錢 甘草五分 熟附子八分 水二鍾煨姜三片棗二枚煎八分不拘時服

托裡溫中湯

治癰疽陽弱陰寒脈虛身冷或瘡為寒變反致不疼或膿水清稀心下痞滿腸鳴腹痛大便微瀉食得氣短嘔逆不得安卧時發昏憤者服之 白木 茯苓 木香 丁香各五分 半夏 陳皮 羌活 益智仁 乾姜各一錢 人參 白豆蔻 甘草各一錢 大

附子二錢 水二鐘姜三片棗一枚煎八分不拘時服 此方與舊不同予製此膏治癱瘓陰症及雜症陽氣脫隔與寒氣偏陽於外者發熱煩燥口乾作渴投以姜附之類其津液頓生煩熱頓退其應如響

聖愈湯
治潰瘍膿水出多氣血極虛脈細空而無力以致心煩不安眠臥不寧或五心煩燥等症並服之 熟地 生地 川芎 人參
各五錢 歸身 黃芪各一錢 作一劑水二鐘煎八分食遠服

保安大成湯
治潰瘍元氣素虛精神怯弱或膿水出多神無所主以致睡卧昏倦六脈虛細足冷身涼便溏或秘胸膈或寬或不寬舌雖潤而少津口雖食而無味瘡竅不聚肉雖微紅總由不足大補堪題 人參 白朮 黃芪各二錢 茯苓 白芍 陳皮 歸身 甘草 大附子 山萸肉 五味子各一錢 木香 砂仁各五 水二鐘煨姜三片去皮棗二枚煎八分食遠服服至精神回手足煖

脾胃醒肉色紅為度上口症乃元氣虛脫已欲變壞之病非此不回也
獨參湯
治潰瘍膿水出多氣血虛極或惡寒格熱或自汗冷汗或手足指甲青冷或身冷脈細並宜服之 人參二兩 作一劑水二鐘

棗十枚煎一鐘徐徐服之若煎稠厚即為膏矣作三次以好溫酒化服亦可
香砂六君子湯
治潰瘍脾胃虛弱極惡心嘔吐或飲食不思等症 人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏各一錢 甘草 藿香 砂仁各五

清震湯
右姜三片棗二枚水二鐘煎八分食遠服
治潰瘍脾胃虛弱或誤傷生冷或氣腦勞役或入房夢遺或火邪乘入中脘乃生呃逆急服之 益智仁 陳皮 半夏 茯苓

人參 甘草 香附各一錢 柿蒂二十個 澤瀉三錢 熟附用一錢 姜生三片棗二枚燈心二十根水二鐘煎八分不拘時服
如身熱口乾便燥火疔者加黃連五分

醃脾益胃湯
治潰瘍脾胃虛弱過傷飲食生冷以致胸膈不寬四肢面目浮腫及小水不利等症並宜服之 人參 陳皮 茯苓 半夏

山藥 白朮各一錢 蒼朮 厚朴 澤瀉 麥牙 木香 山查 蘇子 猪苓各五 老黃米炒黃一錢 水二鐘姜三片燈心二
十根煎八分食前服

治癰疽潰後血虛疼痛不可忍者宜服之甚效 歸身 熟地 乳香 沒藥 川芎 白芍 肉桂各一錢 粟殼洗去筋膜炒二錢

水二鍾煎八分隨病上下食前後服之

神應異功散

治潰瘍陰盛陽虛發熱作渴手足並冷脈虛無力大便自利至飲沸湯而不知其熱者必服之 木香 官桂 當歸 人參

茯苓 陳皮 白木路一 枳實 丁香 肉豆蔻 大附子 厚朴路五 水二鍾姜五片棗三枚煎八分不拘時服 此方於

癰疽陰症及雜症陽氣脫陷與寒氣偏陽於外者發熱煩燥口乾作渴投以姜桂附子之類津液頓生煩熱頓退其應如響人但不

習而察之

參不膏

治癰疽發背等症大膿後氣血大虛急宜用此 上好人參半斤切片加水五大碗砂鍋內慢火熬至三碗將渣再煎汁一碗共用

密絹濾清後熬稠厚磁碗收貯聽用 雲片白木六兩 淮慶熟地六兩俱熱同上法 以上三膏各熬完畢各用磁碗盛之投入

水中待冷取起益勿泄氣如患者精神短少懶於言語氣短自汗者以人參膏三匙白木膏二匙地黃膏一匙俱用無灰好酒一盃

搗熱化服如脾氣虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者用白木膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙好熱酒化服如患者腰膝

酸軟腿脚無力皮膚手足粗澁枯槁者用地黃膏三匙人參白木膏各二匙化服如氣血脾胃相等無偏勝負者三膏各用二匙熱

酒化服此膏用於清晨並臨睡時各進一次自然強健精神頓生氣血且新血易生瘡口易合任瘡危險勢大膿多者可保終無變

症夏天炎熱恐膏生變分作二次熬用亦好愈後能服鬚髮變黑反老還童以上諸方功難及此

八仙糕

治癰疽脾胃虛弱精神短少飲食無味食不作飢及平常無病但久病脾虛食少嘔泄者並妙 人參 山藥 茯苓 芡實

蓮肉各六兩 糯米三升 粳米七升 白糖霜半斤 白蜜一斤 右將人參等五味各為細末又將糯粳米亦各為粉與以上藥

末和勻將白糖和蜜湯中預化隨將粉藥趁熱和勻攤鋪籠內切成條糕蒸熟火上烘乾磁器密貯每日清晨用白湯泡開數條或

乾用亦可但遇覺飢時隨用數條甚便服至百日輕身耐壯助元氣培養脾胃妙難盡述

胃愛丸

治潰瘍脾胃虛弱飲食諸味不喜用過開胃進食之藥不效者此脾崩之家宜服至食進為吉 雲片白木一兩白者末湯送

統同參 淮慶山藥一兩肥大上白者切片用男乳神濕候潤透晒微焙 上白茯苓一兩切一分厚厚片用砂仁二錢同炒 清河人參一兩製後細末

白芷冠三錢 陳皮用陳皮老先炒黃色方 蓮肉去皮心切 小紫蘇按時連根葉切片五錢 甘草錢 右共為細末用老米

二合微焙碾粉泡荷葉湯打糊丸梧子大每服八十丸清米湯不拘時服

二神丸

治癰疽脾胃虛弱飲食不消大便澹泄者必服之 破故紙四兩微炒 肉菓肥大者二兩生用 用大棗四十九枚老生姜四兩切片

水浸棗姜煮至水乾為度取棗肉作丸梧子大每服七十九丸清米湯空心送下及治尋常腎虛脾泄俱效

加減八味丸

治癰疽已發未發口乾作渴舌乾黃硬者宜服 茯苓 山藥 丹皮各四兩 山萸肉五兩 澤瀉三兩 五味子炒三兩 肉桂錢六

熟地為膏酒 右共為末煉蜜作丸梧子大每服二錢空心服鹽湯送下平常酒服亦可此溼潤燥之藥也

紅鉛造化丹

治癰疽元氣不足軟陷不起發或已發復被風寒內外所侵以致瘡毒下陷變為陰塌不痛者急宜服此亦可轉陰為陽反出毒氣

復腫為吉 紅鉛三錢法 人參 茯苓 山藥各一兩 炙甘草 枯礬各五錢 辰砂 寒食鈣各七錢半 麝香八分 冰片六分 乳

粉二錢用蠟生男乳每瓶內 右各研精細末合為一處再共研細用白蜜二兩再同頭生男乳一大盃慢火重湯內用磁瓶頓蜜

滴水不散為度候稍溫和入前藥硬軟得宜丸龍眼核大金丹為衣磁確收用或以蠟固為妙每用一丸好熱酒一盃化丸食速服

之用厚綿帛蓋暖患上其熱如蒸瘡必復起作痛乃此丹之効也諸症嘔吐怔忡瀉痢屢藥不瘥異症並效大率心經之病用石昌

蒲肝經之病用遠志脾經之病用生薑肺經之病用參門冬腎經之病用五味子各隨五經之症用五引煎湯化服其應如神修合

時務要端午黃道日為佳製藥時忌婦人鷄天生人異物預祝齋戒誠意多靈

以上二十四方治癰疽已潰至於收斂正病雜病變症瘰癧症此四者俱在其中選用毋得錯亂以保終吉若不遵此法妄信他說別

以奇方秘法治之終致多變但潰後氣血根本無有不虧傷者大抵補扶扶羸理勞績皆不出於前方此外無法也

腫瘍主治方附餘

神效衛生散

治癰疽發背腦疽丹瘤瘰癧惡毒疔瘡濕痰流注及外科一切瘡症不問陰陽表裡虛實但未成自消已成者即潰將潰者餘毒自

去新血自生功甚速誠外科首用之方也 羌活 白芷 川山甲炒 石決明散 乳香 沒藥 生大黃各一兩 沉香五錢

加防風 蟬蛻 姜蚕錢各五 各為末和勻每服五錢用歸尾一兩黃酒二碗煎八分調服預用金銀花一兩煎湯一小碗隨用漱口

咽下蓋臥汗下俟其自然 若此虛家藏之秘方也非彼秘而不傳者但方貴乎平易異則觸目如兵費用正兵奇則駭然正兵常

也奇兵變也余不敢秘亦不混之於前另錄之用正用奇存乎其人耳

雙解貴金丸

治背疽諸毒脹悶堅硬便閉脈沉實者 大黃一斤 白芷兩 為末水作丸每服三五錢五更時用連翹湯大者十餘根黃酒

一碗煮芴爛取酒送丸蓋卧出汗過二三時行一二次立效 此宣通攻利之 也濟之以芴酒力能發汗故云雙解弱者隨用生

料四君子湯補之 老人虛人每服一錢以人參加生薑煎湯送下過一時再一服得睡上半身汗出睡覺則已

一腫毒初起腫痛不可忍者用 紅花 川山甲炒各五錢 歸尾三錢 黃酒二鐘煎一鐘調 阿魏分五 麝香五厘 服之

一腫瘍發於陰處及乳癰等症用 川山甲炒三兩 牛皮膠炒五兩 為末酒丸每服三四錢黃酒送下未成者即消已成者自斂

一腫瘍已潰不穿及內癰等症用 兒角刺兩 黃芪五錢 甘草二錢 乳香錢 黃酒煎服

一癰疽腫毒有死血陰毒在中則不痛用 遠志酒飲之數之則痛有憂怒等氣積而內攻則痛飲之數之則止或濕熱在內熱逼人

手不可近澄之數之必涼或氣血虛寒潰而不斂及七情內鬱者治之必愈法用遠志泔水浸去心為末每用五錢黃酒一鐘調之渣

清飲之渣數患處余每以此酒調對症藥服以渣數之更佳

一對口初起不問偏正用蛇蛻一條燒灰酒服即消

復元通氣散 治乳癰腹癰腫毒便毒耳痛耳聾由諸氣閉塞者 青皮兩四 陳皮兩四 川山甲兩二 甘草三兩半 連翹兩一 水煎

仁二 金銀花兩一 或末或丸每服二錢黃酒調服

越鞠丸

治牙疼齒痛口舌生瘡或胸膈痞滿嘔吐吞酸或腹脹腿酸等症由六鬱所致者多故用之悉效 炒蒼朮 炒神鉤 香附

山查 枝子炒 撫芎 炒麥芽 等分為末糊丸桐葉大每服七十九白湯送下

腫瘍敷貼類方

初起時腫高赤痛者宜敷涼藥乃撲火之義也然亦不可太過則恐變為陰 漫腫不紅熱似有頭而不痛者宜敷溫藥乃引火就燥

之義也經云發表不遠熱敷熱藥亦發表之意也 凡調敷藥必須多攪則藥稠粘數後貼然必須摠碎則不崩裂不特用原汁潤之乃

借濕以通氣乾則藥氣不入更添拘急之苦 凡去敷藥必看毛孔有汗意者為血脈通熱氣散也反是者逆

如意金黃散

治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕流毒凡起頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕脚氣婦女乳癰小兒丹毒凡外科一

切諸般頑惡腫毒隨手用之無不應效誠為瘡家良便之方也 黃柏色重 大黃 姜黃各五 天花粉十斤 白芷三

紫厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 天南星^{各二} 以上共為咀片晒之極乾用大驢礮連礮三次方用蜜絹羅厨篩出磁器收貯勿

令泄氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月火令時俱用茶湯同蜜調敷如微熱微腫及大瘡已成欲作膿者俱用芎藭湯同蜜調

敷如漫腫無頭皮色不變痠濕流毒附骨難疽鶴膝風症等病俱用芎藭酒煎調如風熱惡毒所生之患必皮膚充熱紅色光亮形狀

游走不定者俱用蜜水調敷如天泡火丹赤游丹黃水漆瘡惡血攻注等症俱用大藍根葉搗汁調敷如蜜亦可湯潑火燒皮膚破

爛麻油調敷具此諸引理取寒熱溫涼治之又在臨用之際順合天時洞窺病勢使引為當也

二青散 治一切痲熱紅腫熱痛陽毒未成者即消 青黛 白友 白欬 白微 白芷 白鮮皮 朴硝 水龍骨 黃柏^{各一} 天

花粉^三 大黃^四 青露^三 兩^印 為末用醋蜜調敷如已成者則敷四圍留頂貼替針膏

回陽王龍膏 治背疽陰病不高腫不焮痛不發熱不作膿及寒濕流注鼓風久損冷痛痺風諸濕脚氣手足頑麻筋骨疼痛及一切皮色不變漫

腫無頭鶴膝風等但無皮紅肌熱者一概用之俱有功效 草烏^{兩三} 軍姜^兩 炒赤芍 白芷 南星^各 肉桂^{五錢}

右製後共為細末熱酒調敷此藥有軍姜肉桂熱血生血既生既熱恐不能散而為害故有草烏南星可以破惡氣祛風毒活死肌

除骨痛消結塊回陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛苦加之酒行藥性攻通氣血雖十分冷症未有不愈者足為寒灰之鹹枯

木之脊大抵病冷則肌肉陰爛不知痛痒其有痛者亦多附骨之痛設若不除則寒根透髓平常之藥固莫能及矣

坎宮錠子 治焮赤紅熱腫痛諸毒並痔 京墨^一 熊胆^三 胡黃連 兒茶^{各二} 水片^一 麝香^{分五} 牛黃^{分三} 右為末用猪胆汁為

主加生姜汁大黃水浸取汁釀醋各少許相兌和藥成錠用涼水磨如墨以筆沾藥塗之

離宮錠子 治一切皮肉不變漫腫無頭腫毒疔毒 京墨^一 蟾酥 胆礬 血竭^{各三} 硃砂^二 麝香^{一錢} 右為末用涼水調成

錠涼水磨如墨照前法塗之

絳紅膏 治一切腫毒已成悉效 先用加味神燈檢照畢次用真銀硃為末以真生桐油調攤如膏貼之

二味消毒散 治熱痺痲痺疥疹風濕痒瘡 白礬^兩 明雄黃^錢 右為末茶清調化鵝毛蘸掃患之痛痒自止瘡果自消

鐵補膏

陰將潰已潰時根腳走散不收束者

文蛤微炒

白芨錢五

銅綠錢五

明礬錢四

胆礬錢三

輕粉錢二

鬱金錢二

麝香分

右為末收之聽用用陳米醋一碗杓內文火煎至一小鐘起金色黃泡為度候溫入藥一錢攪勻炖溫用新筆蘸塗根上綿紙蓋之

自生絛紋漸收漸堅再不開大用

石膏一

銅青錢五

硼砂錢五

白靈藥錢五

右為末次用阿膠一兩以黑鉛三斤夾碎水

四碗煎半碗入阿膠再煎成膏入藥成錠重二錢用人乳磨塗

一用銅青一

硼砂一

以阿膠膏成錠用乳香煎湯磨濃新

筆蘸陰初起者塗一圍消一圍已潰者先用椒茶湯洗之如瘡口已完皮肉未老燒黃之

馬齒莧膏

治發背諸毒莧一握酒煎或水煮冷服自能出汗一服退熱去腐三服良愈再杵莧敷之

楊梅愈後遍身如癩喉硬如管者取莧

梳粗一把酒水煎服出汗 多年頑瘡腫痛頑痛不收口者杵莧敷之取莧一日一換三日後腐肉盡見紅肉珠時換生肌藥收口

婦人臍下生瘡痛痒流水連及二陰者用莧四兩青黛二兩研勻敷之 丹毒如藍根杵敷 唇緊面腫者搗汁敷之 濕癬白

禿取石灰末炒紅用莧汁蒸膏調勻敷之 三十六種風瘡取莧一石水二石一釜煮之澄清加黃蠟三兩再煎成膏塗之服之

洗滌類方

洗有蕩滌之功使氣血疎通以疎其毒則易潰散而無壅滯也凡腫四肢潰潰之在腰腹背淋之在下部浴之如用藥二兩以水二升

煎升半用布帛或棉蘸洗稍涼再易之日用三五次甚者日夜不住以腫消疼止為度 如已潰時及拔筒後先去舊藥用方盤靠身

於瘡下放定隨用猪蹄湯以軟絹淋洗瘡上并入孔內輕手捺淨內膿庶敗腐竅膿隨湯而出以淨為度再以軟綿疊七八重勿令太

乾帶湯覆於瘡上兩手輕盈旋按片時常溫再換如此洗按四五次流通氣血解毒止痛去瘀脫腐此手功之要法大瘡不可缺也洗

時在冬月要猛火以逼寒氣在夏月要明窗以禦風寒若不慎此輕則有妨收口重則必變純陰 蓋用猪蹄湯者使毒聞腥而速腐

耳腐未盡數玄珠膏腐已淨數玉紅膏俱以黑膏蓋之如四邊根已消則不必用箍藥更加大補得宜其功甚速 凡瘡一月不治

則有蟲用艾煎湯投白礬三錢洗因艾性能殺蟲也 瘡由氣血冷而不收口者用艾煎湯洗之更燒艾薰之為艾性辛熱以助陽

氣也 又未潰之前及已照之後用慈艾湯洗之

文蛤散

治腫瘍癢痛不問已潰未潰洗之則腫寬痛減

文蛤三五兩打碎去土

葱白十多根

水煎淋洗

猪蹄湯

治已潰流膿時用此消毒氣去惡肉回免肌潤瘡口散風消腫腐 則已 當歸 白芷 羌活 甘草 赤芍 黃芩 蜂房

等 右為粗末先將猪蹄一隻使水六碗煮蹄軟為度去面上浮油并湯下濁脚取清汁入藥一兩煎數十沸銷濾去渣候溫時以軟絹淋洗

一背疽之輕者用此以代前湯 當歸 白芷 獨活 甘草各二錢 葱頭五錢 水二碗煎用

一陰瘡黑陷而不痛者用 艾絨一斤 硫黃雄黃各五錢 為末同艾水煮半日水將乾取出搗爛濕敷患上再煮再易十餘次以知

痛則生不知痛出紫血者死然必內服大補回陽之藥助以成功

一瘡腐臭穢者用 蛇麻子二兩 皮硝兩 水煎洗之一用 白礬兩 雄黃兩 為末以兩許滾水沖洗

軍持露

治潰瘍腐盡見新肉珠時用此洗之以助生肌 乳香 沒藥 兒茶 輕粉等 為末每用三五錢水煮黃色洗之或用猪蹄

湯煎洗尤佳

膏藥類方

紺珠膏

治一切癰疽腫毒流注乳毒癰瘰疔核並跌撲損傷風寒濕痺骨節冷疼再頑腫風血等瘡及頭痛牙痛心腹腰腿牙痛火眼咳嗽

五疳下痢等症悉效

製油四兩煎滾入 製松香一斤文火化柳枝攪候化盡離火入細藥末二兩三錢攪勻即傾水中拔扯數十次易水浸之聽用 跌撲

腫毒癰瘰等症但未破者再加魏香散隨膏之大小患之輕重每加半分至二三分為率 已破者則另加生肌散然此膏貼破瘡少

痛未若於黑膏內加生肌散為妙而有毒深膿不盡者及頑瘡對口等症雖潰必用此膏復效 未破者貼之勿揭揭則作痒痛亦

勿揭能速於成膿患在平處紙攤在彎曲轉動處用絹帛攤貼 跌撲腫毒疼痛等症貼於本處 腫瘡及臂腿寒食等瘡先用茶

清入白礬少許洗淨貼之刻日見效 寒涼咳嗽貼背心 頭痛貼太陽穴 牙疼塞牙縫內 火眼貼魚尾 小兒疳痢丸茶

豆大神曲為衣每服三二十丸米湯下 內癰等症用蛤粉為衣服之 便毒瘰核多加魏香散 應瘡再加銅青 鱗攻頭癬毒

亦驗

製油法 每麻油一斤用當歸木別子肉知母細辛白芷巴豆仁文蛤打碎山茨菇打碎紅芽大戰續斷各一兩槐枝柳枝各三寸入

油內浸一二七日煎枯去渣取油聽用 余察朝鮮琥珀膏多續隨子此方宜加之

製松香法 擇片子淨嫩松香為末斤次取槐柳桃桑芙蓉等五樣枝各斤剉碎用大鍋水煮濃汁濾淨再煮一次各收之各分五

分每用初次汁一分煎滾入松香末二斤以槐柳枝攪之煎至松香沉下水底為度即傾入二次汁內乘熱攪扯數十次以不斷為

佳候溫作餅收之餘香如法 此原方也但其膏前色火紅艷云加蘇木同五枝煮之

膏內細藥方 乳香 沒藥俱去 血竭各五錢 輕粉麝香各二錢 明雄黃四錢 為細末加石膏內用

魏香散膏面搽用 乳香 沒藥俱去 血竭分等 阿魏 麝香中成 為末罐收聽用

生肌散侯腐盡生肌用此 人參 龍骨 赤石脂 乳香 沒藥 血竭 輕粉各二錢 貝母三錢 珍珠一錢 冰片一錢 一加白蠟二錢 為末罐收聽用

亞聖膏 治一切破爛諸瘡並梅瘡粉毒 象皮一兩 蛇蛻二錢 驢甲塊 川山甲六錢 血餘三錢 蟾蛻四錢 木鱉子七錢 雞子青一個

艾柳槐榆桑枝各二十斤 麻油斤三 浸七日煎如常法去渣每淨油一斤入黃丹七兩煎成膏入黃蠟五錢化勻再加 乳香

兒茶 沒藥各三錢 五靈脂五錢 牡蠣五錢 血竭五錢 成膏出火毒任用

絳珠膏 治潰瘍去腐定痛生肌 麻油十斤 雞子黃十斤 血餘五錢 天麻子肉八斤 白蜜蠟三兩 黃丹二兩 乳香 沒藥

輕粉 珍珠 血竭 兒茶各三錢 硃砂一錢 冰片一錢 麝香五分 乳砒加銀砒兩 右將油燻血餘化麻子肉枯去渣入蠟俟

化離火片時入黃丹攪勻再加細藥和勻收用

瑩珠膏 治潰瘍去腐定痛生肌並梅瘡杖瘡腫瘡下疳 豬脂油兩十斤 白蠟三斤 溶化離火俟溫入 輕粉 檀水各一斤 右為

末攪勻俟稍凝再入冰片一錢末攪勻成膏罐收之聽用先以甘草若參各三錢水煎洗淨貼膏杖瘡用荆川紙攤至薄貼之熱則

易之其疔疾即散疼痛立止 楊梅瘡加紅粉三錢 頑瘡乳岩加銀硃兩 腫瘡加水龍骨三錢 或龍骨四錢

生肌王紅膏

此膏專治癰疽發背諸般潰爛毒各瘡用在已潰流膿時先用甘草湯甚者用豬蹄藥湯淋洗患上軟絹把淨用抵脚批膏於手

掌捺化過捺新腐肉上外以亞聖膏蓋之大瘡早晚洗換二次內服大補脾胃之煖藥其腐肉已脫新肉即生瘡口自斂此乃外科

收斂藥中之神方也

白芷五錢 甘草二兩 歸身二兩 瓜兒血竭 輕粉各四錢 白占二兩 紫草二錢 麻油斤一

先用當歸甘草紫草白芷四味入油內浸三日大約內慢火蒸藥微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾下整血化盡次入白占

微火亦化先用茶鍾四枚預水中將膏分作四處傾入鍾內候片時方下研極細輕粉每鍾內投和一錢攪勻待至一伏時取起不

得加減致取不致

玄珠膏 治腫瘍將潰塗之膿從毛孔吸出已開針者用搵蘸送孔內呼膿痰腐不淨塗之立化 木鱉子肉十斤 盤貓八斤

柳枝四斤 或加鹽甲片三錢 草烏一錢 麻油兩 浸七日文火燻枯去渣入巴豆仁三斤 煎豆黑傾於鉢內研如泥加麝香一分 和

勻入罐中收用

碧蟾膏 治下部濕瘡疥癬並結毒疾串癰瘡 松香取嫩白或片者佳為末篩過用制蜜以猪油調拌之入水至滾入松香不住手攪之以香沉底為度即傾冷水內攪拉百十次以不斷為度 麻油

三煎滴水成珠入松香一斤文火溶化看嫩老取起離火住滾徐徐入糠青胆礬各五錢以柳枝左攪至勻為度如老加熟猪油二

三錢用綠紙薄攤 此方宜寬用土柴用桑器用銀煮用水煎用火取五行之理也忌婦人外人雞犬等見之

貝葉膏 治癰疽發背一切潰爛諸症 麻油入血餘 雞子大 文火煤化去渣離火入白蜜蠟內溶化候溫用綿紙剪塊三張

於油蠟內蘸之貼磁器封上用時揭單張貼患處日換八九次力能定痛去腐生肌其功甚速勿可忽之

麻藥類方 瓊酥散 服之開針不痛 蟬酥錢一 半夏分六 開揚花分六 胡椒一錢 川烏一分錢 川椒一分錢 華撥錢三 右為細末每服

半分黃酒調服 如要大開加白酒藥一丸

整骨麻藥 開取箭頭服之不痛 川烏 草烏 胡茄子 開揚花用倍 麻黃 姜黃分等 右為末茶酒任下甘草水可解

外敷麻藥 川烏尖 草烏尖 生南星 生半夏各五分 胡椒一 蟬酥錢四 一加華撥等 一加細辛錢 右共為末用燒酒

調敷候麻木任割不痛

去腐類方

書云腐不盡不可以言生肌若誤用生肌藥則反增潰爛但潰而不痛者乃其微也又云毒盡則肌自生更有腐不可以不速去也

腫毒已成皮厚不穿者內服透膿散外塗玄珠膏仍以黑膏蓋之則膿由孔竅中滲出三五日毒頂分界成片而落其大膿已盡而內

肉已平神妙莫測陽症立效而必賴內托之功如毒生而不能收斂者以紙蘸蘸玄珠膏送入瘡口內易於收斂不致成漏 杖打塗

之痰腐立化 治癰加天茄子同煤調蘆薈末塗之 禿瘡加花椒數粒牙皂杏仁各七個 少許同煎如法

去腐靈藥 水銀兩 火硝二 食鹽錢三 枯礬錢三 硃砂錢八 雄黃錢三 白矾 硼砂各錢三 一加礮砂錢三 共為末入泥

罐內蓋蓋封口架三釘上砌有眼鑪先底火二寸點香一枝中火一枝頂火一枝隨以水擦蓋勿住香畢去火次日取升上用

發背未破加花粉已破加乳香沒藥 疔瘡初起加蟬酥 腫毒加鵝管石醋調敷 爛瘡加黑附子 囊癰爛加貝母 瘰癧破

加髮灰皂角白芨水調敷 疔瘡加滑石 魚口加皂角 結毒加光粉滑石 腫瘡加輕粉黃丹 跌撲加文蛤百草霜 乳蜂

走馬疔耳腫等俱用茶調 蛇咬加南星川椒 蟲咬加雄黃 蟻咬加雄黃 未香 為末擦膏藥蓋之

蠟蚣散 瘡口緊硬貼膏而無膿者風毒所勝也 全蝎 蜈蚣 未香 為末擦膏藥蓋之 生肌類方

凡大毒潰爛內毒未盡若驟用生肌則外寒內潰重者過毒內攻輕者反增潰爛雖即收口其於旁處復生大疽是知毒未盡不可驟用生肌藥也。只以貝葉膏貼之頻換俟生肉珠時方用生肌藥如元氣弱者須當大補以培其元。

生肌定痛散 潰爛紅熱腫痛有腐者用此化腐定痛生肌 生石膏五七次每兩加研砂五錢 辰砂錢三 冰片分二 共為末搽之

定痛生肌散 潰爛紅熱腫痛無腐者用此定痛生肌 石膏錢一 乳香 血竭 輕粉各五錢 冰片錢 有水加 白芷 龍骨各錢

錢不收口加雞內金錢一 為末搽之

冷瘡不收口者 乾姜為末搽之覺熱如烘平肌易愈

諸瘡發痒 用枯礬乾姜末搽之 細茶 食鹽 煎湯洗之

腐盡生肌散 乳香 沒藥 血竭 兒茶 三七各二錢 冰片錢一 麝香分二 熱加黃連錢一 腐加輕粉錢一 有水加龍骨一錢

欲速收口加珍珠兩 或加鮮黃錢 其法取團臍蠟蒸熟取黃曬乾收用 共為末搽之

或以前七味加猪油斤半 黃蠟兩 稍溫用綿紙拖膏貼難直破爛各醫若杖傷則三七倍之

一以鮮鹿腿骨用紙包火灰內煨之以黃脆為度如黑焦色則無用矣為細末搽之生肌甚速

月白珍珠散 新肉已滿不能生皮及下疳腐痛並湯火傷痛 珍珠錢一 青紅花分五 輕粉兩一 為末搽用下疳腐爛搽脊觀

一用雞子清傾新瓦上曬乾取清為末搽用

五色靈藥 黑鉛錢六 溶化 水銀兩二 結成砂子枯白礬枯皂礬火硝各二錢 食鹽錢五 共炒乾研細入鉛汞再研不見星為度入泥固罐

內封口訂火三枝香不可太過不及冷之過宿取出罐口上靈藥其白如雪約有二兩為火候得中如打 紫者加硫黃五錢 黃者加

明雄黃錢五 紅者加黑鉛錢九 水銀兩一 枯礬兩二 火硝兩三 辰砂錢四 雄黃錢三 昇打火候如前

凡昇打靈藥確要炒燥礬必煨枯一方共用燒酒煮乾炒燥方研入罐。一法凡打出靈藥加石膏倍之和勻復入新罐內打香一枝任用不痛

生肌白靈藥 家傳秘訣歌 鉛粉易山鉛官礬易皂礬硝礬承不易火候亦如常同礬法封口法見四卷末

倒打靈藥法

先將硝礬水銀共研以不見星為度次用泥固罐子煨微熱入礬一角丈火煨化勿令起泡至乾又下一角少時又下至完入食鹽

少許慢火煨之礬枯成泥為度將罐倒合於平底大罐內以罐底高碗沿二指為度用紙條封口次用泥固二指許又次以沙填滿

以碗口平為度取碗生於大水盆內水與碗口平為則次取紅炭砌罐底四圍及底上煨一枝香去火冷定取出罐四旁及碗底靈

藥約有一錢五六分聽用此法始終全存慢火性燥有候

瘡不收口因於虛者須大補之外用人參珍珠等分為末搽之即愈 凡生肌藥必用人參湯浸過曬乾再用入乳浸過其功神捷

瘡雖收口而皮嫩外弱風寒者用小水煮飯乘熱盛碗內以絹帛罩之覆於患處蒸之三五次愈 瘡潰時候入毒水或誤入刺至骨腫痛者用皂角子七個大乾蝦蟆一個胡椒十五粒入鍋內瓦蓋文火煨烟盡取出為末先用溫水洗淨拭乾搽之膏蓋良久毒水盡出有刺者自見 一用黃丹蛤粉等分炒變色搽之 候入一切毒水及皂角水驢馬尿糞以致疼痛者用糯米粉砂糖各三兩生甘草一分為膏貼之毒水自出

馬汗入瘡腫痛者用馬鞭子取手執處燒灰存性為末和諸膏塗之或猪油和塗或用冬瓜陰乾為末

瘡久臭爛生蛆者海參為末搽之或皂礬為末搽之則蛆化為水 腎瘡繃縛法 已潰流膿時不論冬夏 絹帛四五層發膏上外用綿布見方八寸四角以蛇皮細帶貯之蓋絹上將帶紮在前胸繃

實瘡上庶暖氣不泄易於腐潰洗時預備二繃更換 內肉不合法 腐盡結膿痂時肉內不粘連者 軟綿帛七八層放患上以絹紮緊將患睡實數次自粘一片如生成者如患口未完搽

玉紅膏自平 傳西聖膏

治男婦小兒遠年近日五勞七傷左癱右瘓手足麻木遍身筋骨疼痛咳嗽 痰喘瘧疾痢疾痿痺疾走氣遺精白濁偏墜疝氣寒濕脚氣 及婦人經脈不調赤白帶下山崩漏并跌打損傷一切腫毒癰疽癩瘡結毒具爛筋骨疼痛不能動履者貼之悉驗

當歸 川芎 赤芍 生地 熟地 白朮 蒼朮 甘草節 陳皮 半夏 青皮 香附 枳殼 烏藥 何首烏 白芷 知母 杏仁 桑皮 金銀花 黃連 黃芩 黃柏 大黃

白藜蘆 枝子 柴胡 連翹 薄荷 藏靈仙 木通 桃仁 玄參 桔梗 白蘇皮 猪苓 澤瀉 前胡 升麻 五茄皮 麻黃 牛膝 杜仲 山藥 益母草 良姜

稿本 青風藤 茵陳 地榆 防風 荆芥 兩頭尖 羌活 獨活 苦參 天麻 南星 川烏 草烏 文蛤 巴豆仁 芫花紅白各 細辛 貝母 姜豨 大楓子 川山甲各

蜈蚣二十條蒼耳頭二十 蝦蟆七 白花蛇 地龍 全蝎 海桐皮 白芨 白欬各五 木鼈子兩

桃柳榆槐桑棟各搗七 血餘四兩 用真麻油十三斤浸之春夏三秋七冬半月日數畢入大鍋中慢火煎至藥枯浮起為度佳火片時用布袋濾淨葯渣將油稱準 將鍋展淨再用細絹濾油入鍋內要清淨為美投血餘慢火熬至血餘浮起以柳棒挑看似膏溶化之象方美熬熟每淨油一斤用

飛過黃丹六兩五錢徐徐投入火加大些夏秋炕熱每油淨一斤加丹五錢不住手攪俟鍋內先發青烟後至白烟重重旋起氣味
有靚者其膏已成即便住火將膏滴入水中試軟硬得宜如老加熟油若稀加炒丹少許漸漸加火務要冬夏嫩老得所為佳攪下
下鍋來攪煉烟盡加細藥攪勻傾水內以柳枝攪成塊再換冷水浸片時趁溫每膏半斤拔扯百轉成塊又換冷水投浸用時取一
塊銅杓內溶化攤用 細藥開後

乳香 沒藥 血竭各一 輕粉錢八 朝腦兩二 龍骨 赤石脂各二 海螵蛸錢五 水片 射香各三 雄黃兩二 右共為末

加入前膏內

五勞七傷偏身筋骨疼痛腰 痠軟無力貼膏育穴腎俞穴 痰喘氣急咳嗽貼肺俞穴華蓋穴膻中穴 左癱右瘓手足麻木貼肩

井穴曲池穴三里穴 遺精白濁赤白帶下經脈不調血山崩漏貼陰交穴關元穴 痢疾水瀉貼丹田穴 瘧疾男貼左臂女貼

右臂 普濟貼命門穴 疝氣貼膀胱穴 頭風貼風門穴 心氣疼貼中腕穴 走氣疼貼章門穴 寒濕腳氣貼三里穴 胸

腹脹悶貼中腕穴 噎食轉食亦貼中腕穴 痞疾先用麩作團圓疾塊上入皮硝兩許紙蓋熨斗熨熱去硝貼膏再慰出汗

中覺熱方止 跌打損傷及諸毒瘡俱貼患上

凡內外諸症貼之必用熱布熨之 疥癬疹癩等症貼臍上熨之出汗為度 血痕痞疾如阿魏馬齒莧膏各二兩貼之立應 但

阿魏化腐去滯須以水頻化傾入膏內離火按之煎去水氣次下細藥

凡油絹攤膏用雞子清漿過布攤膏用松香黃蠟塗過狗皮攤膏用水洗去硝氣油紙攤膏用甘草湯或加槐枝煮過攤用

衣棉紙法用杭州毛頭每參麵一斤加核桃大白礬一塊打稀糊量加小粉表之則軟白而且不廢

油油紙法用天麻子仁數粒鉛粉錢許研細入桐油梳許打勻棉花蘸刷令遍與不油紙相間鋪之壓之須頻揭換不粘 一以生

桐油熟猪油平克如法

調理須知

凡人無病時不善調理而致生百病既病之後若不加調養而病豈能愈乎其調治之法初起病者以先看病者元氣虛是次看瘡之
陰陽陰否然後用藥調治當攻即攻可補使補不可因循執誤以致變態不測也且患者又當安定心神相念諸念毋使惶惶乃保神氣
不得異變耳再順天時假如夏熱如坐臥不可當風忌置水於榻前床下冬寒須避起居常要溫和而非柴火不可開窗看視恐有浸寒致
生多變又未潰之先毒氣內作倘有口乾渴症者涼物必須少少與之以滋蘊熱至膿潰之後生冷硬物一槩禁之不然傷脾損胃膿必
難成致瘡軟陷又難收斂飲食須宜香燥甘甜飯粥隨其喜惡毋冷過飽宜少宜熱宜濃方無停滯又得易消化也如大瘡潰後氣血兩
虛脾胃並弱必製八仙羹早晚隨食數餅以補接真元培助根本又熬參朮膏如患者脾胃俱須飲食減少胸膈不寬飲食無味者用白

木膏三匙人參膏二匙清米湯空心化服喜飲者酒化亦可若精神短少昏沉多睡自汗勞倦癩癩於動作者用人參膏三匙白木膏二匙亦酒化服如肌膚粗澀面瘡不澤或大便血少虛秘以及皮乾髮槁同地黃膏各二匙和服或飲陽春酒更妙其功強健精神頓生氣血開胃助脾潤肌榮骨此二藥功甚非小大瘡不可缺也寔非草約可比病者宜信用之乃無更變虛視者又多反復不常故有易愈難愈之態寔在乎得此失此之規也。

雜忌須知

凡病雖在於用藥調理而又要關於雜禁之法先須酒掃病房潔淨冬必溫帳夏宜涼帳庶防蒼蠅蜈蚣之屬侵之一切僧尼孝服經事見行婦女及遠客生人開瘡之時俱當忌見牛犬腥醜臘薰藏之物俱能作渴生乾爪菓梨柿菓菜生冷等類又能損胃傷脾雞鴨羊肉蚌蛤河豚蝦蟹海腥之屬並能動風發痒油膩煎炒烹炙酸醜厚味各件最能助火生痰赤豈蒿芎動氣發病惱怒暴急多生痞滿飲食太過必致脾缺瘡愈之後勞役太早乃為羸症入房太早後必損壽不避風寒必生流毒不戒口味後必瘡痒無度大瘡須忌半年小瘡宜忌百日此誠為知命之君子也。

試知百病死生法

死生非神聖不能動其機關疾病無明醫亦不能決其凶吉匪則使人疑或決斷不常予異授呂祖一枝梅真仙方也不敢私秘一例刊註以傳奕世云。

呂祖一枝梅

治大人男女小兒新久諸病生死難定之間用藥如芟實大一餅貼印堂之中點管香一枝香盡去藥已後一時許藥處有紅斑色暈腫起飛散為紅霞棒日病雖危篤其人不死如貼約處一時後無腫無紅皮肉焦舊不變為之白雲漫野病雖輕淺終歸冥路小兒急慢驚風一切老幼痢疾俱貼之紅腫即愈此方用之可預知生死。

珠砂

錢三

銀珠

錢五

五靈脂

錢三

射香

分三

單麻仁

分五

雄黃

巴豆仁各五錢
右各研細於端午日淨室中午時共研加油胭脂為膏磁盒收藏勿經婦女之手臨用取巨大一塊捏為餅貼印堂中其功立見用

過之餅送入河中

分治部

癰疽之原委順逆治法已詳首卷今之分部位者為別經絡認穴定名色耳其症治不外乎首卷之提綱然間有稍異於總治者有崇治本症之方而即以此方各附於本症條下則開卷了然庶無遺漏紊亂矣

頭部

經絡 中行直鼻上巔屬督脈經又屬足太陽膀胱經傍開一寸五分為第二行是足太陽經再開一寸五分為第三行是足少陽經
頭角直耳上中亦足少陽經

百會疽在百會穴初起如粟次大如錢形似葡萄堅硬色赤寒熱痛楚 元氣弱者由熱毒上攻宜黃連消毒飲蟬酥丸貴金丸之類
元氣弱者由虛陽浮泛宜八味地黃丸引火歸源更以附子餅置湧泉穴灸五壯以洩其毒 若腫連耳項七日不穴神昏痰起者不

治

玉頂發穴一名佛頂疽生七星在百會疽之前由足太陽經風熱所致初起神授衛生散紺珠丹是寔者貴金丸虛者十全大補湯加羌活 潰而黑陷脈
大神昏二便閉者不治

透腦疽在透腦門之前形如雞子堅而硬頭痛如斫灸缺盆穴二七壯

侵腦疽在透腦門之前頭痛引目灸止支穴七壯二症初宜紺珠丹汗之次宜托裏散托之
額疽生當額或兩額前一名赤疽腫如桃李由陽明胃經積熱所致寔者貴金丸下之次以內托散托之潰者補之十日不穴潰而無膿出血者不

治

太陽疽穴在太陽穴勇疽狀如伏鼠腫連面目寒熱交加七日不潰毒即攻眼急宜貼破破慎風水犯則損睛屬陽明胃經治同透腦疽 十
一日刺得黃白膿者順清積黑血者逆

鬚疽生于屬于少陽三焦此經多氣少血最忌見膿多由肝胆怒火或因風熱血虛所致初宜神授衛生散柴胡清肝湯清之次以托裡
消毒散托之以速其膿膿成而致收斂時腎虛者六味地黃丸氣虛者補中益氣湯此症虛脈虛之治也若煩燥飲冷身熱脈大神昏

者臟腑寔也宜貴金丸所為瘡瘍寔熱不利者下之是也宜灸伏兕穴二七壯 此症雖屬少陽然脈症俱寔者隨其壯弱瀉以重輕
若守經禁而純投補劑非確論也 有未見瘡時先作渴症一年半載始發髮色紫瘡黑平陷堅硬無膿毒流耳項氣穢容枯神昏

不食者不治

天疽生左銳毒生右耳後俱天者妖變之物也屬肝木銳者鋒利之器也屬肺金二症起於謀慮不決火鬱而成生於隱微發於不測及

覺之特毒已入內矣 紅活高腫易腐易膿者順堅硬伏陷未潰先黑未膿先腐易生元氣易敗此毒氣內攻也為逆 微者加

味逍遙散越鞠丸托裡消毒散隨時增損甚者十全大補湯非倍用參附不能以回其陽

耳後疽耳後屬三焦經高腫有頭者順無膿軟陷者逆甚則噬腫頰痛肩肘俱疼初起者紺珠丹汗之熱甚者涼膈散清之已潰者如

潰瘍門托之補之

耳根毒耳根狀如瘦核不動而微痛屬胆與三焦二經風熱所致宜衛生散或加升麻柴胡或貴金丸下之弱者神效瓜蔓散托之因

怒而耳下腫者或肋痛脈弦緊者小柴胡湯加青皮紅花桃仁牛蒡子再寒熱加荊芥防風蓋肝者內主藏血外主榮筋怒則氣逆故

筋畜結腫若不自加調攝肝迷受傷連延結核再犯追蝕之約因而不斂不治者多

耳發耳輪初起如胡椒漸大如蜂房紫赤腫痛由三焦經風熱所致宜衛生散或加升麻桔梗壯者貴金丸汗之下之 出黃膿者順

出鮮血不食神昏狂燥者逆

五枕疽生於腦後發生在風池穴形如硬癩堅而難潰痛引項肩氣粗鼻塞此足太陽膀胱經伏陽結滯而成少壯者紅腫出白膿易愈

老弱者紫陷流黃水難瘥 寔者內疎黃連湯加羌活金銀花之類或衛生散貴金丸虛者托裡消毒散加升麻葛根酒炒黃芩梔子

之類兼服蠟卷丸有頭者刺之塗拔疔散無頭者以離宮錠子塗之或灸風門穴三七壯艾如菘豆大

腦鏢生於初起如橫太久之上至巔頂下至大椎未膿而皮先損或冷而木痛時流清水或熱如火燎痛如針刺黑如煙灶形如犬咬四

畔堅若牛唇靈樞經云陽氣大發消腦溜項名曰腦鏢煩心者死 此由陰精消固所致急用神妙拔根法視針以通其數內用十全

大補湯加大附子及八味地黃丸以回其陽宜與項部偏腦疽法及腦疽醫按奈酌之若攻補得法亦有得生者不可因其惡而棄之

頭部主治方

黃連消毒飲 治百會疽由膏梁之變者惟宜苦人禁用芳香等約服後忌飲冷水犯之作膿而効遲

黃連 黃芩 黃柏酒炒 人參 獨活 防風 藜本 甘草炙 甘草梢 陳皮 防己 歸尾

蘇木各五 知母酒炒 羌活 連翹 黃芪 歸身 生地各一 桔梗一錢 澤瀉七分 用水三盞煎盡半入酒少許再煎食後服

柴胡清肝湯 治髮疽初起毋論陰陽表裏俱治○川芎 當歸 白芍 生地 柴胡 黃芩 枝子 天花粉 防風 連翹 牛蒡子 甘草節等分 用水二盞煎八分食遠服

應用方

赤也頤腫而連及耳下者當清疎其肝火是耳下則屬手足少陽經也

時毒 初起狀類傷寒一二月間面鼻耳目赤亦腫痛甚則咽喉頸項俱腫由感四時不正之氣所致或結核有根咽喉閉塞至五七日

問神昏喉閉不食不出聲者不治若延至十日外者即不治而亦自能愈矣 症有陰陽治有汗下慎用寒涼兼用咬法 脈浮數者

邪在表也宜葛根牛蒡子湯脈沉實者邪在裡也宜內疎黃連湯脈沉澹者邪入深也宜漏蘆湯又自少陽經出者腫連耳下引以此

胡自陽明經出者首面大腫引以升麻葛根自太陽經出者腫連耳上引以羌活荊芥防風 表裡俱實者宜貴金丸然此症與膏染

積熱不同硝黃非大便秘實者勿用 脈洪數浮數者治宜內消衛生散脈滑數者欲作膿也治宜內托如托裏消毒散腫痛焮熱者

宜砭去惡血數以消毒等約如冬月患此其脈浮緊按之洪緩者 乃寒氣鬱熱也宜以苦發之辛散之如托裏溫經湯慎用針砭所

謂冬月閉藏用藥多而少針石也 鳳眉疽生于眉眉發形長如爪赤痛引腦二目合腫甚則堅痛色黑噁逆悶亂者危 屬手足太陽少陽四經宜灸陽谷穴七壯 六日

可刺得膿則減否則女子七日死男子二十四日死 龍泉疽生于手形小而異麻痺不時寒熱交作由伏陽攻於心肺虛熱注於三焦也 治如疔法 或灸百會穴七小壯

虎鬚毒生于地承漿疽名類癰由陽明胃經積熱所致壯者貴金丸下之涼膈散加升麻葛根羌活防風清之 或灸百會穴七小壯

面部主治方 犀角升麻湯 治頰瘍並治唇口頰車鬚髮巔額等處腫痛諸症 犀角二錢升麻一錢羌活二錢防風 川芎 白芷 白附子

清陽散火湯 治骨槽風 牛蒡子 防風 荊芥 薄荷 黃芩 龍胆草 黃連 水煎食遠服

升桔湯 治骨槽風並咽喉耳痛 升麻 桔梗 昆布 連翹 射干 甘草等分 水煎食遠服

葛梗牛蒡子湯 治時毒脈浮數者邪在表也 升麻 葛梗 牛蒡子 麻黃 連翹 玄參 桔梗 甘草等分

雙解散消毒散 治大頭風脖子腫 黃芩 枝子 連翹 薄荷 甘草 大黃 麻黃 羌活 白芷 防風

托裡溫經湯 治時毒在冬月脈浮緊者宜服 麻黃二錢防風二錢升麻四錢葛根二錢歸身二錢蒼朮一錢人參一錢白芍一錢甘

草五分 水二盅先煎麻黃令沸去沫再下餘約煎一盅溫服蓋被俟汗出則腫自消

立消散 治大頭風頭面虛腫如泡 草烏一兩白朮 甘遂各一小良姜三錢甘草三錢射香一錢 為末用蒼耳根汁和醋調勻

立消散 治大頭風頭面虛腫如泡 草烏一兩白朮 甘遂各一小良姜三錢甘草三錢射香一錢 為末用蒼耳根汁和醋調勻

立消散 治大頭風頭面虛腫如泡 草烏一兩白朮 甘遂各一小良姜三錢甘草三錢射香一錢 為末用蒼耳根汁和醋調勻

立消散 治大頭風頭面虛腫如泡 草烏一兩白朮 甘遂各一小良姜三錢甘草三錢射香一錢 為末用蒼耳根汁和醋調勻

立消散 治大頭風頭面虛腫如泡 草烏一兩白朮 甘遂各一小良姜三錢甘草三錢射香一錢 為末用蒼耳根汁和醋調勻

雞翎蘸掃腫處立消

搐鼻通氣散 治時毒喉腫咽喉不利者用此取嚏以瀉其毒○玄胡索 玄參各三牙皂 川芎各一細辛 藜蘆 草烏

錢一 關羊花_六 為未用紙蘸藥約送入鼻內取嚏為度每日三次以嚏出膿者必愈無膿者不治

清涼消毒散 治面發毒○天花粉 白芨 黃柏 山慈姑 烏約 雄黃 乳香 麝香 右為未用雞子清和

蜜水調敷

火醋錠子 治面上熱瘡身上熱癩 大黃用醋浸晒九次和為錠火酒調塗

黑牛散 治疥癬初起壯寔者○黑牽牛_兩 提碎米醋二盞煎一盞露一宿空心溫服

二金散 治金腮瘰癧透腮頰者○麝金 雞內金等分 為末先用鹽湯盪潔淨擦之

蒸法 治金腮瘰癧毒疥腮久不合口而成漏者

用麵作井圍圈粘瘡口勿令漏洩次揆護心散於瘡口內再次入藥油於井內令滿用紙條做捻燃之初用一條加至三四條預用絹

帕膠臉以防油爆蒸至好肉方痛根有幾處則痛有幾處至大痛時以水濕紙滅燈勿令口吹俟痛稍止再燃如前以油乾為度去麵

井用地骨皮煎湯一碗布蘸湯滴於瘡口內以滴湯盡為度用藥約數四圍以珍珠散揆瘡口內黑膏蓋之俟膿乾時加象皮末收口

內服托裡等約

護心散○雄黃三錢 珍珠二錢 血竭二錢 乳香 沒藥 兒茶 象皮 龍骨 赤石脂_{各錢} 射香 冰片_{各五} 共為

末聽用又於蒸洗時服三五分立能止痛

約油方○黃連 黃柏 連翹 當歸 芍藥 生地各五 用香油一盞文火煎枯絹濾渣聽用

數約方○姜黃 雄黃 大黃 黃柏 黃連等分 為末米醋調敷四圍

面部應用方

神授衛生散 紺珠丹 托裏消毒散 內疎黃連湯 十全大補湯 貴金丸_{俱見}

蟬酥丸 拔行散_{俱見} 永礪散_{見喉} 漏蘆湯_{見腫} 灸法_{見首卷} 黃連救苦湯_{見項}

頸項部

經絡 項之中屬督脈經項之旁入筋中屬足太陽經大筋之旁耳之後屬手少陽經耳之下屬足少陽經頰下屬于太陽經頰前

一寸屬手陽明經扶喉兩旁屬太陽陽明二經 項疽性干項之項中疽俗云對口為與口相對也屬督脈經盛陽之火 焮赤腫痛者易治根大堅硬者難療平塌神昏者死 初起脈

交三卜斗人氏

洪數有力者紺珠丹衛生散貴金丸梅花五氣丹黃連救苦湯俱可選用并隔蒜灸之或灸天宗穴七壯艾如菘豆大 已成者解毒
天漿散托裡消毒散已潰者大小保安湯以補元氣加減地黃丸引火歸源外兼敷治或灸神闕穴二七壯 此症有頭尾頭向上尾
向下形如蜂窩者防毒氣攻心蝕腦又忌見風風入發搖者難療若癩癩毒流兩肩者鮮血暴湧者腹脹謔語者俱不治

臥蚕疽生對口之上
天柱骨之上

治間腦疽

天柱疽骨之間形陷色黑多痒由五焦經構情所致初宜衛生散壯者貴金丸弱者神効瓜萼散已成者八珍湯加柴胡香附及遠志酒

甚者肩背拘急嘔逆惡心宜隔蒜灸之以痒止為度或明灸之灸而有泡者順無泡者逆服汗劑得汗可治無汗難醫靈樞經云失

治則熱氣下入湖腋前傷任脈內黃肝肺十餘日死所以神昏嘔噦血不止者不治

偏腦疽疔對口屬足太陽膀胱經溫熱所致蓋太陽經所司寒水起於顛頂貫項兩旁而順下多冷多沉故多平塌堅硬難潰又易流注

初起未成七日以前者用拔針當頭點入知痛處方止出其惡血通其滯竅插蟬酥條直至瘡底每日二條外用膏貼三日後加添

圍裂縫有膿方住插約輕者九日後脫出或腐化重者至十三日其根自脫如期根深蒂固不能脫者披針取之外貼玉紅膏內服大

補之約托之誠轉重就輕移深居淺之良法也如不腫不疼亦不痛者尤宜此法治之若前腦疽陽症則不用此法

魚尾毒生於後髮際際間在偏

治同偏口出血氣喘痰發者難治

百脈疽 腫透頸項疼痛身熱不食上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五日可刺見膿者順見血者逆

鎖喉毒 頸項忽然腫痛如失枕之狀久則紅透肩背堅硬難消 由肥人善飲風熱外侵所致 治宜清暑疎風

結喉癰生於喉一名猛疽屬任脈及手太陽少陰三經由憂憤所致宜黃連消毒散 衛生散 靈樞經云膿不瀉則塞咽半日死故宜針

之出毒服補托之劑雖潰通流出湯水者亦愈 一灸少海穴七壯

氣癰生於結喉

夾喉癰生於上下

二症治同結喉癰 一灸靈道穴七壯

黃連救苦湯

項部主治方

腦疽發鬚發頤及天時毒 初起增寒壯熱頭面耳項俱腫服之未成者自消已成者速潰

黃連 黃芩 柴胡 升麻 葛根 連翹 桔梗 川芎 歸尾 赤芍 羌活 防風 金

銀花 甘草節等分 用水二碗煎八分入酒一杯食遠熱服

解毒天漿散

腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心煩渴六脈沉寔大便閉結不通者並宜服之

石決明碎 姜蚕 川山甲 防風 連翹 金銀花 羌活 乳香 黃連 當歸尾 甘草各一錢

大黃三錢 天花粉用新鮮末 腦者四兩石向內推 爛投水一碗攪勻取汁去渣用 右將花粉汁碗半同藥煎八分入酒一杯空心熱服行三次方用飲食忌

煎炒發物

迴毒銀花散 腦疽及諸發陰瘡不起色變紫黑者金銀花二兩黃芪生用甘草生用細酒二十兩同約入小口砂罐內蜜封重湯煮三柱

香為度取起瀉清服之蓋煖患上其瘡漸漸高腫此轉陰為陽吉矣後用托裡約膏膿如服後不痛不起瘡頭流出黑水者為真陰不治

梅花五羔丹 腦疽發背諸般疔腫初起寒熱交作筋骨疼痛有似傷風惡心嘔吐但未成膿者並宜服之○梅花水片一錢 射香用

門子 辰砂水飛 輕粉各一錢 瓜兒血竭 乳香 沒藥 明雄黃各二錢 真蟬酥端十日取四錢 用男乳調膏 右藥各研細末對准分數於

端午日辰時製至午時向日為丸如茄子大一時晒乾用川椒二十七粒燈心二十七段同約收確內養之黃蠟封口勿洩氣每用時

先食美饌令飽用無根水漱淨口再含水一口少傾待溫用葱白五寸同水嚼爛嚥下隨將約餅一枚放舌下睡於煖處被蓋約化苦

水徐徐嚥之瘡勢大者二三餅亦可約盡其汗即到如淋諸病若失如冬月天寒難汗噲後將葱湯催之即汗 如暗疔人所不及觸

者及覺而失治者毒氣入裏人便昏沉一中便倒不能依法服約急用連翹葱白七根煎酒一杯研約五餅灌下約氣到心其功如湯

發雷患者即時甦醒誠外科之奇方也不可忽之

大保安湯 腦項諸發癰疽惡瘡大毒已潰之後膿水出多氣血虛弱精神短少飲食不思坐臥不寧煩燥不眠晝則安靜夜則發熱及

虛陽煩渴等症○人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 白芍 熟地 山藥 山茱萸 牡丹皮 五味

子 黃芪各一錢 熟附子 肉桂 麥門冬 甘草各五

用煨姜三片大棗二枚蓮肉七個水二盞煎八分食前後服

腦疽灸法 用騎竹馬法灸之

一法用線橫量人口至兩角為則次用線以黃蠟拖過從患人項上垂下至兩乳頭為則剪之復從患人頸上住後自項垂下貼脊比

齊線盡處為則以墨記之再將先比口之則於墨記處兩傍各橫開一則盡處是穴以墨記之用艾於兩旁穴上各灸三壯或五壯其

毒自痿而不大發徐徐而愈一災氣海穴二七壯三里穴各五壯

頸項部應用方

紺珠丹 衛生散

貴金丸

托裏消毒散

加減地黃丸

絳珠膏 俱見首卷

黃連消毒散 頭部 蟬酥丸

蟬酥條 見方門

敷貼藥 首卷 參用

灸法 見首卷 灸門

腦疽治驗 一人項疽十餘日勢甚根連耳項紅腫焮熱脈浮而數用黃連消毒散二服大勢稍定次用托裏消毒散數服不能腐潰脈

浮無力此為元氣損傷止能起發不能為膿易十全大補湯加桔梗白芷倍參各三錢外用桑柴烘法早晚二次烘之貼紺珠膏數日

患者頭面俱腫雙目合縫形狀可畏然後腐潰並作膿出日至數升將及半月加五心煩燥飲食少思此補力不及所致雖變無妨用聖

愈湯一服不應又進一服如熟附子二錢方應前症悉除次以人參養榮湯加麥冬五味子參朮倍至三錢月餘後腐肉連髮片片脫下

狼狽不堪又恐補不及事每日粥食中用人參三錢凡餐分入同煮食之後元氣漸醒調理四月方瘥

一人生偏疽隔蒜灸十五壯知痛乃住失用內約又四日紫腫木痛便秘脈實以內疎黃連湯加玄明粉二錢通之次用消毒救苦湯二

服腫勢仍甚此內毒外發不可再消換托裏消毒散至二十四日固患者體肥肉多蟹不作腐潰欲行針開放彼堅執強阻後煩悶昏憤

人事不醒乃變症出也隨用披針左右耳邊並頂中各開一竅內有膿腐處剪割頑肉寸許放出膿血碗許服健脾養血大補之約膿似

泉流每朝夕約與食中共參六七錢服至腐化新生又四十日外患者方得漸醒始知人事此症設若禁用針刀不加峻補而得生者

一人項疽五六日瘡根平散又至五日外瘡勢堅硬根脚開大毒氣已過兩肩流注前項胸乳皆腫嘔吐惡心寒熱不食形勢可畏此時

非藥力可及也先用葱湯洗去舊約煮拔筒拔提二處出瘀血碗許隨用銀針斜斜插入根脚透通患底數處以蟬酥條插入孔內最能

解毒為膿總以膏蓋之其走散處以溫藥敷之日漸日消毒收原處黃腫內托降火化痰之約三四日大勢已退內膿已通換服十全大

補湯凡堅而不化者照之腐而不痛者取之新肉生進者培之如是調理三月方瘥

一掃年六月素稟怯弱症頭如粟喜其形體不肥雖發之逆後必易潰先隔蒜灸之次以蟬酥餅貼灸上四邊以吸毒散敷之收其根內

服托裏消毒散數服瘡勢堅硬苦於痛芟子為脈細數而無力此內虛之故不能解毒為膿為要換益氣養榮湯加刺白芷三服

腫亦漸起用桑木烘法臥而漸軟膿出稠而不多前方去皂刺白芷加香附倍參芪又數服膿潰潰後痛亦不止再三日腐肉將脫小半

用乳香定痛散一服疼痛退除數十日完口 此法要在眼力精巧量病易難腐新遲速補助有無用藥各式然後相量日數並皆決之

於前發之必中

一婦壯年體胖項生疽頂高根活彼欲內消予為約消不能針消則可取披針當頭針入六七分至軟肉方任去瘀血插蟬酥條服蟬酥

丸得大汗而解次日瘡出微膿漸消再服消毒清熱之約不出十日而安大凡欲消瘡毒先斷根本次瀉毒氣使毒日衰無致內攻為訣

一人耳後生疽將半月根脚漸大瘡頭血水穢汚四邊紫黑軟陷無膿面慘鼻燥手冷氣促脈散大無根此內敗症也不治果卒但犯此症雖山岳之軀一敗無不傾倒

一掃對口自灸念餘壯不痛灸死焦黑平陷如故脰之脈微數而無力此內虛症也若假約力則悞其事用披針當頂刺入寸許不知痛亦無血此毒滯而未發也插蟬酥條以膏蓋之每日一次七日後周圍裂縫出膿內服補劑至十四日根脫捺絳珠膏又半月口平搽珍珠散生皮而愈此症不用針攻專假約力雖不至死豈能得其速愈哉

一婦年四旬肥甚患項疽五六日視之肉腫瘡不腫乃頂陷也又兼口燥心煩此邪火堅硬紫暗此血死毒薄故不作膿清也根脚散平為真氣內敗六脈洪大為毒氣騰正氣也此太過之症後必無膿軟陷內攻而死辭不治後果效

瘰癧

瘰癧 結核於頸前項側之間小者為瘰大者為癧連續如貫珠者為瘰癧始起於少陽經次延及於陽明經頰車等處再久之則延於缺盆之下形長如蛤色赤而堅痛如火烙屬三焦經名曰馬刀又甚於癧也此由三焦肝胆三經怒火風熱血燥而生或肝腎二經風熱虧損所致 功起寒熱燥痛者此肝火風熱而氣病也用小柴胡湯加胆草枝子芍藥當歸因怒腫痛或發熱者用小柴胡湯加青皮木香桃仁紅花若寒熱止而核不消者此肝火燥而血病也用加味逍遙散以清肝六味地黃湯以滋腎如肝脈弦緊腎脈洪數者由腎水不能生肝也用補中益氣湯六味地黃丸以滋化源如痰盛痞滿右關脈弦者此脾土虛而肝木乘之也用六君子湯加芍藥次仍用補中益氣湯至將潰已潰用神效瓜蔓散益氣養榮湯間服之如潰之膿清者須大補之 機云此不因膏梁丹毒火熱之變由虛勞氣鬱之所致治宜補氣開鬱結調經脈瘡自消散不待汗之下之而自愈也是以始終之治惟以補氣血以滋化源慎用追蝕悍爛等約雖然若至膿稠時必用追蝕等約一劑癧毒去而瘡口自斂諸癧已消惟一核尚存者必用追蝕約一服其核自消若氣血壯而脈沉寔者即用追蝕約一服毒一下隨服補劑調理益瘰癧之毒莫不有根地胆盤毛製度有法能使其根從小便中出雖曰悍爛能助王道之治相濟成功是在治者神而明之變而通之然非緊用之通論也獨婦人患此者居多益因其性急躁其氣佛鬱其心執滯而然也若小兒則內無七情所干是由外受風熱氣血相搏所致忌用燥毒等約宜大聖散連翹丸天竺黃丸調其內並兼外治自然獲效有嬰兒落草時項間即有三五枚者緣兒於胞中其母多怒兒稟其氣所致當治其母用約同前 書有風毒熱毒氣毒之異瘰癧筋癧癧之殊者俱發於項而相似惜乎未詳予為癧由內傷所致其形小其發緩無疼痛計以月年毒由外感所致其形大其發暴多腫痛日不待時為異耳治癧則從本門調理治毒則於項部門參考

以形而言之生左耳根名蜂窩癧生右耳根名患袋癧遇怒即腫名氣癧核痛紅腫名血癧筋縮如貫珠名筋癧小而多疔名風癧遠項生者名蛇盤癧頰紅腫痛名燕窩癧延及胸腋者名瓜藤癧延及遍身紅活易潰者名痰癧生乳旁兩膻軟肉等處名瑛瘍癧灌注四肢

遍身自潰相穿者名流注癰已上諸癰推之動為無根屬陽俱兼外治如後方針灸敷貼蝕腐吸膿等法是也膿稠者易膿清者難治無膿者不治 獨生一個在顛門者名單高癰一包十數個者名蓮子癰核上堆核者名重台癰堅硬如磚者名門門癰形如荔枝者名石癰如柱木者名木癰如黃豆結鑿者名鎖項癰如單形者名單癰已上諸癰推之不動為有根屬陰皆不治之症也切忌針砭及追蝕等藥致難收斂 按右症宜究其原施其治稽其形命其名從本引末針灸隨宜方能獲效非易易也

瘰癧主治方

加味小柴湯 治肝胆二經部位熱毒瘰癧及一切瘡瘍發熱潮熱並小腹痛脇股結核癰癧便毒或耳內耳下先瘡

柴胡 黃芩炒各錢八分 半夏 胆草 枝子 當歸 白芍各錢二分 甘草六分

用生薑三片水二鐘煎八分食遠溫服

加味道遙散

治婦人血虛五心煩熱肢體疫痛頭目昏重心忡顛赤口燥咽乾發熱蓋汗食少嗜卧及血熱相搏月水不調寒熱如瘧臍腹作痛並治室女血弱榮衛不調痰咳潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸等症

當歸 白芍 白朮 茯苓 柴胡各錢一分 薄荷五分 甘草六分 丹皮七分 香附八分 有熱加黃芩五分 生薑三片

紅棗二枚 用水二盅煎八分食遠溫服

加味八珍湯 治瘰癧虛弱者其驗 ○白朮一錢五分 人參 茯苓 當歸 川芎 白芍 熟地 陳皮 貝母 桔梗 何首烏 射干各錢八分 連翹錢 玄參錢 金銀花錢 夏苦草二錢 山慈姑 射干各五分

用水二盅酒一盅煎八分卧時服

家傳消癧丸 ○天花粉搗爛水浸三日取 萊豆粉四兩用鮮荷葉蒸過 香附米二兩童便浸 貝母一兩 茯苓一兩 白朮一兩 柿霜四兩 牛皮膠三兩 牡蠣兩 百合 山茨菇 杏仁各二兩 細茶 粉草各一兩 青黛錢六 硼砂錢三

白礬二兩 右為末煉蜜為丸菜豆大每日二服每服二錢俱白滾湯送下

消癧單方 用蛇遊草南人呼為過山龍北人呼為娘娘拳頭即首草苗也別名地蘇木秋月採梗葉冬月取子每二斤浸乾燒酒十斤入磁罐內封口重湯煮三香埋土內七日取酒早晚飯各一二杯未潰者即消已潰者速愈

又方 ○甘草四兩 生薑四兩 取汁二味入四料南酒瓶內取白花菜汁即射干搗爛絞汁 入瓶以瓶滿為度封口重湯煮一香取出去渣食

後服二服即消

瘰癧後根方

盤毛七個去頭足並翅同糯米炒以用雞蛋一個鑽一孔用銀箸攪勻入盤毛末於內再攪勻另取雞子殼補口綿紙粘固再用粗絲

包七層水濕透聽用取土茯苓大者名為切肩有毒故不用如菜猪肉半斤煎湯聽用 於五更時將約膏用粗糠火煨熟乘熱食之

以前土茯苓肉湯送下三日後小腹脹痛以益元散推之如尚未利再飲熱水催之毒根從小便下形如圓眼如爛肉其根下其癰自消甚驗或以木通滑石青礬之類導之青礬善解盤毛之毒

瘰癧灸法 宜灸肘共七壯三次除根 一灸金門穴二七壯 一灸脊十一椎對臍是穴灸九壯 陵漢章用川山甲炒盤毛等和艾

為炷黃豆大於患處隔蒜灸之或明灸之 子用陽燧鏡子於核上灸七壯貼紺珠膏出水些須其核即消 馬刀堅硬如石痛引頸

項者灸劍巨穴三七壯 凡灸後其核不消者須塗蝕藥以除其根腐去其核方能枚口如三品一條鎗貴金鏡子之類

瘰癧散藥 用獨核肥早子擇新到者用好醋浸一宿次日文火煮透搗爛如泥聲腫處發微腫微痛漸消

瘰癧吸膿法 治瘰癧久潰淋漓不能收口先用木綿做團圓熟瘡口次用小鍋葫蘆或竹筒要三個聽用取乾燒酒斤半大黃兩煎滾

傾入葫蘆內浸滾水中煮酒滾即傾出急合於瘡口上吸取其膿少時取起又將別個葫蘆焯樣合之如式輪流合吸五七十次以見

鮮血為度次用絲綿燒灰敷口自愈其相連未潰者經此一吸亦隨而愈矣

洗瘰癧方 破爛頑腐久不收口者 蘇油煎滾乘熱用棉裏指去鹹油熱抹患處十數次次用生肌等藥 一用雄黃白礬硃砂各一兩

真阿魏六錢為末每用三五錢沖滾兩大盞洗之

搽瘰癧單方 陳年醬瓜蒂隨瘡口大塞之極痛須忍之半日取出瘡自乾愈 一用猪胆汁加輕粉末少許令勻不時塗之瘡痛流黃

水久久乾愈 一搗馬齒莧敷之一取葛條燒存性為末香油調敷

三品一條鎗 治瘰癧疔毒發背腦疽等症○明礬二兩白砒一兩共為末入小罐內炭火煨紅青烟盡白烟起片時約上下通紅住火置

地上一宿取出約有淨末一兩加明雄黃二錢乳香二錢共為細末厚糊調稠搓條如線陰乾凡遇前症有孔者緝入孔內無孔者先

用針放孔早晚插約二次插至三四日後孔大者每插十餘條至七日患孔約滿足方位以後患處四邊裂開大縫共至十四日前後

其疔核瘰癧痔漏諸管自然落隨用對症約數條球膏生肌

白龍膏 貼瘰癧立愈○蘇油二兩大附子二兩川山甲片杏仁粒五十槐白皮一片浸十餘日蝶枯去渣入血餘一團蝦蟆一個 白花蛇一條

徐徐煎化再渣渣淨入飛黃丹十兩成膏加乳香沒藥各二錢

紺珠膏 瘰癧已潰未潰見卷首膏藥門 原膏內倍用阿魏射香再加蟬酥銅綠

大聖散 治小兒風毒瘰癧癩疹風丹○羌活 升麻 薄荷 防風 荆芥 玄參 黃芩 大黃 甘草

或加連翹等分水煎服

連翹丸 治小兒瘰癧○連翹 獨活 桑白皮 白頭翁 丹皮 防風 黃柏 淡豆豉 肉桂 秦光各

錢海藻一分為末蜜丸用燈心湯下

天竺黃丸 治小兒身熱咳嗽氣喘痰壅並急慢驚風今取之治瘰癧瘰核其功甚捷 南星 半夏各二 天花粉 貝母各

兩合一處用姜湯煮過炙乾為末煉蜜丸用燈心湯送下

石疽

石疽疔腫 疔堅硬如石皮色不變由滯寒客於經絡氣血結凝而成初起者用艾灸之至五七十壯方止次以黍飯石膏貼之漸漸求愈非

若失榮之頑惡也

失榮症

失榮症生于肩項耳 初起如瘰核日久漸大堅硬如石推之不動按之不移一年半載方生陰痛氣血漸衰形容削瘦破爛紫斑滲流血

水或加芫蕪葉多穢氣愈久愈大越潰越堅此由先得後失六欲不遂墜癩失道麟火凝結而成乃百死一生之症宜內服和榮散堅

丸外貼飛龍阿魏化堅膏雖不獲全愈而不致夭亡誠緩命之至約也

和榮散堅丸 治失榮症堅硬如石不熱不紅漸腫漸大者○當歸身 熟地黄 茯神 香附 白朮 人參 橘紅各二

貝母一兩 南星一兩 遠志一兩 酸棗仁一兩 柏子仁一兩 蘆薈 角沉各一兩 龍齒一對 如無用鹿 牡丹皮一兩 硃砂六錢 右為末煉

蜜為丸桐子大每服八十九丸食後用合歡樹根皮根湯送下更須改往從新澆薄安命其中有得愈者十中一二否則難脫然也

飛龍阿魏化堅膏 治失榮症及乳岩癰瘤瘰癧結毒初起已成但未破者用此貼之

用蟬酥丸約末一料加金頭蜈蚣五條炙黃 去頭足末 研勻用西聖膏見首 二十四兩頓化入前末約攪勻以紅絹攤貼半月一換輕者漸消重

者亦可停止常貼可以保後無虞

背部

經絡 脊之中行屬督脈經脊之兩旁各間第二行第三行俱屬足太陽膀胱經

上發背生天柱 骨之上 一名脾肚癰其形橫廣如肚屬足太陽脾經由膏梁積熱所致視其高腫鮮明根脚不過兩肩者順腫平堅硬漸大漸開

攻注兩肩胸項者危紫黑平塌下陷者死 初起宜解脾經之積熱間服蠟蟻丸護心散以防內攻已成者必用托裏為主何則所為

托裏則生敗毒則死也

中發背對心 一名對心發由心火妄動熱極而生腫不高穴難起發此為毒刻君位最易傷人若前心有紅暈者不治宜大降心火急

疎瀋熱預用針通隨行拔法務使毒氣內外疎通各從門出庶不內攻方為成守保至十五日後內無變症得膿為解如是期變症漸

生堅硬漸大不作膿者死在二十二期先後若早治十中可保三四

蓮子發突如蜂窩發孔似蜂房二症生於肩顛髀骨或脊或心俞心包等處輕者形長而高腫或偏半背重者形斜而平塌兩脇俱傷又名半

身發甚至形長勢大腫潰半身則名竟體發也

上搭手肩膊動處一名左右串左屬肝右屬肺由痰凝氣滯火鬱而生初宜紺珠丹汗之次以逍遙散清之兼以六鬱湯調之漬以八

珍湯補之所謂禱者開之滯者行之也禁用瘡科攻利等藥 灸會陽穴二七壯

中搭手近清屬足太陽膀胱經治分陰陽虛實攻補隨宜 灸心俞穴七壯艾如菘豆大

串疽生背脇間三四處皮色不變或見微紅痛必牽引內窠相通故又名老鼠攢又名遊走血脾癰也由積憤所致

陰陽二炁疽 其形時腫時塌時乾時堅寒熱不時只在一處非若串疽之攻擊也由七情內熱所致

酒毒發 初發如彈次大如拳堅硬如石麻木不常甚則痛徹五內遍身拘急二便瀯滯數日後頭面手足虛腫臍漏利

連珠發 連腫三五塊形若貫珠內則百節皆疼小腹脹小便閉陰囊腫由酒色過度所致

丹毒發 初生細癩浮淫尺餘形如湯火所傷由服丹石悍燥之藥所致必多發渴治如蠟卷丸國老膏乃要藥也如色黯神昏脈燥腹

肢嘔逆者不治

禽疽 治發紫色如疹數十塊形如拳打如七日內寒熱口燥者不治

按右諸症發出則生內陷則死形雖甚長雖老弱每能多生形小異常即少壯亦能致斃所為大規只怕不純陽治法何妨瘡勢惡

痰注發 形如布袋堅硬如石不紅不熱此由伏痰風火而成

黃瓜癰 形如黃瓜一名肉龜皮色不變疼痛引心四肢麻木右二症多不可治

夏月暑瘍 凡癰疽之症發熱有時為疔甚而旦土也因暑而得者則發熱無時為晝夜不止也然必見暑症如頭目眩暈口舌乾苦心

煩背熱肢體倦怠是也外形初起背有紅暈次發腫疾治宜敗毒散如香薷黃連石膏等藥以清之暑 熱解則腫自消矣壯實者用

槐花末蜂蜜拌成塊黃酒調服亦佳

瘡疽 因胃山嵐障氣積久而成始發黑腫色若靴皮頑痛徹骨按之如石至五七日勢方浮腫色始變青形如拳打寒戰如瘧然必見

風候如頭動口偏手足厥冷是也治法宜急破之出清血三五升方有黃膿白汁相合而出其皮不漫仍前脹痛直至色退其勢方瘳

惟在急迫膿毒出外則無害矣

產後癰疽 夫產後宜扶虛消痰大補血氣總有諸疾以未治之今患癰者由瘀血凝滯也宜生化湯加連翹 一錢 花粉 一錢 甘草 八分

惡心煩燥加乳香 一錢 菴豆粉 三錢 和服忌用敗毒攻利等藥

校正外科大成 卷二
生化湯○當歸八錢 川芎四錢 甘草四分 姜炭四分 桃仁去皮尖研用水碗半煎六分加無灰酒少許和服

背疽總論

夫疽之發於背也在脊之正中為真脊脊在脊之兩旁者為搭手其名雖多惟辨其陰陽為訣耳原委症治已載首卷而瘍科獨運於背疽者蓋以背為足太陽膀胱經乃六經之首領乃督脈經之所主乃十二經之統脈也所以發於背也多險今則復加詳焉

初起腫赤痛甚脈洪數而有力熱毒之症也易治 漫腫微痛色黯作渴脈洪數而無力陰虛之症也難治 不腫不痛或漫腫色黯脈微細此陽氣虛甚也尤為難治

一初起未發出而寒熱痛癢作渴飲冷此邪氣內蘊也宜衛生散 口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也宜托裏消毒散 飲食少思肢體倦怠此脾胃虛也宜六君子湯如未應加以姜桂其有死者乃邪氣盛真氣虛而不能發出也在於旬餘之間見之

一已發出用托裏消毒散而不腐潰急宜溫補脾胃如不應有死者乃真氣虛不能腐潰也在二旬之間見之

一已潰用托裏脫腐生肌如色不紅活瘡口黑暈大而不可收者乃脾氣虛極而不能收斂也在月餘間見之 寬則漏虛則痺此陰症陽症之分也惟宜大補陽氣庶可挽回不發者不治潰而不斂者亦不治 不腫痛不寒熱脈沉微乃脈病而形不病也忌之 色黯漫腫作渴便數尺脈洪數者腎水涸也當毀於火旺之際 疽發於髀脾經絡交錯皮薄骨高之處難醫

一初發頭痛寒熱拘急者表症也用紺珠丹服葱湯化服汗之如焮痛以金銀花散或槐花散清之 一腫焮作痛寒熱作渴飲食如常者此形氣病氣俱有餘也先用神授衛生散清之次用托裏消毒散解之 如腫焮硬痛脈寔者貴金丸下之 腫硬悶痛發熱煩燥飲冷便閉脈沉寔者用內疎黃連湯貴金丸導之欲作膿者用托裏散蠟礬丸外兼敷之

一背疽因開違迨二日重若負石熱如焮火痛楚倍常脈沉數而有力者此青梁積熱之變也時雖嚴寒急用清涼飲子加黃連兩許作一服利二三行痛減翌日再一服痛止次則隨症調理數日而愈此經為有假者反之雖遲其時必從其症也

一漫腫微紅微痛食少此形氣病氣俱不足也用托裏散調補之 不作膿或成膿不潰為陽氣虛也用托裏散倍加肉桂參芪 膿出而反痛或膿清稀者此血氣俱虛也用八珍湯 惡寒形寒或不收斂者陽氣虛也十全大補湯 晡熱內熱或不收斂者陰血虛也

參朮四物湯 欲嘔作嘔或不收斂者胃氣虛也六君子湯加炮姜芍歸 食少體倦或不收斂者脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏 肉赤而不收入者血熱也四物湯加梔子連翹 肉白而不收斂者脾虛也四君子湯加木香酒炒芍藥小便頻數者腎陰虛損

也加減八味丸 遍身作痛者榮衛虛也十全大補湯

一癰瘍嘔逆傷寒於胃也溫補之使榮衛充而氣血周貫則毒隨膿出嘔自止矣者易生肌 一癰痛甚咳逆十餘日水穀不下脈伏如絕者用四君子湯加姜桂三進而瘳

一腫而不潰脹大而浮甚陽氣虛也宜托裏散倍加參芪 內熱作渴脈洪大而鼓指此虛火也前方更加肉桂脈症頓退仍用托裏藥而瘥

一中央肉死此毒氣盛而脾氣虛也用玄珠膏塗之大使不通此胃氣虛而腸不能傳送也小便赤濁此脾土虛而火下陷也雖曰難治惟大補之朝用補中益氣湯夕用加減地黃丸料

一瘡口出鮮血由脾虛不能攝血也宜十全大補湯加陳皮半夏炮姜

一瘡口不斂用托裏藥罔效者約力不及也須用人參五七錢外加附子服之精神頓爽手足自溫不旬日而口合 瘡口不斂脾虛也咳嗽不止肺虛也法當補之書云補可去弱人參羊肉令每日食之不徹旬餘而瘡斂嗽止 瘡口不斂喉腫發熱口乾體倦小便赤

瀉脈洪數而無力用十全大補湯加麥冬五味子補元氣引火歸原而脈症更甚此藥力未能及也再劑頓退却去肉桂數劑而瘥

一背疽不起泄瀉作嘔食少肢厥脈息如無此陽氣虛寒也宜大補藥約加桂附而不應者再加附子二劑而瀉愈甚加用大附子一枚姜桂各三錢參芪歸朮各五錢作一劑服之腹內始熱諸症悉退

一背疽服十宣散之類更加喘渴內熱脈大而無加用補中益氣湯加酒苓麥冬五味子而愈 一背疽服五香十宣等不應更加嘔逆不睡且其素有淋症予以參芪歸朮膏用牛膝煎湯入悍瀝飲之則淋止而思食約盡四劑膿自湧出

外治

一初起焮痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜灸之痛者灸至不痛不痛灸至痛則毒隨火散矣再不痛者則明灸之此未潰以前皆可灸也頂用玄珠膏塗之四畔用藥約圍之換約時用文蛤湯洗之

一初起焮赤腫痛其頭如黍如膿泡五六日間則出頭十數粒漸漸增添者此陽症也用貝葉膏貼之日夜頻換十數次其膿自出痛自減腐自化肌自生不用敷洗始終只此一藥可以收用如元氣虛者或見別症再兼托裏

一初起不紅腫煩燥悶痛積久不潰五七日後瘡頭無數按之流血無膿再久之其頭成片共爛一瘡其色紫黯其毒內攻此陰症難療頂塗玄珠膏內兼托裏如不應急宜溫補外用神妙拔根法 有膿脹痛為膜隔不得出者用針引之瘡腐堵塞者去之更宜精蹄湯洗

之 膿稠或痛飲食如常瘡腐自脫者用消毒藥與托裏兼服之外貼貝葉膏 膿不稠不稀微痛飲食不甘瘡腐化遲者用托裏約外以桑柴火烘之 膿清而稀瘡不痛瘻不腐者宜大補以回其陽亦用桑柴烘之

一凡背疽及脾胃皮裡有筋一層外皮雖潰而內膿不出令人脹痛氣血轉虛變症百出急用針通內兼托裏若待自潰多致不救所謂熱毒中隔內外不通不行針灸約無全功也此症非氣血壯實者未見其能自潰也

附醫案

交玉小年大茂

一人年六旬患背疽十日外視其形堅色紫頭如螺子之多堅長尺餘根橫半背喜其弓腫光亮熱痛脈洪此得之於膏粱醇酒所致隨用焫法其所含螺子盡欲吐出用振子刮去流血水盡許以葱湯洗淨塗生肌膏再以黑膏蓋之四圍腫處用敷藥數之次日如前後其腐盡深入寸餘換搭絳珠膏日漸日長但因其性嗜酒兩月後新肉雖平嬌嫩而不能結皮完口將嫩肉盡行剪去用膏貼數日待肉老平用珍珠散結皮而愈

一人年六旬患背疽十二日半紅半腫微熱微痛生於背心之下腎俞之上高低平等廣開八寸根脚泛腫色若水噴頂陷無神似腐非腐脈浮而大重按而虛此瘡利於腫潰不利於收斂辭不治後更醫為五善俱具治至收口如錢未合不數日而變症出四日乃死

一人仲夏背生熱癩二十餘處內有一瘡甚小其毒甚大予曰此非癩比後之發勢有不可測者彼不信更醫又十日形勢內陷敗症齊出復請予治其人臥於堂以帛蓋瘡上登堂未及兩三步予即告歸彼曰何也予曰敗氣滿前死期速矣何必視瘡急備後事可也再七日果然卒之

一人背疽初起入房犯禁患處腫五寸黯暈尺餘漫腫堅硬背若負石發熱條渴小便頻數兩耳重聽揚手露體神思昏潰脈沉而細右手為甚便秘念七日計進飲食百餘碗腹內如常眾欲通之予云所喜者此耳急用大劑六君子湯加附子姜桂三劑瘡始癒痛自後空心用前約午後用六味丸料加參芪歸木五劑復用活命飲二劑針出黑血甚多瘡膿少許背即輕軟仍用前約便亦通利繼以大補始獲全安所謂症不在難心契則明方不在多意會則明也

腰部

經絡與背部同

下發背 生于背脊中前對臍發此症最為險候蓋內腎乃性命之根本也治宜護腎為要

腎俞發背 陷肉之間 因酒色濕熱者則單生由房勞起火者則雙發 二症如本臟稍有具陰制火則瘡形紅活高腫為膿用人參養榮湯加山萸五味知母黃柏或加乳香沒藥廣膠及加減八味丸以救其源 若瘡形紫黑乾枯堅硬不作膿或膿稀傷膜者為真陰內

敗死期在十五日前後非下搭手之同類也 灸合陽穴五壯

下搭手 生腎俞之旁十連腎發由房勞傷腎所致令人口乾寒熱百節俱疼治同下發背若嘔噎噎厥逆不食及膿清腰骨似折者逆先

有渴症後患疽者腎水竭也膿穢色黯不痛瘡口張大者脾氣敗也小便如淋痰壅喘促口乾舌裂者脾肺敗也左尺脈洪數者腎無所生也左關脈浮瀉者金尅木也秋令尤難俱為不治

濕流注 亦生腫 但其腫而無頭不變色不作痛三五個月不潰令人食少而肌瘦是也治宜補氣血開鬱結如十全大補湯加香附陳皮數劑俟元氣稍復方可針之仍倍用參芪加遠志貝母白斂外以豆豉餅附子餅灸之忌用十宣散流氣飲等約

石疽生於胸膈腫而無頭皮色不變堅硬如石屬少陰陽明二經積熱所致治同濕流注亦由元氣而邪氣固結者也若黑陷麻木嘔噦不食神昏脈散而代者死

凡惡血停滯治之緩則為流注及為骨疽

一婦腰腫兩腿尤甚此瘀血滯於經絡也用桃仁湯二劑稍愈更以沒藥丸而痊 一惡血未盡膈腹刺痛或流入四肢或注股內腫痛者用沒藥丸而病已 一因水濕所觸經脈不行而作腫痛者宜服當歸丸

纏腰火丹名火帶瘡俗名蛇串瘡初生於腰紫赤如疹或起水泡痛如火燎由心腎不交肝火內熾流入膀胱而纏帶脈也宜內疏黃連湯清之壯寔者貴金丸下之以清涼膏塗之自愈如失治則纏腰已遍毒由臍入膨脹不食者不治

清涼膏由石及一塊涼水化開加水打溷澄少時而清水一盞兒香油半鍾打數百成膏加雄黃末少許再打勻用棉翎掃患處立效

一婦年七十腰生一癩作痒異常齊氏曰脈浮數而反惡寒瘡也瘡未潰而脈先弱何以收斂治之無功果效

胸部

經絡 正中行屬任脈經兩旁各開第二行屬足少陰經第三行屬足陽明經第四行屬足太陰經

缺盆疽生于缺盆鎖骨疽由胃與三焦二經積熱所致其症寒熱食少腹脹必小水不利初宜隔蒜灸之服蠟酥丸貴金丸而勢退惟小

水不利者用六一散利之次服十全大補湯調理 此症失治則潰而難斂又名曰瘰疽

甘疽生于胸膈靈樞云發於膈形如蠶疔瓜甚苦寒熱急宜去其寒熱不則十日死死後方出膿

臈中疽生于心膈之上 臈為氣海主分部陰陽臈處生疽由氣鬱所致也 灸陰谷穴三七壯又如錄豆大

并疽生于脇初起如豆皮色不變必先肌熱盈汗心煩飲冷舌燥唇焦乃其候也紅腫易治黑陷難療再神昏嘔吐脹者七日死 灸却門穴三七壯又如藜豆大 如久潰而不斂亦無痛痒者穿心冷漏

蜂窠疽生于胸膈 由心火熱感所致宜急導心經之火遲則熱毒攻心難療

胃疽生于心膈脾發下赤旁些 症由受燻太過所致必人迎脈盛宜清本經之積熱若服藥作嘔飲食不進者不治

按右諸症腫潰治法見後腹部再與首卷腫潰治法參考

乳吹乳毒生于頭孕婦為內吹胎氣旺也宜清之有兒食乳名外吹又名乳毒由肝氣滯也如乳痛發熱作渴夜甚左關脈洪數者熱入血

室也宜小柴胡湯加當歸芍藥甘草枝子 乳痛牽膈內熱口辛肋脹者帶脈為患也宜小柴胡湯加黃連枝子青皮或升葛湯

乳癰乳疽生于乳房紅腫熱痛者為癰堅硬木痛者為疽由肝氣鬱結胃熱壅滯而成也初起者升葛湯若已成者復元通氣散已潰者神效

乳發乳漏 發為乳房嫩赤俱腫熱大如癰未成形者消之已成者托之內有腫者針之以免潰潰諸囊為害防損囊隔致難收斂

膿出未盡者慎勿生肌搽入藥錠吸之煎精華橘皮湯洗之 久不收口時流清水者為漏外用藥線去腐生肌當大補

乳中結核 如梅如李雖患日淺亦乳岩之漸也由肝脾虛者用四君子湯加芍歸升麻柴胡由脾結傷脾者用歸脾湯輕者薑貝散

乳癆 乳房結核初如梅子數月不瘳漸大如雞子串延胸脇破流稀膿白汁而內寔相通外見陰虛等症初起宜隔蒜灸之紺珠膏貼

之薑貝散消之已成者用瓜蒞散調之兼八珍散加姜炒香附夏枯草蒲公英補之已成者見陰虛等症兼用六味地黃丸料以培

其本

乳岩 亦乳中結核不紅熱不腫痛年月久之始生疼痛疼則無已未潰時腫如覆碗形如堆粟紫黑堅硬穢氣漸生已潰時深如岩穴

突如泛蓮痛苦連心時流血根腫愈堅斯時也五大俱覆百無一救若能清心滌慮以靜養兼服神效瓜蒞散益氣養榮湯只可

苟延歲月而已 初起時宜艾炷核頂次日起泡挑破用披針針入四五分插去腐靈藥約撒于紙封之至十餘日其核自落絡珠膏斂

口再當保養庶不再發惜乎初時必不肯如是治也

按乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經外屬足少陽胆經是症也女子多發於乳蓋由胎產憂鬱損於肝脾中年無夫者多有不治

男子多發於腹必由房勞恚怒傷於肝腎治宜六君子湯加芍歸柴胡梔子數十劑元氣復而自潰仍痛而惡寒者氣血虛也易十全

大補湯加柴枳丹皮兼六味地黃丸若兩目連腹肝脈微弦者十全大補湯更加胆草

乳症諸方

升葛湯 治乳吹乳毒乳癰乳疽○升麻 葛根各一 羌活 防風 黃柏 南星 川山甲炒 半夏各 鹿角灰 錢二 大黃

二錢 用黃酒二盞葱頭三個煎八分食遠服 熱甚加山茨菇 薺加土貝母 已成加皂角刺再橘葉橘紅炒通草皆要

約也

乳毒丸○大黃炒三連翹 白芷 獨活各一 為未用沙糖丸黃酒下盡醉為度一漏即瘥 一用牽牛錢良姜三錢 甘草八分

用白酒一鍾水一鍾煎八分服

薑貝散 治乳核○瓜蒞五錢貝母 南星 連翹 甘草各三 用水二盞煎八分加酒二分食遠服一如青皮升麻

神效瓜蒞散觀內 治乳岩久服可絕病根本方去當歸加皂刺半生半熟名立效散

乳癰初起加土貝母金銀花蒲公英有膿少加白芷無膿多加白木

乳癰初起用鮮蒲公英連根葉搗汁酒沖服隨飲葱湯服之出汗 一用鴉翼七根左右用右燒灰為末黃酒服

致和散 治乳岩潰爛膿水不乾者○蜂房 雄鼠糞 川練子經霜者佳 各等分瓦煨存性為末搽之即乾

乳汁不通即乳少者○王不留 川山甲受猪前蹄七斤 為末酒下即通

一用當歸錢三川芎錢二 川山甲 王不留各錢通草錢用鮮蝦湯煎加白酒鍾許和服一加紅花子五分升麻三分下乳約但作脹而

無乳乃氣血竭而津液亡也用八珍湯倍參朮少佐肉桂多服奏效

反奶 用鹽臙子炒熟用黃酒食即變好乳

回乳湯 無兒吃乳致乳汁脹痛者○麥牙兩炒二歸尾 赤芍 紅花 牛膝各二錢 水煎服外以脚布束緊兩乳以手按揉之

一用葫蘆巴為末每服二錢酒下二次即降

乳岩○玄胡索 黃以仁各五錢 黃酒二鍾煎一鍾空心服出汗即驗 琥珀丸對症約也 灸肩髃穴足三里穴各二七壯

腹部 經絡 與胸部同

幽癰生臍上 疔如椰子痛引兩脇發戰咬牙 灸築賓穴二七壯

疔癰生臍上 疔一名胃疽微腫不赤內堅如石先寒後熱走痛引臍欲吐不吐甚則咳嗽膿痰 脈浮大面赤者不治 灸曲池穴七壯毒偏左

衝疽生臍上 由心火熾盛流入腎經宜大補不應者不治

臍癰生臍上 大如瓜突如瘤屬任脈與胃經此由心經積熱流入大小腸也然臍門神門甚用針灸剗癰舍於內惟約攻之勿膿為上宜會

膿散痛如乳香更宜蠟礬丸多服之 臍內出膿四圍堅硬出血水者不治 灸陰谷穴七壯築賓穴二七壯

小腹疽生臍下一寸五分為氣海二寸為丹田三寸為關元俱為小腹疽

橫膈腫痛引背由七情火鬱而成灸箕門穴七壯

腹皮癰生臍下 隱於皮裏膜外由膏粱火鬱所致其右關脈洪數而腹痛甚是也壯者貴金丸下之

發壯生手肘及臍下 宜內托散如檳榔木瓜蒼朮木香甚者加桑白皮姜皮茯苓皮五加皮大腹皮喘者加蘇子蘿蔔子白芥子葶藶子車前子

緩疽生小臍 堅硬如石數月不潰寒熱食少肌體羸弱由脾經積滯而成亦寒癰例也

胸腹總論

按右諸症始終宜固胃氣壯元氣使根本堅固以行經活血藥佐之令諸臟腑有所稟而邪自退矣 如初起腫硬皮肉不變心煩嘔噦

脈沉而實者當疎其內以絕其源用內疎黃連湯利之 蚊腫作痛邪氣實也宜衛生散外以隔蒜灸之次用托裏散 脈遲緊其膿未

按右諸症始終宜固胃氣壯元氣使根本堅固以行經活血藥佐之令諸臟腑有所稟而邪自退矣 如初起腫硬皮肉不變心煩嘔噦

脈沉而實者當疎其內以絕其源用內疎黃連湯利之 蚊腫作痛邪氣實也宜衛生散外以隔蒜灸之次用托裏散 脈遲緊其膿未

成用四君子湯加川芎當歸枳殼白芷或托裏散脈洪數其膿已成用托裏消毒散 膿成而不潰者氣血虛也十全大補湯溫之 膿成脹痛者臥針取之 因悞行汗下以致腫而不潰潰而不斂者十全大補湯加乾姜大附子以救之 已潰而朝寒暮熱氣血虛也食少作瀉脾腎虛也胸痞痰湧脾肺虛也俱用六君子湯加當歸黃芪候諸症退換十全大補湯調理 針孔膿攪不利毒氣內攻也唇舌青黑臍臍壞也不治 瘡口微腫如蟹吐沫者此內潰透膜也不治 臍腹小腫大痛者以下焦蓄血症也脈在左手以四物湯加川山甲酒煮加童便服之 壯寔者用桃仁承氣湯下之自愈慎用乾漆礪砂等藥

一人腹患流注腫硬不潰脈弱時嘔此陽氣虛弱時氣虛寒也法當溫補即用敗毒等約以致身熱脈微予曰身熱而脈靜脫血而脈寔汗後而脈燥者皆逆候也不治後果歿

附小兒臍症

小兒初生旬日臍忽虛浮赤腫者用○大黃 牡蠣等分朴硝不拘 為末用田螺浸水調敷小便下白即愈 一用荊芥煎湯洗之以煨葱伏地氣貼之即消

臍風濕腫用蜂房燒灰搽之 臍濕用當歸燒灰為末搽之或青蛤散見二卷面部

臍部

經絡 臍下中間屬手厥陰心包絡及足厥陰肝經臍前屬足太陽脾經臍後屬足少陽胆經下六寸又屬脾之大絡也

臍癰生於臍 癰初起皮色不變漫腫無頭日久方疼乃生寒熱此患難消終必作膿多由性燥所致初宜柴胡清肝湯加味逍遙散脈虛病虛者補中益氣湯加羌活侯少可去之膿成脹痛者針之已潰者八珍湯加黃芪陳皮香附此以性清治症不待專於攻毒也終始忌用寒涼亦不宜大熱惟宜溫補

灸少海穴七壯或灸間使穴

米疽 靈樞云發於臍下赤而堅者為之米疽發之勿畏若堅不潰者為扶耨馬刀及瘰癧也宜各隨本門治之

點疔生臍 堅硬無頭四肢拘急寒熱大作異於常症者暗疔也治見疔門

肺氣 俗名 狐臭受業於未形之初臍內有臭濁氣從此而出諸約鮮能除根故法不立

肋部

經絡 腋直下脾骨屬足少陽足厥陰二經相火之司也二經之氣不平則風火內搏榮衛血鬱熱聚為腫癰之所由而生也 肋膈骨也肋者

肋也骨曰肋 肋無骨曰肋

肋疽 一名快癰疽 萬肋發腫甚則連及肩肘其患在左痛應於右其患在右痛應於左急宜針砭庶免內攻膿多可治無膿不治 腫

赤痛其煩燥脈震而嘔者為有餘當下之 腫硬不潰脈弱而嘔者為胃虛宜六君子湯加砂仁藿香補之亦有痛傷胃氣而嘔者外感

寒邪及微氣而嘔者雖腫時尤宜助胃壯氣蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二濕氣內傷者十有八九 二十日不穴者死

脇疝 初生如李漸大如杯 靈樞云發於脇者名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之 由足厥陰肝經鬱怒所致初宜柴胡清肝湯解

鬱瀉火已成者托裏消毒散加香附青皮體成者針之勿傷內膜已潰者八珍湯加山萸丹皮澤瀉黃蘗滋腎水 是症肥胖內寔者鮮

有是症惟虛勞者患之如破流臭敗稀膿補托不應者死大抵膿血大瀉氣血俱虛法當峻補雖有他症當未治之益元氣一復諸症

自退也宜灸沖門穴二七壯 一候作瘕痞治之固效數月大如蓋高如鐵堅如石微紅漫腫不甚疼痛者即此症也失治則攻擊成膿形如鼓脹但其肚無青筋而

臍不突為異耳 淵疽生脇初起不紅堅硬久則破潰而有聲如嬰兒啼狀用膏蓋之則斂止去膏則斂作宜灸陽陵泉穴二七壯其斂即止瘡即愈

內發丹毒生脇下即 腫痛色赤如霞急宜砭去血內服貴金丸之類汗之如無汗及嘔噦腹脹神昏便閉瀉身青紫者不治

腋肋之治方 柴胡清肝湯 加味道遙散見瘰癧門 補中益氣湯 八味湯 四君子湯 托裏消毒散

貴金丸 灸法見首卷 下部後 鶴口疽生于尻尾高骨共處一名銳疽靈樞云發於尻初如魚脰久若鸛喙由督脈經熱痰流結所致朝寒暮熱夜重日輕潰出稀膿或流鮮血少

壯尤可老弱難醫 滋陰除濕湯 初起者宜此和之○川芎 當歸 白芍 熟地各一錢 柴胡 黃芩 陳皮 知母 貝母各八分

澤瀉 地骨皮 甘草各五分 水二盞姜三片煎八分食前服 熟地各一錢 沉香

和氣養榮湯 已成不得內消者宜此托之 人參 黃芪 陳皮 白朮 茯苓 丹皮 當歸 熟地各一錢 沉香

甘草各五分 水二盞煎八分食前服 滋腎保元湯 氣血虛弱潰而不斂者宜此補之○人參 黃芪 白朮 茯苓 歸身 杜仲 山萸肉 丹皮

熟地各一錢 肉桂 大附子 甘草各五分 水二盞姜三片棗二枚蓮肉七個食前煎服 右症失治久而成漏者宜服先天大造丸見流注門兼服琥珀蠟礬丸見腫門久之自能收斂

坐馬癰生于尻尾 初起受膝下外臚橫骨盡處

交正外科大成 卷二

治同鶴口疽

醫癰生于醫居小腹之後為陰中之陰其道遠其位僻雖屬足太陽膀胱經多血奈氣運不到血亦罕來最難收斂由濕痰凝結而成

初起有頭紅熱重墜發熱口乾者用貴金丸利之紺珠膏貼之初起無頭漫腫皮色不變者用紺珠丹托之隔蒜灸之如大勢已退餘腫

未消者頻煮熱葱熨之除濕二陳湯調之已成欲作膿者托裏羌活湯痛甚者神授衛生散大勢已退托裏消毒散不消及不潰

不斂者脾虛也六君子湯加川芎當歸黃芪脾虛下注者只白木一味煎食自消母以能潰膿為惑不消作渴便淋者陰虛也六味

地黃丸加五味子潰而不斂者用生薑煎湯洗之欠者以豆豉餅灸之此症自裏至表者十有八九從六淫外感入裏者百中一二

故法宜外發度免內攻其有軟陷無膿根脚平散而不痛者甚則口乾煩燥謔語痰喘氣粗者由悞服寒涼失於滋補所致也不治書

云若無補養之功其禍多在結痂之後是知瘍科以培補元氣為首務也 有因患痔數服寒涼致令攻潰於醫者其脈大而數症則

寒熱作渴瘡則膿水清稀此三陰經虧損之症也不治

醫癰主治方

除濕二陳湯 治醫癰上馬下馬等症 半夏 茯苓 秦艽 薑以仁 麥冬 甘草等分 用生薑一片燈心

二十根水煎食遠服

內托羌活湯 凡醫癰生癰堅硬腫痛者 黃芪一錢 黃柏酒炒 羌活各三錢 防風 歸尾 藜蘆 連翹 蒼朮 陳皮

甘草五分 肉桂三分 用水一盞黃酒半盞煎八分食前服

醫癰應用方 紺珠丹 貴金丸 紺珠膏 衛生散 托裏消毒散 六君子湯 六味地黃丸 俱見首卷

上馬癰 生于醫近 肚門之右 下馬癰 生于醫近 肚門之左 右二症治同醫癰

附

風疔生于醫俗名坐板瘡形如疥癬破流黃水先痒後疼由風寒客於谷道所致宜香白散等藥敷之令毒水出盡即結痂而愈

香白散 枯白卷 輕粉各二種 腦錢 共為末濕則乾揆乾用生桐油調敷 一用丝瓜皮焙為末燒酒調敷 或大蒜瓣燒存性為

一揆之 或用芫花根煎湯洗之

懸癰 生于會陰穴在陰囊之後谷道之前 初生如松子次大如蓮子數日始發紅熱腫大如桃李

湧泉疽 生于前書云腫發太陰狀如伏鼠十日可刺得白膿者順清膿者險赤黑者逆不穴者死

穿襠發 生于前書云腫發太陰狀如伏鼠十日可刺得白膿者順清膿者險赤黑者逆不穴者死

跨馬癰 生于前書云腫發太陰狀如伏鼠十日可刺得白膿者順清膿者險赤黑者逆不穴者死

按右症皆生於前陰之後後陰之前以其形異而名亦異也 屬任脈別絡夾督脈衝脈之會由足三陰虧損多兼志欲不遂之所致輕則成漏重而則隕故麻木黑陷泄瀉嘔噦疲倦者久延谷道內潰臟腑者皆不治 古云陽氣亢盛者宜攻離丸取其苦寒能瀉水中之火令陽氣衰則陰氣自生陽氣衰弱者宜六味地黃丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺則陰自生然此症屬陰精衰弱者十有八九陽氣亢盛者百中一二 初起腫痛小便赤澀者先服製甘草一二劑及蒜灸之次服龍胆瀉肝湯已成不得內消者托裏消毒散加川山甲皂角刺自破或膿脹痛者針之朝服六味地黃丸午服十全大補湯加丹皮澤瀉或再加附子久而成漏者宜國老膏化湯吞蠟蟻丸間以豆豉餅灸之久則大附子餅灸之 如疔熱煩渴氣喘體倦食少大便澀小便數者脾虛也宜補中益氣湯加茯苓半夏候飲食進諸症減更加麥冬五味子自瘥經云陰虛脾虛也脾為陰土而壬生血若悞用知母黃柏苦寒之劑復傷脾肺是絕其源矣

懸癰主治方

國老膏 初起者二三服可消已成者多服自消 粉甘草半斤內用無節者四兩劈破用長流水浸透炭火炙藥水以一盆水盡為度切片另用長流水三鍾無灰酒五鍾煎三分之一如膏一起服之具有節四兩用泉水煎湯洗患處日三次自效 已破者三二服合口年久者雖陽潰糞從瘡口出多服亦驗 一方加當歸二兩

懸癰應用方

龍胆瀉肝湯見疔瘡門

托裏消毒散

六味地黃丸

十全大補湯

蠟蟻丸

補中益氣湯 俱見

臍毒

臍毒者乃肛門腫痛也而有內外虛實之脈 因厚味動勞而得者則脈數而有力肛門邊突腫形如李核大便利小便亦甚者肉泛如蠶堅痛如錐此為外發易治初宜貴金丸衛生散一煎散之類下之外用金黃散以清涼膏調敷已成脹痛者針之如攻利不應者托之外用神燈照焰之麝蟾醋銹塗之其堅硬漸腐俟有膿時用珍珠散倍水片以猪脊髓調敷 因陰虛濕熱下注者則脈數細而虛肛門內結腫刺痛如錐大便虛閉小便淋瀝寒熱痰嗽過夜尤甚此為內發難醫治宜四物湯加知母黃柏天花粉甘草兼六味地黃丸調之五散托之俟膿出方安 因性急或兼補術大熱而成者必痛連小腹二便乖違串蝕肛門大孔無禁食減作渴 因虛勞久瘻而得者必肛門結腫如粟破而成漏瀝盡氣血而亡此二症乃內傷所致非約能療

臍毒主治方

一煎散 臍毒初起腫痛服之立消○當歸尾 皂角刺 桃仁泥 川山甲 妙甘草 各二黃連一分枳殼 檳榔 烏藥

白芷 天花粉 赤芍 生地 各一 紅花 五分 玄明粉 大黃 各三 用水二鍾浸一宿次早煎一滾空心服之俟行三四

次以薄粥補之

五灰散 臟毒腫痛生於肛門內者○蜈蚣 川山甲 生鹿角 血管鷲毛 血餘各藥存性各研末各等分 每服五錢空心用黃酒調服

災臟毒及腸風下血不止秘法令患者平立量脊骨前與臍平處是穴於脊椎上灸七壯如年深者更於椎上兩旁各開一寸各灸七壯除根

壯除根

臟毒應用方

衛生散

金黃散

神燈照

蟬酥餅

珍珠散

六味地黃丸 俱見首卷

附

穀道生瘡久不愈者內用甘草節為末每服三錢空心生薑酒調服外以雞內金煨存性為末摻之

痔漏

痔漏之症雖瘍科之事而鄙談之然擇疾而療豈仁者之用心乎予閱內經惟云因而飽食經脈橫熾腸澀為痔蓋多費解為飽食則傷脾土脾土傷則不能營養肺金肺金失養則肝木無制而生心火侮肺金尅脾土於是尅所勝而侮所不勝也然飽食而成此症者必有其因其因惟何蓋因飽食之後或暴怒或努力或枯坐或酒色婦人或難產小兒或夜啼等因致使氣血縱橫經絡交錯流注肛門而成此痔矣如其腫者濕也痛者火也痒者風也閉結者燥也惟宜隨其勝者以抑之乃其治也第恐學者未得其詳附以專科趙真子家傳的本再附已意於後稍補缺畧云爾

二十四痔

臟癰疽 肛門腫如餒頭兩邊合緊外堅而內潰膿水常流此終身之疾治之無益

鎖肛痔 肛門內外如竹節鎖緊形如海蜃裹急後重便糞細而帶膿時流臭水此無治法

翻花痔 肛門四邊翻出如碗大肉紫黑痛流血水服涼血解毒之藥約水洗之約線孔之根未盡者萬憶膏敷三四次除根內服犀角地黃丸一料永不再發

地黃丸 一料永不再發

蓮花痔 狀如蓮花層層叠起有細孔痒痛出膿水數如聖散七八次至痔紫黑色住約待七八日其痔自落敷粉霜一次去根服槐角地榆丸以去內毒

地榆丸 以去內毒

重疊痔 生騎縫中間層層叠起乾燥無水只痒而不腫痛搽如聖散日三四次七日痔落不須服藥
釣腸痔 肛門內外有痔摺縫破爛便如羊糞後出血穢臭大痛者服養生丹外用藥洗每夜塞龍鬚丸一九於穀道內一月收功

懸胆痔 生於臍內懸於肛外時流膿水便痛出血先枯去痔不須收口服血竭內消丸

內外痔 肛門內外皆有遇大便即出血疼痛用熊胆水片膏日搽三四次用後方煎洗

內痔 在肛門之裏大解則出血如箭便畢用手按良久方入服着肛散裏換痔散即看出洗淨敷如聖散五七次其痔紫黑色自落換

收口葯收口服收肛散即入或看出時用葯線扎之亦佳服槐角苦參丸或涼血地黃丸前法治之其大便有七八日難解須少用飲

食先與患者說明免惑

血箭痔 與內痔同但無痛痒為異耳若大解則鮮血如箭不問莖前莖後宜灸承山穴內服蝟皮參龍丸

氣壯痔 肛門側邊有形無痔遇過苦氣惡酒色則發發則腫脹形若桃核堅硬如石俟氣消毒散則平復如初惟戒氣怒不須醫治

沿肛痔 週圍皆有痛痒出水搽二仙丹二次化為黃水用槐花朴硝煎湯洗之服涼血解毒丸三四貼或清金丸半斤則毒盡根除

楊梅痔 亦週圍皆有形似楊梅只痒不痛乾燥無膿此梅毒將發之候也先服如聖散一劑次服托裏解毒湯十餘劑外搽射蠶丹三

四次自愈

子母痔 兩邊相對或大或小時腫時疼頭大根小數二仙丹內服槐角地榆丸收功

雌雄痔 亦兩邊相對但一大一小腫痛出膿頭小根大為異耳數如聖散六七次俟痔落而再發漏如無漏孔就可收口宜服苦參丸

清熱解毒

凌角痔 狀如菱角左右皆有三四孔一孔通腸流膿水先宜去痔次穿漏孔年久者內有附管用約丁去管次穿漏收口宜服蠟礬丸

乾膿收口虛者服十全大補湯六十貼

葡萄痔 左右如乳頭堆起只痒不痛過辛苦出水或痔有孔出膿宜先去痔次穿漏孔如不通腸用丁取管收口服蠟礬丸收功

核桃痔 肛外一邊形如核桃有孔腫痛流膿先用葯線扎去痔次穿漏服蠟礬丸收口

石榴痔 生谷道前形如石榴破塌疼痛者有孔出膿宜先去痔次收口宜服槐角苦參丸

櫻桃痔 宜先去痔次穿孔服琥珀丸收功

牛奶痔 先用葯線扎去吹點萬憶膏一二次除根

雞冠痔 亦先扎去敷粉霜一次痔平即可收口

雞心痔 鼠尾痔俱無疼痛過辛苦則發不治無害

右痔二十四種形色雖殊而治法則一開載已悉學者宜依次調理不得妄為加減致取不驗至囑
痔漏主治方

涼血地黃湯 治痔腫痛出血○歸尾一錢五分生地二錢赤芍一錢黃連炒二錢枳殼一錢黃芩炒黑槐角炒黑地榆炒黑荆芥炒黑升麻五分

天花粉八分甘草五分右一劑加生側柏二錢

用水二大盞煎一盞空心服三四劑則痛止腫消更外黃薰洗

薰洗方 凡痔腫痛出血及漏毒腫痛俱效○地骨皮 槐花 韭菜根 朴硝各二兩白礬五錢蘇葉五錢葱頭七寸

用水十五碗煎百沸傾淨桶內令患者坐之四圍遮蓋勿令走氣先薰後洗待痔出黃水為妙

清金養榮湯 痔漏腫痛大便燥結後重者○當歸二錢白芍八分熟地二錢黃連二錢連翹一錢黃芩一錢熟大黃半錢枳殼二錢

麻仁二錢天花粉一錢茯苓一錢甘草五分用水二盞煎一盞食前服 忌辛辣熱等物

通聖散 痔漏腫痛大便閉結不通○防風八錢荆芥 赤芍 歸尾 梔子 連翹 黃芩 白朮各一薄荷八分

川芎五分甘草五分桔梗八分石羔八錢滑石二錢大黃五錢朴硝三錢

每劑加漏蘆一兩 生薑二片 紅棗七個 燈心三十根 用水煎服 瀉二三更 食涼粥 止之 忌葷腥油膩 三五日但有熱毒內結者服此

一劑瀉去餘毒 服清金丸三四劑 退腫止痛

清金散○黃連三錢枳殼一錢陳皮一錢乳香二錢沒藥五分用水二盞煎一盞空心服如腫痛甚者外黃薰洗用番丹敷效

十全大補湯 氣血不足不能長肉收口者○黃芪蜜炙當歸各二錢熟地三錢川芎 白芍 人參 白朮 茯苓各一

肉桂五分甘草五分

用紅棗二個水二盞煎八分食遠服 脾胃弱者加陳皮砂仁炒各一錢

黃芪六一湯 漏孔穿開膿水不絕者○黃芪六錢蜜甘草節一錢水二盞煎八分食遠服十餘服膿水自乾

槐角地榆丸 痔漏腫痛出血○槐角四兩地榆炒黑地黃炒焦黃芩炒荆芥炒各二兩枳殼五錢歸尾一兩共為末煉蜜為丸桐子大

每服三錢空心白滾湯送下日用二服 忌煎炒熱物

苦參地黃丸 痔漏出血腸風下血酒毒下血 先紅為腸風後熱為酒毒○苦參切片酒浸瀉蒸晒九次地黃四兩酒浸一宿蒸熟

為丸 每服二錢白滾湯或酒送下日服二次

扁柏丸 痔漏腸風臟毒等下血及吐血血崩等症○生側柏葉一斤用白礬四兩入銅鍋內水青州柿餅十個燒存性血餘

反兩槐花炒焦共為末煉蜜為丸每服二錢空心白酒送下日進三服以止為度

二妙丸 內痔膿毒出血○棉花子一斤朴硝四兩入小酒瓶內加老酒四碗入瓶每服三錢空心白酒調服日進二次忌生酒熱物

搜風順氣丸 治內熱結閉裡急後重並腸風臟毒下血原見中國門余梓○大黃五兩酒洗 麻仁微炒去 郁李仁滾水泡去 獨活

車前子酒浸 兔絲子酒煮 枳殼炒 檳榔 山藥 牛膝酒浸 山茱萸酒浸各二兩 加羌活一兩此楊慶亭之秘法也 共為末煉蜜為丸桐子

大每服三十九茶酒任下

蠟礬丸 大凡漏孔穿開即服此丸乾膿收口乃漏症之要藥也○黃蠟一兩 白礬三錢 先溶蠟化離火俟稍溫方下礬末攪勻乘熱

搗成條隨烘隨大桐子大每服六七十丸白滾湯送下日進三服

琥珀丸 治症同前○白凡一兩 象牙一兩 血竭三錢 乳香 沒藥各一錢 射香三分 蜂窠一錢 共末用黃蠟溶化和藥為

丸每服五七十丸白滾湯下日進二服

六味地黃丸 補腎滋陰益氣養血 依古方以地黃用人乳浸九次蒸晒為異耳

八味地黃丸 治久漏膿水清稀不能收口服此補陰助陽通暢脾胃肌肉易長膿水易乾刻日見效依前方加大附子肉桂各二兩

內消退管丸 又名血竭內消丸 此能退管收口不須外治瘡毒成漏服此尤佳○蜂房代子者一 刺蝟皮一竹重五兩 血竭二兩

• 象牙醋炒為末五錢 姜蚕 蟬退 木香 火硝 乳香 沒藥各三錢 共為末用黃蠟八兩蒸黑取起待溫入藥攪勻丸梧子大每

服三錢日進三服連服七日膿水更多已後一日一服半月後毒將盡肉長管出漸漸剪去用生肌散如毒未盡用火肌肉湯日洗

二三次乾膿收口

生肌散○盤雞每用一錢 血竭 兒茶各五分 水片一分 共為末吹入漏孔內收口

養生丹 內消痔漏百發百中○母猪大腸一尺 入朴硝四兩 兩頭塞住入瓦礮水三碗 煮將乾 象牙末 刺蝟皮二竹 射香

錢一 猪懸蹄二十四竹 川山甲二十四片土炒 乳香 沒藥 雄黃 地榆各三錢 大黃五錢 青鹽七錢 白芷一兩 明凡五錢 小活龜

用泥封口煨存性 蜂房代子者一 黃牛角磨一竹 朴硝一錢 槐花五錢 黃蠟一兩 自然銅醋炒內七錢 共為末煉蜜

為丸每服三錢空心用老酒送下日進二服服至半月出管一月全愈不用生肌

蠟皮象龍丸 退管內消不須卦線○水銀 雄黃 雌黃 礪石 禹良石 明凡各一兩 為末入陽城礮內封固火打三炷香水擦

盞底俟香完過宿取出出火毒听配後約

蠟皮土炒 山甲土炒 象牙炒各一兩 血竭六錢 乳香 沒藥 猪懸蹄五錢 共末用黃蠟二兩溶化為丸菜豆大每服五十九每日

三服用槐花湯送下忌茶葱蒜椒糟房事一月愈

收功盡根丸 痔漏服約全愈須服此約度不再發○枯凡 雄黃 文蛤炒 烏梅肉炒各三錢 水片一分 共末煉蜜為丸分五服每

日一服空心白滾湯送下

卷二

白

翻肛散 內痔服此一劑即時翻出○枳殼三兩 陳皮三兩 作一劑水二鐘煎一盞空心服用外用喚痔散敷之

此藥送入肛門內一時其痔即翻出洗淨用如聖散日敷五六次看痔紫黑色為度七日其痔自落每日用猪蹄湯煎洗三四次待

瘡口收完用收肛散一劑即收入

喚痔散○生草烏共一錢 刺蝟皮末三錢 枯礬五分 水片三分○各為細末葱汁調約送入

收肛散○陳皮三兩 枳殼一兩 水二鐘煎一鐘服

內塞散一名龍射丸 如蟻頭收入內有疼痛用此藥塞入谷道內三四夜止疼收功內痔腫痛尤佳○牛黃 天竺黃 輕粉各五

乳香 沒藥 薄荷葉各一錢 水片二分○共為末用蛭蚰搗爛為丸如粟大再研水片為衣臥時塞一丸入谷道內七夜為止除根不

如聖散 內外一切諸痔七日自落 雞糞四兩用雌雄雞二隻餵七日次早用猪膽子切碎拌糞米 雌黃六錢 雄黃六錢 明礬兩 皮

硝兩 胆礬五錢 共為末入傾銀確內用瓦蓋之火煨青烟為度取出加 乳香 沒藥各三錢 水片五分

共為末磁確收封口用唾津調敷痔上良久去約再上藥如此七次看痔黑色則不須上藥待七日其痔自脫用生肌散二三日收

二仙丹一名賽金散○治外痔 金脚砒二錢 白礬兩 二味為末傾銀確煨烟盡為度加 蝎尾七個 煨生草烏錢 共末敷如如聖散法

玉紅散 去漏腐肉亦可點痔 靈藥 雄黃 白丁香各一錢 蟬酥 乳香 沒藥各五錢 共為末磁確收任用

退管錢子 外漏用此二三次硬管即由如追透通腸亦可以穿線 諸瘡漏皆用○靈藥錢 白丁香半錢 雄黃一錢 蟬酥一錢 輕粉

生肌藥丁 漏瘡去後用此收口○珍珠 象牙 龍骨 兒茶 花蕊石 血竭各一錢 輕粉 白芷 白斂砂各五分 水片三分

共為末飯為條陰乾收用不可加減

藥線 鮮芫花根錢 雷丸錢 蟬酥錢 草烏錢 水二盞煎一盞去渣取汁用生絲一錢入藥汁內以文火熬汁將乾存汁一小酒

盞取起晒乾復浸汁內又晒又浸以汁盡為度晒乾包收聽用至六七月取露天蜘蛛絲做成藥線任用

生肌散 用線挂開者此藥收口 諸瘡長肉收口○蘆甘石湯內七次 木香 降香 乳香 沒藥 血竭 兒茶 黃柏 黃

連 白芷 白斂各五錢 龍骨錢 水片錢 射香分 赤石脂兩 黃丹七次 海螵蛸湯泡去皮五錢 共為末用

珍珠散 長肉生肌收口 珍珠 石膏炒 赤石脂 輕粉各一錢 白龍骨錢 水片二分 孩兒骨五分狗胎 共末收用加象牙錢

萬憶膏脚之汁所 右趙真子家傳痔漏的本終

痔漏附錄

凡醫痔者先服涼血解毒約三四劑如涼血地黃湯通聖散之類次服槐角地榆丸及臟連丸半劑消內毒以斂其根

又下之太急或致脫肛以法上之宜收肛散如涼之太甚或致遺精以法補之宜補漏丸

服經云跌陽脈浮必腸痔下血腸痔下血風熱居多宜條芩黃連生地槐角或小薊丹參以清其熱宜當歸川芎佐以紅花以調其血宜

人參枳殼升麻以順其氣因寒者加茯苓木香因酒者加葛根烏梅 一個黑豆百粒 夫升麻者痔症必用之藥也如不應純宜溫補用

四君子湯加黃芪扁豆或參苓白朮散蓋大腸下血以胃氣收功胃氣回血自歸經矣

凡用枯痔約必先圍護週圍好肉用黃連麝金石膏等分白炭炭半蜜水調稀塗之薄紙蓋之次上枯約 或加片射 凡換枯痔約宜

用羌活獨活煎湯洗之 凡痔已枯盡而不脫者宜靈磁石錢 姜蚕 川烏各味 冷水調塗之立脫 凡痔已脫先用甘草煎湯

洗之再用荆芥文蛤煎湯洗之則不生膿 脫後肉痒者煎粉甘草濃汁洗之 凡痔頭大根小者以線扎之頭小根大者用約枯之

俟痔落而再醫漏如無漏孔就可以收口有漏者插以約丁通腸者挂以約線 無痔而有漏者以因肛門邊先結腫結半年一載此

塊作痛成漏出膿尤內先通腸而後外潰也必非附管治非取管挂線不能收功 痔有三不醫為番花痔臟癰痔鎖肛痔也雖強治

之恐未能全効 凡插約丁退管不可頂底如孔深一寸插約七八分為度早晚插約二次至三四日孔大如數插之至七日自後處

四邊裂開大縫即搽玉紅膏再七日至落落後仍搽玉紅膏者時四邊內外無黑腐時換生肌散膿稠時換珍珠散收口不可貼膏約

恐其呼膿收口必緩必內服蠟丸以乾其膿 忌吃生冷犯之無効 凡用挂線孔多者只先治一孔隔幾日再治一孔如線落口開

者敷生肌散

漏有八

腎前漏生腎瓜穰漏形如出水腎囊漏通管通入纏腸漏為其管曲屈不直風曲漏難以下約至底也串鶯漏蜂窩漏二症若皮破色

雖以挂線依次穿亦穰之類通腸漏惟以此漏用挂是以有善惡之分也再有年去氣虛者虛勞精竭者脾虛火瀉者皆為不治

痔漏類方

臟連丸 治痔漏并腸風下血及水瀉痢疾○黃連 一斤 槐花 半斤 為末用雄猪肥壯大腸以酒醋洗淨入藥扎兩頭次用韭菜五六

斤 一半鋪甌底約腸盤於上一半蓋之文火蒸之以腸脂化盡腸皮如油紙薄為度去腸取藥晒乾稀糊丸桐子大每日二服每服

三錢白漆湯送下

中黃丸 番花痔○缸砂水浸半月每斤用皂角子仁兩指各四兩黃連 槐角子 各二 梔子 黃花地丁 各一 青黛錢 為末用

大柿餅肉為丸桐子大每服四五十九空心清湯送下

牛黃定痛丸 內外諸痔○牛黃分 胡黃連四 梔子炒黑 槐米炒黑 苦食用巴豆麻油 為末糊丸黍米大每服三分時時 花湯下

百草丸 血箭痔 百草霜四 黃芩 梔子各一 黃連各 槐花 地榆錢 各五 為末糊丸每服三錢清湯下

天中散 漏瘡並腸風下血 粽子^{用炒熟} 為末每服二錢白滾酒送下出汗為度管多者間三日再服 腸風一服即愈

魚洗痔漏丸○瓦松 馬兜鈴 皮硝 文蛤 蓮房 蜂房 山桃樹根 共一大劑水一砂鍋煎濃汁傾淨桶內坐熏扎泥圍之俟

稍溫洗之日三次

一加馬汗麩子 一用馬齒莧煎洗 一用刺兒菜煎洗 漏用黍桃^{內許即谷樹子也煎湯洗}

蜂窩漏瘡煎湯洗三五次能退管生肌

數痔方○胡黃連^{錢五} 血竭 兒茶^{錢二} 熊胆^{錢三} 水片^{錢一} 射香^{錢一} 一加礪砂^{錢一} 一加皂白霜^{錢一} 為末用苦食磨水調敷

退管約線類方 一用白砒^{錢一} 雄黃^{錢五} 為末入確封打三香水頻擦蓋取出加乳香沒約^{錢五} 用白芨些瀆水調成線以黃柏末^衣

一用白砒^{錢五} 雄黃^{錢五} 硃砂^{錢五} 水銀^{錢三} 白礬^{兩一} 為末昇打如前做線加鹿角^{壯炒} 為末為衣入瘡不痛 一用礪砂雄黃

略一為末入確內益白礬末而昇打如前糊和成線入管內七八日抽出管易生肌約 鼠瘡取麥粒大一粒入瘡內日二次不痛

發腫三日腐脫 多年結毒甚効

一用白砒末^{錢五} 入鐵鍋內次蓋白礬末^{五錢} 兩火煨簪枯噴水一口於礬上即以繅紙蓋礬上再隨噴水三五口於紙上即以鍋蓋蓋

之膏紙上有白霜為度無霜再煨噴有霜去紙入去油乳香沒約末各錢許蓋礬上離火候冷取為末用飛羅麵打糊成條插用以

管退為度 一加蠟尾^個 生草烏末^{錢一} 枯痔甚佳搽如聖散法

製砒法如砒^兩用黃連黃柏黃芩^{各五} 甘草粟豆各半合水五碗煎湯煮砒以汁乾為度次再昇打若用生砒則毒氣入腹反生瘡忽

做條有法一用山茨粘粉打糊和條 一做條時以猪鬃為心搓成條略晒抽出鬃則約條成筒用之通氣

灸漏法

久漏膿水根深者用硫黃麥麵和大蒜搗為餅三分厚隨瘡大小貼之炷艾一灸一易二十一壯隔三五日方用退管藥

一用蟻站搗為餅乾者為末水調作餅貼瘡上灸之熱易則之五七壯經七日管退而愈

一用大附子末水和為餅灸之次上生肌約

一用騎竹馬法取穴灸之亦佳

漏約製法

蟬蛻^{取竹筒內泥固} 蛇蝎^{入胡桃壳內} 鐵線^蟻 蜂^{貯瓶內} 火^火 蝦^蝦 蜈^蜈 蚣^蚣 刺^刺 蝟^蝟 皮^皮 便^便 蟻^蟻 蛤^蛤 粉^粉 蜂^蜂 房^房 乳^乳 象^象 牙^牙 酥^酥 油^油

家傷痔漏方

喇叭花科即二地黃也 三月內未開花時連根採來陰乾每用五錢水三碗煎二碗滾兩三次 另用韭菜五錢用酒水各一鐘煎八分空
心服渣午後隔二日再一服內外如式治之一切新久痔漏六月除根

截陽症

截腸者脫肛症者氣虛者用參芪歸朮血虛者用歸芍弟虛熱者加以黃柏下陷者佐以升麻外用薄荷煎湯洗之陳年醬蘿蔔切片托
之自效但其所異者有已收些須餘者漸漸結痂偶爾脫落者截腸症也無妨脫落自愈

下部前

便毒

便癰生小腹之下夾縫之間 屬足厥陰肝經之分野又為衝任督三經之隧道其經多血故名血疔俗呼便毒為不使處而生毒也破為
魚口為行動開合如魚口也若橫痃則生於交縫之上矣前賢云因觸景動心夢而不泄由精血交滯而成孫為果如此論則僧尼官
人曠夫孀婦多患此耳蓋此症必由野合妓女陰器不潔淫火傳染所致或有云因倦勞虛火沖動精氣移外交滯而成者若因倦勞
而得者則行立作痛坐卧則止為異耳雖然勞倦者百中一二而已由野合者莫敢腰膚所感之邪透骨搜風散次去肝腎經絡之毒加
味神授散外以陽燧鏡子灸之紺珠膏貼之如已成者托之芙蓉內托散或補中益氣湯加射干潰而不穿者加味透膿散潰而不斂
者加味大補湯 因勞倦而得者補中益氣湯加川山甲因房勞不節者六味地黃湯加桃仁倍牛膝因強固其精者五苓散白木茯苓

澤瀉肉桂 加牛膝二兩煎酒服

脾血痛者婦人之症也其狀則小腹結塊或如所梗或兩拘與人門俱腫小便淋瀝者是也宜雙解散如經脈不調內熱口渴食少肋脹
盜汗白帶寒熱往來脈細而數者虛也加味道遙散加味歸脾湯調理小腹重墜者補中益氣湯加青皮枝子茯苓車前子

便毒主治方

透骨搜風散 散肌膚所感之邪○透骨草白花者為乾更佳 羌活 獨活 牛膝 紫筒菊 胡桃肉 生芝麻 六安茶 小黑豆 白糖

五分錢 紅棗三枚 天茄二分 水三盞煎一盞露一宿空心熱服出汗避風一加槐子一錢生薑一錢

加味神授衛生散 清肝腎經絡之毒 每服錢五 加班毛一個 蜈蚣一條 而當歸引內加羌仁錢二 牛膝錢二 煎服如法外貼紺珠膏

多加阿魏射香俱見前卷

芙蓉內托散 治便毒已成元氣弱者○芙蓉花錢二 人參 當歸 川芎 白芷 川山甲 杏仁 連翹 木別子各一錢 用生薑三

片酒水各一盞煎食遠服

加味透膿散○依原方見前卷加金銀花三錢 牛膝二錢 酒水煎服

清肝滲濕湯 治玉蕊陰囊濕腫重墜小水不利者○蒼朮 厚朴 陳皮 白朮 茯苓 澤瀉 木通 枝子 花粉 昆布錢各一

當歸 川芎各六分 木香三分 甘草五分 紅熟加黃連胆草

腫甚加高陸射干青鹽或加升麻柴胡羌活以升提之用水煎食遠服

麝香丸 治下疳爛爛作痛婦人陰蝕作痒小兒疳積發熱及口鼻生瘡牙齦蝕爛等症○胡黃連 黃芩 蘆薈 白蘞 子青皮

白雷丸 鶴風草各一 木香錢 射香分 共為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心清米湯送下

消疳疔疔散 治下疳疔疔不可忍者○黑羊角兩二 川山甲炒二錢 乳香錢 沒藥錢 共為末作一服空心黃酒調服

二子消毒散 治袖口疔及楊梅等症○皂角子 肥皂子 姜蠶 蟬退 杏仁各七個 搗牙皂條 金銀花錢三 防風 牛膝各錢

猪板油兩 上茯苓片 用水八碗煎三碗作三次服如結毒服三七日愈 袖口疔加黃柏錢 肥皂子肉搗 楊梅疔加

蒼朮仁 皂角刺各一 側柏葉菜豆糯米各錢 楊梅內疔加海金沙五加皮白丑各五分 而皂角子一歲用一粒

下疳洗約類方

一切疔瘡○金銀花 槐花 黃柏 蒼朮 茶葉 水煎薰洗 腫甚者五倍子三四 蔥頭十餘 一加射干荆芥 一加白芷甘枞

下疳陰蝕等症 葶豆一升煮爛入陳茶葉末一兩乘熱傾入多年淨桶內坐之圍之先薰後洗出汗為度

癢疔發厚洗方○紫漆兩 綠礬兩 水煎薰洗

一切疔瘡腐盡生肌時用之收功甚速○乳香 沒藥 兒茶 輕粉各二 為末用水五碗煎紅黃色浸洗之日用三次潰爛甚者用

鮮猪蹄湯煎約薰洗如法

下疳敷約類方

消毒貴金散 一切疔瘡初起熱甚者○黃連六錢 雞內金二個 俱用猪胆汁浸炙七次 輕粉錢 兒茶錢 水片分 射香分 為末搽用如至

波斯祇 治一切疔瘡久不愈者○珍珠錢三 水片錢二 射香 乳香 沒藥 兒茶 硃砂錢各一 輕粉錢 漏加血竭錢 加枯

棧少許 熱加牛黃青黛錢 毒甚加象牙兩 重便內 痰痛加大土驚錢 沿開加龍骨少許 犯房勞加經布一

錢或肥 受黃柏蝕去龜頭者加龜頭一個或蟹頭俱 存性 右製為末乾搽或人乳調搽或猪膏髓調搽 形大者以生肌膏蓋之俟腐盡生肌

時只以珍珠炒爆加水片等分搽之青蓋不必結痂肉變白色而自愈

月白散 治瘰癧○輕粉錢五 青代分五 水片分 為末先用燒酒調飛丹敷瘡上一二時洗去敷前約 一用兒茶貝齒錢各一

水片三分 為末用 一用黃柏肥 受 白菴等分 為末用

下疳應用方

八珍湯 六味地黃丸

補中益氣湯見橫楊梅一劑散見楊加味五寶丹見倒發門加味道遠散瘰癧門

陰濕門

陰濕瘡之陰毛如芥如癬癢痒難忍由腎虛風熱所致搽銀杏散初次痛甚忌之三日三上則不痛而全愈矣如陰手之際如豆如餅發痒結蠟皮者梅毒也於梅毒門治之

銀杏散 治陰濕瘡癢痒不可忍者○雄黃 乾白果粉 朝腦 生礬子灰等分 右為末用乾燒酒調敷

婦人陰瘡

陰瘡運氣皆屬於寒經曰太陽之勝陰中乃陽隱曲不利治以苦熱 仲景云少陰脈滑而數者陰中生瘡少陰脈長陰中必挺出

夫陰器屬足厥陰肝經任脈之會素問云督脈者其絡循陰器合篡間是屬腎脈也至於足太陽外合清水內屬膀胱而通水道于太陽

外合准水內屬小腸而水道出焉則又屬于足太陽也腎主水則又屬足少陰也食入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺

通調水道下輸膀胱則又屬于太陰也素問又為前陰者宗筋之所聚太陽陽明之所合又屬脾胃也癰瘍生於其間須細心求而

責之不可端生一厥陰經而惟清肝導濕之為事斯無悞矣。

陰脫陰中挺出一由足太陰脾虛或產後遇怒或經風所致初宜清熱疎風次朝服補中益氣湯倍升麻晚服龍胆瀉肝湯外兼敷洗

陰章肥遺腫赤中哭 由肝鬱脾虛所致宜補中益氣湯歸脾湯倍加青皮枝子

陰腫忍熱腫而作痛名蝟疽 由勞傷血分所致宜四物湯加丹皮澤瀉花粉柴胡或秦光湯

陰蝕 陰器外生疔瘡內生小虫作痒難忍又名 匿瘡由胃虛積鬱所致宜四物湯加石菖蒲 龍胆草 黃連木通若寒熱與虛勞相似者虫入

臟也宜消遙散吞蘆薈丸早晚各一服外兼薰次以銀杏散塞入陰中殺虫止痒今若寡居患此隱忍不言以待攻刺疼痛口乾發熱

形削食少者不合症也不治

陰脫 開而不閉也痛痒出水由憂思太過所致宜消遙散歸脾湯俱加柴胡枝子白芍丹皮由產後得者補中益氣湯加五味子白芍

醋炒 俱用荊芥殼訶子文蛤大劑煎湯魚洗

陰癩子宮脫出 癩胡蘆由氣血虛者用補中益氣湯去柴胡倍升麻加益母草外以草麻子肉貼頂心再用枳殼半斤煎湯魚洗 由勞

力負重者所致者火臍下四十五分七壯立效 由思怒不遂肝氣鬱結必先小便時堵塞因而努力久之隨管而下也今穩婆扶正

葫蘆令患婦仰臥以枕墊腰吹噎葯收之收入即緊閉陰器隨以布帛將兩腿縛之即小便亦須夾之內服大補升提之約可以暫安若寡居者須令進步除根

陰瘡主治方

秦光湯 治陰戶腫痛小便濕滯甚者便如馬溺二腿拘攣○秦光六錢 石菖蒲三錢 當歸三錢 葱頭個五○水二鐘煎一鍾食前服 外

用艾葉一兩 防風六錢 大戟五錢 水煎薰洗

牛膝湯 陰內尿血腫痛名血結症也○牛膝五兩 黃酒三斤 煎半斤作三次服

桃仁散 陰腫作痒○桃仁炒為末每服二錢黃酒調服仍搗爛敷之

漏痒湯 洗陰蝕作痒○鶴虱兩 狼毒 苦參 歸尾 葶靈仙 蛇床子各五錢○用河水十碗煎熟加猪胆汁二三個先薰後洗一

加乾漆 又方用椒兩 吳茱萸兩 蛇床子五錢 藜蘆五錢 陳茶葉一握 食鹽二兩 水煎薰洗

文蛤湯 洗陰戶腫痛○文蛤 小麥 皮硝 白礬各一兩 葱白根 水煎薰洗

銀杏散 陰痒生瘡○杏仁去皮 輕粉 水銀各製 雄黃等 為末每用一錢裹肉二個和丸綠綿包裹線扎留頭在外先用前湯

痒湯洗畢次入戶內如小便取出便訖再入一日一換四五個自愈 一加枯礬半錢 用猪肉片 或雞腿一隻煮滾取出搽藥于上

插入戶內冷則易之

三反散 陰疔○鹿角灰一錢 雞內金灰一錢 紅戎灰一錢 黃連一錢 兒茶分 珍珠五錢 輕粉五錢 水片五錢 射香分○共為末一搽

即愈 一用硫黃錢 輕粉五錢 水片三錢 射香分 為末預用黃連二○水二碗煎一碗去渣再煎至一酒盞調前約鵝翎蘸掃

陰內

陰蝕方○雄黃一錢 硫黃分五 桃仁個五 木別子肉二個 艾葉五錢 一加銀硃一錢 紙捲作條安及盆內點着入馬桶內患者坐於上

薰之其虫立出

陰瘡應用方

補中益氣湯見首卷 龍胆瀉肝湯 蘆薈丸 俱見疳瘡門 歸脾湯 逍遙散 俱見癩癧門

囊癰

夫囊癰者陰囊紅熱 由肝腎陰虛濕熱下注所致治以補陰為主清熱滲濕之約佐之 如初起腫痛小便溢滯者清肝滲濕湯或送六

味地黃丸因寒中未經發散者用紺珠丹汗之次用滋陰清濕等藥收腫便閉者服神授衛生散已成者托裏消毒散去枯梗加澤瀉

用川山甲外用如意金黃散煎湯和蜜調敷堅硬無膿紫色作爛欲外腐也蟬酥錠為末搽之膏蓋服滋陰約俟腐脫搽紅黑二膏

如餘腫俱消惟一處不消欲作膿也托裏消毒散倍用皂角刺透之膿熟作脹針之以免過潰其囊法以油頭繩扎住腎子開海底穴膿

出自盡服十全大補湯加牛膝丹皮脹出而仍腫痛者熟艾解也托裏消毒散加胆草枝子柴胡餘腫俱退只一條不消者肝虛也六味

地黃丸去茯苓加五味子兼補中益氣湯加茯苓口乾便數者腎虛也六味地黃丸因膀胱酒毒所乘者六味地黃丸料加車前子牛膝內熱肺熱肝虛也四物湯加參朮體倦食少者脾虛也補中益氣湯腹水清稀者氣血虛也十全大補湯久而不斂者大補湯加麥冬五味子外兼豆豉餅炙之單丸懸露者杉木皮托之紫蘇葉包之或瑩珠膏代之內外得法旬日可瘥若攻其毒則陰道愈虛投淡滲之藥則真陰愈損雖少壯者多成痼疾况虛弱者乎更候作疝治以投熱藥必難收斂以至膿清服大者不治

囊癰與疝氣相類但癰則陰囊紅腫內熱口乾小便赤濕若疝則小腹痛牽引腎子少熱多寒好飲熱湯為異耳若水疝雖腫而光雖痛有時不紅不熱按之軟而即起為異耳宜以針引去水氣則安內服本門之約不作

忽然囊紅發熱陰子一大一小狀若傷寒其發迅速者卵子瘟也宜灸肩尖穴七壯或九壯即愈患左灸右患右灸左取穴立法立視一條伸手扶棍以手與肩平為則則肩上有窩窩即穴也

囊內單丸上忽然突出一點堅硬如筋頭疼痛異常身發寒熱者暗疔也治見疔門因患疔漏久而串及於囊者腎囊癰也治見漏門

囊癰主治方

清肝滲濕湯 治囊癰發熱腫痛小水不利者 川芎 當歸 白芍 生地 柴胡 胆草炒黑 枝子 花粉 黃芩各一 澤瀉

木通 甘草各五 用水二盞煎一盅食前服

囊癰應用方

六味地黃丸 紺珠丹 神授衛生散 托裏消毒散 如意金黃散 十全大補湯 補中益氣湯

瑩珠膏俱見首卷 蟬酥條即蟬酥丸見疔門

腎囊風

腎囊風者陰囊作痒甚則疔瘡頑麻破流脂水由肝經風濕所致宜龍胆瀉肝湯柴胡勝濕湯蒜鼓丸服之蛇床子湯薰洗之

龍胆瀉肝湯 治囊風濕痒及陰腫淋濕等症○胆草用柴胡炒 黃連川吳米 餘如常法見疔門

蒜鼓丸 治陰汗濕痒○淡豆豉為末煨大蒜搗和為丸桐子大硃砂為衣每服三十丸空心用紅粟燈心湯送下

蛇床子湯 囊風疔瘡作痒搔之作痛○蛇床子 葦靈仙 歸尾 苦參各五錢 水煎薰洗一加白礬 一用拓料煎洗 一温醋洗 一用姜湯洗

狼毒膏 治前疔并一切痒瘡○狼毒 栝榔 硫黃 文蛤 川椒 枯礬 蛇床子 大楓子各三錢 為末用香油一大盞煎滾入

皮硝三錢再煎滾下公猪胆汁一個和勻調前約搽患處

腎臟風瘡

腎臟風瘡即腎囊風也以其久之則有耳鳴目痒鼻赤齒浮手又白色等症及上攻下注遍體生瘡宜

三因四生散 戴院使云前症因精氣不調襲風所致○白附子 白蔘黎炒去 黃芪炙 羌活等分 為末每服二錢鹽酒送下或

用猪腰子剖開拌藥加鹽煨熟食之 婦人血風瘡亦驗

青兒膏 治前症并婦人臍下連二陰生瘡狀如馬刀痛出黃汗食減身浮二便濕滯由中下二焦風熱所致若熱氣不出當內痔腸癰

馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗之相乾再換消腫止痛退熱立驗內再服八症散尤佳

肩部

經絡 肩之上廉屬手足少陽經前廉屬手陽明經後廉屬手太陽經

肩疽生丁腫赤引背靈樞為疔癰甚連腦脇治宜汗之瀕汗出至足無害四五日內病熾之 一災會宗穴三七壯甚者又肩貞穴七壯

肩癰生肩外垂骨 恐膿深徹骨處傷筋脈拘攣宜緩筋之藥餌之

過疔疽連腋為者一名 乾疽一名丁疽令人寒戰口噤身熱不赤此手足三陽交會之所由風襲熱鬱所致十日可刺無血者死

太陰疽生一肩背骨 肩後疽屬手太陰肺經積熱所致即連子發也若色黑喘嗽大渴胸滿脈微者不治

蜂窠疽生二十肩前 先熱後寒皮赤潰有四十九窠形如蜂窠 災三間穴二七壯

右按症與腫瘍潰瘍總治例同法

臍部自肩至

四股者諸陽之本也陽寔則肢腫陽虛則肢滿又云脾主四肢脾寔則四肢不舉濕感 脾虛則四肢不用燥情 又臍背須別六經究其

痛在何經加以本經之藥行其氣血則症愈矣別經之法以兩手伸直貼身垂下大指居前小指居後而定之則其背臍之前廉者屬

陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉屬太陽經以藜本羌活行之外廉屬少陽經以柴胡行之內廉屬厥陰經以柴胡青皮行之內前

廉屬太陰經以升麻白芷葱白行之內後廉屬少陰經以細辛獨活行之又薄桂味淡能橫行手臂引他藥直至痛處白薑黃之性亦

同何則為非辛不能以達四肢也治肩膊風寒濕一切痠痛服調痛無憂散立止見諸痛門

癰疽背表 色赤而堅惟肘節處差小故又名藕包毒 災少海穴七壯

臍疽連腋 災會宗穴六七壯

樂疽生內 堅如棉子按之痛入骨惡風 災腋門穴三七壯

肩風毒生背 腫連肩頤

臂癱生肩外垂骨兩投骨處由榮衛不調所致如脈深微骨處傷筋脈拳縮治宜緩筋之藥

魚肚發生於內

按右症初宜衛生散或觸痛無憂散加羌活獨活桂枝酒水煎服 若漫腫無頭服敗毒約不消者十全大補湯加桔梗桂枝九之托之不應者由濕痰流注經絡也榮衛返魂湯加南星酒芥調之若臂痛不能舉及左右轉痛者由中腕伏痰也宜千金指迷丸九轉玉華丹導之 脈細皮寒瀉利不食者為五虛雖盛暑之時托裏溫中湯之類溫之甚者臍膜冷痛昏愒灸左乳下黑肉盡處二七壯 脈緊細而筋掣者肝虛而有風寒也四物湯加丹皮澤瀉白朮潰滯而不痛胃氣虛也膿水清稀瘡口不合氣血虛也俱大補之

石榴疽生肘上下餘亦初起黃粟小泡根便開大色紅堅硬腫如覆碗破翻如榴寒如瘡由少陽相火與外濕相搏所致初起宜蟬酥丸汗之以艾炷九壯貼蟬酥餅益膏煨腫處敷黃金散次服消毒無憂散加菊花清之煩燥熱甚者護心散金液戊土丹九日後作稠膿痛減進食表裏俱退者可保無虞反此者逆潰後同潰瘍調理一法破後惟菊花益煎湯洗之最佳次以菊花燒灰存性加輕粉兌勻敷之諸藥不及此 或灸天井穴

肘癱生於經云心肺有邪其氣留於兩肘治同

白芷升麻湯 治臂腫痛乃陽明經分野由八風之變者然身半已上風受之治宜傷風和經脈使無壅滯亦發表之意也○黃芪二酒芥二 生芥一 白芷八 連翹二 升麻五 桔梗五 酒紅花三 炙甘草三 酒水各一盅煎八分食遠執服

臍部應用方

神授衛生散 十全大補湯 托裏溫中湯 黃金散 護心散俱見首卷 蠟痛無憂散見諸痛

榮衛返魂湯見腫毒 九轉玉華丹 千金指迷丸俱証治 蟬酥餅 蟬酥丸俱見疔瘡門

經絡與臍部同

腕癱生手屈處由手三陽風熱所致

兌疽生於腕動脈之間痛徹手搏

穿骨疽生於腕動脈之間

骨蟻疽生於手背初起如粟如豆旬日內大如核桃色紫枯而痛甚由積憂鬱怒所致善於遊走發搐拘急見惡症者不治亦由陰虛

之極火獨光之故發暴而死速也

蜈蚣串生兩手及手初起筋骨陰痛漫腫堅硬不紅不熱或連腫數塊日久破流白漿串通諸竅腫痛仍在虛症并生由思慮傷脾氣鬱
所致惟氣血澆薄者多有之始終俱宜益氣養營湯加味逍遙散扶助元氣十中可保二三如補而不應者不治

臂癱前臍即見

手部

經絡 大拇指屬手太陰肺經食指屬手陽明大腸經中指屬手厥陰心包絡經無名指屬手少陽三焦經小指屬手少陰心經

手發背生背初如水刺無頭漫腫破爛至骨由二陽風熱所致宜羌活散熱加姜黃寒加桂枝 有表症者紺珠丹汗之裏症者內疏黃

連湯下之元氣虛者宜大補之

手心毒生行一名穿掌毒由心包絡經積熱所致

手癩生行掌邊一名穿掌毒二症同治手發背外用鴉節煎湯浸洗再搥田螺肉敷之

病蝦生行背腫赤如蝦用消毒等約外以鹽糟油炒令香淬以熱湯淋洗患處

合谷疔生行虎口疽了又毒孽解毒皆其名也如初生小泡疔瘡癢熱焮痛者多有紅絲上腋由手足陽明濕熱攻注初宜刺破瘡頂

搽拔疔散益膏餘腫處磨礬子塗之內服蟬酥丸或紺珠丹汗之膿成脹痛者針之插蟬酥條膏益自愈

手入發結腫癰痛也治同虎口疽災內關間使各三七壯

調疽生行指大指頭若名燥疽敷也初發如粟如豆漸大如桃如李青紫麻木痒痛徹心俱由肺經積熱所致四日宜刺得膿血者生

黑血者死若黑色無膿不痛者則又名斷指也治宜截之與脫疽同治

蛇頭疔生行手一名天蛇毒腫若蛇頭痛楚連心寒熱交作由心經心胞絡二經積熱所致初起用代指膏豬胆敷未若用陽燧鏡子於

指頭上灸五壯反大痛少時即愈或內服蟬丸汗之 失治破後腫仍不消者 蟬酥條黑膏益之腐爛者紅黑二膏貼之虛而不

飲者補之

蛇眼疔生行指蛇疔生行指又魚肚疔生指甲中斷前蛇節疔又蛇節疔生指中斷而腫如魚肚生指甲中斷前且痛連肘背

凡手部生毒膿成脹痛者即宜針之然針亦有法如手指有毒用繩或細帶先扎指根如掌背生毒用繩帶先扎手腕少時則手指掌

處脹急難堪隨用披針劃破出膿水令完以約水洗淨搽生肌藥令遍隨以膏藥裹之續條縛之舉方去所扎繩帶即合口而愈

代指疔指腫熱痛結膿甚者指甲脫落症類指疽然無蘊毒故不暗黑也由血熱所致得冷藥一味清

僵螂疔生行指背高腫形如蟬肚與屍蝕癰相似然此疔初起不紅不熱不痛日久方痛痛久方腐腫仍不消非若蝕癰之暴發也由

手少陰痰氣凝滯而生腫則以離宮鏡子塗之腐則以蟬酥餅子貼之內服滋補之藥免變虛勞是症非以年計不可以言愈也

窩瘡手足形如菜葉相對痒痛破流黃汁浸淫時痒時痛發於風濕客於膚脈也以殺虫為主用藜蘆膏敷之

狐狸刺 由手指指著處木痛不可忍十日後瘡口日深用蒲公英根滴白汁塗之
鴉掌風 初起紫斑白點久則皮枯堅厚或破裂不已由胃熱血燥兼外受風寒所致亦有因生時瘡餘毒未盡結於此宜二礬散洗之
三油膏 搽之或紺珠膏久貼亦愈再與楊梅門參考

手部主治方

羌活散 治手發背及手掌毒○羌活 獨活 前胡 桔梗 烏藥
煎一鍾食遠服

代指膏

治代指○雄黃 朴硝 等分 用猪胆汁少加香油調塗
藜蘆膏 治窩瘡痒痛黃水浸淫○藜蘆 苦參 附 一 脂脂 羊斤

兩攪勻塗之以瘥為度

二礬散 鴉掌風皮膚枯厚破裂作痛越重越妙○白礬 皂礬 側柏葉 斤 水十碗煎數滾聽用先以桐油搽患處

次以紙糊蘸桐油點着向患處薰之片時次用前湯乘熱淨桶內手架上用布蓋以湯氣薰之勿令泄氣待微熱傾入盆內蘸洗
良久一次可愈七日不愈見一用婦人經布滾水洗下炸患處効

二油膏 鴉掌風及血風等瘡○柏油 牛油 香油 各一 黃蠟 兩 銀珠 兩 呂粉 二 射香 二 成膏搽患處火烘之以油乾為

度手部應用方

內疎黃連湯

陽燧錠子

離宮錠子 俱見 首卷

蟬酥丸

拔疔散 俱見 片門

紺珠丹 股部足三陰之脈在外曰股 股部足三陰之脈在內曰股

經絡 前廉足陽明胃經後廉足太陽膀胱經外廉足少陽胆經內廉足厥陰肝經內前廉足太陰脾經內後廉足少陰腎經

股陰疽 生股內陰形長微赤痛甚膝曲難伸上發下易治下發上難醫灸商丘穴七壯或灸膝下外廉橫骨盡處
陰疽 三寸在左 漫腫痛連陰子上及小腹下及大腿中中都穴二七壯

玄疽 生夾縫之 灸灸溝穴三七壯

伏兔 生膝下寒熱焮腫無頭疼痛徹心

肚門癰 生于大 腰肚

箕門癰 生于大 近膝

履陽疽生於靈樞云腫不變色內薄於骨

環跳疽生於環跳腫脹痛尺脈沉緊腿不能伸

按右症初起紅腫痛者神授衛生散漫腫大痛者內托黃芪湯 痛而筋攣脈弦而緊者紺珠丹汗之痛止易以神應養真丹 遍

身走漏兩日後脚面結腫腿股結塊脈浮輕重緩者由寒外襲也紺珠丹汗之痛止則宜托裏倍加參朮歸芪 嫩腫便閉煩燥飲冷

脈數者熱淫於內也內疎黃連湯貴陰下之 腫痛寒熱發湯脈洪數而有力飲食如常者由足三陽之濕熱壅滯也蘇敗毒散腫

痛寒熱止易以逍遙散 腫痛色不變寒熱食少體倦者由脾虛濕瘦下注也補中益氣湯加茯苓半夏芍約患此入房腫硬二便不

通者六味丸料加牛膝車前二便利仍用補中湯 潰而膿清者十全大補湯加牛膝外以豆豉餅灸之再瘡口紫陷者再加大附子

外加以附子餅灸之 食少者胃弱也諸虛皆稟於胃宜六君子湯加藿香當歸俟食進更以十全大補 膿出惡寒不食脈細如絲

者用人參一兩附子三錢姜棗煎服 潰而反痛氣血虛也峻補之補之則氣化氣化則痛自除 再環跳疽者由脾移寒於肝也惟

黃狗下頰方神驗煎助以胃氣更宜外刺委中穴出血血自差

附骨疽性狀腫性狀腫下而堅者發於筋骨乃陰寒入骨之病也初起則寒熱交作稍似風邪隨後筋骨作痛不紅不熱疼至徹

骨甚者不能曲伸或皮肉微急洪洪如肥狀是症皆宜灸之熨之以散毒氣補陽氣溫脾氣為主 灸法於痛處週圍灸之百壯起泡

可治無泡難治或以筋頭點痛處墨計之艾灸百壯以爆為度又以患骨覺骨中痛為効又附骨疽灸懸鐘穴七壯咬骨疽灸陰包穴

三七壯環跳穴痛灸崑崙穴二七壯 初起寒熱作痛者以紺珠丹汗之次以大风風行經絡活血補虛

生於尻髻漫腫作痛者內托羌活湯生內服近膝漫腫不痛者內托芪朮湯生腿外側漫腫作痛者內托酒煎湯 然必外某灸之熨

之淋洗之以助其陽益腎主骨腎虛則骨冷寒邪乘之則氣血凝滯但能為腫不能為膿故流注者乃傷寒之餘毒由表之未盡也附

骨疽者乃流注之壞症由涼藥之誤也久之陰極生陽寒化為熱熱甚則肉腐化而為膿也 欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者針

之裏者膿稠十全大補湯虛者膿清保元大成湯若氣敗者死食少體倦者香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯 久潰不已者

必出朽骨視其膿膿白清稀者朽骨初脫內深難取膿白而稠者朽骨將出肉脫

大抵瘡疽旬日不退則宜托裏有膿針之有腐取之虛則補之方能收十全之功有因復犯身慾勞傷致令寒熱互變血垂違經脈積

解受病日深以成斯疾者則大腿漸漸腫如冬瓜上過膝腹下連足底牽連漫腫日久潰膿色白腥穢腫痛不減元氣日衰者終為不

腿遊風 外腿忽熱赤腫熱痛按之如泥不復起者由風熱相搏所致宜砭去惡血服當歸拈痛湯及紺珠丹和之

服部主治方

內托羌活湯 治尻髻堅硬腫痛兩尺脈緊數按之無力者○羌活 黃柏酒浸 防風 歸尾 藥本各一 黃芪一錢 肉桂三

連翹 蒼朮 陳皮 甘草 各六 紅花 五 用酒各一鍾煎八分食遠服

內托酒煎散 治寒濕發於腿外側少陽經分野患癱或附骨癱堅硬漫腫作膿或流至足陽明經者○黃芪 當歸 各二 柴胡 一分

連翹 肉桂 大力子 各一 升麻 黃柏 甘草 各四 用水酒各一鍾煎一鍾食前服

大防風湯 治三陰不足風邪乘於兩膝作痛久則膝愈大而腿愈細因名鶴膝風乃敗症也非此方不能治 又治附骨疽皮色不變大

腿通腫疼痛無名瘡後脚痛緩弱不能行步或腿膝腫痛○防風 錢 人參 錢 白朮 黃芪 杜仲 牛膝 當歸 川芎 白芍

神應養真丹 治足厥陰肝經為四氣所襲脚膝無力及左癱右瘓手足頑麻語言澁濕遍身疼痛○當歸 川芎 白芍 熟地 酒蒸

黃犬下頰方 治壯癰小腹癰及腿內貼骨癰神效然而亦治發背大抵此方治下部癰疽更効

黃狗下頰 治連古連皮毛帶入確內益泥封固鐵蓋封口一炷香煙烟消即止取出色黑如皮為度全要存性若帶 豆粉 俗名

汗及熟睡為準 按此方世多用之為敷約散腫止痛而不知可以內服為下部癰疽內消之聖藥也一輪夫環跳穴痛甚如難噉

火灼與此約三錢酒服之未瘡更進一服則霍然如失

川山甲散 治癰疽漫腫不變色者能托裏排膿及附骨疽在裏能內消止痛○露蜂房 兩 蛟蟻 二錢 頭髮 二錢 五分 頭髮 二錢 五分 一方

瓜萋內托散 癰發外腿外側者善能活血消毒○瓜萋 一個 半 人參 歸尾 沒藥 各五 甘草 錢 黃酒 二碗 煎一碗 食前服

還少丹 治鶴膝風等症此約補腎進飲食誠對症之良劑也○熟地 黃 山約 炒 山萊萸 白茯苓 枸杞 巴戟天 酒 牛膝

五味子 肉蓯蓉 酒浸去鹹 杜仲 酒炒 遠志 浸甘草水 栝子 酒 石菖蒲 忌談 小茴香 鹽酒 續斷 酒 兔絲子

追風逐濕膏 治骨節疼痛濕痺麻木筋攣等症○西聖膏 首斬 規 木香 胡椒 各一 白芥子 兩 為末入膏內攪勻攤貼痛處

外灸方 治風寒濕氣腰脚疼痛○良姜 防己 等分為末搗大蒜和為餅安痛處鋪艾灸之以痛至不痛不痛至痛為度

敷腫方 治膝痛并寒濕脚氣○天蛤 燻 吳茱萸 等分 右為末用米醋調敷痛處

承昇膏 治附骨疽痛○銀硃 為末燒酒調敷如腫毒用生桐油調敷

金蟬膏 治骨疽膿汁敗壞骨從瘡口出者○大蝦蟆 一 亂頭髮 雞子 大 猪脂油 四兩 二味燻枯去渣收用先以桑白皮為豆煎

易淋洗瘡口找乾擦之

一治多骨疽及瘰癧瘡用蜜陀僧末用桐油調敷

一人股內側痛久醫作痛風治月餘固勁腰熟肉厚不能穿穴因潰入腹精神昏憤粥不進請予視之脈細如絲氣息奄奄故絕曰可治以披針刺腹腹大泄數升然皆清膿如水瘡口如蟹吐沫疑其透膜曰無傷也投以參芪附子加以厥陰引經藥大劑服之再食前吞八味地黃丸百丸食大進日噉飯升餘肉數鬻旬日而瘡所以知其可治者潰瘍之脈洪實者死微細者生今脈微細形症相合知其受補也所以信其不透膜即透膜亦可治者無惡候也服八味丸者使腎氣旺上升則胃口而納食也瀉膿雖多更進以開胃藥使多食梁肉以補之肌自速生此治瘍潰之大法也

股部應用方

神授衛生散

內躡黃連湯

貴金丸

補中益氣湯

六味地黃丸

十全大補湯

六君子湯

刺委中穴法

按穴灸法

八珍湯

保元大成湯

香砂六君子湯

俱見遺選散 應門

振蘇敗毒散

膝部

經曰肉之小會為絡絡者二肘二膝四腕也

又曰脾病在絡

又曰腎有邪其氣留於兩膝

諸筋皆屬於節筋病皆屬於節又屬於肝也筋

病無多食酸忌用風藥

諸癰發於節而相應者不治應為內發透外也

發於陽者百日死發於陰者二十日死陽為諸節之背陰為諸節前却間也

疝疽發于靈樞云其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之者死 疔之者生

膝癰膝蓋腫痛也 初起用衛生散加牛膝或用加味二妙散

膝眼風膝之兩旁有穴名眼穴 初起腫痛如錐寒熱偏劇宜紺珠丹和之

鶴膝風兩膝內寒熱作痛如虎咬股漸細而膝愈大是也 屬足少陽陽明二經初宜紺珠丹汗之外以玉龍膏酒調敷之以住痛回陽如汗後腫痛不減陰寒深伏也大防風湯溫之或加乳香以住痛舒筋灸膝眼穴二七壯甚者見青筋痛引足心灸三陰交穴二七壯待

膝伸直為止再甚者則於膝頂上灸七壯乃秘穴也

透膝風只心膝痛引發微熱不甚腫初宜紺珠丹汗之

石疽腫色漫腫疼痛堅硬如石此寒氣之腫也 或搵生商陸根加鹽少許敷之

緩疽 其熱緩慢積日不潰久乃點紫皮肉俱爛二症俱宜溫補

按右諸症雖云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛而邪氣得以深襲之也故附骨疽鶴膝風等症由腎氣虛者多有之前人出

附子者為溫補腎氣又能行約勢以散寒熱也 亦有體虛露臥為冷氣所襲者則不能轉側乍熱而無汗按之其痛應骨為賊風所傷者則不甚熱而惡寒不時汗出發之而痛少止俱服大防風湯數王龍膏可愈如失治則變痺肉偏枯之敗症矣 又兩膝腫而腿筋弛長者由陰虛濕熱所乘也主以六味丸佐以八珍湯加牛膝杜仲間以補中益氣湯又脾胃虛者以補中益氣湯若精涸口乾中氣不足也加五味子頭暈頭痛陽氣不升也加蔓荊子 肝腎傷者則形瘦嗜臥寢息發熱痰感作渴小便頻數五臟虛損也俱宜六味地黃湯勝腹疼痛夜多漩溺脚膝無力頭暈吐痰腎氣冷取也宜八味地黃丸 膿成及潰後畏熱憎寒者陽氣虛也膿水清稀不生膿者氣血虛也虛熱往來有時而動者無根虛火也俱宜十全大補湯

按右三湯俱佐以大防風湯為要再如食少腹脹脾胃虛也四君子湯而色痿黃脾胃弱也六君子湯發熱睛熱陰血虛也四物加參芪白朮發熱大渴而不欲近衣面目赤色脈大而虛者血虛發燥也當歸補血湯

委中^{毒腫}搗碎中堅硬如石微腫微紅白胆經積熱流入膀胱也治緩則筋縮而成廢疾宜刺委中穴筋上出紫黑血又宜服逐瘀活血等藥俟瘀血下自消

上水魚^{生爛}結長核如魚作腫痛宜用針亂刺核上出其惡血再以活瘀之約敷之

膝部主治方

加味二妙散 治膝腫初起者○黃柏^炒 蒼朮 歸尾 赤芍 桃仁 南星 牛膝 胆草^{各一錢} 黃芩 連翹 羌活^{各五錢} 紅

花^{木通} 甘草^{各三錢} 金銀花^{二錢} 用水二盞煎八分加姜汁二匙食前服

藥酒方 治鶴膝等風○松節^{二兩} 青風藤 虎脛骨 草烏^{姜汁浸炒} 威靈仙 薏苡仁 杜仲 五加皮^{續連} 當歸 牛膝 川芎

金銀花 紅花^{各一兩} 木瓜^{八錢} 白芷 川山甲 獨活 沒藥 乳香^{各五錢} 肥皁子^{仁四兩} 核桃仁^{四兩} 燒酒^{斤三十}

黃蠟^{四兩} 入坛內封口重湯煮三炷香取出埋土內三日空心前食任服核桃肉過口

五加皮酒方 治鶴膝等風○五加皮^{八兩} 當歸^{五兩} 牛膝^{四兩} 無灰酒^斗 煮三香日二服以醪為度

洗方 治鶴膝等方○斬艾半斤水煎蒸洗洗一次消一分

膝部應用方

神授衛生散 紺珠丹 回陽王龍膏 大防風湯^{俱服} 六味地黃丸 八珍湯 補中益氣湯

八味地黃丸 十全大補湯 四君子湯 六君子湯^{俱見首卷}

脛部

三里發^生三形如牛眼五七日出黑血拘急冷痛由勞力傷筋所致惟宜湯約射出外自愈

腫脹發熱手足寒熱煩燥由腎虛積熱所致初宜衛生散加牛膝木瓜已潰用十全大補湯及腎氣丸補之出清水者死

黃蠟癰生四寸內腫長脛陰疽微紅微腫堅硬如石痛甚由脾經濕熱或肝經積憤所致初宜五香流氣飲加下部引經藥潰而出清水

嘔吐不食者不治

青蛇毒生足趾之打寒熱不食由足少陰太陽濕熱下注蛟頭向下者順向上難治宜針蛟頭出血搽拔疔散腫處塗離宮錠子內服

約與腫脹發同

接骨發生足趾之形如核桃色赤堅腫不痛宜早出膿慮其損筋

附陰疽生于內踝已上初起小泡漸生赤腫痛能徹骨如無膿者不治

內踝疽生于內踝帶靈靈種走緩色不變而石屬肝胃二經虛熱

外踝疽生于外屬胆與膀胱虛熱

穿踝疽初則內踝腫久則外由足三陰經虛熱下注初宜紺珠丹榮衛返魂湯膿成者針之潰者補之補而不應者必成廢疾 災患

足大指端三壯

濕毒流注生于足脛由風濕外浸初宜紺珠丹加下部藥

瓜藤纏生于結核數枝腫痛久之潰爛不已屬足太陽經濕熱初宜榮衛返魂湯加減或五香流氣飲

腎氣遊風生于紅腫熱痛 宜紫蘇流氣飲及栲柳丸

血風瘡生于疔風瘡由三陰經風疔血燥所致初發則搔痒無皮破流脂之日漸沿開宜當歸飲子加椶子柴胡忌投風藥如寒熱食少

體倦者肝脾鬱火也八味逍遙散噴熱盜汗者腎肝虛也六味地黃丸若婦人則由經脈不調血氣滯於足陽明也五積散加黃柏牛

膝俱外兼敷洗

腫瘡入裙風瘡口生於外腫者由三陽經濕熱易治宜胃苓湯加紫蘇牛膝以滲濕次服八珍湯加荊芥防風羌活白芷連翹金銀花

以圖本

生於內腫者由三陰經虛熱難痊宜補中益氣湯加茯苓白芍芍藥及六味地黃丸八味地黃丸外兼洗貼蒸熨等法

膿漏生于疔孔深出水用石灰升入盆內冲白沸湯先薰後洗以瘡發痒為効

四寶風生于疔一月一發痒不可忍形如風痺搔破成瘡用大麥升入砂鍋內水煮熟先薰後洗日二三次五七日可愈

脛部主治方

紫蘇流氣飲 治腎氣遊方○紫蘇 厚朴 陳皮 香附 栲柳 大腹皮 桔梗 芍藥 白芷 甘草 用水二盞生姜三片紅

棧二個煎一鍾食前服

栝榔丸 治症同前○枳殼二兩 栝榔二兩 大黃四兩 木瓜兩 木香兩 為末煉蜜為丸桐子大每服三十九酒水任下

當歸餅子 治血燥膚痒及風熱瘡疥○當歸 川芎 白芍 生地 防風 荆芥 白蒺藜 何首烏各一 黃芪五分 甘草五分

水二盞煎一盞食遠服

搜風順氣丸 見痔瘡門 並癩風門 治腰腿疼痛風濕脚氣及下注一切惡瘡

海桐皮酒 治風熱疼痛○海桐皮 五加皮 薏苡仁 獨活 防風 全蝎炒 杜仲炒 牛膝各一 生地兩 右吹咀入浸無

灰酒一斗五升密封春冬浸七日夏秋浸三日任服

玄精湯 洗血風瘡并腫瘡痒至徹骨者○用益酒水溫洗之或食鹽一碗滾水沖化洗之洗去腐肉以出紅筋為度則好肉自生次用

雄黃黃柏各二 輕粉三錢 和勻敷之絹帛扎之半月方解 一用漏蘆煎湯洗之

乳香法紙 治爪風等瘡及一切寒濕瘡○呈文油紙四張每張篩乳香末五錢 雙折摺一寸闊復作三折兩頭線扎用甘草二兩 水三

碗煮紙須壓之煮一炷香取起去線將紙攤桌上每張用輕粉三錢 不可研篩紙上用棕肘刷之令勻陰乾收用時大小剪貼三日

一換自然生肌如無水出不必再換

銀蠟法紙 治症同前○厚綿紙鋪熱鐺上用黃蠟於紙上擦之令蠟化入紙內候冷用真輕粉勻篩紙上摺注壓收用隨瘡大小剪塊

漣潤紙貼之一日一換即痒

栝粉膏 治血風等瘡○輕粉為末用生栝油調隨瘡大小攤紙上先用米泔水煎甘草洗過貼之布扎緊勿動先三日痛次二日痒再

二日共七日去約已全愈矣

三益膏 治血風腫瘡○先用銀珠加草麻子肉杵如泥作夾紙膏貼去黑肉冷盡隨煮豬頭湯洗之次用青布五寸入生豬板油一兩

白蠟末三錢捲條燃着接其油搽之愈

生香膏 腫瘡血風等症○白松香四兩 用葱汁生豬板油二兩 搗成膏貼之次用紅粉生肌

絳礪膏 治下部一切寒濕血風頑腫等症

香油半斤 荆芥 防風 川椒各一 槐枝兩 杏仁五錢 煎枯去渣入黃蠟一兩溶化離火再下 礪砂五錢 乳香 沒

藥 兒茶錢三 黃丹錢一 血竭錢二 一加樟腦五錢 白花蛇五分 攪勻收用

疔疥約 脛瘡多年者不愈此効 水銀 蚊蛤 呂粉 松香各三 陀僧錢 銀珠分五 樟腦錢四 象牙錢三 珍珠分二 大楓子分三

核桃肉十三 共搗勻加香油調敷

松油膏 治血風等瘡諸約固効者○枯癩十 卷紅二 射香三 水片五 熊胆錢 輕粉三 乳香 沒約 黃丹 甘草 黃

柏 大楓子肉 天麻子肉 四味俱炒黑 色各五錢 雄黃各一 蒼朮 厚朴 苦參各一 右為末先用槐枝蔥艾川椒煎水洗過次

用松油調敷紙蓋布扎二日一換敷洗如前

取松油法取節松五六斤劈如指尖粗細用水缸一個貯水於內用銅盆一個水浸盆底與缸平上用米篩一個堆松節於篩上

次用稻草蓋松節令密頂上置火筒松節烟出即用反蓋之松油自下盆內碟瓶收之勿令泄氣其松節燒過而米篩不壞為異

弘濟膏 治下部浸淫疥及上部頭面癩蝕等瘡雄黑豆炒累研破入酒瓶內與血餘相間鋪之七八分滿以鉄絲罩口或槐柳枝塞之

次將方磚一個中鑿一孔以瓶口倒合於磚口內泥封塞再次挖地一井井內安碗一個將磚蓋井上以瓶口對碗為要磚四面封塞

勿令通風次以乾馬糞堆磚上以埋過瓶底為度火上燃火焚之過宿俟灰冷取出碗內油以鵝翎蘸掃患處

瀕膿蒸法 取豆腐切指厚片隨瘡大小貼之腐上鋪艾爇之爇完加艾以腐水乾換再爇如前腐以三換艾以勸許為度則頑腐皆化

次敷他藥方能獲効 一用麵作井圍瘡口井內安蠟餅一銅錢厚蠟上鋪艾爇之其蠟則化入瘡內俟火盡去艾灰其瘡之腐肉及

四邊鎖口盡行挑去換生肌約收口

脛部應用方

補中益氣湯

十全大補湯

腎氣丸

八珍湯

離宮錠子

足部

衛生散

榮衛返魂湯 見腫毒門

八味逍遙散 見腫毒門

拔疔散 見疔瘡門

五香流氣飲 見流注門

經絡足跌屬肝胆胃三經足大指屬肝脾二經次指中指俱屬胃經四指屬胆經小指屬膀胱經

足跗發一 足發背屬肝胃二經之會由濕熱乘虛下注也初宜衛生散加木瓜麻柳紫蘇之類為引壯寔者由風疫熱積而成宜牛黃

金虎丹繼以十全大補湯托裏溫中湯 陽疽發足跌膿稠可治膿清難治紫陷黑血者不治

足心癰一名湧泉疽 初起湧泉一發熱乃其兆也由腎陰虛損所致宜隔蒜灸之服活命飲送六味地黃丸有表裏症者量為汗下已

成者十全大補湯八味地黃丸大劑餌之取多年羊角燈薰之若黑陷不腫不潰膿穢煩渴嘔逆小便淋濕疼痛徹骨脈微代者為三

陰敗症也不治 脫疽生手足大指初起黃泡次如煮熟紅裏久則黑氣浸漫相傳五指由膏梁之變及丹石熱約之所致此毒積於骨髓不紫黑者生未

過節者可治若黑漫五指上傷足跌形枯筋繃疼痛氣穢者空是症也在肉則割之在指則截之欲其筋隨筋出交洩其毒若待毒筋

內斷骨雖去而仍流者亦不治也有為遺體不忍傷之而至夭者則才傷矣然又不可一己醫治必與眾議更聽患者情意方可益為

截法於未延敵時用頭髮十餘根纏患指本節盡處扎十餘轉漸漸緊之隨用蟬酥餅敷原起未粒頭上加艾灸至肉枯瘡死為度次日本指盡畢方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下如血流以金刀散止之餘腫以離宮錠子塗之次日倘有黑氣未盡單用蟬酥餅研末搽之膏益之黑氣自退其必自生用紅黑二膏照常法生肌收口內服滋腎健脾安神補氣養血等約瀆內無變症外無混雜十中可治三四若割取之後黑氣仍漫痛腫尤甚氣穢無膿口乾舌硬神昏不食者死 一灸有關穴 有因修甲受傷父傷東傷女

因扎傷所致者宜各詳其因分而治之此為形似而來辨穴真而受異也

敦疽惟大指為脫疽其餘足脂發腫痛赤色自潰者由元氣虛而濕毒壅盛也宜隔蒜灸之或陽燧錠子灸之離宮錠子塗之服無憂散托裏散已潰十全大補湯加減八味丸 灸髀骨共數壯 若先渴而後患者或先患而後渴者色黑而不潰不痛者此由高梁傷

脾房勞傷腎精氣已竭也不治或治如前法亦有得生者

甲疽因剪甲傷肌或甲長侵肉致使氣血沮遏而不通久之腐潰而生瘡泡或旁肉裹上指甲腫痛者此肌肉之病不循經絡亦不形於胗也大抵甲

疽惟宜刷甲則不約可愈先用陳皮煎湯浸洗次用木綿旋搗塞入甲內漸漸添之靴甲起以刀剪去之捺烏倍散

足跟疽生于足跟兔留若免之嚙也 此處乃督脈發源之所腎經所過之地若瘡口不合則矯氣不能發生腎氣由此而洩惟宜大補

否為終身之疾如漫腫寒熱體倦食少者脾虛下陷也補中益氣湯補氣作痛頭目不清者脾虛陰火也補中并六味地黃丸痰涎上

升口舌生瘡腎水乾涸也補中并加減地黃丸皆以滋其化源也 外以益湯洗之白朮為末搽之二日一換

厲癰生于小指宛下四淫生于足上下二症辨形如脫疽用約如敦疽

再足脂縫腫痒出水者脚心發熱作痒肌羸作渴吐痰者俱用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源腫硬色白不潰者由陰盛為外寒所

襲也大防風湯若端攻其毒未見其有生也 足指縫爛至足底大塊厚皮脫去外若淺而內深痛難行步者取東行桑樹根白皮四

兩搗爛同生白酒入瓶內重湯煮十數滾取服再飲以醉為度

臭田螺指足起白班作爛痒痛流水甚則寒熱足面俱腫由腎經濕熱下注用甘草湯洗之嚼細茶塗之或用鵝掌皮燒存性敷之或生

桐油調敷甚者蟬酥餅搽之三日後易珍珠散腫處敷黃金散

程寒足根腫脹由熱脚下水見風致令氣滯血枯所致初起用盆一個內安磚磚上安鵝囊囊上合單篋以脚踏單篋上次以滾水從

傍冲入蒸之浸之冷則易之或用新磚燒紅用韭菜汁和醋潑之以脚踏之薰之內膿攻注者針之硬皮敲裂者剪之破流膿水者斗

角散肉不生者絳珠膏皮不生者珍珠散

土粟生足跟 黃腫如琉璃無膿由行路崎嶇腫痛傷筋骨所致宜活命飲膿熟針之

冷疔生足跟初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛紫黑深孔出血水氣穢經水不瘥宜神燈炮炮之鉄粉散敷之

脚氣瘡生足跟間由腎虛風濕相搏所致久則漸增腫痛出黃水身熱經久不瘥宜服犀角散洗漏蘆湯敷龍骨散

田螺泡足生疔忽如火燃隨生紫白黃泡脹痛由脾經風熱所致服解毒瀉脾湯外則挑破貼膏

肉刺俗名用針撥破以蟬酥五分湯化調鉛粉一塗之裏之一以刀修淨厚皮取河豚魚胆塗紙上貼之二三次不發或以胆陰乾收用

足部主治方

牛黃金虎丹 治足面生瘡下連大指上連腫骨母歲數發痒痛不常血出如湧服此丹良久大痛下硬物數十粒如鉄則痛痒頓除數

日結痂而愈此方原載風門治中風痰涎壅塞今以之治臑腑久積熱毒如神○牛黃五 水片錢 賦粉錢 雄黃兩三 白礬五

分 金箔為衣 天雄泡去皮臍 胆南星五錢或酒 天竺黃錢 右為末煉蜜為丸重錢半金箔為衣每服一丸新汲水化下孕

婦勿服

百草霜 脚面生瘡浸淫不已不問痒痛新舊悉效羊糞置瓦上四畔炭火燒盡覆存性為末麻油調敷痒加輕粉痛入射香

烏倍散 治散甲 草烏錢 白丑兩 龍骨二錢 文蛤全者 先將三味搥碎入文蛤同炒至焦黑只用五倍子為末麻油敷濕則

牛角散 治牛程蹇破流膿水○牛角尖燒灰 水龍骨 松香 輕粉等分 右為末用牛骨髓調搽

鉄粉散 治冷疔○生鉄粉即針砂如無用黑呂四兩鉄粉化傾水中松脂 飛丹 輕粉各一 射香分 右各為末和勻先用葱湯

湯洗淨以麻油調搽油紙蓋之孔之

加味神燈炮 治脫疽敷疔

依原方加蜈蚣三個 番木鱉一個 右為末和勻作餅煑炮如常見首卷

立應神燈炮 治漏蹄風足跟疽及楊梅結毒

依原方見首加銀硃二錢水硃一錢黑石七分和勻煑炮如法

一方硃砂 雄黃 硃砂各三 黑鉛一錢 水銀五分 右為末用紅棗肉二十個杵如泥分十九丸每日用一丸放小口罐內對患

處燒薰勿令泄氣三日二丸即愈

犀角丸 治脚氣腫痛風毒生瘡心神煩燥○犀角尖 天麻 羌活 枳殼麩炒 白蒺藜 防風 黃芪 白鮮皮 黃芩各七

檳榔錢 甘草錢五分 烏梢蛇酒浸 用水盪半生薑五片煎一鍾服

漏蘆湯 洗風毒腫痛濕瘡脚氣○漏蘆 白斂 槐白皮 五加皮 甘草各一兩 白蒺藜 四兩

右吹咀每用五兩水一斗煮六升去渣淋洗

龍骨散 治脚疽并久遠惡瘡○白龍骨 輕粉各二錢

殭豬羹 新瓦焙干燒 存性五錢

○共為末先以口噙鹽水或鹽湯洗瘡淨見紅肉次以

香油調敷

足部應用方

衛王散

十全大補湯

托裏溫中湯

六味地黃丸

陽燧錠子

離宮錠子

加減八味丸

補中益氣湯 俱見首卷

大防風湯 調服

蟬酥餅 見行

補遺經文

肉之大會為谷肉之小會為絡谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅血熱肉敗榮衛不行必將為膿內消骨髓外破大膿 言熱也熱則筋弛

積氣留舍榮衛不養內縮筋攣肘不得伸 信寒也寒內為骨痺外為不仁命曰大寒留於谿谷也 肘者筋也谿者二肘二膝四腕也

五臟有邪留於四肢節經曰心肺有邪其氣留於兩肋肝有邪其氣留於兩腹脾有邪其氣留於兩髀腎有邪留於兩膝

又曰脾病在谿