

二

吳齋堂
評註 陳無擇三因方

上海棋盤街
文瑞樓印行

葛家堂中華書局

185 11-185 2/8

三因極一病源論萃方卷之三

敘痺論

夫風濕寒三氣集至合而為痺。雖曰合痺。其用自殊。風勝則為行痺。寒勝則為痛痺。濕勝則為着痺。三氣襲人經絡。入於筋脈皮肉肌骨。久而不已。必入五藏。凡使人煩滿喘而吐者。是痺客於肺。煩心上氣。嗌乾恐噫。厥脹滿者。是痺客於心。多飲數小便。小腹痛如懷孕。夜卧則驚者。是痺客於肝。善脹尻以代踵。脊以代頭者。是痺客於腎。四肢懈怠。發咳嘔沫。上為大塞者。是痺客於脾。又有腸痺者。數飲而小便不利。中氣喘急時。發飧泄。又胞痺者。小腹按之內痛。若沃以湯澁於小便。上為清涕。又六腑各有俞。風寒濕中其俞。而飲食應之。故循俞而入。各舍其府。治之隨其府俞。以施針灸之法。仍服逐風濕寒。發散等藥。則病自愈。大抵痺之為病。寒多則痛。風多則行。濕多則着。在骨

則重而不舉。在脈則血凝而不流。在筋則屈而不伸。在肉則不仁。在皮則寒。逢寒則急。逢熱則縱。又有血痺。以類相從。附於此門外。有支飲作痺。見痰飲門。

合痺治法

附子湯 治風濕寒、痺。骨節疼痛。皮膚不仁。肌肉重者。四肢緩縱。

附子生去皮 白芍 桂心 人參 疦苓各三分

白朮一兩

甘草

右剉散。每服四錢。水三盞。煎七分。去滓。食前服。

黃芪五物湯 治尊榮人。骨弱。肌膚盛。重困。疲勞。汗出。卧不時動搖。加以微風。遂作血痺。脈當陰陽俱微。尺中小緊。身體如風痺狀。

黃芪 白芍 桂心各等分 生薑五片 大棗三枚 食前服

黃芪酒 治風寒濕痺。舉體腫滿。疼痛不仁。飲食惡冷。嘔嘔惡寒。胸

中痰滿心下塞方見中風門

厯節論

夫厯節證。疼痛不可屈伸。身體尪羸。脚腫如脫。其痛如掣。流注骨節。短氣自汗。頭眩。嘔。欲吐者皆以風濕寒相搏而成。其痛如掣者為寒。多腫滿如脫者為濕。多厯節黃汗出者為風。多顧病源所載。飲酒當風。汗出入水。遂成斯疾。原其所因。雖涉風濕寒。又有飲酒之說。似屬不內外因。亦有不能飲酒而患此者。要當推求所因。分其先後輕重為治。久而不治。令人骨節蹉跌變為癲病。不可不知。

厯節治法

芍藥知母湯 治諸肢節痛。身體尪羸。脚腫如脫。頭眩。短氣。嘔。欲吐。

桂心 知母 防風

各四兩

白芍

炙草

麻黃

附子

炮去皮臍各三兩

每服四錢。加生薑五片。空心服。一法。加白术川芎杏仁半夏。

烏頭湯 治病厯節不可屈伸。

烏頭

煎取一升去烏頭

麻黃

去節

吳草

芍藥

黃芪

右剉散。每服四錢。水二盞。煎七分。去滓。投前蜜煎一升。空心溫服。千金方有乾薑桂心大棗無黃芪。麻黃治寒散腹中絞痛。賊風入腹。攻五臟拘急不能得轉側。呴呼發作。有時使人手足厥逆。

附子八物湯 治厯節風。四肢疼痛。如槌鍛不可忍。

附子

四兩

桂心 炮薑 白芍 茯苓 炙草

各三兩

人參

一兩

白朮

四兩

每服四錢。煎去滓。食前服。一方。去桂。用地黃二兩。

獨活寄生湯 治厯節風。近人用之甚效。亦治腰背痛。及脚氣流注。

獨活

三兩

桑寄生

杜仲

薑製

細辛

牛膝

秦艽

人參

茯苓 炙草 白芍 川芎 當歸 熟地 防風 桂心

各二兩

每服四錢。空心服。

吳鞠堂曰。此兩症之漫性者。考中西醫俱無速愈之方。西醫每注射皮下。輕減其痛。中醫必須通絡透濕。及外治蒸熨抽拔之法。然往往以針法取效最捷。此乃軀殼之症。徒恃藥劑。不足以愈病也。

敘脚氣論

夫中風寒暑濕與脚氣皆有漸頓淺深之不同。中風寒暑濕得之頓而淺。腳氣得之漸而深。以其隨臟氣虛實寒熱發動。故得氣名。其如循經絡入藏府。證候雖不一。然三陽多熱躁。三陰多熱煩。亦可推求。但腳氣不專主一氣。亦不專在一經。故與中風寒暑濕為異耳。兼有續生諸病。混雜多端。未易分別治之。須尋其經絡病症所在去處。然後以脈察其虛實淺深為治。假如三陽經絡。其診多在足外踝及手

背三陰經絡其診多在足內踝及臂內以此粗分陰陽可知大概矣。其如風寒暑濕性用各各不同所謂風為行寒為痛暑為煩濕為着乃不刊之論千金方論與董氏顓門類皆蹈襲舊說似難憑據惟留心斯道者必有至當之論焉。

敘千金論

千金論脚氣皆由感風毒所致多不令人便覺或因他病乃始發動或奄然大閼經三兩日方始覺之庸醫不識慢或作餘疾治之莫不盡斃緣始覺甚微飲食嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱為異耳乃論風毒相冒云夫有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦諸處皆悉未知而心腹五內已有所困或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或大小便祕滯或胸中衝慄不欲見光明或精神昏憊語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或腫或肢腿頑痺或時緩縱不隨或

復百節攀急或小腹不仁。皆謂脚氣狀貌也。至於婦人產後取涼。多
中此毒。其熱悶掣縱驚慄心煩嘔吐。氣上躰下冷痞。幅幅然不快。兼
小便淋漓。不同生平。皆係脚氣之候。頑弱為緩風。疼痛為濕痺。右件
千金節文。備敘諸症。不說陰陽經絡所受去處。亦不分風濕寒熱四
氣。及內藏虛實所因。後學從何為治。若一一信書。不若無書為愈。此
之謂也。

脚氣脈證

脚氣證狀固多。但當以脈證分其陰陽。使無差悞。所謂脈浮為風。緊
為寒。緩細為濕。洪數為熱。見於諸陽病在外。宜發散之。則愈。沉而弦
者亦為風。沉而緊者亦為寒。沉細為濕。沉數為熱。見諸陰病為裡。宜
溫利之。則愈。外證自汗走痛為風勝。無汗疼痛攀急為寒勝。腫滿重
着為濕勝。煩渴熱煩為暑勝。四氣兼有。但推其多者為勝。治之當以

諸證互辨。而分表裡。寒則溫之。熱則寒之。在表則散。在裏則下。若大虛氣乏。間作補湯。隨病冷熱而用之。不可拘不可服補藥。

敘太陽經腳氣證

病者頭痛。目脫。項強。腰脊連體樞。循臂外出外踝之後。循京骨至小指外側。皆痛者。乃足太陽膀胱經。為風寒暑濕流注。自汗者為風勝。無汗疼痛為寒勝。熱煩為暑勝。重着腫滿為濕勝。諸經皆當如此推。凡太陽經。宜隨四氣發散而愈。

太陽經脚氣治法

麻黃佐經湯 治風寒暑濕流注足太陽經。手足攀痺。行步艱難。增寒發熱。無汗惡寒。或自汗惡風。頭痛眩暉。腰重。關節疼痛。

麻黃去節 乾葛 細辛 白朮 茶芩 防己 桂心 羌活

防風 灸草 等分

右為粗末。每服四錢。水二盞。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓。空心服。
自汗去麻黃。加桂枝白芍。重着加白术橘皮。無汗減桂。加杏仁澤瀉。
所加並等分。

陽明經脚氣證

病者淒淒寒熱。呻欠口鼻乾。腹脹。髀膝臍中。循脇外廉。下足跗。入中指內間。皆痛者。乃足陽明胃經。為風寒暑濕流注之所為。四氣偏勝。並如上說治之。宜隨四氣微利之。

陽明經脚氣治法

大黃佐經湯 治風寒暑濕。流注足陽明經。使腰脚痺痛。行走艱難。涎潮昏塞。大小便秘。腹痛嘔吐。或復下利。惡聞食氣。喘滿肩息。或自汗譫語。

大黃 細辛 茯苓 防己 羌活 黃芩 前胡 枳殼 厚

朴 薑製 火草 杏仁

炒去皮
火別研

右剉散。每服四錢。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓。空心熱服。腹痛加白芍。祕結更加阿膠。喘加桑皮紫蘇。小便祕加澤瀉。四肢瘡痙浸淫。加升麻所加並等分。

荷葉 藜本湯 治脚踵生瘡。浸淫腿膝。濃汁淋漓。熱痺痛痒。

乾荷葉

四張

藜本

等分

右以水二斗。煎減五升。去滓。溫煖得所淋渫。仍服大黃佐經湯佳。
少陽經脚氣證

病者口苦。善太息。腸痛面垢。體無膏澤。頭額目銳。背痛缺盆。并腋下馬刀腫。自汗。振寒發熱。胸中脇肋髀膝。外至肘絕骨外踝。及諸節指皆痛者。乃足少陽膽經為風寒暑濕流注之所為。四氣偏勝。例如前說治之。宜隨四氣和解。

少陽經脚氣治法

半夏佐經湯 治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰脇痛頭疼眩暈嘔吐宿汁耳聾驚悸熱悶心煩上氣喘滿肩息腿痺縱緩不隨半夏 乾葛 細辛 白朮 茯苓 桂心 防風 炮薑 黃芩 遠志 灸草 柴胡 麥冬各三分 每服四錢薑三片棗一枚煎七分空心服如熱悶加竹懸半合喘滿加桑皮杏仁。

料簡三陽并合腳氣

三陽經有并有合如太陽并少陽少陽并陽明陽明并太陽三陽合病皆于經絡中推考其診隨證治之所謂并者二經相并合者三經會合以此强分使名義易曉不必論其一二也

三陽并合腳氣證治

病者憎寒壯熱自汗惡風或無汗惡寒暈眩重着關節掣痛手足拘

掌。疼痛冷痺緩縱不隨心燥氣上嘔吐下利。此皆三陽經中風寒暑濕。其脈必浮弦緊數。

大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經。手足拘攣疼痛行步艱難。憎寒發熱。自汗惡風。頭眩腰重。關節掣痛。或卒中昏塞。大小便閉滯。或腹痛。嘔吐下利。惡聞食氣。髀腿頑痺。緩縱不隨。熱悶驚悸。心煩氣上。脅下冷痺。喘滿肩息。

麻黃 乾葛 細辛 厚朴 茯苓 防己 枳殼 桂心 羌活 防風 柴胡 黃芩 遠志 炮薑 半夏 麥冬 甘草

分等

右剉散。每服四錢。加生薑三片。棗一枚。空心服。自汗加牡蠣白朮。去麻黃。腫滿加澤瀉木通。熱甚無汗。去桂。加陳皮。前胡升麻。腹痛吐利。去黃芩。加芍藥附子。大便秘。加大黃竹瀝。喘滿。加杏仁桑皮。

紫蘇所加並等分。凡有此病詳認證狀逐一加減無不愈者。常服下氣消癰散風濕退腫進食飲令人不虛江南諸師固秘此方。雖父子兄弟不傳學者當敬用之。

加味敗毒散 治三陽經腳氣流注脚踝上焮熱赤腫寒熱如虧。自汗惡風或無汗惡寒。

羌活 獨活 前胡 柴胡 枳壳 桔梗 人參 茯苓 甘草 川芎 大黃 蒼朮

右剉散每服四錢。薑三片。薄荷一頭。煎七分。熱服不過二服愈。皮膚瘙痒如赤疹。加蟬退。

太陰經脚氣證治

病者腹滿。挾咽連舌系急。胸膈痞滿。循行骨下股膝內前廉內踝過核骨後。連足大指之端內側。皆痛者。乃足太陰脾經為四氣流注之

所為也。四氣偏勝。並如前說治之。各隨其氣所中輕重。溫散之。

六物附子湯 治四氣流注足太陰經骨節煩疼。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。惡風怯寒。頭面手足。時時浮腫。

附子 桂心

各四兩

白术

茯苓

各三兩

防己

四兩

甘草

二兩

每服四錢。薑七片。煎服。

少陰經脚氣證治

病者腰脊痛。小指之下連足心。循內踝入跟中上膕內。入膕中內廉。股內皆痛。上衝胸咽。飢不能食。面黑。小便淋閉。咳嗽不已。善怒。心惕惕。若人將捕之狀。小腹不仁者難治。足陰腎經為四氣流注之所為也。四氣偏勝。並如前說治之。各隨其氣所中輕重。而溫補之。

八味丸 治少陰腎經脚氣入腹。小腹不仁。上氣喘急。嘔吐自汗。此證最忌。以腎乘心。尅火死不旋踵。

熟地

八兩

牡丹皮

澤瀉各三兩

山萸肉

山藥各四兩

附子

肉桂

各一兩

右為末。蜜丸桐子大。酒服五十丸。溫酒米湯食前服。

厥陰經脚氣證治

病者脇肋偏疼。從足大指連足趺上廉上胸至內廉。循股內陰器抵小腹夾脣。諸處脹痛。兩脚掣急。咽乾嘔逆。洞泄者。足厥陰肝經為四氣流注之所為也。四氣偏勝。並如前說治之。各隨其氣所中輕重。而調治之。

神應養真丹 治厥陰肝經為四氣進襲肝臟。左癱右瘓。涎潮昏塞。半身不遂。手足頑麻。語言蹇澁。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍惚。肢體緩弱。上攻頭目。下注脚膝。榮氣凝滯。遍身疼痛。兼治產後中風。角弓反張。墮車落馬。打撲損傷瘀血在內。

川芎

當歸 酒浸

白芍 熟地 羌活 天麻

右等分。一法無羌活。加木瓜炒烏膏為末。蜜丸如雞子黃大。每服一丸。木瓜兔絲子浸酒下。脚痺米仁浸酒下。中風溫酒米湯下。

料簡三陰併合脚氣

傷寒三陽有併合。三陰無併合。脚氣則不然。以久滯藏氣隨其虛實寒熱而流注。故病多併合。不可不知。

三陰併合脚氣治法

病者腹滿胸痞。骨節煩痛。四肢浮腫。上氣喘急。小腹不仁。腰節足心。膚膿皆痛。腸腰偏疼。陰氣抵小腹。夾腰諸處脹痛。此皆三陰經中風寒暑濕。其脈必沉細遲濶。

抱龍丸 治肝腎藏虛。風濕進襲。流注腿膝。行步艱難。漸成風濕脚氣。足心如火。上氣喘急。小腹不仁。全不進食。

赤小豆

炒四兩

五靈脂

白膠香

破故紙

狗脊

火去毛

木鱉

子海

桐皮

威靈仙

地龍

草烏

米泔浸三日淨洗

去皮毛各一兩

川漆煎 治肝腎虛為風寒濕毒所中。流注腿膝。歷節疼痛。如錐刀
右為末。酒糊丸。桐子大。硃砂為衣。鹽酒下五十九丸。

鍛刺不可名狀。

大烏頭

十箇端正者。搘破以紙袋盛或黑豆一升。覆蒸一日。取出去豆。不用去皮。尖。晒乾。川牛膝

二兩。晒乾。

以上二味。並不得見銅鐵器。及火與日。以木臼細搗碎牛膝。同入
石磨中。磨為末。酒糊丸如桐子大。每服四十丸。用好酒一瓶。將中
樣木瓜一箇。切作片子。入瓶中。浸木瓜爛為度。此酒不以時下。
十全丹 治脚氣上攻。心腎相繫。足心隱痛。小腹不仁。煩渴。小便或
秘。或利。關節攣痙。疼痛。神效不可具述。

旋蓉

酒浸

石斛

酒浸

狗脊

火去毛

草薢

茯苓

牛膝

酒浸

地仙子

遠志

去心炒各一兩

熟地

杜仲

去皮各三兩

右為末。蜜丸桐子大。每服五十九。溫酒鹽湯下。

乳香宣經丸 治體虛為風濕寒暑所襲。四氣相搏。半身不遂。手足
頑麻。骨節煩疼。足脰浮腫。惡寒發熱。漸成脚氣。肝腎不足。四肢攀
急。偏身攻注。或閃肭打撲。內傷筋骨。及風邪內搏。男子疝氣。婦人
經水不調。常服活血止痛。補虛壯筋骨。

威靈仙

去蘆

烏藥

茴香

炒

川練子

剉炒

牽牛子

炒

橘

皮

去白

草薢

防風

各二兩

五靈脂

乳香

各半兩

草烏

黑豆一合

同煮竹刀切看透黑度去皮共燒各五錢

右為末。酒糊丸桐子大。鹽酒下五十九。婦人食前醋湯下。

大犀角丸 治脾胃經脚脰腫疼。小腹頑麻。上攻頭面。通身浮腫。小

便不利。上氣喘滿悶絕欲死。

犀角

黃芩

旋覆花

白术

肉桂

防己

各二兩

香豉

畧炒

橘皮

茯苓

各三兩

前胡

桑皮

紫蘇

莖葉以上各四兩

右為散

每服四錢

加薑五片

棗二枚

喘加杏仁

煎服

四蒸木瓜丸

治肝腎脾

三經氣虛

為風寒濕搏着

流注經絡

竭日

曠歲

治療不痊

凡遇六化更變

七情不寧必至發動

或腫滿或癩

痺憎寒壯熱嘔吐自汗

威靈仙

與苦參慈同人

黃芪

與續斷同人

蒼朮

與橘皮同人

烏藥

與黃松節同人

右藥各五錢以大木瓜四隻切益去穰入前伴藥仍用益簪定酒

蒸熟三蒸三晒取藥出焙乾為末研瓜為膏搜和搗千杵丸如桐子

大空心溫酒鹽湯任下五十九世傳木瓜丸最多惟此方有效宜

敬用之黃松節卽茯苓中木是也

逐毒湯

治肝脾腎三經

為風濕寒熱毒氣上攻

陰陽不和四肢攀

拘。上氣喘滿。小便祕澁。心熱煩悶。遍身浮腫。脚弱。

半夏

四兩

黃芪

當歸

人參

厚朴

薑製

獨活

陳皮

各一兩

熟地

白芍

枳實

麸炒去節各二兩

桂心

三兩

五倍子

廿一粒

每服四錢。薑七片。棗三枚。空心溫服。日三服。夜

一服。

脚氣總治

予金脚氣論。在諸風之前。良有以也。方論雖多。識病者少。或覺之傷晚。或狐疑不決。枉死者半。信不誣矣。凡有此症。最宜急治。緩則入腹。攻五臟。雖神丹亦無如之何。又久患續生諸病。如大小便不利。腫滿。飲食傷等。不妨別為治。所謂先去新病。病當在後。若總而治之。則亦庶乎其可也。

烏藥平氣湯。治脚氣上攻。喘滿。及五臟偏勝。諸氣不和。喘咳奔沖。

坐卧不安。頭暈脚弱。上實下虛。

烏藥 人參 白术 川芎 當歸 茯神 火草 白芷 木

瓜乾 五味子 蘇木

各分等

右為末。薑五片。棗二枚。煎湯調服。每服四錢。

蘇子湯 治脚弱上氣。陰陽交錯。清濁不分。上重下輕。中滿喘急。嘔

吐自汗。無復紀律。千金云。宋湘王在南州。患脚氣困篤。服此得效。

蘇子

黑炒

半夏

各五兩

前胡

去苗

厚朴

去皮製

火草

當歸

各二兩

桂心

陳皮

各三兩

右剉散。每服四錢。薑七片。棗二枚。煎七分。食後服。人謂俞山人降氣湯是也。好事者復加附子黃芪。又改其分兩。亦班入太醫方。用者宜知之。

木瓜牛膝丸 治寒濕脚氣。冷濕下注。脚弱無力。或腫急疼痛。兼治

婦人血風大固腎氣活血壯筋絡

木瓜

大者三四枚。開蓋去心先用糯米漿過焙乾為末却將鹽末入木瓜內內令滿仍用蓋針定蒸三次爛研成膏

川

烏

大者薄切酒煮乾研為膏用三兩浸

牛膝

酒浸

活青皮

青鹽另研入

狗脊

燎去毛

巴戟

各一兩

茴香

炒

草解

羌

右為末入青鹽和勻將前二膏搜為丸如硬再入酒杵數次丸如

桐子大食前鹽酒任下五十九丸

茱萸丸 治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸

湯泡

木瓜

去心切片作丸

右等分酒糊丸如桐子大酒下百丸或以木瓜蒸爛研膏為丸尤妙

黑附丸 乾濕脚氣皆治

附子

八錢去皮臍

黑荳

半斤入磁瓶內慢火煮以附子爛為度

右熟荳一合同附子研作餅焙乾為末蜜丸皂角仁大每服二丸

空心用射香酒下。

木通散 治脚氣服補藥太過小便不通淋閉臍下作脹

當歸 桃子炒 赤芍 赤茯苓 生甘草各一
兩

右為散。每服三錢。水煎服。

桑皮赤荳散 治腳氣證。小便澁。兩脚腫。氣脹。

赤小荳半斤 桑皮 紫蘇一握 生薑五錢

右為散。水三升。煮豆熟。取荳食。去藥滓。仍取餘汁飲之。

勝駿丸 治元氣不足。真氣虛弱。及諸虛寒。濕氣進襲。手足拳攣。脚指連腳面拘急。走注疼痛。筋脈不伸。行走不隨。常服益真氣。壯筋骨。黑鬚髮。滑皮膚。一切足弱鶴膝諸風。

附子一枚炮去皮膚 水浸
當歸酒浸一日 牛膝酒浸 天麻酒浸 杞仁炒
熟地酒浸 防風二兩 木瓜四兩 乳香另研五錢 麝香一錢

全蝎 去毒

木香

沒藥另研

羌活

羌草各一
兩

右為細末。用生地三斤淨洗。

研如泥。

入無灰酒四升。煮爛如膏。以前

藥令勻和。杵令堅。每兩作十九。每服一丸。臨卧細嚼。酒下。地黃膏。

春夏極多。遇冬或無地黃。以蜜丸如桐子大。用鹽湯或溫酒。下五

十九。

勝駿丸加減法

枳榔

草薢 蔴蓉

酒浸

破故紙

炒

巴戟肉

右五味各添一兩。內熟地當歸各減減原作增一兩。尤妙。如服此藥至五七日。或半月。見效甚速。行步如飛。千里可至。乃名勝駿。

換腿丸 治足三陰經虛。為風寒暑濕進襲。攀躋痺痺緩弱。上攻胸膈。肩背。下注脚膝疼痛。漸成風濕脚氣。行步艱難。足心如火。上氣喘急。

全不進食。

石楠藤

南星 炮

石斛 酒浸

牛膝 酒浸

羌活

米仁 炒

防風

草薢

黃芪 蜜炙

天麻

當歸 酒浸

續斷 各一兩半

木

瓜

四兩

楨榔

二兩半

右為末。酒煮。麵糊為丸如桐子。每服五十丸。空心溫酒鹽湯任下。
吳補堂曰。脚氣以南方為多。病多由水土不服。廣東何西池有脚
氣專書。甚精。當取閱之。

又曰。脚氣之急性者。嘔吐喘急。腹脹脹數而勁。心體不安。一二日
即死。此外臺祕要所謂脚氣衝心。千金論所謂脚氣入腹。則殺人
也。此等中醫無必效方法。西醫治法心悸用毛地黃。嘔吐含冰片。
服古加巴涅。顏面蒼白。及有心臟麻痺之虞者。用樟腦赤葡萄酒。
麻痺症。注射斯篤利幾尼涅。施電氣療法。往往可治。此症當急救
之。

又曰脚氣須分乾濕二種施治陳無擇此篇名目太多未得執簡
御繁之法也

三因極一病源論粹方卷之三終

三因極一病源論粹方卷之四

敘傷風論

經云。春傷風。夏食泄。此乃四時之序也。或表中風。在經絡中。循經流注。以日傳變。與傷寒無異。但寒泣血。無汗。惡寒。風散氣有汗。惡風為不同耳。仲景正以此格量太陽經傷寒。傷風。用藥不同。而纂集者不識門類。遂雙編二證。使後學混濛。卒不知歸。甚者以傷風暑濕。時氣疫疹。凡曰太陽病者。皆謂之傷寒。晉人不經類。皆如此。固不足道。但名義乖錯。惑於後人。不可不與之辨。今別立傷寒一門。於四淫之前。且依先哲以太陽為始。分注六經。學者當自知。

傷風證治

足太陽膀胱經傷風。有汗惡風。不惡寒。頭項強。腰脊痛。以其脈從顛入絡腦。還出。別下項。循肩膊內。挾脊抵腰中。故太陽諸證。如是。治之宜桂枝湯。

桂枝湯 治太陽傷風。脈陽浮陰弱。營弱衛強。頭痛鼻鳴。乾嘔發熱。自汗惡風。或煩熱。汗出則解。有如瘧狀者。

桂枝去皮 芍藥各一兩 五錢 甘草一兩

右㕮咀每服五錢。水盞半煎八分去滓。食前服。溫覆令徧身微汗。愈或發滯漏不止。惡風小便難。四肢拘急者。加熟附子一分。或項強兀兀反汗出惡風者。加葛根一兩三錢。或汗出後身疼痛。脈沉遲者。加芍藥生薑各五錢。人參兩五錢。或下後脈促胸滿者。去芍藥。若微寒。乃加熟附子。或下後頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。去桂。加茯苓白朮各兩五錢。太陽外證未除而數下之。挾熱利不止。心下痞硬。表裡不解。加人參一兩。或下之微喘者。加厚朴六錢。杏仁十七粒。因燒鍼令汗。鍼處被寒。核起而赤。必發奔豚。炙其核各一壯。加桂一兩與服。因燒針煩躁者。去芍藥。

減桂一兩。加牡蠣龍骨各一兩。可代救逆湯。

足陽明胃經傷風。口燥煩渴。自汗嗜卧。身重。小便難。以其脈俠鼻絡目。下膈屬胃絡脾。俠脾入氣街。故陽明諸證如是。治之宜杏子湯。杏子湯 治陽明傷風。能食口苦。咽乾腹滿。微喘。發熱惡風。自汗。嗜卧。身重。小便難。潮熱而噦。其脈浮弦長而數。悉主之。

杏仁

去皮尖

半夏

湯去滑

五味

各二錢半

芍藥

桂心

細辛

炮

薑 大黃

蒸

甘草

各三錢半

茯苓

各四錢半

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓。食前服。

足少陽膽經傷風。身熱惡風。自汗。項強脇滿。以其脈起於目兌背。上抵頭角。交出入缺盆。下胸中。貫膈絡肝。循脇裏出氣街。合脾厭中。故少陽諸證如是。治之宜柴胡加桂湯。

柴胡加桂湯 治少陽傷風。四五日身熱惡風。頭項強。脇下滿。手足

溫口苦而渴自汗。其脈陽浮陰弦。或發汗多。亡陽。譴詒可以此和其榮衛。通其津液。自愈。

柴胡

一兩
三錢

半夏

四錢
一分

芍藥

黃芩

人參

各五
錢

甘草

三錢

桂枝

五錢

右㕮咀。每服五錢。七水一盞半。薑五片。棗一箇。煎七分。去滓。食前溫服。

足太陰脾經傷風。自汗。胸滿腹痛。四肢怠倦。以其脈入腹絡胃。上膈。挾咽。連舌本。散舌下。故太陰諸證如是治之。宜桂枝芍藥湯。

桂枝芍藥湯

治太陰傷風。自汗。咽乾。胸腹滿。自利不渴。四肢倦怠。

手足自溫。其脈弦大而緩者。

桂枝

五錢

白芍

三兩

右㕮咀。每服五錢。七水一盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓溫服。

腹痛甚者加大黃一兩

足少陰腎經傷風口燥舌乾咽痛胸滿心煩自汗腰連骭骨酸痛以其脈貫脊屬腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本故少陰諸證如是治之宜桂附湯

桂附湯 治少陰傷風胸滿心煩咽喉痛自汗腰疼連骭骨酸痛嘔吐涎沫頭痛其脈沉弦者

附子

生去皮附

桂心

乾薑

芍藥

甘草炙

茯苓

桃仁

去皮尖麪

炒各一兩

右㕮咀每服四錢水二盞煎七分去滓食前服或咽喉痛加桔梗足厥陰肝經傷風自汗惡風而倦小腹急滿以其脈循股入毛中環陰器抵小腹俠胃絡胆布腸與督脈會故厥陰諸證如是治之宜八物湯八物湯 治厥陰傷風而勑自汗小腹急滿寒熱如瘧骨節煩疼其

脈尺寸俱微而遲者。

桂心 當歸 川芎 前胡 防風

各三分

芍藥 兩半

甘草 炙

茯苓

各五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片棗三箇煎八分去滓食前服

敘傷寒論

經云。冬傷於寒。春為溫病。以冬不即病。其寒毒藏於風府之上。至春溫煖之氣發而為病。故曰溫病。或愈或死。死則六七日間愈則多出旬日之外。世號為大病。要當隨此經絡傳變。仍以脈證別之。乃可施治。治傷寒法。蓋盡於此。至晉集仲景論。於太陽經出麻黃桂枝二方。治傷寒、傷風。并錄預備救失加減之法甚詳。至陽明少陽與三陰經傷風證治。則漫聞矣。故知仲景只就太陽一經。格量二病。令勿差誤。編集既不詮辨。後學懵無所知。皆翳典墳。千有餘載。畧不加省。良可

可嘆息。今輒提其六經傷寒、合用對治諸方。以為宗法。其如壞證治法。餘各見本門外編集於後。使皂白自分。初不敢取諸胸臆。蓋有所本於聖經也。

傷寒辨證

內經論傷寒。惟說足三陰三陽六經傳受愈否日數。及各隨其藏府經絡流注去處。而證以行汗下。并兩感脈應病形而已。至張長沙。以伊尹湯液作治法。兼述傷寒暑濕等。詳畧不同。格量互顯。使後學舉隅而反。至晉不解其義。隨行編集。遂行於世。此後蹈襲者不可勝計。所謂百問証治。提綱目錄撮要。備全活人書。傷寒論乃至圖形指脈。皆剝採晉集。初無反隅。雖有意于廣傳。皆未明其義類。緣晉集不識偏正。以此類豫備之方。雜於正治。而正治之方。多所簡脫。故使典籍愈翳。後學固守。不削繁蕪。罔知樞要。因別論於後云。

傷寒證治

足太陽膀胱經傷寒。頭項強。腰脊痛。無汗惡寒。其經絡流注去處。與傷風同。但脈浮洪緊數為異耳。惟足太陽寒水為諸陽主氣。故寒先傷之。

麻黃湯 治太陽傷寒。脈浮緊而數。頭痛身疼。發熱惡寒。無汗胸滿而喘者。

麻黃 桂枝

各一兩

甘草 五錢

杏仁

廿五粒

右㕮咀。每服五錢。水一盞半。煎八分。去滓。食前服。覆取微汗。夏則加知母五錢。石膏一兩。黃芩一錢。或汗出後。無大熱而喘者。去桂。加石膏四兩。

小青龍湯 治傷寒表未解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴或利。或噎或小便不利。小腹滿而喘者。

麻黃 細辛去苗 炮薑 甘草炙 桂枝 芍藥各三

半夏

五味各二
兩半

右㕮咀。每服五錢。水二盞。煎八分。去滓。食前溫服。噎者去麻黃。加熟附子一錢。若小便不利。小腹滿者。加茯苓一錢。喘者加杏仁七粒。去皮尖。

溫粉 凡發汗不欲多。多則亡陽。宜用此粉撲之。即愈。效如神。

白芷 藥本 川芎 白朮

右為末。每末一兩。入米粉三兩。和勻撲之。

大青龍湯 治太陽中風傷寒。脈緊。發熱惡寒。身疼。不汗出而煩渴。或脈浮緩。身不疼。但重乍有輕時。或傷寒見風脈。傷風見寒。脈。

麻黃去節
三兩 桂枝 甘草各一
兩 杏仁去皮
尖

右剉為散。每服五錢。水一盞半。薑五片。棗一個。煎七分。食前服。

足陽明胃經傷寒。身熱目痛。而鼻乾不得卧。不惡寒。腹滿咽乾。口燥而渴。其脈流注與傷風同。以陽明主內。故次傳之。

大承氣湯 治陽明傷寒。脈長身熱。不惡寒。自疼鼻乾。不得卧。腹滿咽乾而渴。大便硬。譫語。或汗後脈沉實。或下利。心下堅。或已經下。其脈按之浮沉。尚有力者。

大黃

酒洗
五錢

芒硝一分。別研入。

厚朴

一兩。薑汁炒。

枳實

一分。
蔻炒。

右為末。每服五錢。水二盞。煎八分。去滓。入硝再煎。若脈遲而滑。汗出身重。時發潮熱。并得病二三日。無太陽證。煩躁。心下硬。下利。後譫語者。去芒硝。名小承氣湯。或發汗不解。蒸蒸發熱。嘔嘔欲吐。胷中痛。大便反溏。及吐利後。腹脹厥煩譫語。去厚朴枳實。入甘草五錢。芒硝一分。名調胃承氣湯。或結熱膀胱。如狂狀下血。小腹急結者。去厚朴枳實。加桃仁十二枚。桂枝甘草五錢。硝一分。名桃仁。

承氣湯。

大柴胡湯 治證狀大畧與大承氣湯同。輕則大柴胡。重則承氣。

柴胡

四兩

半夏

一兩

黃芩 赤芍

各兩半

大黃

一兩

枳實

一兩
炒

右為粗末。每服三錢水一盞半薑五片棗一枚煎八分去滓食後溫服。若內熱理實身體疼痛是表證未解不可服。

足少陽膽經傷寒。胸脇痛耳聾口苦咽乾往來寒熱目眩乾嘔其脈流注與傷風同以少陽主膽屬半表半裏故三傳之。

小柴胡湯 治少陽傷寒。脈弦或沉緊往來寒熱。胸脇若滿默默不欲食心煩喜嘔或渴而腹痛或脇下痞硬或心悸小便不利或咳有微熱亦有不渴不嘔者。又治婦人傷風傷寒經水適斷發熱惡寒。晝日明了暮則譫謠此為熱入血室其血必結故使如瘧狀得

七分熱除脈遲身涼。胸滿譫語如結胸狀。前刺期門隨其實而取之。投此湯即愈。又太陽病不解轉入少陽。并陽明傷寒。脈反弦浮。身目悉黃。小便難。潮熱時噦。

柴胡

二兩

半夏

六錢

黃芩

人參

甘草

各三分

右剉為散。每服五錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。煎七分。去滓。食前服。若腹痛去黃芩。加白芍三分。心下悸。小便不利。加茯苓一兩。若不渴。則有微熱。去人參。加桂枝三分。若欬嗽。去棗。加五味三分。乾薑五錢。胃中煩。不嘔者。去半夏。加桔梗實四分之一。若渴。去半夏。加花粉一兩。胸中痞硬。去棗。加牡蠣一兩。若過經不解。日晡發熱。已而微利。加芒硝一兩。

足太陰脾經傷寒。手足溫。自利不渴。腹滿時痛。咽乾。其脈流注與傷風同治之各有正方。

治中湯 治太陰傷寒。手足溫自利不渴。腹滿時痛。咽乾。其脈尺寸

俱沉細

人參 炮薑 白朮 陳皮 青皮 甘草

五積散 治太陰傷寒。脾胃不和。及有積聚腹痛。

蒼术

米泔浸一宿念雨

桔梗 十兩

陳皮 六兩

白芷

甘草

炙各三兩

當歸

各二兩

川芎

一兩半

芍藥

茯苓

半夏

各一兩

麻黃

去節湯煮

春夏二兩
秋冬三兩

乾薑

春秋二兩
秋冬二兩

枳壳

四兩
麸炒

桂心

春夏三兩
秋冬四兩

厚

朴

二兩
薑汁炒

右先將前十二味㕮咀微炒令香。取出當風涼之。入後枳壳桂心厚朴三味同為細末。每服三錢水一盞。薑三片。棗二枚。煎七分。食前溫服。傷寒手足逆冷。自汗不止。脈沉細面青。嘔逆加順元散一錢同煎熟服。產婦痛陣疏難產。經兩三日不生。胎死腹中。

產母氣乏委頓。產道乾澀。加順元散水七分。酒三分。同煎。相繼兩服。
氣血內和。即產胎死者。不過三服當下。其順元散多少。量產母虛
實加減。傷寒發熱。俠內寒者。加葱白二寸。豉七粒。同煎。相繼服。當
以汗解。

順元散

烏頭炮去皮六二兩

附子

炮去皮廝一兩

南星

炮一兩

木香

一兩

右為末。同前法煎。此藥治內外傷寒。脈沉伏遲細。手足冷。毛髮恂
慄。傷寒陰症。大啜一二盃。氣和汗出即愈。

足少陰腎經傷寒。口燥舌乾而渴。背惡寒。反發熱倦怠。其脈沉注。與
傷風同。

麻黃附子細辛湯 治少陰傷寒。口中和。面背惡寒。反發熱倦怠。自
汗而渴。其脈尺寸俱沉而緊者。

麻黃

附子炮去皮廝

細辛

各五錢

右為粗末。每服四錢。水一盞半。煎七分。去滓。食前服。手足厥者去
足厥陰肝經傷寒。煩滿發熱惡寒。往來如瘧。或囊縮。小腹急痛。其脈
流注與傷風同。本論用小建中湯方見九痛門去遠志即是也。

麻黃桂枝各半湯 治厥陰傷寒。煩滿。發熱。惡寒。往來如瘧。或囊縮。
其脈尺寸俱微緩者。主之。若脈沉短。其囊必縮。急以大承氣下之。
可保五死一生。承氣湯乃利陽明藥耳。若病到厥陰。其勢已甚。益
陽明養宗筋為熱毒所攻。乃以承氣湯瀉其能養。故利陽以救陰。
此猶假虞伐虢。圖魏救趙之意也。

桂枝

四錢

芍藥

麻黃

杏仁

十二粒去皮尖

甘草

各五錢

右為粗末。每服五錢。水一盞半。煎八分。去滓。食前服。入薑棗煎亦

得。

大承氣湯方見足陽明經病

小建中湯方見九痛門

傷寒傳變次序

內經熱論論傷寒云。太陽為諸陽主氣。傷寒必先自太陽始。至漢諸師。凡外所因。皆曰太陽病。未為了義。足太陽寒水。其位居辰。辰為六氣化原。故丙辛遁戊子。至辰為壬辰水。而太陽正化居焉。在天為寒。在地為水。寒喜歸水。故寒必首傷太陽。以此例推。寒既自太陽入風。當自少陽入。溫當自陽明入。經曰。陰為之主。陽為之正。別於陽者。知病從來。別於陰者。知死生之期。此之謂也。或問傳變次序當何如耶。然陰陽流行。出入次序。固有定說。及其中病。或喜入。或乘虛入。或成兩感。或守一經。其可拘也。但當以脈証分別陰陽表裡盛衰為治。又不可以日數期也。

料簡

論曰。有汗不得服麻黃。無汗不得服桂枝。切忌不可誤。若寒証見風脈。風証見寒脈。却以麻黃各半湯。古人治傷風。熱多寒少。惡風。脈浮緊。無汗。用青龍湯。蓋先傷風而後傷寒。風證尚在。而寒脈已行。故有是備也。若先傷寒。而後傷風。寒多熱少。不煩燥。微厥。脈當浮緩弱。而自汗。即傷寒見風脈。但青龍緊暴。不若各半湯平和。無悔吝也。諸經皆倣此。

六經傷寒用藥格法

夫傷寒始自太陽。逆傳陽明。至于厥陰而止。六經既別。治法不同。大陽屬膀胱。非發汗不能愈。必用麻黃者。以麻黃生於中牟。雪積五尺。有麻黃處。雪則不聚。蓋此藥能通內陽氣。却外寒也。陽明屬胃。非通泄不能愈。必用大黃芒硝以利之。少陽屬膽。無出入道。柴胡與半夏。能利能汗。佐之以黃芩。非此不解。太陰屬脾。中州土也。性惡寒濕。非

乾薑白朮不能溫燥少陰屬腎。性畏寒燥。非附子則不能溫。厥陰屬肝藏血養筋。非溫平之藥。不能潤養。此經常之道也。後學不知倫類。妄意進餌。遂至錯亂。諸証蜂起。夭傷人命。可不究辨。且三陽病。汗下和解。人皆知之。至太陰脾經。溫燥不行。亦當溫利。自陽明出。如溫脾丸用大黃者。是也。少陰腎經。雖用附子。復使麻黃。則知少陰亦自太陽出。厥陰用桂。自少陽出。明矣。及其二陽鬱閉。皆當自陽明出。故三陰皆有下證。如少陰口燥咽乾。下利清水。太陰腹滿時痛。厥陰舌卷。囊縮。皆下之。學者宜詳審。不可率意易投也。

溫脾丸 治久病虛羸脾氣弱。食不消。氣噫。

黃柏 大麥芽炒 吳茱萸 桂心 炮薑 細辛 附子

炮去皮鹽

當歸 川連各一兩 神曲炒 大黃各一兩

右為末。蜜丸桐子大。每服三十丸。空腹酒飲任下。

三陽合病脈證治

三陽有合病。三陰無合病。所謂三陽合者。有太陽陽明。有少陽陽明。自太陽傳至陽明。頭疼腰痛者。太陽也。肌熱目痛鼻乾者。陽明也。倘惡寒。脈必浮大而長。浮者太陽脈也。長者陽明脈也。當隨謹調之。本太陽證。因發汗多。則譙語。屬陽明。故有太陽陽明也。少陽證未解。猶當和解。不可便作陽明下之。

葛根湯 治太陽病。項背強。兀兀然無汗惡寒。并治三陽合病。自利。

葛根 一兩

麻黃 三分

桂心

芍藥 各五錢

甘草

三錢

右剉為散。每服五錢。水一盞半。生薑五片。大棗一枚。煎七分。去滓。食前溫服。三陽合病。不下利但嘔者。加半夏六錢煎。

兩感證論并治法

兩感傷寒者。表裡俱病也。一日。太陽與少陰俱病。頭痛舌乾咽滿而

渴二日。陽明與太陰俱病。腹滿身熱。不食譫語。三日。少陽與厥陰俱病。耳聾囊縮而厥。兩病俱作。治有先後。先宜救裏。臟氣內正。急宜攻表。救內固宜急。攻表亦不可緩也。救裡解表。各隨諸證而善用之。自非精妙甄別。其孰能與於斯。

四逆湯 治少陰傷寒。自利不渴。嘔噦不止。或吐利俱發。小便不利。或汗出過多。脈微欲絕。腹痛脹滿。手足冷。及一切虛寒厥冷。凡病傷寒。有此證候。皆由陽氣虛。有寒。雖更覺頭痛體疼。發熱惡寒。四肢拘急。表裡悉具者。不可攻表。宜先服此藥。以助陽救裡。

附子 五錢 炮薑 二分 炙草 一分

右剉散。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓。食前服。強人加乾薑一錢。或惡寒。脈微而利。利止仍亡血者。加人參五錢。或發汗。若下之病。仍不解。煩躁者。加茯苓半兩。面赤者。加連鬚葱九莖。腹中痛。

者去葱加芍藥一兩。嘔者加生薑一兩。咽痛者去芍藥。加桔梗五錢。

兩感治法料簡

桂枝麻黃皆攻太陽經表藥。方各見太陽經。其如陽明太陰少陽厥陰。並可於風寒二方論中隨證施治。

陰毒證治

陰毒為病。手足冷。腰背強。頭疼。腹痛。或煩渴。精神恍惚。額與手背時出冷汗。聲音鄭重。爪甲面色青黑。多因脾腎虛寒伏陰。重感於寒所致。

附子散 治陰毒傷寒。唇青面黑。身重強。四肢冷。或因服冷藥過度。心腹脹滿。昏沉不識人。

附子三分

桂心

當歸

白术

半夏

錢各五

炮薑三分

右為末。每服二錢。水二盞。生薑三片。煎六分。不以時熱服。衣覆取微汗。

返陰丹 治陰毒傷寒。心神煩躁。頭痛。四肢逆冷。面青腹脹。脈沉伏者。

硫黃

五兩通明者另研

硝石

太陰玄精石

各二兩另研

炮薑

桂心

附子

各五錢

右用鐵錠先鋪玄精。次下硝末各一半。中間鋪硫黃末。又將二兩餘末蓋上。以小蓋合着。熟炭火三斤燒令得所。勿令烟出。急取瓦盆合着地上。四面灰蓋。勿令烟出。候冷取出研細。入後藥為末。同研勻。米和九桐子大。艾湯下二三十丸頓服。汗出為度。未退乃火着艾炷灸臍下丹田氣海。更不退則以葱餚熨之。

葱餚熨法 如氣虛陽脆體冷無脈。氣息欲絕。不省人事。及傷寒厥

陰。百藥不效者。葱一束。以索纏如餅餡大。只用白長二寸許。先火燒一面。令通熱。勿致灼人。乃以熱處着病人臍下。上以熨斗盛火熨之。令葱餅熱氣透入腹中。更作三四餅。遇一餅壞。不可熨。易餅再熨。候病人醒。手足溫。有汗乃差。更服四逆湯良。

陽毒證治

陽毒為病。躁熱面赤。咽痛。身斑色如錦紋。下利赤黃。內外結熱。舌焦。鼻黑。類如烟煤。妄言狂走。多因腸胃燥熱。陽氣獨盛。陰氣暴絕。妄服燥藥。熱食所致。

升麻湯 治陽毒傷寒。一二日便成陽毒。或服藥吐下後。變成陽毒。腰背痛。煩悶不安。面赤狂言。或走。或見鬼。或下利。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。下膿血。脈浮數。五日可治。七日不可治。

升麻 五錢 犀角 射干 黃芩 人參 炙草 各一

右剉散。每服五錢水一盞。煎七分去滓。熱服。并進三四服。溫覆汗出為度。

梔子仁湯 治陽毒傷寒。壯熱。百節疼痛。

黑梔 赤芍 大青 知母各一 升麻 杏仁 黃芩 石膏

各二兩半 柴胡 兩半 炙草 五錢

右剉散。每服四錢水一盞。薑三片。豉二十粒。同煎七分去滓。不以時服。

結胸證治

結胷證者。心下堅滿。按之石硬而痛。心鬲鬲起。手不得近。項強如柔症狀。此本傷寒。身熱。醫下之早。熱氣乘虛而入。痞結不散。所致也。若脈浮大。皆不可下。下之則死。尚宜發汗。若沉緊者。宜以大小陷胸湯。量輕重而下之。又結胸有不按而痛者。有按而痛者。有水結在胸。

脇間但頭汗出者。有熱實結者。有寒實結者。治之不可不知其輕重也。各有正方。

大陷胸湯 治傷寒表未解。醫反下之。膈內拒痛。手不可近。短氣煩躁。心中懊惱。舌燥而渴。熱實脈沉而緊。心下硬。大便不通。又治身無大熱。有水結在胸脇間者。

大黃五錢 芒硝四錢 甘遂

右為末。水三盞。先煮大黃至一盞。入硝石。煮溶。下甘遂末。煮一沸。分二服。得利止。

小陷胸湯 治結胸病。在心。按之則痛。脈浮滑者。

黃連一錢 半夏六錢 括薑實一兩

水二盞。先煎括薑至盞半。入前藥。煎六分。分二服。利黃涎沫即愈。大陷胸丸 治病發於陽。而反下之。熱入因作結胷。以下之太早。故

也。其病項強如柔症狀下之則和。

大黃

二兩

葶藶

炒

杏仁

去皮
尖炒

芒硝

各三
分

右以前二味為末。將杏仁芒硝合研為脂。和藥丸如彈子大一枚。別杵甘遂末一錢。白蜜一大匙。水二盞。煎七分。頓服之一宿乃下。如不下。更服。取下為效。甘遂性猛。宜斟酌虛實用之。

胸痞證治

胸痞證者。胃中不和。心下堅硬。乾嘔惡寒。汗出。噫氣不除。亦有因傷寒。身冷。醫反下之。遂成胸痞。

枳實理中湯。治傷寒及諸吐利後。胃痞欲絕。膈高起急痛。手不可近。

枳實

茯苓

人參

炮薑

甘草

各等分

白朮

右為末。蜜丸一兩作四丸。熱湯化下。渴加花粉。下利加牡蠣粉。俱

等分

桔梗枳壳湯 治中寒氣痞。胃滿欲死。

枳壳

麸炒

桔梗

等分

右剉為散。每服五錢。水一盞半。煎七分。去滓食前服。

三黃湯 治傷寒陰證。下之太早。致心下痞。按之軟。其脈關上浮者。主之。若表未解。未可攻。宜先隨風寒二證。投桂枝麻黃湯。表解已。即服此方。

大黃 川連 黃芩

右剉散。每服五錢。沸湯一盞。熱清之一時久。去滓。分二服。或汗出惡寒。加附子。別煎汁。入一合。同服。

半夏瀉心湯 治心下痞滿而不痛者。

半夏兩一錢 黃芩 人參 甘草 炮薑各一兩五錢 川連 五錢

右剗散為末。每服五錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎七分。去滓溫服。或傷寒中風。醫反下之。下利日數十行。穀不化。腹中鳴。心下痞硬。乾嘔心煩者。加甘草半兩。人參一兩。名甘草瀉心湯。或出汗解後。胃中不和。心下痞硬。乾嘔食臭。脇下水鳴。下利者。加生薑一兩。減乾薑一兩。餘如正方。名生薑洗心湯。

勞復證治

傷寒新瘥後。不能將攝。因憂愁思慮勞神而復。或梳洗沐浴作勞而復。皆謂之勞復。或飲食不節。謂之食復。此皆大病後。精神血氣。腸胃並虛之所致也。論有正方。依證調治。惟犯房室。為女勞復。多死不治。白朮散。治傷寒氣脈不和。憎寒壯熱。鼻塞腦悶。涕唾稠粘。痰嗽壅滯。或冒涉風濕。憎寒發熱。骨節煩疼。或中暑嘔吐眩暉。及大病後。將理失宜。食復勞復。病證如初。悉主之。又治五勞七傷。氣虛頭

眩。精神恍惚。睡卧不寧。支體倦怠。潮熱盜汗。脾胃虛損。面色痿黃。
飲食不美。嘔吐酸水。臟腑滑泄。腹內虛鳴。反胃吐逆。心腹絞痛。久
瘡久痢。及膈氣咽塞。上氣喘促。坐卧不安。或飲食所傷。胸膈痞悶。
腹脇脹滿。婦人胎前產後。血氣不和。霍亂吐瀉。氣厥不省人事。常
服辟四時不正之氣。及山嵐瘴疫。神效不可具述。

白朮

一兩

白芷

甘草

青皮

陳皮

茯苓

山藥

香附

桔梗

各三兩

乾薑

五錢

右為末。每服二錢。匕水一盞。薑三片。棗一枚。木瓜乾一片。紫蘇二
三葉。煎七分。食前服。若吐瀉入白梅煎。喘入桑白皮杏仁煎。傷寒
勞復入薄荷煎。隔氣入木通三寸。麝香少許。中暑嘔逆入香薷。胎
前產後氣血不和入荆芥。霍亂入藿香煎。氣厥入鹽湯調下。

陰陽易者。其男子病新瘥未平復。而婦人與之交接。得病名曰陽易。裡急腰踝連腹內痛。婦人病新瘥未平復。而男子與之交接。得病名曰陰易。身重少氣。陰瘡入裡。腹內絞痛。熱上沖胸。頭痛不欲舉。眼中生花。蓋男女病相換易。故謂之陰陽易。

燒棍散 治傷寒陰易。其人身重少氣。少腹裡急。或引陰中拘攣。熱上沖胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脰拘急。悉皆主之。

婦人棍禱燒灰存性。

右細研方寸匕。水調服。小便利。陰頭痛即愈。

假鼠糞湯 治大夫傷寒病后。女人與之交。病名陽易。

韭根一握去青 約半
假鼠糞十四粒兩頭六者是。

右二味水一盞。煎半盞。去滓頻頻溫服。粘汗汗出為度。未知再作。

發斑證治

傷寒發斑者。蓋不當下而下之。熱則乘虛入胃。當下而失下。則胃熱不得泄。二者皆能發斑。其狀如錦紋。赤者易治。黑者難治。蓋熱毒入胃深也。

玄參升麻湯 治傷寒失下。不當下而下之也。熱毒在胃發斑如錦紋。甚則煩躁譫語。兼治喉閉腫痛。

玄參 升麻 炙草

各五錢

右剉散。每服五錢。水盞半。煎七分。溫服。濕毒亦能發斑。

吳繡堂曰。仲景傷寒論三百九十七法。於六經無症不備。無語不精。真能讀之。可治萬病。故歷代醫學名大家。皆崇奉之。陳無擇此篇。就其提綱中要處。擗出示人。以簡而易知之法。別具苦心。然於六經傳變及救逆大法。尚須精研全書。方知要領。是篇於六經傷寒用藥格法。推闡其所以然之故。真堪羽翼經旨。惟將五積散之。

方雜不純者。攬入其中。殊不可解。傷寒全書方法。至精至粹。愈讀而愈有味。無庸畫蛇添足也。

三因極一病源論粹方卷四終

三因極一病證方論粹卷之五

壞傷寒證治

壞傷寒者。以醫者不辨陰陽。錯謬汗下。致病不解。壞證亂經。又傷寒過經。熱留臟腑。病經數變。久而不差。陰陽無復紀律。皆名壞病。
知母麻黃湯 治壞傷寒。以傷寒瘥後。經久精神不守。言語錯亂。或潮熱煩赤。寒熱如瘧。昏沉不愈。皆由汗下不止。毒在心包間所致也。

知母 麻黃 火草 芍藥 黃芩 桂心

各兩半

右剉散。每服五錢。水一盞半。煎七分。去滓溫服。日三四服。若心煩欲飲水。稍稍與之。

無憂散 治傷寒調理失序。毒氣內結。胸腹脹滿。坐卧不安。日久不瘥。狂躁妄語。大小便不通。或復吐逆。

臘月黃牛膽

以天南星為末。入胆內。繡定。令紫當風避日懸之。候乾取用。

右為末。以人參半兩。煎湯七分一盞。調末二錢。乘熱服。遲頃更以熱人參湯投之。或睡。便溺下黃黑惡物。是效。

黑奴丸 治傷寒調理失序。醫所不治。及時行疫病。六七日不汗。脈洪數。面赤目瞪。身熱。煩躁。狂言欲走。大渴。或口噤。精魂已散。但心下緩。幹開口灌藥。下咽即活。并治陽毒發斑。

麻黃

去節

大黃

小麥奴

芒硝

釜底煤

桑上塵

各另研

竈突墨

另研各一兩

右為末。煉蜜丸。彈子大。新汲水研下一丸。渴者與冷水。蓋飲之。須臾當寒。寒竟。汗出便瘥。若日移五尺。不汗。依前法服一丸差。須病人大渴。乃可與之。不渴者莫服。

狐惑證治

狐惑證者。默默欲眠。目不得瞑。惡飲食。面目乍赤乍白。乍黑。齒無色。
舌上白聲。嘔咽乾。此因大病後。腸胃空虛。三虫求食。食人五臟。食其
咽。則為惑。其聲嘔。食下部。則為狐。其咽乾。當看上唇有瘡。為狐虫食
其臟。下唇有瘡。為惑虫食其肛。

桃仁湯

桃仁去皮尖

槐子研

艾各一兩

右剉散。每服五錢。水一大盞。薑三片。棗二枚。煎七分。去滓食前服。
黃連犀角湯。治傷寒及諸病後。內有瘡出下部。

黃連

半兩

犀角一兩。如無以升麻代

烏梅七枚

木香一分

右剉散。

每服五錢。水蓋半。煎七分。去滓食前服。

雄黃銳散。治下部蟲瘡。

雄黃研

青葙子

苦參

黃連

桃仁去皮尖

研一分

右為末。

生艾搗汁和如棗核大。錦囊納下部。扁竹汁更佳。無艾只

用綿裹散子。內下部亦得。

譴語證治

病有言語錯亂者。其證有二。有虛有實。虛則鄭聲。實則譴語。傷寒胃實及三陽合病。婦人熱入血室。及下利而譴語者。皆屬實熱。大小便利手足逆冷。脈微細。言語鄭聲者。皆屬虛寒。治之各有方。虛寒宜溫。如四逆湯之類。胃寒宜下。承氣湯。婦人熱入血室。小柴胡湯。若譴語而四肢逆冷。脈沉細者不治。

四逆湯

方見兩感

柴胡湯

方見少陽證

大承氣湯

方見明經陽

病後虛煩證治

大病後心虛煩悶發熱。與傷寒相類。但不惡寒。與不頭痛為異。汗與人參竹葉湯。嘔者橘皮湯。諸病後多有此證。各見本門。
人參竹葉湯 治汗下後表裡虛煩。不可攻者。

竹葉二把

人參

災草各三兩

半夏兩半

石膏

麥冬各五兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。薑五片。粳米一撮。煎至米熟。去滓食前服。

橘皮湯 治動氣在下。不可發汗。發之反無汗。心中大煩。骨節疼痛。目運惡寒。食則反嘔。穀不得入。宜服此方。

橘皮

兩半

災草

半兩

人參

一錢

竹茹

半兩

右㕮咀。每服五錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓食前服。

料簡

凡傷寒中雜病。證狀非一。當隨門類。酌量施治可也。如發黃。則多用五疸中藥。只依黃疸治之。發狂已見陽毒門。吐衄便利瘀血。見失血門。下利見滯下。奔豚見五積。陰陽厥見厥論。嘔噦喘咳見本門。其他

更不繁錄。

吳補堂曰。傷寒一書。凡經汗吐下燒針誤治者。皆屬壞病。救誤方法甚多。此篇方法無幾。非再熟讀仲景書不可也。惟按之又各有條理。治陰陽錯雜。治痰。治虫。治譫語。治病後虛煩。及動氣。多本仲景心法。陳氏具有見地。非隨意攬入以成書也。究之傷寒必讀全書方可。

傷暑敘論

傷暑者。乃夏至前後各三十日有奇。少陽相火用事之時也。炎熱大行。燉石流金。草萎河涸。人或傷之。則發熱自汗。面垢背寒。倦怠少氣。以暑消氣。氣消血散。與傷相類。此夏間即病。非冬傷寒。至夏發為熱病也。當以脈別之。傷暑脈虛無力。益因氣血消散致脈虛弱。其傷寒則血泣而閉。脈緊而有力。大不同也。要畧言。傷寒家別有暎病。益詮次者見其一條別在後。故有是說。輕重不同。識者當自知之。

傷暑證治

病者身熱惡寒。頭痛狀如傷寒。或往來寒熱。如瘧。煩躁渴甚。眩暉嘔吐。背寒面垢。泄瀉。昏悶不清。其脈陰陽俱虛。緩而弱。皆由傷暑之所致也。

却暑散 治冒暑伏熱。頭目眩暉。嘔吐泄利煩渴。而背寒面垢。

赤茯苓

生甘草

各四兩

寒食麵

生薑

各一斤切搜麵令白

右為末。

每服二錢。新汲水調下。或湯點。不拘時服。

五苓散 治傷暑煩渴。引飲無度。兼治傷寒溫熱。表裡未解。煩渴引水。水入即吐。或小便不利。及汗出表解。煩渴不止。又治霍亂吐利。

黃疸溫疫。

澤瀉

兩半

桂心

一兩

豬苓

去皮

赤茯苓

白朮

各一兩半

右為末。每服二錢。沸湯調。不拘時服。服訖多飲熱湯。汗出即愈。

桂苓丸 治煩渴。消痰飲。寬胸膈。

桂心

白术

各二兩

赤茯苓

三兩

烏梅肉

一兩半

乾薑

一兩

災草

五錢

右為末。蜜丸彈子大。每服一丸至二丸。細嚼。沸湯送下。

香薷丸 治大人小兒傷暑。伏熱。躁渴。昏悶。頭目昏眩。胸膈煩滿。嘔噦惡心。口苦舌乾。支體困倦。不思飲食。或發霍亂。吐利轉筋。並宜服之。

香薷

去梗

紫蘇

去梗

乾木瓜

各一兩

丁香

災草

檀香

白茯苓

藿香

右為末。蜜丸彈子大。每服一丸至二丸。熟水嚼下。或新汲水化下。

小兒半丸

消毒丸 治中暑煩渴。眩暉寒熱。

半夏

炮去滑米泔
者令透一斤

茯苓

生甘草

各半兩

右為末。蜜九桐子大。每服三十九。新汲水不拘時下。

吳蘭堂曰。暑為熱氣。其感人往往身體倦急。肌肉消燥。葉天士對於此病。每取辛涼輕清通液之品。最為精妙。蓋從孫真人生脈飲用意悟出。也是篇大致不差。而葉法尤當補出。

傷濕敘論

經云。濕為停着。凡關節疼痛。重痺而弱。皆為濕着。若氣不平。亦使人半身不遂。口眼歪斜。涎潮昏塞。此中濕之候也。夫寒、熱、風、濕。皆能并合為疾。所謂風濕寒濕濕溫者。其證各有不同。為治亦別。不可不辨。若治風濕寒濕。當發其汗。但微微似汗出。則風濕俱去。若大汗出。風去濕不去。則不能愈。若治單單中濕。只宜利小便。忌不得以火攻。并轉利濕家下之。額上汗出。微喘。小便不利者死。若下利不止者亦死。論曰。治濕不利小便。非其治也。

傷濕證治

病者身重脚弱。關節重疼。發熱惡寒。小便閉澀。大便飧泄。自汗。腰脚冷痺。腿膝浮腫。小便或自利不渴。皆久坐卑濕。或為雨露所襲。或汗出沾衣受濕。漸漬得之。名曰濕痺。

腎着湯 治身重腰冷痺。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。從身勞汗出。衣裏冷濕。久而得之。腰以下冷痛。腰重如帶五千錢。

白术

炙草各三兩

炮薑

茯苓各四兩

右剉散

每服四錢。水盞半煎七分。去滓空心服。

滲濕湯

治坐卧濕地。或為雨露所襲。身重脚弱。關節疼痛。發熱惡寒。或小便秘塞。大便飧泄。或汗出衣裡濕漬得之。腿膝或腫。小便利反不渴。

利反不渴。

蒼术
米泔浸

白术 甘草

炙各二兩

乾薑 炮

茯苓

各四兩

陳皮 丁香

各半兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎三片。棗二枚。煎七分。去滓溫服。

寒濕證治

病者身體煩疼。無汗。惡寒。發熱。脈浮緩細。皆寒、濕相併所致也。

麻黃白朮湯 治寒、濕身體煩疼。無汗。惡寒。發熱者。

麻黃

去節三兩

桂心

二兩

炙草

一兩

杏仁

二十五粒去皮尖研

白朮

四兩

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。煎七分。去滓空心服。

風濕證治

病者身疼。日晡發熱。不能轉側。短氣汗出。惡風不欲去衣。或身微腫。脈浮弦細。此風濕相搏。或汗出當風所致也。

桂枝附子湯 治風濕相搏。身體煩疼掣痛。不得屈伸。汗出。短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫。

桂枝 四兩 白朮 附子 各三兩 炮去皮臍 甘草 二兩

右㕮咀。每服四大錢。水盞半。薑五片。棗二枚。煎七分。去滓空心溫服。或大便祕則去桂。小便不利。悸氣加茯苓三兩。痺加防己四兩。腹痛加芍藥四兩。

風濕寒證治

病者汗出身重。惡風。喘氣。腹內不和。下氣上衝。臍下連脚冷痺。不能自屈伸。骨節煩痛。近之則痛極如歷節狀。此由冒風濕寒。三氣雜至而為病也。

防己黃芪湯 治傷風濕寒。脚浮緊細。身重汗出。惡風。并治風水脈浮。身重不渴。

防己 四兩 黃芪 五兩 炙草 白朮 各三兩

右㕮咀。每服五錢。水盞半。薑五片。棗四枚。煎七分。去滓空心服。喘

者加麻黃。胃中不和加芍藥。氣上冲加桂。下有陳寒加細辛。服藥後當如虫行皮中。從腰以下如水浸。坐被上。又以一被繞身腰。以下溫令微汗差。

風濕溫證治

病者煩渴引飲。心腹冷痛。躁悶。口乾面垢。惡寒惡風。饑不能食。眩暉。嘔噦。此伏暑中風濕所致也。治之各有方法。

白朮 茯苓 乾薑湯 治伏暑中風濕。煩渴引飲。心腹疼痛。躁悶。口乾面垢。洒洒惡寒。淅浙惡風。微汗。飢不能食。

白朮 乾薑 茯苓 細辛 桂心 乾葛 甘草 橘皮 烏梅 香豉

右㕮咀等分為末。每服二錢。白湯點下。

暑風濕溫證治

暑者六氣之一能與風濕併合為病循經流人諸臟但與寒不相得故有暑濕風濕之證。暑濕者惡寒反熱自汗關節盡痛頭目昏眩手足倦怠不自勝持此併傷暑濕所致也。風溫者頭痛身熱常自汗出體重喘息四肢不收嘿嘿欲眠此由先傷風後傷暑所致也治之各有方法。

茯苓白术湯 治冒暑毒加以着濕或汗未乾即浴皆成暑濕

茯苓 炮薑 甘草 白术 桂心各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分去滓空心服

姜蕤湯 治風濕兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛咽喉乾舌強胸內疼痛痞滿腰背拘急

姜蕤三分 麻黃 炙草 白薇 葛根 羌活 杏仁去皮尖各半兩

石膏一兩 川芎 青木香一分

右㕮咀。每服五錢。水盞半煎。七分去滓空心服。木香冬用一兩。春用半兩。

吳繡堂曰。此漢晉以來治濕兼風寒溫暑不易之良法也。方俱精粹。君火論。

五行各一。惟火有二者。乃君相之不同。相火則麗於五行人之日用者。是也。至於君火。乃二氣之本原。萬物之所資始。人之初生。必投生於父精母血之中。而形成。精屬腎。腎屬水。故天一而生水。血屬心。心屬火。故地二而生火。識為玄。玄屬水。故天三而生水。乃太乙含三引六之義也。亦道生一。一生二。二生三之數也。則知精血乃裁成於識。以識動則暖。靜則息。靜息無象。暖觸可知。故命此暖識以為君火。正內典所謂暖識。息三連持壽命者是也。然其所以謂之君火者。以其不行炎暑。象君之德。萬物資始。象君之化。位居少陽。象君之政。神明出

人象君之令。故君亦天也。天亦君也。乾以元亨利貞而運行於其上。君以德化政令而輔成於其下。天道順序則生長化收藏不失其時。君道助順故進退存亡不失其正。其實皆一理也。成象取法雖主配于心腎。推而明之一點精明無物不備。是宜君火之用上合昭昭下合冥冥與萬物俱生而無所間斷也。醫者苟不明此皆墮於術數技藝與夫瞽史之用易拘拘於卜筮休咎之中。吾見其大蔽聖人之道未聞有益于天下後世也悲夫。

五運論

夫五運六氣乃天地陰陽運行升降之常道也。五運流行有太過不及之異。六氣升降則有逆從勝復之差。凡不合於德化政令者則為變眚。皆能病人。故經云。六經波蕩五氣傾移。太過不及專勝兼併。所謂治化人應之也。或遇變眚聿興灾沴。因鬱發以亂其真常之德而

致折復隨人藏氣虛實而為病者謂之時氣與夫感冒中傷天行疫
冷顯然不同。前哲知夫天地有餘不足違戾之氣還以天地所生德
味而平治之。經論昭然人鮮留意恐成湮沒故敍而紀之。

五運時氣民病證治

凡遇六壬年發生之紀歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食
減體重煩冤腸鳴脇支滿甚則忽忽喜怒眩冒顛疾為金所復則反
脇痛而吐甚則衝陽絕者死。

苓术湯 治脾胃感風飧洩注下腸鳴腹滿四肢重滿忽忽善怒眩
胃顛暉或左脇偏疼。

白茯苓

厚朴

薑汁製

白术

青皮

乾薑

炮

半夏

湯泡去滑

草

果去皮

炙草

各等分

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片棗二枚煎七分去滓空心服

凡遇六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金受邪民病瘡瘍少氣咳喘血溢泄瀉嗌燥耳聾中熱肩背熱甚胷中痛脇支滿背髀並兩臂痛身熱骨痛而為浸淫為水所復則反譙妄狂越咳喘息鳴血溢泄瀉不已甚則大淵絕者死

麥門冬湯 治肺經受熱上氣咳喘咯血痰壅嗌乾耳聾泄瀉胸脇滿痛連肩背兩臂脣疼息高

麥門冬去心 香白芷 半夏 竹葉 甘草 鍾乳粉 桑白皮

紫苑取莖 人參各等分

右㕮咀每服四錢水蓋半薑二片棗一枚煎七分去滓空心服

凡遇六甲年敦阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厭意不樂體重煩冤甚則肌肉痠足痿不收脅善瘻脚下痛中滿食減四肢不舉為風所復則反腹脹溏洩腸鳴甚則大谿絕者死

附子山萸茱湯 治腎經受濕。腹痛寒厥。足痿不收。腰脛痛。行步艱難。甚則中滿。食不下。或腸鳴溏泄。

附子 山萸肉

各一兩

乾木瓜

烏梅

各半兩

半夏

肉豆蔻

各三錢

錢 瓜香 丁香

各一錢

右㕮咀。每服四錢。水盞半。薑七片。棗一枚。煎七分。去滓。空心服。
凡遇六庚年。堅成之紀歲。金太過。燥氣流行。肝木流邪。民病脇與小腹痛。目赤皆痒。耳無聞。體重煩冤。胸痛引背。脇滿引小腹。甚則喘欬逆氣。背肩尻陰股膝髀腨腨足痛。為火所復。則暴痛。胠脇不可反側。欬逆甚而血溢太衝絕者死。

牛膝木瓜湯 治肝虛。遇歲氣燥濕更勝。腸連小腹拘急疼痛。耳聾目赤。咳嗽。肩背連尻陰股膝髀腨腨皆痛。悉主之。

牛膝

酒浸

木瓜

各一兩

芍藥

杜仲

去皮、蕕、製去絲

枸杞子

黃松

節 兔絲子 酒浸 天麻 錄各五 火草 半兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓空心服。
凡遇六丙年。漫衍之紀歲。水太過寒。氣流行邪害心火。民病身熱。
煩心躁悸。陰厥。上下中寒。譖妄心痛甚。則腹大脹腫。喘咳。寢汗。
憎風為土所復。則反腹滿腸鳴。溏泄食不化。渴而妄冒。甚則神門
絕者死。

川連茯苓湯 治心虛為寒冷所中。身熱心躁。手足反寒。心腹腫痛。
喘喝自汗。甚則大腸便血。

黃連 茯苓 醬各一
半夏 黃芩 火草 各一
麥冬 去心
車前子 通草
遠志 去心 薑汁
製各半兩

右咬咀。每服四錢。水盞半。薑七片。棗一枚。煎七分。去滓空心服。
凡遇六丁年。委和之紀歲。木不及。燥乃盛行。民病中清。胠脇小腹痛。

腸鳴溏泄為火所復則反寒熱瘡瘍。瘻癥癰腫。咳而軀

芙蓉牛膝湯 治肝虛為燥熱所傷。胠脇并小腹痛。腸鳴溏泄或發
熱。偏體瘡瘍。咳嗽。肢滿鼻軀。

肉芙蓉

酒浸

牛膝

酒浸

乾木瓜

白芍藥

熟地黃

當歸

炙草各等

右㕮咀每服四錢。水盞半。薑三片。烏梅半個。煎七分。去滓空心服。
筋痙脚弱。鎊鹿角屑同煎。

遇六癸年伏明之紀歲。火不及寒。乃感行民病。胃痛。脇支滿。應背肩
胛兩臂內痛。鬱冒。蒙昧。心痛。暴瘡甚。則屈不能伸。骯髀掣痛。為土所
復。則反驚瘧。食飲不下。寒中腸鳴。泄注腹痛。暴掣痙痺。足不能任身。
黃芪茯神湯 治心虛挾寒。心胸中痛。兩脇連肩。背肢滿。噎塞鬱冒。
矇昧。骯髀掣痛。不能屈伸。或下利溏泄。飲食不進。腹痛。手足痙痺。

不能任身。

黃芪 茯神 遠志

薑汁
醃炒

紫河車 米仁

炒分等

右㕮咀。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一粒。煎七分。去滓空心服。
遇六己年卑監之紀歲。土不及。風氣盛行。民病飧泄霍亂。體重腹痛。
筋骨繇併。肌肉瞞酸。善怒。為金所復。則反胃脇暴痛。下引小腹。善太
息。氣客於脾。食少失味。

白术厚朴湯 治脾虛風冷所傷。心腹脹滿疼痛。四肢筋骨重弱。肌
肉瞞動。酸嘶善怒。霍亂吐瀉。或胸脇暴痛。下引小腹。善太息。食少
失味。

白术 厚朴

製

半夏

桂心

藿香

青皮

各二
兩

炮薑

炙

草

各半
兩

右㕮咀。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓食前溫服。

遇六七年從革之紀歲。金不及炎火感行。民病肩背督重。孰嘯血便注下。為水所復則反頭腦戶痛。延及顛頂。發熱口瘡心痛。

紫苑湯 治肺虛感熱。咳嗽喘滿。自汗衄血。肩背督重。血便注下。或腦戶連顛頂痛。發熱口瘡心痛。

紫苑茸

白芷 人參 甘草

黃芪 地骨皮

杏仁

去皮

桑皮

炙各等分

右㕮咀。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓空心服。遇六辛年涸流之紀歲。水不及濕乃盛行。民病瘡滿身重。濡泄寒癟。腰腿股膝痛不便。煩冤足痿清厥。脚下痛甚。則腫脹。腎氣不行。為本所復。則反面色時變。筋骨并蹙。肉瞶瘦。目視眊眊。肌肉胗發。氣并膈中。痛于心腹。

五味子湯 治腎氣虛。卧坐濕地。腰膝重着疼痛。腹脹滿。濡泄無度。

行步艱難。足痿清厥。甚則浮腫。面色不常。或筋骨并辟。目視矇矇。膈中及咽痛。

五味子

附子

炮去

巴戟肉

去心

鹿茸

燎去毛

山萸肉

熟地

杜仲

薑汁炒各等分

右㕮咀。每服四錢。水一大盞。薑七片。鹽少許。煎七分。去滓食前服。以差為度。

凡六壬六戊。六甲六庚。六丙歲。乃木火土金水太過。五運先天。六丁六癸。六己。六乙。六辛歲。乃木火土金水不及。為五運後天。民病所感。治之各以五味所勝。調和以平為期。

六氣敘論

夫陰陽升降。在天在泉。上下有位。左右有紀。地理之應。標本不同。氣應異象。逆順變生。太過不及。悉能病人。世謂之時氣者。皆天氣運動。

之所為也。今先次地理本氣然後以天氣加臨為標有勝有復隨氣主治則悉見病源矣。

本氣論

自大寒後至春分。

厥陰風木
為一主氣

春分至小滿。

少陰君火
為二主氣

小滿至大暑。

少陽相火
為三主氣

大暑至秋分。

太陰濕土
為四主氣

秋分至小雪。

陽明燥金
為五主氣

小雪至大寒。

太陽寒水
為六主氣

凡一氣所管六十日八十七刻半為本氣後以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明之。

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天初之氣乃少陽相火加臨厥陰風木民病瘡身熱頭痛嘔吐肌腠瘡癰二之氣陽明燥金

加臨少陰君火。民病氣鬱中滿三之氣太陽寒水。加臨少陽相火。民病寒及熱中癰疽。注下心熱督悶四之氣厥陰風木。加臨太陰濕土。風濕交爭。民病太熱少氣。肌肉痿足痠。注下赤白五之氣少陰君火。加臨陽明燥金。民病迺舒。終之氣太陰濕土。加臨太陽寒水。民病慘悽孕死。治法宜用甘溫以平水。酸苦以補火。抑其運氣扶其不勝。

靜順湯 治辰戌歲太陽司天。太陰在泉。民病身熱頭痛。嘔吐氣鬱。中滿督悶。少氣足痿。注下赤白。肌腠瘡瘍。發為癰疽。

白茯苓

木瓜乾

各一兩

附子

一兩

牛膝

酒浸各三分

防風

去叉

訶子

炮去核

炮薑

災草

各半兩

右㕮咀每服四大錢水蓋半煎七分去渣空心服其年自大寒至
春分宜去附子。加枸杞半兩。自春分至小滿。依前入附子。枸杞自

小滿至大暑。去附子。木瓜。乾薑。加人參。枸杞。地榆。香白芷。生薑。各三分。
雨。自大暑至秋分。依正方。加石榴皮半兩。自秋分至小雪。依正方。自
小雪至大寒。去牛膝。加當歸。芍藥。炒阿膠。各三分。

卯酉之歲。陽明司天。少陰在泉。氣化運行後天。初之氣。太陰濕土。加
厥陰風木。此下尅上。民病中濕腫脈。面目浮腫。善上。軋齶。嘔欠。嘔吐。
小便黃赤。甚則淋。二之氣。少陽相火。加少陰君火。此臣居君位。民病
瘍瘍。至善暴死。三之氣。陽明燥金。加少陽相火。燥熱交合。民病寒熱。
四之氣。太陽寒水。加大陰濕土。此下土尅上水。民病暴仆。振慄譖妄。少
氣咽乾。引飲心痛。癱瘓瘡瘍。寒瘞骨痿。便血。五之氣。厥陰風木。加陽
明燥金。民病氣和。終之氣。少陰君火。加太陽寒水。此下尅上。民病渴
治法。宜鹹寒以抑火。辛甘以助金。汗之。清清水散之。安其運氣。

審平湯。治卯酉之歲。陽明司天。少陰在泉。病者中熱。面浮鼻軋。小

便黃赤甚則淋或癟氣行善暴仆振慄譫妄寒瘡癰腫便血

遠志肉

薑汁炒

紫檀香

各一兩

天門冬

去心一錢

山茱萸

各三兩

白

术 白芍藥

炙甘草

生薑

各五錢

右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去渣食前服自大寒至春分加白茯苓半夏紫蘇生薑各半兩自春分至小滿加玄參白薇各半兩自小滿至大暑去遠志山萸白术加丹參澤瀉自大暑至秋分去遠志白术加棗仁車前子各半兩自秋分至大寒並依正方

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行先天初之氣少陰君火加厥陰風木民病溫氣拂於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠生瘡二之氣太陰濕土加少陰君火民病熱鬱欬逆嘔吐胸臆不利頭痛身熱昏憤膿瘡三之氣少陽相火加相火民病熱中聲瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴噦喉痺目赤善暴死四之氣陽明燥金

加太陰濕土。民病胸滿身重。五之氣太陽寒水。加陽明燥金。民避寒邪。君子周密。終之氣厥陰風木。加太陽寒水。民病開閉不禁。心痛。陽氣不藏而欬。治法宜鹹寒平其上。辛溫治其內。宜滲之泄之清之發之。

升明湯 治寅申之歲少陽相火司天。厥陰風木在泉。病者氣鬱熱血溢目赤。欬逆頭痛。腸滿嘔吐。胸臆不利。聾瞑渴身。重心痛。陽氣不藏。瘡瘍煩躁。

紫檀香 車前子 炒
炙草 雨各半

右㕮咀。每服四錢。水盞半煎七分。去渣空心服。自大寒至春分。加白薇。玄參。各半兩。自春分至小滿。加丁香一錢。自小滿至大暑。加漏蘆。升麻。赤芍。各半兩。自大暑至秋分。加茯苓半兩。自秋分至小

雪依正方。自小雪至大寒。加五味子半兩。

丑未之歲。太陰濕土司天。太陽寒水在泉。氣化運行後天。初之氣。厥陰風木加風木。民病血溢。筋絡拘強。關節不利。身重筋痠。二之氣。少陰君火加君火。民病溫癘盛行。遠近咸若。三之氣。太陰濕土。加少陽相火。民病身重。脇腫。脅腹滿。四之氣。少陽相火。加太陰濕土。民病腠理熱血暴溢。瘡心。腹膜脹甚。則浮腫。五之氣。陽明燥金。民病皮膚寒氣。及體終之氣。太陽寒水。加太陽寒水。民病關節禁固。腰脛痛。治法。用酸以平其上。甘溫以治其下。以苦燥之溫之。甚則發之泄之。贊其陽火。令禦其寒。

備化湯 治丑未之歲。太陰濕土司天。太陽寒水在泉。病者關節不利。筋脈拘急。身重痿弱。或溫癘盛行。遠近咸若。或胸腹滿悶。甚則浮腫寒瘡。血溢腰脛痛。

乾木瓜

茯神

去木各一兩

牛膝

酒浸

附子

炮去皮臍各三分

熟地黃

覆盆子

各半兩

生甘草

一分

生薑

三分

右㕮咀。每服四大錢。水盞半。煎七分。去滓食前服。自大寒至春分依正方。自春分至小滿。去附子。加天麻防風各半兩。自小滿至大暑。加澤瀉三分。自大暑直至大寒。並依正方。

子午之歲。少陰君火司天。陽明燥金在泉。氣化運行先天。初之氣。太陽寒水。加厥陰風木。民病關節禁固。腰脛痛。中外瘡瘍。二之氣。厥陰風木。加少陰君火。民病淋目赤。氣鬱而熱。三之氣。少陰君火。加少陽太陽。民病熱厥。心痛。寒熱更作。欬喘目赤。四之氣。太陰濕土。加太陰濕土。民病黃疸。孰齶。嗌乾吐飲。五之氣。少陽相火。加陽明燥金。民乃安康。終之氣。陽明燥金。加太陽寒水。民病上瘡欬喘。甚則血溢下連小腹而作寒中。治法。鹹以平其上。苦熱以治其內。鹹以軟之。苦以發之。

酸以收之。

正陽湯 治子午之歲少陰君火司天。陽明燥金在泉。病者關節禁固。腰痛氣鬱熱。小便淋目赤心痛。寒熱更作。咳喘或鼽衄嗌咽吐飲發黃疸喘甚則連小腹而作寒中。悉主之。

白薇

玄參

川芎

桑白皮

當歸

芍藥

旋覆花

甘草

炙

生薑各半兩

右㕮咀每服四錢水盞半煎七分去滓空心服下。自大寒至春分加杏仁升麻各半兩。自春分至小滿加茯苓車前子各半兩。自小滿至大暑加杏仁麻仁各一分。自大暑至秋分加荆芥茵陳蒿各一分。自秋分至小雪依正方。自小雪至大寒加紫蘇子半兩。

己亥之歲厥陰風木司天。少陽相火在泉。氣化運行後天。初之氣陽明燥金。加厥陰風木。民病寒於右脇下。二之氣太陽寒水。加少陰君

火。民病熱中。三之氣厥陰風木。加少陽相火。民病淚出耳鳴掉眩。四之氣少陰君火。加太陰濕土。民病黃疸腫脹。五之氣太陰濕土。加陽明燥金。燥濕相勝。寒氣及體。終之氣少陽相火。加太陽寒水。此下水尅上火。民病溫瘍。治法宜用辛涼平其上。鹹寒調其下。畏火之氣無妄犯之。

敷和湯 治己亥之歲厥陰風木司天。少陽相火在泉。病者中熱而反右脇下寒。耳鳴淚出。掉眩。燥濕相搏。民病黃疸浮腫。時作溫瘍。半夏 桂肉 五味子 炮薑 枳實炒去核 茯苓 訶子炮去核 橘皮 炙草各五錢

右㕮咀。每服四錢。水盞半。煎七分。去渣空心服。自大寒至春分。加鼠粘子一分。自春分至小滿。加麥門冬去心。山藥各一分。自小滿至大暑。加紫苑一分。自大暑至秋分。加澤瀉。山梔仁各一分。自秋

分至大寒並依正方

六氣凡例

凡六氣數起於上而終於下。歲半之前自大寒後天氣主之。歲半以後自大暑後地氣主之。上下交互氣交主之。司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之謂之四畏。若天氣反時可依時及勝其主則可犯以平為期不可過也。

吳補堂曰運氣為病當隨其勝復為之劑酌以臻於平其間必隨臟腑軀體而見症有時可憑亦有時而不可憑是篇根據甲子用藥按圖索驥為一定之理法以備考證則可耳。