Tipos de drogas y sus efectos

La siguiente lista, es un resumen muy simplificado de los distintos tipos de drogas y sus efectos con el fin de conocer la inutilidad del consumo de las mismas.



Alcohol

Tipodedroga:Depresivo.Formadeconsumo:Oral.

Efectos: Adicción (alcoholismo), mareos, nausea, vómitos, resacas, dificultad de expresión, sueño interrumpido, problemas motores, conducta agresiva, problemas al embarazo, depresión respiratoria y muerte (en dosis altas).



Anfetaminas

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Oral, inyectado, ingerido o fumado.Efectos:Adicción, irritabilidad, ansiedad, presión alta, paranoia, psicosis, depresión, agresión, convulsiones, pupilas dilatadas, mareos, falta de sueño, falta de apetito, malnutrición, altos riesgos al VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas si es

inyectado.



Metanfetaminas

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Oral,inyectado,ingeridoofumado.Efectos:Adicción, irritabilidad, agresión, hipertermia, derrames cerebrales, paranoia, psicosis, convulsiones, toxicidad en elcorazón y los vasos sanguíneos, alucinaciones, arritmia, (la sensación de que insectos andan por debajo de la piel).



Ecstasy

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Oral.

Efectos: Disturbios psiquiátricos como el pánico, la ansiedad, la depresión y la paranoia. Tensión muscular, náusea, visión borrosa, transpiración, palpitaciones elevadas, estremecimientos, alucinaciones, desmayos, escalofríos, problemas para dormir y

falta de apetito.

Benzodiasepinas

Tipodedroga:Estimulantes/relajantesydepresivosFormadeconsumo:Oraloinyectada.

Efectos: Falta de apetito, calenturas, convulsiones y dolores de cabeza severos. Alto riesgo al VIH, hepatitis y otras infecciones. Paranoia, alucinaciones, repetición de movimientos y tareas sin sentido excesivos, estremecimientos, tics musculares, sensación de energía o mucho sueño.



Herbal Ecstasy/Efedrina

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Oral.

Efectos: Palpitaciones elevadas y presión alta. Ataques epilépticos, infartos, derrames cerebrales y muerte.

.



Designer Drugs

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Inyectado,ingeridoofumado.Efectos:Parálisis respiratoria instantánea.Alta posibilidad de sobredosis por su potencia.Muchos de los mismos efectos de la heroína.

.



Cocaína

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Inhalada, fumada o disuelta en agua e inyectada.Efectos:Adicción, dilatación de las pupilas, presión y latidos del corazón elevados. Respiración elevada, ataques epilépticos, infartos, insomnio, ansiedad, inquietud, irritabilidad, temperatura elevada, muerte de una sobredosis.

Crack

Tipodedroga:Estimulante.Formadeconsumo:Fumado.

Efectos: Igual que la cocaína.

.



Heroína

Tipo			de			droga:			Opiác	eos
Forma	de		consumo:		Smack.	Sue	le	ser	inyect	ada
Efectos: Ac	licción. Voca	alización poco	clara, paso	lento, pupila	as contraída	s, párpados p	erezosos, pro	blemas con l	a visión noctu	rna
adormecim	iento, depres	ión respirator	ria o falta de	respiración	, resequeda	d de la piel, i	nfecciones ep	oidérmicas. A	Alto riesgo a V	/IH
hepatitis y	otras enferme	edades contag	giosas, si se i	nyecta.						
		-								
1		-	_							
		PC	Р							
Tipo			de			droga:			Alucinóg	eno
Forma	de	consu	mo:	Ingerido,	1	fumado,	oral	0	inyect	ado
Efectos: A	lucinaciones.	Experiencia	s de desdob	lamiento, p	roblemas c	on la coordir	ación motriz	z, inhabilidad	d de sentir do	olor
									contagiosas	
inyecta. Mu			. 1			. 1	,		C	
	S	0								
a Fight	1	TX.								
	- ()									
N AND		ATT								
7 0.7	14-17 TO	ALL PLANT								
1										
4-14		LSI	D (Lvs	ergic A	Acid I	Diethyl	amide)		
Tipo			de	8		droga:	,	,	Alucinóg	eno
Forma	de c	onsumo:	Oral	como	gelatina/	líquido	puesto	en		ojos
					_	stremecimien	1			J
Lycologi 10		WANTE OF THE	ou, 10100 00 0	potito, raita	ac 5ac115, c		oo, araema	.01100 01011100		
Contract of	A DESCRIPTION OF	-								
The same		19								
1111										
16	N.A.	- do								
	11									
The same	A	And the second								
Honge	OS									
_	OS		de			droga:			Alvoináa	000
Tipo Forma	1.			a da a	a la			doo	Alucinóg	
	de	consumo:	Mastic			ervidos	,	mados	como	té
Efectos: Pro	esion elevada	i, transpiració	n, nausea, al	ucinaciones	extremas q	ue pueden pro	ovocar locura	temporal.		
A 11	3									
	1									
1		100								
		T 1	.14							
-		lnh	alantes	5						

Forma de consumo: Los vapores son inhalados.

Efectos: Dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor en el abdomen, cambios drásticos en el humor, agresión, nausea, sangra la nariz, daño al hígado, el riñón y los pulmones, desequilibrios químicos peligros, falta de coordinación, fatiga, falta de apetito, se disminuye la capacidad de oír y la respiración, hepatitis o la neuropatía periférica por uso constante.



Marihuana

Forma de consumo: Fumada o consumida.

Efectos: Ojos rojos, boca seca, uso de razón limitado o afectado, razón del tiempo alterado, habilidades que requieren concentración o coordinación son afectadas, como manejar un coche; paranoia, ataques de ansiedad intensificados, percepción alterada, se dificulta el asimilar información nueva, problemas con el aprendizaje, la memoria, la percepción y el criterio, problemas con el habla, con escuchar, pensar, atención de información y resolución de problemas.



Forma de consumo: Oral o inyectado al músculo. Efectos: Cáncer del hígado, esterilidad, rasgos masculinos en mujeres, y femeninos en hombres, agresión, depresión, acné, cambios de humor.

.



Efectos: Adicción, problemas con el corazón, la laringe, el esófago, la vejiga, el páncreas, el riñón, y la boca, cáncer pulmonar, enfisema y bronquitis crónica, aborto espontáneo, niños nacen pesando poco.