類編朱氏集驗醫方

江蘇古籍出版社





類編朱氏集驗醫方

江蘇古籍出版

宛委別藏

（清）阮元輯

江蘇古籍出版社出版
江蘇廣陵古籍刻印社整理
江蘇省新華書店發行
上海市印刷七廠印刷
開本：七八七×一〇九二毫米　三十二開
印張：一八九七・七五　插頁：四八〇
一九八八年二月第一版
一九八八年二月第一次印刷
ISBN 7-80519-073-9/Z・13
定價：（全120册）2650 圓

宋朱佐撰佐字君輔湘麓人前有咸淳二年眉山蘇
景行序是編分風寒諸門采掇議論詳盡曲當凡所
載宋氏醫書多不傳之秘及又皆從當時善本錄出
如小兒病源方論長生丸塌氣丸較影抄本為詳

類編朱氏集驗醫方十五卷提要

序

二氣運行化生萬物而不能常和平人者天以扶其偏吾身與天下均此理也先賢謂不爲相則必爲醫相與醫分殊而心同皆所以扶陰陽之偏而致中和以生斯人也宰相之方抑多矣自典謨以後集其驗者有五焉曰伊訓曰説命曰周官曰出師表曰資治通鑑若夫醫師之方集之者衆而未有灼然保其驗者吾宗君輔萃聞見紀其効而録之視疾痛疴癢之於身切矣求余序所以作余曰藥進醫手方傳古人理也飲地黄麘服後果可服清凉散孚早服黄昏湯則不必飲定志圓孚喫厚朴湯者必衆矣君輔其爲我驗之哉

眉山朱景行序

類編朱氏集驗醫方目錄

卷之一

諸風門（附）諸中脚氣

中風評　八生飲子　舒筋圓　黃耆六一湯

八寶回春湯　五虎湯　大省風湯　三聖散

十八味流氣飲　省風散　拒風丹　附子煎

蠲痺湯　二妙散　夏英公酒浸飲子　獨活寄生湯

四君圓　醒風湯　小防風湯　人參南星圓

附子大獨活湯　紫金圓　防風湯　麝香輕骨丹

獨勝散　三香散　石楠圓
七聖散　敷貼脚氣藥　牛膝湯
敗毒散　赤小豆圓　草烏圓
張走馬飛步圓　如神湯　木瓜圓
香蝎圓　虎骨圓　秘傳循經圓
循絡圓　獨活散　神效圓
地黃湯　加味火炊圓　葷解散
雞鳴散　三皮散　烏靈圓
橘子仁湯　烏藥圓　木瓜敗毒散
去杖湯　平胃散　蒼弓千里飲
木香散　四製圓

傷寒門（附）諸瘧

雙解散　防風散　自汗痛渴便濁便數

冲和散　白芷散　神朮散　羌活散

羌活散　神應散　蒼朮散　蒼朮散

（諸瘧）知母散　川烏散　檳榔散　檳榔散

青蒿散　增料正氣散　蒜餅圓　露星散

三虎圓　瘧丹　四勝飲　三生飲

常山飲　蜀漆湯　檳榔散　良薑圓

蒼耳圓　大蒜平胃散　二薑圓

五苓飲子　草果飲　草果飲

冷附湯　不再散

草果七棗湯　杜傳瘧母丹

白汪救汪湯　牡蠣散
茯苓湯　着附湯
痟渴八味丸　鹿茸圓
棘鈎子散　冬瓜飲子
加味四君子湯　神功散
參着湯　麥門冬圓
鎖精圓　雞蘇圓
便數小便太過　縮泉圓
卷之三　諸痛門（附）諸疝　腰痛
諸氣評　流氣飲子　蘿蔔圓
烏豆圓　枳芎散　三稜圓

息賁湯　栗子酒　食銀散
薑合圓　薑附圓　主氣散
草豆蔻湯　橘子仁湯　秘傳枳殼圓
單桃方　參附正氣散　蓽澄茄散
（諸迺元招）胡索散　一捻金散　通閉飲子
木香飲　各半散　吳茱萸圓
金鈴子圓　金鈴子散　復元圓
橘核圓　三白散　大正氣散
茴香飲　（腰痛）破故圓　茴香酒
桂附圓　川烏圓　木附湯
銀河圓　神妙圓　趙痛圓
牽牛散又方

脾胃門（附）嘔吐　翻胃　水腫

脾胃評　大沉香降氣湯　崇土散
五補散　厚朴湯　八珠散
生胃丹　又生胃丹　煮朴圓
參橘圓　厚朴附圓　朴附圓
蒜煮壯脾圓　法製薑附圓　脾疼單方
水煎理中圓　木香神效散　枇杷葉散
白豆蔻圓　烏雞煎圓　桃仁散
進食散　丁香調氣湯　經進過院湯
平胃圓　安脾散　薑附湯
生胃圓　蝎梢散　參附正氣散

卷之五

痰飲門 附 咳嗽喘

痰飲評　王壺圓　半夏湯

煮浮圓　王浮圓　王液湯

白朮圓　參苓飲　靈砂白圓子

嗽加減三拗湯　二妙丹　杏仁湯

半夏湯　一服散　治肺熱久嗽方

參苓湯　杏仁煎　石夏圓

南星末　阿膠散　鍾乳散

五味子湯　真蘆湯　出聲散

金露飲　胡桃散　海藻散

治熱嗽方　治冷嗽方　赤茯苓湯

三聖飲　人參飲子　神效散
紫菀湯　洗心散　(喘)冷熱方論
水喘方論　坎离湯
劉散五味子　八寶丹
定喘湯　養氣丹
棗杏圓　黃牛散
麥花散
鮒魚圓
加減滲濕湯
疎鑿飲子
(喘)冷熱方論
卷之六
積聚門　(附)秘結
瀉痢　腸風　痔漏
黑圓子　遇仙丹　馬家五積圓
三稜圓　食藥三稜圓　(秘結)南木香圓
驅風圓　葱白散　琥珀散
治老小便不通　利氣散　小便不通五苓散

調氣散　輕粉散　潤腸圓
秘結并脚氣方　瀉劑至聖保命丹　蘇感圓
一聖散　乳香散　御米圓又方
金粟湯　百靈散　治痢諸方
澤蘭散　黄連圓　瓜蔞散
煨鯽魚方　戊己圓　肉果散
木香散　黄連散　薑茶圓
地榆散　諸色瀉痢方　車前散
固腸圓　棗肉圓　二宜圓
香茸圓　豆附散　大便虛滑不禁方
肚痛圓　猪肚圓　腸風枳殼湯又方
芍藥圓　黄連圓　如聖散

單方
黃連飲
當歸圓
熊膽膏又方
厚朴圓
黃芪四君湯又方
劉寄奴湯
治血痔方

卷之七

黃疸門（附）失血
淋閉

五疸評
黃者飲子
失血失血評

櫟斗散
聚珍圓又方
四神圓
石膏熟艾散
二妙散
弔腸圓
黑雪膏又方
蝎牛膏
洗心散
柏葉飲
痔漏荊芥散又方
木鼈散
血蝎散
單方
倍香膏

單方
單方又方
單方又三方

三豆湯　槐花散　止衄散
葉皮湯　地黃煎　又地黃煎
單方又方　參香圓　又方
二神湯　薏苡圓　地黃圓
六一散　氣喘血方　固榮散
勞心吐血方　犀角地黃湯　衄血方
鵝汁飲　治鼻衄血方　生地黃
七蒸圓　犀角地黃湯　衄血方
雄黃散　(淋閉)　通草湯
二神散　鹿角霜圓　髮灰散
石燕圓　瞑眩膏　沉香散
石韋湯　犀角地黃湯　小便出血方

白薇散
單方又方
單方
信效散
卷之八
虛損門（附勞瘵）
虛損評
十補圓
腽肭臍圓
茸附圓
仙茅圓
秘傳肉丹
單方
通秘散
定磁散
沙石淋方
單方
透格散
鏡面散
燈心湯
小劑飲子
既濟丹
益中丹
茸附煎圓
既濟固真丹
聚寶養氣丹
又腽肭臍圓
梅茸圓
青蛾圓
羔附圓
既濟丹
增益八味圓
既濟玉關圓

秋石圓　瓜砂丹　磁石圓
六益圓　強志圓　巴戟圓
石斛圓　固元圓　固心丹
養肝圓　補腎圓　香茸圓
蒼术圓　暖下圓　仙茅圓
椒丹　養心丹　平補鎮心丹
衆妙圓　沉香固元散　玉女砂
八寶粧圓　茴香圓　二氣散
金櫻圓　大養脾圓　大正氣散
兎絲子圓　加味大建中湯　返精圓
破故紙圓　陞朝湯　坎离丹

神仙修真丹　雙補圓
補骨脂圓　導引方
辟邪丹　勞瘵青蒿飲
卷之九

頭痛門　附　眼耳鼻口舌齒咽喉

附子湯　葶藶散　雙補圓
一字輕金散　抱婆圓　固眞丹
金花一取聖散　一字散　細辛散
又硫黃圓　南荊散又方　細辛圓
眼靈應圓　蒼木圓　硫黃圓
地骨散　祛風散　腦瀉方
茶調散　還光散　羌活散
柴胡散　黃連湯

春雪膏　青金散
磁石圓　洗眼藥
決明散　浮萍散
菊花散　升麻湯
蟬菊散　(耳安腎圓
腎圓　羊腎圓
清神散　驢膏
膿方　又方
鼻齆金散　鼻內生息肉詩
遠志散　麝香散
茱萸散　細辛散
(口)二妙圓　獨勝散
嘉禾散　(舌)酒過痰
齒縫出血方　舌無故出血方
立效散　立效散
白並散　當歸散
龍膽膏
蒼朮散
加味四物湯
(齒)痛證齒痛方　舌生瘡方
冷

細辛散　退腫藥
虫蛀牙痛方　又方　風牙痛方
齒間肉壅出方　苦參不可潔齒論　牙宣出血方
膽酥方　咽喉評　如神散
麻油膏　藜蘆散　吹喉散
一字散　乳香散　白礬散
膽礬散　針法　革麻散
南星散　半夏散　雄黃燻藥
獨附煎　防風立效散　走馬喉閉方
纏喉風方　咽喉閉塞不通方　又方
喉閉方　又二方　舌腫方
喉癰方　巧匠取喉釣方　食鯉魚骨鯁方

卷之十

婦人門

紅花散　千金失笑散　防風散

癮疹紅紫方　神授散　大聖散

聚珍圓　加味四物湯　歸芎圓

胎前鐵罩散　阿膠散又方　安胎散

六物湯　瘦胎飲子　良薑湯

育胎飲子　芎藭散　剋效散又方

加味佛手散　罌粟湯　枳殼散

護胎法　催生論　朱砂圓

產內小便不利心腹脹滿方　神應散

催生湯　麝香散　二仙膏又方

催生神驗散　下死胎三方　（産後）黑龍丹
血竭散　醋墨法　百草霜散
團參散　柑皮湯　榴附飲
單方　雙俱散　烏藥散
白芨膏　扶木湯　産後咳逆方
孤鳳散　沒藥散　（血氣）十味養榮湯
沒藥散　四神散　活血飲子
香桂散　通膈散　分經散
大烏金圓　元胡索散　加味建中湯
神保圓　神功八味圓　加味四物湯
單方　香附飲子　加味四物湯
魚腦一妙散　三灰散　四神散

五倍散　荊芥散　獨勝散
單方　平胃散　加味平胃散
又單方　玉芝散又方　加味佛手散
如勝散　經驗散　沒藥散
帶下小陰蝕丹　石脂散　白芷散
黑附散　(衆疾增損四物湯)　繹皮圓
薏白湯　歸艾圓　小黑神散
虎骨散　芍藥湯　靈砂丹
加味補虛湯　芎歸湯　開胃圓
厚朴圓　鹿茸圓　烏金散
紅花四物湯　八味圓　橘歸圓
三聖散　病妳逆妳癰疽　妳結硬

奪胎神禁惡圖　産母禁忌食
逐日胎神　生子所向吉方　逐月安産吉方
藏胎衣方
小兒先門
辨小兒虛實　不宜服涼藥有七　不宜服熱藥有七
形色歌
驚辰砂圓　蜈蚣圓
龍齒散
防風道赤散　寧神膏
羌活膏
防風天麻散　疳六神圓
蘆薈圓
六妙圓　鮓湯圓
三聖圓
龍膽圓　肉棗圓
黃連圓
積丁香圓
六味三稜圓

丁皮圓　褐圓子　五積圓
(熱)解肌湯　人參羌活散　羌活散
和解散　小麥煎湯　天麻散
木香散　甘露散　桃花散
(脾胃)觀音散　六君子湯　長生圓
醒脾散　(吐瀉)丁香散　白朮散
調中散　蘆香散　塌氣圓
地楡散　大理中湯　豆蔻散
疹痘(勸戒)文　四順清涼飲子　活血散
紫草飲　升麻散　人參散
瓜蔞散　(吊疝)茴香散　桃仁湯
單方　又二方

香附圓　治吊氣方　百二十日內陰囊腫方
（口舌）傅涎膏　透氷散　口瘡方
金花散　治滿月麻口　重舌
治諸般丹毒方　五靈圓　搜風散　治小兒臍血出方
又方　單方治小兒頭瘡方
卷之十二
癰疽門（附）瘡癤
癰疽脉證　癰疽方論
癰毒膏愈腸癰論　發背無補法　外科精要方說
癰毒方論　結疽說　預療發背疽方論
服石發疽論
灸癰疽法　內托散

五香連翹湯　漏蘆湯　沉麝湯
加減八味圓　黃耆六一湯　加味十全湯
神效散　豬蹄湯　家傳不換金正氣散
排膿內補十宣散　孫真人單煮大黃湯　洗藥豬蹄湯
神硝散　五味子湯　牡礪地黃膏
國老膏　萬金散　遠志酒
忍冬酒　飯石膏　忍冬藤形圖
麥飯石膏　神異膏　家藏神驗血碣膏
綠雲散　宣毒散　蹇裏散
神效瓜蔞散　立效散　生肌散
獨勝散　神仙解毒方病圖　治癰疽三法
內託散　洗方又方　豆粉膏

甘草　鹿角膏　牡礪膏
神效膏　療蜂窠癰　治腦疽
治瘰癧堅肩妙靈散　一醉散又方　單方又方
生肉方　瘡癰丁疮瘡腫　琥丹方
羚羊角散　鹿角圓　加減五苓散
增益四物湯　百花散　土末散
驅風散　平胃散　赤小豆
殺虫方　黃連散　癩頭瘡方
火氣入瘡方　治漆毒瘡　五香連翹散又方
神效餅子　藜蘆散　二草散
治小兒頭疥瘡　万金膏　檳榔散
洗藥　熏藥　治臁瘡諸方

單方
治陰莖生瘡方　槟榔散
小兒陰腫方　妬精經效單方　收斂瘡口令乾方
治脚腫方　背腫方　治小兒熱毒遊腫方　治婦人陰腫堅硬方　陰腫方
卷之十三
補損門
傷損證治評　龜獻奇方論　又論
傷損證治論　又二論　熟葱涕愈傷指方論
療打撲傷損方論　療蹉跌鞦韆墜損方論
撲損方論　續骨膏
治臂臼脫方論　平胃膏
神仙接骨丹　單方又四方
龍骨膏

治金瘡又方　神妙圓
又治金瘡方　飲金瘡口止痛方　肘後方
黃耆湯　地黃散
血醒散　桃花散
卷之十四
中毒門（附）　蛇蟲傷　湯火傷
中毒評　犯天麥蠶毒方　礬灰散
雄黃散　凍青飲　解砒毒方
中蟲毒方　治蚕毒方　解藥毒方
解蚕毒并呪方　治金蚕毒方　雄黃散
治蠱毒方又方　中朮生毒方　地漿治諸
治中蒜菌毒方　中蕈毒方　中酒毒方

中鯖魚蝦蟆鱉毒　中豆腐菌毒方　諸果有毒方
中班鳩毒方　藥及中毒方　中魚毒方
中萬病菜毒方　中山雞鶩毒方　中石斑魚子毒
魚尾草　神仙解毒萬病圓　保靈丹
獸能解藥毒論（蛇蟲傷）
被毒蛇傷方　治蛇傷欲死者　立效散
治一切蛇毒所傷　治蛇咬腫痛　治蛇齧方論
治蛇毒所傷方　治蛇咬傷方又方
山林日用方　治蚯蚓咬方
治蜘蛛咬方　中蜘蛛毒方　誤吞蜈蚣方
蜈蚣咬方又方　壁鏡咬方又二方　蚕咬人毒入肉方
治諸獸毒方　蜂蠆蜈蚣方　天蛇毒方
誤飲蛇交水毒方　猘犬所傷方　犬傷方

虎犬咬人方　蝎螯方　治蠷蝮妖虫方
諸虫入耳方　治湯潑火燒方　黃柏散方
治湯潑火瘡方　湯潑火燒
至聖膏　卷之十五
拾遺門
半夏圓　治骨鯁又二方　塩梅圓
治誤吞錢又方　治痲子藥　田螺散
丁香圓　豆蔻圓　四物湯
化虫圓　靈脂散又方　治鼠瘺方又方
唾調散　治紫白癜風方　黃柏散
煮鹿角膠法　合掌散　治風癬
又煮膠法又法　丸藥法

養生雜論　青牛道士
真常子養生銘　孫真人養生銘　養性之術
四損　孫真人十二多

類編朱氏集驗醫方目録

類編朱氏集驗醫方卷之一

○諸風

(附)中風評

湘麓朱佐卒中脚氣君輔集

風之爲病或爲寒中或爲厲風忸傳大或爲偏枯或爲腰脊強痛或爲耳鳴鼻塞頭暈痰厥肺風之狀多汗惡風時嗽短氣渾身癢痒晝靜夜甚心風喜怒不常色赤甚則語言不快肝風善悲色蒼嗌乾多怒上視脾風身體怠墮四肢不收色黃不嗜飲食腎風面浮脊痛不能正立色炲夫風熱怫鬱風本生於熱以熱爲本而風爲標虛極亦生風也治療當察老幼虛實先究其原

不可一緊而言之凡中風初覺不語牙關緊
眼目直視經云視物而睛不動五臟六腑精
目得血氣和則目轉動而還明便以白梅擦牙以局方蘇
合香圓灸去腦子用冷生薑自然汁灌下三兩圓再以紙
撚打鼻引其氣通若省有痰繼以局方醒風湯和橘皮半
夏湯加南木香煎入麝香服氣弱者增附子一兩天雄書云除
荆棘者先斷其根欲醫風者先理其氣若投藥必為廢人若
藥之類寒藥入胃則使血脉凝澁真氣內爍必為廢人若
心臟絶真臟病也鮮有再生若遇此證先以防風生薑煎
湯調局方木香匀氣散加木香下黑錫丹二百粒入塩
煎附子川薑天麻等分服年幼壯實中風面赤煩燥加渴

局方牛黃清心圓若痰盛局方小兒比金圓一貼作一服
燈心湯下氣虛中風或小便不禁手足厥逆局方薑附湯
加天雄煎下養正丹更灸臍(心)或(丹田)氣海一二百壯因
食所傷氣道不通壅悶氣厥痰涎作聲大便不通局方解
毒雄黃圓每服柒圓薑湯下更加(大黃)煎局方三和散服
并沉香降氣湯如是左癱右瘓其人事省定即當依其
所感隨證醫療若內因七情而得之者先當調氣不當治
風外因六淫而得之者先理其氣次依所感六氣隨其證
而治之經云風者百病之首其變化爲他病無常皆風氣
所發所謂除病之道察致之由當斟酌用藥必獲十全效
也○若臂重作痛時麻能飲酒人此是痰飲不可服風藥
可服局方(消飲)圓倍木圓(橘皮)半夏湯加(片子薑黃)茯苓

生薑同煎服○有婦人二十歲偶食中喫驚發搐涎塞不省人事牙關緊急以白梅擦牙次用冷水茶調灌涎吐而省後投局方烏沉湯通而安吐法壯實者可用○有婦人病頭旋經云上虛則眩下虛則厥今服局方不省人事皆是陽虛又云上虛則眩下虛則厥今服局方烏耗爲眼花眩爲眼黑旋暈頭旋俞山人蘇子降氣湯養正丹來復丹通而安如聖餅子亦治頭疼痰厥肉瞤筋惕辛嬪鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫好飲人可加白豆蔻一粒同嚼服○若治心氣怔忪腸中滿時時吐痰睡卧不安如聖餅子去川烏加鐵艷粉極妙○有一室女每經候欲行如風之狀發搐不省人事脇其脉心脉浮衝任脉沉此因經行伏驚致此局方黑神散入(宋砂)燈心(麥門冬)煎湯調下服數日自後經行

如常前病不作若腹痛加(大聖散)服○一婦人脚指赤腫痛不可忍局方(香蘇飲)加(檳榔木瓜)煎三服而痊○有人每遇天陰覺渾身重疼無力此乃濕氣(香蘇飲)與平胃散(加赤芍藥)同煎服最妙○有人常覺左眼瞤動忽然左邊口喎食則不能收求醫僕診其脉浮而濇氣口脉遲而濇遂授之局方(香蘇飲)和霍香正氣散(加南木香)(薑棗)同煎次以小續命湯(加天麻)磨沉香水同煎下局中養氣丹數服痊安○有人四十已上歲平日好食麵飲酒苦右臂不能舉授以局方(五積散)(加木瓜)(檳榔)煎又用(生附子)一兩去皮臍(南木香)貳錢半㕮咀分作三服水二盞薑拾片煎一盞熱服數服而安

○治方

八生飲子治半身不遂手足無力皆由飲食起居失節湯氣不歛風邪所侵若服補劑則風毒愈固其病尤難治矣宜以主陽消陰踈風去濕之藥必可取效服之旬日以手足輕脚膝有力爲驗可戒羊肉猪頭動風氣物切不可針灸也亦名建陽湯)

天雄貳兩此藥最佳無則大附子代之去皮尖

白朮各壹兩

川芎

天麻

全蝎壹拾伍箇全用

木香半兩

右件並生用㕮咀每服半兩薑五片棗二箇水一盞半煎取一盞去滓温服不拘時候

白附子半兩南星川烏并生用去皮尖

右件並生用剉如麻豆大每服水五盞生薑壹兩切片同煎取一盞再煮二盞再煮三盞共煮第二遍取一盞又用水三盞再煮第三遍取一盞半更以水三盞共煮

得三盞一處和合分作三服空心稍温服一日可服此
三盞何殿機寢方
舒筋圓治療同前
蒼朮㕮咀成小川牛膝去蘆肉焙乾壹兩
酒浸焙乾壹兩炙附子壹兩半炮去皮臍乳香
没藥研官桂不見火各壹兩並
右件爲細末酒煮麪糊爲丸如梧子大每服五七十丸
以温酒空心送下日二服何殿機寢方右二方
八寶回春湯治男子婦人一切諸虛不足風疾血氣交攻
凝滯脉絡拘急攣拳氣不升降癰中疼痛痰涎壅盛脾胃
不和飲食不進此藥一則去風二則和氣三則活血大有
神効大凡病風不可專服風藥攻之愈急則愈甚但專服

此藥輕者一月重者二三月自然而愈且無再作蓋此藥不專治風而且和氣不專治氣而又且活血氣和平榮衛調順則其風證不攻而自去

附子炮　人參　麻黄去節　黄芩　防己　香附子去毛　杏仁去皮尖各壹兩　茯神壹兩半　陳皮壹兩　防風壹兩　當歸　川烏半兩炮　白芍藥伍兩　沉香半兩　半夏壹兩半　川烏半兩炮　桂壹兩　白朮貳兩　天台烏藥半兩乾薑壹兩　黄芪參兩　甘草壹兩　熟地黄壹兩生乾地黄壹兩

右二十四味去風八味活血八味和氣八味活血八味為末每服三錢水一盞半薑三片棗一枚煎一盞空心吠咀每服合一服滓再煎此方常服有効不淺　此方乃

王翰林經進奉　旨頒行而謝子充少年亦感風疾得此方服之而安

（五虎湯）治中風瘨曳目睛上視牙關緊急涎盛昏塞不省人事出衛生方

南星　草烏　（新增）

皂角去皮弦子炙　川烏並炮去皮　半夏泡洗次

右等分每三大錢水二盞薑十片煎八分温服不以時

（大省風湯）治一切諸風卒然痰潮神昏語澁

大附子生去皮　天南星壹兩

右等分每三大錢水二盞薑十片煎八分温服不以時

全蝎半兩去尾足　防風　川芎各貳錢半

右㕮咀每三錢水一盞半薑七片煎七分温服不以時

（十八味流氣飲）治一身受風寒濕熱諸邪毒周徧氣脉上

下不知

羌活　獨活
陳皮　白朮
川芎　當歸
甘草　白芷
白茯苓

右等分爲細末棗湯調下
省風散治氣不和爲風寒邪濕之氣着於手足麻痺頭重
偏疼起居不旋運四肢倦怠足腰緩弱掣痛無時每遇陰晦
風寒神思不清痰氣相逆並宜頓服

羌活　人參
木香　枳殼
防風　桂
黃芪

右等分爲細末每服壹分　人參
甘草　防風
陳皮各叁錢　白芷叁錢半
天台烏藥叁錢　天台烏藥

白朮炒 南星半兩 薑者壹兩 麪炒 半夏湯洗七次 各貳兩 薑汁製 天麻 川芎 防風 羌活 獨活 各壹兩 細辛 半兩 右㕮咀每服肆錢大薑拾片棗貳箇煎不拘時候

拒風丹治風虛痰厥頭疼旋如在舟車之上 附子壹枚 炮去皮臍 南星 半夏 各壹兩 湯洗七次 天麻 羌活 各貳兩 川芎 防風 各壹兩半 細辛半兩 右為細末生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸 加至五十丸 食後

蠲痺湯治風濕相搏身體煩疼項臂痛重舉步艱難及手足冷痺腰腿沉重筋脉無力 當歸壹兩 酒浸一宿 羌活 黃芪 蜜炙 防風 各壹兩半 甘草半兩 炙 右㕮咀每服半兩水二盞生薑五片同煎至一盞溫服

不拘時候

二妙散理氣血則風自去

當歸　橘皮

右二味等分爲末以酒調服爲圓子亦可

夏英公酒浸飲子治風疾已下四本宋元憲府手集方

細剉　蕳解　羌活　秦艽

防風　虎骨　拮梗

牛膝

晚蚕沙炒黃兩　枸杞子炒伍兩　蒼耳五升去刺搥碎酥灸　乾地加根洗焙

右十二味用好酒貳斗浸瓶盛封敝一七日開不得向

面恐氣衝頭目每日午時空心及早晨各服壹盞常令

有酒氣

四君圓治風毒濕痺癱瘓等疾

生乾地黃　熟乾地黃　當歸
右四味等分酒糊爲丸温酒下
南星肆兩生去皮用防風貳兩　甘草壹兩
右爲咬咀每服五錢水兩盞薑十片同煎七分去滓温
服不拘時候氣不升降者加木香貳錢半面如虫行者
加全蝎壹錢
小防風湯　治手足不仁
防風　秦艽　羌活　附子各壹兩炮
右咬咀每服三大錢水一盞半薑三片煎七分去滓入
附子大獨活湯　治男子婦人體虛中風半身不遂左癱右

瘈口眼喎斜手足戰曳經脉攣縮足膝軟弱四肢酷冷肌
肉麻痺骨間冷疼行步艱難及風濕相搏關節酸痛自汗
惡風項背拘急面目浮腫兼療八風五痺久患頭風每遇陰
雨發則頭疼項強筋緊頭暈增寒嘔吐不食發渴不已一
切風氣虛損不足並宜服之

人參　肉桂　乾葛

白朮　當歸各玖兩　川獨活拾陸兩　大附子玖枚

甘草各拾貳兩

右爲吹咀每服三錢水兩盞煎至一盞去滓無時温服
其驗如神中風者此藥不過十服立見殊效也
人參南星圓治心虛因爲驚氣所觸風邪乘虛而入或因
氣觸或因驚觸或因微熱流入心經則神志昏亂涎潮手

足搐搦如風之狀

天南星生 白附子生 白茯苓 白

人參 遠志肉 酸棗仁炒熟 天麻

右等㕮咀為細末薄二水糊為元如梧子食後或卧用薑

湯吞下三五十元却用生朱砂為衣

附子煎專治手臂無力麻痺不仁手足不隨風濕相搏筋

骨諸疾痛不能舉

大附子壹枚重捌錢漫火炮裂去皮切作骺片同生薑米泔淹壹宿去薑薄片

防風壹兩 骨碎補半兩去毛炒 漢防已

白朮各半兩 乳香貳錢研

右為細末入乳香勻拌好酒煮糊元每服二三十丸空

紫金圓治諸癲瘈手足不隨極妙

天雄　附子　白附子　拾貳兩研伍兩餘煮用　山梔子　大川芎　淮烏肆兩

人參　乳香　全蝎半兩　沒藥各半兩

當歸壹兩　防風

降眞乳半兩　血蝎尤佳　辰砂肆錢

右件生用焙乾爲細末酒煮糊元梧桐大每服五七九空心溫酒下脚氣木瓜酒下頭風生葱茶下婦人冷心痛艾醋湯下

獨活寄生湯治風濕相搏於腰背氣血凝滯連引疼痛手足搐搦

獨活　桑寄生　白朮炒　參兩　杜仲薑製　秦艽　白茯苓

牛膝酒浸焙乾　防風
白芍藥　熟地黃
川芎　當歸
人參各貳兩　北細辛去葉
川續斷如無桑寄生則用此代
甘草炙各壹兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓熱服食前

三聖散又名舒筋散　治男子婦人手足拘攣口眼喎斜左癱右瘓骨節酸疼脚弱無力行步不正一切風疾出百一選方除孕婦外老幼皆可服

當歸洗焙　肉桂去皮　元胡索炒

右等分細末酒調空心臨卧日進三服湘中黃梔卿父

防風湯治病後足履緩弱酸痺精神昏倦

防風去蘆　白朮
人參　北芍藥白者當歸
熟地黃　牛膝酒浸
右爲末每服三錢水一盞生薑三片棗子一箇煎七分
黃耆六一湯治風濕相搏肌肉瞤動先服滲濕湯次用是藥　杜仲製　黃芪
黃耆　川芎　羌活各等分
當歸
右等分咬咀水一盞薑棗煎空心服　甘草

(麝香輕骨丹)治左癱右瘓不論走注並皆治之
(川芎防風膠獨活海桐皮)各半兩與蜈蚣(去頭)羌活(去蘆)各一倍同爲麤
糯米糊圓最有功還甚左癱右瘓不論走注及諸風
四肢麻痺多疼倦虛損勞傷治一同但把麝香酒研服

須臾爲取病源通

川烏　草烏

獨活　全蝎

羌活　各壹兩　真麝少許

右爲末糯米糊爲元如彈子大空心服陳

騙馬丹治風濕相搏手足疼痛及諸傷百損

骨碎補去毛　白然銅醋煆　虎脛骨酒炙

川烏炮　各壹兩

地龍去土　五靈脂

没藥　草烏炒去尖　各肆兩半兩錢伍醋煆文

當歸　乳香

蕤解炙　羌活

川芎　天麻

防風　白膠香

海桐皮　各半兩　蜈蚣

右細末酒糊爲圓如梧桐子大病上食後服病下食前

服遍身疼痛不拘時每服三五拾圓温酒下
淮西都統丁順傳其效莫述
局方烏荆圓治風痓手足亦治便血
川烏炮壹兩去皮 荆芥 貳兩
右爲末醋糊爲圓如梧子大每服二十圓熟水吞下
有人病狂言諸醫欲下一醫云當用附子後服干全湯次
日脉大服排風湯而愈
温絡湯治氣血不足風冷留於經絡足脛寒冷筋脉虚弱
久成寒痺手足無力步履艱辛骨節疼痛多惡風冷大壯
筋脉止疼痛温四肢下痰止脚暈
白朮 炒 川牛膝酒浸 杜仲炒 附子炮
虎脛骨酒炙各壹兩 黄芪 桑錢半 沒藥 乳香

甘草　人參各半兩　白薑壹兩半　桂心叁分

右㕮咀水一盞薑三片木瓜二片煎七分食後服

當歸貳錢兩　川芎柒錢半

七聖散治老人脚膝疼痛不可履地

杜仲薑炒　續斷

獨活　川牛膝酒浸　甘草各等分　薑解

右細末酒調二錢食前服

蜜陀僧散治風驚氣入心語音不能者

蜜陀僧研如粉以茶調壹錢壹服即愈

省風湯　防風壹兩半　甘草半兩

右㕮咀每服四錢重水兩盞薑十片煎八分熱服氣逆

卿人林用卿嘗從其家子學因得此方傳之

烏藥散 治中風不語老人虛人可用之

烏藥 附子 壹隻 天雄 壹隻 沉香 大塊
甘草 半寸許 各壹兩

右入鉢磨各壹錢病勢稍重用水一椀薑十片煎半椀
空心服氣中加木香半錢無氣加人參半錢

正舌散 治中風舌本強難轉語不正神妙

蝎梢去毒 壹分 茯苓 壹兩 炒 龍腦薄荷 焙 貳兩

右細末每服貳錢温酒下或揩牙頰亦得

川芎散 治中風中氣先服此藥

川芎 人參 枳殼 各壹兩 沉香
香附子 錢各貳 木香 壹兩

右細末每服叁錢以沸湯入塩點灌之

(十二味正氣散)治風中氣中

陳皮　厚朴　半夏　藿香
甘草　人參　茯苓　白朮
石昌蒲　木香　遠志　薏苡仁

右除人參外餘藥各半兩㕮咀每服三大錢水壹盞薑
三片棗壹枚煎八分服以上四方載梁氏總要方用之各有効

(神柏散)治中風不省人事涎潮口禁語言不出手足戰曳
得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人

柏葉去壹握　葱白連壹根握

右同研如泥用無灰酒壹升同煎一二十沸温服

(鄂渚小金丹)治諸風

晚蚕砂炒熟草烏頭生用
右各等分爲末生地龍爲丸如少則加醋糊爲丸每服
四五丸白湯下多則麻人甚妙
芎辛散 治風化痰清利頭目不思飲食出雞峯方
北細辛壹兩 川芎壹兩 甘草貳錢半
右爲末每服貳錢水一盞薄荷七片煎至五分去滓不
青龍膏 治榮衛不和陽少陰多手脚舉動不快出雞峯方
拘時候温服
白花蛇它不蚺者陸兩好酒煮去皮骨新鬼上焙乾取肉壹兩
狗脊 天麻各貳兩
右細末銀盂子盛無灰酒壹升入此三藥重湯煮稠如
膏銀匙攪細磨生薑半兩取汁同熬勻堪鑵內收每服

半匙頭好酒半盞攪勻服或湯亦可食前飲之極佳日

二服神効

(果皮圓)治久患風疾手足不隨

果州陳皮　川當歸

右爲末酒煮糊爲丸湯任服不拘多少親見人用之取効神妙

(趐痛圓)腰臂痛秘方

五靈脂　赤芍藥各半　川烏壹箇

右爲細末酒糊爲丸温酒空心下朱仁卿沒藥肆錢

麝香壹錢

(聖驗黑神圓)成都府昭覺寺潛庵道人眞本傳

右爲細末酒糊爲丸温酒空心下朱仁卿

防風去蘆　川烏炮　好墨剉焙　川附子炮

檀香各半兩　麥子去心焙　薑黃葉去梗焙　白芷
何首烏刮用生薑汁同浸一宿焙再浸　甘草貳錢刮浸弍宿焙再焙姜汁盡爲度　乾薑柔錢
白殭蚕去絲炒　全蝎壹汁同浸弍宿焙　天南星炮裂熟片切以薑汁小盞同泡了甘草貳錢刮浸弍宿焙再焙姜汁盡爲度　白附子炮十枚同糯米糊各柔錢半　細辛去葉及土刮焙
右爲細末大鉢中衮伴兩日極令勻合糯米粉二兩添

龍腦同麝研衮藥末　縮砂仁去膜皮輕焙　草豆蔻拍碎去皮膜生薑汁浸一二日焙再浸　半夏泡湯洗十次炒令熱炮片切用生薑汁半盞　川芎刮焙　白芨刮焙壹　煙甘松去土刮焙　白附子炮十枚同糯米糊各柔錢半　白芨刮焙壹兩貳錢

水煮糊同阿膠膏和藥杵二千餘杵九如雞頭大焙令
十分乾麄銼收置暖處但此方修合雖好然亦遲滯不
若修剉生薑半斤或柒兩甘草叁兩生料衆藥同片切
於麄鏟內用水壹斗五升上下文武火煮水乾爲度仍
除出甘松白豆蔻檀香縮砂仁霍香葉勿煮止合衆藥亦令作一處焙搥爲細
爲末庶香氣全所有煮者衆藥亦令作一處焙搥爲細
末就了却令研臛臛同香松等數件大鉢內杵二日
令藥味和合方作法和搥爲九煮藥下水之訣以水高
衆藥一寸餘許文武火煮若火裂藥無味却在酌量伺
候風爲萬病之根源蓋五臟所受不同而引起疾證有
異善衛生者此藥不可闕感證不同改湯使服之一切
風疾炒令生薑湯下卒中僵倒或醉酒不醒生薑湯研

三五粒灌下小兒驚風天吊五種癎疾入京膩粉少許
煎金銀薄荷茶下沉寒痼冷生薑湯下一切氣疾回香
湯下頭風暗風荊芥湯下咳嗽痰涎半夏湯下肺氣攻
衛杏仁湯下瘧疾烏梅湯下水瀉乾薑湯下痢疾甘草
湯下脚疾濕氣木瓜湯下酒傷食積胃氣不和陳皮姜
湯下腸風胡桃酒下傷寒次霎葱豉湯下時行疫疾山
嵐瘴氣不伏水土藁本湯下中毒甘草水研灌下牙痛
夜卧含化牙宣填窠中婦人血風血氣當歸酒下血臟
虛冷赤白帶下血淋血暈燒褦襶灰研細調酒下腰背
疼痛渾身勞倦温酒下常服食後茶下此藥本決傳之
宿州紅餅子治男子婦人諸般風疾兼諸損陳氏家傳第
神聖功効不可盡述孕婦休服

一藥

何首烏　天南星　川芎　川烏各半兩

蒼朮　僵蚕各貳兩草烏壹兩　藿香

白芷各壹錢　雄黃半錢

右除僵蚕雄黃外以水淨洗曬乾爲末粳米粉糊捻餅子如小錢大土硃爲衣用刀切十字待乾一以服空心偏正頭風生葱茶嚼下打撲傷損（接節）酒下鼓槌風膝腫浸川牛膝酒下如牙疼半餅嚼在疼處先以葱湯下一服

防風湯治手足不仁或腫不已宜服之

北防風　川升麻　川羌活　北芍藥　川獨活　甘草

右等分剉散每服二錢水一盞半煎至八分隨證上下
分空心食後通口服如覺氣逼逐旋服活血丹地仙丹
之類此說方係名醫周繼祖累以收効今聞有用之者
其應如響
萬金湯治風補虛衛通氣血及治脚膝無力鑒官杜壬以
此治手足風累驗
桑寄生　北細辛　桂心　防風
人參　川牛膝　白茯苓　當歸
芍藥　甘草各壹兩　川獨活
杜仲薑製　熟地黃各半兩
右㕮咀每服五錢以水一盞煎至一盞服
消風散治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱爲風所乘

先服順氣藥次服補藥却用茶清調消風散下青州白圓
子而愈廣東譚兄傳此方治人與友人何清之云此藥只服兩
三日見効亦自有理
仙茅散治背膊手足頭目筋脉虛掣一切風證疼痛不可忍
仙茅 無灰酒浸一宿炒 陳皮 枳殼炒 則以好蒼
厚朴製 官桂 秦艽 各壹錢 當歸
白茯苓 白芍藥 白芷 川芎
半夏餅錢半去節 麻黃貳錢不去節沒藥
川烏炮各壹 白薑 乳香
全蝎半箇 麝香半錢 川獨活貳錢
右除桂並麝沒乳餘並炒轉色却入不炒藥同爲細末
每服三大錢炒大黑豆一同木瓜蔭酒旋温調服不拘時

候寶慶張醫宗玉以此醫胡龍圖取効

（通項散）治初中風口噤不省人事者先用此藥搐鼻醒方

用別藥或傷風頭疼昏眩妙甚葉氏錄驗方

黃蠟壹分雄黃研壹分北細辛半兩爲末

右三件和勻不省人事者先用此藥搐鼻醒方時挑少許搐入鼻中即醒涎出

口開方可投藥

治卒中口禁不省人事者

細辛皂角各少許

右爲末或用半夏爲末以盡管吹入鼻中

藥證病源云或失音不語精神昏憒者如能言語牙關緊

急者

一法用白梅擦牙更以鳥蒲末着舌下牙閉即開急卒可用

獨香散治氣中目不開四肢不收皆沉

南木香 不以多少爲細末 右用瓜薑子煎湯調下

有人忽然不省人事身躰軟弱牙關不緊不潮密醫言中風投雄珠圓星附之屬病者轉側僕胗其脉皆濡氣閉脉隔絶濡所以授以局方木香流氣飲煎熟入麝香少許兩服而痊

水沉湯治伏暑傷冷霍亂嘔轉筋虛煩躁渴心腹撮痛吐利交作四肢厥冷

香薷葉 厚朴 各參兩 白茯苓 甘草 各半兩 白扁豆 炒去皮 各貳兩

右剉散每服三錢半酒半水煎水中沉冷服不拘時候

脚氣

(五聖散) 治脚氣脚氣之患皆因坐立濕地或冒濕鞋其風濕之氣乘而入初在皮膚次傳經絡甚至骨髓遂成此疾發作必然行步艱難痛不可忍若不治之漸次傳在心胃甚在臟府歲久則傷命深可哀嘆余因授能療此疾極有妙功試之果驗

三和散　香蘇散　小續命湯除去附子　人參敗毒散

(練子) 十文京南芍藥二十文共三件各一貼加檳榔三十箇搜麪包煨熟去麪及川

右五件和勻作五服水一盞薑三片(棗)一枚(木瓜)三

藥共一處和勻作五服水一盞薑三片(棗)一枚(木瓜)三

片同煎至
貯瓶紗片蓋在器口安頓屋上露一夜次早取
調復元通氣散半貼空心服此藥不問男子婦
加減服餌其效更不盡述 此方係撫州蕭世榮印施方

驅風丹專治遠年近日不問陰陽二證脚足腫痛不可忍

川烏壹兩生用不去皮尖大者破作四邊小者破兩
邊半用如骰子大用麻油煎令黃色勿焦小
草烏肆兩生用不去皮尖每箇破作兩片
擇雞心者用心者破兩
白淨者用黑者不用半用如骰子大貳兩作兩片
油煮如製川烏法貳兩用薑壹兩拌和
浸三晝夜一日一度漉轉薑候日數足取出去
水微淹
地龍肆兩生用乾薑同炒候乾去薑勿令焦本法
超篩去土取少時用紗帕裹定
雞心檳榔壹兩對半
肉用不必更秤
何首烏壹兩對半
赤小豆壹兩擇去
綠豆黃豆

右爲細末用黃子酷一盆好頭麪半兩煮糊爲
梧子大每服三十元空心
服訖不可便食熱物或服
藥後覺遍身麻木不
麻木棄而不服恐是元數過多或食熱物太早
菜茵陳豆豉一切動風毒
乳香應痛圓 大治脚氣風損
川烏生用不去皮
尖鹽製如前
草烏生用不去皮
尖鹽製如前
紅花 剉炒焙 當歸酒洗
剉炒焙
白芍藥洗剉 蘇木剉
生乾地黃洗剉骨碎
天台烏藥焙剉乾葛
金毛狗脊燎去毛
雞骨降香 碎用香燼盛火
約去火二寸許次將乳香置篛葉上
乳香 杵碎篛葉一片虛架在香爐口
上用水潤濕小竹篦子炒
滾用
攪勻
研

没藥杵碎酒浸爛研蓋口及四圍煖紅入好
藥末成劑入同九候諸
自然銅黃子醋內炎三二次可研爲度
右各壹兩爲細末用好白酒濃腳一盆好頭麵半兩煮
糊九如梧桐子大每服三十元空心温塩酒下禁忌如
前凡腳氣發作先服驅風丹大痛稍愈即閒服此藥侯
痛全愈專服此藥謂如常歲每歲則痛一月今年服此
一料只痛半月二十日又明年再服一料則終身不復作矣但
十數日已發未發再服一料止痛
深肯駝腰曲手足攣拳者服前項二藥雖未能卒去病
根然亦能免大腫痛此藥不特專治脚氣但是風損皆
可服之
以上二藥常用微火烘焙恐發潤故也如白虎
歷節之類皆可服

（敗毒散）一貼加（大黃荊芥連翹各半錢重拌和分作二服依
本方煎服以大便流利爲度過秋則以香蘇散間服亦
如前項二證塗之立効脚氣發先用塗藥次合元子藥
（塗藥方）陰陽二證塗之陽證藥虛弱人略加些小
猪牙皂角　不蛀皂角　南木香
右三味等分爲細末黃子醋濃調先於腫痛之上不痛
處用藥周圍塗之閾二三寸若圈然截住毒氣勿使衝
上次塗下面腫痛者止留脚趾尖不塗仍修事脚指甲
以出毒氣時時用醋潤濕
（又方）何首烏　黃連　赤小豆　黃芩　各等分爲細末
右末用生地黃煎湯候冷調塗亦如前法乾則用醋潤
（又方）玉淨瓶　紫芸根　長葉成叢者是

右生採等分細切入好茶末二三錢同擂爛每用一團如當三錢大用瓦盆盛水化開同煮數沸候冷如前法此藥專治赤腫熱痛者立効

紫芸根圖



又方脚氣已止但腫不消不能行履

無名異不以多少半生用一半火煅如煅自然銅法

右生熟拌和為細末醋調塗皆如前法

已上七方得之本州益陽縣坡底歐陽文炳渠本得
之異人秘藏三十年今始一傳謹用刊行以與衛生君
子共之幸毋見方輕藥菩巢君嘗以聖散子方授之
龐公宅常著在方冊使菩巢君之名與此方相
今傳文炳之方刊以散施亦使文炳之名同為不朽
(地龍圓)治風久也此係寧鄉米步彭氏刊施本
為長公子肉壹兩用巴豆壹兩炒不用巴豆
川練子肉壹兩用巴豆壹兩炒不用巴豆
破故紙叁錢用班茅炒不用班茅
葫蘆巴貳錢半用海金砂壹錢炒不用海金砂
水蛭兩條麝半兩
香炒
全蝎貳錢
好麪壹兩
茴香貳錢炒
黑牽牛壹
黑牽牛
自然銅半兩煅醋淬
石薜荔半兩用鹽醋
浸一時用

無名異 炒 肆錢 檳榔 叁錢 不見火 天竹黃 半兩 紅曲 半兩 上焙
右爲細末 將乳香壹錢 沒藥叁錢 麝香壹錢 成用 砂醋鍋 淬子 盛
牛膝 圓治脚氣 何元壽方 炒 肆錢 地龍 叁錢 去土 炒 古錢 拾貳箇 爐內 煅
右爲末 酒叁錢 麪糊 和丸 如梧子大 溫酒吞下 百辰砂 半兩
牛膝 烏 荊芥 續斷 蕳解
草烏 破故紙 骨碎補 黑牽牛
香附子 當歸 川練子 何首烏
赤小豆 石楠葉 防風 芍藥
烏藥 地黃 木瓜
右等分爲末 酒煮麪爲丸 每服三十九 空心鹽酒鹽湯下
地仙丹 治男子婦人陽證脚痛

錢子地龍 炒去土
白膠香 別研
黑豆 生去皮
木鱉子 去殼
椒紅 去目并合者炒出汗
右等分為細末酒糊為元如梧桐子大每服七十元空心鹽湯鹽酒任下南康劉立之方

獨勝散 治乾濕脚氣不問新舊悉能療之
五靈脂 去石天台烏藥
木瓜 去穰
淮烏 炮去皮
赤小豆 炒
五加皮 洗
平胃散 一貼加紫蘇梗細剉同煎通口服如是濕脚氣則一服可愈紫蘇不用葉及不問新舊隆興府徐尉名洲傳有效方

三香散 治脚氣醴泉梁國佐方
檀香 壹錢
麝香 貳錢
穿山甲 叁錢炙酒
沒藥 叁錢

白膠香伍錢　紅曲伍錢　川烏貳錢　全蝎壹錢草烏炒去烏
右爲末每服二錢空心温酒調下
（又方）小續命湯　石楠圓各壹貼
右入木瓜内蒸九次和杵膏爲元每服三十元空心木
瓜湯下梁國佐方
七聖散治脚氣梁國佐方
平胃散　丁香平胃散　棗肉平胃散
木香匀氣散　沉香降氣湯　復元通氣散
流氣飲每用壹貼
右用八角茴香壹爵（大蒜連去皮心用火醋調麪火煨候
蒜香熟取出蒜臼杵拌和前藥如梧桐子大用茶牙與
燈心同煎湯空心下連三服頃刻移步見效

敷貼脚氣兼治(藥)贛州羅監稅傳甚妙

大戟　茉莧　大黃　官桂

右等分爲細末酸醋調敷痛處

牛膝湯治脚氣有驗

牛膝壹斤　白茯苓　人參各壹兩　當歸半兩

右爲細末酒調服

又方敗毒散加木瓜煎湯治脚氣

赤小豆圓治風脚

赤小豆半生用半炒香附半酒炒晚蚕沙半炒生草烏半麻油炒半

右等分加陳倉米三之一半生半炒爲末酒糊爲丸梧

章烏圓治脚氣丁仲信傳屢親見效

桐子大每服十元空心茶酒任下

草烏伍兩水浸兩日去皮切
右爲細末煮清糊候冷入麝少許爲丸如
服十丸空心温酒下極妙

（張走馬家飛步圓）此係第一方筋骨藥能去筋脉骨節手
足腰背諸般疼痛攣縮不伸之患趙寺簿傳渠甚秘之

木鱉子仁 研取肉去油別 川烏生皮臍去 草烏生皮臍去
白膠香 白芍藥 各貳兩 乳香壹兩 別研

右爲細末用赤小豆末煮糊爲丸如梧桐子大每服十
五丸木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌
熱物片時及熱湯

（如神湯）治一切風寒暑濕痙諸般脚氣張走馬家本
金毛狗脊去毛吳茱萸生用 山茱萸連核生用 木鱉子去殼用 各壹兩

右吹咀分作四次每用水五盆煎數沸乘熱熏後去滓
淋洗

(木瓜圓)治脚氣極效田頴伯方

破故紙炒　川萆薢

茨神炒　茴香炒

右爲細末糊爲元如梧桐子大湯酒任下

乾木瓜

(香蝎圓)治脚氣梁國佐見効方

川牛膝酒浸切焙

檀香壹錢　麝香

川烏各貳錢　沒藥叁錢

穿山甲叁錢　草烏紅曲伍錢

右爲末糊爲元每服三十元空心温酒下

白膠香伍錢

(虎骨圓)治脚氣兩腿腫行步艱辛胡永之節推用之有効

蒼术　防風

萆薢　炒薑乾水浸

木瓜

杜仲各叁兩虎骨薄片薑汁浸炙乃有藥箭毒
右件爲末酒煮麪糊爲元如梧桐子大每服四五十元
湯酒任下

秘傳循經圓治男子婦人兒童女室諸經絡風邪寒濕氣
血留滯流注作痛筋脉攣拳並皆治之常服亦可

南星叁兩炮　地龍去土叁兩　川當歸叁兩酒浸　烏藥去皮叁兩
草烏壹兩炮去皮臍　豆餅黃燃兩用黑豆不以多少炒熟去皮臍
右件爲末酒煮麪糊爲元如梧桐子大每服三十九用
乳香　沒藥各壹兩

循絡圓治男子婦人兒童女室諸經絡風邪寒濕氣
得此藥而愈

五靈脂貳兩 北防風去蘆 川萆薢炮去皮臍
大蒼朮米泔浸 虎骨酒炙碎 狗脊去毛
沒藥去油壹兩研 乳香半兩研 川烏生用
去皮臍炮各壹兩
右共爲細末酒煮麪糊爲元如梧子大每服三十元至
五十元温酒食前下不飲者以木瓜湯下此藥可以常
服如痛大作則以小續命湯加檳榔羌活青皮煎湯痛
止則勿服蓋老人恐氣虛躰弱則易耗氣才感此疾得
獨活散治行履艱難腰膝疼痛或腰以下冷痹不仁或
唐接骨傳此方一服而愈
獨活伍兩 川椒叁兩 草烏半斤 麻黄叁兩
防風貳兩 杉木節壹兩 荆芥壹小把 葱壹握
右煎湯重蒸通得手用葱煎湯洗以火爲度更先服小

續命湯

神効圓 治乾濕脚氣骨裏疼痛或腫或不腫並皆治之

川烏壹枚暑去皮 草烏半兩去皮 地龍半兩去土
全蝎肆拾箇去毒 黑豆肆拾貳粒去皮 蜈蚣壹條去
右六味焙乾爲末入糯米糊爲丸麝香爲衣用冷酒下
七元至十元少頃用荊芥薫些小先嚼爛用茶清灌救
之其効如神用之果有驗

地黄湯 治穿心脚氣劉立之已效方

熟地黄肆兩 川當歸貳兩 北芍藥
川牛膝 三奈子各壹兩 杜仲壹兩半兩

加味火炊圓 治陽證脚氣

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分無時服

火炊草九斤　枯松枝　兩一　石膏碎叁兩
石南葉壹斤　萆薢半兩　醋煎
右爲末醋糊爲丸每服三十丸空心服
萆薢散　治一切風證腰脚疼痛徹骨酸楚此藥除風去濕
止痛活血補腎
破故紙鹽炒　川續斷
萆薢　赤芍藥
白芷　熟地黃　川烏炮　防風
白朮各貳兩　杜仲薑製　獨活
沒藥　木香炒
右細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心鹽酒任下三五十
元史衛王奉內祠日忽苦此疾足不能行發熱煩悶後
得此藥三服頓安

鷄鳴散治治脚氣第一隻藥不問男女皆可服如人行
流注脚足痛不可忍用索懸吊叫聲不絶筋脉腫大
檳榔半兩　生薑　和皮半兩　木瓜　各壹兩　吳茱萸貳錢
桔梗半兩　紫蘇並葉叁錢　陳皮　半兩
右爲麤末分作八服隔宿用水三大椀慢火煎留椀半
去滓留水二椀煎滓取一小椀兩次以煎汁相和安頓
牀頭次日五更分二三服只是冷服冬月略温亦得服
了用餅餌壓下如服不盡留次日漸漸喫亦可服此藥
至天明大便當下一椀許黑糞水即是元腎家感寒濕
毒氣下來也至早飯前後痛住腫消但只是放遲二喫
物候藥力過此藥不是宣藥並無所忌　淮頭老兵方
三皮散治風毒濕氣流注脚膝四肢攣拳筋脉不伸脚足

疼痛步履艱難用此藥酒斷根不問三二十年者皆有効
海桐皮去皮 五加皮自采 桑白皮
川牛膝 製杜仲酪去皮 黑附子炮去皮酌用
右爲麁末用綿裹作一包以無灰好酒一壺多少
日秋冬二七日夏三五日濾起藥空心温服一盞一日
三五次服如服藥酒時却飲它酒常令酒氣相接勿令
大醉重者不過兩劑服此藥後旬日兩腿必發大疹漸
漸破出紫黑血候乾贖磨風膏貼瘡上自然好也日逐
脚上如數百條蛇自足而出此其効驗如患足疾之人
脚後有一條筋直湊腎囊疼痛拘攣用(妙香散一貼分
作三服空心食前温酒鹽湯下自然伸也淮頭老得效

烏靈圓治男子脚氣不能伸屈及癱瘓手足不隨滿德夫
草烏剉碎　烏豆豁曰貳兩用生威靈仙各貳兩用好醋浸三
又用草烏性威靈仙各貳兩乾然用好醋浸三
右四件並爲末醋煮麪糊爲丸如梧桐子大病下空心服十九至二十九
温酒吞下病下空心服十九至二十九上食後
橘子仁湯治風濕腰脚疼痛服諸藥不效者此藥親見功効
橘子仁　當歸　蕳解　獨活
肉桂　木猪苓　防風　附子
草烏　杏仁　赤芍藥　甘草
厚朴　麻黄　沒藥　羌活
地黄　川烏　川芎　茴香
右等分爲細末每服三錢用木瓜酒調下空心服

烏藥圓治脚氣徹骨痛不能行履者不過三服見効

白芍藥　木鱉子去殼出油紙　威靈仙　北細辛
右等分爲末薄糊爲丸梧桐子大每服七九丸至十九食
後臨卧木瓜湯下酒下酒下亦可以身上覺麻痺即是効或
未効可添十五九量虛實不可妄增丸数及不可於食
前服之有章烏在其間最忌食後以熱食衝動烏毒
則昏不知人矣丁叔謙傳方

木瓜敗毒散治一切脚氣

木瓜亦可去穰入吹咀自合敗毒
枚無則尋常木瓜亦可
散賣其中入酒調藥烝熟將瓜切片曝乾同
水煎空心服醴泉劉行之路分傳渠得之淮頭有効

（去杖湯治脚弱無力行步艱辛友人戴明遠用之有驗
赤芍藥 陸兩 甘草壹兩
右㕮咀每服三錢水一盞半煎至一盞空心食前
（平胃散治脚氣
平胃散一貼入大蒜研爛盒之有効
（蒼亏千里飲治久近脚氣
蒼术泔薄切米泔浸乾木瓜
白芍藥 川芎
人參 枳殼去穰 白茯苓 甘草炙
大黃 陳皮去白 半夏泡染次 桔梗炒
前胡 乾葛 紫蘇 木香各等分
右㕮咀每服五錢重水一碗半生薑七片煎至一碗去滓温服食前如服此藥先用大蒜三頭剥去皮洗淨搥

細捻作餅子貼所患脚心外用絹帛傳之覺口心微有
蒜氣便温前藥頻服象守紀智立傳親見劉監統用効之
木香散一貼治脚氣鷺絲藤 木香 赤芍藥各壹
右用黍香蘇散一貼同煎去滓服胡郁承傳方
四製圓治脚氣
製蒼木貳兩乾木瓜壹兩
製蒼木好酒壹升煮乾
製蒼木貳兩乾木瓜壹兩
好醋壹升煮乾
蒼术貳兩乾木瓜壹兩
蒼术壹升入鹽貳兩煮乾
蒼术貳兩乾木瓜壹兩
蒼术壹升川椒末壹兩煮乾
右用无器煮焙乾爲末酒糊丸如梧桐子大空心温酒
下三五十丸婦人醋湯下

類編朱氏集驗醫方卷之一

湘麓朱佐君輔集

傷寒

附

諸瘧自汗消渴便濁便數

雙解散解四時傷寒疫癘風溫濕溫不問陰陽二證表裏未辨發熱惡寒頭疼項強腰背拘急肢節煩疼重嘔吐喘嗽聲重目睛眩疼煩躁引飲往來寒熱已經汗下病勢愈甚用藥錯誤壞證惡候及不伏水土山嵐瘴癘婦人血虛發熱凡室女小兒老人並宜服之

人參 白朮 茯苓 乾葛 白芍藥 甘草 各壹兩半 升麻 各壹兩 陳皮 不去白 貳兩 香附子 炒去毛 叁兩 紫蘇葉 貳兩半

右㕮咀每服三錢水一盞生薑五片棗二枚煎七分通口服如要出汗加葱白三寸(淡豉)十四粒連投二三服略以被覆汗出立効不拘時如春夏加(葛本)(白芷)各壹兩○此藥乃(四君子湯)(升麻湯)(香蘇散)合而爲一(四君子湯)解肌發表(升麻湯)(香蘇散)退熱解表(香蘇散)助二藥之表裏此藥性稍涼有熱者宜服之居南方瘴地或冬多徃陽當併服取効若體性有寒及壞證已虛者恐亦難用大抵有虛寒人只服(香蘇散)多亦能助寒有實熱人只服(白朮)多亦能增熱此藥內有乾葛(升麻)(香附子)之類性寒爲(防風散)治頭痛壯熱惡風百節酸疼肩背拘急面赤虛煩聲重咳嗽多自當審之

厚朴薑製　陳皮
獨活　防風
右細末每服三錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分温
服沸湯點亦可春夏宜用之

羌活散治四時傷寒頭疼鼻塞或流清涕項背拘急惡風
自汗　白芷　甘草炙　藁本各貳兩
桔梗炒　蒼朮粳米泔浸一宿焙乾各壹兩
柴胡肆兩　川芎　藁本各壹兩
桔梗　甘草　獨活各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞半葱薑煎七分熱服
羌活　獨活　藁本各壹兩
沖和散治寒温不節將理失宜乍暖脫衣盛熱飲冷坐卧
當風居處暴露風雨行路衝冒霜冷凌晨早行呼吸冷氣
久晴暴暖忽變陰寒久雨積寒致生陰濕如此之候皆爲

邪癘侵傷肌膚入于腠理使人身體沉重肢節酸疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重伸欠泪出氣壅上盛咽渴不利胃腸凝滞飲食不進凡此之證若不便行解利伏留經絡傳變不已

蒼术陸兩　荆芥穗叁兩　甘草壹兩貳錢半

右爲末每服三錢水一盞半煎八分熱服不拘時候併服之姜侍郎方

淳再煎絶覺傷寒及覺勞倦亦須服之不問虛實皆可

白芷散治傷寒鼻塞出清涕出百一方

白芷壹兩　荆芥壹錢

香白芷並

神术散治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒鼻塞聲重

右爲末服瞞茶清調下薄荷壹錢尤佳

蒼朮伍兩　藁本去土　羌活
香白芷　細辛去葉　川芎各壹兩
右爲末每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎七分温
服不拘時傷風鼻塞用葱茶調下
(羌活散)治男女感冒不問陰陽皆可服
柴胡貳兩　粉草半兩　羌活
白芷各壹兩　川芎
(神應散)治四時瘟疫傷寒右爲末葱湯酒任下
茯苓　甘草
黄芩　地骨皮
右各等分白水煎服不過數服而愈宣和間王煥疫疾
神以王有陰德以此方授之
蒼朮散截四時傷寒疫疾

蒼术炒半斤　麻黄壹两去節炒　杏仁貳两去皮炒　甘草貳两炒

右爲細末每服二錢沸湯調服無時候

○右治白瘧

（知母散）治一切瘧疾不問先熱後寒先寒後熱多寒少寒多熱少久年不瘧者止一服取效韻州羅監稅傳方大有功効

知母　貝母　常山　檳榔

右等分爲咬咀酒水各一盞煎至一盞用綿盖定露一時不得過婦人手

宿五更乘冷望東服直到巳時食乾物若喫水便吐煎

（川烏散）治虛瘧

大川烏　草果子　乾薑　良薑各等分

右剉到棗七枚薑七片煎服

檳榔散 治瘧疾不問寒熱無不愈者湘中吳德漾傳方

檳榔　草果子　烏梅各壹箇　常山

柴胡　乾葛　厚朴製　甘草

右先剉草果子烏梅之常服有驗外其餘五味只以常山多些小有熱多乾葛加些小生薑壹大塊擘破用大湯盞則酒一盞半於未發之前一日煎取一盞服之留滓半盞又添起水酒共一盞半臨卧取一盞服之只可作一服便愈後到天明再煎取一盞服之只可作一服便愈後

青蒿散 治瘧疾

青蒿　烏梅　常山

慢火煎生則吐人熟多則加水寒多則加酒直要

甘草　秦艽
青皮　柴胡
桃枷枝各七寸　常山
右以常山秦艽柴胡草果子青皮甘草爲末每服用水一盞半入桃枷枝青蒿子加烏梅一邊煎八分放冷一服只是預先一夜一服

增料正氣散治瘧疾經驗湘中胡伯村傳方
金不換正氣散每服加嶺柳三箇草果子壹箇烏梅一箇少許薑棗半酒半水兩盞同煎一盞去滓五更

蒜餅圓治瘧疾經驗周身叔方
用蒜元大每服一元五更熱酒下或

十元亦可愚度大槩積痩有驗

(三虎圓)治瘧疾

北常山　草果子　甘草

右各等分用白酒餅一箇小者兩箇同爲細末生蜜爲

元彈子大隔先一日塩湯下一元臨發又二元發旺又二元立効

(瘧丹)治瘧疾

蠟茶　硫黄各等分

右寒多則加硫黄少許熱多則加鵝茶少許臨發時用

冷水調下甚者兩服即愈用之屢驗

四勝飲)治瘧疾初患瘧疾未上十次者不可便截皆因暑邪入於脾經生冷傷於中脘或先寒後熱或先熱後寒或或獨作或連日併發或日一發寒則肢體顫掉熱則滿身

如燒頭疼惡心煩渴引飲口苦咽乾背脊酸疼其陰陽未
分胃腸俱病者此疾此藥表解陰陽並治之即日安愈
藥表解陰陽並皆治之後重欲作痢疾若有此疾此
生料五苓散
小柴胡湯
草果散
右此藥共和令勻不問男女孩童大小皆可加減煎服
不換金正氣散
右此藥共和令勻不問男女孩童大小皆可加減煎服
但作四服水一盞半生薑五片肥棗一枚煎至一盞空心熱服合滓再煎兩次不拘時候但忘生冷一切毒物及忘一月飢飽風寒免至再發乃愚蜀中道人傳授功効如神此方係撫州蕭世榮刊施

常山飲治瘧余嘗服之取効

常山　檳榔　烏梅　甘草

北柴胡　草果子各等分

右㕮咀每服五錢水煎不拘時服此方出活人書治婦

蜀漆湯治一切瘧疾

蜀漆即常山苗子　桂心　甘草

茯苓各壹兩　生地黃壹斤　知母

芍藥各壹兩　黃耆伍兩

右㕮咀每服三錢水煎不拘時服此方出活人書治婦

人產後寒熱其狀似瘧湘中名鑒黃槐鄉用之治瘧屢

有功効

檳榔散治瘧疾

大檳榔壹箇　常山壹錢　烏梅壹箇　鱉甲壹錢

右等分細末用猪膽汁爲圓如梧桐子大每服三四十
圓遇發前空心酒吞下如此二服而愈

(五苓飲子) 治瘧疾發作譫言妄語如惑鬼神或時大叫用
澤瀉一兩 赤茯苓猪苓 白朮各半兩 官桂二錢半 右爲末熟水調下絞服小便清狂言意有効

(草果飲) 療實瘧

常山 柴胡 各壹兩 甘草 檳榔各半兩
白薑炒錢 烏梅隨意加減

右㕮咀每服四錢半水半酒生薑一塊烏梅一箇煎未
發前服再發再服不過三服愈

(三生飲) 治虛怯之人發瘧未可以常山等藥攻之者(三生)
發前服再發再服不過三服愈

(順元散) 合和多加生薑煎服蓋無痰不成瘧此極有効

冷附湯 治虛瘧 附子壹隻炮

右切片子分作二服生薑十大片水兩大盞煎
夜煎下用綿裹盞露一宿至五更初取冷服凡患
無過是痰實痞塞不通脾氣弱虛熱在上停于胃膈不
得入于臟府所以五更冷服乃使藥下達壯脾胃去痰
實降虛熱心氣屢試屢驗
(不再散)治久瘧

黃丹壹兩　一百草霜叁兩

右爲末新汲水五更望南服用水不多
露星散)戴防禦治瘧真方天下無二

陳皮陸兩　蒼术肆兩米泔水內入生
薑汁浸壹宿晒乾　甘草叁兩

厚朴以陳壁土生薑二片酒一盞和水
五盞厚朴肆兩煮令乾爲度晒乾草果
檳榔生用　木香

半夏湯次泡　縮砂仁各貳
兩

青皮貳兩去穰對碎以㕮豆三四粒去皮膜線穿定於青皮內炒㕮豆黑去㕮
右㕮咀每服五錢水二盞薑五片烏梅棗子各二枚入
煎至七分去滓空心通口服滓露一宿至天明取入再同滓
薑去青皮如嘔吐加丁香附子去半夏如寒多熱少加官桂
草果七枚熟多寒少加前胡去半夏如寒多熱少加官桂
治瘧瘴

草果　常山
大棗　甘草
右七味等分青蒿倍之每服四錢用水一盞半煎至七
分通口服滓再煎其效如神

貝母　雞
烏梅　心

甘草生用　信砒眞者性寒水一石如琉璃亮者是
右將三味碾爲細末麪糊爲圓如菉豆大朱砂爲衣每
服大人五圓小兒二圓早晨面東用冷水吞下忌毒物
如不圓者用末子以冷水調大人每服只用一字錢小
兒每服半字錢臨發日服之更請眞噢熱食只用温湯
淘飯止飢粥食例放冷恐熱觸犯藥性眞實藥料志誠
修合不過五六服自然而愈後服

良薑圓　新增　醒脾治瘧

良薑壁土炒　甘草　半夏　七湯泡次　製厚朴　青皮

右等分㕮咀每服三錢水一盞烏梅煎服空心

良薑貳兩　右末猪膽圓梧子大紫蘇湯下貳拾圓

自汗

救汗湯（治陽虛自汗不止）

芍藥三兩　官桂去皮味者三兩　甘草貳兩

附子生用不去皮三兩

右㕮咀每服五大錢水一盞半姜五片棗貳箇同煎八分去滓温服不拘時合滓再煎

（一方）不用附子

牡礪散（治卧即盜汗風虛頭痛東垣呂架閣傳）

牡礪煅　白朮　防風

右等分酒服寸匕日二服止汗之效無出於此

又方（治盜汗屢驗）

太平白並壹兩　辰砂半兩

右爲細末酒調下

（又方）治盜汗如神　胡子蓉主簿傳

道地真龍膽草　北防風

右等分水煮麵糊爲圓每服三五十圓無時白湯下

（白朮散）治盜汗極驗　趙冀公傳

白朮不拘多少判成小塊或稍大用浮麥一小升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一二升煮取出切作片焙乾去麥不用

（伏苓湯）治虛汗盜汗

右研爲細末別用浮麥湯每服二三錢不拘時候

（白朮伏苓）爲細末煎烏梅陳艾湯調下二錢服之神妙治盜汗

附子二錢炮去皮臍　甘草壹錢炙　黃耆壹錢或蜜炙

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜三片棗一个煎七分去滓食前後

有如虛出汗用防風不以多少麩炒赤色研為細末煎豬

皮湯下以上等證蓋陽經虛皮膚發泄盜汗多生故有是

證如傷風別有方

牡礪散（治氣虛夜多盜汗）

白朮壹兩　牡礪赤煅而白者火煅通二兩別研極細

黃耆炙壹兩　防風不用叉尾各壹兩

右細末搽令極細方可服每服三錢溫酒下日二三服

痟渴

(八味圓)治痟渴　梁國侯傳妙甚

八味子　用繭空及加空煎湯下

(鹿茸圓)治渴疾　趙司法服之有效

鹿茸二兩　兎絲子壹酒蒸兩浸　天花粉半兩

右煉蜜爲圓每服五十圓空心北五味子湯服

(治渴疾)

五味子湯　黄耆六兩

右㕮咀每服一錢水一盞煎至六分去滓食後温服

(蚕繭湯)有一人苦渴疾日飲斗水諸藥不效遂服煮蚕繭湯

搔絲湯一名益其渴煩除恐不及時如無但以亂綿煎湯服

(治傷酒多或成渴證)

棘刺子本草載云距世當門子五粒

右用棘刺子煎湯吞下當門子其渴立止若盖棘刺最能

大九人家若酒房畔有此木不宜

(冬瓜飲子)治渴疾

大冬瓜子去皮搗爛取自然汁五大椀下(五苓散)一

兩去桂調成飲子時時喫一盞與藥時不得與水不

過二料立愈

(白朮散)治胃虛發渴

白朮壹兩 人參

右爲末每服七錢水盞半煎七分服凡吐渴之後多有

腫疾仍預服復元丹數服漸漸國佐傳

(加味四君子湯)治消渴

人參 白茯苓

白朮 甘草

桔梗

右等分細末白湯調下
(神功散)治消渴
北白芍藥壹兩半　甘草壹兩
右㕮咀每服三錢水盞半煎六七分無時服
(麥門冬圓)治消渴
麥門冬去心焙研成膏瓜蔞根　黃連去鬚
右二味末入麥門冬內搦勻爲圓每服三十圓早晚
食後煎麥門冬湯下
(參蒼湯)治消渴
人參　枯梗　天花粉　甘草各壹兩
右㕮咀每服四大錢水盞半煎八分日進四服留滓合
白芍藥　綿老蒼益智各壹兩半浸白伏苓　北五味各壹兩半

煎以上四方載梁氏總要方

（一方）有木瓜乾葛烏梅三味

鷄蘇圓治病後虛羸發渴

鷄蘇圓用五味子煎湯吞下仍服安腎圓

便濁

硃砂鹿茸圓治小便白濁 李正叔道傳

龍齒 七錢 鹿茸 壹兩 酒浸兩半炙

右細末用石菖蒲遠志剉碎浸酒煮山藥糊丸鹿角膠壹兩炒粉為圓以朱砂為衣如梧桐子大用木香勻氣散下三十圓如無白

鎖精圓治小便白濁 朱仁卿傳

濁平補只用鹽湯溫酒空心服

破故紙炒　青鹽各四兩　白茯苓貳兩

右末酒糊圓空心酒或鹽湯下三十圓

地黃圓治白濁如神　田監簿傳

熟地黃九蒸九曬十兩　兎絲子浸洗蒸　鹿角霜各五兩

右末鹿角膠煮酒爲圓每服百十圓鹽酒任下

遠志圓治小便赤濁如神　柏子仁各三兩　附子壹兩

遠志去心用甘草煮半斤茯神去木　益智仁各貳兩

右爲末酒糊圓臨卧豪湯下五十圓梁國祐云有效

治小便太過王叔緐安撫傳

小便數

益智子不以多少爲細末臨卧每服二錢入鹽少許即止

縮泉圓治丈夫小便頻數 史越王方

烏藥

益智炒

吳茱萸炒九蒸九曝

右等分酒糊圓梧桐子大每服五十圓臨卧鹽湯下

雙白圓

白茯苓去皮

鹿角霜

右等分細末酒糊圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯下 梁氏摠要本

川椒去目并閉口者出汗合

類編朱氏集驗醫方卷之一

○諸氣

諸氣評

人之一身以氣爲主正則榮衛調和百脉流暢周流上下諸病普消苟不得其正盛衰則虛順則平逆則病矣蓋人有七情病生七氣七氣者寒熱怒恚喜憂愁是也又曰喜怒憂思悲驚恐如憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈亦氣也(流氣飲子)治諸般氣疾併泄瀉

黃芪　桂心　苦梗　白芍藥
甘草　當歸　陳皮　大腹皮
桑白皮　紫蘇葉　紫蘇梗各壹兩

大黃　木通各叁錢

右㕮咀每服三大錢水一盞生薑三片棗一枚
分空心服須要温熱則渴人　杭州仁濟大師方
蘿蔔元治諸冷積腹脹氣痛

蘿蔔子叁兩　沉香壹錢半　草豆蔻壹錢半
白术半兩　青皮半兩

右除蘿蔔子爲末別研麪糊元十元米飲下一梁氏方
烏豆圓治氣刺痛

黑豆炒熟用黃柏壹兩剉
炒白豆同前法製黃柏貳兩

母丁香叁粒穿心巴戟壹條去心白蔻煞貳粒拾粒沙薑壹錢半
右爲細末酒糊爲元朱砂麝香爲衣如豪豆大作一服
冷鹽酒以燒豆腐羹壓之

枳芎散治左脇下痛

枳實　川芎　各半兩　甘草貳錢

右爲末每服二錢葱棗湯調下酒調亦得不以時

(三稜圓)心下如盤久不已令人四肢不收發黃疸飲食不成肌膚始由肝病傳脾脾當傳腎腎乘王而不受邪氣留於脾謂之痞氣其脉緩澁兼治食癥酒癥血癥蟲血瘕氣塊時發刺痛婦人血分男子脾氣橫泄

三稜　莪朮　各肆兩　元花貳兩

右三味用米醋三升煮令醋盡獨炒元花令乾將二味焙乾同爲末麵糊圓如豌豆大橘皮湯下五圓

(息賁湯)治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈病洒洒

寒熱氣逆出喘欬發爲肺癰其脉浮而毛

半夏洗　茅根　桂心　人參

甘草　桑白皮

右爲剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎至七分去滓食前服此病患者極多看脉氣有力咳而脇下痛者以十棗湯下之却用息賁湯調理其效尤速

（棗子酒）治疰奔豚氣

雄猫壹筒去頭足翅

右用好肥棗一箇擘開去核安班猫在內用濕紙包文武灰中煨熟去班猫不用將棗子細嚼熱酒送下空心

（金銀散）治蛊毒

蚌粉炒壹兩　入薑黃末半錢水調拌蚌炒乾為末每服二錢鹽少許熱湯調合

治積氣冷氣熱氣血氣出方便集

氣痛多因冷或感風雨濕或冷食癥滯則痛有積也謂之積氣痛堅塊引引至心脇腰築痛上膈逼上膈腰築痛上引至心脉沉而遲面青不渴之大抵煨薑能正冷氣而煨薑能正冷氣而巴豆去積有功也若下元虛冷氣逼上則三稜丸極則(附术丸)主之曲卧不伸者謂之冷氣輕面青不渴如面赤發渴心腹築痛或吐或瀉六脉洪大或沉而數或心脉數大爲其心屬小腸肺通大腸此謂熱氣(三黄九黄參湯)主之假如婦人亦有三證然必是帶血證亦有全是血氣者蓋有所因或感冷冒熱而血氣動行是致如刀之刺謂之血氣前交加散可以加減而用無不愈者

（薑合九）

生薑壹㘝中破兩邊各剜去少許可容巴豆壹
九十五粒却合薑紙裹浸濕煨熟用
右先熟艾下熱白湯一盞取出藥九先一口湯嚥下再嚼
煨薑白湯盡嚥下如瀉亦好

（薑附丸）治脾胃氣弱飲食少或心腹疼痛或飲食難於克
化常服進美飲食脾胃壯實自然無疾

香附子壹斤大者去毛皮油浸三宿春夏一宿二宿十漬出
水淨洗入銀石器內用井水煮上有二宿十漬出
水方可入大蒜二十枚去皮鋪在上慢火煮候
以蒜爛以竹筯攪碎蒜汁乳爲度漉出焙乾用

神曲炒黃
胡椒
右爲末泡蒸餅爲丸梧桐子大每服五十丸任意湯便
下不以時候

主氣散(通快氣寬腸下痰進食
陳皮貳兩　粉草
人參各半兩　沉香　白豆蔻
右細末每服一大錢早晨燒鹽少許百沸湯點服有効
草豆蔻壹兩去皮(通治腹脹滿短氣
右細末每服一錢空心煎木瓜生薑湯下出本草
橘子仁炒(通治氣攻腰疼
右每服一錢酒一盞煎至七分和滓空心服出本草
祕傳枳殼元治男子女人積氣痛不可忍者服之即安
枳實去瓤拾捌片　巴豆拾粒
丁香各用貳拾粒
右枳實兩片合作一筒入巴豆丁香各叁粒線縛定用醋一椀煮令乾去巴豆留小盞醋煮麪糊為元如

兼豆大薑鹽湯下二四十元

單桃方治脇痛　胡桃壹枚不去皮不拘多少

右少用水酒各半盞煎服何元弼神効方

參附正氣散人之一身以氣爲主若正則百病不生故怒則氣上恐則氣下喜則氣緩悲則氣消寒則氣聚熱則氣洩憂則氣亂勞則氣耗思則氣結陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩胸腹脇刺痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脉沉耳乾焦黑面黃體瘦痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病厄羸倦弱妊娠失調理產後虛損並宜服之大能補虛正氣調理氣血固

人參　木香
乾姜　甘草
黃芪　當歸
陳皮　白芷
白朮　附子炮
白豆蔻各貳錢半　川芎
藿香　茯苓
丁香　桂心
縮砂仁　青皮各半兩
半夏曲各柒錢　此方憂南奇効

右㕮咀每服半錢重生薑三五片棗二枚煎服不拘時時呷之甚妙湘中黃楮得此方良薑各貳兩

右爲末每服二錢水一盞煎六七分沸投醋半盞取出良薑散寬中順氣理脾蕩滯中脘不快

高良薑　草果
縮砂仁　厚朴

陳皮 各半兩 半夏湯浸 枳殼 木香
甘草 各叁錢

右㕮咀每服三大錢水一盞半生薑三片煎至七分去
滓空心熱服日中再服清湘張介叟方

(通閉飲子) 治濕熱壅滯腸胃氣
厚朴 製 生薑焙 草果 香附子 去毛炒
皂莢 各叁錢 青皮貳錢 陳皮

右細末空心沸湯盞點服何性之方

(大正氣散) 治男子婦人補虛快氣散腹脇疼痛
當歸 香附子 炒 陳皮 去白各半兩 甘草 炙
木香 各貳錢 白薑
白朮 縮砂仁 大附子 炮壹枚
桂心 各叁錢

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八分去滓空心熱服陳必勝方

○ 治小腸氣痛絶妙

元胡索散（元胡索盐炒 乾蝎

右等分細末温酒下朱仁卿方

（一捻金散）治奔純小腸諸氣痛不可忍

全蝎各炒壹兩 附子半兩去皮臍生用

元胡索 川練子

船上茴香各炒壹兩

右爲細末每服二錢痛作時熱酒調下甚者不過再服

神効本事方

(夜元圓)治鈎腸病

川楝子貳拾五个劉寄奴分陳皮炒貳分巴豆五粒炒黑蓬牛炒黑各壹分肉桂壹分黑丑炒貳錢壹分巴豆五粒炒黑除去巴豆破故紙貳錢代用

右爲細末煮少麪糊爲丸取江水井水各半煎湯吞下空心服

(木香飲)治小腸氣痛黃楓卿方詩訣曰小腸氣痛無叫啼空眼哭口乾脚冷上唇乾額上汗珠濕漉漉

木香炒壹錢 川練子拾个巴豆粒炒令上黃色去巴豆米用 茴香半兩

無淚小兒皆貳錢 史君子

元胡索半兩 南木香

右爲末米飲調下大人小兒皆用

(各半散)治小腸氣攝痛

室女髮燒灰茴香

右等分爲末無灰酒調熱服不拘時候出海上方

(吳茱萸丸)治膀胱氣痛

吳茱萸 不拘多少作肆分為壹小便浸壹分醋浸壹分水浸壹分蒸焙乾

右為末水煮麪糊丸空心酒下

(金鈴子丸)治膀胱小腸亦氣膜苦痛

川練子半兩每箇作四片用巴豆四粒炒焦為度不用巴豆

茴香 拾枚炒

破故紙 各貳兩

右細末酒糊丸每服三十丸

送下常服鹽酒吞下亦可

(金鈴子散)治膀胱小腸攝痛發則欲死諸

葫蘆巴 炒

川練子 拾四個去頭翹足巴豆拾四個心擘開作壹兩

右二味同(胡桃)仁叁个熱葱酒

川練子 拾四個去頭翹足巴豆拾四個心擘開作壹兩

右二味同於銀石器內慢火炒令川練肉帶

微黃焦色取去(班猫)(巴豆)二藥不用只將(川練子)肉別
安之一處外用(茴香)叁錢重和前(川練子)肉用塩合炒
令香并前(川練子)碾爲細末每服二錢匕空心温酒調
下若臟府微痢痛即愈病久而甚病者不過三服病退
即止不可過劑服後仍(安腎元)(沉香)(木香)加散吞服
以補其虚則其疾永不作矣

治膀胱氣痛方 本事方

歙縣尉宋茜甫膀胱氣痛不可忍醫者以剛劑與之
痛與甚令(蒼朮)散壹兩分作三易其各用(連鬚蔥)一莖(茴香)
及塩少許水一盞半煎七分連服之中夜下小便如黑
豆汁一二升臍下寛得睡明日脉已平續用(硇砂)元數

愈此疾往來皆因腎虛　聖惠云腎氣虛風冷所侵流入于腎不能宣散而然也如腸癪難治獨氣癪水癪治之易愈又有寒疝之氣注入癪中名曰狐疝亦屬四癪治法橘核丸主之證録于后

橘核丸　治四種癪病如腫脹偏有大小或腎硬如石或引臍腰絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出黃水甚則則成癰潰爛

橘核炒　海藻洗　昆布洗　海帶洗

川楝子炒取肉　桃仁麩炒各壹兩　厚朴去皮壹兩薑汁製炒　木通

枳實麩炒去瓤　桂心不見火　木香不見火各半兩

右爲末酒糊爲丸梧子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下虛寒甚者加炮川烏壹兩堅脹久不消者加鋼砂

貳錢醋煮熟入

(三白散)治膀胱脫褊熱風濕相乘陰痿腫脹大小便不利

白牽牛 畧炒貳兩 白朮半兩 桑白皮 陳皮

木通 各半兩

右爲末每服二錢薑湯調服空心服初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯疝方大率多用熱藥此方唯壅塞熱證宜服之

(茴香酒)治膀胱脫偏墜久不愈者

灯籠草根渾酒却將茴香(炒碾用此酒調下

八角茴香 白牽牛 炒等分爲細末空心酒調下

○

腰痛

破故圓治陰冷傷腎腰痛并補腎圓 胡周卿傳

破故紙

右一味酒浸一宿炒熟酒煮爲圓更用破故紙少許炒爲末酒調下

术附湯治風濕之氣傷腎腰痛

术附湯加川練子煎空心服

桂附圓治五種腰疼

破故紙二兩炒　附子炮各壹兩

肉桂

右酒糊爲圓每服五十粒空心酒下

川烏圓治男女腰脚滯重

川烏　五靈脂　當歸　杜仲　骨碎補

右等分酒糊爲圓空心酒下

神妙圓治腰髖痛

見傷損類

銀河圓治腰疼如神

黑牽牛一壹兩　硫黃半兩

右二味同炒令牽牛熟留硫黃累在牽牛上不用研碎

趁痛圓治腰臀痛

方見諸風門

每服五十粒用温酒鹽湯空心吞下

（牽牛散）治腰疼神妙

黑牽牛 不拘多少燒熟存上勻鋪不可
生半熟

右爲末酒調加茴香九如
好

（又方治腰痛最妙）（新增）

小續命湯加杜仲七箇炒去皮尖煎服

類編朱氏集驗醫方卷之三



脾胃

附

脾胃評

嘔吐 蕃胃

虛腫

評曰脾爲諫議之官胃爲倉廩之官足太陰之經也蓋脾胃屬土位居中央禹乎戊巳土於中州每旺四季一季之中土旺十八日內主肌膚外應於唇惡濕好燥喜歌樂畏怒氣故與足陽明謂之經相爲表裏表裏温和水穀易化若飲食過度傷於生冷由是百病生焉脾之脉以阿阿緩若脾脉實大則唇焦口燥身熱頗痛體重腹脹善飢善噦短爲本虛脉若實大弦長濡弱皆病脉也若脾脉虛弱則腹脹食減飲食不化或嘔吐泄利甚則腹痛面黃氣急腫滿

右㕮咀分作十服水一盞半生薑三片棗一枚煎八分
空心服大便不通加枳殼去穰心下不寧加麥門冬子
去心不思飲食加神麯麥孽炒夜不得卧加酸棗仁炒
壯筋骨長肉補血加黃耆鹽水浸炙四肢疼痛加桂與
芎藥藏腑有寒加熟附子此藥屢用神效不可具述
崇土散治脾土虛弱腎水無畔岸易致腹滿腹疼時有泄
瀉之證皆宜服之
白朮壹兩切大片以黃土半兩水一大碗煮壹鍾須流去土用
乾薑半兩黃泥裹煨乾去皮 丁香 生參 生用錢
草果半兩黃泥裹煨乾去皮 粉草半兩黃泥裹煨乾去皮
人參半兩黃土對半兩黃泥裹煨乾去皮 縮砂連皮貳
枚黃泥裹煨乾去皮
右爲末每服二錢沸湯調服日空心三服或用伏龍肝
煎湯尤妙此方係杭州傳來服之屢有效

右氣實加（青皮）半兩虛加（陳皮）半兩細碾爲末每服三錢入燒鹽少許空心沸湯點服

（八珍散）治脾疼不進飲食

白豆蔻仁炒去殼　沉香不見火　陳皮各壹兩　甘草半兩炒　白茯苓炒　白扁豆煮熟　薏苡仁炒　石蓮肉炒去殼

右㕮咀每服六錢重水二盞薑五片煎八分去滓服用

紙隔藥炒勿令傷藥力（胡）石壁爲軍器監門人制屬建此藥而愈疾得此

（生胃丹）此丹兆天之五氣由黃反穀生精生陽壯脾元實腎水酸胃吐食胃虛生風手足搐搦痰涎潮作聲久病全不納食胃氣欲絕最能救之南康劉立之方

人參　神麯炒　麥蘗炒　穀蘗炒

半夏麯炒兩各壹　白朮　白芍藥

川牛膝酒浸焙　川厚朴薑製　丁香
白豆蔻仁炒　山藥　白伏苓　防風各壹兩半
沉香各貳兩　香附子叁兩　縮砂仁炒貳兩　木香
粟米壹合炒焦乾爲度　陳皮
右爲細末法圓如豪豆大每服一百元用白湯吞下

(生胃丹)生胃氣消痰沫開腸進食

天南星壹斤用生薑伍斤取汁和作餅真黃土焙乾
粟米肆兩溫水浸透炒熟用
粉白天南星貳兩薑汁浸作餅焙乾再焙乾如是製柒次
茯苓各貳兩陳皮
麥蘗子炒　半夏麴　人參　白豆蔻仁　縮砂仁
青皮　白朮
右焦乾爲度候冷取出南星入藥
浸壹宿次日用生薑汁和泥包焙熟用
各貳兩
巢澄茄

石蓮肉各壹兩　南木香叁錢

右件精揀製同爲細末用米粉糊圓如豪豆大每服五十元薑湯吞下食前服

煮朴圓治脾胃不足停寒留飲泄瀉無時

厚朴壹斤製　天南星去皮去臍壹斤　半夏去皮去臍壹斤　大蒜和皮洗切作片八斤

生薑壹斤　肉桂去粗皮伍拾箇

已上用水五升同煮上肆味於銀器中煮令乾曝炒去薑上肆味却入後藥同煮上肆味不用

乾薑炮　茴香炒各壹兩半　炙同前藥肆兩　青塩壹兩

附子炮　白茯苓各貳兩

右件細末神麴糊爲丸如梧桐子大每服五十丸加至七十丸空心米飲下

參橘圓壯脾進食消飲下痰醴泉梁國佐方

人參 神麴

麥蘗炒各貳兩 白茯苓去皮肆兩 橘紅壹斤去白用生薑

右爲細末薑汁打糊爲圓每服五十圓薑湯下熟水亦得

法製薑附圓治脾胃虛弱

香附子炒去毛秤壹斤米泔水浸秋冬三日春夏一日夜漉出新水洗浸入銀器中水三椀令香附上有水寸餘取大蒜二十頭去皮膜取仁如棋子之候蒜不見而汁乾爲度取出焙乾用銀器不住手攪二三百轉以蒜不見而汁乾爲度取出焙乾爲細末薑汁打糊爲圓如梧桐子大每服五十圓湯下熟水亦得

丁皮 縮砂仁各炒 乾薑肆炒兩 胡椒

右爲極細末湯浸一宿蒸餅爲圓如梧桐子大每服五十圓湯亦可下不拘時候浸蒸餅待湯已入蒸餅了

稍冷用新布包裹裂去水方可用藥如覺難圖入少麪
糊爲圓不妨更加淨陳皮(貳兩用)鹽水浸焙乾尤妙如
寒多加(附子貳兩)桂(壹兩)
周馬帥之祖承奉因靖康初自泗州逃難山陽夜行
墜古冢中已先有人在矣至曉各散出於冢外得幅
紙裹太平錢八十四文紙上有此藥方云江南上下
人弱疾當作於脾胃脾元壯實則飲啖美健自然無
病壯脾有藥曰(法製薑附圓)先祖甫弱冠擔即合此藥
無日不服一生無疾壽八十四祖母安人服之又九
十六母永國夫人服之壽九十八婆婦雖老皆飲食
不減壯年甚妙

(朴附圓)厚腸胃止寒泄助元氣進飲食兼治脾腎氣弱手

足浮腫

附子膚兩去皮生用切作片子

右用水三升於銀器內慢火煮水盡爲度焙乾爲末煮

糊爲圓趙忠肅取效方

霹靂壯脾圓　厚朴

陳皮柒錢　甘草貳錢半　訶子壹兩

蒼朮　白茯苓各貳兩

川烏各壹兩　桑子伍拾枚　附子

厚朴圓　寬中進食推化積聚

厚朴肆兩去浮皮薑生薑自然汁炙焦黃　蒼朮貳兩泔水浸洗

義朮貳兩濕紙裹煨去皮片切　青皮貳兩洗去瓤細畧炒

陳皮貳兩洗去瓤晒乾　當歸貳兩去蘆淨洗晒乾

川椒去目　茴香各貳兩　青鹽壹兩

生薑各肆兩　生厚朴

生薑半斤　訶子壹兩　大蒜十个去皮煮爛

荆三稜貳兩去蘆切片　白芷貳兩切片

禹餘粮火煅醋淬凡十次爲細末用水飛過再
針砂貳兩入乾鍋内火煅通紅淨秤貳兩再研過再
右二味同前藥末内醋煮糊搜和爲丸如梧桐子大
候乾每服七八十元至百元陳米飲送下食前
脾疼單方　治熱食冰雪過多又飲
張忠順盛夏調官都城苦熱食冰雪過多又飲
積冷于中遂感痺疼之疾藥不釋口殊無退證累歲日
齋道人適一道人曰我受宫人供固非所惜但
貳拾壹粒浸於漿水盃中
是而已張如所戒明日椒
編類

永煎理中元
泗州楊吉老名醫也徽廟常苦脾疾國醫進藥俱不效
遂召吉老診視訖進藥徽廟問何藥吉老對以大理中
元上云朕服之屢矣不驗吉老曰臣所進湯使不同陛
下之疾以冷食冰太過得之今臣以冰煎此藥欲以受病
之源果一二服而愈礦碎錄
木香神效散治遠年近日一切脾痛
南木香 青皮 陳皮 麥蘗炒 京三稜 蓬莪朮 神曲炒
大枳殼炒 甘草煨各貳半 北白芍藥 川白芷 肉桂去皮
元胡索 破故紙 縮砂仁各壹錢
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至

七分空心服臨熟加塩一捻再煎兩沸忘
切生冷此方得之鄉里蕭國賢國賢得之
此疾以來遇食冷物或天氣寒冷便發發
痛起或引入背膂痛不可忍服之遂絶根
難以具述出朱佐方

枇杷葉散調理脾胃清膈下氣去積滯舒氣除痰推陳納
新養生之要不可缺也

丁香　乾薑　半夏湯洗浸　沉香
枇杷葉塗炙去毛　肉豆蔻各三錢麪包煨甘草伍錢半炙　白豆蔻仁炒
縮砂仁炒各陸錢半　茯神去木　白朮各壹兩
檳榔煨貳錢　青皮四錢半去白　木香四錢

右㕮咀每服三錢水一盞半薑生薑三片棗子一枚煎至

七分不拘時候

(白豆蔻圓)補脾胃氣弱飽則胷膈虛滿

白豆蔻 炒縮砂仁 炒人參 白朮

茯苓 去皮 丁香 白薑炮 粉草

麥蘗各壹兩 良薑半兩

右細末煉蜜丸如彈子大每服一二元食前煎

湯嚼下 寶慶張太醫方最用有效

(烏雞煎圓)補脾胃虛弱

太附子炮去皮臍 川當歸 白茯苓 茶錢

右爲細末用烏雞一隻將米醋爛烝合末爲元如梧桐

子大每服五六十元空心鹽湯溫酒任下 盧廖太醫方范

(桃仁散)治男子脾疼不可忍神效

桃仁 不拘多少螺粉炒去皮尖研如泥

右爲細末空心酒調服

（進食散）調脾進食療腹脹吐逆

青皮 陳皮 甘草 肉桂 白薑

附子 炮 訶子 良薑

右等分㕮咀生薑三片棗子一枚水一盞半煎至一盞

空心一日一服

（丁香調氣湯）

白豆蔻 剝錢丁香 茶錢 縮砂仁 乾薑 炮

木香 白朮 炒 各半兩甘草 炙 壹兩半 炒鹽壹兩 茶壹錢

右爲細末熱湯點服 魏氏方

（經進過院湯）

草豆蔻壹兩用生薑伍片同拌以乾水炒香
蓬莪朮壹兩為麄末熟湯點服　益智仁兩半炒鹽各壹
右為細末熟湯點服　粉草

(平胃圓)正胃消痰

平胃散肆兩　半夏肆兩薑製　好棗壹百枚煅
右水一大鍾煎至七分去滓溫服

(安脾散)

元如梧桐子大每服五十丸薑湯下

白朮　白豆蔻仁炒　香附子炒　人參　甘草

右等分白湯點服信菴趙太師

(薑附湯)治脾虛腹脹嘔吐痰飲食不進或發寒熱

白豆蔻仁叁錢炒香附子壹箇薑壹兩半去殼附子壹箇薑炮縮砂仁叁錢白薑壹兩炮

甘草半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎八分空心服屢用取效

(生胃圓)治酒食所傷胃腸不快不思飲食

良薑　白薑並各四兩炒　丁香

胡椒

右細末麪糊圓如梧桐子大每服百十元米飲陳皮湯下

(蝎梢散)治腰腹脹

胡椒壹兩　蝎尾半錢去刺

右麪糊爲圓如粟米大每服五七圓至二十一二十元陳米飲下

(參附正氣散)治脾腎傷損見諸氣門

右麪糊爲圓如粟米大每服五七圓至二十一二十元陳米飲下

(青棗散)治脾胃泄瀉心腹膨脹服藥疼痛不納飲食或作吐逆

(飛胃脾痛)氣不升降兼脾胃積冷

陳皮

甘草

乾薑

良薑各炒

右等分細末每服一
生冷魚腥酒猪肉動氣物只可喫鴈子雀兒猪肝肺等物
嘔吐酸水心腹膨脹脚手虛浮逆不納飲食宿食不消氣不升降
（參蘆散）治脾胃積冷吐
甘草　白芷　各壹兩　丁皮半兩　厚朴製　二兩
右㕮咀每服三錢薑三片紫蘇五葉水一
盞煎至七分
時如虛浮入黑豆五十粒濃煎忌生冷魚腥動
（導引方）去太倉不和臂腰虛悶
氣等物
歌身兩手一向偏側急努身舒頭共手競
一時盡勢氣共力皆和來去左右亦然各三七項前後
兩角緩舒手如是似向外扒放縱身心搖三七遶牙亦然

(丁香半夏丸)治宿寒在胃嘔吐呑酸

丁香壹兩不見火　乾薑炮壹兩　橘紅各貳兩　白朮壹兩半　半夏湯泡茶次

右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸淡薑湯送下食前

(柴胡湯)治熱證嘔吐

柴胡去蘆半斤　黃芩人參甘草炙各半兩　半夏乾湯洗茶次焙參兩半　生薑五片棗一枚煎熱服

右剉散每服三錢水盞半生薑五片棗一枚煎熱服

(如神湯)治痰證嘔吐連日不交効

半夏留神曲炒黃色　丁香

右用二味水一盞半煎八分其藥自然煎成濃汁不妨
通口服治痰證嘔吐
大半夏湯（瀹貳兩　人參四錢　切片）治痰證嘔吐
半夏（洗伍兩　茯苓四兩　紫蘇葉貳兩　厚朴叁兩
四七湯（治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或
如梅核咯不出嚥不下或中脘痞滿氣不舒快
上氣喘急並宜服之出易簡方
半夏（洗伍兩　茯苓四兩　紫蘇葉貳兩　厚朴叁兩　枚煎至六
分去滓熱服不拘時一名大七氣湯）大治七氣并心腹
絞痛（一方治七情所傷中脘不快氣不升降攻衝腹脇脹滿

香附子炒半斤　橘紅六兩　甘草二兩同煎大妙

（附子散）治虛弱翻胃

大黑附子壹枚作兩截中心各刻小孔入丁香四十九粒塞滿以竹針挿合置磚上入炭火煅四圍淬生姜自然汁半椀再煅再淬以盡爲度去皮切焙

右爲細末每服一錢半粟米一捻北棗二箇煎食前服

（治翻胃）大附子壹枚切去蓋刻中使淨丁香四十九粒以蓋覆之線縛著寘銀石器中浸以生姜自然汁蓋及盖而止慢火煮乾爲度

右爲細末一錢匕糝舌上漱津下若煩渴則徐徐食縻粥

忌油膩生冷滓熙元年冬搔婭自鄱陽往四明過婺州晚泊逆旅倏有野服者坐于傍扣其何人曰呂醫孫道攻療眼疾搖與之語孫曰君貴家子弟必藏好方

畀我一二或可以爲人起疾掲素秘翻胃方即
孫喜書之於冊未幾州鈐轄苦此疾危甚孫爲
此方數服愈類編

驢尿治翻胃方

外臺載云昔幼年經患此疾每食餅及羹粥等
出正觀中許奉御兄弟及紫薤等時稱名醫奉
盤竭其術竟不能療漸至羸憊死在朝夕忽一
服驢小便極驗日服二合後食惟吐一半晡食
六人患翻胃同服一時俱差此藥稍有毒服時
盛取及熱服二合病深七日來服之良驗本事
温胃散治翻胃

真附子壹箇去皮臍分作四塊生姜半斤切大棃慢火同煮至水盡取附子切
右爲細末每服一錢空心温米湯調下

薑桂湯治翻胃嘔吐不效

白薑炮　紅豆　肉桂　丁香

粉草　縮砂仁炒　敗薑用竈心土炒

右各半兩爲細末每服一錢生薑自然汁一分沸湯調下

治翻胃嘔吐不以多少

山礬葉不拘炒黃用　黑小豆炒香　田螺殼火煆

右爲末或酒或熟水調二三錢服之立止

水煮平胃散趙端明本

厚朴製　陳皮　甘草四味各拾兩

蒼朮

肉桂半斤除粗皮生薑貳拾兩切片子粟米壹升以上四味古本是加品

白朮　茯苓　尚香各貳錢

右以上藥同一處用文武火煮水約過藥三寸煮乾水為度火焙為末每服一錢空心鹽湯點服

（附子五苓散）治翻胃吐食

大附子壹隻取空入（五苓散）在內炮熱右為細末每用壹湯下何元壽方

治翻胃嘔吐（十膈散）

老薑二大拇指大（剉）空中間以子母丁香貳粒在內合住以濕紙煨香同下蕭純仲方

右以（十膈散）嚼生薑丁香同下蕭純仲方

（導引方）除腹肚冷風宿疾積胃口冷食飲進退吐逆不下

正坐兩手向後捉腕反拓席盡勢使腹絃絃上下七左

右換手亦然

○虛腫　附膨脹

（制衣豪豆）治十種水氣脾腎氣浮腫悉皆治之

大附子壹隻去皮臍切作兩片用豪豆貳合半水三椀半同煮乾熟入出乘熱空心只喫豪豆其附子留住次日將附子作四片再用豪豆貳合半水三椀半同煮乾熟乘空心喫豪豆第三日再別用附子壹隻豪豆貳合半依前過度服之又第四日亦如前第一日臨卧時喫豆但依此次第資次凡服四日其水從小便自消退如未退再以前藥服之忌生冷毒物塩酒

荆南朱監酒惠迪夫嚴州人與胡全才僉判云某有下腫病無不效者

一水氣藥收二十餘年醫百十人萬不失一只如到
荆南已醫八九人皆全才傳與先君後將此藥醫三
老人皆年八十餘又傳與諸醫收效甚衆真奇方也

沉香大腹皮湯治腫
沉香　陳皮
丁香　川芎
厚朴　大腹皮　各壹兩炙
右細剉爲散每服三大錢水一盞半生薑七片煎至八
分去滓食前通口服

赤小豆粥治水腫屢效
藥服半月愈

信庵趙魯公母薛國夫人腫三十年後在襄陽得此

赤小豆妙倍樟柳頭細切黃丫魚去腮一對生
燒塩少許
右先將豆樟柳頭煎赤小豆煮濃去汁不用將豆樟柳頭
煮粥若得大樟尤妙無亦可候粥七分熟却入
黃丫魚(無與猪猪腰同煮覺魚與猪腰皆熟方入燒塩喫
之不過半月立愈病輕者其效尤速
又方生樟柳切片赤小豆等分鯽魚去腸存
鱗叁枚
右件二味食之汁送下
單方治脾虛受濕發腫一切虛腫皆治張斗南方
大附子十枚生削去皮破四塊用赤小豆半
右爲末用薏苡仁粉煮糊元梧桐子大每服百十丸

心(冬瓜)湯下或(蘿卜)湯下
沉附湯治腫病
大凡腫病因積而得先用積藥積既除而腫
不利到此束手矣若用利小便藥性寒而小便愈不通
故小便不利則中焦下焦不升降痞隔爲寒氣所結故
水凝而不通但用(沉附湯)
附子壹隻生去皮臍切成片
右用生薑十數片水三盞煎八分次用(沉香)
許加入前藥再煎二沸去滓空心服如此則小便自通喘
滿自去矣(沉附湯)一向喫三五十隻(附子)無碍男子婦
人皆可服梁國佐方
加減五苓散治腫疾

木猪苓　白茯苓
澤瀉壹兩　南木香
檳榔各叁錢　白豆蔻叁
右爲細末每服壹錢半煎白樟柳湯空心
取水加甘遂半錢在藥內利三五次又當
之大凡治腫三日兩日又一取之取三二次水必去
矣續用匀氣藥調理治腫之法無出此也匀氣之藥或
烏沉湯匀氣內去甘草用之緣取腫藥內中有甘遂蓋
甘遂返之故也此藥先不若濃煎燈心一本通湯點服爲
妙不要甘遂從小便下甚穩更量虛實用之大要看尺
脉腫盛而尺脉如絲或浮接之無根者皆不可下此
死脉也外臺云脉大者生小者死叔和云水氣浮大得

白朮　白茯苓
丁香　沉香

延生沉細應當是死別
過氣丸治脾腎氣虛腎水流溢四肢作腫
大蒜五枚去皮磨附子臍壹枚大者作塊去
右三味同於沙鍋內用水五升煮乾爲度水三升漸添
至五升只取附子爲末餘不用却入后藥
白花商陸根一兩半沉香貳錢
右件同附子用薏苡仁末煮糊爲丸如梧桐子大每服
五十丸薏苡仁湯下空心日進三服其効如神
穀神嘉禾散治一切腫喘煎下黑錫丹臨卧服
沉香降氣湯治腫喘每覺氣自小腹衝上便眠卧不安用
局方沉香降氣湯吞下局方尚香丸后來用八味丸與
安腎丸消風散合拌丸用四物湯下

木香叁錢
車前子貳錢半
赤小豆揀伍兩

平胃散治腫病不進飲食候清汁煎平胃散
蘿蔔子壹盞白水煎蘿蔔子汁一盞加薑棗煎至七分
右每服貳錢所以煎蘿蔔子汁一盞加薑棗煎至七分
仍入蘿蔔一捻同煎服此方屢有効

胃苓丸治腫
平胃散　五苓散
右各一貼用大蒜蒸熟九胃苓一藥五十丸煎木通湯
吞下

野雞餛飩法治腹腫
野雞雄不問雌壹隻陳皮　茴香炒　生薑
馬芹子　川椒炒
右用葱醋浸一宿蒸餅和雞肉同作料爲餡少着塩外

用麪皮包作餛飩煮熟爛食
後喫餛飩飽又先早晨服嘉
却用前件料物調和野雞肉
川獨活去巴豆炒用巴豆
右碾爲細末煮精猪肉薤藥盛行
治酒遍身黃腫方
五靈脂壹兩
右爲末入麝香少許研勻飯圓小豆大每服十九用米
獨勝散治水氣腫脹大理孫評事傳一家專賃此藥盛行
味塌氣丸醴泉梁國佐方
加料五加皮散治水腫

先用五加皮飲加澤瀉姜棗煎先服三服次用大戟
甘遂等分為末麪糊為圓如彈子大用樟柳桑白皮
豆濃煎湯細嚼空心下
有老人足脛微腫脾胃虛弱泄瀉吐食調脾補胃略無寸
效用三和散而愈後服復元丹兼補脾氣連自利三
日其病脫然蓋復元丹專治脾胃虛弱而致腫者
紅丸子治一切飲食不化氣滿膨脹
紅丸子貳拾粒去殼
右用橘皮湯送下拘時如神
縮砂飲治氣脹氣壅等病
縮砂仁壹箇炒乾白豆蔻子壹箇研自然汁浸縮砂仁壹宿炒乾又浸數次炒乾
羅青子炒不厭盡為細末每服一大錢米飲調下

(橘蒜丸)治心腹痞脹

大蒜(搗)橘紅(去白)右用蒜搗成膏入橘紅末和丸梧桐子大每服三五十丸米飲下

(大蒜湯)煨熟研和為丸米飲薑湯下(海上方)以陳皮包

○痰飲

痰飲評

人之一身無非血氣周流痰亦隨之夫痰者津液之異名流行於上下者爲精液其所以使之流行於上下者爲痰飲散周於肌膚大抵氣滯則痰滯氣行則痰行故三生飲(無有不效)人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰患一失其宜則氣道閉塞停飲聚於膈上結而成痰其爲端爲欬爲癰爲嘔爲眩暈爲風癇爲狂迷爲忪悸或吞酸或短氣或痞隔或腫脹或寒熱或疼痛其證不一假如頭風證眉稜耳角俱痛治以風則

痰飲(附)咳嗽——喘

不効治以痰則收功又如飲酒之人有時臂痛或痺治以二陳湯白元子消飲九無不作効療痰之上和胃次之故治痰多用半夏蓋半夏性利以其能利痰飲醫者當以意療詳加審問焉

玉壺圓治一切痰飲

大半夏貳拾伍兩 雪白南星壹拾伍兩

右二件用野外地上清潔水滿滿浸逐日換水浸十日將半夏切作兩片南星大者切作六片中者作四片再用井水浸須令水滿只以此水浸伍兩研細末生(白礬壹兩添半)則亦添礬却用井水浸五日足每伍兩研細末生(白礬壹兩添半)夏南星(

兩入全蝎半筒炒白附子貳錢半爲末炒
和勻用炊餅乾末叁兩半用生薑半斤研取自然汁煮
炊餅末和爲元如梧桐子大或乾添些白湯爲元每服
二三十元隨意嚥下亦可此藥不問是何證候痰涎作
壅或有異證風證小兒驚癇之類應手而愈多服之勿
妨勿拘二三十元之說以意求無痰證嚥下皆可無
病人準此治痰飲

半夏湯 生薑半斤 白皂角貳定

南星 半夏各肆兩

右以白水淹過得藥一寸許同煮乾仍用溫水浴過剉
片日乾爲末入丁香縮砂各半兩甘草壹兩半再入熟
粟米粉半升空心沸湯點服顏上羅監務方

煮浮圓治痰壅眩運

南星生　半夏生　防風　天麻　麵生

右等分滴水為丸如梧子大先煮湯令沸滾方下藥四五十丸煮一二滾藥浮即漉出用薑湯吞下不拘時

玉浮圓治痰吐頭痛極妙

南星皮削去　半夏錢洛半壹　陳皮去白　白朮

右件各生為末用生薑自然汁元如梧子大用滾湯煮熟次用煮藥現成湯加生薑自然汁下二十元不拘時候隨多少拌勻生薑皮膾

梧桐子大每服壹錢

附子去皮臍各壹

玉液湯治痰疾　趙魯公方

半夏用揀好者不拘多少湯洗白淨切作片如紙薄用

右每服半兩水二大盞薑三十片慢火煎至七分濃磨
沉香水一茶脚傾入藥內再煎兩沸食後臨臥時服

白朮圓 治濕痰飲以久服多服而後效

白朮 捌兩 半夏湯洗次泡 赤茯苓去皮 乾薑
肉桂去皮 枳殼麩炒 各貳兩

右爲細末生薑自然汁煮麪糊爲圓如梧桐子大服多
至二百元日三服

參苓散 治停痰宿飲自吐出痰後心胃間氣虛氣滿不食

伏苓 人參 各叁兩 白朮 各叁兩 枳實麩炒貳兩

右㕮咀姜棗煎空心溫服 新增

橘皮半兩

靈砂白圓子 治元氣虛弱痰氣上攻風痰潮塞噁吐不止

靈砂研細 青州白圓子各壹兩爲末二味勻以生
姜汁煮秫米糊貟如梧子大生

右每服二十圓空心用人參湯或棗湯下新增

○吃人嗽 附 喘

加減三拗湯（治傷風咳嗽

麻黃（半錢不去節沸湯洗焙乾去毛）　杏仁（不去皮尖炒去皮）各貳錢

甘草（生）　旋覆花各半錢

右㕮咀每服一大錢水一盞生薑一片五味子數粒竹葉一片不可多糯米數粒煎至半盞分作兩服食後溫服梁國佐傳

二妙丹（治男子婦人因思慮之極喘滿痰涎作聲

生薑汁調蘇合香元（仍用二陳湯加枳殼木香煎調

蘇合香元（下養正丹五十粒梁國佐取效方

杏仁湯治積年嗽

阿膠拌粉炒罌粟殼蜜炙白礬飛過 十

右等分四味爲末三大錢水一盞薑三片杏仁去皮尖
三寸許煎六分臨卧時卧少頃喚醒始服此藥

半夏湯治嗽

半夏貳拾壹箇每箇
切作拾四塊燈心
一束

右爲麁末水兩椀煎一椀服

皂角壹寸燈無虫
蛀者去皮

甘草壹寸燈

二服散治暴嗽

阿膠貳片 生薑拾片 大烏梅貳介 甘草壹錢

右用水一椀煎至六分去滓服臨卧

紫蘇拾葉 杏仁去皮尖 大半夏三個泡
去滑皮薑二箇

罌粟殼炙二箇

治肺熱久嗽方

枇杷葉　木通　款冬花　桑白皮各等　大黃減半　紫菀

杏仁

右如常製爲末蜜丸櫻桃大食後夜卧含化

有婦人患肺熱久嗽身如炙肌將成肺勞服之未終劑而愈本草衍義

麥門湯治男子婦人一切虛證冷嗽

人參　甘草炙　白朮

白茯苓　北芍藥

白豆蔻仁炒　當歸酒浸焙

黃耆蜜炙　肉桂去皮各半兩　櫻粟殼蜜炙一兩　五味子各壹兩

右㕮咀每服三錢生薑三片棗兩枚水一盞半煎至八分空心服湘中黃應明三世用之有効

杏仁煎治燥咳嗽失音不出

杏仁去皮尖生薑汁研叁兩 桑白皮 木通 蜜 砂糖各壹兩 貝母壹分 紫菀

五味子為對散用水三升煎至半通貝母紫菀五味子各壹兩

右將木通貝母杏仁砂糖蜜薑汁再煎成稀膏每服挑一二匙頭含化更加梨汁尤好

石夏圓治痰嗽鄂渚孟少師府方

半夏壹兩泡滑石壹兩火煅去火毒

右生薑糊為丸如梧桐子大不拘多少白湯調下

南星末治痰疾咳嗽許六五郎方曾用暨李夫人見効速

大南星壹兩剉成片用生薑半斤取汁煮半日晒乾却剉入蜜半斤炒黃色取出文火焙乾為末

右入貝母末半兩每用放掌心以舌尖點燕下

阿膠散治痰嗽氣滿甚有神效

阿膠麪炒　甘草炙　桔梗　紫蘇子

杏仁各壹兩　南木香貳錢半　白膠香四兩

五味子各半兩　罌粟殼四兩　炙晉礬飛過半兩

右㕮咀內杏仁每服煨七粒去皮尖嚼爛煎藥燕下臨

臥服

鍾乳粉　人參　阿膠炒

鍾乳散治寒嗽不止

鍾乳粉等分為末糯米飲下

五味子湯治寒嗽益肺

五味子　胡桃肉各壹兩半生薑伍兩去皮　甘草

杏仁各壹兩

右將五味子四味於鉢中爛研如泥同甘草末再研令得所入磁合中取沸湯調服加(人參尤妙)

(葶藶湯)治肺壅氣喘急不得卧

葶藶子炒 參兩

右一味大棗三十枚水二升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服神効出本草

(出聲散)治肺損失音

訶子肆箇生用炮兩箇

甘草貳寸炮貳寸生 桔梗壹兩

右㕮咀每服二錢用童子小便一盞和藥煎五七沸溫服二錢白湯調下出雞峯方

(金露飲)平順肺氣過五服出十分全方

右為細末每服二錢白湯調下出雞峯方

人參　白朮
五味子各參錢　甘草壹錢
（胡桃散）治咳嗽
生薑貳錢　人參四錢　胡桃二寸作二段　胡桃去殼
右以夜則含在口中立效名醫何元弼傳出夷堅志
海藻散）治咳嗽胷中不利痞滿短氣心中時悸手足煩不
飲食時惡寒
海藻　赤茯苓
半夏　北細辛
杏仁各叁錢半
（治熱嗽方）熱嗽痰濃鼻熱腥氣飲冷水而暫止者宜以
小柴胡湯治之
治冷嗽方）寒嗽痰薄呷熱湯暫止者宜理中湯（加五味子）

（赤茯苓湯）治停飲於胃怔忡不已蜀醫蒲氏方

赤茯苓去皮半夏泡 茯神去木 陳皮
麥子各壹兩 沉香
右㕮咀每服三錢水一盞薑五片煎七分空心服取効
甘草 檳榔各半兩

（三聖飲）治痰嗽

石梗用白合子根 甘草 貝母薑汁炒
一伏時

右等分細末熱酒調服如作㕮咀則用薑煎亦可蕭行之方

（人參飲子）治寒壅痰嗽

人參 苦梗 赤伏苓各壹兩 枳殼炒 甘草各半兩
半夏曲 五味子

右㕮咀每服三錢水盞半薑五片煎七分空心服寒暑之交氣盛人衣厚作蹇忽痰盛微發熱此藥最宜若作

感冒發汗攻邪必成大病此方佳處乃在赤芩導心
熱枳殼疎肺壅故易作效載治未病方
(神効散)治一切喘嗽
用皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆肉壹粒線繫定
童子小便浸一宿火上炙令焦黃去巴豆不用或入壹
貳粒亦不妨却以杏仁半夏各一合入麻油少許內煎令拆
裂爲度同爲細末每服一字乾柿點藥細嚼或用白糖
點喫亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應食物妙不可言
(紫苑湯)治痰嗽喘急出傳信方
紫苑茸 百部半兩 款冬花壹兩
右爲末每服二錢薑三片烏梅一箇煎一二沸食後服
洗心散)治心熱胃膈滿咽乾咳嗽方見

○喘

喘有冷熱方論

人有喘疾不可一槩治之須分陰陽病發於冬寒冷病也病發於暑月熱病也冷病服青杏蛤蚧元(或霜元)清中湯(暑)肺散()熱病服青杏蛤蚧元之類孫大資(梓朴湯)不拘冷熱皆可服

水喘方論

有人先因咳嗽發喘胃膈注悶難於倒頭氣上湊者宜早利水道化痰下氣若不早治必成水喘宜服紫金丹(病人水在膜外切不可鍼鍼透膜初時稍愈再來即不可治)玉(湘鄉何元弼)方

葶藶半兩(水一盞半煎不用姜)白朮 茯苓

木香各壹錢甘草
(疎鑒飲子)下氣定喘道泉消腫
人參　木通　半夏泡茶次浸紫蘇子錢各貳
草果仁　木瓜　赤伏苓連皮　秦艽　橘紅各壹兩厚朴壹兩半
杏仁　半夏　附子炮　檳榔
木香　甘草各半兩
右㕮咀每服半兩水一盞半生薑七片煎至八分去滓
不拘時候南康嚴子禮方
(劉散五味子)治肺寒理喘下氣
五味子　甘草半兩　乾薑半兩　官桂
陳皮叁錢
茯苓
右㕮咀每服半兩水一盞煎六分去滓服

八寶丹（治痰實發喘朱佐方）

雄黃　雌黃　朱砂　信砒（並生用飛過）　白礬（豪豆粉生）　皂角（炙去黑皮）　黑豆（生）　巴豆（去油各壹錢）

右爲細末煮糊丸如豪豆大磨刀水下一丸至三丸

（加減滲濕湯）

先用（靈砂合來復丹）服若只單服靈砂則秘合服則通次用後藥

嫩蒼朮（炒）叁錢　白朮（叁錢）　赤伏苓肆錢　丁香

縮砂仁　木瓜　神曲　綿薑

厚朴（製炒）各叁錢　甘草（貳錢半）

陳皮　草果

右前藥改咀薑棗煎　廣端明得喘疾醫下痰疎導之

藥引客邪入腎經而兩足并外腎發腫有
虛用此則大小便自流利
定喘湯治證非感外邪而得緣小年喫冷
物太過用分心氣飲下黑錫丹極有神效
養氣丹治男子婦人氣喘
右煎蘇子降氣湯下養氣丹
鯽魚圓治水氣浮腫
用鯽魚重壹斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開一孔
入信石壹塊重壹錢令深入在內却以魚
以青蒿搗泥固濟候乾火煅竹筒通紅候冷出泥取魚
去燒不過者研細入蚌粉三錢研得所研圓如豪豆大
朱砂爲衣每服四圓或五六圓砂糖冷水下臨卧服之

服後忌熱物炒甚

(棗杏圓)治出熱喘

大棗伍拾箇去核　葶藶熬黃者貳兩微炒　杏仁貳兩去皮尖

右搥細研取棗肉研成膏爲圓如梧桐子大每服三十圓

桑肉皮湯下當令人大便鴨湯亦不妨

(黃牛散)治肺熱脉滑大氣急喘滿

大黃壹兩　白犛牛貳兩

右爲末蜜水調二錢立止又用皂角膏爲圓亦可

(麥花散)治肺氣脹實喘急胷滿

大麥麵　芫花醋浸壹宿炒

右等分爲末每服一錢枳枝煎湯調服食後

類編朱氏集驗醫方卷之五

湘楚 朱 佐 君輔

○積聚 附 祕結 瀉痢 腸風 痔漏

黑丸子治長幼積滯湘中黃伯材方

烏梅參箇去核焙乾 生半夏大者伍粒去皮 杏仁伍粒去皮尖炒 巴豆貳拾粒去油存性

右爲細末醋糊爲丸如菉豆大每服十九至二十九

遇仙丹去白治吳茱萸洗一石萬病

陳皮五靈脂 胡椒各半兩

半夏湯泡次泡 白朮

班猫貳拾壹箇去翅足同糯米同巴炒 巴豆貳拾壹粒去殼同班壹粒炒去

右爲細末醋糊爲丸如菉豆大每服十九熟水下或薑

湯下

馬家五積丸治諸般積聚

縮砂仁　紅豆　黑牽牛　蘿蔔子

赤小豆　下皮　令已上各壹兩同炒香熟不可焦

陳皮　香附子　乾漆　京三棱

右件共爲細末如碾時餘得藥頭再炒令黑色再碾爲

末以好醋煮麪糊爲丸如綠豆大淡薑湯下無時候

三稜丸化積聚去米麪五穀等積

枳殼　桔梗　枳殼慢火炒令黑色

陳倉米　壹兩巴豆新者五粒去殼同倉米慢火炒巴豆焦色去巴不用　陳皮　去穰壹兩

半夏　半兩　縮砂仁　麥蘗各貳錢　南木香壹錢

右爲末補面糊爲元豪豆大每服十元加至二十元食

後薑湯下

(食藥三稜圓化飲食積聚

陳倉米肆兩揀淨以新好色巴豆貳拾壹粒剝去殼慢火同炒候米香熟黃色巴豆黑色去巴豆

橘紅肆兩去烏梅肉半兩炒乾縮砂仁壹兩細末用神曲麥糊爲丸如豪豆大每服二十丸

薑湯下

○秘結 附大小便秘

(南木香丸)治大便秘結

南木香不見火檳榔

右等分先將枳殼去瓤每箇切作四片用麻仁不蛀皂角三寸生薑五片巴豆叁粒略搥碎不去殼用水一盞將枳

殼同煮令和亥濾去生薑巴豆皂角並不用只將枳殼細
剉焙乾碾爲末入前木香檳榔麻仁同爲末煉蜜爲丸
驅風丸治大便不通或年高風秘
皂角挼水浸炙去皮弦炮巴豆去皮心研膩粒
右以皂角挼水煮乾爲度去巴豆不用炒枳殼壹兩
木香半兩蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心白湯下
蔥白散治老人大便不通
蔥白壹條 阿膠壹片
右將蔥以水煎候蔥熟不用入阿膠溶開溫服
琥珀散老人小便不通
琥珀研如粉不拘多少

右蜜爲丸梧桐子大每服十元煎赤茯苓湯下甚者加九數立通

治老人小便秘澁不通如小便純血只以末一錢煎燈心湯下

茴香　白頭地龍

右杵汁傾臍腹中即愈

利氣散　治老人小便秘澁不通

綿黃耆　陳皮　甘草

右等分爲末水煎自然通

治小便不通塞上心痛

五苓散　一貼生薑自然汁半盞調一方寸匕用燈心（山茵

陳煎湯調服

調氣散　治老人大小便不通

生薑半兩　葱一莖并根葉泥塩壹撮

右四味搗爛安臍中良久即通

輕粉散　治大小便秘

用大棗拾枚去用（真輕粉）一匣每一个入粉少許合住用盞子盛紙覆之煮湯餑上蒸熟細嚼白湯下虛者不宜用

潤腸圓　治大腸風結氣澁

肥皂角伍片去皮及子　伍片醋炙焦生用去皮

右二味共為末五片水壹升揉取濃汁濾過子

慢火炒銀石器中成膏子入後藥

檳榔壹分　青橘皮去瓤分

右四味為末和前皂角膏搜和成劑

看得所後如硬入少蜜圓如梧桐子大每

南木香壹分

白梓

心温熟水下

治閉結并脚氣方（新增）

大螺以塩七和穀生搥碎置病者臍下寬帛繫之即通

餧醫熊彦誠年五十五歲病前後便溲不通五日腹脹如鼓同道革環視皆不能措力與西湖妙果僧慧月相善致訣別月驚馳往過釣橋逢一異客風姿瀟遣信邀致訣別月驚馳往過釣橋逢一異客風姿瀟洒出塵揖之曰方外高士何子子走趨如此月曰一善友久患閉結勢不可療急欲往問容曰此易事也待奉施一藥即脫鞋入水採一大螺而出曰事濟矣特抵其家以塩七和穀生搥碎置病者臍下一寸三分用寬帛已病者臍下一寸三分用寬帛緊繫之仍辨觸器以須其通月未深以爲然姑異謝之緊繫之仍辨觸器以須其通月未深以爲然姑異謝之熊昏不知人事妻子聚泣諸醫知無他策還以試之曾

未安席者然暴下醫愧歎而散月歸訪異人
熊後十六年乃終白石童守約以脚氣攻注
之搥數螺傳兩股上便覺冷氣趍下至足飢而亦安

○瀉利

附泄瀉

至聖保命丹治赤白痢書夜無度

真麻油參兩　巴豆玖拾箇　黄丹貳兩　黄蠟肆兩

右件先將麻油同巴豆用銀鍋慢火熬成色如炒炭黑
色去巴豆不用次黄丹煎數沸再入黄蠟熬令色黑滴
入水中成寳為度每服一錢重半錢旋丸如菉豆大空
心赤痢甘草湯下赤白痢乾薑湯下赤白痢乾姜甘草煎
湯下

蘇感丸　治積滞痰涎不進飲神効

蘇合香丸　感應丸

右二味和合丸如豪豆大每服二三十丸薑湯吞下

（一聖散）治下痢赤白或小便不利淋澁痛

罌粟殻去蔕蓋洗炒黄色

車前子　炒

右等分爲細末每服二錢米飲下

（乳香散）治一切赤白痢或雜色等痢及水瀉

乳香　貳錢　甘草　肆錢

罌粟殻拾箇去蔕蓋筋膜令浄蜜炙

草果子　炮　兩箇

右爲中細末將乳香入乳鉢内勻三味每服二錢水一盞入飯四五十粒煎至六分無時服立有神效

（御米丸）治一切瀉痢

肉豆蔻　一枚
石蓮肉　呵子　白茯苓　白朮各壹兩
右爲末水糊爲丸每服三十五十九米飲下如血痢減豆蔻白朮加當歸罌粟殼（又方）治老人下痢赤白雜色服胃風湯取効
（金粟湯）治痢　當歸各半兩罌粟殼壹兩蜜炙乳香叁錢
車前子炒　陳皮　甘草半兩
罌粟殼蜜炙去穰各四兩
右吹咀每服三大錢水一盞生姜三片棗一枚煎七分
（百靈散）治赤白痢　去穰蒂用
罌粟殼去穰蒂用好醋炒　陳皮去穰　木通

烏梅 車前子 甘草 黄連
右等分㕮咀每服三大錢水一盞八分生薑三片棗一
枚煎八分不拘時服如腹痛加芍藥忌酒麪雞魚一切
毒物
治痢諸方 赤熱白寒因暑而得先進五苓散一服
澤蘭散 以五月五日造青嵩真艾葉微炒川中
澤蘭葉 謂之筍苗
萬豉 米囊皮 姜汁或炙去膜 甘草炮
右一服水盞半煎再錬赤加黄連白加乾薑
黄連丸 治伏熱瀉痢不止用香需湯下即愈
田監簿方
酒蒸黄連丸用香需湯下即愈
瓜蔞散 治五色痢疾久不愈者

瓜蔞壹箇黃色者以炭火煅存性用楓
右研爲細末作一服用温酒調服　胡大卿
痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈
煨鯽魚去腸肚入白礬一大豆許同煨熟
鯽魚一箇下礬醋喫不過兩枚與痢俱效
戊己丸　治赤白痢
黃連去鬚酒浸好
入芩連（甘草）
真吳茱萸洗川中者湯
右等分米糊爲丸空心
白痢茱萸生薑湯
肉果散　治赤白痢
肉果　木香　陳皮　甘草各叁錢
米煮囊皮灸

右細末分八服白者米湯赤者白湯

木香散 用黄連水者火至乾去薄切焙

南木香 黄連取本香薄切焙

右爲末作三服一炙甘草湯下三一陳皮湯下三米飲下

黄連散 治血痢 以上數方順慶朱承事家施人無不効者

黄連一味剉碎用無灰酒煎至七分温服

薑茶丸 止休息痢大効

乾薑 炮 建茶各壹兩

右以烏梅取肉丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下

地榆散 治諸般痢 地榆專治血痢

右細末鹽米飲調下

甘草

治諸色瀉劑方 蜀醫本

夏月臟氣不和而瀉宜以香薷湯調胃苓散

若有裏急後重宜進風湯加枳殼仍以麪炒去穰

若有積滯宜進蘇感丸

若水瀉宜進蒸黃連丸

車前散 治水瀉

車前子 炒 右每服二錢熱米飲下空心

固腸丸 治泄瀉三山曾太醫經驗

附子 炮去皮 乾薑 炮半兩 白茯苓 去黑皮 大黃連 去鬚打碎 各半兩

木香 切片 右水二椀煮干瞻爲末麪糊丸梧子大每服百粒米飲下

秉肉丸 治泄瀉兼治腎泄五更瀉泄是也

破故紙 肆兩 木香 壹兩 肉豆蔻 貳兩 煨

右細末燈心煮淮棗去皮核和丸如梧子大每服三十五

十九人參薑湯下食稍空或午前鹽酒鹽湯下(五苓散與理中丸同煎服或以五苓散下理中丸亦治大便虛滑不禁方)

(二宜丸治泄瀉)

五苓散與理中丸同煎服或以五苓散下理中丸亦好二方並載梁氏總要方

香葺丸治日久冷瀉

右爲細末陳米飯丸每服五十丸空心米飲下

豆附散專治脾弱泄瀉不止

大肉豆蔻參茴麵裹煨附子捌錢重者每個作兩片炮去皮臍各參

右件咬咀分作三服水一盞半薑五片煎八分去滓温

平胃散水煎不着薑棗入大理中丸同煎化服便住
(肚蒜丸)治水洩一丁必卿云渠每遇五更必水洩一次百
藥無効服此遂安
獭猪肚一枚淨洗去脂膜入大蒜在內以脚縛爛爲度杵成膏子
度自晨至晚以肚蒜丸如梧桐子大每服三五十丸塩湯或米飲空
猪肚丸治臟寒洩瀉先用厚朴附子二味姜棗煎早晨服
同杵丸如梧桐子大每服三五十丸塩湯或米飲空
心下
猪肚丸治
此猪肚丸
川烏炮　附子炮各肆兩　乾薑炮　肉豆蔻煨　蓽撥　白朮
厚朴二兩半　良薑炒　丁香　桂心各一兩
禹餘粮火煅醋淬　縮砂仁

右爲細末用猪肚一隻洗淨洗以川椒一兩去目閙香
壹兩大蒜貳兩入猪肚內用線縫定酒醋煮爛取出川
椒閙香大蒜焙乾爲末和前藥以猪肚子杵和得所
爲丸如梧桐大每服五六十丸空心米飲下

腸風

枳殼湯治遠年近日腸風下血

枳殼 羊脛灰爲末

右枳殼末五錢羊脛灰末三錢和勻用濃米飲一中盞
調下空心服五更初一服知人行五里再服見效

又方枳殼半斤麵炒去穰

右爲末無時常湯調貳錢若難服以麵糊爲丸湯吞下

綿黃芪洗

三五十九即愈

芍藥九治酒毒下血

芍藥 炒　白雞冠花 炒　陳槐花

右等分同炒令紫色不得過黑去茉黃以黃連一

黃連九治腸風下血　　茉黃

右各等分同炒令紫色不得過黑去茉黃只以黃連一

味軟飯九如梧桐子大空心米飲下三五十九日一服

更以胃風湯煎如法吞下

如聖散治腸風下血等疾

右等分爲細末每服二錢空心温酒調下

單方治腸風下血或酒痢亦治

大烏梅十个不去仁用火炒令焦右爲末用空心酒調下二服立效

用藥未喫粥盡爲度

橡斗散治便血

橡斗子壹合內以生硫黃合之紙裹煅存性候冷研空心酒調下二服立效

洗心散治血痢趙侍郎方

洗心散

右細研空心酒調下二錢

有一試官入院偶感血痢間有赤白極危一醫人用此藥數服而愈

黃連飲治血痢　胡黃連

烏梅肉

右等分爲末臘茶清調下空心温服

(聚珍丸)治血痢酒痢尤妙

川百藥煎半兩薄荷煎兩貼陳槐花炒半兩

感應丸壹貼麝香少許

右件拌勻添蜜爲丸男子龍牙草煎湯下女人生地黄

煎湯下

(又方)黄連壹兩白附子半兩生用刺蝟皮煅壹箇厚朴參錢

白礬煅五倍子枳殼各半兩

右件爲細末文醋湯爲丸男子敗棬灰調酒女人綿子

(灰)調酒下

(柏葉飲)治便血

川百藥煎炒黄荆子炒柏葉水煮用入白礬乾

右各等分入乳香末濃米飲下兩服見效

當歸九治一切大便下血

當歸　芍藥炒　白雞冠花炒　陳棯花炒
右等分爲細末青蒿根煮汁爲丸米飲送下

四神丸治一切大便下血

香白芷　枳殼燒存性　川巴藥煎燒烏梅並存性
右等分爲末糊爲丸每服五十丸空心米飲下熟水亦得

○五痔

荊芥散洗熏痔疾

荊芥　熟艾　木鼈子去殼各半兩　寒水石煅各
右㕮咀每服用半兩入楊葉四十九皮同煎令香熟去

以有蓋桶子於蓋子上開口傾藥汁在內乘熱薰稍温
則以手洗水略略洗之仍留
又方荆芥水洗用明礬爲末以米醋調時復自手指調塗
然不可太多後用橘葉炒乾去水氣煎湯熏洗便好二
方吉州儒醫范伯英傳
熊膽膏治久年痔疾
熊膽一味塗之瘡上神效
又方治痔疾有頭如雞冠者
黄連末傅之即效更加赤小豆尤佳
石膏熟艾散重痔疾
木鼈子去殼 熟艾 各等分
右㕮咀每半兩水三升橘葉五七十皮同
軟石膏煅半
入瓶中渾

令香熟却用小口酒壺盛藥坐其口上熏之如藥稍温
略略洗之無時候其藥汁可作兩日用
木鼈散治痔不以内外洗藥
木鼈子去殼 地骨皮 紫金皮 當歸 枳殼半兩
右用黑豆三合先以豆煮軟水五升煎至四升去滓乘
熱熏洗(一方加樟木皮葉一方有橘葉皆有效)
厚朴丸治痔
厚朴 生薑 陳皮洛伍兩切片水兩 白朮
麥孽炒 神曲 各炒 乙兩
右細末麵糊為丸空心米飲下三五十丸 同煮乾焙之
三妙散治痔 四君子湯 黄耆建中湯
右各一貼加白扁豆三縮砂仁同煎何殿機企頽妙方

血竭散治痔漏痛不可忍真血竭細末用自津唾調塗

黄芪四君湯治五痔下血

四君湯加黄芪白扁豆薑棗煎服細末尤佳

又方楓槭核細末陳米飲調二錢服

平腸丸治脫肛痔

一石灰炒熟入熱湯内熏痔候湯温洗數次却服沉香

單方治諸般痔并脫肛

流氣飲吞弔腸丸廬陵姚伯源用之有效

白礬飛過用童子小便調以雞毛拂上一日愈三日

劉寄奴湯治痔疾

劉寄奴

除根終身不再作亦不忌口

五倍子

右等分研爲細末空心酒下仍用其末傳乳上逐愈

(墨雪膏)治痔頭熱腫痛不可忍睡卧不安趙尚書方

蜒蚰虫壹箇　脳子乙撮

右件放在硯上用京墨同磨成水塗上隨手無事

(又方)丁香叁粒　脳子壹錢　黄栢皮不拘多少

右爲末津液調塗上

(倍香膏)治痔疾

五倍子　牲硝存　乳香少許

右爲末用津液調少許揉痔上其疼立止

(治血痔)方

端午日採蹲躅者良用新沙鍍約盛得一升水先以花

內入水約八分許將皮紙蜜糊慢火久煎臨疾作時和

瓶置之桶内以手指黙
蝸牛膏治痔
蝸牛壹枚　麝香
右用小砂合子盛蝸牛以麝香糁之次早取汁塗妙
新增
類編朱氏集驗醫方卷之六

黃疸

附 生失血 淋閉

五疸評

評曰疸之證有五曰黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸者是也古方叙五種黃病者其實則一(治一切發黃方)三山曾太丞方

右等分用燈心煎服不拘時候

(單方)治黃疸身眼黃如金色不可使婦人雞犬見

川練肉 麥門冬 山枝子 甘草

右以水一大升煎取一小升適温空腹頓服後三五日

其黃離如薄雨散最後堅
時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲身黃後可時
魚等肉此徐之才家秘方
又方治黃疸先用溫白丸痢動三兩次次用黑
後服五苓散倍加豬苓山梔茵陳湯點服如嘉禾散五服
滴水爲丸元不問溫酒皆可服其病須服此藥稍多方愈
黃芪散治黃汗
黃芪一兩 赤芍藥 茵陳各貳兩 石膏肆兩
麥門冬去心 豉各壹兩 甘草炙
右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫
治傷寒
發黃

五苓散加山茵陳煎服

○吐失血

附 折傷瘀血

失血評

評曰血爲榮氣爲衛心生血肝臟血肺主氣榮衛調和則氣血流轉決無壅滯之虞其或六氣有傷七情鬱結氣滯經絡則血行失度故有吐衄之患焉夫失血之證有三一曰內衄二曰肺疽三曰傷胃此證未有不因熱而發蓋血遇熱則溢血氣俱熱則血與氣壅故發爲吐衄也又有感胃得汗後邪氣未解鬱乾經絡隨氣勇泄發而爲吐衄者有之又有飲酒傷胃遂成嘔吐物與氣上腹痛自汗發爲吐衄肺傷則唾

血或有折傷吐血治之各有方法

單方治吐血咯血不止

白芨 研爲末粥飲調服

台州獄吏憫一大囚將死顧照顧之因感語之吾七次
犯死罪盡力杭諱苦遭訊拷坐是肺皆擠損至於嘔血
適得一藥每用其效如神荷君庇拊之恩特以報只
白芨一味米飲調餌其後凌遲劊者剖其胷見肺間竅
穴數十處皆白芨補填之色猶不變也洪貫之聞其說
爲郢州長壽宰規之赴洋川任一卒忽苦咯血勢絶危
貫之用此救之一日而止癸志

又方用新汲冷水調真蒲黃服見効胡荊參方本草用温温下

又方治咯血烏梅不以多少煎湯調白皷霜一服愈

右爲末每服二錢煎黃芪湯下

藥皮湯(通)治血常失道暴出色鮮煩躁引飲

大栢皮　梔子各壹兩　甘草半兩

右㕮咀每服五錢用水二盞煎至一盞去滓温服

(地)黃煎治心經火熱脉洪數或吐或衄

生地黃汁半斤

大黃末壹兩

右將地黃汁熬乾一半入大黃末熬可圓如梧桐子大

以熟水五圓食後米止加自十圓

(地)黃煎治咯血嘔血嗽血

生地黃汁沉水捞取貳升

人參壹兩爲細末　阿膠壹兩微炒爲末

生藕取汁壹升　生薑肆兩自然汁取

右先將地黃生薑汁同阿膠末入石器内慢火熬成

稍稠即入參末熬少時方入真酥熬攪勻稀稠得所每
服一彈子大早晨日中臨臥含津嚥或以麥門冬湯化
亦得

又方治咳嗽吐紅不止

烏雞子清以手磨成水須磨千百次自然化成水然後用
右每服入參二錢重調勻約五更服服藥時不得語仰
咬下自然覺心肺俱涼滿口津液如無烏雞子亦得終
不及烏雞子如此哭月十日未有不効者

單方治嗽血咳血

用小兒胎髮燒灰麝香酒調下每箇小兒胎髮作一服
婦人病用男子胎髮男子病用女胎髮

又方治吐血失血後應男子失血勞疾後

用婦人初生男子胎衣以長流水直是不住洗去惡血待清汁出方妙以酒煮直待爛為度却不用鐵器煮止用瓶鉢之類俟其爛取去杵爛如泥次入參茯苓當歸元两又杵元如梧桐子大每服百十九米飲或酒下或用人參湯於中更加茯苓當歸元妙云服時有些逆人愚見加少麝香於中尤妙並宋佐參香丸治咳嗽吐紅

辰砂　人參　乳香

右三味等分用烏梅肉為元麥門冬湯下京口朱醫方

葉本湯治男子咳嗽吐紅不止梁時發方極有功効

葉本貳兩　青皮　陳皮　罌粟殼各壹兩

右五味不犯鐵器杵爛用瓦瓶煮久煮為妙食後服

二神湯治吐血絶妙治男子婦人吐紅之疾蓋是久病或作急勞損其榮衛壅滯氣上生地黃等涼劑治之必求其死矣每遇患者用藥甚簡

甘草炙　乾薑炮　等分

右爲末每服二錢水一中盞煎至五七沸帶熱呷空心意以九治痰吐臭穢及咯血自然安痊不可不知

意以仁壹兩生薑半斤切小塊

右件將手帕裹飯上蒸以米熟爲度生薑不用却以麥門冬(二件去心)生地黃(各叁兩爲一劑搥取自然汁入生蜜(人參末各壹兩打和入(意以仁)煮乾每服

地黃丸治吐血遍服藥不効者

生地黃 壹斤研取汁其滓再
附子 壹兩炮去皮臍切片子地黃汁
入壹斤淨洗細
好酒少許煎
取汁令盡
用銀器熬成膏取出附子焙乾

右以山藥參兩爲末以地黃膏子和成劑丸如梧桐子
大每服三十九米飲空心服

六一散治咯血發寒熱

黃芪 羵羵兩 甘草 壹兩炙

右細末如常服點不拘早晚乾喫亦得

治氣而嘔血方

五膈寬中散下(理中九)蓋白薑能止血也

固榮散治吐血三山魯太丞方

甘草半兩 滑石肆兩

右細末每服五大錢溫酒調下次用後藥

震靈丹貳九　黑錫丹貳拾養正丹拾九來復丹參拾九

右件作一服用湯使隨意下　四方總要方出梁代

治勞心吐血方親用見効

蓮子心柒箇　糯米貳拾壹粒

右爲細末病方

犀角地黃湯　出治傷風汗下不解贊乾經絡隨氣湯滅爲衂或清道閉流入胃脘吐出清血及鼻衂吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角鏤層　生地黃　白芍藥　牡丹皮

右等分咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓温服狂者加黃蓉大黃其人脉大而遲腹滿但依

本方不須加減

治衄血方

山梔子燒灰存性爲末酒趙無疵其兄衄血甚已死
蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄衄血甚已死
入殮血尚未止一道人過其門聞其家哭詢問其由道
人云是曾服丹或燒煉藥毒予有藥用之即活囊間出藥
半錢匕吹入鼻中立止良久得活

又方治鼻衄不止欲絶者良

茅花壹大握剉水二椀煎濃汁壹椀分二服飲立止

藕汁飲治吐血衄血不止

生藕汁　大劑汁各叁合　生地黄汁　生蜜半　匙

右件藥汁調和合勻每服一小盞細二冷呷之不拘時

治鼻衄血方生地黃不拘多少
寻在汝州時因出驗屍有保正趙温不詣鞫所問之即
云衄血已數斗昏困欲絶予使人扶腋以來鼻血如簷
溜平日所記治衄數方旋合藥治之血勢皆衝出予謂
治血者莫如地黃試遣人四散尋生地黃得十餘斤不
暇取汁及三四斤又以其滓塞鼻須臾未歲子婦吐血
衄血有醫者教取生地黃自然汁可惜輒飲數盃隨即
見釜中飲汁以爲棄去半年不通愈有一婢病經血半年不通
煮飲之日服數升三日而愈一婢病經血半年不通利地黃
活血其功如此地黃但用新布拭淨搥汁勿用水洗信効方
（治鼻衄七煮元）
鹿茸炙兩半去殼兩石蓮肉半去心兩白茯苓壹兩

兎絲子壹兩淨洗肉蓯蓉壹兩益智仁去殼兩
石將軍壹兩切片分作七時以水七鎚煎取
一升每處用藥一味同浸一宿連椀排飯上蒸飯熟取
出爲度和勻焙乾爲末以山藥拾兩煮糊爲丸如梧桐
子大朱砂爲衣每服五十九至一百九棗湯下

獨勝散 治鼻衄出血過多昏冒欲死諸藥不效
鏡面草又名螺厴草水洗擂爛入酒濾去滓取汁服
一金散 治鼻衄出血過多昏冒欲死諸藥不效
大蒜研左鼻貼在左脚心右貼右鼻貼兩脚心

(又方)好香墨濃研點入鼻中
(又方)生薄黃貳錢青黛半兩青鹽拌勻
(又方)亂髮灰吹入鼻中

右末每服二錢半多用燈心木通麥門冬新水煎入盞調服

鹿角霜圓 治膏淋多因憂思失志意舍不寧濁氣干清小便淋閉或痛如寢黃赤白黯如脂膏

鹿角霜 白茯苓 秋石 各等分

右為末用糊圓如梧桐子大每服五十圓米飲下

髮灰散 治血淋若單單小便出血如尿此為並血此方主之

亂髮燒為灰不拘多少

右為末每服二錢用米醋泡湯調下治淋

以葵子末等分用米飲調下最治婦人胞轉不尿

石燕圓 治小便澁痛不可忍出砂石而後方通

石韋去毛 瞿麥穗各等

石燕燒紅水淬貳次滑石

右爲末糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯下日
三服

(瞤眩膏)治諸淋疼痛不可忍及沙石淋

大蘆薈一錢 右切作一指厚四五片用好白蜜淹少時安鐵鏟上慢
火炙乾又蘸又炙取盡一兩蜜半兩覆炙令香熟不可
焦候冷細嚼以鹽湯送下

(沉香散)治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致
壅滯小腹滿便溺不通大氣分泄小便不利

沉香 石韋去毛 滑石 王不留行
當歸各半兩 葵子
白芍藥 甘草
橘皮各壹分

右爲細末每服二錢煎大麥湯調下

（石韋湯）治心經蘊積熱傳於小腸小腸熱於脬中脬痺而系轉診心脉大而牢

石韋去毛　車前子

右二味等分濃煎汁飲之其人腹脹比忍溺好盬卧曲味等分濃煎汁飲之其人腹脹比忍溺好盬卧曲膝致陰縮腫此厥陰之證加（赤伏苓）黄芪等分尤妙

犀角地黄湯治小腸淋瀝出血疼痛難忍及治心血妄行

犀角半兩以升兩麻如代無真犀角之為末　牡丹皮半兩

右三味為麁末入生地黄二寸打碎水一盞同煎至八分空心服之心血妄行血等疾食後臨卧服之用絲茅根煎服余癸丑夏嘗苦淋漓之疾出血不已得黄應

明授此方數服而愈

（小便出血方）

白微散 治血淋熱淋

白薇 為藥

右等分為細末每服二錢用酒調下立效

單方療小遺出血條（淡豆豉煎湯服効）

透格散 治五淋勞淋血淋氣淋石淋熱淋困危

浄（燒灰）溫酒調下一服立效

右為細末每服三五錢白硝石壹兩

白皮煎湯下

水下 熱淋瞿麥煎湯下 勞淋葵子煎湯下

血淋冷 氣淋滑石湯下

沙淋桑

單方治淋疾數年不愈者四君子湯去甘草白水煎服

單方治小便出血竹茹為末白水煎服甚妙

治血淋痛不可忍方　通秘散

陳皮　香附子　赤茯苓等分

右爲末每服二錢水一盞煎六分空心服

利小腸　皮

鏡面散治小便出血

余頃在京章貢時年二十六七忽小便後出鮮血數點不勝驚駭却不疼如是一月若不飲酒則血少愈終不能斷偶得一器清汁云是草藥添以少蜜解以水兩服而愈其名鏡面草又名螺厴草其色青翠所在塘縫中多有之

單方治尿血香附子為末用飛過白礬酒下

定磁散治砂石沙

真定磁　赤芍藥

右等分爲細末濃煎燈心湯空心調服

（燈心湯）治熱淋疼痛

燈心　乾柿　二味等分剉碎水煎總要方

（信効散）治五淋此三方梁氏總要方

赤芍藥壹兩　檳榔半兩

右吹咀每服三錢水一盞半燈心五莖煎空心服

（治沙石淋）方

鄧縣尉耿夢得夢苦沙石淋十三年每溺時器中剥落杖根俗呼爲杜牛膝者淨洗焚不堪耽命採苦杖根俗呼爲杜牛膝者淨洗

有聲痛楚不堪耽命採苦杖根俗呼爲杜牛膝者淨洗

碎之九一合用水五盞煎耗其四而留其一去滓以露

香乳香　少許研調服之一

夕即愈本事方

（小劑飲子）治下焦結熱血淋

生地黃肆兩　滑石
蒲黃炒　淡竹葉　通草
山梔仁　甘草炙各半兩　藕節　當歸酒浸

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服空心

類編朱氏集驗醫方卷之七

○虛損

附

勞瘵

虛損評

評曰虛損一證證候多端或大病未復便合陰陽或筋力疲倦飢飽失時用心計算生或吐衄交作或白濁遺精思文字是致氣血耗散百病頻生或吐衄交作或白濁遺精下部虛冷洞泄下利盜汗潮熱發熱或手足厥冷或便數溺溲咳嗽吐痰種種不一或嘔吐不食日就羸黃或飲食雖多不生肌肉日久月深將積微成損氣血愈微微則衰矣婦人產後榮衛虛耗甚為虛也尤甚大抵潮熱者不可過用寒涼之劑秘結者不可倍使疎泄之藥咳嗽者不可

妄施發散咯血者不可誤以爲熱是以調和衛氣滋養榮
血古人所謂補腎不如補脾所謂精氣血氣未有不自穀
氣以爲本也治之之法要當審察其脉理隨其證候施之治
療萬無失焉

既濟丹治水火不既濟精神恍惚頭目昏暗陽道痿
弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛怯心腎不寧凡腎水欲升
而沃心火欲降而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎
上則神自清水不滲下而精自固常服壯陽固氣温脾益
血五味子 白茯苓 附子 沉香

龍骨 從容酒蒸音代浸碎煅各壹兩 益智仁
酸棗仁去殼炒 補骨脂炒 核桃肉去殼金鈴子去核
炒 當歸酒浸 川巴戟去心兩半 兔絲子酒浸壹兩半

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服
五七十丸空心鹽酒任下　侍左王郎中鎔傳與右司
謝大卿服之果是奇絶
聚寶養氣丹治諸虛不足氣血怯弱頭目昏暈肢節倦怠
心志昏憒夜夢失精小便滑數脾胃氣虛又治諸風癱瘓
半身不隨語言蹇澁肢體重痛寒濕氣痺或久寒宿冷泄
瀉發瘧寒熱下痢赤白及腸風痔瘻下血不止婦人子臟
久冷崩漏帶下五色月候不調腹脇刺痛血痕血閉羸瘦
乏力並皆治之
代赭石　紫石英
赤石脂　禹餘糧石
右四味各貳兩醋淬水飛過搜作錠子候十分乾入砂
合內養火三日蘿子埋地中出火毒一宿

陽起石 煅 肉豆蔻 煨 包 鹿茸 酒炙
鍾乳粉 五靈脂 酒研 茴香 酒炒
當歸 酒浸炙 遠志 去心炒
附子 炮 天雄 炮 沒藥 別研
丁香 木香 胡椒 乳香
山藥 茯苓 焙 肉桂 黃耆 蜜炙
血竭 琥珀 朱砂 巴戟 各半兩
右為細末糯米煮糊為丸如梧桐子大留朱砂麝香少
許為衣每服三十丸空心人參煎湯或棗湯下婦人醋
湯下九 江雷醫方
十補圓治諸虛不足補元陽益真氣
茴香 炒 貳兩 萌蘆 巴 炒 破故紙 炒 柏子仁 白伏苓 沉香
蒼术 米泔水浸壹宿水

兎絲子 各壹兩酒浸壹宿炒 以上五味用煮酒浸三宿
大川烏壹箇壹兩者好醋浸三宿 青塩半兩 丁香貳錢
木通壹兩半用塩貳錢好酒壹椀煮乾 麝香半錢

右爲細末用前浸藥酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服
四五十圓空心溫酒送下
益中丹 治真氣補虛備不足焦傷竭臍腹絞痛兩脇脹滿
飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視
氣虛腸鳴大便自痢虛煩盜汗津液內燥並宜服之

鹿茸 丁香 木香 益智仁 黄耆蜜炙 木通油炒 官桂去皮
山藥 青塩 茴香炒
乾薑炮 石斛 天雄炮

附子炮　鵝管石火煅淬　酒浸破故紙炒
川牛膝酒焙　陽起石火煅淬　肉豆蔻
金鈴子去核　覆盆子　萌蘆巴炒　菟絲子酒浸焙
馬蘭花醋炒　肉蓯蓉酒浸焙　熟地黄酒浸焙　菟絲子酒浸焙
人參各壹錢　沉香　非子酒浸焙　沉加
麝香叁字　各壹錢半

右爲細末酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓加
至五十圓空心温酒服

宋孝宗賜新安郡王吴珍傳吴武穆抜
兼修合藥爲官周禮被罪放罷押付興元府中軍入隊
使喚吴彦是時任中軍統制年三十七患虚憊冷病爲
飲酒過多食牛凍所傷服此藥三十五年間服養氣丹
令髭鬢不白皆此藥之力

韮附煎圓生精補血益諸虛百損 吳尚書方

鹿茸三兩燎去毛酒浸 蒐蓉 牛膝洗
熟地黃 巴戟去心 川
以上諸味拌勻酒浸貳宿日乾一處拌 當歸洗
兎絲子 拘兩洗去沙土 大附子炮 破故紙炒
茯神去木 筒香炒 川練子去核
杜仲去皮細剉生姜 官桂去皮 各貳兩 台椒紅炒 木
蒼朮 刮兩米泔水浸壹宿洗去沙土剉片 各壹兩
右爲細末酒糊爲圓梧桐子大每服五六十圓鹽湯温
酒吞下日三二服常服甚妙

腽肭臍圓 補真助陽益壯根本南康嚴子禮方

腊肭臍壹對酒
川烏炮 煮爛用
麋茸
陽起石火煅 葫蘆巴炒
右細末用腊肭臍杵爛和藥將所煮腊肭臍酒煮山藥末爲糊圓如梧桐子大每服七十圓空心酒服

(腊肭臍圓)治證同前 趙龍學方
腊肭臍壹對 鹿角膠
鹿茸各貳兩
熟地黃 葫蘆巴
鍾乳粉 沉香
菟絲子
蓯蓉 當歸
沉香 天雄
尚香 牛膝
朱砂貳錢 麝香壹錢
附子各壹兩

右先將腽肭臍（酒浸一宿煮爛杵成膏將腽肭臍（酒浸一宿煮爛杵成膏將腽肭臍（酒浸一宿煮爛杵成膏

陽起石酒煮一日沉香各貳兩附子炮去皮兎絲子浸一宿
右爲細末用腊肭臍併鹿角膠爲膏子圓如梧桐子大
每服七十圓至一百圓空心鹽酒湯下食前
韋附圓治下元補傷憊駐顏悅色壯筋力去百病
黃狗脊壹條去兩頭些帶肉截作
五七段研炒
碙砂壹兩研爲末
肉桂去皮 附子炮
兎絲子酒浸二日
蒸焙乾
鹿角膠炒 肉蓯蓉酒浸焙
陽起石酒煮一日
研各半兩
右細末用棗肉伍兩酥壹兩相和杵千餘下圓如彔豆
大日乾每日鹽湯下二十元 朱佐方

梅茸圓補肝腎斂肝氣

鹿茸酥炙兩 烏梅肉壹兩用肥者
沉香 參兩 鍾乳粉半兩
右為末次入鍾乳粉拌和用羊脊髓為丸如梧桐子大
每服五十丸粟米飲下

青蛾圓

兎絲子半斤酒浸 木瓜
牛膝酒浸 五味子各貳
右件除青葙附子諸藥俱用酒浸洗去用浸藥酒煮糊
為丸如梧桐子大空心酒服五十丸

青葙 天麻各壹兩 附子壹兩用皮臍埋三枚火炮去
右件除青葙附子諸藥俱用酒浸洗去用浸藥酒煮糊
為丸如梧桐子大空心酒服五十丸

仙茅圓固精煖水臟

仙茅糯米泔浸二日一換取盡赤汁日乾肆兩磨為細末

半夏湯泡柒次
右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大任意服
煮附圓
附子刴片錢重者兩隻去皮臍切
茴香炒 木香各半兩 胡盧巴壹兩炒
右爲細末酒糊爲丸空心温鹽湯下腹疼良薑湯下泄瀉則引諸藥以歸腎
增益八味圓滋養肝腎益心血利足膝實肌膚悅顏色真
男子衛生之良藥也此方專理肝心腎之血澤瀉則引諸
熟乾地黃酒洒九蒸日乾秤大塊者酒浸一宿山茱萸去核大附子壹兩炮去皮臍鹿茸去毛炙五味子各肆兩
山藥酒浸一宿各貳兩

白茯苓　牡丹皮去骨澤瀉酒浸一宿各壹兩半

右爲細末用真鹿角膠半斤剉細入銀石器中法酒元

如梧桐子大每服五十元空心溫酒鹽湯下此乃肉

秘傳內丹養心腎生精血補虛損壯筋骨固下元

藥潤補不僭不燥功效異常　小山薥端明常服加仙茅

腽肭臍尤妙

伏火朱砂肆兩研如粉　代赭石肆兩火煅水飛

鹿角膠杀兩炒粉　鹿角霜貳兩

虎脛骨肆兩酥炙　天雄炮貳兩

桑螵蛸炒肆兩　磁石淬水飛

鹿茸酒浸炙　白蕤仁各壹兩半

右件糯米粉用酒和成餅煮熟元如梧桐子大每服三

十六加至五十六空心搐湯下一方用靈砂不使朱砂
既濟丹 辰砂蜜者尤妙 升降心腎
磁石 研好者煅醋淬 水飛
酸棗仁 人參各貳兩 乳香半兩
右爲細末神麯和爲圓如梧桐子大每服三五十九燈
心棗湯下不拘時候
既濟玉關圓治憂思過多心腎不足水火不能交養神志
不寧此藥壯真元益心氣使水火既濟不生諸疾
真辰砂壹兩 滴乳香半兩 法酒壹升
大附子 砂鍾等隻生去皮臍作罐子上三味用銀器盛
以粉留木瓜內不動將煮了辰砂慢火煮令極乾
却下爲末却用入附子罐內罐子留頂蓋定內有餘

宣州花木瓜兩隻大者上中分作兩片去皮瓤子肆
補骨脂炒毛熟地黃酒浸兎絲子杜仲姜炒各
鹿茸大麥坐木瓜蒸之候兩時辰木瓜香熟却取出附
沉香子切作片焙乾其辰砂別研令細木瓜
川當歸
遠志柏子仁
肉蓯蓉牛膝
綿芪各壹兩

右爲細末入辰砂乳香末令勻更用
白茯苓各
壹兩

右爲細末或只以末入木瓜亦得打糊用木瓜膏子作
一處搜和爲元每服五七十元至百元温酒鹽湯吞下
久服腰膝不痛小便如水功效甚驗不可具述

秋石圓益精生血補養心腎

秋石壹两　白茯苓
川當歸酒浸各半兩血竭炙
沉香壹錢半辰砂貳錢半別研壹半
右為細末鹿角膠煮酒為丸如梧桐子大每服三四十
元鹽湯温酒任下

瓜砂丹治男子婦人諸虛不足心氣不寧夢寐不安手足
疼痛腰膝拘攣步歷艱難及治婦人胸氣衝心噫吐藥食
不能下咽者並皆治之蜀醫何殿機復方

朱砂肆兩以木瓜壹箇開蓋去穰底下根鋪藥末少許再
中以綿片裹朱砂壹兩密封蓋定坐於銀
鍋銀罐中勿用鉄器以柔柴燒
濕盛發二定綿片裹木瓜末令滿仍以木瓜
蓋子蓋定如此者二十个看其銀合大小坐於其中銀合上下仍鋪
藥末封蓋定坐於銀鍋銀罐中勿用鉄器以柔柴燒
晝夜文武火煮七晝夜乃取出朱砂壹味攤乾研細以次又蒸七
次再換木瓜藥末一次又蒸七
意欲粉煮

黃耆炙　當歸
川烏炮　木香
人參　乳香
石斛　龍齒
白芍藥　五味子
附子炮去皮　鍾乳粉各貳兩
磁石圓治心腎諸虛不足　加爪砂貳兩
湘中趙伯海妙方

磁石醋煅　黃耆蜜炙　覆盆子　赤茯苓各半兩
乾薑炮　巴戟去心　桂心　鹿茸蜜炙各叁錢
蒐窘酒浸焙乾　牛膝酒浸焙乾　川椒炒各壹錢半　大附子壹箇炮去皮
防風　地骨皮　遠志去心各貳錢　柏子仁別研

大川烏 壹箇炮去皮
右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三十元湯
酒任下婦人白帶下及男子溼精加龍骨半兩(海飄消)
壹兩(壯礦火煆)
(六益圓)專補脾腎乃劉通眞家秘方
丁香 木香 紫梢花(去木各一兩)
附子(炮壹箇) 血竭(酥炙) 肉豆蔻(麪煨) 白附子(炮)
右件各壹兩爲末酒糊爲元如梧桐子大每服三五十
元温酒下
(強志圓)益心血活腎水治白濁
兎絲子(酒煮熟地黄各貳兩) 茯神 山藥
柏子仁 附子

遠志　枸杞子　杜仲　破故紙

鹿角霜 各壹兩

右煉蜜爲丸如梧子大每服四五十丸空心酒下赤

濁用朱砂爲衣 樂 梁時名醫發傳方

已戟圓 治諸虛不足真陽衰憊服之有効

川楝子 去核 萌盧巴 炒 白薑 炮

茴香 川牛膝 酒浸 破故紙 炒

肉桂 去皮 牡礪 煅 附子 炮去皮臍

右等分爲末酒糊爲丸如梧子大每服五十丸空心

鹽湯溫酒任下隨證加減味于后

腎厥頭痛加川芎肺虛咳唾加五味子寒冬花肓膊勞

倦加沉香脾胃不和加蓽澄茄虛寒熱加蓮心

川牛膝酒浸一宿 磁石火燒酒淬三次 龍齒煆
天雄盞內泡天雄取酒盡爲度 研入酒壹
兎絲子酒浸一宿 淨洗酒蒸 補骨脂各壹兩用青鹽壹兩
車前子半兩 研各貳兩 鹿茸去皮
附子炮去皮臍 萸肉桂去心各
右細末酒煮鹿角膠丸如梧桐子大每服五十丸至一
百丸食前溫酒吞下 寶慶張太醫宗玉已効秘方

固心丹益心壯志心腎除恍惚驚悸

通明朱砂 參兩用生絹袋盛無灰酒兩盞內浸一宿 乳香
研 一宿 成膏 後用銀石器內慢火煮令九分乾 以人參湯研如
粉入在朱砂內

茯神 人參各壹兩半並入朱
砂乳香壹兩半並入朱
研入酒壹
盞爲度

右和令勻入猪羊心血內成丸如小雞頭大每服三兩

元煎(人參)湯炒(酸棗仁)湯服食後臨臥下

(養肝圓)治養血氣壯筋骨梁國佐方

白芍藥　禹粮石　煅　肉蓯蓉

當歸　柏子仁　牛膝

川續斷　益智　蒲　各兩　龍齒兩

木瓜　石菖蒲　炒　杜仲　肆　炒　兩　鹿角膠炒　壹兩半

茯神　去木各壹兩

(補腎圓)治腎氣不足眼目昏暗出嚴氏方

兎絲子　酒浸　磁石　火煅　各貳兩　枸杞子　楮實子

車前子　酒蒸　五味子　熟地黄　覆盆子

石斛　去根　蓯蓉　各壹兩　沉香　青鹽各半兩

右爲細末煉蜜爲元梧桐子大每服七十元空心鹽湯

送下

(香茸圓)補虛壯陽出雞峯方

鹿茸拾兩　麝香壹兩

右先將鹿茸爲細末後入麝香同拌勻以山藥貳兩酒煮爲糊和圓如梧桐子大每服三十九空心米飲下

蒼朮圓（烏髭鬚駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤飢膚久服令人輕健出雞峯方）

蒼朮壹斤（不拘多少米泔水浸三日逐日換水候漲蒲日取出刮去皮切片日乾慢火炒令黃色細搗末）

右每壹斤末用蒸過茯苓半斤煉蜜九如梧桐子大空心臨卧溫熟水下五十九元別用蒼朮末兩甘草末一兩拌和勻作湯點之下（蒼朮圓炒忌桃李雀蛤白及三煅下圓補筋骨久服令人壯健悅澤

胡桃仁（碾）貳兩　蜜肆兩

右以蜜胡桃相和熬如稀餳後入藥末和九如梧桐子

大空心湯婦人服之亦佳

仙茅圓大補益壯元陽久服延年壽

仙茅　茯苓　山藥　鳧茈九節者各壹兩

右仙茅一件不犯鐵器並剉以法酒拌勻於飯上蒸以

飯熟爲度日乾爲末以棗肉和九如梧桐子大每服五

十九空心酒任下

椒丹暖水臟降氣明目補骨髓保長壽命眉州青神縣王

家累世服食方

辰砂壹兩細研如塵　椒揀大粒色紅者去枝梗併合

酒浸椒袋令酒在上三二分以來一宿取出空少許又少

時入朱砂鉢內揑之令勻餘者滴浸椒酒少許度日乾

揑不得用火焙不可犯生水

右每服五十九加至一百九空心酒下此藥用生砂不惜

可久服之

養心丹 能寬神清思全志通神明不老

右爲細末棗肉爲丸如梧桐子大空心清浄水吞下十

平補鎮心丹 治心氣不足虛煩驚悸

九出紫雞峯方用之棗劾

天門冬 熟地黃 山藥 遠志

龍齒 酸棗仁 五味子 柱心

人參 朱砂 麥門冬 車前子

茯神 茯苓各等分

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十元空心米飲

衆妙圓（蜀醫殿機何企顏方佳甚）

川烏　人參　火砂

蜜砂各壹兩　破故紙炒　乳粉

肉豆蔻煨包焙　大附子炮　鍾

白茯苓貳錢　鹿茸酥炙貳

右細末大鉢内炙一二日令勻糯米糊爲丸如梧桐子

小焙乾窶瓶收常存煖處可與八味圓輪服

沉香圓元散常服爲妙

沉香　茴香

木香　川芎

陳皮叁錢　胡盧巴肆錢

右爲細末鹽湯調下此方得之蜀士用之果驗

丁香　烏藥

巴戟酒煮去心

各半兩

玉女砂治男子婦人諸虛百損痿弱下元固陽氣痩宮胃産
後諸虛尤宜服之又專治虛病寒熱自汗盜汗尤神北方
乃潼川許德脩名醫遇玉人得此方極驗

好辰砂捌兩或陸兩或拾兩夾絹袋盛
金毛狗脊去毛呉茱萸
禹松古屋瓦上青毛焙乾去土
人參
芍藥
肉豆蔻燃熟包
桑寄生
兎絲子
熟地黄
五味子
杜仲
川萆薢
牡丹皮去心
茴香洗
巴戟去心
黄耆
茯神去木
山茱萸去核
當歸

右各壹兩椿在一斗瓶内着童子小便五七升將砂袋
懸胎挂瓶中如煑酒法於鍋内着水亦懸藥瓶於鍋中

桑柴或閒松柴煲五日夜火不要急小便不住討添煲
令乾日足取出將砂袋以温水滌十餘次又換温水浸
半日棄藥棄水用浪砂又洗三兩次糯米團子和丸空心
棗湯下五粒至十粒

八寶粧圓壯脾腎進飲食行步如飛

八味圓　安腎圓

固眞丹　黃耆圓

鹿角霜圓　兎絲子圓

右各買壹貼令有壹兩作一處磁器盛以無灰酒浸壹
宿令稍稠得所竹木槌子於淨皁子上搥數千下却加
天雄壹箇大附子壹箇炮爲末衮合在藥內再搥千餘
下又以無灰酒再浸壹宿次日再搥數千下九如梧桐
子大空心鹽湯酒下十五元日加二十九至三五十九

止以乾物壓之

(一)香圓補氣血治腰疼久服明眼有驗

蒼朮水浸三日去皮劉炮 杜仲製 破故紙

川椒各貳兩 厚朴壹兩

右六味修治外以青塩三之一入在瓶內酌量入水文武火煮水盡爲度焙乾爲末酒糊爲丸空心酒下五十丸

(二)氣散治腎經停冷氣滯力弱

大附子壹隻生用不去皮臍切作叁分爲片子令薄乾分

大茴香陸兩淨洗過濾乾叁分每分貳兩

第一度用附子壹分茴香貳兩壹分同炒令茴香黃色度用附子壹分茴香貳兩壹分同炒令茴香黃色香熟用瓦瓶盛貯厚紙封蓋安在冷處一宿次日除附子以茴香爲末空心塩酒調下

第二度如第一度分兩炒法存性皆如前法但次早止除
（附子）一半其一半（附子）同薑棗爲細末凡分兩炒法存性皆如前一度之法但次早全
用（附子）同薑棗爲細末亦如前法服之又可合別藥用
（附子）一名山白蘭乾了以新草鞋篩縮砂壹半
（金櫻圓）補血四川老何方
金櫻子內擦刺令淨搥破去子切焙縮砂壹半
右蜜丸空心酒或鹽湯下五十九
（大養脾圓）補氣血虛湘中老醫陳必勝方親見功効
人參各半兩
肉豆蔻
木香
縮砂仁
麥芽
青皮
白豆蔻仁
沉香
石蓮肉
（肉豆蔻）煨各參錢包煨

陳皮　紅豆
厚朴製各貳錢
右爲末煉蜜爲丸粟米湯嚼
大正氣散（補虛快氣散）腰脇疼
香附子炒　當歸
甘草肆錢　白薑
縮砂仁各叁錢　大附子壹枚炮
右剉散每服三錢水一盞半煎
去滓空心熱服湘中瘴必勝之
兎絲子圓治男女虛勞益顏色
耳目輕身延年最妙
兎絲子酒浸一宿焙　澤瀉酒浸一宿焙

蒐絲 酒浸一宿焙
白茯苓 杜仲 製
石斛 焙
金鈴子 去核
覆盆子 五味子
石爲細末不犯銅鐵器酒糊爲丸如梧桐子大每服二三
十丸鹽湯温酒任下如脚弱木瓜湯下
（加味大建中湯補諸虛）
白芍藥 官桂
五味子 乾薑炮
白伏苓 去皮川芎
陳皮 各壹兩 甘草 半兩
去毛 山茱萸 去核
川續斷 酒浸一宿焙
熟地黃 酒浸一宿焙
川牛膝 酒浸一宿焙
川巴戟 去心酒浸一宿焙
川芎 各貳兩 天台烏藥 削半
桑螵蛸 蜜炙
人參 鹿茸 酒蒸
當歸 酒浸
附子 炮
半夏 中沉者是

右麪末每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎六分去
滓空心
返精九(定心養血補腎此方得之異人)
破故紙(貳兩隔紙炒令香熟)
白茯苓(壹兩去皮)
破故紙(拾兩酒浸蒸酒炒)
右等分爲末酒糊爲丸每服五十丸空心鹽酒下
陞朝湯(治脉溢精血少神氣昏倦背膊疼痛)
鹿茸 當歸各貳兩 川烏 白薑各壹兩
炮
右麪末每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎六分去
滓空心
破故紙(貳兩隔紙炒令香熟)
白茯苓(壹兩去皮)
右爲細末用(沒藥半兩搥破用無灰酒煮浸高浸藥一
指許候如稠餳狀搜成前三味爲丸如梧桐子大每服
三十粒隨食湯下酒糊丸亦可食前服)
破故紙(拾兩酒浸蒸酒炒)
右等分爲末酒糊爲丸每服五十丸空心鹽酒下
陞朝湯(治脉溢精血少神氣昏倦背膊疼痛)
鹿茸 當歸各貳兩 川烏 白薑各壹兩
炮

肉桂壹兩　甘草半兩

右㕮咀每服半兩薑棗同煎空心服三山曾太丞方

坎離丹　既濟水火

伏火靈砂　陽起石酒煮炙　磁石火煅醋淬

龍齒壹兩黑豆蒸

右細末麪糊丸如豌豆大每服十五粒空心用棗湯下

既濟丹　治心腎不交此方得之帥司樂人

靈砂　陽起石煅　鍾乳粉各壹兩

磁石煅

朱砂壹錢爲衣

鹿茸　茯神各壹兩　沉香半兩

右細末麪糊丸如豌豆大每服二十九空心棗湯下

黑錫丹　治丈夫元臟虛冷眞陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味睡臥不寧小便白濁或遺或閉或多或少或冷或熱或小腹脹滿或陰囊冷縮或陽事不舉或舉而不堅或堅而不久或精流不禁或夢寐頻泄或陰汗如雨或陰痿如冰或陰莖痛或陰囊濕或陰囊腫或陰囊痛或陰囊縮或陰囊冷或陰囊熱或陰囊癢或陰囊瘡或陰囊潰或陰囊爛或陰囊生蟲或陰囊生瘡或陰囊生癰或陰囊生疽或陰囊生毒或陰囊生核或陰囊生結或陰囊生塊或陰囊生瘤或陰囊生囊或陰囊生包或陰囊生袋或陰囊生囊腫或陰囊生包腫或陰囊生袋腫或陰囊生囊痛或陰囊生包痛或陰囊生袋痛或陰囊生囊癢或陰囊生包癢或陰囊生袋癢或陰囊生囊瘡或陰囊生包瘡或陰囊生袋瘡或陰囊生囊潰或陰囊生包潰或陰囊生袋潰或陰囊生囊爛或陰囊生包爛或陰囊生袋爛或陰囊生囊生蟲或陰囊生包生蟲或陰囊生袋生蟲或陰囊生囊生瘡或陰囊生包生瘡或陰囊生袋生瘡或陰囊生囊生癰或陰囊生包生癰或陰囊生袋生癰或陰囊生囊生疽或陰囊生包生疽或陰囊生袋生疽或陰囊生囊生毒或陰囊生包生毒或陰囊生袋生毒或陰囊生囊生核或陰囊生包生核或陰囊生袋生核或陰囊生囊生結或陰囊生包生結或陰囊生袋生結或陰囊生囊生塊或陰囊生包生塊或陰囊生袋生塊或陰囊生囊生瘤或陰囊生包生瘤或陰囊生袋生瘤或陰囊生囊生囊或陰囊生包生包或陰囊生袋生袋或陰囊生囊生囊腫或陰囊生包生包腫或陰囊生袋生袋腫或陰囊生囊生囊痛或陰囊生包生包痛或陰囊生袋生袋痛或陰囊生囊生囊癢或陰囊生包生包癢或陰囊生袋生袋癢或陰囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包瘡或陰囊生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊潰或陰囊生包生包潰或陰囊生袋生袋潰或陰囊生囊生囊爛或陰囊生包生包爛或陰囊生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生癰或陰囊生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生疽或陰囊生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生毒或陰囊生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生核或陰囊生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生結或陰囊生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生塊或陰囊生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生包生癰或陰囊生袋生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生包生疽或陰囊生袋生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生包生毒或陰囊生袋生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生包生核或陰囊生袋生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生包生結或陰囊生袋生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生包生塊或陰囊生袋生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生包生包生癰或陰囊生袋生袋生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生包生包生疽或陰囊生袋生袋生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生包生包生毒或陰囊生袋生袋生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生包生包生核或陰囊生袋生袋生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生包生包生結或陰囊生袋生袋生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生包生包生塊或陰囊生袋生袋生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生包生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生包生包生包生癰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生包生包生包生疽或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生包生包生包生毒或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生包生包生包生核或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生包生包生包生結或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生包生包生包生塊或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生包生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生包生包生包生包生癰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生包生包生包生包生疽或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生包生包生包生包生毒或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生包生包生包生包生核或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生包生包生包生包生結或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生包生包生包生包生塊或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生包生包生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包生包生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包生包生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包生包生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包生包生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包生包生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生癰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生疽或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生毒或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生核或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生結或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生塊或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生癰或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生癰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生癰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生疽或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生疽或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生疽或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生毒或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生毒或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生毒或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生核或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生核或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生核或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生結或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生結或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生結或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生塊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生塊或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生塊或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生瘤或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生瘤或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊腫或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包腫或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋腫或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊痛或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包痛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋痛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊癢或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包癢或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋癢或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊潰或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包潰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋潰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊爛或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包爛或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋爛或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生蟲或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包生蟲或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生蟲或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊瘡或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包瘡或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋瘡或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊癰或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包癰或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋癰或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊疽或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包疽或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋疽或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊毒或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包毒或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋毒或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊核或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包核或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋核或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊結或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包結或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋結或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊塊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包塊或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋塊或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊瘤或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包瘤或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋瘤或陰囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊生囊囊或陰囊生包生包生包生包生包生包生包生包生包囊或陰囊生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋生袋囊

小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶下及陰
毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便
回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補損益氣虛回陽返陰

黑錫 洗鎔了去渣秤硫黃結透明者砂子 附子 各貳兩炮裂去皮臍
肉豆蔻 炮 木香 炒 茴香 各壹兩

右用新鐵銚內如常法結黑錫硫黃沙子地上出火毒
研酒糊丸如梧桐子大陰乾入布袋內搽令光瑩每服
五七十丸空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下如一
切冷疾鹽酒鹽湯空心下三四十丸此方得之丹陽普
照寺乃東京藥方本人服多效淳祐丁未胡都承守丹

陽遂得真傳

十全飲治諸虛百損榮衛不和婦人崩漏此藥有効

人參　肉桂

黃耆　川芎

當歸　白芍藥各等分

右㕮咀每服四錢水盞半生薑三片棗一枚煎七分服

不拘時氣血虛億加鹿茸

(萬粟殼)蜜炙各等分

右㕮咀每服四錢水盞半生薑三片棗一枚煎七分服

神仙修眞丹益精補髓壯筋骨明眼目補暖藏氣去一切風

鹿角霜拾兩　附子伍兩炮

右爲細末以鹿角膠半升熬化爲丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒或炒茴香湯下

健補元治下部弱腎水冷平補不燥不熱劉子壽上舍方

熟地黃半斤補血　兎絲子半斤補精

右細末酒糊爲丸如梧桐子大　心氣煩燥不得睡煎

酸棗仁湯下　心氣煩燥不得睡煎茯苓湯下　氣不順沉香湯下

小便少車前子湯下　小便多益智湯下　固眞丹治腎與膀胱虛冷眞氣不回小便滑數

舶上茴香炒　補骨脂炒　益智子炒　白龍骨壹兩火煅別研如粉　鹿角霜各壹兩

右爲末以青鹽鹿角膠各半兩同煮酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸温酒鹽湯下

唐鄭相云予爲南海節度七十有五越地卑濕傷於內
外衆疾俱作陽氣衰絶乳石補益之藥百端不應元和
七年有訶陵國舶主李摩訶獻此方經七八日而覺應
驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京師錄方傳之
其方用(破故紙)拾兩揀洗爲末胡桃肉去皮二十兩研
如泥即入前藥末更以好蜜煉和均如飴盛瓷器中旦
日以温酒化藥一匙服之不飲酒熟水調下彌久則延
年益氣悦心明目補添筋骨禁食羣羊血蕃人呼爲
道引方治殺虫補虚勞令人強壯
雞鳴時叩齒三十六通訖舐唇咽之
三過

○ 瘧方瘵

青蒿飲治傳尸勞瘵不問遠年日近皆可治之此藥妙不可言

阿魏壹分小桃枝壹大握檳榔壹兩

青蒿 甘草叁寸 檳榔壹兩

右件六味以童子小便二升浸桃枝蒿葱甘草四味煎取六合許然後入阿魏更煎二三沸作二服臨服時入末半兩同服如覺心惡必吐吐後令心安時再服

檳榔其勞虫定出送藥人不可與患人對立恐虫傷人

一服其勞虫定出送藥人不可與患人對立恐虫傷人

若男患以女人煎藥若女患以男人煎藥忌雞犬等物

觸之患者冬則三服一年內五服其病自盡去其根

辟邪毋近治久患傳尸骨蒸勞發熱痰嗽汗出及辟
夢　天靈蓋酥炙兩　虎頭骨酥炙貳兩　白朮炒黃　鬼箭
朱砂　雄黃各叁錢　麝香壹錢半　已上
右末煉蜜爲丸桐子大每服二十九食前煎安息香湯
下米飲亦得陽日合忌雞犬婦人見之神效

類編朱氏集驗醫方卷之八

○頭痛 附

湘 麓 朱 佐 君輔

附子湯 治頭風至驗

大附子壹箇生用去皮臍

右同入鈚子內煮豆熟爲度去附子服豆即安每箇可兼豆壹合

煮五服後爲末服之

辛撥散 治偏頭痛絶妙

辛撥壹味爲末令患者口中含左邊疼右鼻吸一字右邊疼右鼻吸一字即効

細辛散 治偏頭痛

細辛

一字輕金散治偏正頭風疼亦腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛迸出或生翳膜視物不明

雄黃各等分爲末少許擂鼻

藿香葉 荊芥穗 旋覆花 香白芷

石膏末細研水飛防風各半兩 川烏兩頭火者去皮 半貳錢 川芎半兩 草烏頭壹錢半

天南星精修事挂日中曬乾同搗爲細末每服只壹字

食後淡茶調下神效不可言丙寅侯食授之

抱婆圓治男女諸虛不足女人頭風男子氣虛弱吐痰及腳氣腰疼下元虛冷並宜治之

大附子壹兩壹隻炮去皮 大川烏去皮尖炮

蒼木參兩泔浸壹宿南木香不見火

天麻酒浸半兩浸免

右為細末酒煮麪糊丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下

頭風食後葱酒下

(細辛圓)治頭痛久不瘥

烏梅 藁本 川芎 北細辛 各兩 甘草半兩

右細末棗肉石膏半斤研細入甘鍋子內火煆過飛去石末

滴石膏水和丸彈子大茶酒任下一丸無時候

(金花一聖散)治頭風

川芎 川烏去皮 白芷 各等分

右細末每服壹字以生葱三寸薄荷葉三四片同煎食

(一字散)治偏正頭疼

全蝎 捌箇 防風壹分 薑蚕半兩 天麻壹兩

川烏壹箇炮南星壹箇重半兩以上者研爲末生姜
大乳香壹粒豆大和南星用文
右同研末入麝香朱砂各半兩拌勻每服一字食後葱
武煬令香熟切作薄片焙乾
酒茶調下

硫黃丸治頭痛

硫黃貳兩研 焰硝壹兩研

右以雪糕爲丸每服二十九臑茶下

硫黃丸治腎厥痛不可忍

硫黃 南星炮 石膏飛 研硝各等分

右細末糊丸如梧桐子大每服三十丸空心進一服加
至四十九有人患頭疼數月痛致厥不省人事皆作虛
陽上攻又有做風氣并痰治求醫於僕診其脉心脉肝

脉俱洪大遂以朱砂五苓散用龍膽草煎湯調下二錢
一服頃刻如失出張氏究原方
南荆散治頭風
南星壹兩 荆芥穗半兩
右將南星切片用生薑自然汁淹一夜焙乾微黄同荆芥爲末每服二錢入修仁茶少許
乕上焙乾無修仁建茶亦得定齋霍喆夫方
調服如偏頭風多用
又方治頭風
右爲細末入消風散薄荷煎各一貼若楊梅皮末多則用十分厚白梅肉杵爲丸如彈
各加兩貼合和爲末却用茶嚼下金陵髮角楊道人方
治腦瀉方
防風 白附子 北細辛

白茯苓　川烏
香白芷　川芎
右爲末每服三錢嚼生薑白湯調下食後服
○明目眼

（靈應丸）治内外障眼
黄連大者　蒺藜仁各壹兩　太陰元精石　陰乾
兩　羊子肝染箇去膜切作片陽火煅
石決明　草決明各貳兩
右用多年粟米飲爲丸如梧桐子大每服二十丸臨卧
時用煖漿者不過一月近者不過十日服
有典史黄仁鍔患赤眼羞明夢得神人惠之
主七日烙頂以助藥此方因宋公琪丞相早歲知綿州

蒼朮丸治内障

蒼朮半斤

右壹味切作片黑豆一小升用水二椀煮乾焙研爲末
糊丸每服三十丸空心鹽湯下

羌活散治一切風熱上攻頭目赤腫疼痛昏澁眵淚怕日
羞明赤脉翳膜

羌活　獨活　柴胡　川芎
黒參　赤芍藥　桔梗　地骨皮
荆芥　薄荷　桑白皮各半兩　大黄

右件各生用爲㕮咀每服秉重三錢水一盞半煎一盞去
滓無時服如有翳膜加蟬退（蛮蒙花）各半兩淚多則加

木賊半兩
地骨散治大人小兒眼赤或生翳膜此心經受熱所致
地骨皮　生地黃　黑參　甘草　水通　黃芩
祛風散治一切風熱上攻眼目赤腫羞明
大黃　黃芩　黃連　地骨皮　山梔子仁各半兩
柴胡　元參　赤芍藥　荊芥　防風　甘草
薄荷　防風　桑白皮各錢半貳
右爲吹咀每服三大錢水一盞半赤腫加生地黃煎如大小便秘澁心胃煩悶加枳殼
還光散治一切男女暴生赤白翳膜
菊花炒　羌活　防風　蟬退去足翅

痰黎炒　川芎　當歸　甘草炙

右等分細末食後茶調下

(茶調散)治男女頭風攻注眼目昏暗最治睛疼

藿香　香附子酌半　甘草貳錢半

右爲細末食後葱茶調下此三方係潘德夫常用有效

(柴胡散)治眼目暴赤腫痛

柴胡　蒼朮　甘草等分

右爲末白水煎如頭疼壯熱則用生薑葱煎已驗

(黃連湯)治火眼廣西鎮幹何清之方

右爲末黃連(柒)去毛節　杏仁(柒)去皮尖粒　北棗(柒)枚大棗

分放在地上去火毒候冷存在湯瓶上蒸温不要熟病

者仰卧令人滴藥汁在眼尖角近鼻者候口中有苦味即是藥透如未知苦則一面滴數次即安其效如神

(春雪膏)治眼目赤腫翳晕明

鵬砂參錢　腦子壹錢　通明朴硝半兩

右細末入乳鉢研再用細絹羅過每用小錢光弦者點入眼中閉霎時令藥勻方開眼淚出為度

(青金散)治眼目四季發動

羌活　甘草　荆芥　生乾地骨皮　桑白皮　各壹兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎八分食後熱服

(當歸散)治一切眼病

川芎　赞金　當歸尾　荆芥

右㕮咀每服三錢水一盞煎八分食後熱服

川芎　菊花　當歸尾　荆芥

羌活　生熟地黄　防風
北芎　藥各等分
右爲末白水煎候熟入(生地黄汁數點
(磁石丸)明目清神　煅醋淬
磁石　柴次　白朮　神曲
麥蘗　當歸　人參
辰砂　牛膝　白茯苓
(洗眼藥)黄附助教方
右等分爲末酒糊爲丸白湯吞下五十粒
(龍膽湯)治遠年日近翳膜遮障攀睛淚肉連
右細末每用一字温湯調無時洗立効
防風　馬牙硝
餅子銅青

昏暗不覩光明隱澁多淚迎風難開治之神妙

蘆甘石 黃連（不以紅藍者爲佳） 龍膽草 桑柴灰（以燈心草火燒存性） 右件藥味同白蜜肆內一處入在一紫黑瓷器內文武火慢熬以竹篦子攪如漆色不粘手爲度切勿犯生水仍不可用鉄器熬藥藥成依舊用甕器盛頓每服如皂角子大新冷水半盞化開洗三日不用每日洗數次無礙藥盞須用紙盖不可犯灰塵截赤目極有神驗

好黃丹羅過平秤半錢 乳鉢內研爲末秤壹錢 右件藥細研飛過候淨日乾不見水暴乾再用乳鉢方可用平秤叁錢 右件藥細研飛過將煖水浸壹宿濾去黃連滓以水煖水入黃連滓次了同黃連水煖水入羅過平秤貳錢 右件藥細研飛過候淨日乾不見火煖粉紅梅花色者爲妙用 右件藥味同在下土上面蜜細爵羅過平秤壹錢 右件藥細研爲末以多少旭砕以多少搥碎入銚子盛火煖水浸壹宿濾去黃連滓次入黃連滓將煖水煖水入羅過候

草決明　青箱子
敗荷葉　乾葛　梔花
右細末食後米泔水調下如四五十日只服此藥若日
子久則眼花老睛懸却再合後藥
香白芷　香附子　連翹　甘草
右爲細末一錢水一盞煎七分用此汁調煎藥仍忌口
蝉退
浮萍散治班疹瘡入眼大人小兒皆可用
浮萍陰乾爲末
右每服二錢以生羊子肝半箇入盞子内以杖子刺碎
没水半合絞取肝汁調下食後不甚者一服差已傷目
者十服差已見効

蒼木散治班疹入眼
蒼术壹两　槐花
防風　枸杞
川芎各半两　木賊
蝉退肆錢　乳香
乾葛壹两　沒藥各半錢
右件爲細末用白水煎食後服加穀精草叁錢半尤妙
菊花散治豆疹入眼
白菊花叁两　緑豆殼
穀精草　甘草各壹两
蜜蒙花
旋伏花
右爲㕮咀每服一錢乾柿壹枚粟米泔一盞煎乾盡爲度取乾柿食後服

升麻湯治斑疹

錢氏云疹未出之初或云傷風疑似之間以升麻湯主之此方通古今用之不知醫幾千百孩兒矣若欲出而不快出身體遍熱獨耳鼻脚梢中指冷者此是瘡證無疑急用升麻湯解肌爲穩若夫斑須要托裏急於升麻湯中倍加白芍藥及加南木香服之則瘡子出得齊無倒陷之患矣熱盛而疹出亦齊者於此時宜以消毒飲子解熱爲捷藥方極多而緊切者此三方爲上

加味四物湯治斑疹入目或疹豆收後方目有翳膜宜用此藥治之

當歸尾　芍藥

白菊花
右每二錢水一盞入生地黃少許杵碎同煎半盞量兒
大小服之乳食後服忘一切動風毒物鮭魚
月日方可
乾葛　羌活　各等分
蟬菊散治班疹入目或病後生翳瘴
蟬蛻淨洗去土　白菊花　各等分
右爲末每服二錢水一盞入蜜少許同煎乳食後量兒
小大與之有驗屢矣

○耳

安腎丸治虛弱耳聾
安腎丸半斤　磁石一斤醋煅兩次　石菖蒲　羌活　各壹兩

右三件爲末共混合爲九如梧桐子大每服五十九
鹽湯溫酒任下

羊腎圓治耳重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

石菖蒲各叁錢　羊腎壹對乾薄切以酒壹盃煮熟搗壹升乾
皂莢壹錠去黑皮蜜炙叁錢　川椒壹合拾貳粒去目及閉口者貳拾粒微炒出汗

右爲末用窠爲丸如梧桐子大每服三四十九空心温酒下九江雷制扈方

清神散治氣壅於上頭目不清耳常重聽

乾菊花　白僵蚕炒去絲嘴各壹兩　木通　川芎　防風各半兩
羌活　甘草　荆芥穗

木香貳錢

右爲末每服三錢食後臨卧服茶清調下

磁石羊腎丸治風虛不爽時有重聽或有風痺之狀並宜治之

磁石末貳兩火煅淬用葱子壹合十次醋淬用葱子壹合十次醋煅淬用葱子壹合十次醋淬用葱子壹合十次醋煅淬用葱子壹合十次醋淬用葱子壹合十次醋

驢生脂和生薑搗綿裹塞耳載劈說妙不可言

有人耳疼一日一作可畏宜挑剔出血銷愈此乃腎藏虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透水丹勿飲酒吠濕麪葱蒜蔬菜雞豬之屬能盡一月爲佳不能戒無效

治耳膿方 (新增)

窑陀僧壹錢輕粉半錢麝香壹字

右爲末先以綿卷耳內膿却摻入藥末

麝香壹字 (新增)

桑螵蛸壹个慢火炙及勿令焦黑分數存性

右爲細末研令勻每用半字糝耳內如有膿先用綿紙

又方乾胭脂 白礬枯過 (新增)

撚以藥糝之

○治鼻齆

贊金散治鼻中息肉

贊金　猪牙皂角各壹兩

右用水同浸一宿火煮透去皂角留贊金爛爲度去
滓焙乾次用北細辛半兩同爲末入麝香碗砂各壹錢或
半錢拌勻煉蜜爲丸如茶子大食後煎茶下

細辛散治鼻齆不聞香臭

北細辛

右等分各細末綿裹如豆大塞鼻中

治鼻內生息肉詩

狗頭骨化灰碗砂加少許每服摘半錢息肉化爲水

○口

遠志散治口瘡立効

五倍子半兩遠志去心半兩

右同研爲粗末用紗羅隔過摻少許於舌上吐出則瘡

已隨愈

獨勝散治口瘡

縮砂殼火煅存性爲末摻口內瘡上即安

立効散治口吻邊生瘡浸淫不愈

檳榔火煅爲末入輕粉傅瘡上立愈二方並試收効

柔萸散治口瘡及咽痛

地龍去土炙吳茱萸去浮者

右等分炒爲末米醋入生
飲酒嗽疾古生瘡方治連月飲
酒咽喉爛舌生
水中螺蚌肉
右用葱豉薑椒煮汁飲三盞差聖惠方
舌無故出血方
一士人無故舌出血仍有小穴醫不能曉何疾偶曰此
各衄炒槐花爲末摻之而愈良方
○舌瘡
三妙丸治舌齒衄蜀士何光甫方
右研爛爲細末綿裹左齒痛納之左耳右齒痛納之右
巴豆不去殼童登加柒枚

嘉禾散治齒疼
耿運管病朽齒者先去之而齒非痛非腫不
能嚼食後薑煎嘉禾散漱之
空心以羊腰一對切片不令斷以葱絲椒子青鹽羌活桑
末固之散二錢拌勻擦腰子內荷葉包煨熟食而愈
方
齒縫出血不止他藥不能治者鹽土之素證
齒縫出血蓋上實下虛也
又方治齒縫出血蓋上實下虛也
故也蘭室寶鑑用麥門冬煎湯漱之亦良
八味丸服之而愈
治冷證齒痛方
安腎丸 八味丸

右相和搽患處即安

白並散治牙疼

白並　血餘　川芎
川烏　草烏　百草霜
朱砂　全蝎　雄黃
沒藥　當歸　麝香

右等分爲末每服一錢茶酒任下空心先將此藥用醋調如膏次以皂角炭火燒令煙出却用皂角點藥搽患

立効散治牙疼

處即安

白礬壹兩　生薑壹兩切片同炒乾

右等分入焼鹽少許爲細末擦牙痛處如神

(細辛散)治牙疼 福州官醫王子益用此二方有効

北細辛 韋撥各貳錢 白芷 川烏 川芎各叁錢

川烏壹箇 全蝎伍箇

右六味曰乾爲末或痛先用塩水洗淨用少許傅痛處立效或有熱腫即入腦子少許和藥擦之皆効

(又退腫藥)

天花粉 白芷 赤小豆 赞金

荆芥 薄荷

右六味等分曰乾爲末蜜水調塗痛處

(細辛散)治牙齦腫痛

全蝎 白礬

北細辛葉錢各貳 鹿角香少許

右細末揩腫處仍用荆芥煎湯灌漱最佳 新洲報恩老方

或作解蟹毒淡嗽之一日得風熱之疾齒間壅大漲塞口不能開水漿不入痛楚待盡而已有一道人言能治此疾丞相命醫之不日而愈其法用生地黃汁壹椀

右末傳壅肉上隨即消縮後多金與之得此方大夫說

猪牙皂角(敷蘸)令炙火上炙熱汁盡爲度其婦李

若參不可潔齒論

予嘗苦腰重久坐則傴僂十餘步然後能行有一將佐見予曰得無用苦參潔齒否予時以齒病用苦參數年其氣傷腎能使人腰重後有太

常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久病腰重自後悉不用

導引方治齒痛

腰疼皆愈此皆方書所不載筆談

東向坐不息四通上下琢齒三十六下
針灸方治口齒蝕生瘡
承漿一穴在頤前唇下窅窅中可灸
又方治唇吻強齒斷痛
尤端一穴在唇上端鍼入二分可灸三壯

○咽喉

咽喉評

評曰咽喉之疾本傷熱毒上攻也四時受熱藏心肺之間一旦所觸上攻咽喉所謂胃傷寒也然其證有單肉蛾双肉蛾有重舌木舌胎腮有懸癰腫脹有裹外皆腫甚者上攻頭面皆腫大法先洗去口中舌上白胎其次掃去風涎

如此單双肉蛾可針則針有不可針者則用熏掺藥退後方依次用服藥如是木舌服藥之外仍用掺脈腫則用塗藥輕者但服藥而自退不須用針及藥點其瘡當自消也

又有腑寒咽閉別有治法

(如神散)治咽喉深在咽下針刀不能及者

膽礬(純緑者研細如粉)一呷調熏下白服不得者灌之即時吐下及喉閉等證

(油膏)治咽喉生癰藥未下及喉閉等證方

生麻油半斤(揀皂角浸去瀝拾錠用生絹濾去滓)

右灌此麻油即時瘡穿濃血吐去而愈

(黎盧散)治咽喉

蔥蘆　白礬火煅各叁錢　猪牙皂角叁條炙

雄黃壹錢　粉草　北薄荷各貳錢

為細末乾服少許如喉閉塞用竹管子吹入即愈

（吹喉散）治咽喉腫痛

右研極細末用一字許吹入鼻中即吐頑涎立差

（一字散）治喉閉氣塞不通欲死者

右為細末用半錢乾擦喉中如腫甚者用竹管子吹入

喉中如有物梗塞

雄黃壹兩別研　甘草生末壹兩

猪牙皂角柒錠　蝎梢柒枚

為佳

白礬生壹錢研　蔥蘆壹錢

乳香散治咽喉閉塞

乳香　青黛　朴硝
粉草　雄黄　朴硝　鵬砂
右各等分為細末乾下一字
白礬散（軟瘡）
白礬飛過兩　朴硝飛過錢
右為末銅筋點腫處再點瘡
（膽礬丸）點瘡
膽礬飛過錢　硼砂貳錢
用針
右為細末點腫處立穿穿則用合瘡口藥
（針法）用大銅筋頭禿尾帶粒米許尖利先用筋頭點軟瘡
藥三兩次看瘡軟硬次則用針針則用筋尾點藥少許

熟認腫處試就手針之庶患者不覺并不至針
訖用合瘡口藥
單麻散合瘡口藥
單麻子炙粟粒焙硝半錢
右細末研成膏每用少許冷水灌漱去之
南星散摻藥
絳礬煅 牙硝飛過 南星 薄荷
右各量多少爲細末水濕手點藥重摻腫處須用力摻
之至痛無害然後服藥
半夏散塗藥
半夏 南星 白僵蚕直者
右各用一錢用巴豆(赤粒去皮油合前藥細研用少許

生薑自然汁調塗外面腫處

(煙藥雄黃散) 雄黃研 巴豆五粒

右細研每遇急患不可針藥者用酒瓶裝之立減

裝火一炷焚之候煙起將瓶口角入一邊鼻中用紙覆瓶

獨附煎治腑寒咽閉六脉微弱

附子壹隻切成片

(蜜炙黃蘗甘味下須詳脉方可用

防風立効散治咽喉

右用薑炙胡 升麻

柴胡 乾葛

石膏生用 牛蒡子炒

北防風 麝金 赤芍藥 全蝎

甘草各壹兩 薄荷葉

半夏泡

赤伏苓　北細辛　川芎　羌活各半兩

桔梗　荆芥各貳兩

右爲末每服四大錢水一盞半葱頭一箇煎一盞食後

卧時溫服滓合煎服忌酒毒物候發散後又如

方解毒雄黄丸（湘中朱國擧家合施方往往輒效）

（治走馬喉閉方）

白僵蚕炒半兩　甘草生壹錢

右爲末薑汁調灌涎出立愈

（又方）白礬壹兩入巴豆貳拾壹粒捶碎去殼同煆礬枯去巴豆

右用礬末壹孛吹入喉中

（又方）焰硝枯礬末壹錢

右含化或吹入鼻中口出血以新水漱而愈

（治纏喉風方）

白礬　銅青等分爲末壹字吹入鼻即愈

（治咽喉閉塞不通方）馬屭亭煎濃汁灌之

（又方）巴豆二三粒去殼搥碎

右攤紙上捲作卷插入鼻一頭以火燒借氣即通

（治喉痺方）

元公章少卿説開德府士人擕僕入京其一日忽患喉痺痺脹滿氣塞不通命在傾刻詢諸郡人云惟馬行街山水李家可看治即與之往李駭然曰證候危甚猶幸來此不然即死何疑乃於筒中取一紙撚用火點着方纔刺於喉間俄吐出紫血半合即時氣寬能言及啖粥飲摻藥傳之立愈士人甚神其技

全蝎兩箇　山豆根貳錢半　猪牙皂角伍
雄黃壹錢　巴豆煨用柒粒柒粒同舂火
右爲細末每服半錢新汲井化水如兩柒粒去油生用
稠得所時徬噦下如口禁以巴豆油紙捻成條子燒煙
出爲度如覺不快更進無害
擂鼻自然口開却以酸黃子醋調用鵝毛拂患處疾涎

治喉痺雜方

治喉痺雜病既腫潰而膿血
流注曉夕不止寢食俱廢醫者束手適楊吉老求赴郡
守招立之兩子走往邀之至熟視良久曰不須看脉已
則無法也語畢即出子有難色曰喉中潰膿痛楚豈宜

食生薑立之曰吉老醫術通神其言不妄試取壹片嚼
我如不能進則舁去無害遂食之殊為甘香稍復加益
至半斤許痛處已寬痺壹斤始覺味辛辣膿血頻盡粥
餌入口了無滯礙明日招吉老謝而問之對曰君居南
方多食魚鰕鵝此禽好啖半夏久而毒發故以薑製之今
病源已清無服他藥予記唐小說載崔魏公暴亡醫梁
新診之曰中食毒僕曰當好食竹雞梁曰竹雞多食平
夏畜盖畜其毒也命捵生薑汁折齒灌之遂復活甚與此
相類類說

巧匠取喉鈎方

咸平中職方魏公潭州有數子弟皆幼因相戲以一鈎
竿垂釣用棗作餌登陸釣雞雛一子學之而誤吞其鈎

至喉中急引乃鉤以鬚逆不敢措
手魏公大怖令人遍問老婦必能經歷時有一老婦九
十餘歲言亦未嘗見此切料有智識者可出之請魏公公呼老婦責之
有一莫都料性甚巧令間魏公大咍曰聞醫者意也其莫都
誤吞鉤莫都料何能治之老婦曰吾子
料曾水中打碑塔添仰厄魏公曰試詢
之公遂召莫都料至沉思久言要得一垂盧及大念珠
一串公與之莫都料遂將垂盧剪如錢大用物攏四面令
軟以油潤之仍中通一竅先穿上鉤線次穿數珠三五
枚令兒正坐開口漸添引數珠捺之到喉覺手墜繫鉤處
乃以向下推其鉤其下而脫即向上急出之見垂盧錢
向下畏定鉤線鬚而出並無所損魏公大喜遂厚賂之

公曰心明者意必巧也意巧者心必善醫名醫錄

食鯉魚骨鯁方

滁州蔣教授名南金因食鯉魚玉蝉羹為肋骨所哽治哽藥如象牙屑用之皆不效或令以多少貫衆不以一盞半分三服并進連服三劑至夜一咯而出因戲云此管仲之力也名醫錄

治哽以類推(鸕鷀治魚哽磁石治骨哽亦各從其類也)

治哽之法皆以類推(鸕鷀治魚哽磁石治骨哽亦各從其類也)

髮哽狸虎(治針哽髮灰治)

類編朱氏集驗醫方卷之九

○婦人門

調經

(紅花散)治婦人女子經脉不通如血膈者二十服效

好紅花 細擘 蘇枋木 搥碎 當歸

右等分㕮咀每用一兩以水一升半先煎花木然後入當歸再煎服半升分兩服空心食前温服

(千金失笑散)治室女經脉不通

當歸尾 没藥

右等分每一大錢炒紅花酒面北呷之

(防風散)治女人經脉不勻氣血壅滯肺有風熱遂令遍身瘾疹紅紫成片肌肉頑痺皮膚粗澁或時瘙痒

北防風 川當歸 赤芍藥 牛蒡子 各壹兩炒 荆芥穗 壹兩貳錢 蟬殼 蔓荆子 白附子 生地黄 白僵蚕去絲 何首烏 白芷 甘草 烏蛇肉酒浸去皮骨焙乾 紫參米炒 各半兩

右件爲細末每服三大錢加至四五錢温酒調下如不飲以蜜湯調服終不若酒之有功

(神授散)調婦人經藥專治室女月經不調變生百病

誰家女子深閨裏 榮衛不調阻經水 免使成勞滯魂鬼

(神麴)麥蘗并青橘

（三稜）一味最深功能破血瘕與血積
味細羅溫酒下壯者貳錢少者壹
（一方留神麴作糊丸如梧桐子大
大聖散治小産下崩不止忽大渴飲水則吐藥食不進命在須臾一醫用後藥一服吐住
荆芥末半錢合大聖散用白湯點服
聚珍圓治婦人小産後虛羸百節疼痛不進飲食百藥不效者
文煎丸　卷柏丸　当歸丸　烏雞煎丸　巴戟丸
右五藥合作一藥溫酒任下兼服沉香荆芥散
加味四物湯治婦人經候不通口乾頭暈嚴醫云此肝血熱證

四物湯加菊花煎服立效

歸芎芍治婦人月候不通

陳皮　當歸各壹兩　元胡索壹兩

右細末糊爲丸每服五十丸米飲下

胎前

鐵罩散安胎孕

香附子炒黃壹兩　砂壹分焦干和穀炒六

右爲細末食後白湯點服如胎動出血用阿膠艾葉湯

調服

阿膠散安胎孕治腹痛或下血水張氏究原方

桑寄生採錢　阿膠炒半兩　艾葉貳錢半

右吹咀每服四錢水一盞半煎熱服不拘時
又方芎歸湯加桑寄生半兩名安胎散治妊娠從高墜下或為重物所壓觸動胎氣腰痛下血
縮砂不拘多少去殼取仁研
右為細末每服二錢熟透卻去皮斗內炒酒調下又塩湯米飲亦可不拘時信庵趙太師親授此二方用之果有奇效
六物湯妥胎和氣腰腹疼重惡露頻下大衍方
阿膠炒　糯米炒　黃芪　川芎
當歸　熟地黃酒洗焙各等分
右粗末生薑三片葱白一筒水一盞半煎七分空心服
瘦胎飲子白九月十月服此永無驚恐

香附子兩炒　甘草炙一兩
右細末米飲調二錢三
良薑湯治妊娠卒中惡腹痛悶絶
良薑　莪朮　各等分　右細末溫酒調下
育胎飲子治妊娠胎動不安或腰腹疼痛
覆盆子　阿膠炒粉　參錢炒　桑寄生　人參各貳錢　艾葉
白芍藥　當歸　各壹兩　甘草炙壹兩
右吹咀每服四錢水一盞半糯米百粒煎至八分去滓
芎藭散治婦人胎動下血不可忍
桑寄生半兩　芎藭　當歸各壹兩
右爲末每服二錢酒水各半煎服

(胎效散)治漏胎

五倍子一味爲末酒調下

(又方)用蓮子房消化以麵糊九湯酒任下

(加味佛手散)治婦人妊孕三月忽然心腹脹痛下血兩小堕臂者意其已下血訖必無胎了腹復脹痛如前服奪命丹琥珀散其脹痛尤甚遂服佛手散加(枳殼)見急後重白藥不效方梁國佐墨粟湯治婦人妊娠痢疾裏急後重百藥不效

墨粟殼　甘草　烏梅

右等分㕮咀白水煎服立效

(枳殼散)治孕婦不省人事謂之子癎

滑胎枳殼散生藕汁調下無藕則用蘿蔔汁生姜汁可

治産内小便不利心腹脹滿

葱白五寸燈心麥門冬各少許 刈荠七穗 薑五片 水二盞煎一盞不拘時發熱變成風氣攻手足抽動用金銀耳環并姜棗煎温服傷寒鼻塞用葱白五寸煎神應散治妊娠臨産腹痛成陣眼中見火

香白芷 百草霜等分 (新增)

右細末研勻每服三大錢以童子小便米醋各少許指研成膏熱湯調服連進二服即下

護胎法治妊娠時氣熱病

乾浮萍 朴硝 大黄炒 蛤粉炒 薑根

右爲末水調三錢貼臍下安胎解熱極妙 (新增)

竊謂妊娠之要可慮而難治者三其不必慮而不必治者一惑先入之言泥卜巫之說或因夢想而有疑或見聞而致危疑之念食息不忘則心氣失所主矣夫心主血血不調則神傷神傷則臨產之時豈復寧謐此其可慮難治者一也婦人女子性最執戀又多暗損不知事體或畏產逐而墮去則固幸也逐而不去之舉不思此等自有定數設至泣涕私求毒藥欲爲逐去之時豈可慮而不動未免憂懼日增或至氣致祥垂氣致異臨產之時豈復有美證者或去血而胞乾或心虛而神亂此可慮而難治者二也臨在產時務在使人不覺切戒揮霍以生異變

腰腹赴痛不可忍之後勿久坐以傷胞勿驚思以動血粥食頻進使飢飽適中扶護行立使筋力不疲勤用醋炭庶使產母臭不絕醋氣勿進酒藥產母素虛而易昏房戶周密無諸穢惡則產理安全無復他患偶然自惡經事之人及有人家久無產育一時不能諳歷臨事之時又無老成人多成擾霍未痛甚而藥已交進稍痛增而喧闗倉皇致信看待人言或破膜而傷枕遂致子母俱斃或奔心而不下或破膜而傷枕遂致子母俱斃緊詮之咎若此類者良醫東手藥石無功此其治者三也凡產育之後兒身壹下即服小黑神散或用童子小便調七寶散又其次如琥珀散遮其衣即下產後不暇喫藥只以本髮灸令其咀嚼心惡嘔噦衣亦即下

此亦良法亦有衣或未來停穿稍久恐瘦產母之力宜急且斷
臍帶以小物繫隘其子氣脉既不潮胞當自瘞雖淹延數日自壞產母心懷安泰亦不害人此其不必慮
而不必治者一也今之人每視三可慮而難治者則蹈之以不覺以產後衣不即下不必慮而不必治者往往舍
皇無措看生者至於綴裳無知妄用手取法則非惟衣斷
不下而母亡者有之矣豈不甚可痛也夫產經云母生子
疼痛喘急必致危困蓋為不斷帶而言也斷帶遲則有此
証只宜進奪命丹活血丹及參黑神散亦自然縮下必不殺
人產後母已虛乏宮戶傾損正恐藥食少入而陰冷下乘
亦自足以致血衝血暈之疾看生不知又欲用手採取以

損其腹家人設用虛言則未害也愚庸者得於傳聞真謂
手可採取請復以余令産母心內驚縮百無一活可不為之哀痛者
女經一時所親見者驗之慶元丙辰春本邑城上周氏生
他問即汲水自洗越七日績閒忽墮下一拳大如破衣狀
而血裹之前後見效如此不一而足壬戌之夏先子捐館
適後妣張氏有遺腹數月衆推大變已自耗傷氣血及期
産訖而衣偶未下予適在二百里外一日夜奔走抵本家
輕信里媼妄用手取法已不可抹痛憤徹骨思不孝之咎
無以自贖因遍閱産科猶未載衣下不可以斷帶而無必
死之證願鑒所見校勘諸方以告來者然猶未敢自以為
是遂於是年十二月二日默請于天地神祇如予有一慮

之得則乞明示夢響以決所疑
官府直舍據床卧病侍者環側余經營藥餌以進立妣
覺甦醒傍有一人云可謂孝子耳閒聞直舍外有數道士
步虛聲而寤是用殫心竭慮敷陳肺肝上以寫無窮之哀
下以抶無窮之失凡事之屢效敬縷數之使覩者
言之不文使觀之易悟有識之士幸無誚焉此論不知何
人所作但見其說甚通梁國佐傳

朱砂催生救危急

朱砂半兩研 乳香壹兩研

右爲末須用端午日取猪心血丸之如梧桐子大每服
一丸乳香湯下立產

催生湯 治婦欲產痛陣尚疎難產經三二日不生胎死腹

中或產母氣之委頓產道乾澁覺痛窘破水便可服

異功五積散

右細末每服一大錢溫酒下若覺熱悶以新水調白蜜入醋一合煎能飲者加酒半盞近代名醫以五積散易名催生湯用之多驗黎景仁以爲若寒月用之甚爲的當隆暑之時恐難輕服不若以五苓散用葵子燈心煎湯調下却暑清魂滑胎易產所施輒驗如胞漿先破則胎乾難產用白蜜生麻油等分浸以熱酒令虐爵香散治產難橫逆生

虐爵香壹兩用清布裹火煅令紅以乳缽研

鹽豉壹兩燒

(二仙膏)救婦人産難橫生倒産一切危險不能産及死胎不下者親試有效

真麻油　好白蜜　各半盞煎沸急取起候温作一服即時下

右二味各半盞煎沸急取起候温作一服即時下

(又方)催生

蛇退皮壹條燒灰存性榆白皮煎湯調下

(催生神驗散)胡氏經効方(新增)

産婦坐草時取路傍舊草鞋一隻用皁絡小耳繩燒灰温酒調服如得左足者男右足者女覆者兒死側者有驚自然理也此藥似非切要催生極驗

治胎死腹中用(葛)葛爲末熟水調下

下死胎

又方下死胎用朴硝爲末以二錢温童子小便調下

又方単桂爲末

肉桂飲下死胎

右每用麝香當門子一粒同研温酒調服須臾如手推下

産後

黒龍丹 治婦人産後一切惡患諸疾垂急者妙不可言

當歸 五靈脂 川芎 良薑

右各等貳兩生乾地黄各貳兩

右各浄洗剉入砂合内以赤石脂泥縫再用紙筋塩泥固濟以炭十斤煅通紅候冷取看如黒糖色乃藥成也細研再入百草霜伍兩硫黄

乳石壹兩琥珀九燒通赤以生童
子小便半盞攪調投藥于中研化頻服產後
灌之難產者服之立生血氣自然汁無灰酒各壹合童
便半盞攪調投藥于中研化頻服產後
灌之難產者服之立生血氣攻衝灌者即下此方張提
治產後敗血衝心氣喘命在須臾宜服此
血竭散
真
右細末三錢温酒調服病勢危篤者盡貳兩可活一人
乃產後敗血衝心皆因惡露不下始則胷中微滿動加
喘急不治以致死者為難治產寶所載諸方皆無如此藥神速宜久
蓄之以備急用
醋墨法治產後破血
經產用好真松墨半錠火燒赤投醋中如此三遍地

上出火毒研羅細每服半錢淡醋湯調服

一百草霜散 治產後下血不止

細麪 微炒 一百草霜

右二錢用無灰好酒調服極妙

團參散 治產後惡血未盡渾身增寒發熱小腹刺疼痛心氣膨脹不納飲食面目虛腫脚手浮腫耳聾眼暈腰痛

乾薑炒 三錢 蒼朮 天仙藤

川烏 北白芍藥 北細辛 各一兩 甘草 麻黃去節 壹

右㕮咀每服三錢薑五片棗一枚荊芥七穗水煎七分通口服病者只喫白粥及猪肝此藥臨產斷手却服三日趕惡血盡畢亦可以暖藥補之即用後青棗散養新血此方乃黃常卿家本

柑皮湯治産後發渴經脉過多發渴者亦治

柑子皮焙乾

右爲末白湯調三錢許服其效莫述(千金方)(三)産後發

稻附飲治産後瀉

甲子歲趙蓂公傳于金陵

酸石榴皮米醋炒

右爲末每服二錢米飲下

香附子

單方治産後虛汗

右一味爲末每服二錢米飲下

防風不以多少麩炒赤色爲末煎猪皮湯下

雙倶散治産後腰痛

石膏壹兩當歸半兩

右爲末每服三錢熱酒調下空心

烏藥散（治産後腹痛
天台烏藥　杜當歸
白芍藥（治産後鼻衄
白芷
右爲末冷水調敷在紙上貼鼻心而效後用燈盞數隻
熟湯煮過數時更替覆頂心（劉司傳云有奇效
枳木湯（治産後心腹堅大如盤水飲所作名曰氣分
枳實壹兩半　白朮參兩
右�once咀每服四錢用水一盞半煎至七分去滓服
（治産後咳逆方
石蓮子（拾箇炒熟丁香拾粒
右細末用水三合煎拾數沸温服

孤鳳散治產後閉目不語
沒藥散治產後百疾
沒藥 血竭各等分
右細末每服二錢用童子小便合酒半盞煎壹沸温調
下總產一服上床良久再服其惡血自循下行更不衝
上免生百疾梁氏總要方

血氣 附諸痛

十味養榮湯治婦人氣血不足臍膜疼痛月水不調
熟地黃酒洗 黃芪蜜炙各貳兩半 牡丹皮炒
肉桂去皮 白芍藥炒 白茯苓各壹兩 當歸酒浸
五味子

川芎 各壹兩半 甘草炙錢

右㕮咀煎服

沒藥散治婦人血氣疼痛

沒藥 紅花 元胡索 當歸

右等分細末酒併童子小便下

四神散治男子婦人一切氣痛不可忍者

甘草炙 各壹兩 香附子壹兩半 炒

良薑煨

右爲末每二錢酒調服煎亦好水瀉紫蘇生薑煎赤白

活血飲子治婦人血氣衝心

當歸 昌蒲

右二味等分爲細末酒調下一錢

香桂散治婦人血刺心腹疼
當歸　肉桂各等分
右爲末每服二錢水一盞入醋少許煎七分空心熱服
通膈散治婦人心腹刺痛寒熱往來
蓬朮　延胡索　北芍藥　當歸
川芎　甘草　牡丹皮
右等分細末每服貳錢薑酒調服
分經散治婦人血氣心痛及經血不通
並皆治之
紅花　蘇木　乳香
敗薑　薑黃　當歸
川芎　木通　甘草

生地黃　元胡索　牡丹皮　淩霄花

右爲細末每服二大錢空心温酒調下一日三服加血竭玳瑁屑各半兩

大烏金丸　治婦人心腹刺痛身體疼痛心惡產前產後惡露不下疼痛不已如經盛行則去白芍延胡索

當歸　熟地黃　白芍藥　川芎

附子　肉桂　沉香各壹兩　乳香　縮砂仁

粉草　香附子　延胡索　蒲黃　丁香

敗姜　白芷　白芨各半兩　薑黃　白朮各貳兩

檳榔　白茯苓　人參各貳錢

沒藥

右細末酒糊爲丸如彈子大百草霜爲衣每服一粒當

歸酒下或嚼薑嚼下或作梧桐子大則加丸數真有奇效

元胡索散(治婦人血氣攻心痛不可忍併走注腰痛)

蓬莪朮半兩麻油煎乘熱切片子元胡索貳錢半

右細末每服淡醋湯調下空心

加味建中湯(治婦人小腹痛)

小茴香煎見效者建中湯加當歸琥珀末煎諸藥不愈遂服

神保丸(治婦人小腹痛服諸藥不愈又有婦人小腹痛服經進

神保丸利數行而愈此不可不知

金露丸(治中年婦人氣衝心小腹痛飲食不納脉沉緊左尺虛遍藥不效)梁國佐方

神功八味丸(治中年婦人氣衝心小腹痛飲食不納脉沉

蘇子降氣湯下八味丸此藥自合方好
加味四物湯治經候不調腹中疼痛或脚氣
單方治婦人遇月經來則小腹痛脚膝疼遍服藥不效
香附子半酒半醋浸
并醋一合煎立效
少附子併此藥服梁國佐已效方
右爲末或爲丸任意空心下病猶未除後用文膠湯加
良薑麻油炒蒼朮盐炒
香附子各等分炒
右爲末用燈心煎湯空心調下
加減四物湯治婦人慾念不遂心膈迷悶刺痛
香附子元胡索各半兩
橘紅

二妙散治婦人血崩

平胃散四君子湯各一貼先合煎數服然後喫後藥

三灰散敗棬灰 棬木葉 樓皮

右化灰存性每服二錢酒煎至七分空心服要爲丸酒

煮糊丸黃丹爲衣

四神散

胡椒肆粒 血柏樹根 嫩者壹兩

細葉禾甌根壹兩 甘草半兩

右吹咀每服二錢酒煎三沸通口服大忌雜鴨子及一

切毒物三方得之周道人親見其醫數人不可以草藥

輕之

（五倍散）治血崩奇絶

五倍子半生半熟等分爲末冷水調二錢空心服即效

（荆芥散）治血崩年深只一服存性　荆芥根尤上焙乾焦黄　甘草炙　當歸　川芎　白芍藥　生地黄　熟地黄　阿膠炒珠　艾葉炒　香附炒　白朮　白茯苓　白芷　川續斷　黄芩　黄柏　黄連　地榆　荆芥穗　白薇　白蘞　白及　側柏葉　蒲黄　烏賊骨　貝母　各等分　每服三錢温酒調下豊泉梁國佐方

（獨勝散）治血崩累收效

右爲末酒糊丸空心服

（單方）治婦人月崩諸藥不效

右爲末酒糊丸空心服

五靈脂拾兩用酒淘去沙石熬成膏

右入神曲貳兩爲丸每服三五十丸空心温酒下兼服

（四君子湯）加肉豆蔻并和氣藥

(平胃散)治血崩遍醫不效一道人用後藥服之有效

平胃散炒其中厚朴一味焦炒如
單方治血崩不止　依本方

定器椀楪不拘多少極細爲末

右以糯米糊爲丸每服二三十九米飲下

(加味平胃散)治婦人脾血不固崩漏

平胃散五貼用酒煎焉籃草空心點服

(王芝散)治血崩　莊制屬經驗方

香附子半生半熟　代赭石

右爲末用酒調下大段崩者煎服

(又方)感應九　治連貼二寸長剖開安感應九

在內浸濕紙裹煨待熟細嚼無灰酒下甚妙

（加味佛手散）治血崩
佛手散加薄黄服之取效
（如勝散）治血崩
撹櫚燒烏梅乾姜各一兩並燒灰存性
右細末二錢烏梅湯調下空心服久患三服愈
治血崩經驗散
香附子半生半炒入代赭石爲末白湯調下大段崩者甚驗
（沒藥散）治婦人月信退出皆爲禽獸之狀似來傷人先將
綿塞陰戶只頻服
（沒藥膏）壹兩餘作九散皆可服即時愈
出張氏雜峯方頻有莊家急切錄此病此危甚以此與莊即甚

（小陰丹）治婦人赤白帶下月候不調諸虛不足

當歸 白芍藥各兩 白朮肆 白茯苓

蕎本 白芷 延胡索各壹兩 沒藥各貳錢 甘草炙

牡蠣煅粉草鞋包煅各半兩 人參 白朮 茯苓

南木香各壹兩 赤石脂煅淬 大附子壹兩炮去皮臍 香附子貳兩

右細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸空心酒服

（石脂散）治白冷精帶下陰脫出或青黑黃白弾下攻痛腹隱頭旋眼暈耳聾啾啾痰上壅

赤芍藥炒 乾薑

煎阿膠芎湯尤妙若要順氣加茴香

白芷散治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至腑腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此藥排膿載本草行義

白芷壹兩　單葉紅蜀葵根貳兩（無則以蘇古苗代之）

白芍藥　白蘞燒枯（別研）各半兩

右細末同以蠟丸如梧桐子大空肚米飲下十九或十五丸

伍九候膿盡仍以他藥補之

黑附散治血海虛損淋瀝不斷心腹疼痛或產內用力過度或產內使性氣或食生冷

烏梅各壹兩（椒閉貳兩燒存性）

右細末每服三錢陳米飲調下煎烏梅湯下亦得如血

過多阿膠艾一塊水一盞煎至七分空心服

增損四物湯 治婦人諸疾

當歸 白芍藥 川芎 熟地黄各伍兩
右爲㕮咀每服三錢水一盞半煎八分去滓無時通口
服孕婦下血腰痛加阿膠艾葉各壹分煎○產後虛弱
血臟不調口乾渴飲水加瓜蔞麥門冬各壹錢用○腰
痛惡露不下加當歸芎藭各壹錢或加没藥各壹錢○血崩不
已加地黄蒲黄各壹錢柴胡半兩○身熱脉大項強大便秘澁加大黄貳錢桃仁壹分炒○泄痢加柱

附子各壹錢○寒熱加乾薑壯丹亦名藥各壹兩○嘔吐加白朮人參半兩○腹脹滿加厚朴枳殼實各壹錢虛煩不得睡加竹葉人參各壹錢○渴加知母石膏各壹兩○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各壹錢半表裏俱虛加柴胡防風各貳錢已上並用水煎服

虛煩狀似傷寒加人參乾地黃各壹兩治產後衆疾如神○加防風熟乾地黃各壹兩治男子婦人諸般風氣毒瘡○加地骨皮貳兩白茯苓各壹兩治男子婦人骨蒸勞氣此方乃養守元氣

得之從巢先生大有神效直高道貴云患風疾及渾身燥痒糯米煎性熱加荊芥前服即愈○治婦人慾念不遂心腸迷悶刺痛每服一貼加橘紅香附子元胡索各半兩

煎　治經候不通腹中疼痛或腳氣衝心加琥珀煎見效并醋一合煎立效○治婦人血熱生瘡加地骨皮香附子煎服○治婦人血旺腳痛加五加皮煎服○治婦人血熱加菊花煎服立效○治婦人百病大有效驗

人經候不通口乾頭暈是肝血熱加吳茱萸若陽臟少使陰病吳興周端仁云加紅花通

治婦人百病吳興周端仁云加紅花通

煎服效

(繹皮丸)治婦人百病大有效驗

當歸四兩浄洗好酒浸壹宿焙乾再浸酒盡爲度

人參　白芍藥　白朮　赤芍藥

白薇　五靈脂　附子　肉桂去皮

青皮各貳兩

牡礪煅　赤石脂

香附子炒 牡丹皮去木 蒼木
敗醬 蓬莪朮 劉寄奴
艾葉 京三稜 澤蘭
蒲黃炒 澤蘭 生地黃乾
右件將蒼朮敗醬陳皮青
澤蘭小薊雄黑豆等等拾味用好醋煮藥候黑
醋少又添煮為度 豆爛熟為度
九如梧子大每服四五十 丸空心姜酒或艾醋湯下有
孕不可服
雞白湯治婦人血虛勞倦
鹿角膠 當歸
黃耆 肉桂
木香 白朮

白茯苓　鱉甲醋炙　秦艽　川芎　川巴戟
柑子皮久陳者壹兩　牡丹皮　天仙藤　甘草各半兩
人參貳錢　枳殼參錢
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑九片薤白三寸煎七分去滓空心服
歸艽圓治婦人平生無子服之屢驗蔡相藥方
生地黃淨洗各壹斤　童壹散法浴壹宿銀器各炒乾入後藥
白芍藥　白茯苓　當歸各去蘆浸貳兩
熟艽　延胡索
上為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空心酒下一日三服
右除艽葉外各焙乾為末入前件地黃生薑作一劑煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空心酒下一日三服
小黑神散　又名勝金散　治產前產後皆可服大能治血定

痛消逐利積亦治橫逆

香白芷炮半兩 百草霜細研貳錢半

右二味和勻每服二錢酷湯熱服如橫逆用童子小便好醋各一盞茶脚百沸湯四五分服二方等分白芷生用

腰脇痛

虎骨散治婦人腰上實肉處痛不可忍

虎骨散用麝香酒調服遂安

虎骨散治婦人脇痛凡藥不進

香附子 雖一兩黃子醋一盞煮乾為度 內桂 二銖 炒

右細末每服二錢沸湯調無時服常一婦人年八十餘

白芍藥

頭痛

靈砂丹有婦人頭痛惡風發熱六脉沉取無根浮取却有醫者謂之虛證

靈砂丹以人參一二兩銀銚煎湯空心下十粒五更天明則愈矣

（加味補虛湯）治婦人頭痛發熱多汗六脉虛細尺脉或絶作血虛治之服後藥見効

术附湯加川芎先服下全蝎丸内補丸次服

又服虛寒湯神术散

芎歸湯治婦人頭暈痛諸脉平和惟肝脉獨弱預見崩疾

芎歸 當歸

右�once咀煎服

○嘔吐

開胃丸治婦人嘔吐不止出聖惠方

半夏叁兩湯泡洗次以生薑叁兩去皮同杵令爛焙乾
白朮炒　陳皮去白各壹兩人參壹兩半夏曲壹兩白豆蔻去皮
右爲細末生薑汁煮粟米飯丸每服三十丸米飲下

厚朴丸治婦人胃冷嘔吐不下食

厚朴叁兩去皮　附子叁兩去皮臍
半夏湯洗七次　白豆蔻去皮各壹兩
右以生薑汁盡焙乾杵細爲末以酒煮神曲爲丸每服三十丸無時温酒下

○發搐

鹿茸丸治婦人虛弱服剛劑太過發搐劉立之云肝血不足之故今搐搦不已宜服此茸丸數服而愈

烏金散治婦人諸般發搐二三山曾試方

眞川墨乃松煙也磨酸醋緩緩啜兩呷即効

有婦人産後頭搖目不開服之便住次用豆淋酒一味

封過一宿次日兩服好

四物湯加紅花煎服見效

紅花四物湯治婦人膏疼又如癲癎劉立之云是血證

八味丸治婦人大小便祕澁更數醫不效劉立之云此血弱不能榮養臟腑津液枯澁遂服

八味圓數服而愈

○便祕

○怒氣傷肝

橘歸丸治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失

常經所以如此服後藥兩日無事

橘皮貳兩　當歸壹兩

右爲細末蜜九溫酒下

○脚氣

三聖散治婦人脚氣遇發吐水至一桶粥藥不下醫用三聖散見効

生料五積散　治中湯　嘉禾散

右三藥合和而爲一隨意水煎服之陰證方可用

○病妊

妊癰瘡

黄瓜婁壹貳箇連皮穰子搥碎

右用無灰常酒一二升於沙瓶內煮存一升去滓時時
温服酒盡再煮滓服如覺初時便服此藥即住
不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿其痛自止
妳結硬凡未成瘡總覺腫硬作痛以葱早尅之其法用中
樣小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿平
瓶口以葱葉及葱白鎚損令偏覆瓶口以手帕子裹定
倒執將瓶口向腫處任意輕輕尅之有驗薰貢元方

六甲胎神禁忌圖

衡官宅施

產母禁食

凡妊娠經五箇月食兎肉兒缺唇食雀肉兒目盲食鴨子
兒倒生食鱉肉兒項短食驢肉兒過月食乾姜蒜麪令胎

不安

逐月胎神

正月床一云房及酉方　二月門一云房及酉方　三月戶及未方一云窓

四月竈卯一云方　五月身一云丑方　六月竈一云君屋及亥方

七月碓磨一云子方及巳方　八月廁一云窓及未方　九月門一云堂及巳方

十月戶卯一云方　十一月竈一云墟及丑方　十二月床一云房及亥方

逐日胎神

寅申日　巳亥日　子午日　辰戌日　丑未日

卯酉日　大門　竈　碓　廁

子午卯酉日向吉方　生子所向吉方

寅申巳亥日向西南方

辰戌丑未日向東南方

陽月宜天德方　逐月安產室吉方

陰月宜月空方

橫看　藏胎衣方

天德乙　正二三四五六七八九十十一十二

月德丁坤壬辛乾甲癸艮丙

月空丙甲壬庚丙甲壬庚丙

生氣壬庚丙甲壬庚丙甲壬

遊魂子丑寅卯辰巳午未申

床房帳爐箱籠門廁房帳爐箱門

類編朱氏集驗醫方卷之十

小兒

辨小兒虛實

面紅如桃花色大者黃稠小便清徹手足和暖乃表裏俱實其子易養也不宜服藥恐傷動脾胃嘔妳泄瀉而生驚掣可服鎮心涼藥有七

面紅色乃為童顏外實也不宜服涼藥也

不宜服涼藥有七

嘔妳腹冷　腹脹腹痛　煮青色　面胱白

足經妳乳　眼珠青　脉微沉

不宜服熱藥有七
足脛熱　兩腮紅　大便秘　小便黃
渴不止　上氣急　脉緊急
小兒驚風二證方書中未嘗分析詳細蓋驚而通言熱極生風殊不知寒暑燥濕之極亦能生風見兒作搐不察形氣虛實便用牛黃朱砂腦麝之劑以致不救者多矣蓋真氣者元陽也其藥性溫則固養元陽冷則敗傷真氣故宜用溫中下氣藥治之
以上並宿州陳氏方論

形色歌曰

火色紅傷寒　青驚白色疳
黑時因中惡　黃即困脾端

辰砂丸 治咳嗽安驚化痰

辰砂研一半爲衣 一半入藥

南星壹兩去皮臍切作片 再用雪水煮焙乾

右細末糯米粉煮糊爲丸如小菉豆大每服二十丸臍

荼薄湯下余長雖感患三年服之而愈

蜈蚣丸 治驚風

白附子 天南星 赤脚蜈蚣 防風 半夏

右剉碎諸藥剔地一小窪用炭火煅煉約半日一日尤之用瓷盆一隻快捉蓋住以泥封四圍至次日相對方

白礬枯 白附子炮 半兩 各

大半夏壹兩 生薑自然汁作餅炙生

取出焙乾研碾爲末用猪心血研爛同蒸爲丸不拘丸子大小用薄荷湯下仍量小兒大小投藥余年七歲感患得此方而愈神効巨言

龍齒散治小兒驚悸夜啼

龍齒　茯苓　白附子炮　蝉退　甘草

右等分細末每一小錢薄荷湯下臨卧服尤佳

防風導赤散治小兒初驚

生乾地黄　川木通　甘草各等分

右生用㕮咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎

寧神膏後用此藥

防風　朱砂各壹兩　麥門冬去心半兩　麝香壹分

右碾細煉蜜爲小餅子每服一餅臨睡同薄荷湯化服

一夜一服(三方)何統制智大云昨在江州日兒子偶有
驚作遂訪一老醫求藥劑服三服隨即全愈遂師問之
渠云三代人有四五藥加減人無數且
如驚搐多是熱證若首先便用驚風藥(白附子)(全蝎)(姜)
(蚕)(川烏)之類便成壞證家中驚藥只用(導)赤散加(北)防
(風)進一二服導去心經邪熱其搐隨手便止次服(寧神)
(膏)是家傳此本自後常以此二藥救人取效甚多
羌活(羌活)(膏)祛小兒驚風定驚

羌活　防風　川芎　茯神去木各貳錢
茯苓　白朮　白附子炮　全蝎　薑蚕姜汁炒各壹錢

右爲末煉蜜爲丸每服紫蘇豆大麥門冬薄荷湯化下

（羌活丸）治風熱化痰安驚

羌活　荊芥穗　白朮　甘草　白附子炮　川芎　防風　桔梗各半兩

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大每服一丸至兩丸薄荷湯化如涎盛加膽茶湯下此方最穩

（防風天麻散）治驚風頭疼

防風　天麻　川芎　白芷　甘草　川烏壹箇炮　麻黃去節

右等分細末葱蜜湯下薄荷湯亦可如驚搐加（全蝎）壹箇（白附子）（虌香）各少許（羌活）煎湯下無不効

(六神丸)治小兒諸疳極妙

木香 濕紙裹炮 黃連去鬚 神曲炒
川練子肉 蕪荑炒 麥蘗炒

右等分爲細末猪膽蒸熟爲丸如麻豆大每服三四十九看兒大小加減不飽服

蘆薈圓 治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿頭髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土寒熱往來目澁口臭齒斷爛黑常服長肌肉退黃殺蟲進乳食

新增

乾蝦蟆去腸肚 大皂角各壹兩三件燒存性爲末 青黛一錢半
朱砂各壹分 射香

右合研勻用湯浸蒸餅爲元如麻子大每三歲兒叁拾
圓温米飲湯下不拘時以兒大小加減
治疳勞四肢小腹大者毛髮落思面黃小便似泔
雄猪肉一斤重五斤重使好石灰置在新飲食者是
瓦上使物盖一夜用糟燠熟取出去石灰一日洗去
潔效後服利水飲（新增）
治五疳黃瘦不生肌肉肚脹多筋頭髮焦黃不思乳食羸
中有蟲米穀不化小便如油睡中盜汗
蘆薈二錢史君子柒箇去殼木通炮壹錢檳榔炮壹
（新增）
黃連去鬚炒貳錢蕪荑炒去膜壹錢青皮炒壹
龍腦草炒壹錢雷丸剉炒壹錢
右件爲末猪膽汁蒸過爲元粟米大每叁拾圓飯飲
送下

六妙丸　治疳積　　蘆薈丸
保童丸　　化蟲丸
肥兒丸　　蚵蛲丸
右各一貼合和爲丸隨兒大小加減服湘中翁仁壽方

六神丸　（新增）

鮓湯圓
南星　乳香
青黛壹錢　輕粉貳錢　金銀箔五斤　巴豆去十六粒心
滑石　白丁香
錫末先將水銀入手那碎紙上溶
右爲末糊圓如粟米大每參拾圓薄荷湯下治疳積鮓湯

三聖圓　治疳積　（新增）
黃連三錢　木香半錢　使君子二錢
下脹蒲黃香湯下赤白痢甘草湯下瘧疾桃柳枝湯下

右爲末糊圓米飲空心下

龍膽丸治小兒疳病發熱

龍膽草去蘆 黃連去鬚炒 青皮去白 史君子炒去皮

右等分爲末猪膽汁和爲丸如小豆大每服二十丸以

肉棗丸治小兒因疳而瘡侵口鼻

肉棗兩枚去核入青礬如核大在內以火煅存性爲

末入麝少許油調塗親用有效

黃連散治小兒頭上疳瘡

黃連一枚用盞子擘開傾膽汁在盞內看汁多少

猪一枚用盞子擘開傾膽汁在盞內看汁多少

入好麻油如膽汁許以乾竹煎令香熟入鷹爪黃連

細末調令得所傅瘡上曾用有効

積

(丁香丸)治積熱傷寒

烏梅壹箇切片用
巴豆兩箇去殼用箬包打
丁香叁箇
縮砂仁肆箇去殼
右除巴豆外為細末入巴豆研勻却用研細百草霜和勻
麪糊為丸如小豌豆大一歲一丸米飲下積塊不妨常
服有功

(六味三稜丸)疇明仲云五六箇月小孩兒未喫穀食有癖積者保安丸太重尺服此六味為佳

三稜煨
莪朮煨
神麯炒
麥蘗炒
青皮
陳皮

右等分為細末水煮清糊為丸熟水下
（丁皮散）治小兒脾積疼痛有效
丁皮　白木　茯苓　青皮
陳皮　良薑　縮砂　神曲
麥蘗　甘草　眞桂心
右各等分為末燒鹽湯點服
（褐圓子）治傷食膨脹
蘿白子炒　莪朮炮　各壹兩
胡椒半兩　（新增）
右末糊圓蒜豆大每拾伍圓不拘時煎蘿蔔子湯下
（五積圓）治左疳勞諸積　（新增）
南星去風積川乙金去驚積　巴豆去油積　肉桂去皮
姜蚕等分　去熱
右為末　史君子為
右麪圓粟米大蘿白子煎湯空心下

熱

解肌湯（去節）
麻黄半兩　人參
獨活各半兩　川芎
每一錢水半盞薑
三歲以下二歲以上一服作二服

人參羌活散
川獨活　羌活
柴胡　川芎
甘草各壹兩　前胡
天麻酒浸炒枳殼壹兩麩炒
各半兩

右㕮咀每服一錢水半盞薑一片薄荷一葉煎三分去滓
北芎藥
白茯苓　人參
地骨皮　桔梗
右㕮咀每服一錢水半盞薑一片薄荷一葉棗半枚煎

三分瘡未發之先亦可服二方極穩

羌活散（散風邪止驚搐退熱解肌）

羌活　粉草　川芎各貳錢　荆芥穗　白蘞蚕炒　天麻生　茯苓　白朮　全蝎半錢炒去刺　白附子炮各壹錢　桔梗貳錢半　防風壹錢半　天南星壹塊炮

右爲細末薄荷湯下如傷風皐塞流清涕或嗽氣促桑白皮煎湯下常服白湯亦可

和解散（治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁皐塞多涕驚悸自汗肢節疼痛及豆瘡已發未發皆可服）

羌活　防風　川芎　甘草　乾葛　升麻

右㕮咀每服三歲小兒一錢水三分盡生薑半片棗子半箇同煎二分去滓服不拘時候

小麥煎湯治小兒夾食夾驚傷寒正受傷寒咳嗽夜熱晝涼傷風瘡疹之疾大効

麻黄半兩去節湯泡白朮炮乾葛參錢半白茯苓甘草各貳錢半

右㕮咀每服二錢水一盞入麥子二十一粒同煎一方用葱白二寸煎服

天麻散治小兒傷風鼻清涕鼻塞咳嗽身熱並皆治之

天麻 防風 甘草 白芷 麻黄去節 川芎

木香散能和表裏通行津液

右等分爲細末葱湯食後服

木香　大腹皮　官桂　前胡

陳皮　半夏　丁香　呵子　甘草　人參

右爲麁散每服參錢水一大盞生薑二片煎至六分稍縮砂各叁錢

赤茯苓　甘草

右爲末每服量兒大小以意增減

甘露散治暑驚風潮熱不退

寒水石　石膏　防風　荆芥

薄荷　甘草

右爲末每服半錢用井花水下或薄荷湯調下

新增

桃花散治驚風潮煩悶

天竺黄　白伏苓

朱砂　腦麝

右爲末每一字薄荷湯下一日二服

新增

觀音散 進食神効

白扁豆 微炒 石蓮肉 心炒去 人參 焙各壹分 茯苓壹錢半
神曲 炒 貳錢 甘草 炙 白芷 木香 炒
黃芪 炙各壹錢 搥碎 蜜水拌

右爲末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢用水一藥注或半銀盞棗子半箇煎十數沸服

六君子湯 治脾虛胃弱生風多困

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 麴 炒 沒石子

右等分爲末水七分盞入冬瓜子少許同煎

（長生丸）寛上實下補脾治痰以下並出宿州陳氏方論

木香　檳榔　枳實各炒壹兩　丁香　半夏　縮砂　肉豆蔻各壹錢各參　仝為末次入肉豆蔻研為細末飯糊為丸黍米大一週兒服五十丸隨乳汁下粥湯亦可

肚空服訖候半箇時得喫乳食日進兩服量兒大小以意增添丸數　吐乳食者胃中有冷也　乳食不消化者脾虛也　大便酸臭氣者飽傷也此三項並宜多服長生丸妙

（醒脾散）治慢驚吐瀉不止　新增

肉豆蔻　檳榔各壹箇　胡椒二十四粒　伏苓二錢　木香　藿香各壹錢

右為末每一錢用水一盞煎温服

丁香散治小兒吐乳傷食

丁香　石蓮肉

枇杷葉生姜汁炙熟

右等分細末米飲湯調下自然

白朮散治小兒嘔吐兼治冷痢常服此藥調理三焦大進飲食

白朮　丁香

肉豆蔻麪煨　陳皮　甘草

右等分細末白湯調下慢驚沉困冬瓜子煎湯下若見水即吐進藥不得吐止用棗子點藥乾喫

調中散治小兒調氣主脾及治吐瀉

人參　白朮

茯苓　甘草

訶子煨　陳皮
黃芪蜜炙　木香
右等分爲細末白湯點服
藿香散治小兒臟府不調作瀉青黃黑白乳食不消薑中有凍如雞子清兼暴瀉如水其證肚痛微熱面唇黃白此藥治之慢驚或偏墜紅腫內吊紫蘇湯調下三五服痛止宜用此藥
陳皮　木瓜
藿香葉　白扁豆炒
厚朴姜製　罌粟子炒
枳殼麩炒　乾紫蘇葉
甘草
右等分爲細末陳米飲調紫蘇湯下棗中有黃白凍子木瓜并白梅去塩煎湯下如痢止用棗子煎湯下大能和胃進乳食此是小兒常服藥
(塌氣丸)治小兒脾虛臌脹或瘧瀉黃瘦

木香貳錢半　青皮去瓤壹兩
胡椒各半兩　全蝎伍箇去毒尖
巢撥
右爲極細末稠醋糊和丸如黃米大一週兒服五十丸
用乳汁下粥湯亦可肚空服服訖候半箇時得喫乳食
日進二服量兒大小以意增減宿州陳氏方
佳
訶子
甘草
地榆散治諸般瀉痢血痢尤佳
地榆
甘草
右等分細末鹽米湯調服小兒吐乳下痢不止
大理中湯治九兒米飲下湘中陳伯尹用之有効方
大理中湯入雪糕作細丸
豆蔻散止瀉新增肉豆蔻壹箇麵煨箇青皮
木香　白朮　甘草壹錢　陳皮
草巢壹箇右爲末米飲下

疹豆

一小兒疹豆蓋因在胎時食母血穢生下口有餘血生婆取去不盡啼發聲則入腹遇天氣温熱搏動而發所以大小皆須一出若遇久晴暄暖間有病此其未病者可預服三豆湯能令不發

一此乃熱病熱極生風或發驚搐但當通心散熱切不可投冷驚藥及着艾蓋灸則火助熱熾投冷驚藥則毒氣內伏久爲大害

一人多用升麻飲然當明其已發未發之說方其未發及其結痂有諸般熱睡皮膚無迹疑貳之間謂之未發

證謂之已發此二證可服亦不可多若總有形迹及瘡未乾謂之正發則不可服盖升麻性冷比犀角服多必致陷伏動臟腑況未必有穿者

(二)最忌諸般臭穢煎炒油煙父母行房等犯觸未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切宜禁戒仍燒帶諸香及打醋炭以防之不可以田舍兒不忌為常法

(三)醫書有飲酒法為天寒氣怯者設若天熱氣旺則不宜飲酒法為天寒氣怯者設若天熱氣旺則發瘡班爛大渴泄瀉本草云酒乃醞釀而成有大熱毒此是熱毒病豈可又飲熱毒物

(四)病此者多不服藥豈知未敢已發則合鮮散正發則合活氣血若依此非惟出疎亦易乾斂仍免後慮若不依

此則邪盛瘡窓收亦費力餘毒爲患致便生血癰疽亦
（二）病若經曰請醫至當先詢病源然後脉視庶無差失東
瘡赤眼咽喉口瘡之類
坡言之詳矣醫家亦當尊
病腥臭其肯詳視者幾何人哉克儁家世講習療病垂
三十年熟視此弊今撮方書要法以爲勸使無夭枉之
失幸矣
（邵倅劉開國大任奉施）小兒豆瘡保生方併論
多有人不會醫小兒豆瘡保今具撮法印施如信用之者
大凡小兒未見出瘡先覺發熱而大便閉小便赤未審委
爲豆證者但與升麻葛根湯及（十神湯）以解輕其腸胃

中之熱毒

若豆瘡既分曉却有三證一曰好證二曰常證三曰危證

今逐項具之（瘡不透而肚實者可泡紫草湯量大小與之能解毒透肌若肚滑者不用服）

（一）好證若乳食與大便如常或一日一次或兩日一次通者此為好證不須服藥亦自愈如要服藥只平和不冷不熱自保十全

（二）常證出豆瘡而大便閉小便赤者此是常證可多服升麻葛根湯若大便閉至三日不通者於葛根湯加陳皮壹錢紫蘇葉數片煎與服之數次又過日不通者宜以麻葛根湯加陳皮真方（四順清涼飲子）

右四味等分煎與之服一錢重歲兒且服一錢當歸

赤芍藥

大甘草

熟大黃

加半錢若五歲兒已上每服二錢重若未滿
但要大便通毒氣出即安
(二)危證出豆瘡而腹瀉不已及小便清者此爲危證用生
料四味理中湯加霍香葉數片及米(三十)粒濃煎與之
頻服待瀉止若多服而瀉不止者即於理中湯內加好
(附子)少許煎與之或又不止則(附子)更略加之
人家小兒出瘡爲父母者切忌食一切毒物
仍須忌色慾不得熬油不得出廁
活血散治大人小兒豆瘡已出未出煩燥
北白芍藥不以多少
右一味爲細末白湯調下此藥大能活血止豆瘡脹痛

屢用屢効湘中黄子發方

紫草飲（治豆瘡欲發未發或未透者）

紫草　北芍藥　盧麻黄去節　當歸　甘草

右爲吹咀水煎服無時

發痘出後一向作熱服升麻葛根散（新增）

山梔子　柴胡　黄芩　赤芍藥

甘草　升麻　干葛

右吹咀薄荷湯同煎

人參散（治疹痘）

麻黄二錢　芍藥

人參　甘草壹錢　荆芥　白茯苓

（瓜蔞散（治欲出痘疹）（新增）

右爲末每半錢薄荷湯下

仌姜　貝母　荊芥

右爲末用紫草同煎連三服

雜病

○吊疝

當香散治小兒吊疝大人膀胱脫血氣痛

京三稜炮　茴香炒　甘草　沒藥

右等分爲末煎吊藤湯調下葱湯亦可湘中黃子發方

（桃仁湯治吊疝幼雛服之取効

木饅頭切炒碎用　桃仁盐炒

右二味等分細末每服二錢温酒下

治偏墜吊疝方（正氣散）一貼入吊藤煎服即愈

(単方)治小兒外腎腫痛

生地龍於土兎上研如泥塗患處妙

(又方)生地黃甘草各等分爲末煎服立効

(又方)五苓散煎羅蔔子煎湯調下即愈吉州彭履仲方

治小兒腎縮方思村王氏之子生七日兩腎縮入茱萸研大蒜塗其腹仍以菌草蛇床子薰之遂愈蓋初生受其寒氣而然

(立甦散)治小腸氣

蚵蜥九個去毒 馬蘭花二錢水浸壹宿 木香壹錢

沒藥半錢 胡椒爲末 右麝香酒下

香附圓(新增)治膀胱疝氣外腎腫痛

牽牛炒 香附子炒 石燕煅浸研紅酒 巴豆七粒同牽牛炒

吐去
治吊氣
鈎藤　干姜
治百二十日內陰囊腫如柿大者（新增）
大黃　甘草　右爲末湯點下
右等分燒留性爲末以雄猪膽汁調抹服則消毒散血
口舌　黃連　黃芩　黃柏
博涎膏治鵝口木舌（新增）
黃丹　腻粉
右爲末用蜜調蒸兩次睡時以
鵝毛塗舌上
透氷散治骨鯁在喉口內生瘡（新增）
朴硝　龍粉
甘草壹錢　右末乾糝入口內

治口瘡

鷄子黃 梧桐子 二味燒灰刷入口中 新增

(金花散)治口瘡潮熱呷疾 新增

雄黃 牙硝 麝金 甘草 瓜蔞 右爲末一字新汲水薄荷水調下

生下蒲月以前麻口 新增

粉草爲末 國冊 煆少許 攪勻密糖調刷舌上 新增

重舌

眞蒲黃 爲末乾糝 新增

○腮脛

(磨風膏)治赤腫胎毒在腮脛上 新增

蕪麻去殼 雄黃 各壹錢

右先將雄黃碎研却將蓖麻同勻研水調搽腫處
搜風散治風熱腫毒
大戟　甘遂　大黃　檳榔
牽牛炒壹錢　青皮半錢
右爲末每壹錢用蜜湯下
治小兒臍瘡
白石脂末貼之即愈未滿月多啼叫致臍中血出
得剝揭
治小兒臍久不乾方
當歸燒爲末着臍中頻用自差有一小兒病臍濕出
膿及清水皆一傳乾後因尿入瘡侵病又得傳愈

(五靈圓)治齒腐風

南星　五靈脂(新增)　草烏爲末

右用羊膽汁調貼之

○耳

(竹屑散)治停耳出膿汁

蛀竹屑　坯子　麝香(新增)　白礬　煅壹錢

右爲末吹入耳內未用藥時先將綿子纔了(膿汁方用)

○毋瘡

(治小兒諸般丹毒方)出大衍方十便良方

赤小豆不拘多少

右一味細末以新汲水調鵝毛拂上大妙(小兒身瘡)

(防風散)治小

防風　荊芥

牛蒡子　連翹　各壹錢半　川芎

右爲細末每服二錢水一盞煎五分空心服風丹加薄

荷下

又方以連翹煎下四君子湯

單方治小兒頭瘡

白膠香爲細末入輕粉少許乾糝如濕用油調

湘蘆 朱佐 君輔 集

○癰癤疽

(附)瘡節 瘭腫

癤腫脉證出林氏類次脉經

脉數身無熱內有癤也腹無積聚身無熱脉數此爲腸有膿也意亦附子漿湯主之

諸浮數脉應當發熱而反洒洒淅惡寒苦有痛處當發癤毒或有赤腫皆此證候

脉微而遲必發熱弱而數爲振寒當發癤腫

脉浮而數身體無熱其形嘿嘿胷中微躁一作胃微躁不知痛之所在此人當發癤腫經云脉浮而數其人發熱

而惡寒或有痛處是欲爲癰
脉滑而數數則爲熱滑則爲實滑主榮數主衛相逢則結
爲癰熱之所過則爲膿也

治癰疽方論

歙丞胡權在都下遇異人授以治癰疽內托散方曰吾此
藥能令未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手捺惡
肉自去不假刀砭服之後痛苦頓減其法用人參當歸
黃耆各貳兩川芎防風厚朴桔梗白芷甘草各壹兩皆細
末別入桂末壹兩令均每服叁伍錢熱酒調服以多爲妙
不能飲者煎木香湯點然不若酒爲奇

服石發疽論

齊王侍醫遂病自煉五石服之臣意往過之並請意曰不

肖有病幸診之告曰公病中熱論曰中熱
不溲者不可服五石石爲羣藥精悍公服之不得數溲亟勿
服色將變癰疽遂曰扁鵲曰治陰病陽石以治陽病陰石以治陰病陽水火之齊故中熱即爲陰石柔齊治之
夫藥石者有陰陽水火之齊故中熱即爲陰石柔齊治之
中寒即爲陽石剛齊治之臣意曰公所論遠宗扁鵲雖言
若是然必審診處度量立規矩稱權衡合色脉表裏有餘
不足順逆之法參其人動靜與息相應乃可以論論曰陽
疾處內陰形應外者不加悍藥及鑱石夫悍藥入中則邪
氣辟去而宛氣愈深診法曰二陰應外一陽應內者不可
以剛藥剛藥入則動陽陰病益衰陽病益著邪氣流行爲
重於俞 一云喻 厥發爲疽意告之後百餘日果爲疽發乳上
入缺盆死此謂論之大體也必有經紀拙工有不習之文

理陰陽失矣史記

向文正元仲之子也淳熙八年爲江陵支攝公安令癰發於胷臆間極療半載弗愈嘗浴罷　甚委頓而臥似夢非夢見一丈夫微揖而坐傳藥方與　曰用沒藥乳香瓜婁三味酒煎服之且言桃源許軫知　亦有此方但不用瓜婁若用速效宜服此友正敬謝即如所戒不終劑而愈後詣玉泉禱雨瞻壽亭閣王公像蓋所感夢者因繪于家類編

五臟不和則九竅不通六府不和則留結爲癰

結癰說

預療背疽方論

楊州名醫楊吉老其術甚著其郡一士人狀若有疾厭厭

不聊莫能名其何等病往謁之楊曰君熱證已極氣血銷鑠且盡自此三年當以背疽死不可爲已士人不樂而退聞茅山觀中一道士於醫術通神但不肯以技自名未必爲人致力士人心計交切乃衣僮僕之服詣山往拜之願執事左右頗旨如意歷兩月久覺其與常隸別呼扣所從來始再拜謝過以實白之道士笑曰世間那有醫不得底病之仍食其滓此疾自當愈士人歸謹如其戒經一歲復往汝但日買好黍喫一顆如生栗已盡則收乾者泡湯飲汝便可下山吾亦無藥與汝試以時脉示我纔診脉又笑曰汝脉尚爾何以告楊立具衣冠焚香望異人不然豈有痊安之理士人以告楊立具衣冠焚香望

茅山設拜盖自咎其學未至也
云一朝士疾危只有一法請剔起
不及挾汁而飲或希萬一用其言遂愈此意正同類終乃
楊介吉老者泗洲人以術聞四方有儒生李氏子棄業願
娶其女以授其學執子婿禮甚恭吉老盡以精微告之一
日有靈壁縣富家婦有疾遣人邀李生以往李初視云腸
間有所苦耶婦人曰腸中痛不可忍而大便從小便中出
鑒皆以無此證不可治故欲屈君子李曰試為籌之若姑
我之藥三日當有瘳不然非其所知也下小元子數拾粒
煎黃耆服之富家依其言下膿血數升而愈富家大喜贈
錢十萬置酒而問之曰始切脉時覺乳脉現於腸部王叔

和脉訣云寸乳積血在胃中關內逢乳腸裏癰
內所致然所服者乃雲母膏爲元爾切脉致此
醫矣李後以豎科及第至博士李植元秀即其從子也

發背無補法

諺云背無好瘡但生於正中者爲真發背膚熏奕侍郎背中
生小瘡不疼不痒又不悞只以藥調補數日不滋蔓疑之
呼外豎灸二百壯已無及此公平生不服藥一年來惟覺
時時手脚心熱疾作旣不早治又服補服何可久也

夫癤者節也癰者壅也疽者沮也一寸至二寸爲癤三寸
至五寸爲癰五寸至一尺爲疽一尺至二尺爲竟體疽
大抵癰疽脉洪數甚者難治脉微濇者易愈凡熱盛脉

數易用漏盡并單煮大黃等湯不甚熱脉緩弱只投五
香連翹湯此第一隻
一初覺背疽之疾便合服內托散後來方免變證此藥但
可服十數服而止
一即合繼服五香連翹湯此第二隻如大便寬快內熱既
退即合住服若一二日大便再祕須合服取利毒氣亦
看病人虛實進藥
一又用沉麝湯此第三隻甚者神仙解毒元方見諸毒門
及按毒之藥
一疽破後多服洪氏排膿內補散若無嘔逆之證酒調有
嘔吐之證本香湯下若癰疽破後當終始服餌不問大小便用艾灸痛則灸至不痛
一癰疽初作不

灸至痛止此十全之功也但是初發三日已前十灸十
愈自然消散此十全之效也後李氏治疽法言之詳矣
一癰疽初作之時便無著艾飯石膏
四圍塗傳以護其根脚不可使開中心却要留癰口如
之後口收只有徑寸許却住用麥飯
石膏
一癰疽總破膿潰大小傳之真疾疽破膿潰
有口便合用豬蹄湯洗其初連日洗五日後
間日洗欲安之際三日一洗
一癰疽既破膿血潰多五七日後方可用神異膏貼傳若
根脚小五日後貼如濶大須七日十日後方可貼
一癰口將收之際最忌用急藥只宜用神異膏

貼多見昧者破此一段不過病者厭於將理暨者急欲
獲利不思毒氣發泄未盡其痰再來人命自此不救所
要深思熟慮以人命爲重陰功厚利一舉兩全豈不美哉
一疽疾將安之際宜多服加味十全湯以補其氣血庶幾
一背疽之人多是先發渴而後背疽作或有背疽安而後
發渴疾因此不救者甚多若有渴疾之人宜專服加減
八味元能使渴疾安疽疾不作若驟得背疽之疾既安
之後不問有無渴證常服加減八味元滋益血氣使精
神強健雖至冬元亦妙
一若是氣虛而嘔其證心不煩熱遇早便嘔或聞穢氣而
嘔早晨宜服嘉禾散如有寒熱宜服家傳不換金正氣

散仍五更初兼服山藥丸以補腎氣

一應諸瘡腫欲知有膿與無膿以手掩腫上熱者爲有膿不熱者爲無膿

藥方次序

丙托散(五香連翹湯)(沉麝湯)(漏蘆湯)已上四方首宜相間多服藥性平和可謂穩重自有宣熱拔毒之意更諸香散氣行血免生他證次當便服已下活氣血療瘡未成者即散已成者速潰也(神仙黃蜡丸)(國老膏)(萬金散)(遠志酒)(忍冬酒)已上五方不問是瘡是疽是癰是疔服之取効也(神仙解毒萬病丸)(祕傳連翹湯)(單煮大黃湯)已上三方是通行宣熱拔毒之藥可斟酌虛實用之萬無失一也猪蹄湯二方(神硝散)已上治癰疽破後煮水洗淨輭帛抱乾或

用膏藥貼去敗毒生新肉或未藥摻之（麥飯石膏）（神異膏）（血竭膏）（壯礪地黃膏）已上四方治癰未破腫痛四畔餘腫臨時詳酌更換用之　服藥既退之後合服內補十宣散多服爲妙也（托裏透膿湯）（加減八味元）（忍冬元）（黃芪六一湯）（五味子湯）論發背有熱未有不因風而得之疽疾將安當補氣血（加味十全湯）（神效瓜蔞散）（立效散）（蠲痛散）（聖散子）（生肌散）（綠雲散）（宣毒散）（寒憲散）獨聖散等輩主之

灸癰疽法

李氏云治疽之疾灼艾之功勝於用藥初發一日之內尖頭如麻豆大時便好措手其法用大獨頭蒜薄切如小錢厚以蒜錢則於疽頂尖上以熟艾炷安於蒜錢

上灸之三壯一易蒜錢若灸時痠痛要灸至不痛初灸時不痛然後止以百壯爲準用大蒜取其毒力通透如法灸之瘡即日而安一能使瘡不開大二內肉不壞三瘡口易合一舉而三得之然人未知之而多遲疑不決至二日之後疽大如指毒氣開散病者不能堪火不可灼艾矣可不預知之乎但疽頭上見疽疽或項以上見疽則不可用此法灸反增其疾其餘皆可艾灸爲上也

丙托散（承）

真綠豆粉一兩　乳香半兩

右研勻濃煎甘草湯調下若毒氣衝心有嘔逆證大宜服此

五香連翹湯

木香　沉香各叁兩　丁香半兩

射干　升麻　黃耆生　最能療此疾如無真者只倍用升麻代之

桑寄生　獨活各叁分　木通

右麁末每服三錢重水一盞煎至七分温服銀器煎藥尤佳疑似之間多服無效二日後與漏蘆湯相間服之

（漏蘆湯）疽作後二日服此退毒下膿又與五香連翹湯間服

生大黃一拾叁兩　黃芩去皮　赤芍藥生判甘草生判

升麻　漏蘆去蘆　麻黃去根

白芷去鬚　枳殼各肆兩　米泔浸一宿去白　白歛洗淨

前熱服以快利爲度病人更自量增損服立效

(沉麝湯)

木香 麝香研 沉香乳鉢 藿香葉 連翹各等分

右細末每服二錢水一盞煎七分温服無時

(加減八味回春圓)

大地黄先焙用酒浸蒸柔次焙秤貳兩 山藥炒 山茱萸去核焙各一兩

牡丹皮去木 肉桂半兩 澤瀉水洗切焙酒 茯苓去皮

白茯苓各刮錢 真北五味子壹兩

右細末煉蜜爲圓如梧子大每日五更初未言語前温酒或鹽湯吞下三四十元内用真北五味子最爲得力

此味能生腎水平補降心氣大有功效

黄耆六一湯)常服此藥終身可免癰疽仍大治消渴

黄耆六兩半生半炙 用水一鍾半煎至一鍾半次瘡水粉草生一兩半炙

右細末每服二錢早晨日午白湯點酒調尤好一發背之人雖已云有熱未有不自腎虛而得之者若疽疾減過五分之後便合如前法五更服(山藥元)或(加減八味元)以補氣血進飲食

○(李氏云有疽疾將安及七八分便當服(加料十全大補湯)以補氣血每日當與排膿內補十宣散(相間服之)加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食

黃耆(蜜炙) 大地黃(先洗焙乾以酒洒蒸七次焙) 川芎 人參 白芍藥 桂心 白朮(米泔浸半日焙乾) 甘草(炙) 茯苓 白芷 肉桂(去麤皮) 當歸(去蘆頭酒洗切焙)

烏藥(麄末) 陳皮(微炒) 厚朴(去粗皮生薑汁炙) 木香(不見火) 縮砂仁(炒) 藿香葉(炒) 丁香(各半兩)

右㕮咀每服壹兩水壹椀生薑伍片棗子貳箇同煎至

八分碗作兩服

(家傳不換金正氣散)

蒼朮米泔水浸削去皮炒肆兩
甘草炙貳兩　陳皮去白半兩　半夏湯泡洗次用製衣貳兩
藿香葉貳兩　人參　木香　白茯苓各壹兩　紫色大厚朴薑製肆兩

右細末每服二錢水一盞薑三片棗一箇煎八分入鹽少許溫服無時

(排膿内補十宣散)治癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰風

人參　當歸　生甘草　防風　黃耆各貳兩　桔梗　冷水浸透蓋煮三五次焙乾　厚朴

右細末酒調下

白芷　薄桂　川芎各壹兩

(神效散)治癰疽發背腸癰
黃耆 用水煎 甘草 各伍兩 當歸壹兩
右細末每服二錢以酒一盞半煎至一盞不問老少皆可服之(留滯傳瘡)
(孫真人單煮黃大黃湯)宣熱拔毒
錦紋大黃 酒浸去皮
右一味不以多少剉如麻豆大水煮服即快利此要法也(消毒氣去惡肉凡瘡有口便要)
(猪蹄湯)治一切癰疽腫壞
用此湯洗濯
香白芷 不見火 生甘草
黃芩去心 赤芍藥 當歸各等分
右麁末看疽大小用藥如疽大加料用石先將猪猪煎

蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分爲兩次澄去面上油并花并下面滓肉每服用藥麤末壹兩投於汁中再用文武火煮十數沸去滓以故帛簁藥湯溫溫徐徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以故帛抱乾仍避風此一方極神效所用露蜂房最有理謂其以毒驅毒也

（洗藥猪蹄湯）

蕎本 當歸 黃連 薔薇根 柱獨活 茴香 大黃 芍藥 狼牙草 甘草 各貳兩

右麤末先用猪前蹄一隻煮濃汁澄去滓肉并面上油花每用藥末半兩蹄汁壹椀（葱白壹根漢椒壹貳拾餘

粒同煎三五沸去滓通手洗

此二方治癬疽破後先用洗淨軟帛揩乾貼膏藥去毒也

神硝散

蛇床子貳兩爲麄末　朴硝壹兩研

右勻和每三錢重水一盞煎沸去滓通手洗拭後末合

瘡口

五味子湯　大治口燥舌乾此腎水竭也

北五味子　黄耆生　人參

麥門冬去心各壹兩半　甘草炙半兩

右㕮咀每服半兩水一盞半煎八分温服無時一日一

夜五七服妙

壯礦地黃膏治癬未破腫痛

大黃一兩　牡礦鹽泥固濟煅出火毒極細二兩

右生地黃研取汁調塗腫上乾時用地黃汁刷濕毛豐

菜又名驅風草治諸般癬癩惡瘡聤耳其草莖梗皆有

白毛開白花子先綠而後紅顆中有穰子更治風毒脚

氣先煮沸水一盆盛出入藥候冷淋洗脚腫消痛住大

國老膏治一切癬疽欲發期服之能消腫逐毒使毒氣不

內攻功效莫述

有功效

大橫紋粉草二斤

右搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓用密絹濾

過銀石器內慢火熬成膏以磁罐收之每一匙無灰

酒浸起服或白湯亦可曾服燥藥丹劑亦解之或微利無妨

萬金散治癰疽惡核腫痛發腦背等已潰未潰便宜服此排膿托裏

栝樓一箇去皮取子去大甘草節二分細末入研右除沒藥無灰酒二升銀石器內煮至一椀許去滓却入沒藥每服半錢許浸無灰酒服無時候

遠志酒治一切癰疽發背癰毒惡候浸大有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍或緼熱在內熱迫人手不可近傳之清涼或氣虛血冷潰而不斂傳之即斂此本韓大夫宅用以救人極驗若七情內鬱不問虛實寒熱治之必愈

遠志不以多少米泔浸洗去土去心

右細末酒壹盞調藥末叁錢遲頃澄清飲之以滓傅病處

忍冬酒治癰發背初發時便當服此藥不問疽發何處發眉發瞼或頸或項或肩或臂或脇婦人乳癰或在手足服之皆效如或居於鄉落之間僻陋之所城市藥肆又遠或居負乏之中無得藥材但屢心服此亦能取效仍兼以麥飯石膏及神異膏塗傅其效甚奇

忍冬藤五兩木龍微搥不可犯鐵微

右二味入小沙瓶內以水二椀用文武火慢慢煎至一椀

大甘草節一兩生用

入無灰好酒一大盞再煎數沸去滓分爲三次温服一日一夜要兩劑服至一翰云如無生者只用乾者終

大腸通利則藥力到沈內

不及生者力大而效速（忍冬葉）入沙盆內爛研入餅子酒少許生餅酒尤佳調和稍稠得所塗傳四圍中心大留一口洩其毒氣

此藤二月開花五出微香蕾帶紅色花初開則色白經一二日則色黃故又名金銀花又名鷺鷥藤又名金釵股又名老翁鬚在處有之近代名人用之奇效其效尤紅內消如洪內翰遠沈內翰存中良方中所載甚詳療癰疽發背經效奇方皆是此物忍冬之藤形并開

（忍冬藤形圖）

忍冬草



麥飯石膏）治發背諸般癰疽神效

白麥飯石其石顏色黃白類麥飯團者是如無此
煆全紅只尋舊麪磨近齒覜石不限多少用炭火石
爲末重羅以好驢米醋淬之如此煆碎十數次方得却碾
五七日要如麪爲妙入乳鉢內用杵子研令極細用

鹿角不用白脫者須揀帶腦頂骨全者即是生取之
角方可用截作二三寸長炭火內燒令煙盡爲
度碾羅爲末再入乳鉢內更迭研令極細用

右煆成麥飯石細末貳兩白斂末貳兩鹿角灰細末肆
兩最要研得極細方有效驗若研得不細塗得極痛若
細而嫩大能止痛收口排膿和合時量藥末多少用經年好
醋入銀石器內合魚眼眼沸却旋漸入前三味藥末在內用竹篦子不住手攪
攪一二時久令稀稠得所取出傾在甕盆內候冷以紙

蓋其上勿令著塵埃每用時先用猪蹄湯洗出癰疽上膿血至淨以故帛揩乾以鵝翎拂藥膏塗傳四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大以出膿血使熱毒之氣隨出如膿未潰能令內潰如已潰則排膿如湍水逐日見瘡口收斂如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但內膜不穴亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡更忌有腥腋氣之人及月經見行婦人或有孕人見合藥亦忌此等合此藥時須要麥飯石好鹿角要燒灰時却不使腦骨但辨其生取與自退爾若能精擇藥材精麦修製勝用他藥收功多矣仍可熬取好米醋一大椀收甕器內密候逐日用藥於瘡上久則其藥乾常用鵝翎點醋

拂濕其藥勿令綢也初使須一日一洗一換
兩日一換古方云白麥飯石顏色黃白類麥飯
者尤佳愚謂麥飯石不可作磨如古人云魯作
佳則或惑人矣麥飯石其狀如飯團生粒點若
以舊麵磨近齒處石代取其有麥性故也屢試得效此
石鋪家有時無賣念欲用之於溪中尋磨石中有白石
粒如豆如米大者即是也但其石大小不同或如拳或
如鵝卵或如盞大略如握聚一團麥飯焉古方有
古之吕西華秋方傳以外舅之親計其不可得裴貞
哨之以重刑吕寧絕榮望守死不
神異膏治疽疾先以麥飯石膏塗傳候其瘡根腫斬收止

於寸徑大却用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺取效合時不可與婦人雞犬猫鼠厭穢物見之

露蜂房要用蜂兒多者剪事治極淨壹兩 全蛇蚺以鹽水洗淨者焙乾細剪壹兩 真麻油壹斤 男子亂髮淨洗焙乾如雞子大 黃丹伍兩羅細者後入 黃耆叁分 杏仁去皮切壹兩

右藥先將麻油入銀銚中同亂髮於風爐上慢火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁變黑色用好綿濾去滓再將所熬清麻油入銀銚內然後入黃耆元參二味慢火熬一二時久出銚子安一冷風爐上候半時久火力稍息旋旋入露蜂房蛇蚺二味先準備柳枝攪下了却移銚子於火上不住手攪慢火熬至黃紫色又再用綿濾過復入清油在銚子內乘冷

投黃丹急攪片時又移銚子於火上以文武火慢慢熬不住手同攪片時候藥油變黑色滴一二滴於淨水中見得凝結成珠子稀再熬少時必候得所然後窶器內封收用或恐偶然熬得磁器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成將少蠟黃麻油添在內用子須用連所盛磁器置淨水盆中出火毒一晝一夜歇三日方可用熬此膏藥極難於用却量度將硬軟於火候須臾煩看緊慢火猛即藥中火發不特失藥性又傷人面目救助不及千萬謹戒精高藥方甚多不下數十治家藏神驗血竭膏伍氏方

川當歸去蘆頭 白芷 大黃

黄連去鬚　黄蘗
杏仁　木鼈子　皂角去皮子
男子乱髮一兩半　漢椒去閉口者炒去汗　露蜂房各一兩
血竭別研　豬丹羅過陸兩　乳香　沒藥
右除乳香沒藥血竭外餘藥剉碎令勻用真麻油捌兩
浸一宿入鐵銚内文武火煎令髮焦爲度綿濾去滓取
清油秤過多少再入銚内煎沸令冷沸每兩清油
兩枡杖攪不住候加減軟硬得所就水中試之不拈手
爲度再入乳香沒藥血竭三味攪勻候冷取出用白皮
紙就熱火上隨瘡口大小剔開剪去四邊白紙貼瘡口
上合藥用辰日及天德月德天醫吉日爲佳
(緑雲散)治遠年近日一切惡瘡發瘡生於背脳

金星鳳尾草乾秤八兩　生粉草壹分切

右慢火焙爲細末分作四服每用酒一升煎沸入冷酒二升和勻以醉爲度立效若曾服金石重藥反者此藥最妙

宣毒散　治初發或灸後用敷貼消腫收赤暈圍聚

露蜂房叁兩炒略炙　南星　赤小豆各壹兩　生粉草壹分　生白礬半錢重　生米壹合

右細末淡醋調塗四畔乾即再上

塞裏散　止痛消腫初發則消已成則潰既潰則生肉常服

活血補虛不患瘡瘍

蘇木貳兩　忍冬藤三兩　乳香壹兩　沒藥壹兩

黃瓜蔓叁兩切取藤子炒　甘草節灸半兩

右粗末每用藥壹兩半無灰酒二碗藥入瓶內煮至一碗半去滓分作三服空心日午臨卧服如要常服即爲細末酒糊爲丸如彈子大朱砂爲衣每服壹丸至五丸即安

神效瓜蔞散治婦人乳癰

歸酒下打撲傷損患服

瓜蔞子多者壹箇去皮焙乾 川當歸 生甘草各半兩

黄瓜蔞

乳香壹錢各別研

沒藥

立效散治發背及諸癰瘇并瘰癧有效或婦人乳癰神妙

三次食後乳疽之方甚多獨此一方神效無比

紫色皂角刺半斤不用枯炒赤生甘草貳兩

右用酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清汁分爲

乳香別研半兩

瓜蔞伍箇去皮取肉并仁搥碎炒黄

右細末每服二錢温酒調下無時候
生肌散 斂瘡口
木香 檳榔
右等分淨器中研羅爲細末時以傅瘡若瘡口猶未斂
白芨末 輕粉 各少許和勻即效
獨勝散 凡癰疽皆緣氣滯血凝而致宜服諸香能行氣通
也如瘡初作便服此代茶每食後半盞許
香附子 去皮毛以生薑汁淹壹宿焙乾研令極細
右無時白湯調二錢服瘡潰後只以局中小烏沉湯內
甘草 但用五分之一瘡愈後常服半年尤妙
節公 下上桂元 云大凡疽疾多因怒氣而得之若不
多怒但服香附子藥進食寬氣有此疾必

神仙解毒萬病元治一切癰疽發背及療魚臍疔
者方附諸毒門

右外科精要乃臨川醫士陳自明所編廣東許帥趙平齋
嘗隅郡舊刻今擇其最者以行其傳

第一法

蓮花藥黃鬚者 蛩錢生用 雄黃半兩生 天南星半兩
川當歸去蘆 腳者 飛羅麪貳錢生 冰霜貳錢生
右為細末醞米醋調成用紙花大於
患處用篦子
重疊抒紙令着實紙花留眼子在瘡口上放
膿水一日一換臨換藥時用煎熟溫湯以軟帛子煎湯

洗去舊藥候乾再上新藥其藥不可久留久留則無力
旋合不可過三日如瘡大用藥多則以此料劑添合之
如發渴一面服第二藥或不渴亦多服之疾濃膿水盡始
用第二藥欲瘡口忌一切毒食患者不可令聞穢氣其
藥功效不可盡述

(第二法)治瘡正發時作渴雖不渴亦多服之

瓜蔞壹箇　綿耆壹兩　粉草半兩

乳香　沒藥各貳錢

右五味㕮咀水二椀煎至一椀温服一日三服頻多煎
如熟水時時呷之尤妙

(第三法)

赤欲生用　豇豆粉各貳錢

白欲生用

寒水石㕮咀各半兩

龍骨半兩　輕粉壹錢　黃丹貳錢飛過

右爲細末乾撒於瘡口上不可犯生水如瘡口將斂切戒近色欲

（內托散）治癰疽瘡疽發背

瓜蔞貳枚去皮留穰加倍用

右用白酒四椀煮甘草瓜蔞煎減一半去滓入沒藥末貳錢半別研甘草半兩生用

攻温緩緩飲盡服此必膿多痛止如痛未止膿來多更依前作一劑服膿流三五日方洗

（洗方）猪懸蹄淨洗不拘多少煎沸湯放温淋洗拭乾

（又方）臘茶末白湯調放冷洗

（豆粉膏）治發背

豆粉壹兩炒赤放下出火毒

右并水調敷四圍大凡用藥塗瘡不可當心則瘡便走散只當在四圍塗住不可使之散去發背

(甘草膏)治發背

甘草參大兩生爲末　大麥麪玖兩

右用一大盤中攪和令勻取上等好醋少許別捻入藥令勻百沸水投和如餅劑方圓大於瘡一分及故紙隔令通風冷則換之已成膿自出未成膿便内消崔元亮海上秘方李北海云此方神授極奇一切癰瘡方治未成不可用膏藥貼宜此藥塗

(鹿角膏)治

鹿角尖用砂鉢内同老米醋濃磨

右時以鵝翎塗拂四圍當中留一口通乾再塗即内消

(牡蠣膏)治癰腫未成膿者拔毒

白壯蠣爲末以水調塗乾更塗

神効膏治瘡癰疽一切毒瘡

龍灰十即是餅藥蠣殼灰節細糯米舂白

右先將龍灰米上約留半寸餘一把灰盤內其餘一把灰攤在左盤內其糯米亦在日裏曝要得稍温仍將左盤載餅藥在日裏曝灰米發變如角淡餅藥調之入鉢中研成膏用手傳在瘡上以早爲上如瘡方發腫時便可傳藥以消散爲效不可傳之總移便是作效如瘡已聚膿血則以藥傳四畔只留其頭使之血盡瘡口合爲度其瘡口或皮膚有破損處千萬不可傳藥痛不可忍如婦

人小兒只宜用清水或十分淡餅藥調之或安在疳瘡上然後以藥傳之先用餅藥在炙教温火上既入米灰則不痛立效

（療蜂窠）黑蜂窠泥調法醋傳方得之循州謝推官雷仲渠家三世施此二藥鄉人言以是獲登第之報

（治腦疽）用松節細研用獵猪膽汁和合麻油傳瘡親見效

（治瘰癧）玉屑妙靈散

滑石 貳兩用靜江者

右爲細末每服貳錢米飲調下若有琥珀研細濃燈心湯服之尤佳良久旋下甘物正如剥皮子蒲萄肉而瘡

盡平復此方載之陳氏方中余親見其效
一醉散治瘡疿
貝母　香白芷
右等分爲末酒服次飲酒醉爲妙酒醒而病去矣
又方煎犀角飲子調五苓散服
單方治膿血淋瀝其効如神
犀角　甘草貳兩
右㕮咀以三斤水深堪上以三斤火八兩爲細末
一服假炭盡取一錢食後以建茗同煎點日二服忌
魚酒醋醬油鹽海味等物此病多有人父子相傳至死如
服此藥定並不疼痛亦無吐痢
又方牡礪用火煆爲末以糊爲丸如梧桐子大每服二十
元以連翹煎湯吞下

生肉方（過）

膿月猪脂　松脂煮過收水
白者　黄蠟煮過收
右各貳兩用清麻油五六兩慢火熬成膏
去舊藥拭乾用紙剪一大圍子塗藥在上蓋瘡上如痒
不得動此生肉故也一日一次換藥切戒毒物

○六瘡癤（附）

治一切瘡腫外臺祕要方云丁腫方甚多皆不及此
右以酢泔淀和泥塗上乾即易不過十餘度即拔根出
虢丹膏（過）治一切瘡癤
虢丹伍兩　巴豆拾粒　麻黄八兩

方竹

右件油煮下竹枳巴三味前煮黑色却入號丹打勻黑
爲度令自然成膏如瘡未破用巴豆如已破則去巴豆
羚羊角散治一切膿泡熱瘡及發背

羚羊角　黃耆　當歸
川芎　生熟地黃
右等分㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分空心服
鹿角元治療同前

鹿角　黃耆炙
右等分却入羚羊角一半蜜圓地黃温酒下趙龍學病
剛劑過多劉立之云必有瘡疾服此藥後不發
虛服之止遍身發細瘡用生地黃汁解白餅酒常服兼進前方

服之遂無事蓋鹿角(散)
(加減五苓散)治療仝前
沉香　檀香　生熟地黄　升麻
乾葛　羚羊角　犀角　黄耆　黄芩
羚羊角　為藥　連翹　甘草
防風
右等分每服二錢白水煎服仍煎首烏散服
(增益四物湯)治一切瘡
川芎　當歸　地黄　甘草
芍藥　防風　荆芥　仝
右㕮咀等分每服三大錢水一盞半煎八分金星鳳尾草

百花散治一切瘡

鬱金　黄連

枝子仁　葵花

右細末冷水調成膏貼瘡膏痛處其效如神

土朱散治一切瘡

土朱　號丹

右細末用好酒一盆溶牛皮膠入此二味和勻澄清喫

驅風散治一切瘡

清藥酒留脚傳之瘡上乾又再貼

紅椒開口者連根葱頭採粒

右同煮水浄洗用絹衣掩乾余甲子夏自八桂歸途中遇長老寂嵓授此三方數日

而愈

(平胃散)治一切瘡用麻油傳之立效

獨珍膏治軟硬癰諸熟毒疱瘡

五倍子不以多少炙焙乾

右細末冷水調塗仍入數點麻油盧陵一士人傳曾效

(赤小豆)治善惡瘡併赤腫及詐腮無不愈者

仁宗在東宮時常患詐腮命道士賛能治療取赤小豆三

七七粒爲末傳之而愈中貴任承亮在旁知狀後自患

惡瘡瀕死尚書郎傅求授以藥立愈問其方治之甚捷

久之沁官過豫章或苦瘡幾至五臟壞者治之耶壞驚拜曰某用此活三十

承亮曰君得非用赤小豆耶壞驚拜曰某用此活三十

口願勿復言有傷發背如爛瓜周鄰家乳婢後疽作用

之皆如神其法細末水調傅瘡及四傍赤腫癢
之又一本爲末每服二錢水一盞煎服仍用
藥傅之緣赤豆粉粘物既乾難揭則用芎麻根爲末和
之便不粘也此法尤佳

殺虫方

雞心檳榔壹兩 黃連壹兩炒 川山甲拾箇燒存性 麝香半錢

右爲細末用腊茶末調塗隔日一洗一日三次用藥
如此三五日後用收暈煖肌膚生新肉藥

黃連散 治疥瘡萬不失一

大椒 黃柏皮 黃連 各半兩 檳榔壹兩

右爲細末用巴豆二十粒煎麻油塗之巴豆煎至黑爲
度先用本人小便燒秤鎚令紅投於小便中方

與洗頭瘡都無皮了然後以
歷青伍文細研
右用油魚參箇以盞熬成油調歷青塗三日效
（火氣入肺方）
黃柏皮爲末摻之立愈
有婦人因冬間向火兩股上逡成瘡其汁淋漓人無識
者後見一道人云此皆火氣入內而生用此方果如其
言後又再作適無黃柏用薄荷煎塗之立愈
（治漆毒成瘡方）
磨鐵槽中泥塗之即愈
往年燕湖二漆牙相爭其人以漆一桶自頭澆其人患
瘡幾死有人教以此方治之而愈又蠟黃塗之亦愈

(二草散)治諸般瘡

金星鳳尾草 肆兩

右爲細末酒調下生用者搗爛酒服不拘時候

(神効餅子)治一切毒瘡

山慈姑 五倍子

草烏燒存性 各半兩

右爲細末先用雞子焙乾已上各半兩號丹貳錢熱傅瘡上疾冷取出傅藥其上數日間瘡乾連皮脫去瘡乾即用麻油調德安寺有僧面上生偏幾死一用即安

(蘇盧散)治諸般瘡已效

甘草 壹兩

蘇盧壹味不拘多少用鹽少許以鯽魚煎油塗

(五香連翹散)治風氣瘡自上而下調之風瀝自下而上

雞蘇散 南連翹 丁香
麝香 少許 桑寄生
甘草 沉香
右爲細末白水煎服食後服又用牛尾蕨根(謝婆根)又名赤莧子根(三味搥碎酒三碗渾服併用洗瘡口潰爛之後亦用此藥洗直要潔淨大惡忌白物豆腐麵白羊白雞白猪一切白物皆忌之如服藥後小便淋瀝用(五加葵麥木通煎喫此方得之艱用之收效)

(又方)蔡盧(羅過三枕生用每以三枕曬將兩枕入)硫黃 壹兩
荊芥 各伍錢 大赤 叁錢
蛇床子 叁錢
右同爲末麻油(乘熱清調臨卧塗亦瘡上次以前藥)

(盧一味入甘草三五十錢同爲末每服半錢酒調酉時

服各二
治小兒頭瘡及一切疥瘡
烏梅拍樹麪皮向東者
苦練樹根皮焙乾
右研爲細末用麻油調塗有膿水乾傳亦可
萬金膏 治敗毒生肌諸毒瘡皆可用
黄耆半兩　當歸半兩　大枹五倍子
白芷三錢　白礬
杏仁叁錢
防風叁錢　羌活貳錢　獨活貳錢　官桂貳錢
白飲貳錢　狼毒貳錢
乳香叁錢　沒藥叁錢
黄丹肆兩　清油壹斤　桑白皮貳錢
右除黄丹一味以文武火熬於銀器内煉不住手攪千餘滴水上如珠爲度陰天煉春夏入黄丹次用柳枝攪千

冬軟收夏月蒼收用新磁器盛以竹篦子攤罨
塵常保好好盖覆愈久愈好文蒼尤佳貼上不宜
劍判元益授此方用之效

治膿瘡諸方

花乳石散　追風獨活散

右各一貼合和酒調空心服

洗藥海桐皮　石榴皮

右等分煎湯淋洗令淨然後用熏藥

熏藥牛旁子壹字研爲細末

右用紙撚子將藥在內燒熏之然後塗藥

槟榔散治瘡　班竇拾肆个

巴豆拾肆粒槟榔壹箇　全蝎七箇

麻油拾伍錢重

右用麻油慢火煎先入全蝎次入班茅次入巴豆黑色方入黃蠟油入後藥
擴櫛見巴用只用蠟油入後藥
用只用蠟油入後藥
黃蘗皮貳錢 雄黃壹錢研 生硫黃壹錢研 生硫黃壹錢研 蛇床子貳錢研
杏仁 輕粉 海螵蛸壹錢 白膠香 黃連
號丹壹錢 麻油膠香真油先容
右細末同入麻油中調傅瘡下攝高客傳見效
(單方)治外鎌瘡臭爛數十年不愈者
生烏龜一箇打死去殼剁碎用碗盖地出火毒盡令取殼酯數次入輕粉麝香拌匀臨用先用葱水洗乾方用
右烏細末入輕粉麝香拌匀臨用先用葱水洗乾方用
藥胡師賢親見效
(擴櫛散)治遠年內外鎌瘡

檳榔　乾猪糞　各等分　燒存性　龍骨壹錢　研
右爲細末麻油調塗三日一次換不過三服愈忌無鱗
魚濕麪雞肉動風毒物此方乃建安軍人犯法傳與司
理官楊炳之極妙
收斂瘡口令乾方
母礪一塊用破草鞋包縛入火內煅令紅去火候冷取出細研
右隨用時旋入枯飛過白礬些子拌和傳瘡口上
治陰痿瘡
豆粉壹分　蚯蚓貳分
右水研塗上乾又傳之
治妬精經效單方
大田螺兩箇和殼煅過存性
右碾爲末以輕粉揉於所患處便安
陰腫方
升核痛人所不能治者

馬鞭草搗爛塗之

(小兒陰腫方)治小兒陰囊忽虛腫痛者
生甘草汁調地龍糞輕輕塗之

(治小兒熱毒遊腫方)
破草鞋
人亂髮燒灰醋和傅本草

(治婦人陰腫堅硬方)
枳實半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之

治脚腫方)男子六十一歲腫生瘡忽食猪肉不安暨以藥
利之稍愈時出外中風汗出後頭暴腫起紫黑
輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與
小續命湯加羌活一味明以煉石塗之便差

(背腫方)楊慣患背腫馬嗣明以煉石塗之便差
陪煎服之遂愈

龍黃色一石如鵝鴨卵大猛火燒令赤內醇醋中自有
石屑落頻燒石盡屑曝乾搗篩醋和塗腫上無有不
愈神妙

○補損

傷損證治評

傷損一證盛至破肚出腸頭破出髓又有斷指斷臂者誠然可畏然切觀被傷之人不在致命處尚可治療如破肚腸出大小腸不曾傷破則以桑皮綫縫合傷處續以生肌活血藥傳之自然無事要知香油洗去血穢內入却以針穿桑白皮綫縫合傷處續以生肌活血藥傳之自然無事要知香油洗去血穢內入却以香油浸用藥散止血次以香油乃傷損上藥一則不生虫三則生肌如被傷處口未合聚常用之自有奇效設或跟骨傷損大小便無可活之法其間糞穢從孔中出日爛

一日烏有再生之理哉又如頭破髓露者依舊與藥服餌活血去風生肌之劑如南星血竭相皮之類是也外然後傳以去風生肌之劑如南星血竭相皮之類是也外有鬪歐磕損墜馬損傷折足斷臂或有碎骨者必須刮開去其碎骨整頓條理以絹帛縛定傅以生肌去風之劑服之以活血接骨之藥如自然銅血蝎乳香沒藥之類是也其間腰腹內恐有敗血必須除去卒急無藥可辦急以火麻骨燒灰為末熱酒調服或以童便一半相投服之為妙如無麻骨用麻布亦可然後用桃仁大黃川烏血蝎無往不效曾有腰內疼血不除年老為終身之病者亦有之矣或有閃挫及脫臼之類治之又有手法醫者須以意調理之

龜獻奇方治傷折方論

昔有傷折或云宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢一龜進作人言告曰汝被傷勿相害吾有奇方可療治腕折傷筋損疼痛不可忍用生地黃壹斤切蔵瓜薑糟壹斤生薑壹斤同切都炒令均熱以布裹熨傷折處冷則易之甚有奇效本事方

又論類編

紹熙五年秋湖口人林四因日暮馳馬顛墜折一足骨斷招外醫整接骨非(敗)龜殼不可治此却難得要生者甚易入視曰筋接骨非(敗)龜殼等也語訖即退退林招衆醫議道人過門聞其聲而問故道人曰但得殼足矣生與敗灰可辨茲去五里許江畔一大龜身闊二尺常跧伏泥中捕而脫其殼燒灰傅損處計

其收效賢於小者百數也時已昏暮未暇遣僕半夜後鄰
室張翁者夢烏衣人來訪自言通爲江畔老龜救護張謝曰
林四折足蹙欲殺吾取殼以療傷折望一言以哀投甚切云
老夫愚鈍如何施力烏衣云只煩丈人詣林氏諭衆蹙曰
往日曾有龜傳一方於人而贖命用淹藏瓜糟卷斷處次
將杉板夾定方書亦嘗記載一味拌入糟
中然後板夾不過三日即十全安愈願公便以告之異日
當圖報遂去黎明張如所戒林與兒皆喜而從之應期而驗

療打撲傷損方論

打撲傷損瘀血凝滯氣因不行關竅皆不通七聖損趺元凡有此證須問
者可服洗心散老弱者可服七聖損趺元凡有此證須問
臟府所打處疼痛若傷處大便三二日不通然後可

下前二药若大便不閉傷處不甚猛痛則不可服宜服沒
藥乳香查當歸

長安石史君嘗言通衢有從後呼其姓第者曰吾無求於
人念汝有難故來救汝出一紙卷授石曰有難則用之乃
治折傷內外損方書也明年因趨朝坐馬為他馬所踶折
足墜地又踢一臂折家人負至夜半痛急合此藥且灌且裹至夜半痛
止後手足皆堅牢如未傷時方本出良方用川當歸鉛粉
各半兩鵬砂二錢同研令細濃煎蘇木二十調服一錢乙損
在腰以上先嚼淡粥半椀然後服藥損在腰以下即先服
後食仍頻頻呷蘇杭汁別作糯米粥入藥拌和攤紙上或
絹上封畏傷處如骨碎用竹木片夾定乃以絁或衣物包

之其妙如此故表而出之

又

汀州涇口市民陳公誦觀音甚誠慶元初出行擷折一足忍痛叫苦產越三晝夜夢一僧拄杖持鉢登門問所苦陳曰不幸折一足負無力訪醫只得告佛僧曰不用過憂吾有一方接骨膏正可治汝便買豪豆粉迨於新鐵銚內炒令真紫色旋汲井水調成稀膏自然後厚傳損處須教偏滿貼以白紙將杉木縛定其效如神不必假他劑也語訖僧忽不見陳亦寤如方修製用而愈

崔給事頃在澤潞與李抱真作判官李相方以杖球擊毬杖按毬子其軍將以杖相格承勢不能止因傷李相拇并爪甲

擘裂濕透索金瘡藥裹之強坐頃索酒飲至數盃已過量色
愈青忍痛不止有軍吏言取蜱炙開其間有涕取蜱損處仍多煨取續之易熟者凡
剥皮擘開其間有涕取蜱損處仍多煨取續之易熟者凡
三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度用熱葱并涕
畏遂畢笑語本事方

療打撲傷損方論本草衍義

(自然銅)有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲傷損研極細酒調服頻服仍以手摩痛處

療墜馬折足方論

定州崔務墜馬折足暨令取(銅末)和酒服之遂痊平及
亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅末束之朝野僉載

宣和中有一國醫忽承快行宣押就一佛刹醫內人限目
今便行送至奉旨取軍令狀限日下安痊醫診視之已昏死矣
問其從人皆不知病之由皇恐無地良久有二三老內人
至轎下環而泣之纔得其實云因蹴鞦韆自空而下墜死
醫者云打撲傷損自屬外科欲申明又恐後時疑差不測
再視之微覺有氣忽憶藥籠中有蘇合香元急取半兩於
火上焙去腦麝用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更
下惡血數升調理數日得痊予謂正當下蘇合香元蓋從
高墜下必挾驚悸血氣錯亂此藥非特逐去瘀血如氣逆
鬼殆蹀傳尸心痛時疾之類皆治良方載甚詳須自合為
佳耳本事方

道人詹志求信州人初應募卒隸鎮江馬軍一
因習驍騎騎陸罵右脛折爲三四困頓且絶軍帥命皆再生獨
救鑿出敗骨數寸半年稍愈扶杖緩行骨空處
脚筋攣縮不能伸屹落軍籍淪於乞丐經三年過宋道人
亦舊在轅門問曰汝傷未復初何不求鑿對曰窮無一文
豈堪辦此宋曰正不費一但得大竹管長尺許鑽以一竅
繫以繩卦于腰間每坐則置地上舉足搓衮之勿計工程
久當有效詹用其說兩日便覺骨髓寬暢試猛伸足與常
日差遠不兩月病筋悉舒與未陊時等予頃見丁子章以
病足故作轉軸踏脚用之其理正同不若此簡便無力者
可辦也癸志

許元公入京師赴省試過橋墮馬右臂臼脫方論
曰急與接入臼中若血漬則難治矣僕用其說許已昏
迷不覺痛遂做轎歸邸或曰非録事巷田馬翁不能了
此疾急召之至已日暮秉燭視其面曰尚可治乃施藥封
腫處至中夜方甦達旦痛止去其封損處已白其青瘀乃
移在臼上自是日日易之腫亘肩背於是以藥下之瀉
黑血三升五日復常遂得赴試蓋用生地黃搗紙上數
腫上此正治打撲傷損及一切癰腫未破令内消云類說

黃栢　半夏　桂花

右為末生薑自然汁調塗腫處其功全在生薑如藥
乾薑上薑汁為佳
當歸散治打撲傷損
當歸 沒藥各壹兩為藥 木香
川白芷 川烏各半兩川芎 生地黃錢㕮咀參
欝金貳錢
右為末空心酒調每服二錢如未愈加川牛膝(紅花)酥
神仙接骨丹
末各半兩調服
黃丹飛過 密陀僧 自然銅各肆兩
血竭 乳香 沒藥各壹兩芫青砂
白礬飛過 膃月猪脂各拾叁兩

右件新鍋子先下脂鎔濾去筋膜次下蠟成油去鍋於冷處次下窑陀僧黃丹自然銅末更慢火煎滴水中不散爲度便出鍋於冷處下諸藥用柳木篦子攪勻入瓷器中不住手攪至凝丸如彈子大候極冷收入通油新瓷合內永不敗壞若一切折傷不問內外輕重雖已無氣但心頭尚暖者分一粒如彈作十五丸熱葱酒吞如已絶不能吞即以熟葱酒磨腫但下咳即自省人識痛病人痛亦定仍取十丸入少油火炙軟灘在帛上貼痛傷處如傷損處大用二丸以上此藥不沾粘肉即以尋常膠黏皮破與暗傷悉能治之

平胃散治打撲傷損不問

平胃散以冷水調塗則愈

昔有一士夫與一同官交甚密書柬往來止以
子逕傳入宅是日偶失去銀盞遂以其事執之一小廳而
同官以小廳根之不覺打碎小廳子右手破骨出遇一
道人教以前藥遂愈 安城劉克昭傳用之果有効
雙烏散治諸傷百損如被打破傷折久後時時疼痛雖新
被傷縱不破皮而內損者尤宜服此

川烏 草烏 各炒 各半兩
蘇木 參炒錢當歸
大黃 生乾地黃 白芍藥
紅麴

右爲細末用酒煮一麪糊和藥丸如梧子大每服五十丸
烏頭生用有力恐太猛所以用溫火略炮放冷服如覺麻痺無害但二
龍骨煨治金瘡

真龍骨少許海飄消五倍子赤石脂
等分亦得如傷大先以冷塩水洗淨却用
右藥料酌或過不用亦可方不用
黄桑生發塗四圍待水乾皮斂即以藥乾敷百發白中
如小小傷只以冷塩水略洗便敷藥此直截妙甚
右二方得之軍中以重資購之始傳用之屢試屢驗
單方治打損撲傷大欬血竭尤佳
又方淋過灰滓水調塗半寸收醋傾地上撩泥塗生大黄
末酒塗並能見效
又方生地黄以米醋調傳瘡上
又方用冷水麻油各一半打和如卵黄用雞毛拂之

治惡瘡金瘡刀斧傷見血入水並無妨絶妙好降真香爲末貼之
又方石灰壹升石榴花半斤爲末取少許傳上擦少時血止便安崔元亮海上方預製急用無不效者
治金瘡普張氏經驗方治刀傷磕損血不止痛難禁此出於荆門軍玉點頭録余分教石城鄉人戴尧臣作尉試馬于洋宫之前馬劣挼人予驩戴損大指甲離肉血淋余偶記此方呼令人將葱白煨爛乘熱縛定痛與血隨止竟冷再易遂不復痛翌日洗面全不見痕跡活人甚衆不可具述
又方晚蚕沙生用細末摻勻綿裹之隨手瘡愈血止
治刀箭及折傷

烏狗血和酒連喫數碗差大血能去惡血也注西總
管李貴傳親見效甚簡易徐因會客于南樓墜樓者
二十餘人亦用此收功
神妙元
威靈仙根和烏鴉焙乾為末酒麵糊為丸空心下五
十元見效廣東馮帥幹云渠當年腰下為金瘡所傷
遇春則發痛入小腹有不可忍忽傳此方療之神妙
肘後方治箭鏃入骨不可拔者
巴豆去微炒 蜣螂
右二味研勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍待極痒
治損折傷等疾痛定必須立出
不可忍便撼動箭鏃拔之

自然銅醋淬木鼈去油 草烏 川烏

右件四味為末以醋煮麵糊為膏熱塗損處時時更易

治金瘡方

痛盛以火熨之

周宣班猫捕海鼠被寇以提刀所傷血出不止分明筋

如斷骨如折用花蕊石散掩之血不止痛亦不定有兵

士李高言某在軍中被人傷中欲死見統領以藥一貼

名紫金散掩之血止痛定明日瘡靨如鉄遂安又無瘢

痕後告統領求此方只用紫藤香薑灰刮下一石碾二

傳之救却萬千人也名醫錄紫藤香即降真香是最佳者 細

飲金瘡口未止疼痛方

劉寄奴一味為末摻金瘡口裏立効

宋高祖劉裕微時伐狄見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有人朞往覘之見青衣童子數人於榛中搨藥問其故荅曰我王為劉寄奴所射合藥傳之帝曰吾神兵不死不可殺帝叱之皆散收藥而反每遇金瘡傳之良驗寄奴高祖小字也

黑神散治傷損大吐血或因酒食飽低頭掬損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲未失無有不効

百草霜　蚌粉

右等分為末每服二錢用糯米飲調下側栢枝研汁尤効速鼻衄搐一字皮破灸瘡出血舌上出血並乾糝上立止

黃芩湯治病證如前

枳實炒爲末黄芩貳拾箇
紅棗參拾箇同枳實煮
右爲末搗爛慢火焙焦黄
用米飲調二錢食後服

地黄散治打撲金瘡止血住痛辟風續筋骨生肌肉
地黄苗　地榆　甘草半兩
赤芍藥　青蒿　蒼耳苗
右五味㕮咀用清水浸取汁
十日瘥不腫不膿本事方

生地黄散
生地黄　生艾汁參合　石灰參升
右五日午時修合前藥汁拌石灰陰乾入黄丹參
兩更杵羅細凡有金瘡折傷出血用藥封裹勿令動着

當歸　川芎　赤芍藥　生薑
生地黄　蘭草子　川芒硝　荆芥
細切

馬齒莧陰乾壹兩

右爲細末和勻酒煎蘇木取酒調藥二大錢無時候服

血醒散 出世驗方 生地黃 芎根去皮燒灰等分

右杵爛半酒半男童子小便急濾藥汁調小便酒潼之

如血不甚發熱減芎硝加桃仁荷葉乾

桃花散 出敗帖法

仍生雞鴨血調同服尤佳

乾地黃生 桃木取白皮劉寄奴葉 枯桐皮炙取白

右爲細末和勻用生餅酒調塗損處如因損而成風則

加服風損藥 國丹 各等分

右爲細末和勻用生餅酒調塗損處如因損而成風則

類編朱氏集驗醫方卷之十二

中毒 附

中毒評

蛇虫傷 湯火傷

評曰凡中藥毒及一切諸毒從酒得者難治言酒性行諸血脉流徧身體也因食得者易治言食與藥俱入於胃胃能容雜毒又逐大便泄出毒氣毒氣未流於血脉故易治也已毒即歸於臟飽者毒氣未能深入故宜急解凡解諸食毒爛嚼甘草嚥之則毒吐出矣

犯天麥毒方

齊州有人病狂每歌曰五靈華蓋曉珍瓏天府由來汝府中惆悵此情言不盡一九巍嵩火吾宮又歌曰踏陽

春人間二月雨和塵陽春踏盡秋風起腸斷人間白髮
人後遇一道士作法治之乃云夢中見一紅裳少女引
入宮殿皆紅紫飾小姑今歌道士曰此正犯天麥毒文
則心神小姑脾神也按醫經蕘蔺治麵毒故曰火吾宮
礬灰散治中諸毒劉立之方并羅蔺食遂愈洞微志

晉礬 建茶各等分

雄黃散治中惡毒亦救蛇虺毒尤佳趙信庵方

雄黃一錢新汲水調下得吐即效未吐再服

右爲末空心每服二錢

治甲子歲以此藥救三人不拘多少

入麝香少許以麥門冬湯調下出舌數寸者亦

凍青飲解砒毒

凍青葉擂取自然汁添井花水服須瀉下解

解砒毒方(凡人誤食生砒唯單飲

生麻油以吐爲度則其毒氣自消不能爲害

治誤食諸毒方(貫衆濃煎湯服之即解

中仙茅附子毒方

鄭長卿資政說少時隨父太宰官懷州將官服仙茅遇毒齊衆醫環視不能治一醫獨曰毒在脅張出口漸大與肩齊可少緩無及矣取小刀釐其舌隨破隨合釐至百數始有血許醫喜曰無害也舌應時消縮小即命煮大黃硝石(數枕連服之并以藥末摻舌上遂愈又蓋諒郎中說其兄洗因感疾醫盡生勸服附子酒每生切大(附

子貳兩浸以斗酒旦起輒飲一盃服之二十年後再爲
陝西漕使歸過之南樂縣拉同行中途曉寒
詰飲一盃竟寢令温半盃皆酒至自覺微醉乃與妻使
飲行數里妻頭腫如斗唇裂血流下駐路傍隨行李職
曉腫始消詰仍服之不輟到長安數月失明遂致仕時
方四十二歲

(解藥毒方)

王仲禮嗜酒壯歲時瘡瘡發於鼻延於顏心甚惡之服
藥弗效僧法滿使服何首烏丸當用貳斤適墳僕識草
藥乃掘得之其法忌鐵氣但入砂鉢中搗黑豆煮熟既
成香味可人念所煮水必能去風證以頼面初覺極熱

漸加不仁至晩大腫眉目耳皐渾然無別診望之者莫不驚畏王之母高氏曰凡人感風癩非一日積吾兒遇毒何至於是吾聞生薑汁赤小豆解毒山豆根黒蛤粉能消腫亟命撲搦捺薑汁以三味爲末調傅之中夜腫消初盖先採何首烏擇焉不精爲狼毒雑其中以致此撓也 類編

治蠱毒方

嘉祐中范吏部道爲福州守日揭一方於石云凡中蠱毒無論年代近遠但煮一鴨卵挿銀釵於内併嗡之約一食頃取視釵卯俱黒即中毒也其方用五倍子貳兩硫黄末壹錢甘草生半寸半炙丁香

輕粉各少許

糯米貳拾粒

右八味瓶内水十分煎取七分候藥面生皺皮爲熟絹濾去滓通口服病人平正仰卧令頭高覺腹中有物衝心者三即不得動若出以盆桶盛之如魚鮓之類乃是惡物吐罷飲茶一盞三五九經旬平復類編

解蠱毒并呪方

賊鮓醬十日後服解毒元

項有朝官與一高僧西遊道由歸峽程願竟遠日過中餒甚行尋村舍間其家而敷小村舍可無憂也食至僧閉目誦持俄見小蜘蛛緣碗吻神呪可速殺之於是竟食無所損其呪曰姑蘇啄摩耶吾僧曰速殺之於是竟食無所損其呪曰姑蘇啄摩耶吾知蠱毒生四角父是穹窿母是舍耶女眷屬百萬千吾今悉知汝摩薩薩摩訶時同行者競傳其呪所至無

恙別傳解毒方用

豆豉炒粒　巴豆去皮粒

右入百草霜一處研細滴水丸豪豆大以茅香湯吞下七丸

治金蚕蠱毒方

泉州一僧治金蚕蠱毒云繞覺中毒先吃白礬湯味甘而不澁次嚼黑豆不腥者是也但取石榴根皮煎汁飲之即吐出活虫無不愈者以李晦之云以

白礬　茶芽　搗爲末冷水服凡中一切毒可治之

雄黃散治五積蠱毒

雌黃末　雄黃末　麝香末

右各壹錢取生羊肺如指大以刀開內雄黃等物以肺
裹吞下
治蠱毒方
白礬末　甘草末
右等分清水調下或吐出黑涎一兩椀或瀉曾驗
又方　牡丹根搗爲末服一匕日三服
中桃生毒方
與化人陳可大知肇慶府肋下忽腫起如生癰狀頃
刻間其大如椀識者云此中桃生毒也俟五更以豪豆
細嚼試若香甜則是已而果然乃搗
右取冷熟水調二大錢連服之遂洞瀉出生葱數莖根
川升麻爲細末

鬚皆具腫即消縮煎調補且食白粥後亦無他

又方

雷州民康材妻爲蠱巫林公榮用雞肉桃生東
一者善醫療與藥服之纔食頃吐積肉一塊剖開筋膜
中有生肉存已成雞形頭尾皆翅悉肖似康訴于州州
捕林置獄而呼楊生令具療疾證用藥其略云凡喫魚肉
瓜果湯茶皆可桃生初中毒覺胷腹稍痛明日漸加攪
刺痛十日則物生能動騰上胷痛沉下則腹痛積以瘦
悴此其候也在膈上則取之其法用熟茶一甌投膽礬
半錢於中候礬化盡通口呷服良久以雞翎採喉即吐
出毒物在下膈即瀉之以米飲下贊金末貳錢毒即瀉
下乃擇人參白朮各半兩碾末同無灰酒半升納瓶內

慢火熬半日許度酒熟取温温服之日一盞五日乃止

（地漿治菌毒方）

然後飲食如故

四明温台閒山谷多生菌然種類不一食之閒有中毒往往至殺人者蓋蛇毒氣所熏蒸也有僧教掘地以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活此方見本草陶隱居注謂之地漿亦治楓樹菌食之笑不止俗言食笑菌者不可不知此

（治中菰菌毒方）

茅根煎湯服吐下解

（熟艾煮服三五盞）

雄雞血亦可

崇寧間蘇州太平山白雲寺五僧行山間得蕈一叢甚
大摘而煮食之至夜發吐三人急採鴛鴦蕈生啖遂愈
二人不甚肯啖吐至死此蕈黃白花傍
水依山處皆有之治癰疽腫毒尤妙或服或傅皆令人
謂之金銀花又曰老公鬚本草名爲忍冬(本草已志)
中酒毒(方)飲酒中毒經日不醒者用
黑豆壹升煮取汁
一服一小盞溫服不過三服即愈(今人所謂中酒也)
中鰿魚蝦蟆蠏毒(方)
頃有一士人好食鰿魚及鱉與蝦蟆嘗云此三物不可
殺大者有毒殺人蝦蟆小者亦令人小便秘臍下敝疼
有至死者宜以

生豉壹大合

右投新汲水半盌浸令豉水濃頻服之即差茅亭客話

中豆腐毒(醫治方)

人有好食豆腐因中其毒醫治不效偶更醫一至中途適見做豆腐人家夫婦相爭因問之云今早做豆腐畏籬薁湯置腐鍋中今豆腐不成盖豆腐畏籬薁也醫得其說至病家凡用湯使卒以籬薁煎湯或調或嚥病者遂愈

諸果有毒(本草)

諸果有毒桃杏双仁毒五月食未成核果令人發瘧疽癰及寒熱又秋夏果落地為惡虫緣食令人患九漏桃花食之令人患淋桃李仁不可和雞子食患內結不消

原闕

原闕

酒磨服　灸近頭疼太陽疼(薄荷)酒磨塗及含藥少許吞下牙痛緊急磨塗一九分
三服　打撲顛撻損傷折炒松節)酒磨下半粒仍以水磨
塗　湯火犬鼠蜈蚣毒蛇百虫傷並用水磨塗并服一
粒　癰疽發背未破魚臍瘡諸般瘡癤惡瘡腫毒水磨
塗并服覺痒即消　治小兒急慢驚風五疳八利寒水
薄荷磨隨大小加減孕婦不可服　牛馬六畜中毒亦
以此救神良　凡居家或出入不可無此藥真濟世衛
家之寶也如嶺南毒藥最多若遊宦嶺表才覺意思不
便服即安二廣山谷間有草曰(胡蔓草)又名(斷腸草)若
以藥人急水吞之急死緩水吞之緩死又取毒蛇殺之
以草覆上以水洒之數日菌生其上取為末酒調以毒

人始亦無患再飲酒即毒發立死其俗淫婦多自配合
北人還即戒之曰子某年來若從其言即復以藥解之若過
還即與之情相好多不肯逐北人回陰以藥置食中比
期不往必斃矣名曰定年藥北人甭彼亦宜誌之若覺
着毒或於雞豚魚羊鵝鴨等肉內下藥後食此物即觸發急服此藥一粒或二粒
下藥後食此物即觸發急服此藥一粒或二粒
五倍子 叁兩淡紅黃色者起碎洗淨 紅牙大戟 壹兩去蘆研細 甘遂 貳兩洗淨
右三味焙乾爲末入麝香研叁錢 麝香研叁錢
續隨子 壹兩去殼研細 白礬 貳兩洗淨
右三味焙乾爲末入麝香研叁錢
右三味焙乾爲末入麝香研叁錢
右三味焙乾爲末入麝香研叁錢

足人及雞犬見之有一女子久患勞瘵命垂旦夕爲血
尸所噬磨一粒服之一時久吐下小虫千餘條
保靈丹解毒方論治蠱毒諸毒一切藥毒神妙
往時蜀俗喜行毒而城都故事歲以天中重陽時開大
慈寺多聚人物出百貨其間號名藥世者於是有於寔
隙間呼貨藥一聲識其意驅投以千錢乃從寔隙度藥
一粒號解毒丸一粒可救一人命夫迹既回側故時多
疑神仙政和間祐陵以仁聖惠天下嘗即上清寶錄
宮中之前新作兩亭左曰仁濟主給藥治疾苦右曰輔
正主符水除邪思因遂詔海內凡藥之治病彰二有聲
者悉索其方書而上之焉於是城都守臣監司奉命相
共窮其狀乃得僊解毒丸家蓋出世拒行毒者爲齟害

故歷其迹非有所謂神仙者既據方修治得其全即并
藥奏御下殿中省上曰朕自弛天子所服御以濟元元
毋煩有司也繇是殿中省群醫諸司驗其方則王氏博
濟方之保靈丹不當是時猶子行適領殿中監事故獨
得其詳吾落南來是藥嘗救兩人食胡蔓草毒得不死
蓋不可不書百衲居士鉄圍

朱砂壹兩淨細研　大山豆根兩半雄黃
麝香　黃藥子　黃丹

續隨子生杵末貳錢半　班猫貳去頭錢半翅足
赤蜈蚣貳去頭足炙壹生

右十味各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合不
令雜犬婦人見用糯米稀糊丸如圓眼核大陰乾磁合

收每服一九好茶清吞下不得嚼破須吏病人自覺心
頭如物下或自口出或大便出嫩
則是蟲或蜣蜋諸雜帶命之物若血老則是鱉或蜣蜋諸雜帶命之物下或自口出或大便出嫩
下以水洗淨收之可救三人如中毒口禁即扳開下藥
或蛇蝎馬汗諸毒以好醋磨傳患處立解服藥已效如
知毒害之家不必研究若訝之其毒再發後更
忌酒肉毒食一月惟軟飯可也或急用但擇吉日精潔
修合此方出劉涓子神仙遺論雜峯普濟方一卷

獸能解藥毒論

名醫言虎中箭食青泥(青石)野猪中藥箭緣齒尼而食雉被
鷹傷以地黃葉貼之又麝香試之鼠
中如醉亦不識人知取(泥)汁飲之須臾平復為獸虫物

猶知解毒何況人乎被矢中者以甲虫末傳之

○蛇虫蜈傷

治蛇蠱方論

臨川有人以弄蛇貨藥爲業一日方作場爲蝮所齧即時殞絶一臂之大如股少頃徧身皮脹作黄黑色遂死有一道人方旁觀嗤言曰此人不死矣我有一藥能療但恐毒氣益深或不可治諸君能相與證明方敢爲出力衆咸竦踊勸之乃求錢二十文以往繞食頃奔而至命汲新水解裹中藥調一升以杖扶傷者口灌入之藥盡覺臍中搰搰然已能起與未傷時無異遍拜觀者且鄭重謝道人道人曰

此藥不難得亦甚易辦吾不惜傳諸人乃香白芷並一物也
法當以麥門冬湯調服適來事急不暇姑以水代之吾今
活一人可行矣拂袖而去郭邵州沍得其方嘗有鄱陽一
卒夜直更舍為蛇齧腹明旦赤腫欲裂以此飲之即愈
被毒蛇傷方本草衍義
有人被毒蛇傷良久已昏困有老僧以酒調藥一錢灌
之遂甦及以藥滓塗咬處良久寢灌二錢其苦皆去問
之乃用
五靈脂壹兩 雄黃半兩
右為細末酒調下貳錢爾有中其毒者用之無不驗也
治蛇傷欲死者
雄黃末為餅貼瘡豬血調貼亦可

香白芷 麥門冬湯調白礬末塗之
北細辛末水調塗仍以酒服之
鴨舌膽礬末沸湯化細呷并傅瘡
五葉藤又名五爪虎陰乾為末乾摻止痛立安
巴豆數粒細研貼瘡
立效散治蛇傷垂死者
鐵蛟龍一名金蓮花 取根水藕兩對一名烙乾
貝母各壹兩 雄黃半兩 天雄壹箇
知母
紫荷車真北細辛
大川烏壹箇生用
右細末用生地黃酒調服即愈如鼻口血來生酒地黃
加雄黃丸下如傷風隨脉證用發散藥並服之見瘡口
腫不消用針腫處候毒氣出即安如有孕婦則除天雄

少用(川烏)忌食葷物蕭南仲方屢效

(治一切蛇毒所傷方)

赤脚大蜈蚣壹條(兎)上焙乾 雄黄

巴豆霜各壹錢 麝香少許

右爲細末以杏核數箇每箇各磨成一竅去仁填藥在內令滿却以蠟塞竅臨時蠟丸以針挑藥末塗傷處候黄水出即瘥用畢後塞其竅一枚可救數人

(治蛇咬腫痛)七葉黄荆搥爛塗之

(治蛇傷方)酒研水邊烏桕根喫即活

(又方)急以酒調好雄黄末傳之毒水流如涎大效

(治蛇虫所傷方)凡蛇傷虫咬倉卒無藥去處以大藍汁壹椀雄黄末貳錢

右調均點然在所傷處併令細細服其汁神驗如無藍以
(殺花)青黛代之
(山林日用法)每欲出時用
雄黃壹兩燒烟起
右以熏脚綳草屨之類及袍袖間即百毒不敢浸害邪
祟遠避
(治蚯蚓咬方)
浙西軍將張韶爲蚯蚓所咬其形如大風眉鬚皆落每
夕蚯蚓鳴於體有僧教以濃作塩湯浸身數遍雄黃傅之朝野僉載
(治蜘蛛齧方)雄黃傅之
(中蜘蛛毒方)治蜘蛛咬一身生絲
羊乳壹味飲之

貞元十年崔貞外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾而平本草

(誤吞蜈蚣方)

有村店婦人因用火筒吹火不知筒中有蜈蚣藏焉用以吹火蜈蚣驚迸竄入喉中不覺下胷臆婦人求救人無措手適有人在傍云可討小猪兒一箇切斷喉取血令婦人頻服之須臾以生油一口灌婦人遂吐出繼與雄黄細研水調服遂愈

(蜈蚣咬方)

蜘蛛取壹枚咬處安當目似者立効今人以蜘蛛飲毒了即將放浄水中以活蜘蛛

甚妙孫真人

(又方)中蜈蚣毒者以烏雞屎水調塗咬處效　大蒜塗亦效

桑汁和白塩塗亦效

又畏(蛄)蝼蛄蝓不敢過所行之路觸其身即蜈蚣死故取(壁鏡)咬方(壁鏡)毒人必死用(白礬)治之

(又方)壁鏡毒人必死用(白礬)治之

(又方)以柴灰汁三度煮沸取(白礬)爲膏塗瘡口即善治療蛇毒亦效

(蚕)咬人毒入肉方(取)芋塗之

(治)諸獸毒方

本草

馬咬用獨顆栗子燒灰帖　猫咬用薄荷汁塗
鼠咬用麝香唾調塗或用猫毛燒灰敷之
狗咬傷涎入瘡令人昏悶者急浸椒水調南草末塗
猪咬松脂鎔作餅子貼又屋溜中泥

(蛛爲蜂螫方)

處士劉易隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂骨于蛛網蛛持之爲蜂螫墜地俄頃蛛鼓腹破裂徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有爲蜂螫者授芋梗傳之而愈

(天蛇毒方)

太子中允關杞魯提舉廣南西路常平倉行部邕管一醫言能治使醫視之曰此毒舉身潰爛有一

天蛇所螫毒疾已深不可為也乃以藥傳其
鉗拔之有物如蛇凡取十餘條而疾不起
又予家祖妣癸在錢塘西溪常有一田家忽
爛號呼欲絶西溪寺僧識之曰此天蛇毒爾非癩也取
木皮煮飲一斗令其恣飲初疾減半兩三日頓愈驗其
木乃今之秦皮也然不知天蛇何物或云草間黃花蜘
蛛是也人遭其螫仍為露水所濡乃成此疾露涉亦當
戒也筆談

誤飲蛇交水毒方

陳齋郎湖州安吉人因涉春渴掬澗水兩口嚥之數日
覺心腹微痛日久疫甚服藥醫診之云心脾受毒今心
脉損甚齋郎荅云去年春渴飲澗水得此病醫云齋

郎喫却蛇在澗邊遺下不淨在澗水內蛇已成形在腹中食其心而痛也遂以水調雄黃服之果下赤蛇數條皆能走也名醫録

(猘犬所傷方)

沈約宋書曰張收嘗爲猘犬所傷醫云宜食蝦蟇膾收甚難之醫含笑先嘗收因此乃食瘡亦即愈

(犬傷方)凡犬傷人量所傷大小

杏仁爛嚼沃破處以息繫定至差無苦本草衍義

(虎犬咬人方)

白礬末糝瘡中裹之一止痛立愈

(蝎螫方)

礬石壹兩醋半升煎之投礬末於醋中

右以礬醋浸蜜處井底泥傳亦愈

治蠷螋妖虫方隱於墻壁間尿射人之影令人通體生瘡如湯火所傷治法用

烏雞翅毛燒灰

右麻油調傅以雞者白虫塗四畔瘡即愈

又方用雞子尖頭刺小竅取白塗四畔瘡虱螢火扣頭虫皃角虫皆能為害有人患腦痛為虫所食或教以

桃葉一握搗碎綿裹塞鼻孔中須臾虫自鼻出形為鷹嘴人莫知其名有人右為枕睡一夕虫自鼻出形為鷹嘴人莫知其名有人

蜓蚰入耳遇其極時以頭撞柱至血流不知云痒不可忍蜓蚰入耳往往食髓至盡又能滋生凡虫入耳麻油灌妙

○湯火傷

治湯火瘡方

劉寄奴不以多少

右爲末先以糯米漿雞翎掃傷處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯着急以塩末摻之護肉不壞然後用藥傳之至妙本事方

湯潑火燒詩

細碾山梔子濃調雞子清鵝毛輕拂上立便冷如氷

又方 黄連 黄柏

輕粉各等分研細硝少許

治湯潑火燒方

右爲末入麻油用合子合住上飯蒸調塗立效愈

生側柏葉燒灰存性
右碾爲末以雞子清調
黃柏散治湯火傷
雞子殼　黃柏樹皮　朴硝
右等分爲末白水調塗極妙
三聖膏治湯火傷
雞子黃壹兩
右用銀石器內熬自然油調好粉傳之愈

拾遺

湘 麓 朱 佐 君輔

半夏圓治五絶一曰自縊二曰墻壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳及此五絶皆以半夏壹兩

右爲末水圓如豆大納鼻孔中即愈此是扁鵲法好事者閑慢製下危急得濟 南嶽魏夫人方

治魚骨哽

橄欖一味用急流水調服之若無橄欖亦可

又方 白梅取肉去核砂糖合下須更自下
又方 玉屑無憂散用貫衆調下妙不可言
鹽梅丸 治誤吞鐵錢及骨鯁之類
古文銅錢拾數枚 入白梅拾箇淹過宿即出
每服壹圓如彔豆大侵晨取流水吞下即吞
治誤吞鐵錢
羊脛骨灰為細末米飲下
泥齊取汁呷之自化
又方 山棗子燒灰存性白湯服 武林劉開國大任傳
治非子藥
滑石半兩 彔豆粉四兩炒過
右研如粉捺之

(田螺散)治狐臭有效

田螺兩箇各起掩入巴豆壹粒去殼取肉入在螺內仍掩生須臾盡化成水却去掩挾任胃下令水貼在肉上須臾狐氣上衝惡心欲吐却以感應丸一貼并

(神保丸)三九同用温湯送下令瀉即愈兩服斷根

(丁香九)治積熱傷食

丁香三粒去殼用管子盛粒砕去油入鉢内研熟烏梅一個四顆去殼巴豆一粒炮干

縮砂四粒去殼用管子盛粒砕去油入鉢内研熟烏梅一個四顆去殼巴豆一粒炮干

右除巴外並爲細末仍入巴豆研勻却用百草霜同和麵糊爲圓如綠豆大煎米飲下積塊不妨大小而用有效

(豆蔻圓)治濕腰痛嘔虫

陳皮　甘草
半夏　沒石子各二錢半
肉豆蔻　訶子兩各半　厚朴製柒錢木香

右㕮咀每服三錢姜三片棗一枚水一盞煎七分無時
湘中老醫陳必勝以此醫一女使遂除根本

四物湯治休息痢

四物湯下駐車丸每服百粒痢初作一服而愈此方
係順慶朱承事家施人無不見效

化蟲丸治諸蟲

蕪荑　錫灰
神麴　麥蘗

右等分爲細末麻油爲圓取月初五更空心用炙猪肉
細嚼藏汁不喫肉汁引動蟲次用濃煎石榴根湯下丸

靈脂散(新增)治毒蛇傷

五靈脂壹兩　雄黃半兩

右爲末以酒調服以滓塗咬處甚者再服出醫說

又方

急以酒調好雄黃末傳之毒水流如涎大效

(治鼠瘡方)(新增)

信石(入豉豆同研)班猫(去足羽)爲末

右麵糊爲圓黃丹爲衣用時打破以醋浸一宿其瘡先

以艾灸次用此抹

又方

白朮　白伏苓

甘草　黃蘗(新增)

當歸　檳榔　白芍藥各壹兩　郁李仁半兩　班猫壹分（去班猫炒黑去足羽）　白並　黑牽牛半生半熟各壹兩　蜜陀僧壹分（用林米同炒黃色為度）

右為細末粳米糊為圓如芥子大小兒七圓大人十九至十五圓灯心湯下忌葱菜油膩房色酒不妨忌使性氣孕婦不可服後服復元通氣散立效

治齁喘

甜瓜蒂柒枚　研為麁末用冷水少許調澄取清汁呷一小呷如其吐緩飲竟即吐膠黏狀胷次既寬齁亦定少再作又服之隨手而愈

（治紫白癜風）

蜜陀僧別研爲末五錢　白然銅研五錢重篩研別研爲霜

猪牙皂角五錢爲末

右爲末和勻先用熱水指洗去黑被抹乾用水調藥薄抹肉上令入肉紋一日晚用一次三次

黄柏散　治穀道生泡痒而復痛此風毒流行證

黄連去鬚　白礬煆過

白蛇皮燒灰各等分

右細末重篩入麝香蝎梢少許和勻津唾調抹瓜破水

出則乾糝。一方只用黄柏皮末壹錢枯礬半字和勻

米泔調塗此方專治行路指縫谷道痛仍用水先洗

（唾調散治同前　五味子末唾調

蛇床子 葉本 各壹兩 硫黃壹分 石亭脂 老硫黃青
射香貳分 月色壹錢

右先用前二味爲細末却納細殺後三味併入前末和勻
生麻油調於無風處爬發用少許在掌心合定候融煖
化稀遍身搓擦

服四物湯勻氣血祛風毒四物湯用生地黃赤芍藥
加荊芥等分粗末水煎

治風癬癬有數種荷葉瘡者最開生如圈多在頭面柯皮癬鮮
者皮厚痒痛

輕者用荷葉心左纏藤荷葉同爲末麻油調塗厚者加
砒少許和勻水調塗

煮膠法　梁國佐傳

鹿角不以多少先用斧缸盛水浸三日漉出用鋸二寸長一塊別換江水再入缸浸三日用一大瓦鉢有蓋者用塩泥和泥固濟隨鉢大小作一罨用第二次所浸水入鉢内和鹿角煮常以鐵瓶燒水在罨門口如鉢内水耗一寸又添一寸斷不可斷火以煮盡水爲度第四日早漉出三日三夜不可斷火以煮盡水爲度第四日早漉出用乘熱將修去皮便成鹿角霜鉢内所餘汁須要熬取十分稠粘却用竹筒溜出掛在陰凉處隔宿即凝結破開竹筒用布線鋸成餅子收頓

（又煮膠法）須用兩鍋一鍋常要温湯準備添用

（又法）

鹿角不用自死者不以多少三寸許截斷去麁皮將
鹿角於河水內浸七日其每日一易候日足洗淨鍋
中煮每鹿角五斤用桑白皮半斤楮實一斤胎上硫
黃二兩朱砂二兩同煮之如水盡旋添湯及一伏時
自然已軟或火不相繼未軟再煮一伏時如軟放冷
取出於當風處掛起候便可入藥用煮角水濾去諸藥
慢火再熬便可爲膠

（貞藥法）

窒劑每藥壹斤用窒壹斤
麵糊劑每藥末壹斤用麵四兩
米粉亦如之

養生雜論

青牛道士

皇甫隆遇青牛道士封君達二體欲常少勞無過食去肥醲節酸鹹減思慮損喜怒謹房室

養性

養性之道欲小勞但莫太疲及強所不能堪爾食欲小飢不欲頻常如飽中飢飢中飽善養性者先飢乃食先渴乃飲食後當行畢摩腹數百徧暮卧常習開口開則失氣邪從外入屈膝側卧益人氣力勝正偃卧春欲晏卧早起夏秋欲夜寢早起冬欲早卧晏起雖云早起莫在鷄鳴前雖云晏起莫在日出後莫久行久立久坐久卧久聽久視

莫強食莫強酒飲則不欲多多則□□□□□
至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不久處□□□□□
卧不至厭先寒而衣先熱而解□□□□□

真常子養生

酒多血氣皆亂　味薄神魂自安　夜漱却勝朝漱
暮餐不若晨餐　耳鳴直須補腎　目暗必須治肝
節飲自然脾健　少思必定神安　汗出莫當風立
腹空莫於茶穿

孫真人養生銘

思多損神　神疲心易役
怒甚偏傷氣　氣弱病相縈
勿使悲歡極　當令飲食均
再三防夜醉　第一戒晨嗔　亥寢寅鳴叟敲

寅興喪玉津　妖邪難犯已　精氣自全身
若要無諸病　常當節五辛　安神宜悅樂
惜氣保和純　壽夭休論命　修行本在人
若能遵此理　平地可朝真

孫真人十二多

多思則神殆　多念則志散　多欲則志昏
多事則形勞　多語則氣乏　多笑則臟傷
多愁則心懾　多樂則忘錯　多怒則百脉不定
多喜則忘錯昏亂　多語溢　多惡則憔悴無歡
多好則專迷不理　多惡則憔悴無歡

真人養生銘

人欲勞於形　百病不能成　飲酒勿大醉

諸疾自不生　食了行百步　數以手摩肚
寅丑日剪甲　頭髮梳百度　飢即立小便
飽即坐旋溺　勿當風　居止無小隙
遇夜濯足卧　飽食終無益　思慮最傷神
喜怒最傷氣　每去鼻中毛　常習不唾地
平明欲起時　下床先左脚　一日無灾殃
去邪兼避惡　如能七星步　令人長壽樂
酸味傷於筋　苦味傷於骨　甘即不益肉
辛多敗正氣　鹹多促人壽　不得偏躭嗜
春夏少施泄　秋冬固陽事　獨卧是守真
慎靜最爲貴　錢財生有分　知足將爲利
強知是六患　少慾終無累　神靜自當安

修道宜終始　書之屋壁中　將以傳君子

楊泉物理論曰穀氣勝元氣其人肥而不壽元氣勝穀氣其人瘦而壽養性之術使穀氣少則病不至矣

養性之術

四損

多睡損神　多汗損血　多疾行損筋

類編朱氏集驗醫方卷十五終