

陳立  
序

吳之  
序

序

寫

有

清

肉

十五年二月三日

# 男女隱病

朱振聲

## 發育不全

(一)

問 振聲先生同道未經御 李意切贍韓夙仰 先生畢  
業於 丁公之門。每欲臨書問候。又苦拿址不詳。以是思慕  
之忱。與時俱集。茲購閱尊編腎病研究。始知 台端下榻深  
處渴想。爰不揣謹附託神交。時得開函而如面。則慶幸何

如茲肅者。友人楊君之子。今年齡十九。勤讀詩書。約在十六  
七歲時。先有白濁之患。繼有夢遺之苦。乞診於予。余曾受業  
於興化魏小泉先生。予治以滋陰泄熱之品。近來較前稀減。  
一月約有兩次體瘦肉闊。健忘耳鳴心悸。頭空眩。神疲氣悶。  
小便短黃。陰毛既發。而生殖器細小。如未成年者狀。惟陰莖  
時短時長。並易勃起。勃起時。龜頭突出。而小精易出。且乳頭  
不高。起據述從前年稚無知。思想不正。予爲之一再診察。斷  
其相火亢進。遺泄太早。含苞之花。遽被摧殘。以致龜頭舉九  
大傷。失於涵養。此乃生殖器發育不全。前楊君囑予向幸福  
書局代購腎病研究。以資參考。購來覽及。  
兄所立陰莖短小簡治法。但此法弟亦曾於遺精廣論見知。

之並已經停其遵藥物治療。自然療法施用。瘡潰流弊。諒因藥丸不合症情故也。竊思家傳之方。殊無效果。此因僅恃藥餌無功。非求他法。且弟與楊兄情關至契。故不得不於無法。自求方法。殊無

(杭海仙)

(二)

問 鄙人因小時被下人將生殖器玩弄。致生殖器於小時  
即脫壳。後鄙人因年小不知。再犯手淫。今則年大。略懂手淫  
之事。因之不犯。然鄙人今年已十七。而身小若幼年。故甚憂  
慮。恐發育不全(單金達)

答 身體長大及短小。關於先天。實無法可施。手淫過度。亦  
能致發育不全。此後宜勉力戒除。此惡習。節制性慾。不使此  
心妄動。靜養數年。亦能恢復健全。惟恐 足下無恒心耳。

## 陰莖短小驗方選

尤學周

某君年二十歲。身體素弱。生殖器短小。如童稚。當屬具體而微。  
未曾發育。有似天鵝。用雄豬陰莖。將剪刀破開。陳酒洗淨。文  
二二三

火燉酥如綿油。常服不斷。如此五六年。始發育如成人。直隸贊皇孫陸敬之爲循吏。陸某之孫生而天閻後得一方。用何首烏。生取汁和人乳服之。三四月後。下部時覺熱氣衝動。五六月後漸發育。一年後竟生子矣。(蔡濟平)

(學周按)陰莖短小。有由於先天不足者。有由於後天斬喪者。先天不足。名曰天閻。顧名思義。即知本症之不易圖治矣。後天斬喪。多於青年發育之時。性慾不節所致。較諸天閻。尚有挽救之希望。本節應用之二祕方。竟能使天閻者成爲偉器。女媧補天功亦偉矣。苟用此二方施之於後天斬喪者。如鑿斯應。意中事也。然實際上恐不能如天閻者見效之捷。蓋得諸先天者。早存絕望之心。於性慾一事。已屬無緣。而一點真陽。反賴以保持。加以相當之養料。不難欣欣向榮。其由於後天斬喪者。不特一點真陽不能保全。且習慣成自然。放心不求。一時亦難於控制其慾念之不發。雖有良方。其如不能得力何。

## 陽痿早洩

牙振聲

問 敵外幼犯手淫。以至遺精十有餘。日間稍覺疲乏。夜必患之。百不一償。每月至多雖減。二三次而精神不振。記憶力銳退。面色蒼白。與予結婚之後。竟不克盡其人事。一觸即

洩。有時未作入幕之賓。已倒戈先遁。鴉片煙本有固精之可服。之絲毫未見效。驗市售丸散。亦嘗試服數種。均如石沉大海。影響全無。七寶美髯丹。亦服數兩。未見功效。本草謂洋虫九枚。用蛇床子湯沖服。能壯陽事服之。亦未見効。予每責其何不早醫。據云。碍難啓齒。以至一誤再誤。在未結婚以前。尙未感有何項痛苦。結婚後。雖亦在外日多。而工作繁勞。因是精神日見衰敗。甚至心有所動。精已還出。前年尙能自動堅強。去歲大病之後。不復自主矣。卿雖不負我。我實負卿。予聆斯言。五內欲裂。雖自歎命薄然。亦無可如何也。彼既未能盡其夫職。巧婦又何能爲。無米之炊。翁姑對予頗有煩言。(意謂不能生育)予祇有暗自飲泣而已。近檢本草。謂陽事不起。用五味子研末。溫酒下。忌豬魚蒜醋。百日自見功效。法雖簡便。予因不知藥性。未敢令彼嘗試。所謂忌豬魚等。是否服五味子後。即不能吃猪肉魚等。又日前見貴報某君。問葵蕊及○○○等分研末。陰乾。○○能令陽事。引八。(藥名製法用法。均已忘記。能再見示尤甚感激)敵外陽事據之較前縮小甚。多未知。亦能仿用此法否。予因頻受翁姑及妯娌冷譏熱笑。難以自堪。外子既目不識丁。就醫又碍難啓齒。故不瑞冒昧。將種情形。錯雜道陳。懇乞貴報。各大醫師詳悉。簡易良方。俾外子恢復康健。

實不啻再生之恩矣。肅此奉慰並頌

大安

嚴嫵梅鞠躬

答由手淫而遺精。由遺精而陽痿早泄。因腎陰虧耗。以致性神經衰弱。夫婦之道。固不僅求性慾之滿足。而處於「無後為大」觀念之舊式家庭之中。將產生不良之結果。而招翁姑之歧視。固意中事也。身為女子者。既不能暢其床第之歡。復受「不育」之母妾之謠言。其痛恨為如何。然處此環境之中。既然「自嘆薄命。無可如何」。則當代為設法。於絕處求生路。常人對於本症。祇知服藥。一若藥石萬能。除服藥而外。無別種方法。不知本症之發生。由於縱慾太過。服藥以補償其所失。固無庸議。性慾貴有節。縱慾成疾。尤當「絕慾」。首先降伏其心。不使妄起慾念。再則不行房事。夫婦分床。禁慾一二年。枯楊始有生稊。之望。服藥「無比山藥丸」。加味金剛丸。皆可服食。然亦非一月二月之功也。

## 口陽痿之原因及療法

沈熊璋

名稱——一名陰瘞。亦名陰莖勃起障礙。即當交媾時。陰莖之擴大不足。硬度減低。或全無奮起力。因之不能插入女子腔中之謂也。

原因——有一時性陽瘞與持續性陽瘞之別。一時性陽瘞

者。有由於精神過勞者。如治療自潛過度者。有由於睡眠不足者。有由於機能發弛者。(如獨身主義者及佛教信徒。因生殖器官久廢不用。致勃起力減弱或缺如)。有由於精神感應者。(如老人與少女交接。自慮持久力不足)

持性陽瘞。有由於生殖器之畸形者。如陰莖彎曲。陰莖短小。包皮狹小等。有由於藥物飲料中毒者。如常服臭素及烟燐酒。癖過深之人。有因腰或性神經衰弱者。如房事過度。腦力過用。或手淫遺精等。有因於他種疾患而發者。如糖尿病。肥胖病。脊髓病。腎臟炎。慢性淋疾。攝護腺炎等。

症狀——局部為陽物軟弱無力。全身則現虛弱症狀。

療法——赤脚大仙種子丸(全當歸。肉蓯蓉。蓮鬚蕊。杜仲。菟絲子。淫羊藿。遠志。鹿角破故紙。牛膝各八兩。枸杞四兩。鴉桂心二兩。綫魚膠二斤。大天雄每枚重一兩四五錢者二枚。蜜丸)。傅青主方(熟地一兩。山萸肉四錢。遠志。巴戟天。肉苁蓉。杜仲各一錢。肉桂。茯神各二錢。白朮五錢。人參三錢。五兩。熬膏)。

攝生——食滋養之物品。(如牛肉汁。鷄肉汁。雞卵。魚肉。而

以羊腎或羊肉和米養粥爲尤佳）爲規律之運動。（如珠術拳術郊行乘馬皆可。惟須有一定之時間持續之恒心及勿使太過爲要）行局部之冷浴（以冷水灌注生殖器及脊柱復以毛巾拭乾）保精神之安靜。杜淫獵之言行預後——苟非重篤之症皆有治愈之望。一般之患陽痿者每焦灼憂懼若搜沈疴此大誤也。考陽痿非死症充其量不過喪失床第之歡耳。夫床第之歡爲使神經感覺愉快之一種方式並非舍此方式即無快愜可得。如伴愛人小語於綠蔭之下。徜徉於山水之間。如與嬌妻歌唱於明月之夜。舞蹈於氍毹之上。此種精神之愛戀實人生無上之幸福也。

## 陽痿治療

梅竹洲

謝君係余學生少隨讀書娶妻多年未有孕育在伊父久欲稱公奈伊兒難於生子本擬小星之詠飾說大婆之難實在下體沾病有不敢遽出諸口者也。未幾伊父逝世而宿疾方敢言醫爰詣余寓求余訂方只說要補問渠何病答曰醜醜不便不便余則笑而談之謂吾與汝本有師生之誼以生對師有何不便之處後乃含羞細語謂老蚌間有珠吐枯楊難望稀生苦之陽具其不舉者既有年矣未知先生有無方法余說此陽痿之証實爲房事之累與補中益氣湯去生薑陳士云淫羊藿治陰虛陰痿巴戟天治陽虛陰痿陰陽並施得

皮加杜仲杞子菟絲子巴戟淫羊藿起石海狗腎鞭鹿鞭等味。囉他多服定可壯陽第要守身毋生妄念否則不惜元氣服藥無益。彼曰唯唯。惟命是聽。從此靜養數年復娶達室竟生一子。何幸如之。此證暫則易療治法不外補腎壯陽乃爲根本解決所以補中益氣湯加減原方爲氣虛下陷而陽痿又是氣虛下陷故低垂弗起所以用參者以補氣提其陽即以起其痿當歸補血俾血液充滿海綿體則陽具自然膨大而勃起何有致於陽痿耶。白朮甘草甜則入脾稼穡作甘以補其中土。即內經所謂精不足者補之以味歟且脾爲後天飲食入胃自能滋生先天之腎氣足則陽不痿加以杜仲杞子菟絲子巴戟補腎壯陽陽壯則陽不至痿合之柴胡麻俱以其陽氣一升亦不致於痿。海狗腎驥鹿鞭以三獸之鞭久戰不屈屢戰不休取其象形以治從頰而施有大補元陽者也。至淫羊藿其梗如草梗葉如楓葉一說此草主淫有土人看見白日無風美女經過其地距離尺許霍草低垂下拜似人點頭頻頻一般一說北部有羊一日百戰因食此藿所致故名陽起石出齊州雲母根也嘗有大雪偏境而此山獨無以陽氣蒸騰熱氣突起乃禦天陽之氣凝結而爲石之精故大雪之寒氣不敢逼近此語豈以治也。葉天士云淫羊藿治陰虛陰痿巴戟天治陽虛陰痿陰陽並施得

效是易有是病必有是藥非是也不能治病中醫藥其可廢乎哉。

## ■ 腎萎及其種類

昌

腎萎即是一種男性的性的障礙。陰莖無力勃起以與女性交接。腎萎由來可分生理的先天的及後天的三個方面。男子到了年老力衰的時候性慾減退甚或完全消失了性的要求。這是生理上的普通徵象也即所謂生理的腎萎。有些先天睪丸缺乏（天閹）或者生殖器構造畸形沒有性的要求或者不能與女子性交的人這就是所謂先天的腎萎。後天的腎萎原因比較複雜但是牠的原因不外乎受人爲的病害所促成譬如因睪丸的疾病而行切除術性的機能即喪失殆盡而成腎萎不過兩個睪丸倘然尚留其一時那未不會因切除一個而呈腎萎的現象又譬如有些疾病一脾病脊髓病以及其他的慢性的全身衰弱病患者肥胖病者也能使生殖器始則勃起衰弱繼至完全不能勃起而成腎萎的腎萎的由來和症狀既有這許多不同因此腎萎的種類可依病原病症的各異分爲下面的四種（一）器質腎萎（二）精神的腎萎（三）神經的腎萎（四）癱瘓的腎萎

## ■ 夾陰傷寒驗方選

尤學周

夾陰傷寒乃房後感寒直中陰經之惡症也可分急性慢性二種急者陽物即時縮入腹內疼痛難忍陽物縮盡性命即不可保一時無藥可用即將陽物用手握住毋令再縮隨用錫壺或酒壺（若無錫器瓷器亦可）內盛沸水隔衣重接臍中陽物即出（若不隔衣用紙一二重隔住亦可因恐壺底太熱灼傷皮膚也）

又法用洋硫磺三錢研細末沸黃酒冲服陽物立出此余家世傳之秘方也萬試萬驗若牙關緊閉陽物業將縮盡者則找一未生老毛之小鷄雞活搗極爛加重便少許壓取濃汁揭牙灌下立甦。

以上皆急性夾陰之治療也其慢性者多發於房後數小時或半日或一二日不定初起祇覺腹痛沈沈漸痛漸劇繼復不覺痛舌漸強而致不能言心中雖醒而週身百節既不能如意運動疾狀至此誠可危矣急取小雄雞一隻重量在一斤以內者活剖其腹不去腸雜覆臍上少頃腹中雷鳴渾身汗出即愈此法奏效神奇萬試萬驗確能起死回生識者幸勿輕視若覆臍時再加麝香少許於臍內則取效更速此皆經驗之談也（鍾俊麟）

(學周按)飲食男女。人之大欲存焉。然飲食無度。必傷胃腸。

男女之間。狂浪不羈。亦必發生種種疾患。急色之子。縱慾無度。既不審天時。復不擇地利。所謂桑間濮上。無處不可實行。其洩慾主義。此與饕餮之徒。同一易於發生疾患。此輩不特易感夾陰。且有脫陽之患焉。漚上已去世之某名醫。以善治夾陰而得名。法用鵝一隻。劑有急慢二症。某名醫之用鵝。僅知慢性之治法。而急性之治法。尙未之前聞得。此篇可以補其闕略矣。

### 下疳包皮腫驗方選

尤學周

患下疳者。其人若爲包莖。則必於潰爛之時。同時包皮發水腫性之腫脹。腫脹之皮膚發有光澤之水紅色。內含水分。以指彈之即可破。此症殊爲困難。既感腫脹之痛苦。而包皮一腫。即不可翻上。洗滌敷藥。又感困難。因之包皮內部。愈加潰爛。若不先消去包皮之腫。斷難收拾愈之功。顧治法雖多。每每不能速效。茲將一最易而最有實驗之祕方錄之。以貢於世。其法用鮮馬齒莧一握。搗之極爛。納入青黛細末五錢。川連細末三錢。冰片少許。共搗成糊。用蠟紙或油紙攤匀。包於陰莖上。每早晚各換一次。二日可消。包皮腫消。即可翻上。而

好洗滌敷藥矣。(續)

(學周按)包莖之人。有因包皮太小。不能下退等。有因包皮太長者。最易藏垢納污。故宜常洗滌。患包莖之人。若尋花問柳。其毒蟲於包皮中。最易傳染花柳病。患者宜深加注意。馬齒莧爲清熱解毒妙品。以之治白帶白濁。皆甚靈妙。佐以青黛川連。退毒之力尤偉。此方不特可治包皮腫。一切熱毒皆可用之。

### 由白濁而起之囊癰

尤學周

囊癰。即睾丸炎。其原因多由溼熱下注。侵入睾丸而起。患白濁者。每易發生此症。大凡此可怕之囊癰。患者十有六七由白濁而起。白濁之爲害亦大矣。

白濁初起失治。似愈非愈。病勢蔓延。及於腎臟。則腎臟疼痛。及於關節。則關節疼痛。及於睾丸。則睾丸疼痛矣。其痛時作時止。作時脹痛徹骨。不能久耐。輕者稍覺牽引。如電光之閃。牽及膀胱。惟一閃即止。此時可用生薏米一兩。北沙參三兩。淡吳萸一錢。海桐皮四錢。煎日三服。如於牽痛之時。不加注意。則病情更進。脹痛無有已時。則用仙方活命飲。穿山甲一錢。兒角刺錢半。當歸尾錢半。甘草節一錢。金銀花二錢。炒赤芍一錢。乳香一錢。沒藥一錢。天花粉一錢。防風一錢。大貝母

一錢白芷一錢陳皮半錢半水酒各半煎服。

## 膀胱左面漲大

問鄙人幼時多病。十一二歲時會發虛腫。病平時稍有頭暈耳鳴等症。前年冬季下部左面膀胱之筋略大。行路時該筋恒有小痛。月可一二次。其痛時間約一二分鐘而精神亦甚憊乏。今年春鄙人返家就醫診治。據云元陽氣缺乏。虛濕火亦盛。但診治匝月無效也。如故嗣即回。因思長此以往甚覺危險。

且鄙人身任跑街職。日奔走於道途中。苟不亟圖補救。則前途焉堪設想。用特函詢先生用何法以補救之。(霖松)

答敬啓者。該症甚難確定。惟奔走則易於牽動。最好改換職業。得能休養。在未明症情以前。不敢遽定內服方。試用白芥子一錢。香附二錢。赤芍錢半研末。熱醋調敷。

## 陰囊濕癩

仁

陰囊濕癩。由於其人分泌水濕之機能不發達。濕濁停留爲患。若其人血分較熱。喜飲酒食。厚味則爲患更甚。又有一種係因白濁之毒退伏所致。患此者。陰囊時常濕潤。癩不堪耐。入夜更甚。有腥臭之汗液。久之必延及跨間兩股。且令人陽

萎。督弱治之。法以麻黃根二錢。飛滑石六錢。牡蠣四錢。蛇床子五錢。密陀僧三錢。赤石脂三錢。冰片四分。薄荷二錢。均研爲末。調勻敷。惟有血毒者不效。應另診治。內服導濕解毒清血之劑。

## 囊癰

按南星治風散血。蘇木行血祛風。紫蘇和血止痛。香圓(即佛手柑)切碎同入公猪尿脬內。好酒三斤。煮爛搗丸。日夜服之。健脾公猪尿脬用爲諸藥導導。又借酒力以和之。故佳。

## 前陰腫治驗

陳應期

清宣統元年八月間。李村張正猶。伊兒兆新。四歲前陰腫痛。民國六年五月間。龍仙岡。陳壽麟十二歲前陰腫痛。民國二十一年三月間。岡廈陳自飄。伊男志養十四歲前陰腫痛。俗名火綻。令均用蚯蚓揩白糖擦敷數日腫消痛止。盡告平。安。民國八年岡廈陳新飄三十餘歲。亦是前陰腫痛。醫者誤以花柳藥治之。升丹爲丸。一連三日。每服丹丸數粒。變本加

膚以致口腮爛。牙肉盡腫。真是上腫下腫。上痛下痛。上下交征。幾不聊生。改延別醫。亦無效果。伊欲自裁。他母問余。有無別法可救。隨即臨床。問他病情如何。據說前陰腫痛。余亦信其無他。不過爲醫所誤。燭伊亦用蚯蚓擂白糖擦敷。數日腫則全消。第有白濁血淋。便溺如同刀割。另與四苓散。并卑薦分清飲合方而治。數劑而愈。所以然者。蚯蚓上應軫星。軫水爲虧。則下飲黃泉水。即以導足少陰之腎水。而濟足厥陰之相火。蚓又上食穡壤。加以白糖入脾。據恰蚯引腹蛭。又以滋足陽明之胃實。而燥足太陰之脾溼。故能應手。

### ■男女前陰腫痛

陳應期

前陰者。後陰之對也。前陰居身之前。後陰在背之後。爲穀道。爲糞門也。前陰在男子。則爲陽具。爲生殖之器。前陰在女人。則爲陰戶。爲生育之門。考之。膀下爲小腹。小腹兩旁爲少腹。小腹者。少陰水藏。少腹者。厥陰肝經。內經云。腎開竅於前後二陰。是前陰者。屬少陰也。經又云。前陰者。宗筋之所聚。太陰陽明之所合也。以陽明主宗潤筋。是前陰屬太陰陽明也。總之經絡貫通。萬殊一本。而其要則歸結於厥陰肝經。夫肝經藏血。主筋。若果血熱作劇。筋被火灼。而熱毒發現。以致前陰腫痛。其平素清潔。并未有臥柳眠花者。則外症須當外治。內

服難以圖功。外療易爲奏效。理或有然。試之屢驗。是則外治之法。實足以助內治之所不及。云爾。試言男子。其在巫雲楚雨。酒地花天。自行作孽。而毒染前陰者。無論已即以平人言之。守正不阿。他無別病。而突於前陰之處。忽而紅腫。忽而痛痒。此證之重要關係。非輕治之非容易也。實在治得其法。究無難事耳。何者。時當酷暑。火傘高張。行路難。囊中伏熱。操工困苦。袴下薰蒸。倏坐泥坪。而補蠍火燒。適爲熱氣所加增。因而毒發前陰。腫大宏長。痛不可忍。有呼號叫苦焉者。治以蚯蚓數條。白糖少許。擂融泥漿。敷之。患處常蘸。常擦。而腫消痛止。真有實驗之單方者矣。若說女人。其爲皮肉生涯。包辦奇貨。自貽伊戚。而毒惹前陰者。弗究已。即以常人論之。守貞待聘。不染淫邪。而忽於前陰之間。倏然腫脹。倏然痛爛。此證之艱危。非同小可。治之亦屬爲難也。實則治有其方。頗易見功耳。此症之起。或陰沉濕熱。反伏治田。少息勤續苔蕨。採樵餘暇。帶做針指。突坐草頭。而陰戶腥羶。致爲土虫所仰吸。因而吐毒。前陰腫浮。高出痛極。非常有涕泣悲啼焉者。治以狼毒數兩。煎水常洗。朝夕無間。洗過數日。不知不覺。而腫散痛除。此又爲實驗之單方也。

### ■陰戶腫痛外治方

羌活防風。葱白各一兩。煎湯薰于陰戶。能消腫止痛。有神效。  
按製字者。以風字從虫。蓋知空氣中多微生蟲。而風邪之病。  
亦多由微生蟲之爲患也。故中醫祛散風邪之藥。皆能治西  
醫所謂之細菌病。且有特效也。陰戶腫痛。亦必有細菌生焉。故  
以防風羌活葱白之祛風藥薰之。可以愈也。

## ■女人陰中作癢

蔣一鳴

女人陰中作癢。乃濕熱下注。及早治之。斷根甚易。惟女子羞  
惡心重。下部陰曲之事。最不願意告人。因循失誤。久則難治。  
成爲終身之累。此症初起。用杏仁輕粉水銀。雄黃四味等分  
研勻爲細末。每五分。以棗肉一枚。和爲丸。以絲綿包裹。留一  
線條。擦擦在外。先用荷薄百部。濃煎。洗陰戶。然後將藥納入  
陰中。留線在外。如欲小便。取出便過。再納入。一日一換。另用  
當歸白芍。生地川芎。黃芩。黃連。山梔。柴胡。茵陳。知母。龍胆。大  
黃等涼營瀉火之品。煎湯內服。(便利者不用大黃)。重者  
四五日可愈。  
或用活蚌一個剖開。將有肉半個。對陰戶合。一夜次日再用。  
一個可以安全。蛤蚌不必用大者。普通河蚌亦足應用矣。(  
編者按)陰中作癢。亦有由於血虛所致者。宜明辨。果由血  
虛。當用補劑。

## ■婦人陰道分泌液過多之疾患

明 善

婦女陰道中時下白色粘膩之液。其甚者有如膿樣。人皆謂  
之白帶。婦女病此者十居八九。致病之原不一。如花柳毒之  
淋。菌子宮內膜炎。膀胱陰道炎。惡性腫瘍。蛲蟲。腺病。萎黃病。  
感冒。房事過度。手淫等。其初起症狀。如陰道粘膜發炎症。  
充血。壓感。疼痛。惡寒發熱。尿意頻數。交媾及排便均有障礙。  
久之轉爲慢性。帶下增多。貧血。便秘。秘食。恩不振。交媾不歡。因  
之受孕無望。

從女子體上的炎病而死。以及從大多的痼疾而死。聞說有  
百分之九十乃起遠于此的淋病。尚有一種可怕的結果能  
使產兒瞎眼。此事久已證明。據一八八四年眼科學會所報  
告。在英國四個盲人院中有百分之三十五至百分之四十一  
的小兒。因是而盲目。全人類中因受感了母親的淋毒而至  
盲目者。其數甚巨。大都於胎兒出體時。受體的淋菌所侵入  
而盲目。故犯有淋病嫌疑的母親。應于生產時請醫生防範。

## ■陰毛八角虱

人陰毛中生虱。名八角子。貼伏毛根。最癢惱人。相傳此虱不醫。延及頭髮眉毛。其人當死。治法以銀杏搗爛敷合毛上。隔宿其虱盡死。余少年曾患此。用此法神效。有友爲余言。生此虱者。運會將否之兆。余患此之後。抱病十餘年。備嘗苦楚。其言果驗。(內翰良方)

(按)余友方君。近日亦患此病。一日相值。問余以何法可治。余即囑用上法。有效與否。尙未得悉。惟方君年來遭際不佳。潦倒風塵。孜孜謀食。無暇注意清潔。醞釀而生虱也。所謂運會將否者。其說亦不能否認。惟因果倒置耳。實則其人生八卦角虱者。其運會早已否矣。

## 婦女隱病治驗記

陳益生

骨間行疹。摸不到患處。胸有焦臭。上冲舌絳無苔。脈象細緊。擬用溫化。礙其焦臭。清之。臭焦化而疹折。加重察婦神情流動。似蹈求嗣法所言之弊。逐屬購肉桂末一錢。用絲棉包裹。外潤蜂蜜。剪透一頭。向上納入陰道。經數小時。遍體汗出而愈。又丁卯仲冬。舍姪媳生產未幾。即將所着布裙脫去。至五日後。其腹脹若未娩。反板硬掣痛難轉側。余曰。此拘骨傷寒。重症係未拘骨股裙風寒由產門內竄也。予前法不數時。汗徹已軟縮矣。推而廣之。凡產後驚風及倦怠骨疼。諸治不效者。慨可以此法治之。費省效捷。故登本刊以廣其傳。並願兩性知算。慈享康健福。

## 遺精

守淵

## 青年之遺精

婦人交接時。或違生理。有終身之疾。轉展求治不愈。亦有因治不得法而喪生者。竹林女科症治求嗣法中有云。「凡交接不可大肆出入。密密揉之可也。若大肆出入。胎風自不免矣。」是以交接大肆出入。圖快一時。而胎未成。寒風更易竄入。蓄久內舍骨髓。易成湯藥不逮之症。醫者苟不體會病原隱情。妄施藥石。不免僨事矣。矧男女者。人之大欲存焉。夫男子身中之機。既能因情勃起作強。豈女子不能因感而勃發吸弛。中國素重禮教。即有情感。每不肯言。曾治某婦。患腰折

所謂遺精。就是在睡眠中。不知不覺地從精囊中排洩出精液來。同時身心即起一種不愉快的感覺。這種於深夜睡眠中。不自知覺的精液排洩並不完全屬於病理的症象。許多人都有排洩精液是屬於生理的自然現象。要判斷這種洩瀉是係生理的自然現象呢。抑為性神經衰弱的病象。那時要看這種洩瀉的相隔時間之長短。與洩瀉以後的身心精

神的影響如何。大體地說。如遺精的時間。每次在一週以上或每隔數週遇有一次的遺洩。於身心精神毫無不良的異常感覺的。都可以說是生理的現象。反之。若遺精次數增多。每週有數次或每晚多至數次的遺洩。身心精神上都因此而行起不良的影響。這無疑地是該歸之於病態的範圍。亦即所謂性神經衰弱的顯明表徵了。

這一種病理的遺精對於身心精神上所引起的不良影響。是些什麼現象呢。大概在日常遺精以後的結果。身心即呈疲勞狀態。他如頭昏。頭重。耳鳴。目眩。心悸亢進。四肢疲乏。背部酸痛。等等。都是遺精者最習見的症狀。精神方面。則感憂鬱。迷朦。心境時常悲觀不樂等現象。這種遺精後即發生的身體的倦怠疲勞與精神上的抑鬱矇朧的程度。是跟着遺洩的密度。即遺精回數而不同。大概極度的重症者幾乎每晚均有一次或數次的遺洩。因之身心之疲勞。達於極點。精神上的抑鬱亦莫可言狀。對於社會事業個人前途均抱悲觀主義。什麼事情都沒有念頭。沒有興趣。想做了。

尚有一種。除晚間有習慣性的遺精之外。在日間亦有遺洩精液之事。如白晝看見異性女色而興奮勃起。或大小便後之輕微刺激。即能使精液遺洩而出。這種漏精現象。當然屬於重症的性神經衰弱的病理範圍了。

至於遺精的原因。第一要算是由於性神經衰弱了。（本來遺精為性神經衰弱的主要症象。上文已經說過。）而造成性神經衰弱的最大原因。則莫過於慾度與手淫了。尤其是手淫。可以說是青年界所犯最普遍的惡習慣了。我們每週接到讀者們因犯這手淫惡習而至遺精一類的疾患的通訊。真是太豐富了。幾乎無日無之。這足見手淫確是青年界造成遺精一類性機能障礙的最大原因了。又有因避姦而經常採用避姦套或房事時使其不排精而中止性交。等等。往往亦引起性神經衰弱而得這不良的遺精惡疾哩。此外也可不由於性神經衰弱而由於生殖器或泌尿器官疾患而成功的。如先天性的包莖（即包皮過長緊包龜頭。不能或不易下反者）及後天所傳染的白濁症患者。最為習見。又如攝護腺炎及攝護腺腫大等疾患。以及膀胱炎。膀胱結石。尿道炎。尿道狹窄等。等。均能成遺精病象的。現在要來說說遺精的療法了。我們每次接待讀者的問病信件。在敍述病者遺精的種種現象。種種痛苦之後。接着不就是「請貴大醫師本慈悲的心腸。速賜根治方藥以解除病者的苦海呵」的哀求苦語嗎？可是我們的答復除了勸告原因療法。以及種種攝生方法以外。多是沒有給與以方藥的處治的。這不是我們不給與病人以藥到病除的方藥。以

解除了問題者的病痛却是因為凡屬這遺精了類的性機能疾患除戒除引起性神經衰弱的誘因（行為）和平日切實努力攝生而外。是沒有更對症的「藥到病除」的方藥的了。遺精並不是一個獨立的病症。他只不過是他種疾症之一。尤其最多的是神經衰弱的症象耳。故治療方法亦惟有設法除去造成遺精的原因才是根本辦法呢。

除由於生殖器或泌尿器等的器官疾患而起的遺精。應當就醫對症處治——如包莖者須用手術開割之有白濁症者須照白濁治療等等而外。若由於一般的性神經衰弱而就者則須從戒除並注意造成性神經衰弱的原因。始有治愈的希望哩。譬如由於性慾過度的應由節慾着手。由於手淫的先應戒除手淫的惡習。始有恢復健康之望呀。那末遺精病人會應該注意些什麼衛生方法呢。現在來把他主要的攝生法寫出來以供遺精病同人們的參考。

如由於手淫而成功之遺精不消說須要患者具有堅決的意志。戒除的決心並須保持心緒的清淨。拋棄一切不正的慾念。把整個的情緒精神放到有益的事情上。改變易於引起性的刺激的生活環境。避免富於衝動的目觀耳聞飲食方面。舉凡富於刺激性的東西如酒類。烟草。咖啡。濃茶。等等嗜好品均在禁忌之列。即普通飲食物亦以清淡為主。萬勿

飲食無常。暴飲亂食。性愛小說。性愛電影。以及淫污的繪圖。亦能引起遺精患者的性衝動。而增加其病體。故亦勿去看爲是。如在便意之時。應立即小便。因飽滿的膀胱與充實的直腸。均能刺激尿道。精囊。而誘起遺精之結果。睡眠時。飲食不宜過多。不宜多進茶水。腸胃過於飽滿。不易入睡。亦爲引起遺精之原因。被褥亦不可過於溫暖。睡眠時穿的短襪衣褲。切勿過緊。以減少刺激的誘因。

對於生殖器的局部。每日可用冰水洗滌。一則能供龜頭清潔。龜頭周圍的不潔污物。停留着時。亦能刺激生殖器而引起遺精。二則冷水洗滌。減少生殖器溫熱。則減少其興奮的機會也。其實每天能行冷水浴。直接減少性興奮的良好方法。間接即有益於遺精患者呢。故凡遺精患者的同人們。儘有一試之價值哩。

運動。對於遺精。如能行之合理。亦能俾益于患者。但切勿作身心過勞之運動。否則無益而有害。精神勞動者。應減少其費神勞心的工作。避免身心的過勞。又患者在攝生治療的過程中間。須保持能自治愈的自信心。切勿終日憂鬱。朝夕不安的懊惱煩悶。精神的抑鬱不樂。能使病體更加陷于悲哀不救的境地的呀。

至於藥品的療治。當然要請告醫師。不可自行亂投藥餌。更

不可輕信報紙上的誇大廣告的成藥。什麼立止遺精丸。麼一盒斷根無效還洋等等的口號。那十九是欺騙病人的勾當。一上了當。輕信了牠而忘了攝生。那損失幾個金錢。到還是小事。弄壞了病體。倒不是玩的呢。況且對於這種病症。

藥石的效力遠不及攝生療養。藥石只得做做攝生療養的一副手罷了。這是凡舉遺精患者的同人們所極應注意的一點。

## 口 精病概說

茹十眉

### (一) 精之來源

精之來源。本涵諸血。真銓。山五臟各有藏。精並無停泊於其所。蓋人未交感。精涵於血中。未有形狀。交感之後。慾火動極。爲週身流行之血。至命門而變爲精。以泄焉。故以人所泄之精。貯於器。少拌鹽酒。露一宿。則復爲血。內經則曰。腎者。主水。受五臟六府之精。而藏之。考之西醫。則謂睾丸爲造精之要。真至春機發動期。則睾丸中之精液。細胞分化精液。而由輸精管運至精囊存貯。以備交合時之放射。然亦未盡精之所由來也。故應以中醫之學說。以補其不及。

### (二) 精之可貴

萬有醫庫

精能生氣。氣能生神。榮衛一身。莫大於此。養生之士。先實其精。精滿則氣壯。氣壯則神旺。神旺則身健。身健而少病。內則五臟敷華外。則肌膚潤澤。容顏光彩。耳目聰明。老當益壯矣。故靈樞謂精爲身之本也。

### (三) 儲精之法

精既可寶。則宜設法以儲之。或問儲之之法。若何。曰。節慾是也。養生書曰。人年四十以下。多有放恣。四十以上。即頹鬢。氣力衰退。衰退既至。衆病蜂起。久而不治。遂至不救。若年過六十。有數旬不得交合。而意中平平者。自可閉固也。又云。凡覺陽事。輒成必謹而抑之。不可縱心。極意以自戕也。若一度制得。則一度火減。一度增油。若不能制。縱慾施瀉。即是膏火將滅。更去其油。可不深自防也。

### (四) 補精之方

精之不足者。多見腰背痛。而脛痠。耳鳴。目昏。而眩。冒。補之。方宜求諸五穀。蓋世間之物。惟五穀得味之正。但能淡食。最能養精。凡羹粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚也。食之最能生精。其甚者。始宜補之。以藥餌。如人參固本丸。(人參二兩。天冬。麥冬。生地。熟地。各四兩。蜜丸)。班龍。

九（鹿角膠。鹿角霜。兔絲子。柏子仁。生地黃各八兩。白茯苓。破故紙各四兩。米糊和丸。）等劑是也。

### （五）遺精論治

遺精之因有三。一由色慾過度。二由勞心太過。三由濕熱下注。三者之中。色慾過度者占其半。故多患之於青年。其一月一遠。而明日不覺倦之者不足爲虛。一月三四遠者。輕一夜數遠者。則元陽耗盡。最爲危險。急宜施治。固真丹。（蠶蛾二兩。肉蓯蓉。白茯苓。益智各一兩。龍骨五錢。爲末。鹿角膠酒浸化。開和丸梧子。每服三十九粒。空心酒下。乾物壓之。）保精湯。（當歸川芎。白芍。生地黃。薑汁炒麥門冬。黃柏酒炒。知母蜜炒。黃連。薑汁炒梔子。童便炒乾薑。炒黑牡蠣殼。山茱萸肉。各五分。水煎空心服。）黃連清心飲。（黃連。當歸。甘草。茯神。酸棗仁。遠志。人參。蓮肉。各等分。每服五錢。水煎服。）皆可選服。取效。

### （六）滑精論治

不因夢而自泄者。謂之滑精。其症險於遺精多矣。宜即服固精丸。（知母。鹽水炒黃柏。鹽水炒各一兩。牡蠣殼。芡實。蓮花蕊。白茯苓。遠志。各三錢。龍骨二錢。山茱萸五錢。米糊丸。空心鹽

湯下。五十九。（或鎮陽丹。桑螵蛸。三兩。龍骨。白茯苓。各一兩。糊丸。煎茯苓鹽湯下。七十九。治之。）

### ■談遺精

潘蘭坪

遺精當辨有夢無夢與濕熱之因。有夢治心。無夢治腎。濕熱治小腸膀胱陰虛者。填精陽虛者。補氣陽強者。瀉火。故前賢治法。有蓄心益腎。填精固元。與清利濕熱之別。茲先擬寧心益腎固攝之劑。以便因各見症加減治之。  
桑螵蛸三錢。雲茯神三錢。大麥冬二錢。（連心）建蓮米五錢。（連心）熟棗仁一錢半。遠志肉五分。（製）敗龜版打碎五錢。生龍骨打碎三錢。二味先煎。或加菖蒲。雲連各三四分。爲佐使。（如有夢加多些黃連。無夢但加味人參。）陰虛加熱。地天冬。阿膠。當歸等。（去棗仁。遠志。茯神。）陽虛加人參。黃蓍。杞子。杜仲。白朮等。（去龜版。麥冬。龍骨。桑螵蛸。）陽強加生地。知母。黃柏。（去棗仁。遠志。茯神。）遺泄頻頻。宜佐以固攝之品。如菟絲子。五味子。覆盆子。金櫻子。蓮鬚之類。選入一二味爲佐使。至若精遺因濕熱者。宜另用猪苓湯法治之。（如芡實。山茱萸。沙苑。蓮米。凡遺泄症皆可常食。）

### ■夢遺

守淵

對於遺精的種種情形和攝生的大要。上節已經述說過了。這兒所提的夢遺。實際上和遺精沒有絕對的區分的。如要望文生義的分別起來。那他們的相異之點。就在「夢遺」是有着與異性或將與異性發生性的衝動或幻覺後而流出精液來。不若在遺精時的排洩精液。在乎不自知覺之中。

幻覺

故夢還是有着隱約或明晰的夢的境象。同時亦有與交合時行將排洩精液的極度興奮時所有的恍惚狀態的性的快感。而遺精則否。不過此種恍惚狀態的性的快感。只是極短極短的一剎那。這種感覺全然是精神上的反應和幻覺。

這種因有夢境而排洩精液的夢遺。如果也只不過是偶爾的發現。而不是經常的發生。當然亦無多大影響於身心的健康。這與偶然或相隔期間頗遠的遺精現象一樣。都不好算作病的現象。反之若經日連夜的發現夢遺。那也與經日連夜的遺精無異。當然能影響於身心健康的病象了。不過在這深夜夢遺後往往容易引起青年們的非分的思戀和幻想。這種思戀和幻想久了慣了。當然亦能使精神及神經系統漸陷於不利的地位的一部分性的神經衰弱症的患者即起因此。至於這種屬於「病理的夢遺」——即有習慣性的夢遺習慣。而能引起身心不良的影響的夢遺。對於身

心精神所引起的現象。也和上述「病理的遺精」所引起的身心精神的現象無異。譬如身體的疲乏倦怠。精神的鬱悶。不樂。心境迷朦悲觀。腦神經系統的記憶力薄弱。作事鈍有興趣等等。總之一般神經衰弱的徵象。差不多是應有盡有的。呈現出來。

所以對於夢遺的療法。除原因療法。須視患者由何原因。再視各人症候而異。對於一般的療法。還是不外乎注意日常生活。在努力於一般攝生的治療期間中。最要的就是心境要抱樂觀。意志要堅強。鎮定。不但要有必須治愈的决心。還要具有必能治愈的自信。除了息作飲食起居的攝生外。胡思亂想。固然要禁忌。苦悶煩惱。亦是不必要的。逐漸地把生活弄成規則化。合理化。然後這可惡的夢遺症象。亦會漸漸地消滅無形。

## 再談夢遺

何中明

按夢遺之症。其因有四。有用心過度。心氣空虛。不能攝腎而遺者。有淫慾邪思。動其君火者。以致。火不甯。搏激真水而遺者。有色慾過度。下元虛憊。滑泄不禁。而遺者。有年壯氣盛。久無色慾。精氣溢而遺出者。為證不同。治法亦異。用心過度者。當安其神。宜遠志。棗仁。茯神。龍齒。山藥。蓮肉。歸身。人參。丹

熱姜湯。

(天王補心丹)(甯心保神。益血固精。壯力強志。令人不忘。除怔忡。定驚悸。清三焦化痰涎。去煩熱。療咽乾。養心神人參。當歸酒浸。五味麥冬。柏子仁。酸棗仁各一兩。白茯苓一兩。天冬一兩。丹元參。桔梗各七錢。遠志七錢。生地四兩。黃連二兩。酒炒爲末。蜜丸。桐子大。辰砂爲衣。每服二三十丸。臨臥時。燈草竹葉煎湯下。一方多石菖蒲。熟地黃。杜仲百部。茯神甘草六味。)

麥冬之屬。培補心氣。或苓朮菟絲子丸之類。固之。淫慾邪思者。當清其心。宜妙香散。遠志丸。天王補心丹。生地麥冬川連黃柏之屬。在所必用。色慾過度者。當固其真。宜六味丸。如鹿茸牡蠣蕤蓉菟絲子五味子龍骨。(茯苓菟絲丸)治脾腎虛損。不能收攝。以致夢遺精滑。困倦等症。白茯苓白朮米泔浸蓮肉各四兩。五味子酒煎二兩。山藥二兩。杜仲酒煎三兩。炙草七錢。菟絲子(用潔水淘淨。入陳酒浸一日。十一兩。文火煮爛打爲餅。焙乾爲末)。右用山藥末以陳酒煮糊丸。桐子大。空心淡白湯服一百餘丸。(如氣虛神倦。不能收攝者。加人參三四兩尤妙。)

(辰砂妙香散)治心脾不足。恍惚不睡。盜汗遺洟。血漏血瘀。灸草結梗山藥遠志(甘草湯泡去骨)。茯苓神各一兩。黃蓍蜜炙人參各二兩。木香二錢半。辰砂三錢。麝香一錢。右十一味爲散。每服二錢。不拘時。溫酒調服。秘旨無木香。有砂仁三錢。本方去黃蓍。桔梗山藥。

(王荆公妙香散)安神閉精。定心氣。龍骨益智。人參各一兩。茯苓神。遠志各七錢。珠砂。灸草各七錢爲末。每服二錢。空心溫酒調服。

(遠志丸)茯苓神人參。龍齒各二兩。遠志石菖蒲各一兩。蜜丸。桐子大。以辰砂爲衣。每服七十九。空心熱湯下。又空心。

## 夢交

秦伯未

男子之遺精病。多由於慾火熾盛。擾動精室。夫人知之矣。而不知女子亦有此症。即夢交是也。其病於熟睡中夢有男子與之相合。即泄精而醒。與男子之夢與女子相合而遺精。正同一轍。特女子不肯言。言之亦以爲鬼魅作祟。而不認其爲病。更不知其日久之損精耗神。能造成種種之虛弱症也。余於前歲治王君之女。年二十許。飲食少。面白黃肌瘦。神思恍惚。將一載。葦齧以爲癆。余診其脈。弦硬有力。心疑之。因問能安寐否。曰能寐而易醒。更問多夢否。曰夢中情景能略憶。否。女俯首不應。余曰。此症似癆而非癆。但再延則真成癆矣。爲用平火益精之藥。不一月而全愈。又治蒯姓女。白帶甚多。

諸醫不能止。有介紹余者詢得亦時有夢擾。初尚不以爲異。既而頭眩帶下雜作。同時夢擾更繁。余曰此陰精愈耗。則相火愈不能涵養也。爲調理月餘而始復健康。上所述者。聊舉一例。以見此症之不足奇。更不可祕守。以致喪失健康之身體。若夫已見此症。即宜延醫服藥。一方面更須善自攝養。以免復發。茲將普通攝養之法列後。爲一般女同胞告。

- 一 絶對禁止觀覽淫書淫畫。
- 二 不觀淫蕩戲劇及其他足以引起妄念之遊藝。
- 三 少涉男女交際場所。
- 四 禁止煙酒等刺激食品。
- 五 眼時勿過勞。勿妄想。
- 六 多閱正當書籍。以遷其思想。

## 勞心太過之遺精

尤學周

青年遺精。非必盡由於性慾過度。或性慾不遂。勞心太甚。亦能發生本症。蓋勞心者耗傷腦力。造成神經衰弱之象。性神經亦受其影響。以致失其約束精闢之權。有時反形成易於興奮之狀態。不克自制。而於睡夢中爲尤甚。因是而發生遺精之症。

近時青年大都受惡環境之影響。好倡自由不受約束。荒蕪奢侈。流於浪漫。故多遺精之症。此由於性慾無度者。其他一部分自好之青年。則又刻苦砥礪。奮勉有加。兼之不景氣現象。到處皆感於生活之壓迫。經濟之恐慌。又不得不努力奮鬥。以解決其生活問題。因心神之太勞。神經漸次較為衰弱。由此造成遺精之症者。蓋比比然也。

黃履素《湧幢漫錄》謂「先大夫少年極苦此病。蓋用功過苦。名心太急所致。每臨場則愈頻。陽事少着。即遺苦無可奈時。牀席俱穿一大孔以臥。使其無着。是科發解。武林居停。邀其親戚。女客飲喜酒。相率觀解。元公書室。則牀席有大孔。皆莫解其故。以爲笑談。一自營解後。夢泄便希。及登第後。則尤希矣。余少年亦若此。迨登第後。漸漸老愈減」。此可證勞心足以致遺。及功名既遂。既釋其勞。復舒其心。遺精亦逐漸向愈。

患者如自審其遺精之起。並不因於性慾不遂。或性慾過度。確實由於勞心過度而起者。最要在去其病原。即使此心得有休養。以恢復其衰弱之神經。一面服「天王補心丹」。臨臥時桂圓湯送下錢半。或二錢。久服方能奏效。

## 性慾不遂之遺精

尤學周

性慾為青年時代大問題之一。此項問題包括如何解決此性慾。如何可以防其慾潮橫流。如何可以導之入於正軌等。蓋性慾出於天賦。既不能禁。又不能絕。知好色則慕少艾。人之情也。惟慕之則戀。既戀則思染指。蓋戀愛原為性慾之初步表現。及性慾既遂。戀愛之情亦日趨於淡泊。此事實之易於證驗者。

青年時代求愛不得。染指無從。則性慾不遂。亦能引起遺精。

之症。經云思想無窮。所願不遂。意淫於外。入房太甚。發為筋

癥及白淫。此條於意淫於外句下。必衍「則夢內接」四字。

蓋所願既不遂。而慾念又未能即時制止。於是意淫於外。意

淫則「厥氣客陰會器。則夢內接」(經文)。固意中事也。若

直接接入「入房太甚」四字與「所願不遂」立於相反地。

位。上下意思不貫通矣。

性慾不遂之遺精。大都為夢遺。凡心有所思。其思潮即傳達

於腦。留一深刻之幻象。「不遂」則此心不休。其幻象益深。

睡中朦朧之時。一切幻象如放射影片。將攝入之外景風展

雲舒。映入銀幕之上。千奇百怪。層出不窮。夢之由來。亦猶是

也。一有思潮。即感動靈敏之神經。傳達於腦府。成為夢魔。幻

為夢境。以快其私慾。發生交接之事。成為遺精。

近日之青年受經濟之壓迫。往往延遲其婚期。在生活方面。

固求其減輕肩上之負擔。在性慾方面。實少其發洩之機。而女子之稍有知識者。又眼高於頂。選擇頗嚴。無貌無才。無錢。之青年男子。往往不得邀女性之一顧。遑論戀愛。遑論結合。性慾愈不得遂。或者雖已結婚。拋妻離家。覓食他方。別時固黯然魂銷。別後又時繫於夢寐之間。春情縷縷。成為幻境。夢遺即肇於此。

因性慾不遂而生之遺精。第一宜早為完婚。或組織小家庭。同居一處。使性慾得遂。此心既有寄托之處。幻夢減少。遺精亦能自止。服藥以「滋腎丸」為最佳。每服一二十九。早晨淡鹽湯下。

### 性慾過度之遺精

尤學周

青年病之最普遍者。厥為遺精。十人之中。有七八人患之。都市之青年較鄉間之青年患者尤多。其原因雖不一。大多與

性的方面。有極大之關係。

都市之中。風氣較鄉間為開通。事競尚浮華。聲色玩好。應

有盡。有久居於此者。為惡環境所引誘。易於奪魄銷魂。潛志滅性。因性慾之衝動。思謀所以發泄之道。或則尋花問柳。斬

喪其元。或則手淫。屢犯生機不遂。久則腎陽大衰。精關不固。發生遺精之症。此皆性慾過度之所致也。

由性慾過度而發生遺精。在理有虛無實。宜投以固澀之劑。壅其流而益其源。得以養精蓄銳。培養天機。恢復其固有健全之軀。然患者體質雖虛。而性慾仍形旺盛。見色易起淫心。常發爲春夢。恍惚引起狎愛。情不自禁。致精液無端洩流。蓋相火偏旺。心境不淨。或爲夢遺。間亦有無夢而遺者。然爲數甚少。故其治法。固腎保精。原不可廢。而治心。尤爲要着。所謂心病須將心藥醫者。是也。患者若不除妄念。節制性慾。使此心如止水。縱有靈丹。亦難見效。然非有大慧力者。無此決心。即以此故。

關於遺精之治法。成方甚多。多從陰虛立意。未免失之於偏。「大補陰丸」及「知柏八味丸」。雖合於性慾過度之遺精。然配合上尚欠妥善。余宗其意。另訂一方。用之頗能見效。藥味及其配合如下。

川黃柏四兩。肥知母四兩。二味鹽水炒大熟地(酒蒸)六兩。龜版膠四兩。酸棗仁四兩。猪髓調蜜糊丸。上好硃砂爲衣。每晨鹽湯下二三錢。

## 遺精與淋病

小川

期內往往招致遺精。一般理想。咸以爲自然而然。而少有究詰其原因者。更有遺精期內。適淋病進入極度慢性。他覺自覺的症狀。悉隱時。竟作尋常遺精治療。而一般昧於醫學常識者。並有遺精積久能成渴。或則以爲白濁即敗精。於是治療的基本。根本即築在遺精一點上。完全忘却淋病病理。則主點之錯觀。當然難愈矣。吾人爲搜求其眞諦。請先述生理的解剖。

按在攝護腺稍上。介乎直腸及膀胱之間。有兩個精囊。上部各離下部逐漸接近。而綜合爲一直接輸精管。而達後尿道。部位之精阜開口。該部在人生意義上。估價殊爲嚴重。蓋歷來學者的研究。已確定該部除有存儲與攝護精蟲的功能外。並具吸收一切不利舉丸製造精蟲的分泌作用也。淋病達後尿道部份時。炎衝波及精阜。乃起輸精管炎。由漸而入精囊而起精囊炎。自管壁之腫脹以致強直。同時因刺激乃致勃起而遺精。在急性者。因腫脹之故。射精乃感劇痛。或且混有血液。惟以性神經之遭受刺激。患者乃常覺尿道內有蟻行癢。同時並感情慾性的快適。故時時勃舉。連續遺精。至於在慢性者。最是恐怖。蓋病者雖同起後尿道炎及攝護腺炎與本症。然一般殆皆治愈各症。而殘留本症。故許多患過淋病者。即在一切經過都見良好。遺精却依然多至。亦

感患淋濁病者。有一極普通的症狀。即無論在急性和慢性。

有在初期勃舉行得短時間的興奮。漸則因情慾性神經之迭受橫暴打擊而致衰弱。或乃擴大而成全身症狀。顯有未老先衰等病態。或竟不幸而轉成陰萎。則不獨生育不能。亦且整個剝削人生真趣矣。

有本症之病者。往往於大便或放尿之後。外尿道口擠出點滴精液。此在醫學上稱爲精液漏。檢視其中可發現不動性精蟲。殊爲診斷上之一大佐助。而在平常之遺精者。檢視其精蟲固多少存具活潑性能在焉。

## 遺泄與白帶

秦丙乙

病之最足戕生而最難圖治者。有二證焉。厥名雖何遺精。與白帶是已。考男子之遺精。與婦人之白帶。其證同。其治療也。同。其在現今社會上所佔勢力之盛。亦何往而不同。爰不得不并爲一談。而有斯篇之作。遺精之原因。有二。曰濕熱下注。曰相火過熾。白帶亦然。惟屬於濕熱者少。因乎火盛者多。帶亦如之。除此二者外。有因用心過度而遺者。猶白帶之由氣鬱不舒而致。惟尤其屬少數中之少數矣。此症病起原因之和固也。至二症證狀。莫不面部脫白。血不華也。精神短少。作事乏力。日久腰肢痠軟。自汗盜汗。耳聾眼花。常抱悲觀。種種壞症。不一而足。帶之與遺。幾同一轍。此二症證象傳

變之相同也。若夫用藥圖治。初起不外滲熱利濕。次則於洩火之中。佐以滋養真陰。入後出於固瀕補精之一途。凡此皆一定不易之理也。然從實際上言之。大概此二病症。任百計。洩火而火終不甯。縱千方百滋。而陰仍不濟。卒之補不勝補。瀕無可瀕。勢成騎虎莫展。一籌此無他。病者之不能從事於心理療治也。誠能清心寡慾。潔身自矢。則草木豈真無情。而藥石詎皆不靈也哉。此二病治療之道。同。而其麻煩困難。亦初無大致之殊也。噫。遺也。帶也。世間幾多青葱活潑。有爲青年。爲所斷送於不知不覺間耶。

## 遺精而至滑精

朱振聲

問：讀大作。病理的詳述。解釋的清晰。細閱之下。纔知道是先生的大作。宏論的確。在淫浪狂蕩的社會裏底青年。淘醉甚至終身沉淪呢。先生首詳告病途。避免治療之法。真猶苦海明燈先生。請你不要討厭我的魯蘇。請你聽我的苦訴吧。但是病「遺精」。有神經衰弱而促成者。有過勞而罹病者。有縱淫而患症者。種病起原不一。所以我也告明的一節。我今年十九歲。約於十七時。任充洋貨店學徒即患此病。「遺精」當時不過按月二次。等情體格康健途徑一無阻礙。奈何日復一日。時局轉變。環境隨遷。逆料喪身之禍根。在此種

定了。我老實告訴你吧。沒有錢。找不起醫師。祇有聽天由命。今年不對了。精如水耗先生。我那無補之軀。怎受得起暴雨的摧殘呢？形容日現枯槁了。我遺精更進而至「滑精」了。

隔日。「眼花頭暈腰酸四肢乏力。」那年未老而精神先退的惡態。那是多麼懊喪呵。先生我還未娶妻。我亦不會犯過手淫。我想一定過勞吧。不然怎麼會三四天一次呢？暗思醫師是慈善的。尤其是先生吧。一定肯救我那無靠的苦孩的。先生照前面病象可以用什麼方子纔可痊愈。而且省錢先生慈悲請你救我。愈後登報鳴謝敬祝。

着手成春（王俊名）

答：遺精一症已成爲青年普通之病症。久而不愈。元陽虧耗將失其康健之幸福。然亦不致招「喪身之禍」。望勿過於焦慮。此種慢性病一時亦無法使之斷根。「聽天由命」主義對付此病甚爲合法。然既患此症。當節勞省神。種種忌想。邪思益當遏制。省錢之方。莫如購服現成藥丸。「金鎖固精丸」似可一試。

## 口夢遺便濁

朱振聲

問：敝人在數月前曾患夢遺怔忡心悸。失眠耳鳴。及有時小便混濁（未悉是否石淋）等症。亦曾服過大補陰丸。殊

砂安神丸及六一散等藥。至今各病比前皆較和緩。小便亦漸見清。但根本仍未全愈。故請

貴醫生指教以上各病之根本治法。（楊化州）

答：按足下之症。決非由數月前發生。病根早已深伏於二年前。心悸怔忡失眠耳鳴。爲神經衰弱之象。非於短時間可能造成也。小便混濁不清。非石淋。由於溼熱下注之故。既服過大補陰丸。殊砂安神丸。而見效。鄙意以爲不必換方。即用此二味。早服大補陰丸。晚服安神丸。蓋此症非一時可以奏效。須有忍耐心。切不可貪圖速效。時時換方。反致不靈。小便混濁。多服開水足矣。下午四時已後開水。又當少服。以免夜間膀胱脹急。引起遺精。

## 口精關不固

朱振聲

問：十五歲起。因思想過度。眉棱頭脣隱痛。熟睡中雙足猛鑿盜汗及墮語連連不已。間有夢遺。次數極少。年歲漸增。洩精之次數亦漸多。身體日瘦。精力日減。小便次數較人爲多。行走。在路小便更多。襯褲付洗時。常有黃漬發現。未知是否白濁（惟從未體溼及手淫請注意）。去夏起。患失眠。多月。嗣有心跳頭眩目花等症。記憶力本弱。畏冷。尤畏日光。目眶深陷。面色灰黃。有時稍呈光彩。誤係虛火上升之故。日間昏昏。

肆中無對證之現成丸藥。不敢介紹。如有白濁。白菓不宜沖服。

## 因夢遺而抱厭世之心

問 某君年近弱冠。而骨瘦如柴。體虛尤虛。故未成家。當其二三年前。即犯手淫。而近一年來。覺悟前非。未敢復作。然在一月中間。有夢遺一二次。雖曾進以白木耳及人參等補品。亦未見恢復康健之効。因時萌厭世之念。素仰先生抱濟世之宏旨。望即賜以救濟之方。則感德無涯也。(來順高)

答 每月夢遺一二次。並不十分重大。何必違萌厭世之心。身弱體虛。皆因手淫過度所致。今既已悔悟。不難渡登彼岸。惟此種慢性衰弱之症。非一時可以恢復健康。急遽求其速效。反難圖功。人參白木耳與本症無涉。服之無益。徒耗財耳。試服「無比山藥丸」。每日晚淡鹽湯下二三錢。

## 遺精面腫

陸成一

答 足下既未體淫與手淫。何以知色念之害。豈非自相矛盾。所述現象。爲性神經衰弱之徵。必由性慾不節而來。痔上黃濱。或係遺精所致。是否白濁。不敢臆測。此症第一在節慾。足下既已悔悟。諸證自能減退。惟非一時間可以收效也。藥號定戶)

徐啓鶴君。現年四十六歲。賦性謹厚。體質頗不弱。嗜酒。間喜飲茶。自幼爲農。甲寅歲。奇旱荒歉。心中抑鬱。爲之憂勞成疾。每屆春初。必發咳嗽多痰。入夏始可。就痊。數年來。體力之健全。非同尋。昔間有夢遺之證。去年冬。面現浮腫。四肢委頓。神

疲力倦。兩目欠明。至今春更甚。二月初九日服某醫生方藥。用橘芩夏朮苡杏枳壳防己旋覆防風等數帖。初時似中肯。後亦無奏效之可言。施於二月念九日赴杭垣莫先生處診治。斷爲陰分不足。濕熱逗留。留久化熱。木火內燔。腎水下虛。用決明鈎藤天竺黃杜仲建龜米仁牡蠣杏仁女貞谷芽麥冬佩蘭橘紅等藥品連服六劑而身熱益甚。繼服某醫磁蠣龜板等潛陽欽陰之品。病勢漸見輕鬆。迨三月念三日邀渠族叔某先生診視。案云脈象濡數。右勝於左。重按無力。舌苔淡白無容。而潤頭目。暈眩心悸不寐。顯係虛陽上浮。陰竭於上之證。連服生龍骨牡蠣磁石山萸杭芍柏子仁加鐵銹水四劑。諸恙漸平。惟面腫如故。此後停藥月餘。又加腰腹腫脹。於前月十五日陪往義橋孔姓處就醫。方爲製厚樸防已。浮萍帶皮荳蔻陳蠶砂苡仁草薢苦丁茶蕷皮薤白沉香麴等藥計服五劑。後腰部腫脹略寬。念六日復往彼處診藥。藥爲製樸滁菊防已車前苦丁茶冬瓜子葵子薤白茯苓括萎石葷砂壳之品。計六帖。服後腳氣之舊病頓起身熱。神昏。病勢加劇。現今脈弦右部較大。舌苔光潤。食減不能起床。又患泄精。惟二便如常。竊思此症每交春患痰嗽。顯係肝火挾胃中濕痰。以上壅於肺。夢遺爲肝失疏泄之常態。而屬胃面腫目眩。皆肝已化風。挾胃濕以上升。非即虛也。及舌苔淡白而

潤熱爲濕遏矣。繼又腰部腫脹屬肝風。腫屬胃濕固結於內矣。神昏亦是濕熱之氣上蒙心包。非即襲入心包。宜化濕不宜開泄。今舌苔光潤。食減胃氣告匱。非胃陰不足。觀其始終舌瀉可知。如此險症。反不能用重藥。宜輕劑調之。先開胃氣。瀆胃濕。佐以平肝。用台參鬚三錢。參不可用。又長鬚生麥芽五錢。玫瑰花去蒂一朵。茯苓三錢。炒苡米三錢。生甘草四分。酸棗仁三錢。如服後苔生。食加方入坦途。

## 遺精病論治

黃天則

### (一) 道言

精之生理——精液爲胎化之原素。神經組織之營養物。乃人身最重要之一種液體。其液爲黏稠渾濁白色。有固有之臭味。呈中性反應。或弱鹹性反應。含固形成分約百分之十。主要爲蛋白質及脂肪鹽類等。精蟲雜於其中。精蟲乃一種特別細胞。頭爲梨形。頸爲短桿狀。尾如纖絲。產自睪丸精管中。當射精時。此蟲浮游於睪丸及副睪丸所分泌之一種液體內。混合輸精管精囊及攝護腺等分泌物而出。若與女子之卵珠相合。即成爲人體之小始基也。

射精之生理與病理的異點——既明精液之所以構成。更當知射精之生理。正常人之射精。乃由交媾陰莖知覺神經

興奮。反射射精中樞。由輸精管及精囊之筋肉。收縮令精液沿射精管經尿道射出。此爲正常之射精。若夫遺精乃無意智主宰之射精。（亦有不健全意智所主宰之射精者。即夢遺是也。）其陰莖知覺神經及射精神經中樞易興奮。因其易於興奮。故每致成習慣性之遺精。習慣性之遺精既成。則舉丸勞於分泌。而內分泌因以衰減。遂致神經衰弱之症。畢呈矣。然性交之射精與遺精之射精。均爲排洩精液於體外。何以一者無害。而一者有害乎？蓋性交之射精。乃大腦發生情慾觀念。至使勃起神經興奮。反射射精中樞而射精。若遺精則無情慾觀念。主使但勃起神經興奮以射精。且所遺之量無定數。非意智所能制裁。是性交而射精。其精神得所寄託。屬生理的必然結果。若遺精則精神不但無寄託。且感覺痛苦。故爲病理的結果也。反之。遺精而屬於生理者。亦無害。若性交而無節制。則其害亦與習慣性之遺精等也。

## (二) 痘因

造成遺精病之原因。凡四。

甲 先天不足。後天失調。所謂先天不足者。即遺傳性神經衰弱是也。後天失調者。即貧血。精神衰弱是也。夫神經乃主宰人身知覺運動之一種組織。故凡患先後之神經衰弱。則

外界不良之刺激。易受感動而興奮。不能以強毅之意識。以堅定之故。每每造成遺精之疾患。  
乙 手淫。手淫爲最戕賊身體健康之一種惡習。足以妨礙舉丸之分泌作用。失遺精非意智所能禁止。而手淫則純出於自動。凡習慣手淫者。其神經必有造成刺激性覺感銳敏。以致久而久之。成爲衰弱。雖有微細之刺激。而其勃起中樞。及射精中樞。即興奮以促進射精之發生。故習慣於手淫者。尤足以做成遺精病。

丙 泌尿生殖器病。因泌尿生殖病之波及。亦足以致發生遺精。爲慢性淋毒。後尿道炎。其炎症若遍及於射精管。則射精管擴張弛緩。而致滑精。此外尚有精囊炎。膀胱結石。膀胱腫瘍。尿道狹窄。前列腺（即攝護腺）。炎。龜頭炎。直腫炎等等。均能刺激精管而發生遺精。

丁 過於運用腦力。用腦太過。亦足以發生遺精。故莘莘學子。與夫科學家。多數有患此病者。

遺精之病因。既如上述。而更有所謂漏精。滑精者。前者之原因。由大便過直。腸時。精囊被壓迫而起。故患大便燥結者。多有此病。而大驚卒恐。亦時見之。至若滑精。則乃夢遺之更進一步。蓋夢遺既久。射精中樞易興奮。即射精管弛緩。故一遇刺激。即隨而滑精。不待夢而後遺也。故其病則有甚於遺精。

又有生理之遺精者。乃發生於青年未婚者多。而遺亦祇每  
月一二次。此乃生理而非病理。故無碍於人身也。

### (三) 病理

遺精為最戕害人身體之一種慢性病。能障礙睾丸之內分  
泌作用。使人身之營養缺乏。故能令健康者頻於羸弱。而羸  
弱者頻於死亡。我國醫學對於精液素來重視。內經曰。精者  
生之本也。又曰。人始生先成精。精成而後腦髓生。固其如此。  
重視故對於遺精病亦知其為一種戕害生理之病。但以其  
未十分明瞭內分泌之故。(惲鐵樵先生以內經所言天癸  
即今西學之所謂內分泌。其說似是。然當其時未能十分明  
瞭。亦敢斷言也)是以終不知其何以有害。遂以理想實驗  
測之。此我國醫學之所以較遜於泰西也。然無論其孰  
優孰劣。而遺精病為人身之蟲賊。此則中西所同者。

### (四) 症狀

內經靈樞決氣篇云。精脫者耳聾。海論篇云。髓海不足。則腦  
轉耳鳴。腫瘍肢冒。目無所見。懈怠安臥。蓋遺精則內分泌障  
碍而致神經衰弱。故所見者皆為神經衰弱症。如思想不能  
持久。易於變易。喜靜惡動。時惘然若有所失。且多發貧血症。

皮膚如蒼白。心動悸等。又不能耐勞。易於懈怠。此皆遺精病  
所表現之症狀。

### (五) 診斷

我國醫學。其診斷法皆以症脈互參。因而追討其病源也。仲  
景金匱要略云。失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脈極虛。  
芤。遲。清穀。亡血。失精脈得諸芤。動微緊。男子失精。女子夢交。  
又云。虛勞裏急。悸。衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽  
乾口燥。此皆仲景診斷遺精之法也。然遺精之病狀。非皆全  
如上述。惟腰骨痠疼。精神疲倦更甚。則遺溺。髮落。耳鳴。目眩  
等。皆為診斷遺精之要據也。

其屬於生理而非病理之遺精者。診斷上尤不可不注意。生  
理之遺精與病理之遺精。本無甚區別。惟生理之遺精。遺後  
精神不覺疲勞。而反覺愉快。且每月祇一二二次。若病理之遺  
精。則反是。

### (六) 治療

遺精病之治療。非徒恃藥石所能奏效。尤當誘導其思想納  
於正途。蓋造成遺精之病因。多由手淫及慾念不遂而致。而  
手淫之惡習。亦由不良環境所造成。故欲治療遺精病。尤須

先行身心之衛生修養。及改善惡劣環境。然後乃可言藥石治療也。

(A) 身心衛生之修養改善惡劣環境

(甲) 起居之注意

- 一 不可讀誨淫小說。宜讀偉人傳記。及修養道德之書。
- 二 不可談男女間瑣事。
- 三 青年婦女宜少接見。
- 四 劇場舞場餐館等男女混集之處宜少到。
- 五 暫時宜運動。及作郊外遊。以吸收新鮮空氣。
- 六 就寢須行室外或室內運動十分鐘。以疲勞其筋肉。便易入睡。
- 七 翌晨醒覺時。須即起床。

(乙) 衣服之注意

- 一 衣服不必美觀。力求潔淨。
- 二 衣服不可過暖。以足禦寒為度。
- 三 被擋不可過軟。但宜適中。
- 四 禁用毛織之短裙。以免陰莖受刺激。致易引起勃起作用。

(丙) 飲食之注意

- 一 早晨午餐宜飽食。晚餐以少食為宜。
  - 二 禁食有興奮性之食品。
  - 三 多食蔬菜。其美味濃厚。如量品以少食為宜。
  - 四 烟酒富有刺激性。務宜戒絕。
- 以上三項能實行之。則淫慾之念可漸漸消滅。然後進而求諸藥療。庶幾勝功遠矣也。

(B) 藥療

夫治療遺精病。金匱要略有三方焉。一曰桂枝加龍骨牡蠣湯。二曰小建中湯。三曰腎氣丸。三方之為用各有不同。茲分述之。

1. 桂枝加龍骨牡蠣湯 桂枝 芍藥 生姜各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 龍骨 牡蠣各三兩  
桂枝加龍骨牡蠣湯者。乃興奮神經和緩急迫之方也。蓋桂枝含有揮發油。能刺激神經使衰弱者轉而令其興奮。生姜亦含有揮發油。能刺激胃粘膜。促進其消化作用。使食慾亢進。以還精病每發見消化不良症故也。至芍藥大棗甘草據湯本氏個人經驗。謂凡用芍藥甘草大棗之證。必診得筋肉變急。而於直腹筋最為明確易觸知。故診得此筋肉變急。即

可爲應用三藥之目標。而東洞翁亦云。甘草主治急迫也。芍藥主治結實而拘急也。大棗主治牽引強急也。觀二說則可知此三藥確爲和緩劑。故仲景用之。而其主證。所以有少腹弦急也。加龍骨牡蠣者。以失精病。每有心悸之症。而牡蠣藥微謂主胸腹之動。所謂胸腹之動者。意即心悸之代名詞。故此用之以鎮定心悸。且此藥含多量之炭酸鈣。有制酸作用。亦足以佐生姜促進胃之消化作用也。若夫龍骨牡蠣。微謂之。臍下之動。因此湯本氏遂謂其爲收斂藥之一種。故亦用之。蓋恐患者由遺精而轉滑精。故用以斂其射精管。所以防患未然也。

2. 小建中湯 桂枝 生姜各三兩 茯苓六兩 炙甘草  
二兩 大棗十二枚 膜飴一升

小建中湯者。即桂枝湯倍芍藥加飴糖之方也。桂枝湯爲興奮神經和緩急迫之方。既如上述。然其倍加芍藥者。所以增進其和緩組織之力也。故仲景凡用本湯之症。多兼有腹中痛。裏急等症者。即斯故耳。其加飴糖者。以飴糖含有麥芽糖。爲炭火化合物之可容性。易消化。可爲消化不良症之補劑。是以仲景於傷寒二三日。心中悸煩。無腹中痛。裏急等症。亦用之者。以其爲補劑也。且本條首揭虛勞復曰。裏急腹中痛。故不得不以本方一方面補其虛。一方面緩其急也。

3. 腎氣丸 乾地黃八兩 山茱萸 薑蕷各四兩 潤瀉  
茯苓 丹皮各三兩 桂枝 附子炮各一兩

腎氣丸爲強心利小便。促進各組織新陳代謝之方。以之治遺精病。仲景雖未有明文。而後人用之。每有奇效。然究其所以能治此病者。蓋亦有理存焉。觀仲景之用此方於小便不利。凡三條。一曰虛勞腰痛。小腹拘急。小便不利。八味丸主之。二曰短氣有微飲。當從大便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。三曰婦人病。飲食如故。煩熱不得臥。而反倚息者。此名轉胞不得溺也。以胞系于戾。故致此病。但利小便則愈。宜腎氣丸主之。觀此三條。則可知腎氣丸確有促進膀胱排泄小便之功。或曰。金匱消渴脈證篇云。男子消渴。小便反多。飲一斗。小便亦一斗。腎氣丸主之。是仲景於小便多亦有用腎氣丸者。今言其爲利小便之劑。恐或未盡然也。不知所謂利小便者。乃用於膀胱失乎其排泄力而言。若消渴而見小便反多。似有類於西說所言之蛋白尿。其病由腎實質炎及腎臟之血行障礙等。用腎氣丸以消除炎症。促進血行。二者之病截然不同也。(按湯本氏謂本爲石蒸劑。證以石蒸劑亦有渴飲之證故也。不知石膏劑之渴飲。乃胃熱而然。故無小便反多之證。本證渴飲而兼小便多失之毫釐差之千里。是湯本雖詳於渴飲。而忽於小便反多之證也。豈智者千慮猶

有一失歟。故本方亦以之治遺精者。以方中既含有茯苓澤瀉以促進膀胱之排泄力。又有寓於滋養料之山萸淮山。佐熟地丹皮以補血。更有含有揮發油之桂枝以興奮神經。而以附子強壯心力以刺激腹部之新陳代謝機能是方也。如

以之治遺精。則於尿道炎膀胱結膜炎等。而致使患此病者。此方較為尤的。以上三方皆為治遺精之聖方。而後人所擬之方。如封髓丹黃連清心飲。太補陰丸等。或亦有驗者。然其法究不如仲景之精密。故苟能通仲景之意。從而變化之。則提綱挈領。法無餘疑矣。

## 遺精神效力

張仲德

余乃令六弟憂鳴依法製成。給五弟服之。一日不間。果服未終而病即除。大喜過望。特誌之。以告世之患遺精病者。

## 遺精神病簡治法

袁國榮

遺精神病除生理之遺不可謂病外。屬諸病理者可區別為三種。第一種夢精。第二種無夢。第三種滑精。屬於第一種者。由於青年性慾之衝動。所欲不遂。日思夜夢。而夢遺生焉。治宜瀉火。甯水。如三才封髓丹。知柏八味丸所宜也。第二種因夢遺過多。精關不固。或手淫過度。房事過勞。而無夢亦遺矣。治宜益精滋水。如六味地黃丸。水陸二仙丹所宜也。第三種因無夢遺精過多。以致心腎虧損。精道更滑。不分日夜。一動其心而即遺。一勞其神而即洩。治宜兼補心腎。收攝精液。如龜鹿二仙膠。鹿茸益精丸所宜也。總之遺精一症。纏綿極久。宜從速醫治。以免日久變症百出。更難著手。作者本人曾患遺精病十一年。現又業醫。亦專一醫此症。故從自身之經驗及臨症之心得。對於是症。頗有見地。質而言之。就是要病淺即求醫。切勿初起諱疾忌醫。以致日後轉重。自招伊戚也。

## 遺精驗方錄

葉勁秋

五弟景陽年廿二歲。經商於淮安。操勞過度。致患遺精病。始而十天八日一次。繼則三天兩日一次。精神頹頓。飲食減進。中西醫治均無效。恐甚。遂買舟回里。求治於余。並告余曰。凡知柏地黃丸。水陸二仙舟。及金鎖固精丸等。均服過效。驗毫茶四兩研末。每早晚用鹽開水服三錢。包立愈。余幼時曾患此證。醫治無效。奄奄待斃。一路人授此方服之即瘥。

遺精一症。各醫報上已讀得夠了。實在遺精病患者十人有

九。而又不易速瘳。在生理上本無妨碍。不須醫治。在病理上

說着。不外相火有餘與心腎不交幾種。至于治法。終不免偏

于補濁。殊不知此外還有濕熱下擾精宮。純屬實症。誤故溫

補收瀉反生變端。茲錄驗案一則。足資參攷。

我邑宿儒趙曉因先生。早歲苦攻得遺精症。經多數名醫診

治。咸謂陰虛競投熟地黃肉龍牡滋膩之品。非惟無效。且加

劇焉。凡數百里之名醫。罔不邀診。莫不指爲虛勞陰膩之品。

雖然並進循至腹膨足腫。涎沫上湧。人日消瘦。皆謂不起矣。

其初某覘其就張事青先生處一診。一決行期之早晚。非敢

望愈也。時張先生居無錫。尙無赫赫名聲。診後即笑曰。遣泄一

症。壯年大盛者。往往有之。不足怪也。君初病乃濕熱下擾精

宮。與虛勞之精宮不固者。虛實齊攘。主治天淵誤服補藥。溫

火漫無出路。結成痰飲泛溢中焦。脾土鬱遏。腫脹根萌。及早

變計。尙非不治之症。惟正氣已傷。痰飲根深。恐將貽後日之

累耳。乃處方令服十劑。應如桴鼓。連診數次。諸恙均安。痰飲

迄未除根。果如張先生言。厥後連舉二子。一任北大教授。一

任溫州第十中學教授。原方未見于張氏醫案。茲特抄錄于

後。以擇閱者。

十一診。面色黃濶。望而知爲土鬱也。遺泄頻來。腹膨足腫。多

痰口渴涎沫。舌苔薄膩。此由濕擾精宮。精遂不能固攝。府中

之流行。亦爲濕阻陽明失降。所以嘔氣時作。當防其變爲腫

脹等症。不可拘拘以遺泄爲主治也。

製半夏二錢。製香附一錢。上川朴一錢。新會皮一錢。川草薢二錢。大腹皮錢半。赤白芍二錢。生苡米三錢。

木猪苓錢半。澤瀉錢半。越鞠丸三錢。

二診。脈較宣揚。投以分利遺泄却未續。至其非精闢之不

固。可見一斑。欲固精闢當開水竅。

製半夏錢半。生苡米三錢。枳實一錢。廣皮一錢。川草薢錢半。姜竹茹錢半。赤白芍二錢。澤瀉錢半。

木猪苓錢半。大滌菜二只。

三診。分利和中。淡滲鹹化。如係精闢不固。後此滲利之品。

勢必日甚。乃至今一月不過數次。遺泄之後。溲軒黃赤蓋。精

泄後。濕熱乘隙下趨故也。胸痞涎湧足腫。嘔氣分所阻。亦屬

瀦漫于中。故難宣暢。脈象濡細。左尺微弱。當從前法再滲蓄

泄之品。

炒白朮錢半。生薏仁七分。木猪苓錢半。范志曲錢半。

川草薢錢半。大腹皮一錢。赤茯苓二錢。黃柏一錢。

春砂仁七分。製半夏錢半。姜竹茹一錢。大滌菜四只。

四診。痞滿噯氣嘔等象。時雖間作。而夢遺却值構思。即緣

腰府痠楚。兩足時腫。脈久按微帶數象。腎虛是本。濕熱是標。

## 再兼補攝心腎。

上潞參二錢 白歸身錢半 煙壯蠅二錢 煙龍骨三錢  
赤白芍錢半 建澤瀉二錢 生苡米三錢 茯苓神錢半  
野於朮二錢 大淡菜四只

## 治遺精不可專恃藥力

農

稍讀醫報者無不知大補陰丸與三才封髓丹爲治遺精之特效。殊不知該二種藥品對於遺精一症並無若何功效。余作此語也人必疑余夢語以爲古人發明之方法皆是苦心研究得來我人正宜崇拜之提倡之焉能妄顧此種設想。余豈未曾想到惟當此醫學革新時代凡百學說無正確之明示無把握之治療道不能自立茲篇所言并非妄闢古人正爲國有學術增輝耳考之方書三才封髓丹乃黃柏砂仁甘草三味製成黃柏之功能在於清濕熱砂仁之功能在於理氣甘草之功能在於和中。比三味平淡無異之藥對於遺精有何意義。大補陰丸乃熟地龜版知母黃柏四味製成熟地龜版之功能在於滋陰養血知母黃柏之功能在於清濕熱。瀉相火此種藥品以之治腎虛骨痛等症確有功效以之治遺精祇能滋其源而不能塞其流無異揚湯止沸且陰寒滋膩之品大不利於脾胃脾胃受傷生化告乏與遺精之受傷。

有何分別原遺精發生之原理大致在青年期內內經云。男子二八而腎氣盛。精氣溢漏陰陽和而能育子。精氣溢漏者。射精之謂也。惟其腎氣盛則生殖機能必易於興奮。惟其易於興奮則不得不爲之設法減去其興奮於是手淫意淫相繼而來矣。試看大馬當其興奮時候若無雌者逐其欲則必狂跳叫喊如飲頑狂之藥人爲萬物之靈有禮義爲之規矩廉耻爲之納束雖在發性時期苟無配偶只能強忍豈能如犬馬之狂跑叫喊然強忍亦非佳策於是不得不行其待償作用。待償作用者手淫也。意淫也。當其初犯之時亦不過偶一爲之及至後來并不要犯手淫意淫而精亦能自如而來。此遺精病之所由來也。遺精病之大要得分爲二種一種是夢遺一種是滑精。凡患夢遺者大抵已有戀人或朋友或外遇不然不會形諸夢寐中。佛氏云有因必有果可以知天下斷無因之人而患夢遺者。至於夢中如何邂逅如何遺泄則又非局外人可知矣。患滑精者大致手淫過度精關不固。生殖機能一受外界刺激或睡眠時受被單壓迫或睡後過熱即不能自制。余讀折肱漫錄內有記載一滑精事甚有趣。一併錄之以備讀者「先大夫少年時患遺精百藥不效苦極此病蓋用功過苦名心大急所致每臨場則愈頻陽事少著物即遺苦無可奈將牀席俱穿一大孔以臥便其無着是

科發解武林居停。邀其親戚女客飲喜酒。相率觀解元公書室。則牀席有一大孔。皆莫解其故。以爲笑談。一自發解後。遺便希及。登第後則愈矣。」由此事觀之。可以知遺精一症。厥非藥物完全可以療。

## □遺精的攝生

關於遺精的攝生。(一)臨睡的時候應該清心寡慾。(二)在每晨四五點鐘的時候。最好起身小便一次。(三)臨睡前節制飲料。使膀胱不致擴張。不會壓迫精囊和射精管。(四)睡時屈膝側臥。不要躺直仰天。因爲遺精的時候。大都陰莖勃起。勃起時觸着衣褲或被褥。就會發生射精。(五)睡時不可太暖。棉被不可太重太硬。足部尤宜較涼。使下半身不致充血。因爲下半身的充血。也是發生遺精的一種原因。(六)不看誨淫的書籍和圖畫。不作猥亵不正當的空想。(七)養成每日大便一次的習慣。不使有大便閉結之患。因爲大便的閉結能使生殖器充血。促成遺精。(八)禁食富於刺激性的如酒濃茶咖啡。辛辣等食物。(九)多作運動。游散等有益的娛樂。強健身心。(十)遺精的主因是性神經衰弱。所以醫治性神經衰弱是治療遺精的根本辦法。

## □敬告患遺精之青年 尤學周

青年病之最普遍者。厥爲遺精。遺精發生。大多屬於生理的與心理的。關於病理之遺精甚少。

生理的遺精。俗稱之爲「精滿而遺」。所謂精滿而遺者。非如器之容物。太過其量。溢而出外。實由生理上之一種要求。因不得發洩之機會。藉此以暢其願耳。心理的遺精。即前所述『性慾不遂而起之遺精』。滬上青年之患遺精者。十分之九。屬於此例。蓋上海爲文明之處。亦爲罪惡之處。目之所見。爲濃裝艷影耳。之所聞。爲歡歌情曲。鼻之所嗅。爲粉香肉氣。朋友之間。言不涉義。所談大多爲笑謔浪詞。而報章雜誌。於性的新聞。刻畫形容。曲意描寫。青年於此環境之下。有不神搖志奪。銷魂蕩魄者乎。

生理之遺精。不必施治。心理之遺精。其治亦不可全恃藥力。首宜使此心安靜。不受外物之引誘。能到此地步。方可不發。若徒恃藥力。無濟於事。譬諸潮水風平。則浪靜。風不息。浪何能自平。

心理之關於遺精。大約可分爲消極的與積極二種。消極者。爲性慾所驅。使環境所誘惑。不能鎮靜此心。即上所述者。消極者。過於小心。又爲危詞所訛。恫提心吊膽。臨睡之時。防其

遺泄。抑之而適以揚之。恐其遺而遺愈頻。故患遺精者。對於性慾方面。宜加以抑制。對於病情方面。又須處之泰然。一若毫無其事者。則不服藥久之。亦能漸愈。遺精而至頭暈健忘。目糊腰痠。雖爲病象。服藥固不可廢。然非短時間所可奏效。且推原其本。首當止其遺。止遺則又非從心理方面着手不可。至於遺精成癆。遺精足以危及生命之說。皆爲危詞。遺精不能直接成癆。遺精亦不易危及生命。惟多遺。則身體將虛弱。易於發生病證。則有之患此者。如能存有戒心。決不致發生他變。

### 預防遺精法

沈仲圭

遺精一症。須服藥調養。二者並重。方能迅奏膚功。且世風不古。人慾橫流。而繁華之春。申引動性慾之物。事尤夥。故病遺精者。往往十人則九。茲將東西醫家公認之衛生法條。次於左。已病者。足輔藥石之不遠。未病者。可預防其發生。倘亦讀者所願聞乎。

一、正心修身。使慾念無發生之機會。(性史爲造成遺精之利器。青年宜懸爲厲禁。)

二、寢具宜硬。下部勿使過於暖溫。

三、能行冷冰浴者更佳。如或不能。以冷水摩擦脊柱。洗滌

陰部。日一二次。

四、臥時宜側身屈膝。不可中夜改變姿勢。

五、夜睡勿飽食。睡前勿飲茶湯。中夜倘有尿意。務宜起而排泄。

六、醒即興起。切勿戀衾。如嫌睡眠不足。不妨午睡以補元氣。之七、禁食助陽之食物。(如饅饃。貝類。葱蒜。姜椒。萎芥。濃茶。酒類等是。)

### 精清立愈法

景岐

房事過度。或濫行手淫。以致腎水不旺。精液清冷。不克直射子宮。而聚於子嗣者。宜服固本健陽丹。方以熟地黃。山茱萸。各三兩。揀淨菟絲子。酒浸川續斷。炒蛇床子。製遠志。肉酒蒸山藥。酒洗牛膝。酒洗當歸。鹽水炒益智仁。酥炙鹿茸。酒炒斷絲杜仲。酒浸肉苁蓉。茯神。巴戟天。五味子。各一兩。枸杞子。三兩人參。二兩。共研爲末。蜜丸如梧子大。空心淡鹽湯送。臨睡再服。每服三四十粒。

### 精冷立愈法

景岐

精冷在乎陽氣不足。以致陰莖萎縮。或腎氣不利。自醫之法。

宣以五味子一兩。枸杞子八兩。酒煮菟絲子八兩。去蒂覆益子四兩。炒車前子二兩。共研爲末。蜜和爲丸。開水吞送八九粒。

## 精少立愈法

景岐

男子本原虛乏。則射精稀少。不能直達子宮。而交合遂不能酣暢。自醫之法。宜用固本丸治之。方以去心麥冬酒製菟絲子酒蒸。搗熟地黃酒浸。天門冬。伏神。五倍子酒浸。搗乾地黃各四兩。微炒淮山藥三兩。去皮心蓮子黨參。枸杞各二兩。共研爲末。蜜和爲丸。如梧子大。用淡鹽湯送服。每服七八十粒。

## 神經衰弱

問 鄙人十三四歲時。與無知同學。每夜皆以手淫爲戲。現今體疲力稀。精神疲倦。遇事皆生畏懼之心。作事易忘且易倦。此種病像不知是否由此得來。中醫的補藥方。參虎膠等。皆無効。驗西藥之自來血。補腦汁。也同中醫一樣的無效而已。(胡持均)

答 所述爲神經衰弱之現象。確由手淫過度而起。試服三天。

王補心丹(藥肆有售)。每晚淡鹽湯下三錢。半月後或有效。房事方面。宜有節制。

## 青年之神經衰弱

石蘊華

青年之患神經衰弱者。或由於先天賦稟不足。或由於性慾過度。或由於思慮及煩勞耗神。近世風俗鄙薄。道德淪亡。性慾易於發動。而社會生活亦日益複雜。既因於應酬。復極意於鑿算。神經之施用過度。神經之衰弱。由此而起。其初心神不安。精神恍惚。意興索然。無忍耐心。記憶減退。夜不能熟眠。頭眩心悸。發生種種病象。百念俱灰。常抱悲觀。甚則恒存自殺之心。且樂於狂嫖濫交。一面自悲環境之不良。恒求戒絕。一面藥此不療。治法忌用興奮之劑。以鎮靜神經爲第一要義。如天王補心丹。孔聖枕中丹。磁硃丸。歸脾湯。皆可選用。一面力求靜養。作精神上之調治。又須持之以恒。日久必能收效。

## 神經衰弱與失眠

周進之

凡神經衰弱已成爲症候者。則精神抑鬱。思慮紛然。臥時常覺睡意毫無。而精神又非常疲倦。勉強入睡。有微夜不交睫者。有終夜爲惡夢所擾。而疲憊不堪者。有祇睡三四小時。一

到習慣醒時。即不能睡者。此所謂習慣醒者。惟親歷者方知

之。譬如第一夜於午前三時醒。第二夜亦復如是。以至於以下諸夜。無不皆然。一到此時不能入寐。不眠之時。心焦氣悶。痛苦已極。倘力爲排解。則妄念乘之。於是追想既往。懸念將來。一切喜怒哀樂之妄想幻境。均乘機竊發。不可制止。精神已疲極。思睡而種種之妄想幻境。尙恍惚如在目前。有不能

斷絕之勢。愈欲睡而愈不能睡。轉瞬晨鐘破曉。意態始覺矇

朧。日間勞頓異常。心緒惡劣。有不得不從事於晝寢之勢。或有全然與此相反者。其精神疲倦。日夜思睡。偶或醒覺。輒感不快。且睡時恍恍惚惚。鼾聲已達於戶外。而自己或不覺其睡。且自謂未嘗交睫也。此種似眠非眠之症狀較失眠者其神經之受病。恐猶深一層。蓋其腦系已由衰弱而入於昏濁之境矣。

## □ 心理與失眠

尤學周

失眠之原因甚多大別之。不外心理與病理二種。一因感受疾病之痛苦。精神上起一種反感而致不得安眠者。因精神受外界之刺激。或違反其睡眠時之習慣。以致不能入眠者。是乃由於心理所致。如喧鬧煩躁。擾人清夢。高談闊論。喜悅歡暢。煩悶憂慮。及有『擇善病』之移居以後。即不易於

入眠者。皆心理所致不眠症也。

社會愈文明。生活程度愈高。個人之負擔亦愈重。對內之職顧。對外之競爭。勞神費心。最易造成不眠之症。家庭富足。生活寬裕者。則又躡躅於妓院酒館。呼盧喝雉。日夜流連沈溺。不返。耗費寶貴之精力。造成神經衰弱之症。多成爲心理上之失眠。

心理上偶受刺激。偶感興奮。而形成失眠者。乃暫時之事。於身體上並無十分影響。不足顧慮。若時受刺激。時感興奮。則精神上受極端之苦悶。或無限之耗費。造成一種習慣。深刻於心版之上。時時擾動其心神。則成永久之失眠。心理而轉變爲病象矣。此時除失眠而外。兼見腦力衰弱。記憶減退。心悸怔忡。精神萎靡。脈象虛弱。此則足堪注意。不容忽視者也。語云。『心病還將心藥醫。』不眠之由心理造成者。第一須愉快其精神。調和其心力。改變其摧殘精力之環境。則心有所安。神有所養。服藥易於奏効。其他如寢室宜幽靜。使五官不受外界刺激。晚餐食物不宜過飽。當避含有刺激性者。多運動。多沐浴。皆爲康樂身心。促進睡眠之要法。宜實行。不背久而久之。自能收無上之效驗。

## □ 失眠之簡易療法

筠春

文明進步。社事日繁。勞心之事漸過於勞力。於是其產生物之不眠症。遂應運而生。吾人覺到太古時代。日出而作。日入而息的景象。則所謂不眠症者。實無由而生。不眠之苦惱。非但患不眠症者自覺之。即旁人亦無不代爲痛苦。有人謂不眠甚於飢渴。事信有之。

不眠在醫學上論之。不過爲一種病的症狀。須求其因而治之。茲則屬於醫學範圍之內。今僅就簡易之療法。爲世人所易行者。述之於後。倘能一一實行之。必有所獲者也。

一、患不眠症者。就眠後往往因雜音而醒。故睡處務宜擇清靜不擾之所。

二、就寢前過飲過食。往往易起消化不良。而陷於不眠。宜避去之。

三、晚上或臥室中。有使神經興奮之書物。宜避去之。

四、喜使用頭腦之娛樂者。如耽讀小說書報。聽演詞談講。均足使神經過勞而陷於不眠。

五、恐怖憂愁。憤怒等使精神過勞。則夜睡時容易醒。漸成慢性不眠症。難以治愈。

六、每日有規則的生活。如定時入睡。定時起身。乃最要之一般療法也。

七、冷水摩擦。日光浴。冷水浴。溫浴等。均足以幫助睡眠。

八、床上讀書。且讀且睡。自然合眼。亦一法也。

九、就眼前行體操。使身體疲勞。達自然安眠之程度為止。此亦一法也。

十、欲鎮靜神經。雖濫用催眠藥亦無效。

十一、靜靜數字。似若有效。而往往無效。何則。因此法太簡單。難以壓制雜念故也。

十二、法國之某醫。發表對不眠症之患者。令其頭在北足在南。睡眠時。則可安然入睡。其理由。因地球之磁石流。自北向南。容易通過身體。則人睡安睡。若照此方向橫臥時。則妨礙睡眠云云。

## ■ 安眠良法

不眠之症。最傷精神。市上雖有安眠之藥。奈效微而費大。法於臨睡時。以手摩擦兩足底。可以熟睡。初亦不信。後親試數次。每獲奇效。且此法簡易。患不眠症者。蓋一試之。

## ■ 一味定神散

辰砂一味研末。溫酒調和。可治不能安眠之症。昔有一富人。患不眠症。百藥不效。得僧人授此方而愈。睡兩日方醒。惟此藥不宜多服。多服有傷神經。

## 失眠症怎樣治

養活錄

(一)適度運動。就寢之前須為適度運動。使腦中積血移於四肢。但切忌過於劇烈。

(二)行深呼吸。就寢之前須為腹式深呼吸。約十分鐘停止。使腦中積血集注腹部於眼睡極有效力。

(三)寧靜精神。就床後若妄想或憂慮。則精神一不安。決無成眠之理。故就寢後宜寧靜精神。縱有憂慮亦當棄之。

(四)戒飲濃茶。睡眠之前勿飲濃茶。因濃茶刺激性甚強。有碍睡眠。其他咖啡。香煙。香料等種種刺激品亦宜戒之。朋友。你患失眠症嗎？如果有的話。不妨照上面的方法試一試。幾天後你就會覺察自己精神的舒暢。這就是牠的功勞啊。

## 心悸不寐

朱振聲

問 鄭人現為商店司帳員。生活方面尚稱舒適。惟出入頻繁。精神太勞。近年得心悸之症。夜不安寐。且健忘。深以為苦。未知有無特效治法。(錢志一)

答 操勞過度。心血虧耗。血以養心。而灌溉百骸。血虛則心無所養。故心悸失寐而健忘。治當養血補心。一面節勞省神。

先生仁心仁術。濟人水火。無論藥石療養。精神療養。統求一

最好變更其生活。則奏效較易。

大生地四錢 辰麥冬三錢 石菖蒲七分 酸棗仁三錢  
全當歸二錢 京元參三錢 遠志肉一錢 抱茯神三錢  
炙潞黨三錢 阿膠珠三錢 柏子仁三錢

## 心悸不甯

朱振聲

問 銘樹今年十五歲。素有心悸(即心跳速度增加)之症。到了現在。增加得分外利害。本來樹的心悸絕對不能算是一種病。因為在不想的時候。一些不發的。或許是「感應力」特長的緣故。譬如有一「重要的事情不可心悸」這樣一個心悸即發生了。理智再也不能壓制。到了現在覺得心悸更加可怕。唯恐發作。以致時時刻刻的恐懼。一些忘不了。所以心悸就時刻不停。發的時候。心房震動得異常迅速。頭容顛晃。消瘦。舉動失措。面易紅。若怕羞然這樣繼續下去。對於前途的希望。終身的幸福。以及身體虛弱。百病易生。真不堪設想呢！總之這病是愈恐懼愈發作。祇要能不去想到有甚麼心悸一回事。使得心中沒有恐懼。或者用理智可以克服。那就好了。可是用甚麼方法能使「不想到」「不恐懼」呢？用甚麼方法理智完全可克制它呢？

一指教得以治愈。樹則銘感五內。永世不忘呢。

或者用甚麼方法可使得心跳速度止住。例如呼吸使慢。將它壓下去。但這祇可短時間的做。況且還不能完全此住。答 心悸一症。「最要是鎮靜」能夠「淡然忘懷」尤妙。越是覺得可怕。越是厲害。從來信可以證明了藥物方面可常服「天王補心丹」每晚淡鹽湯下三錢。

(樊銘樹)

## 尤學周

健忘由於神經衰弱。對於腦力之保養。當為要着。蓋腦為身體神經之主宰。神經之衰弱與健忘。與腦力有密切之關係。各部之神經。固不宜使受過重之刺激。以致及於腦。而腦之本身。尤宜加意保養。不可過於勞碌。精神愈用。則愈出。腦力愈用。則愈靈。然用時貴在有節。若一勞而求永逸。則逸且不可得。反因勞而傷其腦力矣。

莘莘學子。治學過猛。於功課方面。固以出入頭地。腦力必為之大傷。又有平日優游成習。置功課於不顧。臨考之時。發憤忘食。夜以繼晷。亦非所宜。如神經本已衰弱。浸成健忘之症者。腦力之使用。尤宜節制。否則。其證情必復加甚。已忘之事。亦不宜勉強追憶。之當追溯而不能記憶之時。宜棄之不顧。

## 青年之健忘

或能於偶然之間。若強加思索。最為不宜。且有因此而更不能想出者。即幸而憶及。有傷腦力。非攝生者所當為。勿過用腦力為健忘者。消極之攝生法。充足其睡眠時間。為積極之攝生法。俗尚之三八制。規定工作八小時。休息八小時。睡眠八小時。乃指普通之康健人而言。如身體失於健全。則不能以為例。譬諸健忘之人。腦力之休養。最為緊要。八小時之睡眠。尚嫌不足。當必增加。而使其充足。然患健忘者。每有失眠之傾向。其睡眠時間。不足八小時者。有之。睡眠不足。精神恍惚。記憶力必愈減退。故睡眠充足之先決問題。為如何可以得使熟眠。

熟眠之法。最好於寢前作適宜之運動。運動之後。繼之以沐浴。即不沐浴。亦當以溫水洗足。洗後就寢。被褥以柔軟為宜。睡後運行精神。集於足之趾尖。又屈數兩手之指。則腦間血液。自然流注於他部。由是一切皆空。漸入於涅槃之境。可安然入睡。一覺醒來。精神倍增。此健腦之良法也。

## 淋 潤

## 弱國減種之淋病

佚

馬苦民謂德國盲者所損失之生產力。與養育之費用。合計

每年國家損失二千萬馬克。即一千萬圓。是尚不過少數盲者所生之損失。若血氣旺盛之青年如學生役人商人勞動者一罹淋病。則其爲休業及死亡。所生國家生產力之損失。爲兵士罹淋病所失之戰鬥力。爲子宮淋所發之流產早產夭死及不姪症。凡人口蕃殖上所蒙之損害。苟一一計算之。則國家之損失實在幾億萬元以上。

淋病者上自社會高等人。及最下等人。各階級中均受蔓延。故其損害非常可懼。決非虎列刺百斯篤赤痢等可比。噫。今尙可視為粘膜加答兒。而謂不足注意耶。

以此陰險可畏。爲社會勁敵之淋病。告世人以可恐之狀。且與以防禦之武器。自立陣頭。以講勦滅其敵之道者。皆我醫者之職。而此即救個人。保家族。助社會之健全發達。國家富強基礎之一端也。

## ■ 淋病的歷史

小鳳

我們已能明瞭花柳病在從前只是爲人認作一個病。根本無所謂梅毒下疳白濁等分別。西洋人說起來。花柳病是哥倫布到美洲去帶回來的。日本人以爲葡萄牙人在明末將毒種帶送至中國。而中國醫書上明白記出梅毒病的要以明代植崇時陳司成爲開端。也是這樣考證。却因粵人傳

播。故名廣。除了兩個理論以外。有人還主張石器時代已經發見此一病症。不過太渺茫了。所以原始的說明始終是根據前面兩種。一直到那依斐氏發明雙球菌花柳病方始分別完備。也開始有淋病紀錄。但是中國古書籍裏倒也有不少的紀錄。可以猜詳。請讀下文。

「文選辨命論」注引韓詩曰：「荼蕩傷夫有惡疾也。」辭君章句曰：「傷其君子有惡疾。人道不通。求已不得。發憤而作。」你明白麼。人道不通。求已不得也。者不能性交之謂也。然而陰委天闕。不算惡習。亦永遠不再能發情而作了。那末這惡習一定是花柳疾無疑。同時生花柳疾還能發情。除了淋病以外。梅毒及下疳是決決不可能的。當然是白濁毛病。此可稱淋濁。見諸古籍記載之證。春秋時晉平公疾甚。鄭子產謂爲「近四姬所致」。秦國名家《醫和》診斷云：「近女室之疾。皆不可爲。」按晉平得疾在魯昭元年。而二年竟又娶齊少姜。四年又娶子尾之子。從可知晉平雖病而仍近女室。初未會知所省改也。晉平之薨卒。在於魯昭十年。則稽考時日。其有疾以遠於病死。遲延竟達十年之久。以名醫斷爲「不可爲之近女室。所致疾病」。竟能時發時愈。延及十年。亦且不斷的接近女室。是何惡疾而能如此。亦可決其必爲淋病無庸疑義。從可定晉平實開中國淋病病人之紀錄一笑。

「素問玉機真藏論曰」少腹冤熱而痛出白。一名曰疊此即淋濁之的證。亦古代淋病診斷症象之定論。此則中國淋濁醫案之第一例。

## ■ 淋病之研究

方克明

### (一)

## ■ 淋病問答

時泰

淋疾與子嗣。  
(問)俗謂有淋疾者皆不能生育。然歟。  
(答)否。男子患此雖疾未愈。若於行房之前。暢通小便。依然可以得孕。若婦女患此。雖男子無病。亦萬難受胎。蓋以精蟲不能受酸素作用也。精蟲經酸則死。故男子之老淋公。照常生子。惟產生之五日間。宜加意保護。嬰兒雙目稍一不慎。可以致瞽。是在收生之得人矣。

淋疾與脊屬。  
(問)有患此疾已愈而突然復發者何故。  
(答)雖有因體虛或勞碌而發者。十僅得一大多數由於男子治愈其夫人則以顏面關係畏憚不前。決不療治。如此苟夫婦行房最易復發。反之婦愈而夫未治亦然。故根本解決有一患者者。非夫婦同時治療不爲功。

淋疾與房事。  
(問)俗謂患淋者與紅潮方至之婦女交可愈。更謂與處女交尤善。其說然否。  
(答)此誠荒謬絕倫之談。男子患淋時期。切忌房事。凡此皆有害於人。無益於己。淋忌衝動。而宜靜養。多走路尚不相宜。況性交乎。

在每溺的時候。痛徹心脾。濁和尿混合一起。終日淋漓的不止。龜頭腫脹。勢必潰爛。很為可虞的。陰莖須終日的放平。不能向下的懸垂。凡一下垂。脹痛甚致。欲死的式樣。到如斯的現狀。其淋濁須謹防。由紅變黑。黑色一起。不可藥救。性命當然放棄在物外。就能醫治而愈者。十不一二了。這謂之五淋中的急性淋。急性淋中最慘痛難受的是石淋。血淋兩種。至於慢性淋。比較這種當然分不能合的。大概因身體的虛弱。房事的過度。其症在初發的時候。和急性淋的相彷彿的一候。日久時時覺得精管中蠕動的作癢。竟日的淋滴不休。但在便溺的時候。不覺什麼的障礙和痛苦。時重時輕。或有或無。有數日不愈。有經年不愈的。惟形於面色的日益黃疸而憔悴。身體日益虛弱而不能支持。然其症狀的險惡。不稍減遙於急性的淋病。蓋日久不瘥。他的穢濁必漸漸的遁入膀胱的中間。以致變為魚口便毒等症。故論到淋病的症狀的同志們。均謂治療慢性淋。難於急性淋。不啻十倍。

淋病治療法 淋病的治療法。第一務須利濕下濁。濕盡濁除。則精管的宿穢完全的得到排泄。於是淋病的症自然收到痊愈的目的。解除困苦的災厄。第二須注意清潔。使得淋濁不傳染到別的地方。然後服利濕清濁的藥劑。病根可絕。

更不傳染而復發。惟切不可求速於最短時間。所謂欲速則不達。速則反為不美。非但不能治愈。且有意外的產生。患這種病的之求速治的多。因為他病症的苦痛和那淋滴下濁的不潔。往往抱一種悲觀的形景。故求速治。則非霸道之藥劑。決無功效。一經誤服霸道之藥劑。於是內則濕濁未盡。外則無路可出入膀胱。發生魚口便毒等危險大症。故患這類的症狀。須切戒。要求速愈。宜服不傷脾胃。清通血液。潤驥利尿。排泄防腐等藥。最為合適。更有注意者數點。

#### 得勞倒。

一、宜慎房事。禁絕煙酒和茶末。山葵姜椒葱韭等刺戟物及多脂富膏的飲食。不可吃。患部務使清潔。身體宜安靜。勿明接之於瘡口。則病毒蔓延全身。故在清潔上。不可不格外注意。

#### (二)

#### 淋 警

淋毒於何種情形下可傳染 淋毒的病菌為德國南色爾氏所發見。稱為マノマソク。微生物。此菌是很神秘底繁殖於人類中。此種病菌在患淋病男女尿道之膜中。患淋病婦人帶下之中及風眼的膜淚中。是異常多的。

然而於婦人方面的患病者普通多因夫婦生活中由於男人的直接傳染。淋菌也有附着于腰帶及手帕等物之上。亦有因此而傳染的人。此種情形不過是很稀有底事。淋菌在浴塘和浴室中可生活二十小時左右。然而僅十是生存。對於傳染力多是非常底薄弱。

所以普通初患淋疾的男子。丁夫婦生活中有傳染的可能。像這種從男人尿道中急性地直接傳染。不用說是非常之多。然而也有從最初不現任何病狀底男子的慢性淋疾而傳染的也很多。若對於男人不注意。而婦人一度底受這種慢性淋疾的傳染。那柔軟的粘膜被侵害。就成了一種極猛烈的急性的狀態。

男子的淋疾成一種慢性病的時候。若不出臘也就沒有腫痛。因此以為可以自愈。以後同處女結婚的時候。在尿道的深處所潛藏底淋菌可以很快地傳給新婦。因此而演出種種悲劇的事情也很多。淋病的根本治療。所謂淋疾是一種具有非常頑固性質底病。若一旦受傳染。是頗不易治療的。所以無論如何預防是非常的必要。在日本政府有發表花柳病的法案。如果患此病而傳染給旁人的時候。要受有極重底刑罰。對於預防是非常底努力。可是于實際預防上一

一每人衛生思想促進的方法還沒有。家庭中之婦人患淋疾的結果。不用說是由於男人品行惡劣底結果所引起的。所謂這些都是一般男人從某種地方得來的病症。同時瞞着自己的妻去密密的治療。然而此種病並不是一朝一夕可以治愈的。所以終於對于妻子傳染底機會是很多。

到了最後。男人纔向自己的妻子說明。同時妻亦只好寬容。於是彼此的病症成了非治不可的樣子了。如果不幸得了這種病的時候。切不可用暫時平常人的自療法。必須要急速請專門醫生用高妙底方法治療。這種病症多是時期與病症權應。因為治療的方法很難。所以平常人的自療法都是很危險的。

#### 淋菌初期侵害之徵候

淋菌侵入到膀胱與尿道的時候。這便是初期症狀之異點。淋菌最初侵害膀胱的時候。便起一種陰加答兒及頸管加答兒等。立刻便釀出一種膿樣底帶下。同時這種帶下中常常是混有血液的情形。這便是淋菌已經侵蝕而且入到頸管部中。在這個地方便起了激烈底加答兒。並且還要糜爛的。

同時于下腹部。腰部及鷹骨部還有一種不快底感覺。或是

覺得腹中脹。或是下腹部有一種蟄急底疼痛。

其次便是淋菌侵入到尿道時候。俗謂之消渴。尿道之口發腫。同時小便時還覺得疼痛而且難耐。除去此種情形之外。膀胱之入口的兩側尚有名叫貝爾托林氏腺（前庭大腺）的小毛穴。淋菌也有從此侵入的。到了這時便起一種可謂貝爾托林氏炎。再經過異常疼痛。遂到了破裂出膿的時候。

男子患淋疾對於女人妊娠之胎兒之障礙。

癥毒對於胎兒有直接影響。而淋疾並無直接影響。然而男人若患淋疾。當然對於妻子的傳染不能不留心。若患淋病而同時又妊娠。那便非慎重地調護不成。妊娠的淋疾是一件非常重大的事情。如產後患最可怕底產褥熱。多是因于淋菌的緣故。所以分娩時如有此疾。必需要向接生婦說明。還有產後子宮收縮時。關於清潔內部需要十二分底注意。同時切要細心預防淋菌從子宮侵入到喇叭管及腸膜內。對於生下來的小孩。生後即用苦列地氏的硝酸銀點眼法。若不注意乳兒的眼睛而淋菌侵入。便起一種膿漏眼（俗謂之風眼）。以致可以失明。硝酸銀點眼法直到今日為一般人所應用。然而仍有失明底不幸底孩子。所以對於它的注意是十分必要的。

## ■ 淋濁造成之原因

何白元

內經。內經無赤白濁之名。至真要大論有云。諸轉反戾。水液渾濁皆屬於熱。又云少陰在泉客勝。溲便變少。陰在泉客勝則溲白。此言濁症之因於熱。若瘧論云。思想無窮。所願不得意。淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。白淫即濁也。又曰問篇曰。中氣不足。溲便爲之變。又五癃津液別篇曰。陰陽不和。則使液溢而下流於陰。髓液皆減而下過度。則虛。虛故腰背痛而脢癆。雖不言濁字。而髓液即濁之謂。凡此數條。皆言濁病以虛而成。

巢氏病源云。白濁者。由勞傷腎。腎氣虛冷故也。

劉河間原病式。舉內經諸病。水液渾濁皆屬於熱。言天氣熱則水渾濁。寒則清潔。水體清火體濁。又如清水爲湯。則自然白濁也。可謂發聖人之旨。朱丹溪云。濁病屬濕熱。有痰。有虛。亦屬血。由小腸屬火故也。白屬氣。由大腸屬金故也。又曰。思慮過度。嗜欲不節。以至心腎不交。精元失守。而成赤白濁之患。赤濁者。爲心虛有熱。由思慮而得之。白濁者。爲腎虛有寒。因嗜欲而得之。又曰。白濁爲濕痰流注。宜燥中宮之濕。赤者。濕傷血也。

王肯堂云。患濁者。雖便時。莖中如刀割火灼而濁自清。惟

竅端時有穢物。如瘡膿目眵。淋漓不斷。初與便溺不相混濁。濁病由精敗而廢者什九。由濕熱流注與虛者什一。

張景岳云。赤濁多由於火。白者寒熱俱有之。由精而濁者。

其動在心腎。由濁而爲濁者。其病在膀胱肝脾。

## ■ 淋病家族間之傳染 丁仲祜

淋病家族間之傳染。關係甚大。茲就余所診察者之一例觀之。

某人因在公廁所大便。翌日小便時覺尿道稍痛。二日後漏薄。由是腹漸變濃。經二十日。其妻亦於小便時起痛多。膿終致時時下腹感痛。更經五日。其所生幼女僅及九月。亦從下面出膿不已。而其小便時必劇泣云。此親子三病人來診察。所乞余診治。其時適為發病後第二十九日。余檢查之。知三人共有淋病之徵。甚多。此男子不知自己淋病傳染力之可惡。傳染其妻。又延及其愛女。然其夫幸倘有良心。爲保自身與家族健康之故。不敢再延時日。即往醫師處診察者。是又下幸中之幸也。然世之男子。非盡如是之正直。竟有深知淋病之危險。而以自己情欲難制之故。致毒害無罪之婦人者甚多。余用毒害二字。何以言之。婦人淋病之危險。比男子尙大。德國刑法。凡自知傳染病而傳染他人者。與歐

打創傷之罪同。實則其罪之深。不止歟。打損傷已也。蓋與故殺謀殺等罪相同焉。

## ■ 婦人淋病之傳染 仲祜

幼年婦人往往結婚未幾。忽焉發熱。顏色蒼白。身體不暢。問其病狀。則小便時作膿下甚多。腰間關節筋肉等疼痛可憐。此清淨無垢之新婦。今爲結婚前放蕩之夫所累。淋病之徽菌。新得一蕃殖地。蔓延勢盛。不一月而起子宮內膜炎。更喇叭管膿腫。若不速切開之。則終以腹膜炎故。致如花之美貌。可立萎也。縱有幸而發生者。然婦人久在病褥。數月後始得離牀。則曩日如花之姿。變爲瘦弱之影。害神經衰弱症者。有之。不育小兒者亦有之。家庭如是。尚何娛樂之可言。要之婦人之淋病。比男子更危。婦人病中之難病。亦莫如淋病。嘗見婦人強發熱。或下腹猝痛。俗名爲癆。實則罹淋病之婦人。概有是病。眼回頰高。顏色蒼白。面生黃斑。貌極醜惡。行步蹠跟如羅肺病之末期。此即子宮淋患者之面貌也。

## ■ 淋病與性神經衰弱 笛壽

一個人患了淋病以後。往往發生遺精。腰痠。容易舉陽等種種症狀。所謂腎虛體虧。相火旺盛等。是實爲淋病後攝護腺

神經症。名曰情慾性神經衰弱。原來後尿道攝護腺部陰阜的地方便是神經最多的地方。倘是發生了淋病。淋病不知道不覺地從前尿道蔓延到後尿道。並且蔓延到攝護腺等。到急性症狀經過後。就會遺留着情慾性神經衰弱症。他的症狀是很多。吾現在把他分做二種講起來。一種是局部的症狀。一種是全體的症狀。

(甲)局部的症狀。講到局部的症狀。譬如患者往往覺到會陰部(就是肛門和陰莖中間。俗名海底者是)。有重感或是鈍性的壓迫感。或是尿道睾丸直腸內有癢感。此等的異常感覺或永久存在。或有時發作。患者頗為苦惱。有時不但有這樣異常的感覺。而且有劇烈的疼痛。此疼痛不但僅僅發生在後尿道和攝護腺。而且放散到肛門鼠蹊部(就是下腹和大腿的交界部)。睪丸。大腿。荐骨等部位。發作性的出現。常常因運動。坐椅不適。或是放尿射精時而發生。或使疼痛加甚。病人竟有坐立不安的狀態。還有一種重要的症狀。就是攝護腺漏。在大便之後。或是放尿完結。在尿道口有精液樣物流出。患者因此頗為恐懼。誤以為流出的是精液。惶恐的去就醫。其實何嘗是精液。不過是一種攝護腺的液體。但是也有一種真正的精液漏。這是因為淋病侵犯到精囊的時候而發生。其情狀和攝護腺漏是不同的。

放尿障礙。也是常見的現象。大多是尿意頻數。或是放尿疼痛。這樣的尿意頻數。有在夜間劇烈。也有在一日中一定的時候劇烈。譬如早晨或黃昏的時候。排尿時候的尿腺。因括約筋的痙攣忽然半途中絕。或尿腺時大時小。或是放尿終了。尿道裏面還有若干的尿未排盡。滴滲而來。濕潤衣服。因之患者當排尿終了後。往往故意振動陰莖。或是壓迫尿道。想排除這殘餘的尿。利害的往往因這樣的尿滴漓引起了包皮和陰囊的溼疹。關於生殖方面。也有著種種障礙。患者陰莖往往容易勃起或遺精。射精後。尿道內常有灼熱的感覺。劇烈時。則永久持續。他的疼痛。放散到直腸。此外交接時缺乏快感。和勃起力的衰弱。成了早洩和陽痿。

(乙)全身的症狀。有了慢性攝護腺炎以後。患者的全身症狀。也受著很大的影響。就是除上面所講的局部症狀以外。往往有放散的知覺異常。荐骨痛。背部痛。頭部痛。眩晕。心悸。便祕。怠倦。不眠。容易疲勞。和恐怖觀念等。患者的性質因此陰鬱起來。對自己的命運。常常悲觀。感覺自己的疾病過於重篤。肉體和精神力的活動力減退。結果竟懷着一種厭世的觀念。此等總稱之曰情慾性神經衰弱。

上面所講的情慾性神經衰弱症最多的原因。便是淋症。此外手淫。乘車。乘馬。房事過度。交接中絕等。也都可以發生。本

症。但是發生本病的人，大多有神經質的因素。加以一種的運動機體如冷水灌腸、冷水浴、坐於石上、直腸部的刺激、後尿道的不適當治療等，都可以引起本症。

## 中西醫淋濁診治之比較觀

商智

近來人慾橫流。患淋濁者日多。其症當小便排洩時。尿道前半部痛如刀割。尿如沸湯。龜頭增腫。不時流出膿狀黃色液體。臥則陰莖勁挺。尿口下面垂於會陰之宗筋。緊張如弦。疼不可忍。大便難滯。中西醫學所列症狀大致相同。但起病之原因。中醫則以爲溼熱壅於下焦。或忍精不洩。致瘀濁滯於隧道。西醫則以爲不潔之交媾。淋菌由尿道侵入。然實地考察。西醫之說殊不盡然。蓋男子之患淋濁者。未必交媾即傳染於女子。女子之患淋濁者。亦未必交媾即傳染於男子。此徵之多數患淋濁之男女。可明證者也。若云菌毒則濕熱瘀滯。何嘗不化爲菌哉。是中醫雖不言菌而菌即在其中。其診察方法。西醫係用高倍顯微鏡及濁濁血清反應機檢驗雙球菌狀較之中醫。但以問切所得者形式自較爲優。至西醫之治療。不外尿道注入蛋白化銀。注射黃色素阿爾地。抑或混合血清等。雖能收效於一時。而有餘毒未清。流爲橫痃。

墨丸。炎關節炎及慢性白濁等之弊。而中醫則用古方之將軍蛋（生川軍研細爲末。入鷄蛋孔內。蒸熟食之。渴下五次即愈）及葉氏杜牛夕麝香等法。頗有效驗。予則於將軍蛋內加西琥珀末一味。杜麝方內加生地、川柏桃仁、大黃四味。甚則加紫雪丹。俟淋濁十減七八之際。繼服燕絡終服局方清心蓮子飲方。而加以紫金錠數條。其治療之結果。既無橫痃。墨丸關節等炎症之害。亦無淋菌潛伏後尿道內。尿道狹窄。變成慢性不易根治之虞。論其功效。實出西醫之上。奈世之患淋濁者。徒取西醫之時髦。殊不知中醫診治取效。雖緩而有利無弊。則知之者寡。患淋濁者。曷不比類而齊觀之。始知余之言不謬矣。

## 談談五淋

(一)

錢泉

嘗讀金匱曰。淋之爲病。小便如粟狀。小腹弦急。痛引臍中。此濁。何嘗不化爲菌哉。是中醫雖不言菌而菌即在其中。其診察方法。西醫係用高倍顯微鏡及濁濁血清反應機檢驗雙球菌狀較之中醫。但以問切所得者形式自較爲優。至西醫之治療。不外尿道注入蛋白化銀。注射黃色素阿爾地。抑或混合血清等。雖能收效於一時。而有餘毒未清。流爲橫痃。

治法以五淋湯。(赤茯苓錢半。赤芍。山梔仁各一錢。當歸。甘草各一錢。二分。燈心二十莖)爲主。而膏淋則加菟葵血

則加乳香。沒藥。桃仁。鬱金。牛膝。沙石淋則加茅根。冬葵子。葶苈子。枳實。連翹。瞿麥。萹蓄。滑石。勞淋則加人參。黃芪。氣淋則加沉香。本香。此其大約也。

然此第論普通淋證。專主熱證而言。豈淋證祇有熱證而無寒證哉。往往有冷客下焦寒氣堅閉。水道不行。其症先戰慄而後小便短數。淋瀝不斷。或四肢厥冷。口鼻氣冷。此非桂附八味湯不可。若以五淋湯投之。則南轅北轍。其不致誤人性命也幾希。

蓋淋證之因於熱者。其常因於寒者。其變熱證易治。寒證難治。愚初不敢謂治淋者無能知冷淋證也。愚亦不敢謂治淋者咸能知冷淋證也。故今往復。環爲未知冷淋證者告耳。我中醫以淋爲一症。濁又爲一症。從不敢混爲一症。乃今之新學家言。淋濁異派同源。淋之前期而爲急性者。謂之淋濁之後期而爲慢性者。謂之濁。其原因皆出於交媾不潔之人。而爲花柳傳染病之最輕者也。彼蓋以爲交接不潔之婦人。其不潔之液體入男子溺管內。經二三日即呈尿道灼熱。腫痛。稍有分泌液。射尿時。尿熱異常而發劇痛。再經數日。則濃汁變爲黃色。至腫樣狀。尿道口發赤腫。小便時。其痛更劇。

此爲急性淋之現症。若治療失宜。或怠於治療。則變爲慢性。殆無瘳痛。

初起時略有分泌物。久之則有尿管狹窄之危險。其症候更深一層。雖然有前期後期之判。急性慢性之殊。總不外乎淋病重球菌所傳染。膀胱炎與尿道炎而已。斯言斯旨。直以淋濁爲一而二二而一者矣。以新學徵舊學。經云思想無窮。所願不得意。淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋萎。及爲白淫。白淫即淋濁也。其意義似亦可融會貫通者。

茲姑捨濁而論淋。鼻色黃者。小便難。小便不利。求之膀胱。然膀胱雖司小便。而所以能司小便者。氣化也。氣之所以能化者。不在膀胱而在肺。肺主氣化。肺病則胃熱下注。溲不得行。止適中乎。觀乎此。則療淋病者。當注意於肺胃矣。惟病在下焦。肝腎二經。亦不可不研究者也。適時傳一治淋經驗良方。土牛膝四兩。細甘草梢二兩。加鹽少許。水煎空心服。淋通即止。不宜多服。老弱人減半服。其發明云。土牛膝下行之力最大。且有利尿行氣作用。故能直入膀胱。排除濕熱。甘草能除尿道內皮炎。用稍以直達莖中而止痛。加鹽少許者。取其直接引膀胱。迅收掃蕩廓清之功也。必用煎劑者。欲其效力宏遠。也不可多服者。恐其通利過甚也。鄙人謂此方固簡。要不煩。發明亦完全無缺。惟祇堪施於壯實之人。若稍涉虛者。尚

(二)

王子萍

定義 淋者。小便滴澀澀痛也。濁者。暫時不通也。實則同一證耳。古分氣淋。石淋。血淋。膏淋。勞淋五種。

病因 諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也。水火不交。心腎氣鬱。遂使陰陽乖舛。清濁相干。或胃熱飲酒過醉入房。竭散精神。勞傷血氣。或因色興。或敗精不出。或因迷亂而真髓多耗。或驚惶不定。或憂思不寧。或餓飽過時。或奔馳不完。或隱忍大小便。或寒入膀胱。或發泄久興。或暑中胞囊傷偶一不慎。致起斯疾。

證候 (一)氣淋。小便澀滯。餘瀝不盡。以致膀胱滿悶。甚者小便不通。(二)石淋。一名砂淋。臍腹隱痛。小便殊難。莖強痛甚。雖須臾不可忍。小便中下如砂石之類。有大如皂角子者。或亦或白色。澤不定。已溺之後。少少寬快。(三)血淋。血與溲俱下。遇熱則發。燭必澀痛。(四)膏淋。小便中出物若脂膏。故又名肉淋。(五)勞淋。小便淋澀不絕。如水流而不斷。總之諸淋。小便無不澀痛。欲去不去。又來滴滴不斷。此其現象也。又有治淋者。寒客下焦。水道不快。先見寒戰。然後成淋。濁有赤白之分。赤濁帶血而赤。自濁色如甘漿。總之患濁。

者。便時莖中均如刀割火灼。溺自清。惟當歸時。有穢物如落膽目。眵。淋滴不斷。與便溺不相混淆。

治法 (一)氣淋。用炒牛膝五錢。製乳香一錢。酒。養溫服。如氣症。血虛者。宜注意。不如用青皮。甘蔗。上頭青。梢三四兩。酒養溫。服法極佳。而極效也。(二)石淋。宜用海金沙砂五錢。滑石四錢。木通一錢。車前子三錢。煎服。兼進白蜜以利下竅。又用黃魚頭中小骨如石者十枚。煅爲末。滑石五錢。木通一錢。煎湯調服。(三)血淋。用杜牛膝。搗汁冲服。或用白茅根。搗汁飲之。(四)膏淋。用菟絲子。桑螵蛸各等分。澤瀉減半。煎服。(五)勞淋。用胡桃數十枚。每枚用黃泥封固。取火燒之。至泥焦黑。為度。然後擲去泥。搗去其壳。取淨內研細末。早晚用淡鹽湯下三錢。

談談白濁

朱卿榮

緒言 白濁又名淋病。爲花柳病中傳染最易。而流佈最廣。之惡疾也。此症不僅足以危及我個人之健康。且能斷絕生育之能力。近就新醫家調查報告。謂今世之嗣者。若雖多。而因本病造成者。實佔百分之七十以上。其故蓋因生殖器被害。以致不能受孕故也。即幸而成孕。妊娠期滿。其於分娩之時。胎兒經過產道。其產門部之白濁病原菌。甚易侵入胎

兒之眼中而引起白濁性結膜瞼漏眼。三日不治必至失明。遺恨終身。故此症爲患之烈較之梅毒有過之而無不及。洵可畏之亡國病也。

然我國同胞多因鮮有科學智識。每有因本病不發現於身體之外部。莫不以爲在花柳病中係最輕者。加以一般初患者羞愧人知不受醫治。或既受醫治尚未全愈即中途停止受治者。以致遷延時日。急性變爲慢性。輕症變爲重症。病毒升堂入室。痛苦莫甚於此。是時雖欲求治也難乎其難矣。茲特將關係本症之內容分段申述如下。用告讀者諸君深望會之幸焉。

**病原** 本病之發生乃因受染一種細菌所致。此菌名曰白濁雙球菌 Gonococcus 在一八七九年名醫奈沙氏 Neisser 所發。其形狀爲腰式與加非豆相似。喜兩個相對多可於患者分泌物中檢得。查此菌之所以侵入人身。不外下列各種原因爰述如下。

(一)直接之傳染。歐西各國對於娼妓之營業者均派專門醫師一一檢驗。其有患病者立時停止其營業。勒令就醫。候確實痊愈後始准復業。是以本症已日益減少。宜其生產率日高也。反顧吾國各通商巨埠雖妓館林立。然絕未

見政府設有醫師充任檢查之職。即或一二處有之亦大多敷衍塞責。不肯認真。甚有營私舞弊盡醫師人格。故一般官娼私妓什九身罹此症。而我健康者苟一入花叢與患本病之娼妓直接相觸。鮮有能倖免者明矣。

(二)間接之傳染。本病發生原因既屬受染白濁雙球菌所致。故我人如與患本病者同起居。間接共同使用器物(如便桶。尿壺。浴盆。浴巾。襯褲及女子所用之拭尿布等)皆足爲本症病原菌侵入身體之機會也。

**病狀** 白濁因發病之部位各異。男女生殖器之不同。故所現之症狀亦各有別。茲簡述其重要者如後——

我人若受染白濁菌。其潛伏期約二至八日。首先在水道發作。患部漸漸腫脹。開始分泌黃白色之濃液。患者自覺尿道內灼熱疼痛並有搔痒之感。甚屬難堪。尤以小便時痛苦更甚。苟其分泌物減少。則疼痛亦減。如此約持續一二星期。則急性症候已過。而移行爲慢性狀況。分泌日益減少。痛苦亦退。然有時既變成慢性。患者苟稍一勞動或身體失調。則病狀必復發。加險於前。其普通所常見者爲尿道時時出血。(俗稱血淋)尿意頻數。呈裏急後重之感。小便淋漓痛楚極矣。此等病狀乃證明其病毒已由前尿道而侵入後尿道矣。如其爲慢性白濁。則無論其爲前尿道或後尿道。其自覺病

狀得暫時減退。然其傳染之能力却仍存在。苟稍事勞動。則甚易復發。又此時白濁雙球菌居於後尿道。則甚易侵入攝護腺。副睾丸及膀胱等處。而引起各種炎症。請述一二如下。

A 白濁菌如入後尿道。侵入攝護腺。(攝護腺居膀胱之後。直腸之前)。則此腺必呈發炎之狀。腫脹疼痛甚。或化膿。其病狀與後尿道白濁相似。或較凶猛。其慢性者。病灶僅形成一硬塊。自覺之病狀不著。

E 白濁菌如不侵攝護腺。而侵副睾丸時。則誘發白濁性之睪丸炎。(俗人多誤認爲疝氣)。其副睾丸一個或兩個同時腫脹並疼痛甚劇。

C 苛白濁菌侵及膀胱。則發膀胱白濁。此症與後尿道白濁相似。惟尿較混濁。

患白濁而併發此等複雜病變時。則病原更爲深在。不易治愈矣。

#### 女子之白濁症狀。

女子之患尿道白濁者。其病狀與男子相仿。然因女子尿道短而寬。故其自覺症候自較輕。而其自然痊愈亦較容易耳。又女子之患子宮白濁者甚多。此症大多由於患本病之男子直接交媾而來。然亦有自尿道白濁繼發而來。其病狀頗凶。初起全身發惡寒。繼之以熱頭痛。恶心嘔吐。以及下腹部

有牽引樣疼痛。患者多坐臥不安。其分泌物甚多。往往惹發外陰部疾患。有發病之一二星期以內。病狀最凶。一待四星期過去。則各病狀減退。熱度亦下降。疼痛不作。患者乃不自覺痛苦。惟時時分泌黃綠色之黏液。經期不正。經水既減。其下腹部與薦骨部及盆骨等處之疼痛仍稽稽不去。如病勢不退。則引起喇叭管及卵巢病。其下腹疼痛加劇。恶心嘔吐。發寒發熱之病狀又作。危險尤甚。

#### 男女白濁共有之病狀

患本病者。其病原菌往往自泌尿器轉移。侵入身體某部之關節。而引起一二關節炎。當其發病之初。受侵之關節腫脹。疼痛甚劇。日有寒熱等全身症候。此時舉動障礙。患者非臥床不可。此症極難治。苟醫療不當。保養失宜。則甚易使患者之關節強直。運動障礙。乃成殘廢。殆恨終身。洵可畏懼之疾患也。又患白濁者。男子易惹起陽萎。滑精等症。女子則子宮卵巢受害。以致雙方缺乏生產之可能。斷絕子嗣。世之悲傷痛心之事。孰有甚於此者。又此菌如侵入眼內。則誘發白濁性眼漏眼。平常多發見於初生兒。大概因產生時。經過產道。染着此菌。而一般舊式產婆。又不知施行正當之洗眼點眼等療法所起。成人之受染。大多爲不潔之手帕或手指帶病菌入眼所起。病初起時。眼結膜極度腫脹。眼分泌頗爲旺盛。

盛。疹。痛。亦。甚。烈。苟。病。灶。已。延。及。角。膜。虹。彩。則。兼。有。劇。烈。之。頭。痛。疹。有。盲。目。之。虞。不。可。不。知。也。

預防。自。濁。的。預。防。法。與。梅。毒。大。同。小。異。可。大。別。為。公。衆。預。防。法。及。個。人。預。防。法。然。其。公。衆。預。防。法。乃。屬。行。政。範。圍。以。內。之。事。故。暫。略。之。茲。謹。述。其。個。人。方。面。之。預。防。法。如。下。——

A 遠。離。不。正。當。之。交。接。機。關。如。妓。院。賭。場。酒。館。等。處。蓋。此。類。場。所。多。好。色。樂。淫。之。徒。膚。聚。受。染。之。機。會。極。多。也。

B 絶。對。禁。止。不。潔。之。交。媾。如。已。身。犯。不。潔。之。交。媾。者。宜。立。時。放。尿。並。用。消。毒。藥。水。洗。滌。陰。部。又。醉。前。大。醉。之。時。交。媾。兩。性。

皆。必。有。熱。烈。之。互。相。擁。抱。甚。易。感。染。病。毒。又。交。媾。中。止。及。射。

精。後。陰。莖。長。時。間。留。於。膀。胱。均。為。其。誘。因。須。嚴。禁。

C 女。子。交。媾。後。亦。宜。立。時。放。尿。並。用。二。百。倍。之。來。蘇。溶。液。洗。滌。其。陰。部。及。用。三。%。之。硝。酸。銀。水。或。普。太。哥。溶。液。二。三。滴。滴。入。陰。道。內。部。然。後。用。黏。有。消。毒。藥。之。糊。滯。包。裹。之。

D 男。性。之。患。包。莖。者。應。於。未。成。年。以。前。為。其。父。母。者。當。負。請。醫。師。為。之。割。治。蓋。有。包。莖。之。人。交。媾。之。後。切。污。物。多。停。積。於。皮。內。而。甚。易。受。染。也。

E 普。通。浴。室。之。浴。盆。浴。布。浴。衣。等。皆。為。本。病。間。接。之。傳。染。物。此。種。地。方。最。好。勿。與。之。來。往。公。共。場。所。之。手。巾。亦。極。危。險。切。勿。亂。用。

F 公。共。廁。所。之。門。扭。及。其。附。屬。之。器。物。時。有。白。濁。菌。附。着。或。因。其。他。原。因。手。指。未。免。不。潔。故。不。可。直。接。與。生。殖。器。相。觸。或。揩。拭。眼。目。以。免。受。染。

G 至。嬰。兒。之。初。生。時。不。論。其。母。體。是。否。本。病。之。患。者。皆。宜。以。溶。足。之。硼。酸。水。清。洗。兩。眼。並。須。銀。氯。強。礬。水。點。眼。先。事。預。防。

H 治。法。白。濁。一。症。其。受。染。之。易。為。害。之。深。須。防。之。難。已。如。上。述。矣。然。我。人。苟。偶。爾。不。幸。受。染。斯。疾。則。其。治。療。之。法。安。可。不。略。知。一。二。乎。

I 按。此。症。之。治。法。除。嚴。守。衛。生。法。外。尚。有。洗。滌。內。服。注。射。三。法。欲。求。治。愈。非。同。時。合。拚。施。治。不。可。爰。分。述。如。后。——

J 一。衛。生。法。白。濁。之。治。法。首。重。衛。生。蓋。如。僅。注。重。下。述。三。法。而。忽。略。此。法。則。必。事。倍。功。半。考。患。本。症。者。不。可。過。勞。宜。絕。對。靜。臥。勿。動。其。所。食。之。物。品。亦。宜。選。擇。富。於。滋。養。性。而。易。於。消。化。者。富。於。脂。肪。性。及。刺。激。性。之。食。物。如。豬。肉。烟。酒。辣。椒。生。薑。胡。椒。之。類。概。宜。禁。絕。不。食。又。對。於。房。事。亦。絕。對。不。可。再。行。此。其。大。略。也。

K 二。洗。滌。療。法。乃。用。一。種。器。具。將。藥。水。灌。注。於。尿。道。內。以。之。清。洗。尿。道。也。洗。滌。前。須。先。小。便。注。藥。次。數。每。日。三。四。次。至。六。七。次。所。用。之。洗。藥。普。通。多。用。二。百。倍。之。來。蘇。溶。液。Solu-

Lysol 1——200倍百倍之硝酸銀溶液 Solution Silver Nitrate 1——500倍千倍之海苔農溶液 Solution Hego non 1——2000以及普太哥 Profargol 艾爾敗近 Alberg in 硫酸銻 Ganz Sulfur 鐵鑄養 Potassii Permagum 等。然本療法不適於急症者。

三、注射療法 白濁之用注射療法實為近代最常用而普遍之一法。也在急症者多用色素注射。如天德之脫呂帕弗拉文。民生之脫離帕淋。立興之果乃克淋。新亞之果能克淋等。其他仇貨亦有數種。(想敵人因其仇貨而不介紹其品名)均能藥到病除而在慢性之白濁則實用乏克辛注射尤以發合併症時如副睾丸炎。關節炎等發生時為宜。其普通者如先靈之阿爾梯共及天德之果乃金等均奏有特效。四內服療法 以上洗滌及注射二療法概為醫生行使之職權。而我常人不得自行療治。今欲自行療治除內服外實無別法。然近市上治淋之藥日出不窮。其中良莠不齊。故選擇甚困難。恐不一一列舉矣。

## 口急性白濁驗方選

尤學周

男女行房忍精不洩。或無力行房。勉強敷衍。或吞服春藥。以加性慾。皆易造成白濁之病。又於洩精之時。感受驚恐。或受

意外之刺激。其精將洩未洩。精門已開。留於中途。或身體衰弱。房事過度。元陽虛損。精門不閉。亦足以讓成白濁。緣上述諸端皆精不暢洩。留滯精管。久則腐化而下。成為白濁。近日青年之患白濁者甚多。其原因什九由宿娼時傳染而來。為花柳病之一種。

白濤初發時。龜頭上有一種不適之感覺。馬眼中。有白膩之物。時時流出。溺便時。尿道內稍覺微痛。一二日後。即覺梗塞。溺時作痛異常。且尿意頻頻。而又不爽。馬眼中之白膩物。愈增愈盛。漸泛黃色。間有出血者。龜頭有紅腫而爛者。夜間往往陰莖勃起。發劇痛致不能安眠。或引起遺精。此即急症白濁之現象。大約白濁初發。多為急症。失治。則延為慢性。急症白濁治法。第一務須利溼下濁。使精管宿穢排除。蓋淨。第二須注意清潔。使濁液不傳染於他處。則病根可絕。本病之治方甚多。其效最捷者。莫如用牛膝根(至少一兩)搗汁。陳酒沖服。其效甚速。如再加麝香少許。尤佳。服後小便爽利。痛亦減退。再用石蓮子錢半。麥門冬一錢。九節菖蒲七分。福澤瀉一錢。生甘草五分。赤茯苓六錢。辰燈心三札。煎服。可以漸次平復。

青年宜絕足此途。萬勿受慾情之驅使。爲無恥蕩婦所惑。未犯者謹防失足。已犯者切勿再犯。若一誤再誤。則傳染愈烈。未病根亦愈深。噬臍與嘔悔無及矣。

## ■慢性淋病之危險

壽筠

世人雖大多知道慢性淋病的難治。但是沒有知道慢性淋病有怎樣的危險。往往放任著不加醫治。如果知道了有下面的危險。吾想大家必定早去醫治了。

### (一)急姓再發

世人以爲淋病的急性症候經過了。從此可以太平無事。就沒有危險。這是一種很錯誤的觀念。原來不把淋病醫治斷根之後。就是你永遠不去尋花問柳。但是潛伏的淋菌仍舊可以急性的發作起來。這就叫做再發。

### (二)急姓合併症的出現

尿道裏有了潛伏的淋菌。不但損害尿道。還可以隨時作祟。侵犯鄰近和遠隔的臟器。譬如侵及到睾丸。發急性睾丸炎。轉移到關節和心臟。發生急性關節炎和心臟炎。都是有很大的痛苦和危險。

### (三)狹窄的形成

尿道受著淋菌的侵及柔軟的粘膜。就結成了硬固的瘢痕。因瘢痕的收縮。引起尿道的狹窄。尿道狹窄的結果。使病人不能排尿。有因此引起尿中毒膀胱破裂。腹膜炎等等的危險病症。

### (四)有傳染於對手方的險危

歡樂健康的家庭。因爲一方受著淋菌的侵及。已經著很大的痛苦。一方面又要傳染給一個無辜的愛妻。也使他受著很大的痛苦。歡樂健康的家庭。就此打破。充滿了愁雲慘淡的空氣。吾知道受過了這樣痛苦的人。方才明白吾的話呢。

## ■老白濁

存

白濁久之。積年既多。欲求治愈。實爲難事。蓋有一種頑性白濁。實際上確實無斷根之可能。此種頑性白濁症。患者必係腎部衰弱已達極度。患濁久之。腎部愈虛。腎部愈虛。則白濁愈爲纏綿不盡。相互爲因。相互爲果。乃成爲局部治療之白濁症。腎虧者。虛火未有不旺。濕熱未有不盛。醫治者。若治標

不治其本。一見濕熱。亟爲利濕。故無論洗射針藥。皆不見效。即有小效者。亦斷無斷根之可能。患此病者。欲治此症。應先知此原理。若抱『斷根』之奢望。則將永淪於痛苦之境地。

治之之法。第一應先求腎部之強健。恢復膀胱之蒸化能力。『育陰清化』乃唯一治本之法。宜忌酒少行路。一面當服

下列藥方。不求立時見效。但圖腎部強健。則白濁發生之次數。日益減少。身體日見康強。身體日漸康強。則白濁發生之次數。亦日益減少。其初約服藥一月。其後每逢天氣潮濕。或遇於勞動之後。及節令氣候變遷之際。服藥三五劑。則其初之一二年。本發七八次者。可減爲三五次。其後三五年。猶須發一二二次。久則可使三五年僅發一二次。若每年本發一二次者。則見效更易。然此乃慢性根本治法。絕非妄言斷根之空談。愚曰。白濁久者。其亦一試『中國藥物』。慢性根治之特長乎。(下方係適合一般人進服之方劑。無力就醫者。先服三劑。苟其人非有其他特殊情形。則服之全無不適。可日服一步之治法。以求避免流弊。而收全功。)

元武板四錢。雲茯苓三錢。威靈仙錢半。京元參三錢。山萸肉二錢。黃柏炭八分。大生地五錢。淮山藥三錢。鑽地風一錢。潼蒺藜三錢。

## ■ 老白濁治方

問：振聲大醫士台鑒。讀

尊輯百病秘方。搜羅宏博。立說詳明。曷勝欽佩。中有治老白濁一條。用豬脊髓兩條。用酒沖洗。豆漿送服。又。膏尾復有尊案。醫方亦用是項脊髓之法。所謂脊髓兩條。長應若干。是否生吞酒洗。是否有別於酒浸手續如何。若用牛乳代豆漿。亦無妨否。應服幾日。多服有無流弊。不揣冒昧。足以奉告。伏乞不吝教益。幸甚。(封君)

## ■ 傳染白濁

問：鄙人前由朋友之介紹。識一女友。經過數月友誼。因探得其人尙屬溫和持重。故由友誼進而于上月初始有肉體關係。初尚相安無事。毫無所覺。毫無他異。不料日前。鄙人忽然發生白濁一症。其初惟覺刺癢。繼即見白濁點滴。小便略痛。更甚。且尿管內以手按之。覺有無數小粒散布。而挾之則

覺痛。因想白濁乃花柳場中與不潔女子接觸方有此患。更據友人說謂體虛亦有白濁之患。今特請問照鄙人所述痛苦情形。此項白濁是否該女不潔所致。抑係體虛所致。然據一般人說體虛白濁並無若何痛苦。茲問體虛與有毒者其症狀有否分別。最近鄙人在購服市上所售的(藥的能)治濁藥。然服之亦未見效。未知此藥有否妨害之處。亦請賜教。

答 據函述足下所患確係花柳性之白濁。非體虛也。該女子既溫和持重。諒無惡疾之傳染。足下所患是否由與該女一度春風而來。甚難斷定。安可妄加猜測。以損人名譽。白濁初起。當投解毒利水之品。川草薢五錢。川黃柏三錢。肥知母三錢。炒銀花三錢。潼木通三錢。海金沙(包)四錢。赤茯苓三錢。木猪苓二錢。飛滑石四錢。甘草稍二錢。

## 口忍精不洩與淋濁

仁航

陰莖由慾念而勃起。由勃起而摩擦而酣暢。由酣暢而洩精。是自然一定之理。而不能稍有違反者。世有狂徒之子。恒於當將洩之時。故抑頓而熬忍之。令精液緩洩。以圖時間之延長。而暢其如火之貪慾。詎知此類違反自然之理。每因之而起重大之疾病。如淋病即其一也。苟與妓女交接而強忍圖。

入發病尤易。蓋當未經發洩之前。其膿液汚水已侵蝕流入尿管。迨精放洩。遂逆精之力。帶出於外。不然。因精蓄積之故。侵入更進。至放洩時。又不能大暢。病遂發生也。

## 口白濁與疝氣

方修進

白濁愈後。每發疝氣。此症與平常發者不同。其人在曰濁之際。必服檀香油丸劑。而愈餘濕。餘毒潛伏。十九皆發為疝氣。此種疝氣與普通疝氣微有不同。治法亦不同。此疝初發時。往往因步行過勞。或受寒冷。或久坐寒濕之處。初起。睾丸腫大。硬而疼痛。繼則睾丸日益石硬。且有硬底。則消化甚難。須初起。當投解毒利水之品。川草薢五錢。川黃柏三錢。肥知母三錢。炒銀花三錢。潼木通三錢。海金沙(包)四錢。赤茯苓三錢。木猪苓二錢。飛滑石四錢。甘草稍二錢。

內服方

柴胡稍三分	金鉢子一錢	延胡索二錢	荔枝核三錢
粉草薢三錢	塊滑石三錢	通天草錢半	陳橘核八枚
小茴香五分			

車前子三錢包

薰洗方

以紫蘇葉四錢。荔枝核五錢。紅花一錢。煎水待沸。傾入脚盆。初時以其熱氣薰蒸睾丸。待水溫時。以水乘熱洗之。水將冷時。即以水重煮。再薰再洗。二日後。睾丸漸軟。漸小。其病漸愈。此症如用刀割之法。仍有復發之虞。寒氣重而腎陽不振者。

上列藥方猶欠平淡。應酌用附塊炮薑之類。若久有此患而氣虛下墮者。應酌用潞黨黃芪之類。惟總須兼用導濕去濁之品。始克有效。

## □淋病治案

凌鏡清

治病之道千變萬化。所謂活法在人。經云其高者因而越之。在下者引而竭之。此成法也。又曰。上病下取。下病上取。此活法也。故爲醫治病必須活法。從心隨機應變。然後無刻舟求劍。膠柱鼓瑟之訛。予向曾治一淋症。以修園上竅通下竅泄二語爲訓。以紫苑知母貝母杏仁滑石阿膠桑子牛膝等爲劑。與服。越日見其人來覆診。行步蹣跚。甚覺艱窘。慮其或有變化。比及問之。即云昨晚七八句鐘服藥。至夜半欲小解。難澁而不得行。而小腹亦復脹。甚乃用力努排。造小水欲行。眼中火星迸出。溺管痛極難堪。及至便通。初爲血水。總則盡爲水泡。稠如麥粥。不下數百夥。盪漾其中。便迄腹中之氣順寬。五更左右再下一二次。其血水水泡稍稀。尿道便不如前之痛。因昨夜有此痛苦。今晨行路是以有此不便也。一劑水藥。其効如此。豈非肺爲水之上源。而又主氣。淋爲水道不利。其不利又爲上焦之氣不化。經所謂膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。故古人治此多以五苓八正二方爲主。其

人前此未經予治。而先服他人之藥。如二方者。不知凡幾。在處方者。何嘗不曰。吾按法而施。豈非知其然而不知其所以然。尙少一番斟酌乎。是法也。修園謂須以麻杏甘石湯。馬元儀謂宜紫苑湯。吾依馬氏之言。略爲增減。果爾成功。蓋以所用諸藥。較爲甘涼柔潤。取其滑澤。易於下行。居然從心所欲。不踰距。驗其所下水泡。蓋欲作砂琳。在腹未久。相煉熬火未透。未曾成形。故能得氣化一湧而出。如其日久。一經成形。便非如此易也。後驗知其症。初由花柳而來。即於原方中。再以土茯銀花。知母黃柏。以解其腎命門之火毒。遂以功收。

## 楊梅毒瘡

鴻盛

## ■妬精瘡

病因。此屬手足太陽經不利。熱毒下傳。入於足厥陰經。因而發生。或因久曠房事。思色動慾。以致敗精流入莖內。或由腎虛風濕相搏。邪氣乘之。亦能患此。證候。初發形如粟粒。赤腫潰爛。作血痛癰。妨肉。其痛或在莖之旁。或在莖之標。久之變紫黑色。漸成融瘡。毀其莖而死。別有一種搔癩成瘡。浸淫汁出。盡是黃水。久則狀如乾癬。治法。宜以子和泄水丸散導濕毒。無不愈者。若已成瘡。先

泄其根。次從標而治。外以葱白黑豆汁潔洗拭乾。以黃連木香蜜陀僧乾胭脂之類細末擦之。如內潰瘍不出。以追膜散上之。又用子和泄水丸。如後潰瘍少。可用黃連木香胭脂等貼之。

## 處方

(一) 茯苓補心湯 治一切妬精陰瘡。白茯苓乾葛前胡桔梗甘草陳皮白芍紫蘇人參半夏當歸熟地川芎枳殼薑三片棗二枚燈心二十莖水二鐘煎服。

(二) 陰瘡膏 治男女陰瘡。米粉一酒杯芍藥黃芩牡蠣附子白芷各七錢半。上藥入猪膏一斤微火上煎三上三下候。白芷黃膏成綫去渣。納白紙和勻取敷瘡上。

## 楊梅瘡

魏步寬

攷西歷千四百九十三年。西班牙師征印度馬提島。士卒染徽毒病。不數年已遍傳歐洲。至一千七百年間。(即明弘治末年)葡萄牙人航海入廣東與我國互市。自是徽毒遂侵入中國。愈辨續醫說云。明弘治末年民間患惡瘡。自廣東人始。吳人不識。呼爲廣瘡。又以其形似謂以楊梅瘡。近此瘡已遍傳國內。患者極衆。貽害較前益烈。我國遂不幸有徽毒國之稱焉。查楊梅瘡初起者易治。若誤服輕粉水銀悍劑。妄希速效。致毒邪深入骨髓。積久外攻。而見牙根腐爛出血。始吳人不識。呼爲廣瘡。又以其形似謂以楊梅瘡。

## 梅毒之治療觀

秦慎安

及喉內腐痛結塊腫硬等症者。名結毒倒發。如醫者不察其病原而加以適當治療。鮮有不誤人命者。特述治驗數則如下。

(一) 壬申春。阜甯吳少青淋濁愈後。牙根潰爛出血。遍服清熱養陰藥不效。乞先君治之。當用牛黃珍珠冰片各一錢。石鍊乳二錢。辰砂三錢。琥珀四錢。共爲末。入飛麵綠豆粉各二兩研和勻。每服一錢。土茯苓煎湯和服。以清其餘毒。服一料而即痊。(二) 揚州汪某。患喉內腐痛。延喉科診治不應。乃聘予叔蔭塘往診。予叔詢其致病之因。係由下疳愈後。毒邪上攻所致。當令服九龍丹。以急瀉其毒。再服歸靈內託散加減。以清餘氣而愈。(三) 辛酉秋。淮揚鎮守使署一顧問官之公子來。余處診病。其護兵某甲。患兩腿腫硬結塊。破流污水甚多。外調治經年終未收口。因託其主人轉懇予爲擬一方。予疑是症必有異。詢之果起於楊梅瘡後。即用銀花甘草石決明苡仁木瓜木通土茯苓等敗毒之品。兼服四聖後煎丸亦逾月而瘥。

有患者。故其症名不顯。自清咸同而後。西風東漸。男女競言自由道徧云亡。逾閏蕩檢。士大夫以不正當之交合。竟視爲常事。淫風大肆。未有甚於此時者也。

前人治此症者。曾用以毒攻之法。砒石輕粉水銀大五虎小五虎升降諸丹。種種劫劑。效甚速而遺害無窮。幾經研究。不用此等毒質。亦可斷根。但功慢而無流弊。近以西藥盛行。所用有名之藥。何嘗非砒汞類之藥。爲主要。雖云提煉純淨。金屬毒質無疑。製爲藥針。注入血內。與內服實無絲毫之異。華人好奇。并不知其藥何質。但求速效。即明知其毒而不顧。不知此等毒藥。乃中國經過而不用者。乃暫時壓制不即發耳。絕非根本之治療也。復發一次。病深一次。斷無不復發之理。或者西人體強。有抵抗毒質能力。而不復發者。容或有之。華人體弱。必然復發。如現今有名之九一四之治法。必須注射一全劑(即十針)後。陸續驗血。須二三年。尙不能決定。不論餘毒(見天德藥廠良藥提要)。如未愈。仍須繼續注射。乃至之華人。遇有梅毒者。打一二針。竟不知是何功效。豈非盲從之尤者乎。且每針之價。必須數元。較之華藥。豈止倍蓰。又如果乃金爲治白濁之聖藥。查其宣言。乃用各種不同之白濁齒所製成。蓋其用意。無非亦如我國往昔用毒攻毒之法。可以直達病所。乃用者欲求速效。全不思及此。多數不同白濁

菌。不得謂非極污穢之物。浸入我寶貴之身。新病即許暫愈。又不能保不再復發。而此無量數之毒物。留於我之血中。如何排而去之。或逕聽其存留。將來同朽化乎。抑或死菌與活菌。相角逐而自去耶。又何能不生變化乎。不知用者。曾一慮及此否。中醫治此。雖屬功慢。然斷不肯用此猛毒之品。以留後患也。人生誰不愛其身體。古以一朝失足。追悔已遲。乃又受此藥物之害。真可爲長太息者矣。此種妙藥。只可施之於體質不同之西人。決不可用於我華人者也。焉得患此者而遍告也。

現在解放之聲愈高。男女防閑。已成爲一種失禮名詞。行見梅毒之症。必將蔓延全國。(兩精相遇。即是梅毒敗精。必須一來復方能流盡)。僕恐即有滅種之慘。尚望海內同道。急起研究一種無毒質而能治此症之專藥。廣爲傳播。救人即所以救其子若孫。不禁歎予禱之矣。

### ■ 治梅毒方

金蘊齋

余於梅毒一症。治驗甚多。久欲公諸同道。不但藥無毒質。專治七十二種梅毒。並治梅毒服過輕粉之人。發生各種病症。且可保治愈之後。生兒育女。如從未生過梅毒之人。一般不遇收效稍緩。誠恐同道未能堅信。不敢宣佈。非敢視爲祕傳。

如同道能深信余言。請試用即知其驗。此藥治梅毒只要兩個星期全愈。謹將用方次第開明以廣其傳。梅毒開始用九龍丹以熱水吞服九粒必瀉二三次去其火毒。如未瀉至三次再服九粒瀉至二三次即止服。

次用通仙五寶散。

石鍾乳粉三分。劈丹砂二分。琥珀五厘。冰片五厘。

碎珍珠二厘五毫。

共爲細末。另加飛白麵粉炒黃三錢合

上藥末和勻作一料。分作十二小包。每日清晨用土茯苓四

兩煎水十二碗。清晨用土茯苓水一碗。用五寶散一小包。冲

下攪匀。溫服。其餘十一碗。土茯苓水不要用五寶散加入。只

當茶水服不可另服茶水。一日服盡。第二日清晨又用五寶

散一包。煎土茯苓四兩水十二碗。如前如此至十二日。服完

一料即愈。如毒重未全愈。再依前法服一料。無不愈者。但切

要叮囑生毒之人多服土茯苓水。不可吃別的茶水。如少服

土茯苓水。吃了別茶水就減了藥力。此藥是要把筋骨及一

身火毒從小便流出來。並不發生口流涎腫痛苦。真正乃仙

丹服此藥忌食鵝肉。魚腥。炒辣椒。生姜。酒房事。藥完

病愈不急。此方治七十二種梅毒。併治人生過梅毒。繇花天

地。或筋骨疼痛。舉發無時。或遍身生瘡。不消。或手足皴破

出血。或遍身起皮發癩。好一層又起一層。或赤白齷鴟掌風。癬。或皮好骨爛。口臭難當。及年久臙瘡不愈。或淋症與一切頑瘡惡症。皆經余用此方治。百發百中。但除火盛之楊梅瘡外。開始不必服九龍丹。真天下古今第一仙丹也。幸勿輕視。

如紅腫未破爛或已破爛。外用解毒紫金膏。

明淨老松香。礬紅等分研細末。麻油調塗。紙蓋住。繫。

## ■梅毒之特效藥

葉橘泉

徵瘡。一名梅瘡。係由傳染梅毒而來。其傳染之途徑。固以生殖器部分直接行不潔之交媾而致。爲最多。然由間接傳染者亦復不少。如醫療之器械。及衣服被褥。均能傳播。又有先天梅毒。乃由祖若父母患有本病而遺傳。及於子孫者也。其證狀。往往於陰部發生硬結。繼變潰瘍。並於皮膚發現斑疹。色紅。而稍稍隆起。多見於頭部髮際。及背部四肢。此外又有發水泡。疹。膿。胞。粟粒疹。然不搔癢。且鼠蹊腺等腫硬。頭痛。眼球疼。痛。筋骨痛。咽喉及肛門粘膜糜爛。有發於腦脊髓者。現神經證狀之麻痺。狂半身不遂。癲癇等。本症之療法。如沃度劑。求劑等。雖爲合理。但祇能奏效於初期。設病至第三期。即素稱特效藥之「六〇六」、「九一四」等。恐亦無濟於事。

耳。若於初期間用土茯苓為排毒療法，應具著效。著者嘗經實驗，其功用不下於汞碘也。考土茯苓植物名彙載為百合科植物之山歸來，乃常綠攀登植物。其根狀如葵葉而圓，其肉軟可生啖，為變質劑之改血藥，發汗利尿藥，且能緩和酷厲委，故其功用有清血排毒之效。治肢節痛，經久污穢之潰瘍，瘡毒，楊梅毒之滯留於血脈筋骨間者，頗效。荷蘭藥鏡『薩苔排毒煎』，用薩爾沙根二盎斯，土茯苓一盎斯，朴窟福鳥篤四錢，甘草六錢，右剉細浸水八磅，煎至三磅，加薩撒弗刺斯，剉三錢，攪待冷布攏過，治梅毒泛漫血中，尚未潛結諸骨者，極效。『服量』本品性緩弱，非多服不見效，每次一盎斯，或益半加水五六磅，煎至三分之一服之，或加入其他排毒劑內服之。

## ■楊梅瘡塗方

### 杏仁五錢，輕粉一錢，硃砂五分，共研末，同猪脂調塗即愈。

### ■治花柳症不用毒藥之經驗

徐世華

花柳之症，近時醫家或以薰法，或以藥丸，或採西法用六九一四注射，治法多端，大都以毒攻毒，即時雖或有效，亦

必變生他症，或愈復發。推原其故，皆因或用輕粉，或用紅粉，其餘藥味亦皆多屬毒藥，藥之毒質，留於皮肉筋骨之間，為害更烈。至於婦人不僅若是，一經醫治，往往陷身於不孕，深瘻，楊梅毒之滯留於血脈筋骨間者，頗效。荷蘭藥鏡『薩苔

苔排毒煎』，用薩爾沙根二盎斯，土茯苓一盎斯，朴窟福鳥篤四錢，甘草六錢，右剉細浸水八磅，煎至三磅，加薩撒弗刺斯，剉三錢，攪待冷布攏過，治梅毒泛漫血中，尚未潛結諸骨者，極效。『服量』本品性緩弱，非多服不見效，每次一盎斯，或益半加水五六磅，煎至三分之一服之，或加入其他排毒劑內服之。

## 外科

### ■癩痢頭

癩痢頭，一名肥瘡，初起頭部奇癢，流水，久則髮落腥臭。此係風熱侵入血分，聚而生蟲，蛀食髮根，當用鮮豬肚一只，白信石二分，用水煮熟，乘熱將豬肚套在頭上，待肚冷後去之，蓋

蟲聞香味。盡行外出。食飽即死。然後再用陳蠟燭油擦之。能生髮如初。

### ■ 痘腮特效藥

痄腮。平潭俗名猪牙癧。生於耳下兩腮。以腫刺痛。或發熱惡寒。或牽引頭痛。潭人以青靛化調醋塗抹。或有用生南星磨醋。時時抹之。內服葛根牛蒡板蘭根銀翹煎湯。服效驗如神。經余歷見頗多。誠治痄腮之特效藥也。

(按)生南星及青靛皆有消散之效。葛根板蘭根等。又有清熱之能。痄腮一症。多由熱毒內蘊而起。此法內清外散。故有特效。

### ■ 治肉癩法

予讀鑄花錄。內載治肉癩法。以青銅錢一個。拗於癩上。用黃表紙捻成團。如圓核大。放錢孔拗出肉癩頂上。灸之。如痛不妨。少緩再灸。一日灸三壯。子弟手生千日瘡。以此法試。並未用。團乃用艾炷。如麥大。灸之六壯。四圍生膜。連根脫落。後治別人亦效。

### ■ 上婆癰

形如水泡。如有發生。宜急速醫治。否則傳毒頗易。一觸即發。

本病患於面頰兩部。豐滿而肥。不須延醫診視。惟用剝刀燒在熱油的釜中。離患部寸許。將剝刀運轉。日必數起。自能痊愈。平復。

### ■ 口角生瘡

口是人生表觀言和食的第一要。管兩角患瘡。頗感不便。每啓唇時。偶或不慎。那末瘡裂出血。宜用燕子的巢。連泥帶糞。研成細末。和麻油調敷可愈。

### ■ 無名腫毒初起治法

用生鷄子清。不拘數。調和真葛豆粉成濃糊。依瘡腫面積。浸透之。乾時則以冷水頻濡之。次日以沸湯洗去。再塗二三次。自消。

### ■ 黃水瘡效方

用花椒三五錢。熬水洗去膿痂。再以陳石灰研極細。篩過。香油調塗瘡痕。次日仍用花椒水洗。數日自癒。

### ■ 天泡瘡

用靛青和冰片少許塗於患處。或用蠶豆殼灰。菜油調敷。立愈。

口治癬效方

尤學周

■ 脘中流水

朱子語類

癬小疾也。人有自道其病證之輕微者，輒以癬疥喻之。然癬雖小事失治亦頗難堪。昔曾文正公據此疾患，良爲憾恨。於家書可以見之。此證用西醫治癬之藥亦無大效。今有一方，頗爲靈驗。茲錄之於下。

靈驗方：斑蝥三十個，蟾酥三錢，土槿皮五錢，白附子三錢，膽礬三錢。研極細末，以好燒酒固塞浸之。三月後以新筆蘸塗三四遍，日夜三四塗。覺微辣癢，六七日斷根。或起泡出水，則愈更速，不損皮膚也。

漆瘡治法

邵叫飛

此症木形人患者最多。發無定處。初則搔癢。抓之則形似抽皮。日久則潰爛如黃水瘡。然初用皂礬無名異水煎洗。又黃柏。兒茶。水粉。硃砂。各等分共研細。末麻油調抹。甚效。若身有發熱。宜服化班解毒湯去人中。責方即升麻石膏。連翹牛蒡甘草黃連知母元參水煎服。

先生費掉寶貴的時刻與精神來答復我這小子的難題。  
——我的病因是爲了什麼而來的。

萬有醫庫

三八三

- 二 我臍內流出的膿不似膿水不似水的物。是從何處來的或生的。
- 三 我的臍口還能結得如傍人一樣嗎。
- 四 長此下去有發生何種變化嗎。
- 五 我的腹內還有別的病症嗎。因為腹內是不覺得什麼的。

還要請

諸位先生賜以病名及治方那就感德無涯了。(陳煥情)

- 答一 你的病大約因搔癢時由指爪上帶入不潔的東西而起的。或者在沐浴時候侵入汙水的緣故。
- 二 那種似膿非膿的東西。因污物侵入臍孔。即發炎化膿而來。
- 三 痘去後可以復原。
- 四 終以早日治愈為佳。久則蔓延入內部。發生其他病症。

五 現在腹內既然不覺什麼。當然沒有病症。

本症治法可用韭菜葉。扁柏葉二味共搗取汁一酒杯。加蜜研細末。加蠟燭油四錢。豬油一兩。共和分七塊。每日貼一塊。便一茶杯蒸熱服。外用蘆甘石用好醋泡一晝夜。瓦上焙乾。研末敷。

疥瘡小疾也。然患之者纏綿不已。奇癢難堪。且惹人厭。取蠅蛆數十。乾置玻璃中。數日即化水。再取綿紋大黃切片浸蝨蚪所化之水中。數小時取出晒燥。再浸再晒。三次後儲以待用。遇有患疥瘡者。即將大黃三片研開水吞下。數次即愈。又方。枯礬二錢。東丹二分。烟膠一分。銅綠二分。雄黃二分。共研細末。用生豬油搗之。塗於瘡上。

## 疥瘡神效方

### 濟瘡奇方

### 消疥丸

消疥丸。治疥如神。用苦參。白芷。薑皮各一兩。枳壳。連翹。羌活。

山梔當歸荆芥各三錢共爲末蜜丸梧子大每服五十九食後白湯下。

## ■ 瘰癩結核

瘰癩結核初起宜消散用大戟芫花三錢莪朶各二錢海浮石三錢共爲末蜜水擦敷即消。

## ■ 瘰癩初起

鄙人於去年秋間遭危險之跌撲愈後左右耳前右耳後左額下皆起環小之核雖經十月不甚進展此是否瘰癩抑或血弱所致祈賜良方(鄒進德)答此係瘰癩之初徵乃體質虧弱之故與跌撲無關宜服滋養之品以增加其抵抗力可常服魚肝油。

## ■ 貼凍瘡

天寒之日人之手足耳邊易生凍瘡如覺紅腫癢痛即刻辣茄皮貼上即愈。(接)辣茄味辛性大熱能祛風行血散寒導滯故貼在凍瘡上可以使血不凝滯也但祇宜用於凍瘡初起之時若日久已潰者則不宜貼此矣。

凍瘡初起宜用蘿蔔剝空瀝入蠟燭油放在炭火上滾數沸俟稍冷擦患處即愈。

## ■ 凍瘡膏之討論

薛定華

凍瘡一症多見於冬季因嚴冬之時外界空氣寒冷耳及四肢時受刺激皮下組織起異常狀態則血行障礙微管鬱血則凍瘡成矣故初起之時鬱血部分發生水庖(皮膚粗糙之部屢生戰裂而出血)皆由鬱血更滲出而起呈腫脹狀甚則成爲潰瘍也然因余對於是問題早存疑問也其動機發生于醫藥研究會製藥組試製凍瘡膏時以松香黃柏同麻油煎熬而成爲治已潰凍瘡之外敷劑當時許多同道談及某先生有至驗凍瘡膏之秘方每年製成施送結果非常靈驗但未知以何藥配成據云方以涼性藥不以溫藥也余聞之後多方參攷終未有見以涼藥治凍瘡也近據友人潘君告示凍瘡膏一方是方乃他家所秘傳其配伍皆用涼藥外敷治凍瘡發炎腫痛頗有效驗余喜而錄之以供諸同學之研究也方列后。

## ■ 凍瘡膏

側柏三兩黃柏二兩苦根二兩棟樹果二兩冬瓜皮三兩梅片三錢川連一兩連翹二兩甘遂二兩

黃芩二兩 甘草一兩 五倍子一兩  
右味共研極細末。勿氣洩。加陳黃酒少許。麻油調外敷。治凍瘡。瘡亦疼痛或潰爛。

是方之藥物配伍。性皆寒涼。有消炎之功。收斂之能。但余未經試驗。始終懷疑不決也。適昨閱京江趙竹泉先生所編著之內外驗方秘傳一書。中有治凍瘡一方。所配藥味與余友所述者大同小異。亦用涼藥。今又錄于下。以供參考證也。

趙竹泉先生凍瘡驗方（側柏三錢 茄根黃柏各二錢

蠶豆葉三錢 棟樹果二錢 冬瓜皮三錢 甘遂二錢

川連一錢 鵝屎二錢 黃芩二錢 蛤粉灰三錢 甘草一錢）

晒乾爲末。以陳酒姜汁蜜和敷。

以上兩方之比較。藥味之去入。不過蠶豆葉。鵝屎。蛤粉灰。冰片。連翹。五倍子等味。但兩方之本性。各仍有消炎之功。經我友之試驗及趙氏之經驗。是二方確有可取。蓋凍瘡雖因寒而主。但當其局部發炎時。則非涼藥消其炎。不爲功。正合某先生之說也。故陽和膏僅治其最初時有效。是二方治凍瘡。腫亦疼痛爲最宜。潰後頗其收斂者。余以爲其効甚微。余希望各同學。有見患凍瘡者。與以一試。

## 口薰洗痔漏初起效方

鮮蒼耳子一科（全部）切碎。加水煎成濃湯。預將馬桶或溺器。以開水滌淨。趁熱傾入器內。令患者脫解下衣。露臀敦坐。其上熱氣少殺。再以棉花蘸洗之。連續行之一週。自可除根。

又方。冰片（一至三分）水仙花葉（一至三斤）。先將水仙葉搗爛。再將冰片。摻入外用新棉一層薄包一小團。塞入肛道內。一日更換一次。數日即癒。此治漏瘻妙方也。

## 口痔疾良藥

無花果爲治療的良藥。食其實。並用葉煎湯。功效尤大。倘若每晨食之。既可潤腸通便。且能治痔。冬季如採無花果一斤。先用鹽水洗淨。不使帶有水氣。去皮。加冰糖四兩。清水一杯。煮二十分鐘。成爲糖漿。患痔疾者。每早括在麵包上吃。或用醋半匙。無花果漿一匙。用開水冲湯服之亦可。

## 口不可思議之血痔方

南通張芝山布商印君。素嗜酒健談。因患痔。某歲痔大發。肛門內腫痛突起。上有小孔。每大便血自小孔一縷射出。量極多。綿延數旬。體日疲弱。凡通海著名醫生。無不逼求診治。或謂爲內痔。或謂爲血痔。方藥遍嘗。終不能治。其同業某君

聞之與一單方。向南貨肆買金針菜二兩。赤砂糖兩許。同入瓦罐。即以南貨肆包貨之粗草紙剪爲罐蓋。而加水一大碗。養之。藥熟取汁。空腹飲之。印君初以爲金針菜乃平常佐食之品。何能治痔。不甚深信。但和糖煮汁飲亦無害。姑一試之。乃一服血止。再服病若失。竟有不可思議之奇效。自後每遇血痔。投以此方。無不獲愈。誠所謂單方一味。氣殺名醫矣。

## ■療痔須標本兼治

林潔之

中國現時患痔之人甚多。考其原因。半由於體質薄弱。半由於不講衛生。試證之。東西洋各國。此症獨少。即可知矣。本病如在初期。每次通便之後。稍覺灼熱。患者因其輕微。多不介意。反遷延數年。痔核脹大。痛苦不堪。乃遍試藥劑。急欲全愈。至此地步。勢非施以手術。決難見功。惟割治後之成績。亦不能一律。有不再發者。有愈後不久。忽又發生者。有收口極其遲緩。或竟不能收口者。如有此種種不良之結果。大概可爲有兼症之徵。即可從事檢查。果有兼症。斷不可再省手續。僅治其本病。致延長患者之病期。倘係割後復發。除再行割治外。更須從原因治療法入手。標本兼治。俾既愈之後。不致有續發之虞。

蓋本病之原因有種種。或因常習便閉。努力過甚。養毒蓄積。

或因遺傳。梅毒。宿娼染毒。或因慢性淤病。遷延不治。或因腸內有寄生蟲。排泄毒質。刺或局部等而成。以上各項皆能導致本病。總之有無兼症。一經詳細檢查。自不難明瞭。檢查之後。如覺有異。則須另定治療之方針。以爲一勞永逸之計。麻成。本兼各症。同時完全脫體。則患者之目的達。醫生之責任盡矣。

## ■治脫肛祕方

世人患脫肛者。或用中醫補中益氣之法。或用西醫剖割。去之法。其結果。備嘗痛苦。毫無效驗。余見同居張某。患此病。狀諸藥不效。後遇鄉人傳一單方。如法製之。果驗。所謂禮失而求諸野。誠不謬也。

方用枸橘三枚(打)。線香三支。折置瓦罐內。水一碗半。濃煎。薰患處。脫者即收。最重者不過薰二三次。即能斷根。永不復發。

## ■治疗瘡

凡遇生疔瘡。無論生在何處。可以野落蘇(即野茄子)梗。中之蟲。浸於菜油中。以此蟲塗於瘡上。腫即退。瘡可消散矣。(又一方)若以鴉片煙與白砒和之。塗於瘡上。亦可治愈。惟

在嘴唇上者。塗時望特別留意。

傭婦某食指患疔。剝那間暴腫如紅蘿蔔。奇痛至不可耐。就醫於隣近醫院。塗以西藥。呼號益甚。同里有老嫗見之。曰吾有秘法。是可針而愈也。便袒其背。以縫衣之針。納線而刺之。取一黍許大之瘻出。俄頃間傭婦覺指端發癢。毒已漸消。不一炊黍頃。霍然若失。鄉野秘方。時有神效。此與患齒痛者。以水銀和某藥塗於虎口之上。而痛立止者。同爲不可思議。

### ■ 猪膽治療有特效

白虹

友人孫君。指上忽紅腫痛極。或云係疔毒。後由鄰人傳一單方。取豬膽稍破一口。將指套入。以線紮之初。指頭覺甚涼爽。睡一夜後。紅腫全消。特錄出以公大眾。

### ■ 芭蕉汁治癰瘍之一例

謝毅仁

外科中有朝患暮死者。每陷于難治危險之程度。醫生窮於應付者。厥爲疔瘍。我人在臨床上時常所遇到的該症之由於完全係濕熱與風邪擾動。發無定處。尤以面部更形劇烈。蔓延麻木或疼痛甚則身熱不醒。設不早爲治療。每易致走黃而死。上月內有王某及某鄉婦一患。頑疔一患。唇疔瘍甚。麻癢無瘳。疔頭黑腐。身熱神昏。言語舛錯。已呈走黃且極危。

重狀態。該症於事實上非服藥不可。無奈二人皆係勞工。無力服藥。情殊可憐。余幾爲束手。忽憶昔時師長曾語及芭蕉。能治危急之疔瘍。然余從未實試。尙屬半疑。今則該症既無力服藥。此外確無挽救之術。預料不久定遭殞死。余姑爲除運用手術外。令服芭蕉根汁五大碗。次日來治。症驟減漫腫略束。身熱止而昏暎除。漸呈景氣。殊出意外。再令照服。越四日而痊癒來歸。道謝。上述二症于嚴重之下。服芭蕉汁得能挽救。亦云幸矣。

### ■ 一個治療的驗方

瘍中的疔最利害。不過弄的不好。往往有性命之憂。是不能不注意的。現在有一個簡便的方兒。最有效。驗是把指甲煅成炭。浸入適量的煤炭。白洋糖裏面。擣勻。乘起疔初。把他敷在疔的四周。只露出尖頂在外面。不要一兩天疔就消散了。那敷的地方都褪了一層皮。

這個法子。是我們鄉裏一個老嫗專利的。後來被我探出。試驗多次。都是隨敷隨愈。後因爲他很有效驗。所以就登在這裏。傳衆周知。大家試驗試驗看。便能知道此方的功用了。

### ■ 紅絲疔

疔的流行非常的迅速。一經成就有性命之憂。且痛苦萬狀。

莫可言宣。他的紅絲生在脣面的。漸漸的蔓延到喉頭。生於

手上的。漸漸蔓延到心上。生在足上的。漸漸蔓延到臍腹的一部份。一到這種地位。非藥力可救的了。事前須用急救的

方法。先詳視紅絲所到的地方。遠紅絲一二寸。用頭髮緊緊的束。然後將絲頭用針刺破。用艾火燒在絲頭上。絲頭即行退散。倘一時不散。須燒散了方可止手。(燈火亦可)

驗的方法。用生黃豆令病人咀嚼無豆腥氣者。即為疔之現象。藥膏塗護。是可消散。

疔前的預防。確知是疔。用鴉片少許抹於疔上。用蠟皮膏或

柒油一碗。可無性命之憂。此保命之藥。他劑皆不及此。

## ■ 拔疔根法

用草藥子一粒。去油乳香一分。去油。用飯少許。共打極爛。爲餅貼之。少時疔根自出。

凡疔瘡發作最速。有朝發夕死。有隨發隨死。有三五日不死。至一月半月而終死者。其毒最烈。或發寒熱。或發麻木。或嘔吐。或煩躁。或頭暈眼花。或舌硬口乾。手足青黑。或心腹脹悶。或精神沈困。或言語顛倒。此皆生疔之証。由其形或大或小。或圓或長。其色或黃白或紫。或有青紅絲。名色甚多。治法則一。倘辨別不清。以生黃豆令本人嚼之。如無豆腥氣。即是疔瘡。照治療各方用之可也。

## ■ 治紅絲疔秘方

紅絲疔起於手掌節間。初起發紅。漸發紅絲。令人多作寒作熱。恶心嘔吐。遲治則絲至心。則不能救。此疔走黃最速。凡治此症。貴在乎早。急用銀針挑斷其絲。急拔去頭頂中紅髮一根。即安。若不急治。百無一生。

## ■ 治疔瘡奪命湯

疔瘡走黃。急用白菊花五兩。甘草五錢。水煎。當茶飲之。或飲

## ■ 治癰疽及疔毒方

明雄黃一兩。巴豆霜五錢。樟腦一兩。共爲末。貯磁瓶內。以蠟封固瓶口。勿令洩氣。凡遇生癰疽。或疔毒者。將藥加按膏藥上貼之。初起消散已成者。提膜。惟膜盡不能再貼。恐傷好肉。慎之慎之。

## ■ 治癰疽迅風掃鏟散

迅風掃蕩散治發背癰疽一切無名大毒以及瘡癰等症屢試不爽。尋山甲七片蜈蚣七條（去頭足）蟬退五錢（洗）殼蠶二錢（炒去絲）乳香二錢半（去油）全蝎七個（頭足腰全酒浸去腹內腸）斑毛七個（去翅足糯米炒）明青黃五錢麝香一錢冰片八分五倍子一兩半共爲細末曝乾勿令見火。掺于毒上再以尋常膏藥蓋之其效如神。

**婦女胯疽**

高尚清

產後膀胱一症。害人最速。苟醫治不得其法。其傾人性命。有如反掌。考之古人醫書。從無治是症方法。蓋亦後世新增之症。

毒菌。因有所阻退而毒愈甚。然當未產之前。榮分殷實。尚足相抵。一經產後。氣血大虛。其寄生於血分之毒菌。乃得乘隙而大肆其虐矣。意者此症不發於產前。而發於產後。即此理由歟。

其現象初來多兼外感。發熱頭痛。脈洪數有力。心煩似疔毒走黃。又有內胯疽外膀疽之別。其害之烈。直等於近世之核。疫與疔毒。第核。疫與疔毒不拘男婦老少。此則專發於產婦。且核。疫與疔毒不拘全身何處。俱可發生。此則專發於下身。腰間與膀際。爲不同耳。核。疫有現核者。有不現核者。醫家謂不現核較現核者尤重。此症之分內外。亦猶夫是臨症者。須細心審查。不可稍涉大意。致其變生不測也。預防之法。凡婦人產後三日內。臨臥時。須覓得農夫臭汗舊鞋數隻。向火烤熱。輪熨於兩膀之上。熨時務須時間深長。便可免此症之發生。此最簡便最穩當之法也。伺候蓐室者。謹記於初生時。依法爲之。此預防之最善者也。外治之法。(按此係治外膀疽之法。若內膀疽專仗用藥。內消外固。無從治之)。凡產後膀間忽痛。或駁現麻木。或心內煩躁。當細審其腰間膀上等處。如有腫核或紅片或紅點。或毛眼不順。但肉皮與尋常異色。便須謹防此症。外治之法。用三棱大針。向患處或紅片上或腫核上。橫刺五針。刺五七分之深。用火罐向刺處將毒血吸

盡。取葱生搗爛。並胡椒末少許用白布包。安於患處。取熱烙

鐵隔布熨之。(時間亦須深長。余見有隔十數日一拔火罐)

連刺十數次。

連拔十數火罐而病始愈者其症之頑如此)

更內服消毒之劑。庶幾有瘳。西人凡產後必用藥水將產婦

洗滌乾淨。所以患此者甚少。此或亦減少此病之一因。並可

與前防法參看。方劑三合湯。普濟消毒飲。(當用吳鞠通方)

)清魂散。紫金錠。(心煩可用)仙方活命飲(可選用)青

蒿龍甲飲(骨蒸者可用)龍膽瀉肝湯(肝脈獨勝者可用)

)回生丹。(大腸結者可用)又有專治膀胱傳鈔之三方。

(原注)膀胱有內外之分。內膀胱急毒攻於裏。至多十日而

生命以傾。外膀胱緩毒發於外。數月之間成瘡瘍之形。苟不知治法。如疔毒走黃而生命亦殞。此刺法。熨法。詳前不贅。與

服藥託毒內消所不可缺。一者也。茲有經驗。按日治膀胱三方。開列於後。

三日膀胱藥方(計日之數當以膀胱發現後計算)

當歸一兩。川芎五錢。丹皮二錢。益母草三錢。黑荆芥二錢。乳

香一錢。山楂肉二錢。桃仁七粒。引用蓮葉一塊。水煎服。

六日上膀胱方

當歸一兩。川芎五錢。潞參三錢。荆芥一錢。益母草三錢。引用

生薑煎服。

## 十二日膀胱方

黨參一兩。生黃芪一兩。當歸五錢。丹皮五錢。紅花一錢。薑炭五錢。茯苓五錢。

## 美容術

施惠羣

包於我們全身的皮膚。雖然祇有一釐左右的厚。但柔軟而

富於彈力。緻密而不起裂痕。已可保護全身皮膚的顏色。因

人種而有種種不同。又以各人而有種種不同。白色人種最

白。黑色人種最黑。銅色人種則呈銅色。黃色人種則呈黃色。

皮膚顏色的濃淡。是以色素細胞的多寡而區別。白色人種

色素最少。黃色人種稍多。黑色人種最多。

女性的皮膚普通比男子密緻而且白。這是因為表皮薄。含

於下層的色素少。最大的原因是血量少的緣故。他如皮下

包含多量的脂肪。也是原因之一。

女性的皮膚是柔軟滑澤綜合起來。其所以富於曲線美。是

脂肪的功效。那豐肥而可愛的頰短而圓的。圓而彎曲的

肩。其他從胸腹臀各部到四肢。都是美的排列。難以言語形容。

容的幻想與快感。刻於異性的胸坎裏。是因為脂肪的充足。包裹其筋肉。反之。男子的肌膚是粗糙而堅硬。皮下的脂肪很少。隆起的肌肉很發達。從兩性的皮膚的特徵與彩色而推測之。則男女皮膚的質素是以先天性的不同。在後天而變化的很少。

### 雀斑治法

夫雀斑藥市上未聞有靈驗者。下錄一方。據試過者云。稍有實效。法用宮粉。蛤粉。輕粉各五兩。蜜陀僧。白檀各二兩。研末。須極細。加麝香一錢。調和。每日和鷄蛋白調敷面部。

### 面疱粉刺

佚名

面疱亦名粉刺。約於十五六歲時開始發現。初起係紅色小瘰。隔三四日。紅腫微高。尖端現淡白色。擠之出白液。或濃厚如白粉。數日後即平伏。此瘰滿佈面部。尤以二十歲左右為盛。考此瘰之起由於少年血氣充旺。血分熱甚而濁。更以大便秘結。脂肪油膩。排洩無路。濕熱停留。遂致皮膚現此面疱。此肪並非全屬皮膚病症。蓋亦皮膚上一種排洩作用。故各種治方並無特效。大抵至二十六七歲時。面疱漸漸減少。移至頭頂頭髮之間。粉刺累累。繼而移至後頸。繼而移至背

部。通常至二十七八歲時。面部面疱漸減。盡移於背部而止。此乃生理上自然之程序。故醫學上殊無絕對有效之治法。苟能少食油膩脂肪之品。時使大便通暢。則面疱之勢略為減退。尚有一治標之法。以冰片末五分。滑石末三錢。綠豆粉末四錢。和入無敵牌牙粉一包。晚臨臥取少許。調水溝塗於面部一厚層。待明晨洗去。施用半月後。可使面疱銳減。

### 最新面貌整飾法

人萍

不久以前。我在銀幕看到一面容整飾法。二張新聞片。爰就記憶力之所及。走筆週之如左。  
先以水洗淨面部。不待其過乾。即以香粉撲。繼以軟綿之絹帕。輕輕拂去。(此時宜對鏡自照。不使剩有粉跡)俟拂淨後。可用保膚脂或潤面膏塗於手心。向面部雙頰間摩去。(務使潤遍)。摩勻後。待其稍燥。可再洒以少許撲粉。拂去後。隨取胭脂膏塗。中心點於頰間。再以手徐徐向上移動。(一切忌胭脂過多。若已過多。可擦以香粉少許。唯須由深化淡方佳)。此後畫眉者可畫眉。畫眉須由眉內端向外沿去。畫眉工程完竣後。則以口紅塗深點於上下唇中間。然後雙唇緊閉。微向左右摩擦之。至有一到處。可用舌尖微舐之。最妙能於塗口紅前。先敷以脂油少許。如此比較的易於勾勒。

(按)欲保持唇紅時間較久者。可於塗唇紅後再微敷以脂油。不僅光澤。即有「甜心」者亦可多吻幾下。而不致易於溶去矣。

## ■面生皺紋之自療

宋愛人

原因 俗語有所謂本噴桃花者。此形容人面之嬌嫩也。人面之嬌嫩由於氣血之壯盛。氣充於表。血華於外。故肌膚柔滑。而面尤嬌嫩。如桃花之水噴。蓋面者精華之會也。反是而氣血衰敗。則肌膚枯澀。而面尤萎黃如雞皮之繩裂。此亦一定之理也。然人之嗜慾不一。而最足以衰敗氣血者。厥惟淫慾。而手淫為又甚。故年少無知。情慾動而閨廝未深者。往往以青春之年。現衰老之境。其受手淫之害。恐十人而九也。致冬令寒風砭骨。皮膚燥裂者。時常有之。

症狀 面多慘白。唇色不紅。鼻樺不明潤。耳輪不厚。擇其類間。面頰多現繩紋。如水波狀。又如鮮鱗狀者。

治法 按古法對於美容術頗資考究。如井華水。神僊水。(即甘露葉上露水)。珍珠粉。白玉屑。桃花瓣。杏仁霜。珊瑚丹砂之類。然法雖完備。要亦其本屬血氣內充。服之或可益增容光。致若氣血不充。而面生皺紋者。惟有調養氣血為治。本之法。蓋藥石非養生之品。未可謂有恃無恐。而專以藥石是去之。宜用發癰硝酸。西藥用木條蘸點於患處。(立即發痛。

賴余爲是言。不僅指本題一說而然也。爰擇方書中最純正無偏者。謹錄用之。法取母豬蹄四箇。洗淨。煎成膏。臥時擦面額。次早洗去。半月後即不繩矣。(方是驗方新篇)。羊脂亦佳。各種膏蜜亦可選用。

## ■面多紅癟

問 鄙人年方二十。於前年正月中。面部鼻部。發出淡紅色紅癟。數數甚多。大似苡仁所發之處。皮色皆紅。日發日退。常變化。每洗面之時。手巾所擦。即流出清水。歷五分鐘後。至水流出後。發紅之皮。遂似脫皮之樣。至三月中始愈。去年亦是。雖各藥水等皆治無效。今則自去冬發生。至今已四五月。尚未見愈。而發出較去年更烈。洗擦面時。有數珠出紅血。不能痛不癢。內藥無效。外擦藥水雖數種。脫皮後即復生。不能斷根。(陸仲雲)

答 此種紅癟為青年發育時應有之現象。俗謂相火旺過之故。久後自退。無藥可治。亦不必服藥也。

## ■去痣法

前人

痣子多發於面部。有一粒至數十粒者。患者甚不雅觀。欲脫去之。宜用發癰硝酸。西藥用木條蘸點於患處。(立即發痛。

至數日癢則脫落。此法甚驗。硝酸有劇毒。宜慎用。口眼之處須防沾滲。用量宜少。

### 消滅疤痕

問 鄙人額角之處。有一疤痕。如蠶荳一半之大。稍帶微黑。此疤痕微黑。用何法除之。又頭角之處。沒有頭髮。如錢之大。此髮又用何法再生。懇請貴社賜示。(陳家驥)

答 痘痕無法可以消滅。如疤中無髮。因髮根已破壞。亦無

法再生。否則可用生姜日日擦之。

### 治頭髮脫落

用側柏葉一味。在新瓦上焙酥。研爲極細。未調茶沖。時時抹髮際。半月後可長三四寸許。且可變爲烏光明潤之髮。出生髮油尤妙。

(按)頭髮脫落。係氣血不榮。肌肉無澤。致髮根寬鬆。側柏葉有收滯之能。然非根本治法。如審知由於氣血虛損者。當兼服補益之味。

### 髮鬚早白之自療

宋愛人

(附髮禿方)

原因 人身毫髮皆屬血氣之華。而前人立論略有分辯。如足太陽膀胱經氣血充盛。則多髮而光澤可愛。足少陰腎經血充盛。則多髮而亦光澤可愛。然以兩說觀之。則仍不外乎血氣之盛衰。而鬢髮之榮枯。系也不充者。其髮多早白。自然細考。血氣所以不充。而致於髮鬚早白之故。則有先天血氣不足者。有後天榮養缺乏者。有深謀遠慮。窮思極想。以絞盡腦汁者。有酒色是耽。留戀忘返。而斬喪精氣者。世有蒼蒼白髮。未老先衰者。職是故也。

證狀 髮髮早白。不論何種年齡。大約在智識初開。其最早者。十六七歲。已有此種白髮發現。女子似較男子爲尠。初則僅見一二莖。或數十莖。轉瞬而髮之白者。居十之三四矣。或黑白相半矣。或竟有白多而黑少矣。一樹梨花。誠覺催人易老也。

治法 聖濟人參丸。最有特效。人參三兩。熟地黃焙乾五兩。天門冬去心五兩。白茯苓去黑皮五兩。胡麻仁泡去皮五兩。研末蜜丸。如桐子大。每日早晚各服錢半。日久自驗。如白髮而不多者。可拔去之。法取梧桐子搗汁。塗拔去之髮孔中。即生黑髮。如多不勝拔者。可取覆盆子榨汁。一一塗之。服人參丸。自無不愈。

附髮禿不生方 用棗樹上嫩枝皮一大握。取繩緊束之。樹

皮堅直勿令倒下。上面以火燃之則下面有油汁滴下。以碗盛盛之先以熱水洗頭後將此汁刷在禿處行之月餘自然髮如烏雲矣。

## ■ 髮落更生

程其恒

我國小孩大多不知衛生清潔。以至患鬍鬚以及爛頭生癩者不可勝計。每每愈後禿頭和疤痕殊覺難看。爲學生者。每多有以蓄西裝爲名。因爲只要有一部頭髮可以遮着全部。然蓄髮一事亦不衛生之道也。茲有一法。驗用多次。非常神效。凡患頭上有疤者。可將殺雞時滴下熱血塗于患處。不久髮可新生。但應注意血冷後再塗無效。有此病者請一試之。

## ■ 美容須知

佩 莫

不適當不合宜的飲食。最易損害容貌的。損害的程度比任何事物來得利害。所以要有優美的容貌。飲食應有適當的時間次數分量和合宜的食料。如欲永遠保持「處女美」必須避免鹽乾肉香料醃漬品過量的醬汁等肉與菜蔬一切碎而混和的食品已經二次燒煮過的也不宜。好牙齒是美容的要素。清潔牙的用物沒有比蘋果再好的了。

## ■ 簡易美容術

波 光

用冷水洗面是很好的。可以刺激皮膚。使血液的流動加快。些這樣便能把玫瑰一般的鮮紅顏色帶至面部。由兩頰上湧出來。

真要達到美容的目的。相當的運動。萬不可少。這一點很是重要。應當牢記。應當實行的。洗了熱水浴後。應用一塊浸透冷水的海綿。摩擦全身。

步行是一種良好的運動。人人可以實行的。婦女們常常躊躇。以爲沒有空閒工夫去作較長距離的步行。其實是很容易的。例如出外常坐車的。便有機會做步行的運動。就是出去的時候。要幹要緊事。不能不坐車。在幹完了事回家的時候。不妨勞動兩足走走了。知其路程過長的。不妨一半乘車。一半步行。這樣不是有機會實行步行的運動了吗。

假使一位姑娘沒「有愛神之弓」形的口。不用自怨自艾。只要稍加注意。略施小技。便可克服天然的缺點。所謂「人」力可以勝天。克服的方法。就是行口的按摩。用指尖從嘴唇的兩邊至中央向內按摩。假使嘴唇過於凸出。那麼向外按摩。即可如願以償。要使嘴唇柔嫩。應用少許緩和的潤脣膏。

女子的臉龐。伊是最愛惜的。每天總要對着鏡子照好多次。又時時擦粉。現在市上擦臉的粉內含有少量的鉛質。鉛之有害於皮膚。這是人人所知道的。但是最上等的香粉。用炭酸鈣和香精製成的。特地把價定得很貴。表示它是上等的粉。這種粉只有資產階級的婦女喜擦。

今天有幾個平民化的美容方法把它寫出來。貢獻於愛惜臉龐的婦女。每天臨睡的時候。如果在臉頰上擦些鷄子清。過夜次日早上仍把它洗去。一月之後。臉上的皮膚會光緻細膩。又一法。每日清晨未洗臉前。可用人乳塗面。待乾後再洗去。或用豆乳代替亦可。這三個方法。會由許多女子試用。連續一月之久。都生了效驗。油光闊晦雀斑都能漸漸的減退。只要有恒心。不可中輟。

我們這地方。有許多溫州婦人。伊們喜用山芋。就是山薯。天天切一薄片。向臉上細擦。等到山芋滲出的白汁擦完了。再用水洗臉。伊門天天這樣用。不擦粉。臉上倒也很好。很光緻。據說山芋有漂白皮膚之功呢。

## 口 日常的美容術

佩英

有美皆備。無麗不臻。這兩句廣告術語。卻可以借來用作我們在美容方面的最大目標。還有一句外國的老古話叫做

「美麗要依美麗做。」對於我們可算是一個美容的公式。現在不妨連接起來。成了這樣一個十全十美的美容公式。美麗要依美麗做。要做到有美皆備。無麗不臻。欲使這個理論的公式。成為實現的定則。非得一種完善的方法不可。這裏有一種日常的美容術。雖不能算盡善盡美的方法。卻是十足道地的經驗。所以敢介紹給講求美容的同志來嘗試一下。

美容品。「工欲善其技。必先利其器。」講究美容的人。也不能例外。必須常備幾種美容的利器。這裏所需要常備的美容利器。就是市上出售的化妝品。例如質地良好的洗膚霜。潤面霜。溫和軟性的收斂劑。淡薄的粉底膏。香粉。臘脂。塗唇膏。美睫液。畫眉筆。和美眠粉。等。這幾種化妝品。怎樣製造。我們不用探求。但是成分怎樣。質地怎樣。色香如何。用法如何。我們卻不可不約略明瞭。因為依普通情形而論。大概都用慣一種化妝品。不大肯輕易變更的。能夠對於一種用慣的化妝品。深知底細。詳悉用法。在美容方面。可以增加不少功效。

美容術。晚上就床之前。用洗膚霜來塗面。使面部洗清。最好塗洗一次。每次用柔軟的織物來揩。然後擦敷一層較厚的潤面霜。而按摩一下。這種做法。對於容易乾燥或有鱗的

皮膚。有莫大的利益。擦敷潤面霜後的按摩。要向眼睛的四周橫過額部而至口部四周。輕輕地。勻稱地。擦。在早上用溫和軟性的收斂劑。把面部和額部的毛孔中所排洩出來的脂肪液。完全除去。洒些冷水上去。或用噴霧器來把冰水噴上面部。等到差不多要乾的時候。薄薄地搽上一層潤面霜作底。搽起來要當心而迅速。否則把香粉撲上去的時候難免要有污斑不勻之弊。用香粉要勻稱平均。舉可以粉撲來撲去。而不要用手掌來擦上去。因爲撲粉比擦粉來得適當。撲後用一柔軟的粉刷來刷去任何過剩的粉紋和條痕。同時把睫毛與眉毛上的粉也要除盡。

香粉撲上後。就要敷胭脂了。晨間用的胭脂要揀淡紅色的。最好淡得像天然血色一般的紅潤。塗唇膏或稱口紅。也以淡紅色爲宜。假使你喜歡運動的那麼所敷的胭脂和唇膏。尤其要用淡紅的顏色。因爲在打球騎馬游泳等運動之後。面頰上多少會起一陣紅霞的。若是天然紅上加了人工紅。反爲不美。至於眼眶上。在早晨可以不搽美眸粉。午后的美容術和晨間的略有不同。胭脂和唇膏。要揀顏色深紅的。睫毛在這時不必多用。

晚上是一個人表顯在美容方面有真藝術的時間。假使要外出參加宴會或舞會的便可利用這期來炫耀你的美容。

藝術。先把日間所搽的霜所撲的粉。所敷的胭脂和所塗唇膏。完全洗去。揩清。然後照晨間所做的美容步序。重新搽霜。撲粉。敷胭脂。和塗唇膏。這時所散的胭脂和所塗的唇膏。不從下而上的。用手指蘸了胭脂。連眼邊上也敷些。似乎比兩頰至睫毛間不敷胭脂來得更好看。胭脂敷上後。再撲上些香粉。然後用粉刷來刷去過剩的粉。

## 寶貴的一張美容奇方

紀效宗

### (一) 中醫方

此方專治男女面部雀斑。粉刺。黑痣。瘰粒。麻點。疤痕。以及肌膚粗糙。黯黑。枯黃等症。曾經治愈面病不下數千。不敢自秘。特錄方中藥名及用法如下。

檀香一錢。甘松一錢。山奈一錢。細辛一錢。葉本一錢。白芷一錢。白芍一錢。白芨一錢。陀僧一錢。僵蠶一錢。天麻一錢。防風一錢。荆芥一錢。羌活一錢。獨活一錢。山梔一錢。菊花一錢。枯礬一錢。川椒一錢。真珠粉五分。紅棗七枚。

右藥二十一味。共研細末。加蜂蜜四五錢調和。(天氣熱時。

可不用蜂蜜。改用溫水調拌亦可。

用法。每於臨睡時以手指蘸藥少許。置於兩掌。用力塗擦面部。約數分鐘為度。該藥至次晨洗去。入夜再依上法擦用。如是試用數星期以上。必有奇效。輕症半料可愈。重症至多用至二三料。惟心急及間斷不能依法常用者。概難見功。

## (二) 西醫方

凡皮膚粗黑。頭髮枯黃。乃為美容之大障礙。欲謀挽救。當以藥品清其血液。增其皮下脂肪。庶可使皮膚細膩白淨。毛髮光澤而烏黑。藥方如下。

亞硫酸  $0\cdot05$  克。黑椒末  $5\cdot00$  克。阿拉比亞樹膠  $1\cdot00$  克。蒸溜水適宜。上藥入器混和。以蒸溜水糊丸。勻作一百粒。每日服三粒。於三餐後開水下。迨後漸增。加以日服十五粒至三十粒為限。服至見效為度。不過此方所用之亞硫酸含有劇烈之毒性。必經西醫診斷。詢以此方與已體是否合宜可服。若西醫聲明不宜服。萬不可入口。苟得西醫許可。初服時以少為貴。服過一二星期。絕無變象。方可間一二日加多一粒。又配合時分量務須秤準。蓋此方為西洋極貴重之秘方。皮膚粗黑者服之。直有脫胎換骨之效力。惟藥性劇烈而有毒。故審慎。

出之。

## 乳部

### ■ 乳部與生殖器之關係 尤學周

人身各器官。其部位有表裏上下。其功用各有專責。除同在一系統之外。似乎各不相關。實則人體為一部最精細之天然機器。四肢軀幹。以及臟腑經絡。互相維繫。息息交通。各有關係。惟其關係有大小之不同。故有顯著之殊耳。

乳部原不在生殖系統之內。然與生殖器之關係甚大。當妊娠之初。月經閉止於斯時也。尚不能必其為懷孕。缺乏生育常識者。往往不能自知。即醫生診斷。亦為時尚淺。胎兒渺小。不易辨識。致有誤作停經。妄投破血之劑。因而墮胎者。在所多有。實則妊娠原有其他之現象可徵。於乳部方面。懷孕一月。乳頭漸形紫色。第二月。乳頭漸變暗黑色。四圍有暗色之暈輪。三四月以後。乳頭高聳。乳房之變化亦愈著。乳腺膨脹。乳房緊張。捫之覺疼痛。以兩指夾乳下壓之。即有類似清水之乳汁流出。此蓋因妊娠時。生殖器發生變化。乳房則又受產後子宮弛張而下垂。一時不易恢復原狀。此時亦不必服

藥調理及授乳以後一受刺激自能促其收縮常見資產階級之婦女為求個人生活之舒適起見生育後每不肯自己授乳必另雇乳娘。乳娘之身體是否健全其乳汁是否合於乳兒之營養固置不談而於產婦本身方面此種習慣於生理上實屬不合蓋子宮之收縮授乳與有力焉如以此職使他人代之則子宮不易收縮往往變生他症於此又可證乳部與生殖器關係之重且大也。

其他如月經來潮之際乳汁亦受其變化小兒哺之往往發生消化不良致腸胃疼痛或起泄瀉宜暫停止大多婦女於月經重見後乳汁即漸見減少月經與乳汁一出子宮一出乳房而此停彼來彼停此來顯見乳部之與生殖器有絕大之關係醫學家以婦人乳腺竟比之為生殖器之一亦以二者之間其關係甚為密切之故也。

## ■多乳頭之原因

尤學周

據友人某君云其鄰家婦日前臨產一女而生六乳事聞於外莫不嘖嘖稱奇或謂猪轉世或謂羊轉世或謂牛轉世以致議論紛紛傳為談資。

吾人之乳頭無論男女大多為二竹書紀年謂文王之胸四乳仇池筆記載范蜀公多四乳除此二人為多乳頭而外其

他則少所聞見且此二人皆為男性關於多乳頭之女性記載尤少竊嘗思之男性既有多乳頭女子之乳房較男性為發達其功用亦獨彰多乳頭之發生必不能免大約多生之乳頭不若原有一對之發達而顯著於幼年時代往往忽視及既長大而發育又格於羞恥之心掩藏緊束不使暴露人既無從知之伊亦諱莫如深矣但據歐人之調查人之生副乳者男子二百零七人中占百分之九女子一百零四人中占百分之四副乳在原有之乳頭下者多接近在乳頭上者多遠離所多生之乳頭通常在胸之前方有時亦在腋下背部等處者或乳房隆起顯而易見或僅留一乳頭之痕迹不甚顯著。

自進化學上研究之吾人之乳頭最初必不僅一對一胎所產之數量亦必不僅為一子或一女與其他之動物無異後因生活之關係養育為難產數漸減乳頭過多轉覺無用遂逐漸消滅僅存一對然生理上之遺傳尚未淘汰於盡至寂滅無痕之境故不免有多乳頭之發生也。

## ■乳房之伸長

尤學周

## 論女子束乳之害

佚名

時受其牽引。乳房亦漸漸伸長及斷乳以後。乳房即見下垂。已改變其乳前之狀態與處女時代之乳房則迥乎不同矣。產育次數之多者。其伸長亦較甚。下垂如袋。即俗所謂爻袋乳是也。

乳房之伸長與否與體質之強弱頗有關係。體質强者筋肉舒張呈苗壯之象。體質弱者筋肉萎縮呈枯瘠之象。乳房於授乳以後不能伸長。雖不能謂筋肉萎縮之特徵。而其體質必不十分健全者。女子乳房其變化之時機有二。一在發育時期。一在授乳時期。發育時代。乳部平坦不隆起而豐滿者。為不健全之徵。人所共知。授乳時期而不能伸長。與此同一徵象。惟不伸長而仍豐滿者。仍不失其為健全之體。又有雖伸長而枯瘦如乾茄者。亦非康健之象。故又不可執一而論。

乳房之長度亦有關於種族。不僅為強弱之測驗而已也。非洲南部之「荷吞脫脫」人之乳房發育最甚。其長足堪驚人。此種人之臀部後突頗起。嬰兒跨坐其上。以負於母背。不須另以襁褓裹束之。授乳之時。其母將乳頭上翻肩部。其兒即能自背後吸之。真奇觀也。交州記載一趙娘者。九真軍安縣人。乳長數尺。不嫁入山。聚羣盜常著金擒捉。屢又見南越志。此乃生而異秉非常體也。

纏足之害。始革東乳之風。又起一般時髦之女子。受社會惡習之同化。均以束乳為雅觀。不知乳之部位在於胸膺。胸廓之內。則為心肺。心主營血。肺主衛氣。氣血皆宜舒暢而不宜阻滯。今反束縛。使其氣不暢。血流不達。在未嫁之女子。勢必因之發現種種貧血之險症。在已嫁之女子。勢必難於受孕。即受孕而胎元亦必不能發達。何則。兒在母腹。全賴母血之營養。之今束其乳。則血為之阻滯。不能下供胎元。產下之兒女。亦必矮小而多病矣。且產後乳汁必少。小兒更受影響。甚矣哉。女子束乳之害也。

## 經前乳痛

朱振聲

問 敵之內人。今年三十一齡。結婚有十四五年。迄無生育。體氣健壯。並無多病。不過每於經期前半月。乳房疼痛。患有此種人之臀部後突頗起。嬰兒跨坐其上。以負於母背。不須另以襁褓裹束之。授乳之時。其母將乳頭上翻肩部。其兒即能自背後吸之。真奇觀也。交州記載一趙娘者。九真軍安縣人。乳長數尺。不嫁入山。聚羣盜常著金擒捉。屢又見南越志。此乃生而異秉非常體也。

短時調治所能取效。茲擬一良方。或請指示。常服何丸。為止。而經前且覺小腹墜痛。又每於飯後胃部常覺心嘈。似仍未飽。不卜何故。平素曾經延醫服藥。終難見效。深知此症非。

宣。有勞青囊之濟。當不忘此回春之恩。(宮雲程)

答。乳與小腹皆隸於肝。肝失疏達氣鬱不宣。經來之前壅滯難下。故脹脹痛。經淨後壅者已疏。滯者已達。故塊消而痛止。胃部常覺嘈雜。木火旺而乘土也。法當疏肝理氣。左金丸一錢(包)炙薑艾二錢。生白芍二錢。炒枳壳錢半。廣鬱金錢半。橘葉皮各一錢。川棟子錢半。焦楂肉三錢。桃仁泥三錢。兩頭尖(包)三錢。酒水各半煎服。

## ■產後初次分泌之乳汁 尤學周

產後初次分泌之乳汁。謂之初乳。與真正之乳汁。其成分作用大不相同。除乳球而外。復含他種原質。即初乳球或有含有核細胞及無色細胞。其成分爲蛋白質八·九七。脂肪二·三五。乳糖三·六四。鹽類〇·五四。真正之乳汁爲白色液體。初乳則白中帶黃。其味之甜與真正乳汁相同。婦人於分娩以後。誠恐乳腺不通。嬰兒不能吸收。常以手擠壓之試。乳汁之能否外出。初乳即於是擠去。不知飲食屬於天性。初出母胎。飲食之本能亦隨之而來。苟非口腔生有疾患。無有不能吮乳者。乳頭之清潔與否。足以影響於乳兒。此點當宜注意。至於乳汁之能否吸收。除暗乳頭而外。並不有何種困難發生。似不必擠乳以試之。緣初乳之作用。能泄瀉胎糞。小

兒食之。得益孔多。

初生小兒。防有胎毒。習慣上以三黃(黃連、黃芩、黃柏)湯與之。或以大黃磨汁喂之。既可速除胎糞。又可清解胎毒。法至善也。然終不若初乳之自然而妥善。蓋乳汁與胎兒於同一時期醞釀發生。初乳又隨乳兒以俱來。有同氣相應之妙。其功用必較藥力爲更勝一籌。此理之易明者。而今之產婦又有因其質之稀薄而泛黃色。謂爲乳汁之不純粹者。故意擠之。去甚可惜也。

## ■乳汁之分泌量 尤學周

乳婦乳汁之分泌量。大率分娩後之半月內。自十兩至十四兩。半月後。自十二兩至十八兩。二月至十五兩。至二十五兩。三月。自二十兩至三十兩。是後至八九月間。殆少變動。間亦有增加四五兩者。故此時乳汁爲特盛之時。過此以往。所出分量漸少。且甚稀薄。以上指一般而言。實則乳量之分泌如何。有關於體質與營養。體質之強者。各部機能必均發達。其乳腺之發育亦必甚。氣血充盛。乳量之分泌因之增多。反之體質羸弱。發育不盛。乳房不充。乳汁之分泌機能爲之減退。其量必不充足。營養之與乳汁之分泌關係尤大。營養之良否。不特足以補養羸

弱之體質。使之日增於健。全同時又能使乳汁增多。故爲乳婦者。宜行適度之全部運動。每日於清曠之處爲之。以振起其精神。增進其消化。同時注意其營養。則乳汁之分泌亦可增加。常見普通人家之傭乳婦者。於營養方面。雖加注意。但於營養之成分。則不加選擇。於運動方面。則一無規律。故乳汁之分泌雖能增多。其成分則未必十分優良。亦未得爲善也。

除體質與營養而外。精神之感動。身體之勞役。與乳汁之分泌量。亦有關係。尤以當疾病時。其關係最大。如發熱時。及泄痢。乳汁之分泌必因以減少。此最顯著者也。

## ■藥力是否能移行於乳汁中

尤學周

小兒有病。服藥頗爲困難。非用極端之強迫手段。不能下咽。故嘗小兒服藥之際。須有數人侍之。否則。呼喧號舞。手揚足。藥碗每爲之翻倒。即入口。亦必噴然吐出。於事仍無所濟。吾錫習俗。兒病多延推拿者。爲之按摩。以祛其疾。雖未必盡能有效。亦所以鑑於小兒服藥之困難。而求此終南之捷徑。或則由乳母代爲服藥。謂爲藥力移行於乳汁中。兒服其乳。亦能藥到病除。

藥力是否能移行於乳汁之中。此爲足堪研究之一問題。蓋乳汁原由血液變化而來。食物入胃。藉消化之力。變爲精微。轉展入於血管而成血。以營養各部。藥物入胃。同樣受消化器官之運化與輸送。入於血管。達於乳腺。故孕婦服藥。其藥力移行於乳汁中之說。確爲事實。非鑿空之談。據試驗者。用藥房中所售之擴大瞳孔之藥名阿特羅平者。使乳婦服之。其子飲其乳汁。瞳孔亦因而擴大。近日有所謂「越乳療法」者。如治先天黴毒。即取九一四注射藥。注射於母體。而間接以治其子。亦本此理也。

因小兒不能服藥。由乳母代服。然其藥力之作用。因間接之關係。終不及直接自服之效速而大。且藥性之平穩者。代服尚可。如劇性之藥品。在病者原用以剋伏病魔。於全體之機能。不致發生危險性之影響。無病而代服劇性之藥物。以戕害其機能。影響於生命。是不可不注意者。

陸婦某其二歲之小兒。患胃實之症。大便不通者八日。氣勢頗甚。服以藥。不得下咽。太半痕籍於外。未收效果。該兒尙未斷乳。陸婦即自服之。不知該藥爲瀉下之劑。所以通導小兒之胃實者。服後頻作瀉。一日夜七八次。以致不勝疲憊。兒病未受絲毫之影響。乳汁反因以減少。弄巧反拙。幾成大錯。

## 精神變動與乳汁之關係 尤學周

吾人所稟之氣質。莫不有異。精神之變動。又隨其所稟之氣質而異。多血質之人。秉性活潑。舉動敏捷。然無耐忍之心。稍久即弛。膽汁質之人。堅忍不拔。歷久不渝。然剛愎自用。傲慢不恭。神經質之人工。愁善病歌哭纏綿。想像雖豐富。而行事乏決斷力。粘液質之人。不易為感情所激動。亦少感情之變化。四者以神經質與膽汁質之感情最强。神經質之精神。最易變動。膽汁質之精神。除因橫逆拂志。發生暴怒於外。亦少變動。

精神之變動。雖有關於氣質。而其變化之動機。則又關於環境與其遭際之順逆。女子多屬於神經質。而其環境與遭際。往往拂逆多而順意者少。易於發生刺激。精神上因感受之不快變化以起。

精神之變動。足以影響於身體之康健。故工愁者善病。善病必不壽。婦女於授乳期間。因精神之變動。又足以影響於乳汁之分泌量。與其成分。如憂鬱不歡。悲哀過甚。乳汁為之減少。如遇驚駭。則乳汁之分泌。或全行停止。若即時授乳。而其乳汁亦發生變化。小兒哺之。往往有中毒之危險。夫婦行房。為歡。雖僅片刻。若在授乳時期。其乳汁亦改變原有之質素。

不合於小兒之營養。故行房後之一小時內。不宜授乳。且須將乳汁擠去。以防小兒哺之。發生不良影響。大約精神變動之屬於悲觀方面者。其影響於乳汁者多不良。故宜極力避免。

宋書朱脩之傳。修之隨彥之北伐。戍滑台。為虜所圍。數月糧盡。脩之母聞其被圍。既久。常憂之。忽一日。乳汁驚出。母號泣告家人曰。吾年已老。忽復有乳汁。斯不祥矣。吾兒其不利乎。古人以事出非常。謂為不吉之徵兆。修之之母。驚愛出乳事屬非常。故謂為不利。在生理學尚未曉解之宋朝士大夫。尙多不知其所以然之處。矧在婦人。兆之利與不利。固不足為憑。而精神變動之足以影響於乳汁。此為鐵證。可以信而無疑矣。

## 乳房疾患

竹均

### (甲)母乳不足

產後母乳雖有。但不充足。有時閉止。或全停頓。這是由於母體缺乏營養。或者精神受有非常的刺戟而來。此外更有初產婦的脂肪過多症。或經產婦前次不自授乳。以致乳腺萎縮等情。均為乳汁不足的原因。

母乳不足的處置。除多攝營養物以及一切對症療法外。尚

有人工太陽燈的射照。亦可催進乳腺的分泌。但孕婦分娩之後。即貸哺乳於親生兒的責任。所以產後乳不充足。或竟閉止。是皆嬰兒不幸之事。因此母體在妊娠時。就該保養心身。強健無病。以便產後乳汁可得純良的充足。方是根本辦法。

### (乙) 乳汁過多

乳腺的分泌機能極其旺盛。哺乳方畢。乳汁仍有流溢。源源而射。或者稀薄如水。都是乳汎過多的症候。母體因此往往易起營養障礙。或貧血衰弱等患。如患乳汁過多。應即少吃生乳的食物。或以布片綑帶緊壓乳房。或用吸乳器吸去乳汁。均無不可。如果乳房覺痛。可塗豬油或凡士林。

### (丙) 乳汁鬱積

乳線的分泌。不準其量而排泄。乃起鬱積之症。俗稱乳熱。在乳熱發生時。乳腺緊張似受壓迫而覺疼痛。大都是在產褥第三四日發生。同時體溫常在三十八度以上。可用濕布。綑帶貼壓乳房。並投瀉鹽。如其疼痛劇烈。可貼黃芩膠皮膏。

### (丁) 乳腺炎

化膿菌由乳房皮膚的損傷部竄入。即成乳腺炎。大都在產褥第二以迄第六星期內發生。初起時高熱畏寒。乳房覺痛。往往成為滲蔓性的浸潤。如果發熱持久。於是患部亦腫。已患乳腺炎之後。如果不很嚴重。對於哺乳不必急於廢止。因為有時反以哺乳而能痊可。但須用濕布冰袋提舉乳頭。或行溫罨法。然後緊張可以減輕且能防止化膿。

### ■ 病後乳汁不來

朱振聲

問 振聲先生大鑑。逕啓者。茲有數疑問。欲請問于先生。祈即答復為荷。

- 一 婦女初產將及一月。忽染瘡疾。以致乳水全無。能否藉藥力仍使乳來。
- 二 已能藉藥力使乳仍來。則請代擬一方。
- 三 兩乳之內各有一塊。是否即俗稱乳核。
- 四 此次之乳。因病而無。若以後生產。乳汁能否照常而來。
- 五 通乳藥有無現成者。何處有售。價目如何。

綜上五問。並煩在  
貴報內刊佈之是幸。(葉琴齋)

答 (一) 以停止之時日多少而定。過多恐不能復來。(二) 詳情未悉。不敢妄擬。(三) 即乳核久能自消。(四) 可以照常來。(五) 不知既有不可亂服。恐一切病體耳。

## ■ 睽乳頭

葉鳳紀

女子慣喜穿小背心。緊壓乳峯。不使墳起。以爲雅觀。因此往往乳頭凹而不凸。俗謂之睽乳頭。有用盡各法。吮之使出者。產婦受不少痛苦。至是始顯小背心之害。悔已無及。亦有謂因幼時洗浴。慈母未爲擠出之故。然在發育時期。如所穿衣服寬大。能自然發育完全。鄉間農家婦女。未聞有患此者。是一證也。曾身歷此痛苦者。必不乏其人。當同情斯言。今得一治法。屢試有效。即在受孕後。胎乳發生時期。取桃核一枚。分之爲二。去其肉。壳裹及邊。用刀刮光。以之罩在乳頭外。用布袋縛住。經一月。能自己凸出。是法簡易而有效。有人孕而患乳頭不出者。得此法預治。可以少受一些痛苦矣。夫有病而治之。乃不得已事。最好女子於幼年。宜穿寬大衣服。使其自然得發育完全。免此小患。乃合上古聖人治未病之意也。

(接) 女人患睽乳頭者。其乳頭縮陷不起。在平日固無妨礙。及生產後。將失哺乳功能。此法不藉藥石。不費大力。亦不受痛苦妙法也。

問 鄙人在處女時。乳頭如被衣服擦着。即覺疼痛。今生產後。哺乳之時。痛苦萬分。據年長者言。新乳均有如此情狀。後以一乳授之。時痛少改。今已三閱月矣。惟日昨忽而復痛。如前。未悉此症何法可以治之。素慕大醫士醫學深淵。乞賜良方。至感。(丁憂麗)

答 乳頭被衣服擦着而疼痛。或係皮膚嬌嫩之故。產後因乳房膨脹。益易與衣服接觸。可擇柔軟之料。以作內衣。如乳頭腫脹。按之有硬塊者。當服藥調理。苟無此證。亦不必調治也。

## ■ 乳頭疼痛

聶其杰

乳房結塊。俗名乳吹。謂哺乳時爲小兒所吹也。舍十弟婦患此症。延西醫某君治之。創口月餘不合。復換德醫某加割二次。仍不愈。後請夏君診之。用紙捻粘藥末插入外貼膏藥。兼服湯藥旬餘而愈。後年餘。姪女適曹氏者。亦患此症。延夏君診。夏君授膏藥貼之。服藥一劑。次日愈矣。越數月。予之書記張君之妻。亦患此症。予授以所賸膏藥及藥方。次晨來言全愈矣。後以治數人。皆神效。有疑貼膏藥者。亦效。因向夏君乞

得此膏藥末方。茲并錄如左。

治乳塊。內方醫案。乳頭屬肝。乳房屬胃。乳頭結塊。腫及乳房。氣痰凝滯。絡道不和。法當內消。  
(按)硯耕緒錄言。山左人求此方。費五百金。故名五百金方。  
橘葉絡各一錢。炒青皮一錢。薄荷六分。(後下)象貞母三錢。  
炒枳壳一錢。白蒺藜三錢。紫蠶錢半。絲瓜絡二錢。炒赤芍錢半。煅決明錢半。赤茯苓三錢。如肝鬱者。加香附一錢。鬱金一錢。

### 附調膏藥藥末方

此方係夏君家傳秘方。專治一切腫塊骨節作痛。疝氣偏墜。風痰流注。乳吹初起。均極效。惟陽症紅腫膿已成者。則不宜。乳癰初起者。可貼。已成者。不宜貼。公丁香二兩。細辛二兩。薑擦二兩。蜂房四兩。百草霜二兩。右藥共研細末。以好瓶密塞。和入膏藥內貼之。其膏藥爲普通藥店內出售之清涼膏。每膏藥一斤。加此散一兩。餘藥膏烊化後攪勻。攤之。此方已經照配。屢見效驗。

### ■乳癰外治奇方

又名五百金方

趙維貞

用豆腐水。即造豆腐時。淋下之水。貯一大桶。傾入鍋。熬乾成膏。濃稠處。乾則再擗。無論乳癰已潰。擗五六次。即使其腫

硬消散。且有化腐生肌之效。誠屢試屢驗之良方也。

(按)硯耕緒錄言。山左人求此方。費五百金。故名五百金方。蓋豆腐係豆及石膏所做。豆出解毒排濃之功。石膏有清熱化腐之效。其淋下之水。熬乾成膏。適得其精華之汁。非特擦乳癰有特效。即擦各種癰毒亦必有效也。

## 月經

邱治中

### ■經來須知

女子月經來潮。爲自然的生理。本非疾病。所以處女在初次月經來潮時。切勿驚懼。有時處女正在學校體操或勞動操作的時候。月經突然而至。不懂的往往驚懼失措。神經受着劇烈的刺激。反爲不良。爲母親的應當在她十二三歲的辰光。預先將這種理由告知。方纔適當。在經來的時候。身體康健的婦女。當然不覺得什麼影響。起坐運動。並沒有什麼障礙。也不必十分注意。惟有患月經痛的婦女。就要在身體上和精神上。有些相當的注意。關於精神上的。最要緊是不可受強烈的感動。須安臥靜養。不應用腦用力。如看書。看戲。賽跑。打球。騎馬。乘車。乘船。及一切用力的工作。

## 月經病之三大原因

周桂庭

凡事之成。非成於成之日。必有由來之漸。其由來者爲原因。其底於有成者爲結果。現今科學昌明。醫業進步。吾人處此時代。皆當以真理解釋之。使謬妄之邪說不能有絲毫存在。此吾輩之天職也。茲就本題發揮其所見。然有未盡之處。尚乞海內高明政之。

婦女一科。本由內科出發。所異者。爲調經。閉。生產而已。故經病之作。不外乎內因。外因。內外因三種。所謂內因者。即體質年齡之不等。或受七情之刺。或乃經病之導線也。如人體質薄弱。則生理上機能障礙。生殖器受其影響。故成經病。然亦有當發病時。而間接爲害者。必待外因侵入而成。但吾人七情之動。皆弗學而能。以其天性所固。有各隨本臟之所生。以致發生經病。此內因而致經病者也。所謂外因者。吾人生存於天地之間。於自然界之變化。常能調節抵抗之。故氣候之變化。及細菌之肆虐。必有極大之暴力。始足以致病。如外界六氣過甚。侵入體內。滯塞血管。使其流行緩慢。則經水受其影響。而凝滯。受其風熱。則血流迅速。或強度充血。其經水如大海波濤。有澎湃奔騰之勢。所以月經中最宜注意。感冒。月經與感冒。雖無何等直接關係。但在月經中而受感。

冒之影響。最爲敏捷。能續起生殖器障礙。月經本以生理之作用。爲機轉。今受外界之刺。或使不得安閑。故往往致成經病。經曰。『天地溫和。經水安靜。』即可知婦女生殖器障礙。而爲疾患者。乃自然界失其溫和也。進而言其性慾之致經病者。如現今人類之性慾。常有放縱奔逸之傾向。實因社會環境惡劣。加以高唱自由戀愛之徒。從中作弊。以盡其禽獸之行。不顧廉恥。道德爲何物。以致梅毒傳染於全世界。而婦女中之罹此惡毒。致生育斷絕。因而發生經病者。不知凡幾。此外。因而致經病者也。

所謂不內外因者。如跌打損傷等是也。夫內有所傷。外有所感。而致經病者。內經所謂「不得虛邪。不能獨傷人」。此自然而然之理也。若夫不內外因。自是突如其来。當屬於外科之例。似不能屬於內科婦女經病也。爲嘗見妊娠滿月之婦。其陰戶狹小。而致行使切開之術。行後。始成經病。致不能孕育者。有之。又或因跌損之故。致瘀血停留。機能障礙。而經滯不行。者。亦往往有之。此則不內外因之所致也。吾人立說。自應合乎生理之自然。若曲全其說。違反自然之生理。以欺世而誤人者。則不免爲識者之所笑耳。不揣冒昧。妄陳方見。質之海內。以爲然乎。

## 經血與普通血液之異點

尤學周

月經。或謂血之餘盈。盈則外溢。或謂血之鬱積。積久則外潰。血之流行循常道而環迴不已。故月經亦循常道而時下。不稍愆期則經也。血也。一而二也。然實際上經血與普通之血。其不同之點頗多。

經血與受外傷時血管所出之血。外觀上大為不同。以色澤而言。外傷之血。其色則為鮮明。經血則不及其新鮮。其顏色大多呈暗赤色。或作汙黑色。以臭味而言。經血因有子宮頸

之粘液及皮脂腺分泌物混入於內。有特異之臭味。如以顯微鏡窺之。又可見血球之外面粘膜之上皮似有組織聚集者。然乃乘機而混入之各種微菌也。

經血與普通血液特異之點。為無凝固之性。且無論何時。皆不能凝固。冬天然。夏天亦然。其所以不能凝固之理。雖有不少人注意及此。而曾加以研究。然觀其所發表之學說。言人人殊。皆不能有真確之定論。如某學者曰。經血之所以不能凝固。因其內含有雜質。如子宮頸粘液及分泌物之故。普通血液則甚純粹。故因外傷而出之血。即易凝固。然此說頗多疑慮。而一時則又無非之之理。可以解釋。又有一學者曰。康

## 經期勞動之害

陳景岐

健之婦女。在月經來時。其血液亦缺少凝固性。故經血亦不能凝固。固然此亦通論。康健之婦女。其經期內之血液。未必全無凝固之性。以余之意見。大約經血所含之水分較外傷出血為多。因稀薄之故。其凝固性為之減退。亦非無理。以經血之能凝固與否。可以測驗其人之是否康健。大凡身體康健之人。經血皆不凝固。其凝固者。身體必不康健。緣純粹之經血。不能凝固。惟混入血液以後。始失去其流動之習性耳。血漿而能混入經血之中。其為病證無疑。故經血而成塊者。皆非正當之經血也。

婦女月經之來潮。乃一種生理的作用。當此時。間身體必呈變異之狀。故有種種之避忌。如忌辛辣。油炒。生冷。烟酒。交合。驚恐。悲苦。憂慮等。良以經期中之不衛生。最易惹起疾病也。至若勞動一事。影響尤大。在貧家婦女。則輔助家庭。主持中饋。歷碌終日。不克休止。在富家婦女。則宴會酬酢。賭博。娛樂。互相牽制。日夜勿息。於不知不覺之間。遂發生種種疾病。以致衰弱其身體。憔悴其形容。甚則絕育不姪。影響於嗣胤者。尤為重要。外國婦女於經未來時。則停止交際。及操作女子。之在學校中。亦請假休息。是誠宜效而行之。然在富厚之家。

傭奴使婢。尚無不可。若貧賤之家。似乎難已。但在當局亦宜自爲撙節。毋過劇烈。事之可稍緩者。不妨俟清淨後爲之。如是庶幾少受疾患乎。

## 月經來時之房事問題

尤學周

月經將來未來。適於是時行房。其汎即至。俗謂之撞紅。此雖出於偶然之巧遇。蓋亦有故緣。此時子宮內膜充血異常。因慾念之衝動。而并見之於事實。充血處逐破裂而出血。故經水即時下行。實際上非「撞紅」乃「促紅」也。

房事撞紅。俗謂不利於男性。習俗以女子月經爲不潔之物。着於人身。必有不利。實際上撞紅一事。於男性方面。並無何種影響。於女性方面。則關係非淺。蓋女子月經。乃子宮出血之一種現象。惟此種出血。有作用。有定時。爲異然。其創口。則與普通出血同様。宜加意保護。否則不易平復。或且引起意外之變端。經來行房。性器官受劇烈之衝動。將引起不良之影響。彼賣淫之娼妓。在搗母嚴酷之監督之下。送僕迎新。夜無虛日。當經來之時。亦無休養。以致不能復原。反而引起潰瘍。膿液淋漓。或爲頑固之白帶。故妓女大都生有隱疾。未始非由於此。

習俗對於撞紅一事。不言有害女性。而反謂不利於男子者。

顯係重男輕女。蔑視女性。既不研究此中真實之弊竇。而反信口雌黃。謂爲月經之足以損人。真不值一笑。

雖然。性慾之衝動。男子每甚於女子。故男子行房。女子常處於被動地位。在性慾旺甚之男子。慾念易興。不顧一切。任意妄爲。甚至月經來時。亦不休罷。惟有動之以利害。或能却步。不前。則所謂不利於男子之說。非不利也。藉此望其慾念耳。

『小溪新漲桃花水。勸汝劉郎莫問津。』今宵隔斷紅塵路。不許僧敲月下門。』何以勸。何以不許。蓋亦以有利害存乎。其間。僧乎。劉郎乎。當桃花水漲紅塵路隔之時。當記取此言。

## □ 經時不準

朱振聲

問 賤內自去年夏秋間起。覺經期退後而減少。轉經時不過些。服藥數劑。少效。繼至本年正月間。試服艾葉紅糖茶。接服二月。經時竟經略多。然來期仍退後。反發生胸腹連帶疼痛。(無塊)且時常作痛。延醫診治。據云少吃艾糖。茶服六七劑。毫無效果。查鄉間所開藥味。都係止痛藥味。決非根本澈底之藥也。然則賤內平常看之似無病症。面色血氣甚旺。飲食尤不減。身體亦強。惟肚痛時。連痛胸口。厲害時不能動作也。如服五洲出品之月月紅。及廣幫藥店之烏雞白鳳丸等。能否有效。紅花紅棗黃酒可常服否。(林振聲)

答。月經落後而減少。因原因之不同。其證狀亦各別。以其

色澤而言之。有鮮赤者。有暗紫者。有黃淡者。以其時間而言之。有漸漸減退者。有猝然減退者。以其感覺而言之。有腹中脹滿不舒者。有疼痛拒按者。有如枵腹作痛者。不能一概而認。艾葉紅糖茶乃通經之劑。如不能確斷其爲淤血內阻而經少。何可妄用。服之而仍不效。反致痛連胸腹。可見與瘀血無涉。紅花亦不可服。比症未明。原委未敢處方。月月紅白鳳丸等。不知其藥性。與尊夫人病症是否相合。亦一問題。亦未敢率爾介紹也。

## 月經不調

仁

女子自十三四歲至四十八九歲間。月經必一月一行。無有或誤其間者。反之則非屬懷孕。即屬受病矣。雖亦有三月一行或一年一行者。惟百人中未必有一二人耳。通常月經之期。平均約二十八天。逾此期者。皆非康健之徵。略舉如下。

一、月經超前數日者。由於血熱過甚。血行較速。行經之成熱期較早。於是月經超前同時。恒兼見各種熱象者。如身熱頭痛。便祕口苦。舌黃心煩等象。凡向有此種情形者。宜於月經未行之前。忌食辛辣發熱之食品。大便宜使其每日通達。即不易致此。如月經既已先行。而熱象猶未減退。則應用清

理血分之藥方。

淡黃芩四錢 粉丹皮三錢 京赤芍錢半 天花粉三錢

金銀花三錢 連翹壳錢半 福澤瀉三錢 瓜蔞皮三錢

二、又有身體素虛。虛火甚盛。舌光紅無苔。晚間微熱。口唇乾燥。頭暈目眩。耳鳴時作。月經超前而至。或不及二十日而又至者。此係平素久患虛弱。月經時常不準者。宜於平時調服滋陰補虛。潛伏虛火之劑。擬方如次。宜常服之。

阿膠珠三錢 細生地三錢 淡黃芩三錢 當歸身三錢  
炒白芍二錢 地骨皮三錢 大麥冬三錢 牡丹皮三錢

京元參二錢

三、月經之遲行者。大抵爲月經將行之前。穿着單薄。而受寒冷。或誤食寒冷之品。如水果冷茶或冰類冷飲。逗留中院。

即使血液凝聚。阻止卵巢成熟。月經遲遲不行。大抵兼見腹痛。骨楚畏冷。腰痠諸象。尤以腹痛爲最顯著。酌服下方。用散寒祛瘀法。

紫蘇梗一錢 紫丹參三錢 台烏藥錢半 全當歸三錢

大川芎一錢 金鉛子錢半 炮薑炭四分 紅棗二枚

四、月經遲至。亦有因身體虛弱。血分虛少。月經遲遲不至。行時其色淡白。爲量甚少。其人面色慘白。心悸怔忡諸象。此證宜於平時調理。常服補血之品。

五。月經不調原因多端。如有因肝氣橫逆而致月經不應其期者。為婦女所常有。症情不一。治法各別。若細細分敘。雖數萬字亦難盡舉其例。略舉其要。以供裁酌。而備不時之需。

## ■月經反常問答

尤學周

問 女子經水。一月一至。為常。其有三月一至。半年一至。一年一至者。又何故耶。

答 三月或半年一至。謂之居經。一年一至。謂之避年。若常此按期而至。乃生理上之關係。並非病象。但較諸常人體質似差一籌。宜多服溫補之品。以助其化源。或可轉為月行。傳青主有助仙丹一方。可以參酌用之。方用白芍。陳皮各五錢。白朮(土炒)。白芍(酒炒)各三錢。菟絲子(酒炒)二錢。山藥(炒)三錢。杜仲一錢。甘草一錢。河水煎服。

問 經期月水不至。無故吐血。有若何危險。

答 月經以下行。為順。上行。為逆。婦女當月信之期。不善調養。外邪乘隙襲入。血室經期一至。下行之血。無路可出。又值拂逆傷熱。肝氣上逆。血乃隨之上出。不特見之於口。有時亦見於鼻。此名倒經。並無大危險。不必驚慌。用韭菜汁一茶杯量。便一杯。沖和溫服。或用好墨磨水一盞服。其血止後再用歸尾。紅花各三錢。煎服。以漸將通關導之下出。或用四物湯。

(熟地芍藥。當歸。川芎)。加大黃服之亦佳。

問 月經以上行。為逆。其治法亦得聞矣。然婦女當經來前一日。大便見血者。何故。比亦下行也。是否為頓。

答 月經以下行。為順。謂其能循規而行也。如不從前陰而從後陰流出。失其常軌。不得謂順。蓋女子生殖部分。與直腸為鄰。胞宮之氣不能攝血。以致錯經妄行。流入直腸。而為便血。用順經兩安法。當歸五錢(酒洗)。白芍五錢(酒炒)。大熟地五錢(九蒸)。山萸肉二錢。人參三錢。土炒白朮五錢。麥冬五錢。黑芥穗巴戟肉各一錢。升麻四分。或用薯蕷八兩。(鹽炒)。炒蒲黃六錢。研末為丸。梧子大。每服三十九粒。空心下。

問 孕娠以後。經水即當停行。嘗見有懷胎以後一二月。經水仍如期而至者。何以故。

答 婦人懷孕。其經水即留作養育胎兒之用。若其人血氣充實。供過於求。其所餘者。仍還為經水。此名盛胎。身體如常。保持其原有康健狀態者。無病不必服藥。若懷孕數月。血忽大下。並不按期者。此名胎漏。其原因不同。治方各別。當另述之。

## ■調經之要義

柏良

女子經水。一月一行。不愆其期。故謂之月事。又謂之月信。至

醫生實爲大誤。當知月經乃生理之一種現象。何秘之有。亦何恥之有。故一旦覺有不適。月經呈異常之狀態。宜速告慈母。或就醫生調治。不可自誤。

### ■室女閉經

秦丙乙

四十五歲以後。即無準期。嗣後即漸次閉止。此乃衰退之徵。爲生理上應有之現象。如青春或壯年。月經忽前忽後。忽多忽少。則爲病象。

月經不調之症。甚爲普遍。其受病之因不一。或由行經不慎。或由房事非時。或由六淫之波及。或由七情之影響。其證狀。約言之。爲不調與不準。二端。然不調不通。中有兼疼痛者。有兼發熱者。此分而爲四也。細詳之。不調之中。有先期而來。有後期而至者。不通之中。有血虧者。有血滯者。疼痛。有時常作痛者。有經前經後作痛者。發熱。有時常發熱者。有經行發熱者。故名爲調經方法。不一。皆在臨診時之機變。

女子性情恒多偏執。不善化解。偶有拂意。不易消釋。故每由拂意而成煩惱。而憂鬱而疾病。逐步漸進。月經因以不調。此爲最大之原因。最好爲女兒時。由家長之指導。養成寬大之胸懷。將此不良劣根性。力行祛除。凡事自尋快樂。行之日久。自無煩惱憂鬱之產生。所謂忍一朝之忿。無終身之憂者也。月經來時。最忌寒冷。下體須較平時爲暖。忌冷物。慎風寒。偶犯之。宜飲熱湯。或服和緩之藥以調理之。此雖小事。而所關至重。因經期受寒。子宮易於發炎。往往久而不退。造成月經不調之徵象。

年輕女子。以月經爲秘事。苟有不適。恥於告人。又不願聞諸。

治療 此病原因。既有如上述。言治療當亦非一朝一夕所能。

室女閉經一病。在現今社會。頗佔極大之勢力。意或環境使然。歎愛將此症之原因與治療簡述於后。用告世之患病者。原因 室女氣血渾全。何得有經閉之發生。其非一朝一夕之故也。明甚。自來女子善懷。當及笄之年。情竅甫開。漸知一切。其或素性貞嫻。紅顏自命。覩燕蝶之雙飛。繕鶯鶯而增感。脈脈含情。難以自遣。所願不遂。積想在心。夫心生血。脾統血。如此日復一日。鬱結不解。則心氣不開。脾氣不化。胃納不馨。水穀衰少。無以化精微之氣。心不能生血。脾不能統血。而血脈遂枯。經云。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。爲女子不月。此之謂也。不寧。唯是貞嫓之女。雖非浪漫者。之比。然而思想無窮。相火終必熾盛。如此則心既不能生血。脾亦不能統血。而肝火又旦旦而伐。熬煎其血。經猶安得而不閉耶。職是故也。此病之患者。非盡屬浪漫之女。即貞嫓安靜之輩。亦往往然也。

能濟。况進一步言。無情草木。焉能醫曲折之心病。是宜亟與

婚配。俾心滿意足。鬱結立解。則經水自行。舍此法誠末由也。

或曰。抱病縊烟。恐未法之萬全爾。曰。否。果必待經通而成婚。

則病愈深而根愈固。正非病家之福。蓋解鎗繫鉛法之善。無

逾此者。惟茲後當存縊烟爲療病之觀念。與尋常之婚不同。

常以襟身自矢。知所節養。則自萬全而無失矣。至藥物療法。

果假之以時日。持之以恒久。亦未始不可以挽回於萬一。初

起通治。主以加味逍散加減。(柴胡當歸白朮白芍茯苓

甘草丹皮山梔)而香附澤蘭麥冬龍膽黃柏黃芩之類俱

可隨證參加。後用歸脾湯。(人參黃芪白朮當歸茯苓遠

志甘草棗仁龍眼木香)合逍遙散。若治療已窮。病仍未愈。

其反加劇。可用極苦寒極斂滻之龍蒼丸。(龍膽草蘆薈當

歸梔子黃芩黃芩木香麝香)此項治法。出自喻嘉言寓意

草。其意謂此病可療處全在有汗。以汗亦血也。故病人虛熱

多汗者。因經血內閉。止從皮毛間透出一路。設無汗而血不行。則將皮毛枯槁而死矣。所以用極苦之蘆薈味斂其汗液。

使之恢復爲血下。通於衝任。也准心病藥醫區區草木。恐不及人工治療之爲速。蓋原因之曲折既如彼。用藥之困難自

當如此也。

附白。此證亦有因血瘀而致者。但究屬少數。故不具論。

## 經閉原因

(一)

程哲

唐容川曰。婦女經閉有四。一寒症。二熱症。三實症。四虛症。寒症經閉者。積冷結氣。經水斷絕。至有歷年。胞門爲寒所傷。經絡凝堅。陰中掣痛。少腹惡寒。上行腰脊。繞臍寒痛。或瘀血不行。留爲石瘕。皆霜凝冰結之象也。熱證經閉者。胞爲血室。血室爲肝之所司。肝火橫逆。從胞脈上迫於心肺。心肺之氣不得下通。則發寒熱。頭暉耳鳴。煩燥多怒。咳逆氣上。治宜平其肝火。使肺氣得下降。心血得下注。斯經通矣。實證經閉者。婦人小腹如鼓狀。小便微難而不渴。此爲水與血結在血室也。虛證經閉者。或因失血過多。面與爪甲之色俱淺淡。黃白血既從上而脫。更何從再注胞中。以爲經水哉。治法宜止其吐衄之血。使其下行。再補其虛。則血生而氣順。下注胞中。斯經得通矣。或因過淫精竭。腎中天癸之水不至胞中。則不得引動衝脈之血。是爲陽不促陰。水不化血。宜滋補其水。以益天癸。或因生產過多。傷血血枯。或室女血枯。名爲量薄。宜大滋其血之化源。此唐氏之論。要言不煩。豈執一四物湯。逍遙散。以治婦科者。所可同日語哉。

(二)

紹衣

經閉之故。或因生殖器生長不安。或因內分泌腺缺功。因病所致者。屬於傳染病類。如瘧疾。結核病等。屬於慢性精神病類。如癲癇。及進行性癱瘓病等。屬於慢性全身性病類。如糖尿病。尿崩病。慢性腎炎。梅毒等。

又有或因遷換居處變更水土。與受寒冷。浴及操作過勞。腦部不安。或食物養料不足。讀書用功過度。或身體太肥。脂肪過多。或驚慌憂愁。思慮過度等。

凡經閉者。每逢行經之期。雖無經來。但顯有頭痛。陣熱。驚悸。惡心。或嘔吐。腹下部脹痛。身體軟弱等狀態。

其治療法。如因變換水土所致者。俟其居處與水土有定。自能行經。受寒所致者。使其全身溫暖。用熱水皮袋暖腹下部。用熱水浸足。嗣後注意衛生。以防復輸。用功過度所致者。宜多運動。常遊行於空曠之地。而注意休息。以資養腦。

身體肥胖所致者。少食富含脂肪之食品。大便須有準則。凡經閉。均須注意衛生。須令多吸新鮮空氣。多見日光。勤沐浴。及合宜之運動。

## 經閉當分虛實

阮金堂

肝傷血枯。載子素問。惡血不去。著于千金。此經閉不行之有虛有實。所當首先辨別者也。經閉之病原異常複雜。其屬於

虛者。則爲血枯。肝傷。淡溼中虛。何以言經閉不行。由于血枯。肝傷哉。內經謂中焦受氣。取汁變化爲赤。是爲血。設中焦取汁與變化之機能退減。則汁液乏生化之源。經水亦由此而告竭矣。况肝爲剛臟。體陰而用陽。血虛無以養肝。則肝受陽矣。肝虛無以藏血。則血愈枯矣。是故肝愈傷而血愈枯。血愈枯。而肝愈傷。血既枯矣。肝既傷矣。經水又安得不斷絕乎。更何言經閉不行。由于淡濕中虛哉。蓋中虛者。胃之消化力減少。脾之運輸力薄弱。是故飲食入胃。不能盡化精微。而若干分子。且必稽留于脾胃。醞釀而爲淡濕。于是壅于上者。則爲胸悶。脘脹。咳嗽。氣逆等症。滯于下者。則爲白帶。白淫等症。遂致卵巢與子宮黏膜發生障礙。而不能照常分泌。病之輕者。則爲經水衰少之症。病之劇者。則成經閉不行之候矣。

經閉之由於虛者。上文已約略言之。今當進而言經閉之實症。矣。其最普通之病原。則爲瘀血停留。或經來行房。或癰癥積聚。蓋瘀血充滿。或收精停滯。癰癥凝結。必致子宮內膜。發生障礙。而不能分泌。且排泄道路。亦必因阻塞而不通。于是惡血當瀉而不瀉。敗精當去而不去。廢穢當化而不化。遂致經閉不行。腹大如孕。而成膩脹石瘕。或乾血癆等病矣。嘔。同經閉而有此虛實之辨。吾人豈可妄認經閉屬實。而妄投攻伐之藥耶。

## ■經閉虛實之研究

王慎軒

凡女子十四歲至四十九歲之間。謂之「行經期」。雖或因體質。性情。氣候。風俗之關係。而有遲早之不同。然大約在此三十餘年之中。除「受孕期」及「哺乳期」之外。皆當有「經水」。按月而下也。若因有病而不下者。即為「經閉」也。然經閉一症。種類甚多。當分「虛性經閉」及「實性經閉」兩大類。而虛性實性之中。又有各種原因之異。茲述其大概如下。

### (一)虛性經閉

1 血液貧乏症。如頭眩。心悸。色㿠脈細。經行漸少。漸至經閉者。此因血液貧乏。不能使生殖器充血。故致經閉也。治宜當歸白芍。地黃丹參之類。

2 神經衰弱症。如神疲氣短。肢冷脈微。經行乍多。漸至經閉者。此因神經衰弱。不能司卵巢之工作。故致經閉也。治宜人參黃耆。附子巴戟之類。

3 分泌不足症。如乳癰。性寒。腰痠。脈沉。經期屢愆。漸至經閉者。此因內分泌不足。不能催促卵珠之成熟。故致經閉也。治宜黃芩。桃仁。赤芍之類。

4 消化不良症。如食少。便溏。面黃。脈虛。經期屢亂。漸至經閉者。此因消化器不良。不能產生經水之原料。故致經閉也。

治宜白朮。茯苓。山藥。苡仁之類。

### (二)實性經閉

1 瘰血停積症。如少腹硬痛。肌膚甲錯。脈象沉澁。月事不來者。此因瘀血積於子宮。新血不得下行。故致經閉也。治宜大黃。䗪蟲。桃仁。赤芍之類。

2 神經鬱結症。如滿腹脹痛。胸悶噦噫。脈象弦細。月事不來者。此因神經鬱結。不能司卵巢之工作。故致經閉也。治宜香附。玄胡。旋覆。鬱金之類。

3 分泌障礙症。如少腹冷痛。帶下連綿。脈象沈遲。月事不來者。此因內分泌障礙。不能催促卵珠之成熟。故致經閉也。治宜肉桂。吳萸。川芎。車前之類。

4 脂肪過多症。如滿腹膨大。形肉豐盛。脈象沉滑。月事不來者。此因脂肪質太多。阻礙經水之下行。故致經閉也。治宜半夏。橘紅。南星枳實之類。

以上所論之經閉。僅言其大略。至其詳細。不勝枚舉。如急慢性傳染病。重證結核病。及腎臟炎。糖尿病。精神病。中毒病等。皆有使月經停閉之可能。更有生殖器之發育不全。及生殖器之閉鎖症。由於生理異常者。則月經終身不來。即古人所謂暗經也。又有二月一行者。謂之並月。三月一行者。謂之居經。其經水雖不能按月而來。而身無疾病。且或能受孕。此亦由

於生理上之異常。非關於病理者也。

尤學周

## 經閉與乾血

婦女月經除妊娠及哺乳期間皆按月通行不失常道其有

遺前或落後者皆謂病象若臨期不至則謂之停經此時當

審其是否有孕苟無妊娠現象其為病態無疑較之遺前落

後尤為重大不可不加以注意蓋經停不行在初期或無何

種不快之感而種種之重大證候必相繼而至也。

經閉之症按之字義實包括乾血而言惟習慣上經閉與乾

血分爲二症其意指普通之停經謂經閉子宮結核謂乾血

二者雖同爲月病不至其病源不同見證亦大異粗工於此

每混雜不分往往誤事

月經停止之原因大約可分爲三類其一由於身體之虛弱遺體酒陳六腑血盛則體壯血少則體弱若血而至於乾則循

環作用全部停止尚有生命之可言耶此蓋狀其血之不足耳非真乾枯不行也。

治療之法當辨其虛實虛者宜養營補血實者宜行滯導於其受精神上之影響者則以安靜爲第一義乾血一症有虛

有實如病原尚在局部可從實症下藥若已現虛勞之象則

又以補養爲先當從虛症調治矣。

## 經閉重要調肝

吳鞠通曰經秘一症俗名乾血勞今人概用四物八珍當歸養營之類不然則用三棱莪朢大黃桃仁大攻大伐以致不

起者不可勝數經謂二陽之病發心脾男子不得隱曲女子不月男子不得隱曲者蓋陽明主約束筋骨而利機關陽明

主之脾統之肝藏之由肝下注衝脈衝脈滿則月事以時下

矣茲陽明虛飲食少血無以生月事從何而來故調經先以

胃氣爲本次以條暢肝氣爲主蓋女子以肝爲先天也如肝

及極嫌惡妊娠之婦人月經亦能猝然停止望文生義第一

頰實可屬於乾血乃乾血一症僅限於子宮結核此命名之

誤亦由對於病原無切實之認識所致也。

胃無病方責下焦或通或補視其病之虛實余謂婦人經病

實最重調肝。因女子以肝爲先天。陰性凝結易於拂鬱。鬱則氣滯血亦滯。本病必妨土。故次重脾胃。餘則血虛者養之。熱者涼之。淤者通之。氣滯疎之。氣弱補之。大要不出乎此。

## 月經或多或少

覺非

病因 月經過多者。或緣於內熱。血得熱而妄行也。或緣於氣虛。虛則血無所倚而多下也。過少者。或緣於氣滯血瘀。或緣於血衰少。其因不一。咸當以脈症爲憑也。

診斷 過多因於內熱。則必渴赤口乾。脈數舌紅。因於氣虛。則必神情倦怠。脈細少。食若因氣滯血瘀而過少者。則必胸悶不舒。腹脅作痛。若因血氣衰少而過少者。則必現不足之候。脈虛神疲是。

治法 內熱而多蒲黃散。(蒲黃。當歸。柏葉。黃芩。生地。

艾葉。伏龍肝。)固經丸。(龜板黃柏。香附。芍藥。黃芩。桔梗。根皮。

)氣虛而多補中益氣湯。(黃耆。白朮。陳皮。人參。柴胡。升麻。炙甘草。歸身。)當歸補血湯。(當歸。黃耆。)因於氣滯則利之。推氣散。(青皮。枳壳。)四烏湯。因於血瘀則通之。失笑散。(蒲黃。五靈脂。)歸仁承氣湯。(桃仁。桃枝。大黃。甘草。芒硝。)

(蒲黃。五靈脂。)歸仁承氣湯。(桃仁。桃枝。大黃。甘草。芒硝。)  
若十全大補湯。(人參。茯苓。白朮。炙草。熟地。白芍。當歸。川芎。黃耆。肉桂。)人參養營湯。(十全大補湯去川芎。加五味。

陳皮。遠志。姜棗。)則宜於血氣不足而少者也。

## 經至如湧

何伯度問 內人經來頗準。自前月起一月數至。則如湧色甚鮮明。此非佳兆。現在身體甚覺疲乏。然唇色頗鮮艷。恐內經伏熱。敢問治法。

朱振聲答 經常道也。一月一行。不失其常。故曰月經。若一月數至。不循常道。不得以月經名之。證以唇色鮮艷。確爲營分有熱。若因循失治。或治不得法。恐致血崩。不可不慎也。大生地四錢。細子芩二錢。海螵蛸三錢。當歸炭二錢。墨旱蓮二錢。京元參三錢。丹皮炭二錢。茜根炭半錢。黑豆衣三錢。鮮藕二兩(煎湯代水)。

## 婦人經期吐瀉

劉曉東

婦人有經水來時。每每嘔吐泄瀉。其由脾胃衰弱。當月水來時。血海盈滿。衝脈隸于陽明。胃氣上逆。故嘔吐。胃與脾相爲表裏。以膜相連。則泄瀉隨作。當服香砂六君子湯。數貼。俾脾胃氣足。再逢經期。自無吐瀉之弊矣。

## 經期落後腹痛

毛南松

婦女平時喜食酸物生冷水果。故月經之行必落後而腹痛。婦女怕羞並不延醫服藥。以致每至經行腹痛難忍。長此以往恒與生育有關。可以陳酒一碗。生姜三四片。赤糖一撮。以甜爲度。或燉或煎。則隨量飲之。每次經行之前。服之頗有神效。惟前白帶褐色而腹痛者不可服也。

## 口 痛經之研究

尤學周

痛經者當月經將來未來之時。小腹作痛之謂也。其輕者。小腹微覺下墜不舒。重則腹痛難忍。直至經來之後。始脫苦累。亦有牽及兩乳者。經來之前。兩乳先覺脹痛。及月經下後。方逐漸舒緩。

婦女之患痛經者。臨診之時所見甚多。約而計之。十人中有一人患之。有初次月經來潮之時。即已腹痛者。有猝然患者。有出嫁以後始發生者。痛經之患者既如此普遍。故此症實已成爲婦科之一大問題。

前人之論痛經者。非曰寒濕互滯。即曰氣血凝阻。此即內所謂「不通則痛」之意。蓋「互滯」之凝阻。之後經血不能即時下流。遂覺脹痛。與食積而促成之脹痛。其理由正同。此語言之有理。原不可厚非。然僅曰「互滯」。而不言其

「互滯」凝阻。之由來。尙未得爲詳明。爰補充其說如下。

痛經之原因。大約可分爲三端。其一關於生理者。生殖器官失其常態。例如位置異常狹窄。或閉塞妨害月經。以致不能下注而出。蓋血液停留於子宮。發生一種異常刺激。於是子宮肌肉而欲排去之。以致陣陣作痛。此症若遷延不治。將來月經益見澀滯。從而疼痛亦必加甚。其二關於神經者。神經衰弱之婦女。每見此症。此等婦女之生殖器官並無何種變化。因神經感覺過敏之故。當經來之時。似有疼痛之感。證情輕微。其疼痛之程度。遠不及生理上之劇烈。其三關於局部病理性者。如生殖器官及其鄰近之各器官。生有疾患。以致腫脹發炎。則月經來時。因充血而感受刺激。發生疼痛。斯三者。其因不同。調理之法亦各異。不可執一而論也。

經來作痛之婦女。往往有不能生育者。故一患痛經。有以不能生育爲慮。然證以臨診之經驗。痛經與生育雖不可謂全無關係。然亦不能必其不能生育。當視其疼痛之原因而定之。如上述之第一原因。生殖器官失其常態者。不特月經難下。同時亦不能受精。故難於生育。第二原因。關於局部病理性者。如卵巢。輸卵管。子宮等發生疾患者。往往影響於生育方面。如骨盤腹炎。膀胱直腸等部之疾患。雖能使經來時發生痛苦。然於生育方面。或不致受若何影響也。

經來作痛。通常名謂肝氣不宣。故牽及乳部。蓋子宮與乳部

之關係甚大。如妊娠之初月經閉止。此時尚不能必其爲懷孕而驗諸乳頭。則有可證之徵象。懷孕一月。乳頭漸形紫色。

第二月乳頭漸變暗黑色。四圍有暗色之暈輪。三四月後。其變化尤顯。產後子宮弛緩下墜。授乳以後。一受刺激。自能收縮。在授乳期間。月經不下。斷乳後。即月經復來。凡此種種。爲證痛經之影響於乳部。亦非偶然之事。所謂肝氣不宣。指神經之因刺激而發生疼痛之謂。(古人所指之肝。一部分指神經而言)。理亦近是。其說尚未透切耳。

關於痛經之治法。多宗內經「不通則痛」之意。用四物湯加紅花。丹皮。木香。附。兩頭尖。桃仁等破滯行瘀之品。此方用之於第一原因。頗能見效。第三原因。有時亦能幸中。對於第二原因。不特不能有效。反易生變。宜將歸脾湯(白朮。黨參。黃芪。當歸。遠志。茯神。木香。龍眼肉。甘草。大棗。生姜)。逍遙散(柴胡。茯苓。當歸。白芍。薄荷。陳皮。甘草。煨姜)二方。參酌用之。

## 婦女痛經治法

吳健華

暢快。腹痛即愈。

## 月經色黑

顧志道

婦人有經行色黑者。昔朱丹溪等。皆指爲熱。不知亦有屬寒者。不可不辨也。蓋以血液遇熱者。煎灼煅煉。則血中之水液減少。血球變壞。色素變深。固可由紅而變紫。由紫而變黑也。然而血液遇寒者。寒凝冰凍。則血中之水液凝固。血球堅結。色素變深。亦可由紅而變黯。由黯而變黑也。况經水非純良之血液。乃排泄之液體。固易受寒熱之刺激而變色者也。若夫不知辨別。不分寒熱。偏執丹溪屬熱之說。概用清熱涼血之藥。投于熱症。固可獲效。施於寒症。必致責事。然則經色之黑者。豈可不辨寒熱哉。辨之之法。厥有二端。一辨之於色澤。其經色黑而光亮者。爲熱。而晦黯者。爲寒。一辨之於脈証。例如面蒼口苦。內熱便燥。脈弛數者。爲熱。面白唇青。腹冷肢清。脈微遲者。爲寒。以上二法。前者雖亦甚確。惟大都由於病人之口述。間有失實之處。後者則憑醫家之詳細診斷。寒熱不難立判。治寒者。宜溫。宜熱。治熱者。宜清。宜涼。兩者易治。甚于操刃。由此觀之。彼丹溪以經水色黑皆屬於熱者。實係一偏之說。豈可盡信哉。而其他紫色屬風。白色屬痰等說。亦難盡信。由此可以舉一而反三者也。

## 婦人經斷復來

劉曉東

易曰坤道成女。女子以七爲數。二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。七七當經斷不來。如復來者。此屬氣虛不能攝血。法當氣血雙培。

處方 路參 黃芪 當歸 地黃 血餘炭 柏子仁  
白朮 甘草 白芍 川芎 元武版

## 經帶病治法大要

宗桐蓀

女子首重調經。一月一行。不愆其期。故經文稱女子之經水。謂月事後賢又名月信。經水者。取諸經之血。貯於血海而下。其不致崩漏淋漓。任脈爲之擔。帶脈爲之約。束襪三旬而一下者。以象月盈則虧耳。若非期而至。總名經病。婦人經病。有不調者。有不通者。有兼疼痛者。有兼發熱者。此分而爲四也。細詳之。不調之中。有遺前。有退後。遺前者。熱退後爲虛。不通之中。有血枯。有血滯。血滯宜攻。瘀血枯宜補。疼痛有時常作痛。有經前經後作痛。當時與經前爲血積。而經後則爲血虛也。發熱有時常發熱。當時爲血虛有積。經行爲血虛而有熱。也是四者之中。又分爲八矣。大抵氣行血行。氣止血止。故治病以行氣爲先。香附之類是。

## 調經要方

朱振聲

先期飲 當歸 白芍 生地 川芎 黃芩 阿膠 艾葉 香附 炙草

(按)此方治經水先期內熱重者。有涼血固經之妙。唯方中知葉芩連。有疑爲苦寒太過。不知血分熱重。胃強善飯者。服之不啻一服清涼散也。況有四物養血。而艾葉香附炙草。都屬溫性。更可無妨。宜空腹時溫服效。

過期飲 當歸 白芍 熟地 香附 川芎 紅花

桃仁泥 蓬莪述 木通 桑甘草 肉桂

(按)四物養血。炙草和中。香附行血中之氣。紅花桃仁莪朶木通行血去瘀。而尤妙在肉桂。溫通血氣。血得熱而行。無寒凝之患矣。若虛者去破血藥爲是。

固經丸 黃藥 白芍 黃芩 鎮板 檉根皮 香附子  
(按)經水過多不止。乃陰虛挾熱所致。法當補陰清熱。此方

也。熱則流通。寒者凝塞。故治血病。以熱藥爲佐。肉桂之類是也。簡易療病法。如血滯。多服茺蔚子。血枯。常服二泉膠室女。經閉。肌削汗多。溫補不效。宜用極苦之藥。斂血內入。而下通于衝脈。先令汗止。自然藥退經行。蘆薈丸。日進三服。一月後日進一服。甚效。

主之乃丹溪之法。以肝腎爲主。四物中只用一物。非尋常套方者所能知。

地骨皮飲 生地 川芎 當歸 白芍 地骨皮 粉丹皮  
(按)經行超前多由于熱。蓋由陰虛陽旺而然。此方清血熱之中而有和陰補血之效。血得補而充。熱得寒而清。平肝而不傷胃。與知蘖之苦寒迥別。實良方也。

烏藥湯 烏藥 香附 當歸 木香 炙草

(按)治氣瘀血海作痛。此方理氣行經。藥不多而效自見。因血隨氣行也。

失笑散 五靈脂 蒲黃

(按)治心腹綻痛欲死。或血迷心竅。不省人事。此方甘不傷脾。辛能祛瘀。製末用酒調服。更能溫通氣血。不覺諸證悉除。

直可一笑置之矣。

溫經湯 當歸 白芍 桂枝 吳萸 川芎 生薑

半 夏 丹皮 薏苡 人參 甘草 阿膠

(按)此金匱婦科主要方。也治寒凝血滯。少腹作痛及經脈不調。治有特效。胞中溫和。則能受孕。若風冷侵入。則經行而痛。此頹婦人。每無生育。此方備溫補通行之效用者。多驗。若無熱去丹皮。

## 經期不準與胎兒關係

問 內子十五歲嫁時。身體已成熟。直至今年十七歲。月經不準。總是落後數天。惟今歲正月。經期一準。即就懷孕。這種現象於她身體之康健上。有無關係。所生子女是否確係衰弱。(陳君棠)

答 經期由不準而轉準。且即此懷孕。乃身體健全之徵象。所生子女能哺乳合法。決不致衰弱。無容疑慮。不可亂投藥石。

## 崩漏帶下

婦人血崩不止 抱琴

鄰婦年四十。體素康健。某日農事過忙。終日未息。晚上血崩。有謂棕櫚炭灰。酒沖服可愈。急如法製服不效。血流過多。面色灰白。暗矣。有謂煎參湯灌服可愈。即向富家借來人參一枝。倉卒不及煎湯。咀嚼下咽。瞬息血止。色亦變和。相將慶幸。後有患者。用獨參湯灌服。無不奏效。真神方也。

(按)西醫常誣人。參謂爲無用之物。安知具大補元氣。有旋轉乾坤之妙。氣虛血脫之症。用參須重濃煎服。且不可

用他藥監制。

邱治中

## 血崩須知

大約遇着血崩忽然昏倒。不省人事的時候。須將枕頭減低。頭部用熱手巾溫貼。手脚用熱水袋或熱水瓶溫暖着。飲料最好用葡萄酒須和糖少許使血液流動得更快就可恢復知覺。不妨再請婦科醫生想個根本辦法。

## 崩漏要方

獨參湯 人參

(接)此方於氣幾息。血將脫之證。速即濃煎頓服。能挽回性命於瞬息之間。非他物所可代也。良以有形之血不能驟補。而無形之氣所當急固。人參能補氣安神。故暴崩不止。氣隨血脫者無不相宜。若病兼別因。則又當隨機應變。獨參湯中或加熟附。補陽而回厥逆。或加生地涼陰而止吐衄。或加黃芪。固表之汗。或加當歸。救血之脫。或加姜汁。以除嘔吐。或加童便。以止陰煩。或加茯苓。令水化津生。治消渴泄瀉。或加黃連折火逆衝。上治噤口毒痢。各隨見症之不同而加減之。則其效更可相得而益彰矣。

歸脾湯 人參 白朮 茯神 藜仁 龍眼 黃芪

當歸 遠志 木香 甘草 姜棗

(按)此方補肺脾之氣。而養心脾之血。心生血。脾統血。心脾旺而血有所歸。肺主氣。肺旺而血有所攝。凡脾虛而致崩漏者。宜之。

補中益氣湯 黃耆 白朮 當歸 陳皮 柴胡 生薑

(接)氣虛而崩漏不止。其脈沉微。神疲力乏。納少面黃。此方有參耆朮草以補氣。當歸和榮血。陳皮利氣機。薑棗具和中之性。升柴有升清之功。氣充則崩漏自止矣。

升麻 柴胡 薑棗

蒲黃散 黃芩 當歸 柏葉 蒲黃 生薑 艾葉

(按)此方重用生地。少用艾葉。並無補氣之藥。清營泄熱是其專長。蓋熱清則血止。血崩之因於熱者。宜之。

## 白帶概論

仁

白帶一症。為婦女最流行之病。但種類繁多。因人而異。各有不同。苟非細加研究。而予以對症之藥。甚難斷根。故分述如下。

一、白帶有因氣體虛弱而發者。體虛而元氣不固。衝氣約攝無能。最易發為白帶。一經勞動行走。帶下淋漓不已。此種

白帶傷身最甚患之不久即易面色萎黃精神倦怠肌肉瘦削兼發盜汗潮熱之屬入於虛弱狀態此種症象最宜從早就醫診治遷延日久即癆病之漸治法宜用補攝元氣之劑。

二、白帶之病有因濕熱困蒸下部所致所謂濕者即鬱血作用水份分泌排泄之能力不強水濕停留於下部必其人缺乏運動或常居潮濕之地或常居閨房懶於動作遂致水濕無推行排洩之機會積時既久乃成白帶此症在婦女患白帶之中比較最多治之之法在逐濕清熱或用利濕之劑或用燥濕之劑或用健脾之劑或用通小便之劑隨症施用尤宜每日作相當之操作適可之運動則氣血交流濕無停留之可能否則一時醫愈終必復作中國婦女缺之運動與操作故而患白帶者較為衆多誠不可必要何患濕之易生矣。

三、一切病症皆由『太過』與『不及』而起苟得其平即為無病白帶病中又有因勞動過度而得者此類白帶宜求休養若兼見其他虛症者宜就醫診治

四、白帶有因房事過度而起者神經衰弱白帶粉下縱慾過度慾火更熾逼灼愈甚帶下愈多此類白帶傷身最甚能

致月經銳減新血不增皮色萎黃面斑滿佈神氣灰滯意志薄弱舉止輕暴每不數年而衰老不堪或成瘻瘍拘攣風癱癲厥之病故一有此類白帶即宜決心節慾並從事醫治

養否則未有不爲血枯之症者。

五、白帶有因懷春隱曲所欲不遂而作者未婚之女及壯年寡婦多有患此此爲神經作用不宜聽其久鬱帶下一則宜早圖琴瑟之好一則宜更易其不良之環境因勢利導非就醫服藥所克奏效。

六、白帶有因子宮寒冷而起者溫化無能帶下薄白多而不黏此類白帶傷身亦甚其人畏冷腹疼腰疼重墜足部寒冷患者每缺乏子臟月經不調日趨虛弱務須就醫診治長時期進服溫補子宮之劑。

七、白帶有因脂肪質過多子宮中生黏痰狀濁物此類白帶與濕熱所致之白帶症似同而實異治法宜清潔子宮蓋亦有碍於生育也。

八、白帶有因與不潔之男子交接傳染花柳病而起者成爲白濁性之白帶者目下婦女患此者屢見不鮮此種白帶治療時宜用解毒逐濕如草薢分清飲之類斷不可濫用升提陷毒之劑胎毒繩於未來之子女切宜注意又宜慎用輕

九。白帶有因陰部不潔而起者。濕癰非常。惟爲數不多。治之最爲簡易。購硼砂四錢。冰片三分。蛇床子末三錢。潼蒺藜三錢。白藜四錢。金銀花四錢。均研末分數次。養水洗滌下部可矣。

十。白帶有如黏膩厚痰質如膠凍狀。此類白帶最爲險惡。往往不易治愈。凡向患癆病而忽見此者。即係死兆。常人得此亦非輕症。亟宜醫治。

十一。白帶有因心腎病而來者。腎氣不納。多事行動操作。白帶即易一衝而下者。亦有一經嘯白帶即易下流者。皆爲虛症。亦有脾腎虧弱而來者。亦有因肝氣旺盛而得白帶者。亦有因產過多氣血大衰而來者。亦有因月經不調而來者。種種不同。治法當視其原因症象。逐一設方。始克痊愈。

## 白帶治法大要

楊志一

女子帶脈不固。下部時流稠液。綿綿不絕。有如帶之象。故名白帶。其原因不同。治法亦各異。如由於濕熱者。宜用威喜丸。

(黃蠟白茯苓各四兩) 及二陳湯。(陳皮半夏茯苓甘草) 加黃柏知母滑石。烏賊骨。銀杏肉等。以清理濕熱。

(按) 黃蠟燥濕。茯苓淡滲。二味相合。治濕熱帶下甚效。虛者

固精丸 蓼蘆 滌蒺藜 炙龍骨 炙牡蠣 茶實  
(按) 蓼絲強陰益陽。五味滲精。生水石蓮清心。山藥補脾。茯苓甘淡而滲。于補正中瀉腎邪。治下元虛損帶下。滑脫者。有甚效。唯屬於痰濕及有濕熱者忌用。

## 白帶要方

茯苓菟絲丹 菟絲 茯苓 五味 石蓮 山藥  
(按) 菟絲強陰益陽。五味滲精。生水石蓮清心。山藥補脾。茯苓甘淡而滲。于補正中瀉腎邪。治下元虛損帶下。滑脫者。有甚效。唯屬於痰濕及有濕熱者忌用。

威喜丸 黃蠟 茯苓

不宜或兼補益藥服則無害。

## 不孕與求孕

### 求子方法

瘦秋

#### 倒拖七道溝

婦女不育。是因為生理上的變態。這在稍有知識的人。總可以明瞭。（編者按。並且不一定是婦女生理上的關係。也許是男子生理上的關係。）但是我國的民衆醫藥常識太不普及。而迷信舉動。倒是極為普遍。因為這種緣故。所以就發生種種荒謬的舉動。像求子咧。抱泥人咧。真是難以枚舉。現在我所說的倒拖七道溝。就是迷信的一種。在江北的鄉間。很是盛行。

事實是這樣的。如有某一家的婦女。多年不能生育。她的丈夫因為求子心切。就要實行倒拖七道溝了。先邀集幾個朋友。預備繩索。乘他妻子不防。把她拉倒。提着兩足。向前拖着走。一面由她丈夫問她。『你養不養？』這女人就要說。『我要養。』『我養哪！』於是這一幕趣劇。就算終了。據說在從前。非要施遇七道土溝不可。現在呢。總算改良了。祇要她回答。即止。

『我養哪！』以後。就把她釋放了。

在廢歷正月十六日。淮陰西門外洪門街的瓦匠王學禮。曾頑過這一套趣把戲。當時她被拖得皮破血流。但是因為臉皮太嫩。不好意思說我養哪。然而她越是不說。她丈夫越拖。得厲害。最後經她丈夫打了幾下。她終屈服了。大喊『我養哪。』『我養哪！』

### 痛經與不孕

梁闡放

尋常婦人之子宮。前面貼於膀胱。腹內之壓力。屬於子宮頂。後面。令子宮向前。其子宮頂是向近恥骨關節。子宮長軸與陰道長軸。乃如曲尺形。故正常之子宮位置。其子宮頂向前。面向恥骨關節。子宮頸則向後而向薦骨。患痛經而兼不孕者。多因子宮前屈。

子宮前屈亦可分爲三等。(1)子宮體前屈。(2)子宮頸前屈。(3)子宮體子宮頸前屈。

子宮前屈病。爲未嫁或已嫁而未曾受孕者。所患之病。其病原多由於胎生發育不足所致也。

子宮前屈之主要病狀。(1)痛經。(2)不孕。

其不孕是因子宮前屈能阻精蟲之射入子宮之故。

治法當用手術令其子宮頸道直而大其法即以脹條入子宮頸內緩緩擗之。

展太子宮頸道之時間最宜於經期後一星期用展具時宜用全身麻醉法。

## 口白帶與不孕之關係

經康壽

白帶一症爲婦人生殖器疾病乃月經以外之分泌物也健康之婦女決無斯病在普通人以爲非病實則不然倘不防漸杜微爲之治療而罹身體於衰弱之境比比然也惟其原因其主要者爲傳染治病或經來時不講衛生房事過度或產後不知保養以及西醫所謂子宮內膜炎質變炎癰腫筋腫卵巢炎陰孔炎等症或出分泌物其種類亦不同有透明如水者有不濃而白者有青而黃者有似血色者有無惡臭者有惡臭不堪者然皆爲子宮有病之證爲不孕之絕大原因也蓋婦人無子之理由有三一爲分泌物有碍精蟲之進路二爲受孕而無發育三爲白帶含有酸性能殺精蟲雖此說探之西醫然中醫婦科書中謂帶多主不孕亦數見不鮮矣治療之法宜息心靜養清潔局部再按其主因而治療之則帶止經調能熙之占可操左券矣。

## 口衰弱不孕之治例

李健頤

拙荆素屬寒體外觀雖見豐肥而內實血氣衰弱月經素來淡白如水骨節酸痛約六七年間未添男女心甚不安凡溫經湯種子丸歸脾湯等……偏管殆盡皆無獲效改服西洋仍乏效果吾以是悄悄憂而悄悄悲也一日俯仰焦思細心揣摩尚乏妙術可以療治者觀其行動舉止如無恙惟其性交時不知感快樂之情趣世常懷懨懨不樂之狀態真如此病者誠世之罕見也以後漸漸推究經診其脈乃如此症是由血氣衰弱子宮寒冷所致蓋血衰氣羸則月經淡白如水月經淡白則不能生育卵珠故性交之時不知感快樂也夫婦人以月經來時爲卵珠成熟之期卵珠既熟子宮溫暖遂起一種淫慾之火以刺激醜渾骨之神經引起愛情之感動者即爲有子之期也否則病矣按拙荆之病既爲血衰氣羸即宜大補氣血氣血強壯子宮溫暖即易得胎遂用黃耆四兩當歸二兩大紅棗四兩龍眼肉四兩鹿茸(羊油炙)四兩好酒六碗浸一星期日服二次各用一杯燉熱空心服溫服至半月零自覺心中稍有溫暖之狀子宮裏亦覺有熱之刺激者月經變爲赤色精神清爽四肢靈動經淨之後竟懷六甲至十一月間添一男後因勞碌過度舊恙復發將及七

戴。又未添弟妹。施恩前年所服之藥。雖試有效。然猶在懷疑中。不如再試以證實驗。是否用原藥投之。果如前效。又添一女。以後連試三四次。皆驗。由此觀之。婦人患血氣衰弱。子宮寒冷。不能生育者。此方爲最鄙人屢次試驗。以確證者。

## 墮胎與安胎

明倫

墮胎。近幾年來在上海婦女界很流行。是頗值得注意的一件事情。

在蘇俄婦女墮胎在相當條件下聽說是不禁止的。世界除蘇聯以外的大國。例如法、英、美、日、德、意諸國。法律上多認墮胎是犯罪行爲。中國刑法亦有墮胎罪的專條。可是正如其他犯罪一樣。法律的效力好像並不能減少犯罪的數量。各國法律上雖然禁止墮胎。而事實上並不會使那事件不發生。我沒有詳細的統計及調查。不知道禁止墮胎的各國中的墮胎事件。是不是比不禁止墮胎的蘇聯的墮胎事件少。墮胎之風過去是以法國最利害。致使法國政府於消極禁止墮胎之外。更不得不有許多產兒的獎勵。而法國婦人之所以歡喜墮胎。是因爲她們愛好享樂。婦人生育兒童之

麻煩與討厭。那是事實。育兒麻煩而在有錢的人有請乳婢的辦法。且不說。生產時是何痛苦。我們不會經驗過。亦不談。就是在胎裏的那幾個月。有的婦人終日頭昏嘔吐。已很夠受。即不嘔吐。大腹便便的去交際或旅行也多不方便。盛宴或者茶會跳舞之類。亦多不能參加。這在享樂慣了的太太們。不能不說是很痛苦。

所以我認爲有許多多的墮胎事件。實在是爲了享樂。除了享樂之外。世間還有好些原因。使人處在某一種境況。除了墮胎沒有第二條路好走。例如封建社會舊禮教家庭中一位沒有出閣而肚裏却懷起胎來了的小姐。以及夫婦兩人的勞力。僅夠兩人的開支。而沒有養育一個孩子的力量。那妻子更沒有育兒懷胎等悠閒的歲月及時間。諸如此類的原因。亦常會逼得使人去做那所謂犯罪的行爲——墮胎。

但站在國家的立場上。國家要素之一的人民自然是愈多愈好。那就無怪乎認爲墮胎是一種罪大惡極的行爲。不過。用優生學來講。倘沒有力量培養教育。徒然把那種在將來無法受教育的人類衆多的遺留在世界上。却也並不是一件好事。能乾脆的不使那一類東西而到人世間來。倒也是

橫直是作牛馬。何必自己再給他人去製造牛馬。

然而繁殖慾是生物界所共有的。不要說動物吧。就是植物亦會適應其環境。借用許多方法以繁殖其種子。而母性的愛更可以說是天然的慈愛的母親之所以能下殘酷的辣手。毀滅她的沒有見面的孩子的生命總有一種說不出的「苦衷」。社會既改成那許多慈母會有的那許多「苦衷」而不根本上着手去消滅那些下毒手的慈母的那些「苦衷」全憑權力用威嚇的法律條文。會有什麼效力。因了法律的禁止。墮胎更還會生出更多的悲劇。例如造成醫生敲詐的機會。以及用不科學方法的秘密產婆傷害產母之類的事件。

在中國內地的農村社會。現在仍可以看見許多夫婦自己刻苦的生活之下。愉快的養育許多孩子。他們想不到墮胎人類天然的繁殖慾。他們天真地保存着。

## ■求墮胎法

朱振聲

問 某女月經未來已有三三月。常覺頭痛腰酸。作事易倦。噁心嘔吐。常有不樂。喜食酸物。想必受孕無疑。最好請給一墮胎法。此女家內經濟困難。其夫犯法已在牢獄之中。已有子女二個。目下又有孕。將來怎樣可過。平日做工日得六角。

錢以前又無銀錢積蓄。常與吾談此事。吾為其苦也。故只請先生代為設法。雖墮胎為法律所禁止。但是照這樣看來。非墮胎不可也。未知先生以為如何。敵只得敬請給一墮胎藥方。萬萬勿誤。淚求賜之。感謝之至(如心)。

答 境胎不特為法律所禁。亦有背於人道。敵社同人所不敢為。亦不願為之者。足下既憐其苦。當為之籌一妥當之法。何可出此犯法之下策。且墮胎一事。危險殊甚。用之不當。性命攸關。此非智者之所為也。浪上慈善事業甚盛。不如任其瓜熟蒂落。後送入育嬰堂。則生活上可以少一費累。而又不損於道德明達。如足下以為然否。

## ■妊娠胎動將墮方

此症多因衝任經虛。受胎不實。或飲酒房事過度。跌閃擊觸。損動胎元。或七情不舒。傷動血脈。或服緩補諸藥而不相宜。皆能使胎動不安。腹中絃痛。或下血及黃汗。但因母病而胎動者。可先治母病。其胎自安也。或因胎不固實而致母疾者。但當安胎。其疾自愈。服方列后。

川杜仲錢半 沙條芩錢半 清阿膠三錢 煙牡蠣六錢  
桑寄生錢半 白歸身二錢 川芎八分 陳苧根三錢  
菟絲子三錢 炒白芍錢半 炒冬朮錢半

## ■ 安胎問題

郭柏良

婦女於妊娠期內其變化甚多最著而最普遍者為腳腫及泛嘔作吐。脚腫於懷孕六七月後始見。泛嘔作嘔則見於一星期及一二月內。此外如子嗽子淋子癟子煩子眩胎漏等不一而足。原因不同。證情之輕重亦各別。輕者來勢緩和。胎兒胎婦亦無何等影響。產後即能自平。重者來勢急驟。繞孕婦無生命上之危險。而胎兒之安全實未可逆料也。妊娠期內發生變化者大多為不甚健全之婦女。如素有胃寒及泛嘔作酸等症者。孕後必泛嘔作吐。且較常人為甚。素有肝陽或肝氣者易於發生子煩子眩身體虛弱者則有腳腫胎漏等之現象發生。至於健康之婦女可以免除此患。偶或發生證情亦甚輕微。

所謂安胎乃除去其病源。恢復孕婦之康健也。孕婦康健胎亦自安。必得瓜熟蒂落之美滿結果。決不致中途有流滑之處。世人昧於斯道。事前既不實行衛生康健之法。妊娠期內偶有變動亦不推求其故。即以安胎為第一要著。甚至毫無改變。故亦妄用安胎之法。忘服安胎藥亦可謂庸人自擾矣。世有所謂安胎良方。安產經驗方者。一般無醫學常識之慈善家。每附刊於書畫之後。復為之頌揚稱道。故神其方之靈。

異或假造不經之故事。以證實其志。固堪嘉其事實無益而有害。蓋體質有不同。證情亦各異。安有一方而概治一般之理。嘗考各種安胎方中所用藥品。大率為培補之品。非特有病者不可服。無故服補亦恐有難產之虞。此不可不慎也。

## ■ 安胎之研究

王鞠坪

產前有病。以安胎為第一義。人盡知之。不知胎之所以不安者。病為之耳。病不去。則胎不安。雖日用安胎之藥無效也。然則欲安胎者。必先審病之所由來。而攻去之。病去。胎安。其效甚捷。並非安胎之藥。却是安胎之方。竟有碍胎之味。反收安胎之功者。必是豈膚淺者所能識哉。即如厚朴枳殼半夏皆為孕婦所忌。然濕溼氣逆者。舍此不為功。甚至大黃芒硝根實乾薑桂附。更非孕婦所宜。然熱閉寒滯者。非此不能治。昔黃帝問於歧伯曰。婦人重身。毒之如何。歧伯對曰。有故無損。亦亦自安。必得瓜熟蒂落之美滿結果。決不致中途有流滑之處。世人昧於斯道。事前既不實行衛生康健之法。妊娠期內偶有變動。亦不推求其故。即以安胎為第一要著。甚至毫無改變。故亦妄用安胎之法。忘服安胎藥亦可謂庸人自擾矣。世有所謂安胎良方。安產經驗方者。一般無醫學常識之慈善家。每附刊於書畫之後。復為之頌揚稱道。故神其方之靈。

## 安胎驗方

敖知白

病狀。懷孕在五六月間嘔吐異常。不思飲食。四肢無力。腹部脹痛。

治療。理血健脾清熱。  
主方。當歸五錢。熟地六錢。白芍三錢。川芎錢半。白朮五錢。黃芩二錢。(方內之白朮黃芩可因患者寒熱虛實而增減用之。)

治驗。鄰婦某素患小產。每孕五六月間上症畢現。前醫每授以保產無憂散。或其他養胎方。而前症轉劇。後余教伊服此方三劑。諸症若失。月滿適產一男。以後凡孕婦患上症者。投之輒效。百不失一。真良方也。

## 胎前

### ○孕婦衛生常識

A. 懷孕。已婚的青年女子受孕是自然的現象。算不是一種疾病。這一點須特別了解。不要誤會。中國一般婦女不知孕婦衛生常識。所以常常誤食藥物。以致發生很多病狀。但也有許多的疾病。是可以預防或治療的。甲。懷孕與婦女身

體的影響。——懷孕後的婦女身體。各部增加工作。如母體與胎兒之營養之排洩等。故母親須有充分的營養和休息。

乙。懷孕的期限。——(一)平均二百八十八天。或九個月零七天。(二)計算預產期。按末次經期來的日子起。加上九個月。

然後再加七天。如末次月經起自二十一年九月二十二日。加上九個月零七天。就是二十二年六月二十九日左右丙。受孕之徵兆。——(一)月經停止。青年結婚女子。月經素日正常。一旦停止。有懷孕之可疑。應即就醫診斷。是否受孕。(

(二) 朝凜。孕至二三個月時。有微量嘔吐之狀。故早晨可先食少許食物。緩緩起床。以防嘔吐。(三) 乳房變化。初婚懷孕在三四個月後。乳房漸漸漲大而硬。同時乳頭變黑紫色。並能擠出淺黃色的稀薄乳汁。(四) 小便次數增多。懷孕在三四個月後。因爲子宮漲大膀胱受壓的緣故。所以小便次數增多。孕至六個月時。子宮漸升入腹腔。膀胱所受之壓力減輕。至臨產期。因胎兒下降膀胱復受壓。而小便又勤了。(五) 局部變化。甲。乳頭變成黑紫色。乙。腹皮有裂痕。並變褐。色裂紋。丙。女陰變成深黑色。(六) 腹部漸漸增大。並於五個月時。腹部漸次漲大和胎動。(七) 醫師診斷。五個月以後的胎兒。能聽出胎心及摸得胎兒的方位。

B 孕期的衛生  
(甲) 飲食——應易於消化及營養充分的食物。一、植物米麵。蔬菜如白菜、菠菜、胡蘿蔔、豆類、西紅柿等。二、動物鷄鴨、魚肉類等。每日一次不可過多。以防胃的工作過勞易得孕期血中毒。三、菓品棗子、蘋果、橘子、梨桃等，均有益於身體。四、水多喝白開水，每天宜飲八、大杯。五、忌食甲富于刺激性的飲食，如煙酒濃茶、咖啡、辣椒等。乙、孕婦不宜常服藥。(乙) 衣服——衣服宜寬大、輕鬆、重力懸在肩上。胸腰二部不宜束緊。圍腰可用以托腹。(丙) 孕婦身體應注意懷孕期內的牙，最易生病。所以當預防產後脫牙與出血和牙酸痛等。其法只多食含石灰質的食物，如玉米豆類、雞蛋、牛奶等。和早晚及飯後必刷牙。必要時請牙醫檢查一下更好。(丁) 乳部的保護。內凹乳頭不便哺乳嬰兒，且授乳時容易破裂。所以在孕期應常用手外拔並用肥皂水洗乳頭，以便軟硬適宜。三、陰部女陰外部應常洗滌，以保清潔。(戊) 日常生活——一、要有新鮮空氣和日光，可在戶外有相宜的工作。二、睡眠要充足，每日至少八小時。午後要休息一二小時。睡時開窗並寬解衣帶。三、操作和運動不宜劇烈，至于輕便家事可藉以活動身體。四、沐浴。孕期前六個月可以沐浴。產前三個月只宜淋浴或擦身，不可浸坐于浴盆中，以防胎大小產。五、大小便通暢，以免毒質散入血中，免便結。

C 孕期的疾病  
應早期診斷和預防，以免發生危險。  
(甲) 胎毒的症狀——嘔吐。三個月以後繼續的嘔吐須加以相當的注意。可少食魚肉，多食青菜、菓品，多飲開水，多休息，又頭痛是胎毒症狀之一。有時因便結或眼病而致頭痛，均須多加注意。三、水腫脚和外陰戶有水腫現象的，當先延醫診視。

以防胎毒並且高抬腳部及鬆解帶子，以防血管被壓。四、尿含蛋白質是胎毒之現象，須節制肉食。五、抽風。產前後抽風危險頗大，須延醫診治。

(乙) 花柳病——梅毒病，能致小產早產或死產。母子均受其害。孕時早期診療可預防先天性梅毒的傳染。一、白濁(淋病)對母子之害甚大。若能早期治療可以預防後患。(丙) 其他病症——一、痔瘡。胎兒壓力和便結均能增痛。二、心燒。消化不良所致。所以食物應有定時。三、失眠。因精神感覺煩惱和憂愁所致。須避免刺激或閱書報以引睡。四、氣促。胎兒長大，壓至胸部所致。五、流液。流紅色含有血質之液，須防小產。

宜速靜臥並即延醫。棕色之液係胎兒已死的徵兆。(丁) 痘

骨縮。孕婦骨軟。可多晒太陽。和食富於石灰質之食物。以補救之。

D 胎教。母體之營養。日常生活和心理態度均能影響於胎兒。所以產母在孕期必須注意衛生的方法。  
E 產前檢驗的手續及益處。一般婦女懷孕。總是想避免使他人知道。殊不知產前檢驗有下列的益處。明瞭孕史和月經情形。及生理變化。二。檢查身體各部。如體重。牙齒。心肺。腹部四肢。陰部。血壓等。以預防疾病發生。和生產時的危險。三。側量骨盤之大小。以防難產。四。早期診斷。是否受孕。以防小產。五。按期檢查。以診查胎兒的狀況。矯正不正當的方位。以防臨產發生意外。六。檢尿。是檢查尿內是否含過量蛋白質。以免胎毒或抽風。家庭中驗尿法。盛尿在六寸長半寸徑之玻璃管內。至半滿。加醋酸三滴于尿內。然後在燈上燒熱。如現白霧狀。即斷定尿內含有蛋白質。

## ■ 妊娠期內的衛生

麗君

葱芥末濃酒漿。

婦女在妊娠的期內。應該十分注意衛生。因為妊婦稍有不適。不能保持自己的康健。並且影響到胎兒關係很大。現在把妊婦應該注意的地方。記在下面。

A 妊婦的精神。應該使她愉快。最好叫她聽微妙的歌聲。清

## ■ 孕婦須知

尤學周

同一孕婦。在富家則惡勞好逸。保養惟恐其不周。在貧家則奔走操勞。一如平日。而其情意之苦樂。與精神上所受之影響。亦各不同。一則失之太過。一則失之不及。皆非正當之法。

脆的鳥語聲。和洽的絲竹聲。切忌以悲泣的事情去激動妊娠的感情。

B 每天須有九小時的睡眠。使身體和精神兩方面得充分的休養。但朝上應早起。以呼吸新鮮空氣。

C 有二三個月身孕的婦人。必定發生惡心不時嘔吐。歡喜吃酸性食物。如橘子。青梅之類。這時候應該停止運動。安心調養。食物應選擇淡薄而容易消化的。

D 妊婦的衣服須特製。比平常穿着的須寬大一些。以免胸腹被壓。阻礙血液的流行。致胎兒不能充分的發育。

E 妊婦的乳房須不時洗滌。以除去污穢。產前的兩三個月。尤應每天用溫水洗滌兩次。

F 妊婦不應交媾。因為一交媾。胎兒易受胎毒。至五月以上。則交媾後。胎兒就要變動位置。易致小產和難產。

G 妊婦不應吃喝含有刺激性的食品和飲料。如薑椒大蒜。

也。

孕婦以重身之關係。一人之糧兼顧二人之用。往往感受不足。發生虛弱現象。又因胎兒生理上之變化。起一種胎孕期間特有之病症。故為孕婦者實較常人易於發生疾病。

孕婦有病往往發生意外之變。病之屬於急性者大都有高熱。易於損傷胎氣。屬於慢性者體力易感疲勞。不能攝胎。皆有流產之虞。即不然。胎兒之發育亦必蒙其大害。且孕婦有病用藥亦甚困難。雖內經明言「有故母殞亦無殞也」。然遇體質虧弱之孕婦。稍帶利氣滯滯之品。即能發生危險。有用輕微利氣之品而驟然生變者。雖有其他原因。而病家不察。往往聽信讖言。歸咎於醫家。以此醫家有許多顧忌。效力因之遲緩。故懷孕以後。最好防患未然。確遵衛生之道。

有孕之婦。血脈易受阻礙。故宜勤洗浴。俾去皮膚之汗垢。而助血液之流行。過於運動固非所宜。好逸不動亦有流弊。宜少勞身體。使氣血周流。關節鬆動。則胎前少病。臨產自易。精神方面。宜求其快。睡眠時間亦宜適度。飲食注意尤為要點。偶一不慎。每致成疾。宜擇易於消化而富於滋養之品。至姜椒芥酒。辛熱刺激之物。易耗胎元。生冷瓜果。堅硬難消之物。易傷脾胃。肥甘則壅氣。生涼酸鹹則耗血。傷脾均非孕婦之所宜。

孕婦有病。宜速就醫。不可遷延誤事。以致輕病轉重。重病轉危。亦不可妄服單方及成方。如保產無憂散及保胎良方等。蓋藥性分量。隨人之氣體而轉變。成方則固定不變。未必人人適合。切莫妄試。

## ■女子孕期之注意

張壽漢

女子受孕後。按生理上有逐次之變化。故易變異。常之態度。若能照衛生之方法。因勢利導。即可減少孕婦之痛苦。及難產小產諸弊病。即產後亦易回復健康。今將孕期中之注意點。略述於左。

1. 飲食——孕婦之飲食。可照平時習慣。惟有刺激性。（如辛辣濃酒）與不易消化之物。切不可食。肉食亦須減少。應有孕之婦。血脈易受阻礙。故宜勤洗浴。俾去皮膚之汗垢。而助血液之流行。過於運動固非所宜。好逸不動亦有流弊。宜少勞身體。使氣血周流。關節鬆動。則胎前少病。臨產自易。精神方面。宜求其快。睡眠時間亦宜適度。飲食注意尤為要點。偶一不慎。每致成疾。宜擇易於消化而富於滋養之品。抑制食慾。甚不相宜。祇須每餐減少分量。增加餐數。產期將近之時。應忌飽食。晚餐更宜減少。如餐後稍食水果。尤有裨益。

孕婦之飲料。白開水最佳。淡茶。雑麥湯等亦可。黃酒。葡萄酒。之類。略飲尚可。燒酒和白蘭地等。則須禁絕。

2. 衣服——孕婦之衣服。宜清潔而寬鬆。厚薄適時。不可寒冷。腹部下肢更須溫暖。小背心及束胸之惡習。更當解除。腰帶亦不可過緊。欲使產婦腹壁寬鬆。宜於懷孕四、五月後用白色布綁于腰腹。俟臨產時解除。（布闊七寸五分長約四五尺）。既使胎兒穩固。更便臨產時腹部地位寬暢。此即古人瘦胎之意。但不可過緊。

孕婦之足。每有略腫。故鞋履亦宜寬大。高跟皮鞋。更不相宜。

3. 運動——適度之運動。足以強健身體。舒展精神。故孕婦可照尋常之操作。惟業務勿可過於繁重。如猛力舉重疾走。行遠屈曲身體。蟠坐久時……等事。均宜屏除。每日遊於空曠清氣之地。并練柔軟體操。皆頗有益。如跳高賽跑等。當然在禁絕之例。乘汽車馬車……等行於平坦之路。猶可。但亦不可久坐。孕之末期。若有下肢浮腫之病狀。即不可運動。宜安靜平臥。注意飲食。最宜多飲牛乳。通利大小便。延醫診視。尤爲穩妥。因恐有心腎病也。

4. 注意空氣——社會之習慣。內房睡室。緊閉窗戶。于冬季尤甚。殊不知新鮮空氣爲人生康健之要素。能洩濁清肺補助血液。無論晝夜。不可或缺。在孕婦非特宜清己之血液。且

須清兒之血液。故新鮮之空氣。尤爲緊要。惟在嚴寒之際。以不使感冒爲限。

5. 潔淨身體——孕婦之身體。因有胎兒之關係。排洩較多。皮膚爲排泄緊要之器管。故須日日沐浴。每日晨起浴之。最佳至孕末之期。更宜勤浴。水之冷熱適度。下體勿浸在盆內。以免污水溢入陰道。按中國婦女鮮知沐浴之益。所以浴室少備。以爲一過夏天。即不沐浴。其實新陳代謝無時或息。若不按時沐浴。則皮膚上之生活機能受阻。爲害非淺。但多數已成習慣。一時改革不易。欲求潔淨身體之法。最好用毛巾蘸熱水。揩擦身體。擦時。預將窗門嚴閉。如遇冬季。置一火爐。待房中溫度匀和後。方可卸衣。

孕婦外陰部。往往因分泌增多。易致不潔。宜用硼酸水。一英錢化開水一磅。勤加洗滌。或用微溫水洗之亦可。若其夫會患白濁症者。更宜常洗。或請醫生診察。而按法治之。孕婦又常有牙痛之患者。宜常擦牙漱口。雖有蛀牙而無搖動者。切勿輕易拔去。因產後多能自愈。

6. 注意乳房——凡受孕後。乳房逐漸膨脹。以增乳腺之作用。故衣服亦當寬鬆。不可壓抑。若有乳頭進縮之狀。每隔數分鐘時。以潔淨之指。引之使出。孕末前三四星期內。用炭匿酸甘油。和水一倍。每日擦乳頭兩次。

在授乳期內之婦。或有懷孕。宜速速斷乳。否則非特母兒兩受其害。且易小產。

初乳適合初生兒之消化。有益于兒甚大。故親自哺兒。爲孕婦第一之希望。亦爲母之天職也。

1. 節制房事——孕期中能絕慾最好。次之亦當節慾。若逢往日行經之日期。及孕末之前數日。更宜注意。若曾流產者。

尤當謹慎。

8. 靜養精神——孕婦須要寧靜。七情六欲驚駭之事。宜設法避之。睡眠宜足。每晚須睡八小時以上。日間最好略睡片時。以資休養。

9. 通潤大便——大便須每日有一次。若有大便閉結之習慣。尤宜注意調理。(A) 飯後略食水果。(B) 多飲白開水。

(C) 勉勵適當運動。(D) 改換日常之食品。若有便閉日久。發生不爽快之狀態。須請醫士診治。切不可擅服重瀉之藥品。而引起小產之惡果。

10. 請醫診察——婦人受孕後。應請醫士隨時診察。若有身體不爽之症候。可請醫設法改善。至孕之末期。則每隔一二星期受診一次。

11. 勿急臨盆——在臨產前之數星期。往往因子宮收縮胎動過重。致腹作痛。此名曰前驅陣痛。亦名試痛。惟無整體。在

綿綿作痛之時。用熱物暖之即止。有時因受寒或大便不暢。致有作痛之徵狀。必須細細辨明。切勿誤會發動。慌忙益臨。致成難產。亦不可搔擦腰腹等部。以免發生未熟之誤。

## □ 胎教之注意

魏鏡清

(一)

人之生也。稟受父母之形骸氣質。是爲先天。故人形骸氣質之美。已定於有生之初。夫父母愛子之心。無所不至。疾病饑渴。則憂之憐之。雖恩昧之人。亦不願生敗子。然而市井無賴。觸目皆是。何哉。則胎教之不講求故也。胎教之方法。維何。即下述是已。

禁慾念。女子一覺有孕。即宜別寢。否則亦須禁絕房事。蓋慾念一動。往往有墮胎難產等事。且此好淫之性。早已遺傳。於胎兒將來。爲害於子女者極大。顧世之爲父母者。注意之。高尚其品性。女子無知。往往喜聽里巷穢談。爲夫者。當將古來英雄豪傑之事。每日講若干則。或令其觀往哲之遺像。及正當之小說。或與之游山川花木之地。務使優遊漸漬。常存一高尚之感覺。則品性自無形而高尚。而子女之品性。亦隨母念而推移矣。

平時且極不宜。況有孕之時乎。故爲夫者當和善其形貌溫柔其言語。融融洩洩。毋使勃谿。使婦女心中常覺怡悅。則有益於胎者極大矣。總之女子一有孕。其一動一靜。與胎中皆息息相關。欲使子女爲善。當先講求胎教。昔太任之孕也。日不視惡色。耳不聽惡聲。口不出惡言。發生文王。日本名儒伊藤仁齋妻懷孕時。仁齋母每晚爲誦述孝經詩書。生子東涯。知名於世。是二者皆胎教之效也。

## (二二) 念菴

何謂胎教。婦人妊娠的時候。要修身節慾。其思想視聽言動。該要純正。勿使胎兒感受惡感化。是謂胎教。現在把幾件易行的寫在下面。

- 一、言行要合乎道德。胸懷磊落。守善良之箴規。沒有悖謬的動作。這是種孩子的德因。
- 二、意志要清明。思慮純潔。常抱樂觀主義。這是種孩子的智因。
- 三、運動得宜。勞逸適均。飲食有節制。務使心神爽快。常使血氣和平。這是種孩子的體因。

此外飲食一項。對於胎兒也很有關係。特表出之。

甲 酒類刺激性烈。容易擾亂孩兒神經。吃了使孩兒愚鈍。乙 葱韭蒜類等辛燥品不可吃。吃了胎火上亢。小兒多患目疾。或口臭腋臭。

丙 獸肉野味。腥氣猛烈。吃了使胎兒多驚。

丁 藥品之中。人參不可多吃。吃了胎兒肥胖。易成難產。

## ■ 怎樣產生美麗的孩子 亦羣

小兒在胎裏做母親的。總是要格外留意。一視一聽。一舉一動。都要隨時謹慎。不可冒昧疏忽。因爲孕婦能感形變胎人。家都說孕婦不可看猴子。因爲多看猴子。生出小兒來。面孔要像猴子一般。多吃螃蟹。分娩時候。或恐要橫腰產生。如一隻手先伸出來。俗名討鹽生。現在有一個例子。足爲感形成胎的鐵證。我寫出來給大家看看。

前年遼甯有一個製鹿茸的專門家。他家中的婦人懷着孕。天天去喂鹿。日後胎兒出世。頭生兩角。和鹿角一般。又有一孕婦喜歡看哈哈鏡。常到游戲場裏照去。引爲笑樂。後來產生一個畸形怪狀的孩子。

現在科學發明。法國有位生理學家根據這個原因。他專門提倡產生好孩子。特地在巴黎設立一所「美兒院」。凡屬孕婦要產生好孩子的。叫他們住到這院裏去就行。據說這

院子裏設計注重於美感。處處是美風景。美園藝。美佈置。美裝飾。美環境。美天然美。孕婦遊散其間。處處得着美感。有引人入勝的山水。有活色生香的花果。還有金魚翠鳥。疊石疏泉。二到華燈初上。更有美麗女郎。宛轉歌舞。孕婦身入其中。耳目所娛。身心俱快。天天閑醉於美的空氣中。自然忘懷了院外一切愁城。到了產兒的時候。不論男的女的。一個個美貌天成。雪白可愛。聞這位生理學家。尚擬於各大名區多設分院。果能擴而大之。將來美的結晶。或造成美世界。不獨女子中沒有無鹽嫫母的醜相。而且男子都為衛玠潘安一流之美。這段新鮮新聞。不可不佈告大眾。所以我要來介紹介紹。

## 孕婦與便秘

尤學周

吾人大便。宜每日排泄一次。便無宿積。則精神爽快。身體亦健全。反之如大便不暢。則腹脹。精神不爽。或引起其他疾病。

二三日以上不大便。謂之便秘。有偶然便秘者。有成為習慣。時常便秘不通者。此症之原因甚多。而出於人為者亦占不少。常人以生活之忙碌。往往無暇顧及大便。或故意忍住。日則便糞凝固不易排出。隔日愈多。糞便愈結。排洩愈難久。

後將成爲習慣。

孕婦便秘之原因有二。其一。因身體運動不足。(大多數之孕婦恐運動有礙於胎故。多安逸少動)。腸壁蠕動緩慢。以致便秘不爽。其二。直腸與子宮鄰近。受孕以後。子宮逐漸膨大。壓迫直腸。使排泄之道。爲之緊窄。大便不易排出。成爲便秘。

通常之便秘治法。率用瀉劑。患者以大便之困難。身體不舒。於是服瀉劑以通便。數日後便又秘。再服瀉藥。其結果必致不服瀉劑不能通便。以後便愈秘。藥量愈增。而愈不生效力。此種便秘。所以成爲習慣者。皆由亂服瀉劑所致。爲之治療非一時可以奏效者。

孕婦便秘。其害較常人爲大。糞便久留體內。有毒物質被吸收而入血液中。除引起頭痛。眩暈等不快症狀而外。且將影響及於胎兒。且糞塊積滯腸內。壓迫子宮。於胎兒亦爲不利。故最好養成日日通便之習慣。否則數日一便。努力掙持。足以損傷胎氣。且有流產之患也。

## 孕婦小便不通

樊須欽

經云。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。良以水入胃。得脾陽蒸騰之力。上佈于肺。得肺金治節之權。下輸膀

子眩俗稱兒暈。皆由肝風挾痰。上升顱頂。氣逆腦轉。則頭爲之暈。目爲之眩。甚則轉慄發厥。以定眩湯平肝熄風施治之。

膀一身水精。盡歸于此。故膀胱爲人身之州都。津液之湖海也。然州都之物。貴乎運輸之敏捷。湖海之水。賴乎日光之蒸晒。州都之物。不運輸。則商賈不至矣。湖海之水。不蒸晒。則雨露不下矣。故膀胱之水。必晒陳於膀胱。灌溉于表裏。上之則爲唾液。下之則爲小便。是猶州都之有運輸。湖海之有蒸晒也。若至陽氣不宣。氣化不彰。則水道不通矣。胞宮受戾。膀胱受壓。則決瀆不利矣。今夫懷孕而小溲癃閉。是胞宮隆大。壓其膀胱。陽氣不得宣通。水液不得下達也。陽氣愈鬱愈虛。水液愈蓄愈滿。水液蓄于膀胱。膀胱居于少腹。是以少腹痕急也。病屬轉胞。失治則下極犯上。易於喘呃成變。經云。小大不利者。先治其標。通其小便。實爲急務。惟是溫通滲利之品。俱屬妊娠禁忌之藥。治病則礙胎。顧胎則增病。用藥之間。務宜詳爲注意。下方最爲穩當。可資病家考攷。

紫苑茸一錢蜜炙。苦杏仁三錢去皮尖。苦桔梗一錢。西潞黨二錢直劈炒。生白朮三錢。赤茯苓三錢。陳廣皮一錢。廣木香八分生切勿見火。上沉香八分切片。厚朴仲三錢鹽水炒斷絲。桑寄生三錢。福澤瀉錢半川。椒目四分全炒。通天草一錢。

錢少補

口子暈

## 妊娠瘀血證之研究

蕭俊逸

瘀血證以婦人為多人皆知之。然妊娠中之有瘀血證人多忽之。良以醫者每遇妊娠疾患。咸斤斤於保胎。惟恐其胎之下墜。鮮有議及妊娠之瘀血者。

患本證者苟遷延不治。必致流產。因其子宮內有於血胎在子宮日益長大。瘀血亦日益積多。因此子宮之空間日益窄狹。至不能容受。時瘀血與胎兒逆擠而下。時間多在妊娠前半期後半期甚少。常有妊娠服補藥而致小產者。是必子宮先有瘀血瘀血得補氣機愈滯。夫既已有瘀血之障礙。又益補以滯氣氣滯血愈瘀。其胎焉得不墮。且其所用之藥又必係呆補而少調氣行血之品。若補劑中佐以調氣行血之藥。則本症輕者亦可得以保全無恙。普通所用之保產無憂散。紫蘇飲。安胎飲。其所以能保胎者以其調氣行血之藥占全方十之八九。故有相當之效果。如保產無憂散中之歸芍。芎艾葉。貝母。羌活。壳厚模荆芥。生薑。紫蘇飲中之蘇葉。大腹皮。歸芍。芎陳皮。葱白。生薑。安胎飲中之歸芍。芎蘇葉。陳皮。香附。砂仁。是也。氣調血活。瘀血何自而生。即有些小瘀血亦必潛消於無形。然瘀血之重證。又非此三方所能奏效。必用桃仁。紅花。牛膝。靈脂三七之類。以破瘀活血始克獲效。以上諸藥。

皆為妊娠所忌。世人畏之如砒。燒綻醫士有明確之診斷。而病家不敢服。不知有故無隙。（預者言胎之墮落也）何畏之有。祇須診斷確實。放胆用之。萬無一失。夫有是病而用是藥。雖攻破之藥亦為可貴。今人不審病情如何。祇論藥而不論病。舍當用之藥而不用。殊屬莫解。愚臨症以來。歷用破瘀之劑。以治本症。從無一失。茲舉數案。藉資佐證。

一、內子生產難危。民十四再產後即服斷產藥。至民十六。經停兩月。噁心嘔吐。食慾不振。時吐清水。腹部脹滿。以上症狀雖為妊娠初期之徵。然閉經血瘀亦有此現象。況曾服斷產藥。又加腹部脹滿。意其必係經停血瘀為患。徑用桃仁四錢。紅花三錢。牛膝一兩。當歸尾三錢。炒穿山甲三錢。連服五劑。諸症皆除。食量陡增。腹亦不脹。但經水仍不行。而腹部日益隆起。至此始知有妊。及足月產一女。自是以後。對於妊娠初調各種疾患。益加細心體驗。知妊娠因瘀血為患者其多。恒稱病之嚴重。投以化瘀法。體弱者加參芪。寒者加溫藥。熱者加涼藥。無不應手而愈。從無一失。

二、同宗啓南兄令堂。經停兩月。餘精神不振。食減。少腹結一癟。瘤大如杯。延予診。予曰：此妊娠兼瘀血。當去瘀以安胎。否則胎必墮。幸病家第信於平日。遂不遲疑。乃連進大劑消瘀。（方內用藏紅花二錢。因藏紅花較川紅花力大數倍。）

癆癰全消。神怡氣增。足月產一男。今已四歲矣。用大劑破瘀。

病愈而胎無恙。人皆以爲奇。

三 周婦年二十餘未經生產。係一貧血體質。平日經水時閉時行。所下不多。去春三月忽神血體倦頭眩痛。時覺凜寒。脈象細數而濡。予斷其陰虛疲滯而不能決。其有妊投以補

血破瘀之劑。病家曰。設係有妊。不妨胎。予曰。如係有妊。更須化瘀以保胎。此予平日親自經驗。請勿遲疑。於是連進數劑。經行數日。所下皆黃水紫血。諸症遂愈。更以氣血平補佐以化瘀之品。以善其後。自是以後。體健食增。經不再至。而腹膨胎現。至十月間果產一兒。此症若懷疑懼而不敢用破瘀之藥。則匪特病難即愈。胎亦莫保。勢必陷於流產。

妊娠瘀血證之診斷。胸膈滿悶不舒。不知飢時作嘔聲。時吐清水。惡心噁逆。(以上諸症。痰飲停蓄。亦有此象)。背心凍寒。或夜熱早涼。腹中脹滿或痛。平日經水不調。目下及環唇色青黯。脈象帶澀。

查婦女界中每歲患小產者甚多。受瘀血之障礙者佔一大原因。於血性小產者。產後若不施以化瘀法。下胎又必小產。醫林改錯少腹逐瘀湯。小產後(屬於瘀血性者)服之可保以後不再小產。或於受孕三月時服之。亦可保無小產之虞。體弱者酌加參芪。體熱酌加芩連。

### 附 方

保產無憂散	菟絲子一錢四分	當歸一錢半	貝母一錢
	艾絨九分	甘草	羌活各五分
七分	黃蓍	荆芥各八分	枳殼六分
		川芎	厚樸各一錢二分

生薑三片

紫蘇飲	白芍	當歸	川芎	甘草	人參	陳皮	大
腹皮	葱白	生薑					
安胎飲	人參	白朮	當歸	川芎	白芍	陳皮	砂
仁香附	甘草	紫蘇葉	黃芩				
少腹逐瘀湯	炒茴香二分	炒川薑一錢	玄胡索二錢				
五靈脂三錢	沒藥一錢	當歸三錢	川芎一錢	生蒲			
黃三錢	桂枝一錢	赤芍二錢					

### ■結核病與孕婦

錫康

或謂結核患者得孕後。本病之豫後。反見佳良。或謂患者第一次妊娠尚可支持。至第二次第三次繼續得孕。其結核症所受之影響。甚爲危殆。論者紛紜莫衷一是。惟欲明此二者之關係。須考核以下三點。

一 結核症因妊娠所受之影響。大都患者妊娠時期。受害尙淺。產後數月間。結核症常有暴發之危險。患者如依法施

治結核即不易復發。

一、妊娠因結核所受之影響則甚淺。結核患者所產小兒在腹內死亡者占百分之十。其餘產後幸活者亦較常人爲瘦小。故無難產之危險。惟以後如繼續受孕難產實所不免。故患者第一次產兒後在二年間結核病尚未痊愈之時。不宜再有妊娠以免危險。

一、結核病與小兒之關係則頗緊要。患者所產小兒雖一時幸活其不滿十二月而死亡者實占百分之七十。蓋小兒之結核症由母體遺傳者固有之。其最要之因乃在初生後數月間產兒與結核患者直接觸而傳染。故小兒宜離乳母撫養不宜常與母體接觸也。

## 胎前要方

朱振聲

保生無憂散。當歸白芍川芎厚朴羌活荆芥枳殼艾葉川貝兔絲子黃芪生薑甘草。

(按)孕婦臨月先服此方一二劑。臨產可無難產之虞。或遇逆生亦可服此一二劑。無不出險。人夷應手取效。其立方之意。蓋以新孕婦人腹氣完固。腹皮緊窄。氣血壅其胞胎。最難轉動。此方用活血運氣而成擰胎之法。以歸芍川芎養血活血。用以擰開血脉。羌活荆芥疎通太陽。太陽脈行身之背。即

將背擰開。且太陽經脈最長。太陽治則諸經皆治。枳殼厚朴疏理結氣。將面前擰開。艾葉溫暖子宮。擰動子宮。則胞胎靈動。川貝菟絲最能運胎順產。將胎氣全體一擰。大具天然活潑旋轉之象矣。加黃芪以補元氣。元氣旺。則旋轉有力。加生薑以通神明。神明充則邪惡不侵。更以甘草協和諸藥。俾其左右咸宜。而全其擰運之神妙也。

泰山磐石散。人參黃芪當歸熟地川芎白芍續斷黃芩。白朮。甘草砂仁糯米。

(按)參朮黃草補中。中氣健旺。則能攝胎。歸芍地芍養血。血足則能養胎。黃芩清熱安胎。砂仁理氣。和胎續斷糯米固胎。妊娠服此。則胎安。和泰山磐石可無小產墮胎之患也。

當歸芍藥散。當歸川芎芍藥茯苓白朮澤瀉。

(按)此方金匱治婦人懷孕腹中疼痛。疔痛者。綿綿而痛。不若疝氣之絞痛。血氣之刺痛。乃因氣血不足。血不養肝。肝木侮土所致。故以當歸芍藥養血平肝。荅朮澤瀉化濕健脾。脾土健旺。肝不來侮。則痛自止矣。

保和丸。山楂半夏橘紅神麌茯苓麥芽連翹萊菔子。

(按)妊娠食積不宜猛用攻伐之藥。傷胎元。惟宜用此消導。且用丸以緩治之。庶幾善盡。美然間有大積大聚者。審證的確。亦可攻下。經所謂有故無慎是也。

救損安胎湯 當歸白芍生地白朮人參炙草蘇木乳香沒藥。

(接)妊娠跌撲損胎雖屬外傷。然其氣血必已素虧。蓋若正氣充足。胎元堅固。即或偶爾顛蹶。尚可未傷及胎。惟內之氣血素虧。則略有閃挫。胎便不安。若止作閃挫。外傷治之。斷難奏功。且恐因治而反障其胎。不可不慎。當如此方於大補氣血中。少佐行瘀之品。斯得之矣。

## 臨產與小產

### ■ 產時衛生常識

A 產期應注意之點。一、末次檢驗胎孕。在預定臨盆期的

前幾天。須經產科醫師檢驗一次。藉以斷定(甲)胎位正常與否。及產式方位。(乙)嬰兒之大小。(丙)盆骨之比例。以定

生產難易。(丁)孕婦身體情形。以防臨產發生危險。

二、延醫。孕婦在預定臨盆左右。如發現腹痛。必須延請產科醫師。或助產士診察接生。切勿使對於生理上。醫學上。莫明其妙。又不知消毒的舊式接生婆。或親屬接生。以免殘殺胎兒和孕婦。

三、消毒。臨盆時孕婦之陰戶和接生者之兩手。必須用藥

水消毒。墊布必蒸過。剪臍帶之剪刀及臍帶布。也須消毒。方能使用。否則產婦易得產褥熱症。嬰兒則有抽風的危險等。

四、臨盆共分三期。(甲)自腹部陣痛起。至子宮口開全。這是第一期。此時孕婦當可隨意行動坐臥。(乙)自子宮口開全。孕婦即應躺臥床。上兒頭漸出子宮口。至嬰兒全身產出。這是第二期。(丙)自嬰兒產出後。至胎盤流出止。這是第三期。產痛發作後。切勿急躁。或使動。以免疲困力竭難產。

五、陰道。孕婦之陰道。除產科專家外。不得舊式接生婆或其他不懂醫學的人。用手探入。以免染毒。發生產褥熱。

六、會陰。(甲)會陰之保護。頭兒初出時。可用手輕接兒頭。勿使急出而撞破會陰。(乙)縫補會陰。會陰如撞發破時。須立刻用線將破裂處縫補。否則容易染病和失去盤底托力。致有子宮下墜等現象。(丙)蓋護會陰。胎盤產後。出血正常。即用消毒棉花。或紙墊。蓋護起來。

七、流血。產後流血過多。每以手採子宮。使之收縮。墊高臀部。並請醫師止血。

八、嬰兒點眼藥。嬰兒生下。臍帶剪斷包好後。即用百分之一硝酸銀。在嬰兒每眼中點一滴。以防淋病菌侵入而致瞎眼。

B 產前及臨產的諸種設備。孕婦在第七個月以前。應預備

臨產時種種物件。作未雨綢繆之計。若七個月後。則孕婦身體日漸笨重。不宜操勞過度。倘遇嬰兒生出時不準確。則臨

時匆忙失序。尤不相宜。

一、孕婦未產之前。先預備房屋一間。房內的空氣光線。床之位置等。均須適宜。

二、產婦預備之衣物。列後。(甲)睡衣及哺乳衣兩件。(乙)襪子兩雙。(丙)被單兩條。(丁)紙墊六個。以粗紙置于布套內。用後即拆洗布套。(戊)油布一塊。為保護褥墊之用。(己)丁字帶兩個。(庚)洗臉巾大小各一塊。(辛)大毛巾一塊。(壬)便盆或瓦盆一只。(癸)藥棉花及來蘇水無菌墊子。先行蒸過。或用熱熨斗燙過也可。

C、產時佈置的程序及產婦的飲食。一、預先決定住醫院生產。或請醫師或助產士在家生產。在醫院生產可免預備一切。若在家生產。當預備下列各物。(甲)涼熱開水各一壺。作洗手之用。(乙)床上鋪放油布及紙墊。(丙)佈置嬰兒的床。並宜使其溫暖。(丁)屋內什物。宜騰出。(戊)預備臉盆便盆。一、產婦可隨意飲開水。食易消化食物。如牛奶。稀飯。嫩鷄蛋。鷄湯等。

## □ 難產之研究

龔敏仁

夫產育者。天然之常事也。譬如瓜果之成熟者。及時自落。不難產哉。然觀婦人之難產者。自然產下。母庸助手。豈有所謂其原因。約有四端。多由于產婦平日失其衛生之道也。一因安逸太過。不事運動。以致骨盤不得舒展。或異常狹小。或特別畸形。則胎兒已到門而不得不下。此為最危險之難產也。西醫須用手術取下。或剖腹取出。然多死而少生也。中醫以此稱為交骨不開。外貼開骨膏。內服開骨散。尙覺有效。但多數須令熟於接生之穩婆。略用手術以助之。庶能產下也。二因染養不足。氣血虛弱。氣虛則子宮之收縮乏力。不能推送。血虛則子宮之濡潤不足。不能滑利。故為難產。此症可用保產無憂散。或人參湯。或桂圓湯。乘熱頻服。以助其推送滑利之力。則兒自易產下矣。三因厚味太過。溼毒留戀。以致生瘡生瘻。阻礙胎兒之產出。此亦難產之一端也。惟此症必于未臨盆之先。早服祛溼解毒之藥。庶可有效。否則臨渴掘井。恐不及矣。四因憂鬱太過。神經鬱結。以致司分娩之中樞神經。不能使子宮收縮。不能迫胎兒下出。故致難產也。古人有滑胎飲一方。多用理氣之藥。即為此症而設也。蓋理氣即舒暢神

經。故能有效也。

越銘

## 臨產要方

朱振聲

## 瀝漿生

原因 此症由氣血枯弱。臨產難。以致胞破漿乾。胎濕不得下。俗謂之瀝漿生。

治法 用鮮豬肉一二斤。洗淨。切大塊。急火煎湯。吹去浮油。令產婦恣飲之。或用香油白蜜童便各一碗。入銅鍋內慢火煎三沸。去浮沫。入滑石末一兩。攏勻。頻服。多以油蜜於產婦臍間從上至下摩之。

方劑

加味芎歸湯 當歸四兩 川芎一兩 益母草二兩 西

潞參一兩 水煎 加童便白蜜各一杯 溫服

## 裂胞生救命至靈湯

治婦人臨產裂胞生。及難產數日血水已乾。產戶枯澁。命在垂危者。

桂圓肉(六兩去核)。土牛膝梢(一兩黃酒浸搗爛)。將桂圓肉煎濃汁。冲入牛膝酒內。乘熱服之。安臥片時。即產。按桂圓肉善補血液。牛膝梢善于達下。妙在又以酒浸熱服。使其產戶枯澁之處。即得滋潤通達之益。故能轉難爲易。轉危爲安也。

加味八珍湯 人參白朮。茯苓。甘草。當歸。白芍。熟地。川芎。乳香。丹參。益母草。

(按) 凡臨產誤自驚惶。用力太早。致漿水去多。乾澀難生。且兒抵產門。母力已盡。欲出而不能出。速宜煎服此方。可保無虞。蓋補其血。則水漲船行。補其氣。則一帆風順。佐以活血行血之品。則胎兒可如船之順流而下。安得不即時產下哉。

開骨散 當歸。川芎。龜板。髮灰。

(按) 此方主治臨產交骨不開。夫交骨之所以不開者。由于陰氣之不足也。陰不足。則氣不達。氣不達。則交骨不開。故用龜板至陰之物。直補陰氣。髮灰疎通陰血。更加當歸補血。川芎行血。陰氣陰血充足。則交骨自開矣。

## 小產之原因及治法

原培

西醫謂妊娠十八星期以後。胎盤與子宮之黏連。始堅。固是以小產在十八星期以前爲多。云云。至其原因分述如下。

(甲) 中說。或因妊娠衝任氣虛。不能滋養其胎。胎氣不固。或跌仆。墜致氣血動損。或因熱病溫瘡之類。或因悲哀憂愁。恐懼。或勞力等等。皆令半產。

(乙) 西說 其病原分屬父屬母屬胎三者茲述產科專家

吳陳懿女士之言如下。

(一) 屬父者 因梅毒體弱結核病年老房事過度等。

(二) 屬母者 其原因與父同另有因病症而致者如因病而致體溫過高與血改變或因外傷或勞力過度或坐車受震或因情感或有屢患小產之習慣性者等屬於局部之患者如子宮差位與盆內之組織炎子宮內膜炎子宮發育異常等。

(三) 屬胎者 絨毛膜敗變羊水過多胎盤位置異常等均致其小產小產之預兆若無月經而已顯孕娠之徵狀者忽現腹痛又如行經者當防其流產。

(丙) 治法 小產之原因除因花柳病須實行根本療法外實不但小產即其他各病單純者皆較易治夾有花柳則一時不易肅清。

(一) 驗方 有署名玄中者於廣濟醫刊發表一文題曰「小產經驗錄」其方至佳茲介紹其原文及方如下。

小產一症世乏良方拙荆小產共八胎中西醫均乏善策嗣後由友人介紹一保胎良方自受孕服起至過小產時期止果安好連產三女大小平安產婦身體亦較清健嗣後再孕

停止不服即生一男產婦大產二三次本可不必再服緣小產慣性業已除去也茲將原方抄錄於後。

上黨參四錢 炒白芍四錢 繢斷一兩 製首烏四錢  
炒棗仁四錢 野朮四錢 淮山藥炒一兩 土炒歸身  
四錢 厚杜仲四錢 藕子廿枚 蓮子十五粒  
另加黃牛鼻一個烘乾搗碎入藥爲丸每晨服二錢忌用鐵器。

此方大補肝腎安和胎元托住不墜并可調經種子雖未孕亦可服不孕之婦服之易於受孕却有奇效勿輕視之。

(二) 驗方 湘蓮三十個白扁豆二十粒日日淡羹食之自成胎後服起連服數月可無小產之虞此方平淡而神奇。

余感某君會試驗數人皆靈效不可以平淡而忽之。

(三) 少腹逐瘀湯 (小茴香七粒炒乾姜一分炒元胡一錢沒藥二錢研) 按此方爲王清任所製見於醫林改錯內

其功用甚多凡因子宮有瘀血而小產者不可不服。

(丁) 結論 薛立齋云小產重於大產蓋大產如果熟自脫小產如生採破其皮殼斷其根蒂也但人往往習於輕視死者多矣便產須知亦云小產不可輕視其調養過於正產十倍可也云云則小產後之一切調理當如產後法不當忽視也明矣。

## □流產與早產

松筠

### (甲) 流產和早產

妊娠一二個月後的流產。大都在醫師或助產士尚未注意之中。不知不覺的流下。亦有一種還未知道懷孕。竟去旅行。到了後來月經忽較尋常為多。這一種往往是極早期的流產。

什麼叫做流產。就是指着妊娠七個月以前胎兒尚未沒有子宮外生活能力的早期分娩而言。什麼叫做早產。就是胎兒雖離母胎亦能生活。但是尚未達到分娩期。就已產下。所以稱為早產。按照統計。經產婦的流產早產。比較初產婦來得多數。現在有個統計表。根據一千二百二十六個產婦當中。發現的多寡。作為比較如下。

產婦別	流產	早產
初產婦	三一人	四八人
經產婦	二四一人	九〇六人
最容易流產的時期	大都在妊娠三四個月左右	來得頂多。此後漸少。妊娠初期的流產。竟有本人出於不知不覺之間。輕輕的了事。至於一個月以上三個月以下。那末就有相當的危險。假使遲到五個月左右方才流產的話。往往要起大的危險。

出血。若患急性貧血或心臟薄弱的人。亦有因此絕命的危機。還有一種所謂不完全的流產。只不過流出卵胞。所有胞胎等。仍然殘留在內。這也很危險的一回事。不可不由醫師施行手術。必須完全取出方可無憂。

### (乙) 流產的預兆和處置

流產的預兆。在妊娠一個月左右。隨同月經流下。乃在不知不覺之中。並無任何預兆。若在妊娠二三個月流產的話。最先流下混有血痕的粘液。約經五六日或十日。就象氣分不舒。繼忽又覺腰痛。腹痛。不肯休止。又起陣痛。但是因了這種出血。是否可以決定。指為流產。那亦未必盡然。總之延醫治療。實在刻不容緩。若能如此。既可幸免於萬一。而且還有注射防止的方法。

對於流產應急的處置方法。應該靜心仰臥。安逸精神。並將冰袋置在下腹部。用脫指棉繩帶塞在局部之處。至於流產的治療。乃與正常的分娩並無異致。但在應行注意之點。更應嚴守。

### (丙) 流產不可忽視

一般人對於流產。往往有輕視的傾向。在事實上雖不致太

碍生命。但因此亦有易起子宮內膜炎或實質炎等患。而成不妊症的頗多不少。又因胎盤和卵膜的一部份殘留在子宮之內。因此而起癥熱或惡性的脈絡膜一皮腫。就是子宮內發生惡劣性的腫塊。以致喪失生命的亦屬不少。

### (丁) 流產早產的原因和預防法

流產早產原因很多。其中發生於單純原因的較少。大部分都係種種原因湊合起而所以做妊娠的人不可不有這種常識。以便留心周到。現述大要如下。

主要的一種原因。乃是胎兒死亡。胎兒死亡的原因。也有種種。但不問任何原因。倘使一朝死亡的胎兒必由母體排出。

妊娠患有肺炎。傷寒。霍亂。瘧疾。丹毒等高熱的傳染病。或會患腎臟病。心臟病。腳氣。肺癆。白濁。梅毒等病。

胎盤的位置異常。(就是前置胎盤) 羊水過多。症臍帶的捻轉。雙生兒等變化。妊娠受有外傷。就是因為跌墜衝突。爭鬥等。情。受有激動及損害。或用熱水的腳浴。坐浴及海水浴。又如長途跋涉。舟車勞頓。異常的精神感動。意外的驚嚇。過激的性交等情。

妊娠中的服藥。也為流產早產的一種原因。

以上各種原因當中的梅毒。腎臟炎。子宮後屈症。子宮內膜炎。腫瘍等患。如不完全根治。那就容易變成習慣性流產。或習慣性早產。勢必反覆發生。貽害無窮。成為永遠絕嗣的惡果。

預防方法。除先明瞭上述各種主要原因外。若在流產預兆發現之時。急忙施行相當的處置。那末或可免除此患。這種相當的處置。除照上述的應急處置外。尚須避去各種興奮性的食物。並使精神肉體。不可疲勞。假使幸而轉危為安。化險為夷。那末此後的攝生。當然要格外慎重了。

### 二 產後惡露不下

寄先

原因。或子宮寒冷。或臨產受風。或中氣虛弱。惡露遂停留不下。延之日久。必生他變。凡血量閼絕。心腹痛。積聚癰瘍。四肢腫滿。血瘀癆瘍等症。皆因此而起。故惡露不行。為產後最關緊要之症也。

症候。初則小腹脹滿。雖痛可忍。繼而積瘀成塊。漸漸發熱。食量缺減。腹中發劇烈之疼痛。甚則惡心嘔吐。譖語昏狂。不時暈厥。或再感新邪。多成不治。

治法 產時去血過多。敗血已少。不必治也。但徐徐調養。新血自能生長。惟留瘀在腹。所宜急治。初治只宜生化湯加減。

芎歸散失笑散亦可服。而量便爲清營妙品。如遇惡露未淨。瘀血上冲頭目。昏暈心腹悶急。取清量便去頭尾乘熱服之。無不立效。

(方劑)

產後化瘀湯 炒山楂 延胡各錢半 廣鬱金 炒牛膝 各一錢 赤芍錢半 香附二錢 用益母草湯代水煎服 又方 當歸三錢 番肉炭 炒丹皮 濁蘭各錢半 川斷 製首烏各二錢 水煎溫服  
清熱消淤湯 細生地三錢 丹參 丹皮各錢半 大豆 卷二錢 荊芥子三錢 茯苓三錢 桃仁八分 山楂 梔子 澤蘭各錢半 號珀末三分 水煎溫服  
加減生化湯 當歸三錢 川芎錢半 益母草三錢 桃仁炒一錢 紅花一錢 蘇木錢半 丹皮二錢 炮薑三分 煎水溫服

## ■ 產後尿袋落

敵鎮江北人楊某。今春其妻產後。尿袋(即膀胱)忽脫落下。殊異常不適。乃至藥肆購魚腥草薰洗無效。後有張氏婦告

以一方至肉店內買豬臀頭一個。(連腸一尺餘。洗淨備燜。米十餘粒不可太多。置罐中燶爛食之可以獲效。後試之果驗。

## ■ 產後發熱

尤學周

產後體質虛弱。往往發熱。或因於外感。或因於血虛。因子外感者佔十之二三。因於血虛者佔十之七八。外感之證必頭疼脹項。背脊強畏風。無汗。食物變味。當用輕宣之劑。以祛寒散風。如荆芥前胡。蟬衣蘇葉桑葉等。不可用重劑表散。恐蹈虛脫之弊。若係血虛。時寒時熱。面色㿠白。唇淡無華。頭暉耳鳴。心悸不寐。自汗盜汗。舌苔淡白。脈象沉細。宜用培補之品。如當歸。熟地。人參。白朮。黃芪。白芍。茯神。酸棗仁。龍骨。龍齒。牡蠣等品。可酌量病情。加減用之。

陰虛發熱。若誤爲外感。而投以表散之法。則汗出愈甚。心悸愈增。而病勢日增。蓋汗爲心之液。心賴血之供養。汗愈出。則血愈虧。心無血以養。於是驚悸不寐等證。相繼作矣。

產後發熱。有因於惡露未盡者。則腹中結痛。按之有塊。治宜去瘀生新生化湯(當歸川芎桃仁黑薑甘草)。佛手散(八味歸川芎)。加味芎歸湯(當歸川芎龜版髮灰)。皆可採用。

以上三症。尙易調治。其有發熱不甚。或兼見咳嗽。似外感而非外感。似血虛而非血虛。醫者不察。誤認外感而投以疏散之品。反致自汗心悸。認為血虛而投以培補之品。雖不致變。然隔靴搔癮。亦難收效。還延時日。證情日增。往往不治。此種證候。大率爲產褥病。即普通之所謂產後。治療法當從治療方。法入手。不可固執普通之產後例矣。

## ■產後發熱之原理及治法的芻見

吳緯之

醫以愈病爲主。其診斷及治療。雖中西不同。然無非尋病症之因。恃藥物之力。助體功以驅逐病毒。兩方學理。原可會通。茲論產後發熱之理。就管見所及。將中西學說互相證明。淺陋之見。未審當否。尙冀高明有以指示之也。按產後發熱。除傷食外感二症外。以血亂蒸乳爲最多。蓋自受孕以後。子宮逐漸發展。至爲腹內最大之物。儼若增多一腑。故內經謂爲奇恒之腑者。良有以也。初時因神經不慣而起反射。遂生惡阻。症狀久之漸成習慣。人遂以安。及產後子宮縮小。移輸其血。至乳房。以爲乳腺化生乳汁之用。不免凌亂擁滯。因而發熱。惟不甚重耳。金鑑所謂三朝蒸乳亦當然者是也。用生化湯。加疏通之劑。治之可愈。其發熱之稍重者。則爲產後瘴熱。

蓋去血之後。再受瘴毒。則血必益虛。故熱不免。稍重中樞。雖有調節機能。亦是不能使之恢復。故須以補血和解之劑。兼投殺蟲之藥。調治得法。亦易收功也。(按瘴熱四時。皆有老少。皆能染受。不獨產後爲然。不過治法不同耳。因不關本篇範圍內事。故不并及。)至產後熱之最延緩者。則爲瘴熱。西醫籍謂是一種細菌。由產門創傷處侵入而成者。其病狀似瘧。但寒熱去來無一定之期。設爲治療之法。之決不見功效。調理之道。惟有溫補氣血。以壯體功。并投殺菌之劑。以減病毒。久而久之。則體功之抵抗力漸盛。病毒漸消。漸愈而已。所以病期不能預定。須視其體功之恢復。爲何如耳。大約一月或數月不等。此即中書所謂助正逐邪之義耳。間或調治不良。纏綿日久。形銷骨立。終成蓐勞而死者。然亦有續發心肌肉。心外衣及心內衣炎者。皆屬險症。病期愈難解決。縱不至死。亦必遺留後患。此外則爲血虛發熱。須分輕重。輕者血雖虛而不至使生理變化。溫度如常。六脈靜絕。不外表層微熱而已。調養得宜。容易復原也。重者則因產後子宮不能收縮。致血去過多。因而眩暈。甚者面白唇白。舌色指甲無不白矣。此等症狀。中書謂爲血崩眩暈。其或因神經失養。而現驚悸。恍惚症狀者。則中書所謂產後血虛心氣不守。神氣怯弱者也。此時若體溫不升。脈不甚數。徐徐調補。尙或不至危殆。惟

亦不能速效耳。反是則體溫升高。六脈弦數。重按無力。則爲血虛發熱之最重者矣。病勢至此。最爲難治。而此種病理與血行器之變化。亦有關係。則又最堪研究者也。大凡無病之人。血皆脹滿脈管。故血至而脈管舒寬。其象圓整。(按惲鐵樵先生脈學發微篇云。脈管容血。恒略溢於其所能容之量。惟其如此。吾人診脈之頃。必覺指下湛然。脈管既溝。脈象遂圓。又云。脈之遲。由交感迷走兩神經互相調節。所以不病之體。無所欹重。能得保持平均。故脈搏必整)。今因下血過多。遂致不能脹滿脈管。接之便覺中空。所謂芤脈是也。但血既不能脹滿脈管。則脈管壁之彈力。即不能使脈管之血。常通過微絲血管。循靜脈還歸心房。(按惲氏又有言曰。脈管壁有彈力。血在脈管中分量恒微溢於脈管之所能容。蓋必如此。然後其勢力。乃能直達於微絲血管)。遂致微絲血管。有所滯鬱。生理上遂起變化。心跳加速。脈管縮窄。在體功之目的。不過欲壓迫血行。使微絲血管勿有滯積。得以減輕病勢而已。然脈象已變爲弦數矣。倘至此。血猶不能通行無碍。則爲滯鬱之極。而熱度亦因之而增高矣。因此既停鬱不行。則血中之養氣合燐質而起燃燒。惟燃燒所以作熱。此等症狀。因下血多而虛。因虛而鬱。因鬱而熱。而神經之調節體溫機能。似亦弛廢。東垣所謂甘溫除大熱者。似可吻合。蓋即

整頓其調節機能。並溫通其血流也。此時病人如能消受補劑。則或可挽救。否則決死無疑矣。產後發熱之症。要不外此數種。不過淺陋之學。容有未中於事理者。尚望明達教正。

## ■產後骨盤痛與瘀血痛之鑑別

李健碩

世人每謂產後腹痛。是因瘀血停積作痛。宜與散氣破血之藥。以除瘀血。乃愈服破血。而腹愈痛。甚至血海枯涸。惡症叢生。豈可不戒者。獨不知產後骨盤虛痛者。十居八九。而瘀血腹痛者。十僅一二耳。蓋產後交骨大開。骨盤空虛者。任脈萎弱。引血之機能遲鈍。骨盤之神經受反射之刺戟。而引起凌厲麻痛。誠非瘀血積滯而作痛也。夫骨盤虛痛。其痛在於小腹。牽引腰背。連及陰器。若久坐其痛益劇。以手按之。稍止。與瘀血鬱結作痛。大相懸殊。然瘀血阻滯。係屬有形之痛。痛時小腹紐結如石。以手按之。其痛加劇。此症多由婦人產後時。或因憂思憤鬱。氣滯不行。或因驚怒傷肝。肝血不舒。以致血瘀。而成停瘀。宜與加味逍遙散。以開肝鬱。以通瘀血。自然有滯而停瘀。宜與加味逍遙散。以開肝鬱。以通瘀血。自然有效。若骨盤虛痛。投以此藥。反成大害。爲醫者。不可不小心分別施治。鄙人因鑒世人多以產後骨盤虛痛。認爲瘀血。紐痛。屢投破血之藥。誤害頗多。心實深痛。專志研究。撰作此篇。冀

將生平經驗良方錄於下。用公於世。  
蘇黨參三錢。秦當歸二錢。川芎錢半。牛膝三錢。  
續斷三錢。川升麻錢半。元胡索二錢。青皮木香各  
錢半。炙黃耆三錢。炙甘草一錢。  
清水一杯半煎八分冲好酒一羹匙溫服。連服數劑即可奏  
功。宜安臥牀榻不宜久坐至爲叮嚀。

## ■兒枕塊痛

丙辰夏內子產四產後。忽患兒枕塊。痛遍醫不效。後晤同寅  
某君云可覓江西禁碗之草拂去塵土剪成寸許。煎服即愈。  
試之果驗。按兒枕塊痛係婦女產後瘀血所致。禁碗之草能  
行血故也。

## ■產後瘀血作痛方

用山楂炭五靈脂蒲黃香附元胡索杜牛膝炒荆芥穗各等  
分。清水一杯半煎八分冲米酒一匙溫服最有效驗。  
(按)山楂炭五靈脂蒲黃香附元胡索杜牛膝炒荆芥穗均  
爲行血破瘀之藥。以治瘀血功效自彰。

## ■產後血腫

魏小泉

城東倪家婦產後惡露不行。少腹堅微痛。面目周身俱腫。渡  
亦短少。已及旬不愈。其家憂懼異常。予謂此症由產後停瘀  
不下。瘀化爲水。浸於皮膚之間。故面目皆腫。唐容川血證論  
中名爲血腫。當用生化湯合失笑散加澤蘭琥珀二茶澤瀉  
一服而瘀行痛止。再服而溲利腫消。再調理數日而體氣如  
常。

## ■產後敗血成癰

周越銘

原因。產後氣血兩虛。榮氣不從。逆於肉裏。或敗血留內。遂  
成癰癧。治療。此症切忌寒涼敗毒。恐潰後腐爛。必難醫治。  
方劑。生化湯加連翹銀花甘草乳香沒藥。

全當歸三錢。川芎一錢。甘草八分。桃仁十粒。  
炮姜炭四分。連翹錢半。銀花二錢。甘草節一錢。  
乳香沒藥各八分。

右方用黑大豆三十粒炒熟。以酒沃之。水煎服。

## ■產後行房治驗案

盧震春

前閱李福報載有虞舜臣先生產後行房一案。奉讀之甚異。  
不意於七月初旬。有張右者來就診。望其面無血色。白且微

青爪甲亦然。呻吟之聲達於戶外。切其脈沈而且細。舌苦色白。知感寒所致。隨問其何以致此。右則吃吃不出面現愧色。以手捫腹。惟裏氣不已。春遂正色問曰。夫疾除。望聞切三診之外。若不詳詢病源。用藥恐不克效。右因曰。方產數日。我夫即欲行房。余不允。固強之。卒未能免。如斯者三次。越日右脅有筋一條牽引。少腹疼痛。惡露至今淋瀝不斷。云按產後甫數朝。子宮溫度尙未復元。今即交媾。以致寒氣襲於胞中。與瘀血相搏。故苦痛乃爾。須慎防損症。因擬祛寒行瘀法。用小

茴香錢半煎水炒當歸尾三錢。淡吳萸八分。煎水炒杭白芍三錢。製香附錢半。酒洗西紅花八分。青陳皮各錢半。炒桃仁三錢。熟附片錢半。上紫油桂八分。(研末和藥服)川玉金一錢。台烏藥錢半丹參三錢。炒黑荆芥錢半。炮姜四分。澤蘭葉錢半。照此方加減。服至十數帖。迨下旬復來診。謂惡露已盡。胎前有疾。用藥恐其傷胎。故動輒顧忌。產後兒既出。胎似無碍。手矣。不知婦人產後。八脈空虛。藥性之與分量。偶一偏欹。頃刻生變。較諸治胎前病之困難。則有過之。該所謂甯治十男子。莫醫一婦人。即指胎前產後而言。

胎前病之自療各法。既已介紹於讀者。諸君乃進而着手編輯。產後病之自療法。共分爲四十七條。凡產後常見而緊要之病症。無不歷舉其治法。讀者諸君。玩索而有得焉。亦可以應用不盡矣。

## ■產後病自療法

朱振聲

引言

(一) 產後胞衣不下自療法

原因 多由產婦努力送兒。氣已虛乏。無力再送胞衣。

微寒微熱。咽喉奇癢。用桑杏湯合二陳湯去沙參豆蔻。加薄荷。蘇梗。桔梗。香草。麥皮。白芍。元參。知母。出入爲方服至四帖。

症狀 小兒下地已久。胞衣尚不落。治療 一手在少腹上輕輕撫摩。一手持臍帶輕輕下引。仍不下。宜服生化湯。

處方 全當歸二錢 大川芎八分 炮姜炭五分 益母草二錢 桃仁泥三錢 路黨參四錢 炙甘草五分

### (一) 產後惡露不下之自療法

原因 氣虛而滯。經絡不利。瘀血壅而不宣。積蓄於內。故不行。

治療 宜溫緩活血。則瘀自行。

症狀 惡露不下。小腹脹滿刺痛。

處方 路黨參三錢 炒歸身三錢 大川芎八分 延胡索錢半 炒赤芍錢半 炒蒲黃錢半 製香附一錢 淡乾姜四分 益母草二錢 陳廣皮八分 炙甘草五分

### (二) 產後惡露不止之自療法

原因 產後氣血俱虛。不能統攝。故惡露綿綿不絕。

症狀 血色淡紅。綿綿不止。四肢怠倦。納食減少。

治療 宜調氣補血。

處方 高麗參二錢 炒當歸二錢 大熟地五錢 土炒

白朮二錢 炙升麻五分 陳廣皮一錢 西黃芪二錢  
雲茯苓三錢 炙甘草五分 阿膠珠三錢 大棗五枚  
生姜一片

### (四) 產後玉門不閉之自療法

原因 皆由氣體虛弱。胎前失於調養。以致氣血不能收攝。之故。

症狀 陰戶啓張。不能收復原狀。

治療 用生甘草二兩 檉白皮一兩 嫩槐枝一握 夜合花五錢 煎濃湯。先薰後洗。內服補中益氣方。

處方 西路黨三錢 炒白朮三錢 炙黃芪二錢 全當歸三錢 大熟地三錢 炒白芍錢半 小川芎八分 炙升麻三分 陳廣皮一錢

### (五) 產後子宮不收之自療法

原因 由臨產努責過甚。兼氣虛下陷之故。

症狀 有物如茄翻出陰戶。

治療用 紫梢花 胡蘆巴 蛇床子 檉榔各一錢 煎湯薰洗。內宜用補中益氣法。

處方 見玉門不閉條。

(六) 產後無乳之自療法

原因 產後血虛不能變化爲乳。即有少量乳汁亦不能流注。

症狀 乳汁不下。吮之亦無。

治療 宜培補氣血。

處方 路黨參三錢 生黃芪三錢 大熟地四錢 全當

歸二錢 大麥冬三錢 瓜蔞皮二錢 王不留行二錢

路路通五個

炙甘草五分

(七) 產後乳出不止之自療法

原因 胃氣虛不能收攝。則乳汁自流不止。

症狀 不必吮吸。乳汁自流滴滴不止。

治法 宜補攝兼施。

處方 路黨參二錢 炒白朮二錢 雲茯苓三錢 西黃

芪二錢 五味子八分 炙甘草五分

(八) 產後血虛而量之自療法

原因 產後去血過多。氣竭神昏。將脫之兆。

症狀 氣喘神昏。心慌汗出。脈微欲絕。

治療 先以酸醋數斤。註入銅壺。以炭燒紅投醋內。其氣上升。薰入鼻孔。俟醒。再用大補氣血之品。

處方 吉林參四錢 西黃芪四錢 大熟地一兩 全當  
歸(土炒)四錢 小川芎一錢 炒白朮三錢 炒白芍三  
錢 熟附塊五分 雲茯苓三錢 陳廣皮一錢 炙甘草  
三分

(九) 產後敗血上冲而暈之自療法

原因 惡露不下。敗血上冲。神經激動。發爲昏暈。

症狀 前症心慌汗出脈微。一派虛脫之象。此則二便滯少。

少腹脹實。惡露不下。乃爲實症。

治療 去瘀導滯。

處方 酒炒當歸二錢 小川芎八分 黑芥穗二錢 生

芍二錢 炒蒲黃二錢 五靈脂錢半 黑乾姜三分

桃仁泥二錢 炙甘草五分 大棗五枚

(十) 產後血崩之自療法

原因 產後血崩。總屬血不歸經之故。蓋肝藏血。脾統血。惟  
肝虛不能藏。血脾虛不能統。所以血不收斂。而泛濫奔流。  
直如山崩水決而不能制也。

症狀 口唇淡白。面無華色。汗多神疲。形脫氣微。此症與惡露不止。同一根源。惟症狀較惡露不止為猛烈耳。

治療 宜大補氣血以挽狂瀾。

處方 高麗參三錢 炒當歸三錢 炙生地四錢 炒白朮三錢 阿膠珠三錢 西黃芪三錢 黑芥穗一錢 炙升麻五分 淡黃芩八分 炒白芍錢半 大棗三枚 炙

### (十一) 產後鼻血之自療法

原因 產後惡露不下。虛火載血上升。遂從鼻竅而溢出。

症狀 惡露不下。鼻中出血。

治療 用倒經法治之。

### (十二) 產後感冒之自療法

原因 起居不慎。感受風寒。

症狀 發熱惡寒。頭疼鼻塞。脈浮苔白。

治療 宜疏解表邪。

處方 紫蘇葉七分 炒荆芥一錢 炙桑葉二錢 嫩前胡一錢 光杏仁二錢 清水豆卷三錢 炒枳壳八分

小川芎八分 炒穀芽二錢

原因 人之胃腑為水穀之海。水穀之精化而為氣血。榮潤臟腑。產後空虛。邪易乘入於腸胃。致氣逆嘔吐。  
處方 全當歸二錢 炒白朮二錢 淡乾姜五分 蒜瓣參三錢 公丁香四分 半夏麪一錢 杜鵑香一錢 陳廣皮八分 炙甘草三分  
症狀 嘔吐氣逆。不欲飲食。  
治療 宜溫中健胃。

### (十四) 產後嘔逆之自療法

原因 產後形體勞倦。脾胃虛弱。不思食而強與之。胃雖勉受脾難轉運。致成傷食之症。

症狀 食停宿満。嗳腐吞酸。

治療 宜健脾助胃。加以輕品消導之藥。

處方 炒歸身三錢 小川芎一錢 焦白朮一錢 焦神曲二錢 焦麥芽二錢 陳廣皮八分 春砂壳五分 炙

甘草五分

### (十五) 產後膨脹之自療法

原因 產後中虛傷食。瘀積相併。則腹脹而脹。

症狀 腹中膨脹。飲食無味。得矢氣則暢適。

治療 宜寬中消滯。

處方 炒當歸二錢 小川芎八分 白朮炭錢半 炙姜炭四分 焦麥芽二錢 焦神曲二錢 炒枳壳八分 陳廣皮一錢 炙甘草二分

### (十六) 產後血虛發熱之自療法

原因 陽虛則寒。陰虛則熱。血屬陰。產後去血過多。最易發熱。

症狀 胶體怠倦。其熱不揚。日輕夜重。

治療 宜補血養陰。

處方 大熟地四錢 大生地四錢 炒當歸二錢 小川

芎八分 炒白朮二錢 炒白芍二錢 抱茯神二錢 酸棗仁二錢 遠志肉七分 龍眼肉七枚 生姜三片

### (十七) 產後虛煩之自療法

原因 產復氣血未復。津液未充。因思慮操勞。以致心火虛炎。腎水不能上濟。故有煩躁不寧之象。

症狀 心中懊憹。口渴思飲。夜不得眠。或兼出汗。

治療 宜壯水制火。益氣寧神。

處方 大熟地三錢 北沙參三錢 五味子七粒 炒枳壳一錢 新會皮一錢 仙半夏錢半 炒竹茹三錢 陈茯神三錢 炒棗仁四錢 遠志肉一錢 炙甘草五分

### (十八) 產後自汗之自療法

原因 產後營氣不足。衛氣失守。不能斂皮毛。固腠理。故動輒汗出。若不甚多。或偶出即止。無甚妨礙。惟大汗淋漓。狂來不止。恐有「陽之虞」。

症狀 始不過唇燥口乾。身作困倦。屢出不止。則精神漸少。力氣漸衰。或目昏頭眩。或筋脈拘攣。再不止。必致津液枯涸。來肝風大動。手足振顫。

治療 宜育陰潛陽。

處方 西黃芪二錢 防風根一錢 煙牡蠣五錢 生熟

地各四錢 天花粉錢半 大麥冬三錢 五味子六分

淮小麥三錢 大南棗三枚

### (十九) 產後盜汗之自療法

原因 雜證論云。陰虛則盜汗。產後陰血虧耗。故易盜汗。

症狀 睡中汗出。醒來即無。

治療 宜養陰止汗。  
處方 路黨參四錢 炒當歸二錢 大熟地二錢 天花  
粉三錢 煅牡蠣四錢 浮小麥四錢 瘿桃乾八枚 大  
紅棗十枚

### (二十) 產後蓐勞之自療法

原因 蔊草毒也。產婦坐草艱難以致過勞心力氣血大虧。  
變爲勞倦虛弱諸症故曰蓐勞。

症狀 血虛陽無所依而爲發熱自汗氣喘虛煩等象。

治療 調補氣血增加病人之抵抗力以恢復其元質。

處方 大熟地一兩 大生地五錢 全當歸三錢 人參

靈芝三錢 炒白朮三錢 肥知母二錢 大麥冬三錢 炒  
白芍錢半 五味子五分 地骨皮錢半 功勞葉錢半

炙甘草四分

### (二十一) 產後房勞之自療法

原因 產後未滿二月不戒於慾以致血液阻滯而發熱。

症狀 身熱脈數肢體怠倦飲食漸減似外感而非外感似內傷而非內傷故有誤認爲蓐勞者惟蓐勞乃產後月內之病此乃生產後一月以外之病也。

治療 宜通流氣血。

處方 全當歸二錢 大熟地四錢 人參鬚二錢 炒赤  
芍錢半 炒冬朮二錢 真新絳八分 桃仁泥三錢 五  
靈脂三錢 延胡索錢半 紅鵝冠花七錢 青葱管三莖

### (二十二) 產後癲厥之自療法

原因 產後陰血既虧更加思慮操勞以致心陽外越肝木  
鴟張化熱燥陰生風劫液遂生癲厥之變。

症狀 筋脈拘急手足振顫甚則噤口咬牙不醒人事。

治療 宜平肝風潤血燥保津液扶元神不可妄用消散開  
透之法。

處方 大生地四錢 生白芍二錢 生牡蠣四錢 炒阿  
膠三錢 黃菊花二錢 生鱉甲四錢 青龍齒五錢 大

麥冬三錢 甘枸杞三錢 珠茯神三錢 明天麻五分

### (二十三) 產後驚悸之自療法

原因 心血虧耗神氣不守或外受驚恐所致。

症狀 心中恍惚畏聞人聲如人將捕之甚則徹夜不寐寐  
即驚醒或兼煩熱或兼冷汗。

治療 宜重劑補血養心。

處方 西潞黨三錢 全當歸二錢 紫丹參八分 小川芎八分 遠志肉一錢 珠茯神三錢 青龍齒五分 柏子仁一錢 龍眼肉八枚 炙甘草三分 珠燈心一粒

原因 產後血虛不能養心。以致心神模糊。

(二十四) 產後妄見妄言之自療法

原因 產後血虛不能養心。以致心神模糊。  
症狀 妄見妄言。有如邪祟。

治療 宜安神定志。

處方 炒歸身三錢 小川芎八分 柏子仁三錢 人參鬚三錢 大麥冬三錢 炒棗仁三錢 遠志肉一錢 炙甘草七分 龍眼肉十枚

(二十五) 產後癲狂之自療法

原因 惡露不多。敗血未淨。遇阻在內。刺激神經。  
症狀 神昏譖語。歌笑怒罵。坐臥不安。俗謂之衝心。

治療 宜祛瘀甯神。

處方 全當歸二錢 小川芎一錢 生熟蒲黃各錢半  
桃仁泥三錢 炮姜炭六分 離蘭葉二錢 磬紅花錢半  
上降香七分 遠志肉七分 西血珀三分 炙甘草八分  
珠茯神三錢

(二十六) 產後喘促之自療法

原因 失血過多。孤陽無依。上逆作喘。或感受寒邪。邪氣入肺。與肺氣爭持。而作咳喘。

症狀 虛者氣短脈弱。感冒者。氣粗脈浮。一虛一實。

治療 虛者宜育陰納陽。感冒者。宜疏散而兼補。  
處方 見哮喘病自療法。

(二十七) 產後浮腫之自療法

原因 脾腎兩虛。脾虛不能制水。腎虛不能行水。水溢肌膚。  
症狀 手足浮腫。皮膚光澤。

治療 宜實脾制水。補腎行水。

處方 炒白朮三錢 製厚朴五分 大腹皮二錢 白扁豆二錢 生苡仁三錢 白慈仁五分 生姜皮四分 西蓍皮三錢 金匱腎氣丸四錢 (包)

(二十八) 產後喘腫之自療法

原因 諸溼腫滿。皆屬於脾。脾虛生溼。溼鬱生水。水溼泛濫。無所不到。肺為水之上源。不能通調水道。下輸膀胱聚水。腫肺病及腎。腎氣不納。肺虛不降。則發為喘。

症狀 遍體浮腫。咳嗽氣喘。難以平臥。

治療

宜順氣化濕。

處方 生白朮錢半 肉桂心三分 炙蘇子二錢 淡姜皮六分 連皮苓四錢 化橘紅八分 炙桑皮二錢 川椒目十粒 粉猪苓六錢 光杏仁三錢 象貝母三錢 濟生腎氣丸三錢(包)

### (二十九) 產後手足痺痛之自療法

原因 人身之經絡全賴血液以濡養。產後陰血已虧。不能營養經絡。邪風入絡。有宿瘀不通則痛。

症狀

手不能舉。足不能行。肢節疼痛。

治療

宜養血祛風。去瘀通絡。  
處方 全當歸二錢 大川芎八分 青防風八分 大白芍錢半 木防己錢半 西秦艽一錢 陳木瓜二錢茺蔚子三錢 紫丹參二錢 淮牛膝二錢 嫩桑枝四錢酒炒

### (三十) 產後頭痛之自療法

原因 產後血虛火上炎。內風因之厥動。或偶感微邪。乘血虛而上逆。

症狀 頭痛時作時止。痛處多在太陽穴。以布擦頭。略覺舒適。

治療

宜化滯消瘀兼通陽法。

適治療 宜養血以去風。

處方 炒當歸二錢 炒杞子二錢 菊花炭錢半 小川芎一錢 蔓荆子錢半 荆芥穗一錢 抱朴神二錢 明天麻八分 連鬚葱白五莖 生姜三片

### (三十一) 產後偏頭痛之自療法

原因 偏頭痛屬於肝病。產後血虛生風。肝陽上升。症狀 產後頭痛。或偏左。或偏右。脈形弦細。

治療 宜養血熄肝。

處方 全當歸二錢 炒川芎八分 阿膠珠三錢 白芍利三錢 紫丹參二錢 炒赤芍錢半 石決明六錢 黃菊花錢半 益母草三錢 煎湯代水

### (三十二) 產後心痛之自療法

原因 心痛之症極少。普通所謂心痛。指胃脘痛而言。症由產後惡露不盡。瘀濁內阻。清陽不得開展所致。

治療 後覺嘈。

宜化滯消瘀兼通陽法。

處方 製川朴七分 製半夏錢半 延胡索錢半 全當

歸二錢 瓜蔞皮錢半 高良姜五分 製香附一錢 五靈脂錢半 炒蒲黃錢半 白茯苓二錢 薄橘紅八分

(三十二) 產後兒枕塊痛之自療法

原因 產前聚血。產後氣虛。惡露未盡。新血與舊血相搏而痛。俗謂之塊兒。基痛。實即血瘀之類。

症狀 腹中有塊。上下時動。痛不可忍。

治療 以祛瘀為主。

處方 全當歸三錢 元胡索錢半 炒蒲黃二錢 五靈脂二錢 桃仁泥二錢 紫丹參錢半 炙乾姜五分 炒

赤芍二錢 原紅花五分

(三十四) 產後受寒腹痛之自療法

原因 睡臥不慎。風寒入脾。則腹中作痛。

症狀 其痛綿綿。以熱手按之則舒適。

治療 宜散其寒氣。

處方 紫蘇葉一錢 春砂仁四分 公丁香四分 陳廣皮一錢 黑乾姜五分 廣木香七分 炒赤芍錢半

(三十五) 產後腹痛帶下之自療法

原因 惡露停留。脈絡阻滯。遂令瘀滯化帶。

症狀 少腹墜痛。腰尻作疼。帶下陣陣。

治療 宜化腐去瘀。

處方 全當歸二錢 川斷肉三錢 蕁草炭一錢 白芍

利三錢 烏賊骨三錢 紫丹參二錢 洋蘭葉錢半 炙

茯神三錢 川貝母二錢 製香附二錢 大南棗三枚

(三十六) 產後小便不禁之自療法

原因 產後氣弱。不能收攝腎氣。以致膀胱失司。

症狀 尿意頻頻。時欲小便。

治療 宜固攝腎氣。

處方 炙黃芪二錢 路黨參三錢 炙生地三錢 炒白芍二錢 蔡絲子三錢 煅牡蠣四錢 覆盆子二錢 煅

益智錢半 炙升麻四分

(三十七) 產後傷肝之自療法

原因 臨產時用力太過或守產醫生手術不周。以致膀胱受損。

症狀 小便自遠。

治療 宜用補脾飲。

處方 柴灰淋汁用生黃絲絹一尺。白牡丹根末二錢。白芨末二錢入柴灰汁內煮至絳爛如餡服之。始靜臥不可作聲。

### (三十八) 產後小便淋瀉之自療法

原因 營血已虧。宿瘀未清。挾濕下注膀胱。宣化失司。

症狀 少腹微脹而痛。小便淋瀉脈弦緊。

治療 宜和營祛瘀。通利州都。

處方 全當歸二錢 穀茯神三錢 澤蘭葉錢半 藁薢梗錢半 紫丹參二錢 生草梢八分 益母草三錢 大

### (三十九) 產後泄瀉之自療法

原因 產後血虛。脾胃不健。易於積食傷溼而成泄瀉。

症狀 泄出稠黏。完穀不化。久則胃納漸減。腰腿痠軟。治療 宜消補兼施。

處方 土炒白朮二錢 淮山藥二錢 全當歸二錢 白扁豆二錢 炙姜炭四分 春砂壳五分 煙肉棗五分

六一散三錢(包) 猪茯苓(各)二錢 炙甘草三分 陳

廣皮五分 炙內金錢半

### (四十) 產後便閉之自療法

原因 產後去血過多。傷其津液。以致胃燥腸枯。故大便難。

症狀 大便難行。數日一行。或十數日而不行。

治療 若無腹滿之苦者。不必輕下。反傷元氣。如腹中脹滿。

欲便不得不勝其苦者。用潤下法。

處方 柏子仁三錢 郁李仁二錢 白杏仁三錢 松子仁三錢 大麻仁三錢 陳廣皮八分

### (四十一) 產後便血之自療法

原因 由脾虛不能攝血。兼之腸胃有熱。迫之外溢。

症狀 大便帶血。甚則其下如注便下。盡殷紅之色。

治療 不得妄用止瀉。宜實脾清腸。

處方 炒白朮二錢 清炙炭一錢 京元參三錢 生地炭三錢 淡黃芩一錢 槐米炭一錢 銀花炭二錢 酸棗仁四錢

### (四十二) 產後脫肛之自療法

原因 臨產努責太過。肛門下脫。產後又氣血兩虛。以致不

能收攝恢復原狀。

症狀 肝門下墜坐不安適。

治療 用補中益氣法。

處方 西黃芪三錢 路黨參五錢 炒白朮二錢 全當歸二錢 炙升麻一錢 北柴胡五分 炙甘草五分 陳廣皮八分

### (四十二) 產後腸癰之自療法

原因 產後氣血兩虛不能周行。血之敗者日以壅積遂成癰瘍。

症狀 胸中懊憹。腹中堅痛。小水不暢。脈洪而數。

治療 切忌寒涼敗毒。恐潰後腐爛必難醫治。

處方 全當歸二錢 小川芎一錢 粉丹皮二錢 生苡仁五錢 冬瓜子五錢 瓜蔞仁五錢 金銀花三錢 炒赤芍三錢 連翹壳三錢 炒竹茹錢半 地扁蓄一錢 乳沒藥五分

### (四十四) 產後乳癰之自療法

原因 產後乳汁源源而來。其數不通。則壅塞不行。成爲癰瘍。

治療

處方 見癰疾自療法。

### (四十七) 產後霍亂之自療法

症狀 初起有塊作脹。日漸紅腫。失治則潰爛。

治療 宜活血通絡以消散之。

處方 連翹壳三錢 瓜蔞皮三錢 小川芎一錢 皇葵刺二錢 福橘葉錢半 小青皮一錢 桃仁泥三錢 炙甘草一錢 已潰破者加人參二錢 黃芪二錢 當歸二錢

### (四十五) 產後痢疾之自療法

原因 或傷飲食。或受寒邪。釀於腸胃。傳變爲痢。

症狀 腸痛難堪。裏急後重。如廁則又不爽。痢下或赤或白。

治療 清瘀行滯而健脾胃。

處方 見痢疾自療法。

### (四十六) 產後瘧疾之自療法

原因 瘴爲傳染病之一。產後氣血兩虛。不但易於傳染。而抵抗力薄弱。一經傳染。每纏綿不愈。

症狀 寒熱相乘。或一日一發。或間日一發。或三日一發。

治療 宜扶元而祛邪。

處方 見瘧疾自療法。

原因。冷熱不調。感受時氣。邪正相搏。升降不順。清濁淆亂。於腸胃致成霍亂。

症狀 中脘不舒。上吐下瀉。口渴引飲。

治療 分清降濁扶正逐邪。

處方 金當歸二錢 炒白朮一錢 生苡仁四錢 白扁豆三錢 製川朴七分 製半夏二錢 杜霍香三錢 花椒一錢 炒六曲三錢 清吳萸五分 猪茯苓各二錢

## ■產後之要方

時逸人

世人以生化湯爲產後要方。醫家病家胥視爲利劑。余以爲藥所以治病非可以無故服之者。茲特分別舊方生化與新方生化之功用。及與產後之關係。世之衛生者。幸垂教焉。

舊生化湯治產後瘀血停滯之症。

全當歸三錢 川芎錢半 炮姜炭五錢 桃仁七粒  
灸草八分 陳酒一杯冲服。  
新生化湯治產後瘀血停滯之症。或惡露不下。或腹中塊痛。  
全當歸三錢 益母草三錢 丹參三錢 桃仁七粒  
益元散二錢 白蘿蔔汁一杯 清白蜜便一杯

說明 原方用當歸炮姜炭。川芎桃仁。益母草之溫升爲陽虛。不運者立法。若陰虛火旺之體質。大非所宜。故石蒂南氏。

另訂新方。以清熱活血。然余以臨症之經驗。參合。知產後病症。陽虛不運者。實居多數。舊方不可全棄。新舊兩方並行。不悖可耳。於活血行血藥中。加益元散。量便之。清熱利大便。藉汁之清熱。生津液。不可謂非石氏之巧思神悟。若因陽虛不運而見脘悶。嘔逆。肢涼。自汗。身熱。惡寒。發行不暢等症。則舊方加化痰順氣藥品。大有殊功。非石氏新訂之方所能及。但藥所以治病。無病不必服藥。世人以生化湯爲產後通行之藥。甚有無故而服之者。則誤之矣。

(附解)西醫以產後子宮血管破裂。宜用收斂之劑。此大誤也。子宮血管既以破裂。必有瘀血停滯。不行其瘀。惟以收斂。豈不誤事。况中醫治產後變生諸症。最爲合拍。惟無故而服之。斯不可耳。

當歸補血湯 當歸黃芪

(按)此方過用黃芪。仍以當歸補血爲名。蓋有形之血。不易驟補。無形之氣能生有形之血也。

補氣解暑湯 人參 生黃芪 當歸 荆芥炭 炮姜炭 等

## ■產後宜安靜

(甲)產後的睡眠

產婦在產褥期的臥室。最好寬廣幽靜。空氣流通。室內溫度。

宜在攝氏十八度左右日光換氣不可直接。室內除醫師助產士或護士外務宜限制出入以期清潔而達肅靜。此時產婦的精神極易感動無論喜怒哀樂慎勿使之稍有感觸。所以在分娩後的二三日內務使晝夜安睡以便身心靜逸見聞不亂切勿任意起立行動以免發熱出血之危本身和家族都應充分注意。

### (乙) 分娩後十日間的心得

分娩後就床的時期從前的人以為三個星期已夠休養。但是實際上欲得產後的充分休養須在六個星期以內為度。因為起立太早則有種種害處例如出血量多易患發熱而且子宮位置及形狀容易變化並有血栓血塞之危。心身怎樣才可安靜就在產後十日間的心得可以知道。

為產婦生活就是重病人的生活所以需要安靜達於極點。一切床外行動應該在可能時期以後徐徐應付為宜。今述心得如下。

一、頭二天須仰臥。分娩方畢之後絕對需要安靜已如上所述。頭二天產婦應該仰臥以免空氣侵入子宮對於飲食排便均應在牀上為之切不可起立如側。

二、三日後可側臥。第三日飲食授乳可以自由側臥。第四

日可以隨意掉換睡眠的方向假使固定偏於一側那末要使子宮的位置發生惡化又如仰臥太久就有子宮後屈的起因所以最好左右各側隨時互易。

三、五日後可起坐。五六日以後對於授乳排便飲食等事可以隨便起坐但仍不可離牀否則離牀太早難免發熱或出血之危。

四十日後可稍動。十日後或兩星期後如果子宮收縮佳良惡露正常可以稍稍起立但仍可以在牀之時較多為宜。大抵至少須在三個星期以後方可正式離床六個星期以內切勿操勞過度。

## 口產後之衛生

樊須欽

### (一) 引言

婦女生平最痛苦最抱憾底事情要算「生產」這件事了。偶然有點不當心那就生病咧輕的或者淹縛床褥重的就致於傾生殞命像這樣而死的不知有多少豈不可怕嗎。然而仔細研究起來這種情形雖未必時常發生但造成這種慘劇的罪咎就應當歸於家庭中看護的不良了。看護如果得當那產婦便可以享安健的幸福何致於生命與死為鄰呢。所以產後的看護是非常重要的現在姑且舉個要點來說。

說。雖是老生常談。却也和產婦的生死攸關。不可輕意忽略過喲。

感情也應當禁止。總之一切舉動。容易使產婦刺激的都在禁止之例。

### (一)身體的靜養

產婦經過生產以後。身體的安靜是不可少的。一二日的必須仰臥。非到四五日。即使在床起仰坐臥。也是非常要當心。因為產時受到許多痛苦而身體大經創傷。至於子宮下血等。身體是虧極了。非靜養不可。萬一不慎。那就可促進下血及病毒侵入陰部。而發生可怕的產褥熱等症。入於危險之境而不可救。多麼可憐呢。然而往往田舍中人在產後一二日就起居動作。一如往常。這種輕舉妄動。何等危險啊。所以據學理和實驗來說。必須在床睡眠九日。或十日以上。那末產婦可以得到充分的靜養哩。

### (二)精神的休養

休養精神。也是產後唯一的要務。因為產婦的神經很容易刺激。尤其在八九日以內。倘使有一些感觸。便易釀成大患。所以無論什麼事。最好不必告知。家事更宜禁絕。其他如高聲談笑。玩弄發音機和產婦互談等事。有勞產婦的神經。最非所宜。再有憤怒。悲哀。怨恨。恐怖的動作。足以激動產婦的

疾病的發生。大都因着不清潔而來的。倘使能夠清潔。並且消毒。那病痛便可以減少哩。所以無論什麼病。能夠消滅毒菌而講清潔。倒也是治療上的一助。但這二端。更其為產後的要務。因為危險病毒的侵入。由於消毒不完全而做的媒介。那末產後創口。就應當用煮沸的溫水和乾淨軟棉布揩洗。同時並用百倍或三十倍的石炭酸水浸入軟棉洗滌創處。消毒之後。再拿浸漬的軟棉和布貼固創處。再用繩帶紮之。

### (五)飲食的調節

飲食的注意。是非常繁博。現在祇好簡略的說。說產婦在一、二日內。最好以牛乳雞汁肉汁之類。以後就稍進稀粥。雞子流動性而易於消化的東西。庶乎不致呆滯腸胃。如果脂肪多或含有刺激性的東西。就切不可進。否則腸胃受傷。便有下痢泄瀉諸病發生。那是很危險的。

### (六) 衣服的適宜

衣服這一個問題。總要跟着時令和氣候而轉移的。冬令天時雖冷衣着也可過厚過厚要發泄皮膚的。夏季氣候雖熱穿的也不可太薄。薄了容易感冒的。最好溫暖要調和不可過冷或過熱。還要寬大舒軟為宜。至於潮溼和不潔淨的衣服。切不可近身。應當時時更洗。那才可使產婦的身體安適哩。

### (七) 居室的衛生

產婦的寢室。以易通空氣。光線透達為宜。因為新鮮和暢之氣能夠助愈創傷的緣故。而清明透達的光能夠愉快精神。但室內的溫度也須調和。在一、二日內。最好每天檢察二次。如比較室外溫度過低或過高。就應當設法轉換空氣。以增減熱度。即使在冬天。溫度也不可比室外過高。因熱度高了。致產婦發汗太多。很不相宜的。

### (八) 運動和外出

產婦必須靜養。已經說過了。至於離床運動。大約非過二星期後不可。然而也不可有劇烈的運動。祇能徐緩行走。或在室內操作做一些輕便的事情。倘使要出外。那非過四星期

不可哩。不過有的產婦。要過五六星期。或許多時候。才可以起床。這是依人的強弱而定。要看護者權變的。不可以拘執的啊。

### (九) 疾病的注意

產婦生產後。子宮大受創傷。必定有很污的惡露下來。經過四五日後。就逐漸變血色。同時乳房就會分泌乳汁。這時倘使惡露不多。或者乳房結核。乳汁不下。就分泌乳汁時而發熱。中心嘔吐等現象。那就是生病之徵。應當即為醫治。再如經過四五日而不大便。或在一晝夜時。小便不通。並且也有作噃等症。那也很關重要。就宜急急治療。不可輕意忽視。而產婦自己數日內。也應當十二分留意。切不可用冷水洗手。免得感冒風寒。而成病疾啊。

## □ 產後衛生常識

A 產後休養的重要。一。產婦產後。子宮必須經過六個星期。才能恢復原狀。產後若無休息。或下床過早。則子宮位及恢復情形。往往錯亂。

二。當生產時。用力過大。所以產後應當充分休養。給予產婦身體恢復原狀的機會。俾得撫育嬰兒。

三 在產後一小時內產婦不可伏睡以免空氣入子宮使其不易收縮或感覺不舒適甚且發生危險(平睡側睡為宜)。

B 產婦應注意清潔(甲)擦身以清潔皮膚並可使血液活動(乙)勤換衣服(丙)每天要刷牙二次(丁)要有適宜的陽光和新鮮空氣。

C 母乳的調養一產婦哺乳時為自身的舒適起見可臥床哺乳三日後可坐起哺乳。

## 二 不宜使乳量過多

三 奶瘤有下列的五種預防法甲。每次哺乳前須用硼酸水或白開水洗乳頭乙。遇乳量過多時產母宜少飲流質的食料丙。用圓腰幫助可免乳量過多丁。如乳頭破裂應即報告醫師並格外注意清潔戊。乳漲時可用冰袋或熱敷法。用以鬆退。

D 陰部的護理一產婦每逢大小便後應用來蘇水沖洗陰部二。宜時常更換廁過或蒸過之布墊三。產後第十天惡露應完全停止僅有少許無色液質如仍流血而發臭味應即就醫診治。

E 產後的食物一。補充失血和水分二。預防大便閉結三。使分泌乳汁四。宜食容易消化和富於營養的食品其種類大

略如下(甲)產後第一天宜食流質如牛乳稀飯豆漿雞湯肉湯嫩鵝蛋掛面等(乙)產後第二天可加饅頭或烤麵包雞蛋羹等(丙)產後第三天起可食家常便飯(丁)飯食必須按時最妥。

F 增加乳量的方法。一多喝開水或其他流質。二按時進食前述之食品三。哺乳前半小時宜喝牛乳豆漿或開水一碗。四。應按時哺乳每三小時或四小時一次但時間長短應按嬰兒的體重標準五。產母食後應休息六。每晚按時睡眠至少八小時七。在哺乳前三十分鐘宜接廢乳自腋下至乳頭至少十次。

G 產後檢驗一。產後必須檢驗一次藉以知道子宮是否復原及有無感染疾病二。檢驗的時間第一次在產後六星期至八星期第二次在產後半年第三次生產後一年三。產後不檢驗的危險一子宮失位或墜下及其他病狀二生長毒瘤及其他婦科病。

## 小兒疾病

何少遊

小兒初生臍帶落。取置新瓦上炙之。燼熟取起放於地上。

以蓋覆之。存性研末水飛過加辰研三分五厘生地歸身各四錢煎濃汁調抹兒之上。腭及母乳上使藥下盡次日大便遺下胎毒穢物則無痘疹矣。

## ■小兒究否有蟬蠅子 尤學周

蟬蠅子一症。醫書所少見。而習俗則常有爲小兒割蟬蠅子之舉。且有專習此業者。故此症之究否。有無聚訟紛紛。莫衷一是。一般醫家又多反對割蟬蠅子。甚至目爲妖姬惑人。徐靈胎氏反對尤烈。其言曰：「自古蟬蠅子之病。凡小兒變蒸之候。每有口內微腫惡乳之時。名曰妬乳。不治而愈。其或不能自愈。用藥塗之亦可愈也。近有海濱妖姬。造割蟬蠅子之法。以騙人取利。强者易愈。弱者俱死。惟蘇淞一帶。最受其害。蓋小兒兩頤內外皮有兩層。中空處有空膜一塊。人人皆然。割之復生。妖姬以此惑人。人見其果有如蟬蠅子者。遂信奉不疑。死而不悔。深可憫憐。」就此段文字而言。徐氏實未知蟬蠅子之爲何物。惟鑒於「妖姬」之妄割。憫小兒之受此割之復生。妖姬以此惑人。人見其果有如蟬蠅子者。遂信奉不疑。死而不悔。深可憐憐。

蟬蠅子即蟲類蟬蠅之子。一名蠅蛆。初生時如擠出之牙膏。

附着於枝條之上。疊成螺旋。小兒之真正蟬蠅子在兩頤黏子也。

蟬蠅子之症。余初固不信。後曾目睹二次。始知其詳。此症之發見。大都在產後一月左右。小兒之患者。面黃色不轉。(初生小兒其色多黃。毋傷。逐漸其色自轉。久而不轉。則爲病徵。)沈迷嗜睡。不吮乳。亦不啼。(亦有好啼者。余未見之。)扣其腮。而視其內部。腫起異常。腫處繕有紅絲。治法以刀割破腮腹。用力擰出內蘊之黃色膏狀物。再敷以藥。其事乃畢。小兒即啼哭而能吮乳。手續頗便捷。且無危險。此症於實際上不常發生。一般「妖姬」因生計問題。不得不信口雌黃。無中生有。向小兒腮內亂割。割下之肉。乃復故。以示人。自炫其能。愚夫愚婦。反信以爲真。而不知小兒枉受無妄之災也。

真正蟬蠅子發生之原因。或以爲胎毒。以余之偏見。大約產婆採取小兒口內血塊時。(小兒出胎時。產婆每以指探其口。挖出血塊。)其汙穢之指甲。抓破腮之黏膜。傳入不潔之物。蘊釀而成。欲免此症之發生。臨產時。使產婆剪去指甲。注意消毒可耳。

## ■小兒生下不啼救法 吳福基

凡小兒生時難難。或天氣寒冷。生下不哭。以及如死者。急用綿衣包裹。再用香油紙燃着。將臍帶慢慢燒斷。則暖氣入腹。漸漸作聲而活。倘先剪下臍帶。必死無救矣。

## 口不啼與不乳

陳覺生

### (一) 不能啼

兒生下地。即不啼哭。不能吞乳。奄奄如死者。急看喉間脣齶前脣上有一泡。用指摘破。或帛拭去惡血。勿令嚥下。即能出聲吮乳。

小兒初生。氣絕不能啼者。必是難產。或冒寒所致。急以棉絮包裹抱懷中。且勿斷臍。用紙蘸油點火於臍帶下。往來熏之。令火氣由臍入腹。寒得溫散。氣得暖通。啼聲自出矣。小兒有臍胞生者。可用左手搦兒右手。搦其背。當墮下而醒。小兒氣悶不啼者。以葱一束。輕鞭其背。氣通即啼。如無葱時。可捻小兒雙足。令其倒轉。以手拍其背。屢試多驗。

凡小兒初生不啼者。可取貓一隻。以布袋裹其頭。使伶俐婦人拿住貓頭。向兒耳邊。以口咬貓耳。貓必大叫一聲。兒即醒而開聲矣。

凡小兒生下未啼時。萬不可先斷臍帶。臍帶一斷。即不可復治矣。須切記之。

### (二) 不能乳

兒初生一二日。用藥開口後。產母即宜哺之以乳。若小兒不肯吃乳。必其瘀熱內蘊。臍糞未下。以致腹脹不食。其形症爲面紅舌赤。哭聲壯厲。宜一捻金散主之。

一捻金散 生大黃 黑丑 白丑 人參 檳榔各等分。共爲末。每少許蜜水調服。

若小兒形症爲面色青白。多啼聲低。此乃產母過食寒涼胎受其氣。以致中寒。腹痛而不乳。宜勻氣散主之。倘四肢厥冷者。理中湯主之。

勻氣散 陳皮 烏藥各一錢 炙甘草六分 廣木香四分 炮薑 砂仁各五分 右共爲細末。每服五分。紅棗煎湯調服。

理中湯 人參 炒白朮 乾薑 炙甘草 引用紅棗。水煎服。

## 口不乳

(又名難乳。謂嬰兒初出胎。不能吮乳。)

病源 因拭口不淨。穢惡入腹。或因難產。有傷嬰兒元氣。證候 因穢惡入腹者。胸腹痞滿。不欲吮乳。氣息短促。眉蹙多啼。有疼痛不舒之狀態。因難產致兒元氣受傷者。面色淡

自精神困頓。氣息奄奄。乏呼吸之能力。

診斷 凡初生嬰兒犯前項不乳之症。形狀似乎危險。若無他因夾雜。均在可治之候。

療法 因穢惡入腹者。當以茯苓丸主之。若猶未效。再進三

黃丸。因元氣受傷。不能吮吸者。宜減味四君子湯治之。

處方 茯苓丸

赤茯苓

小川連

炒枳殼

等分爲末。和蜜爲丸。如梧子大。每服

一丸。乳汁化下。

三黃丸

淡黃芩五錢。炒焦錦紋大黃一錢。小川連一錢。共研末。麵粉糊丸。如蚕豆大。每服三粒。日二服。米飲湯化下。

減味四君子湯

太子參五分。焦冬尤五分。清炙甘草一分。同煎一沸。緩緩與

飲。看護 寒燒應適溫度。若服藥後。雖已餵乳。亦宜緩緩哺之。

使兒氣調和。無過飽不及。致傷脾胃。

## 口馬牙風

高善道

小兒發熱。嘔吐。發生紅粒。口不哺乳者。即爲馬牙風。急宜早治。否則變生險惡。絕乳而瘍。世之育兒者。不可疏忽。

右藥用清水煎濃湯。即將藥內胭脂取起。頻坑患處。日疔數次。即當漸退。不過三日即愈。極其靈驗。如神。

「猴子丹」是症從肛門或陰囊邊紅暈爛起。漸至皮膚不洗浴。只宜用軟帛蘸甘草揩淨。雖蔓延遍身。可保全愈。方用

## 嬰兒急症二種

林蔭祥

關於馬牙風之治法。有專業此法者。其手術亦簡單。用針將紅粒挑去。至出血爲度。然業此者。多不講衛生。消毒法。往往有微菌帶入口內。變生他症。不如用下法調理之。硃砂川貝天竹黃陳皮瓜薑霜各二分。僵蠶二尾。薄荷葉二張。共爲末。蜜調敷患處。一日數次。另用桑葉。甘菊。杏仁。麥冬。薄荷煎湯服之。

菟。菟粉一兩。冰片一分。珠砂一兩。輕粉一分。  
右藥研末用金汁調勻。鵝毛蘸敷。

## ■ 小兒最危險之臍風

陳壽山

我國每年初生之嬰兒死於是症者幾不能以數計。推其原因多因我國人民缺少醫藥普通學識。有以致之。因一般婦女將近臨產之時期。則全數皆特賴於一般穩婆。而此一般穩婆大多數為毫無學識者。皆不知殺菌消毒為何物。一任已意之所欲為。以致產婦身體受傷。至使產婦受種種疾病之痛苦。甚者或至致命。更有無辜受累。即嬰兒初產後於一星期内。中要發生一種危險疾症。即臍風。是此症之原因。多由於接生時器具及各等用物不清潔所致。因該症之菌由於不潔之物入臍帶。由臍帶入血至腦而腦中其毒。而顯此病。其病狀即癰瘍。面紅鼻常噴嚏。吮乳口鬆口舌紅赤。臍帶粗大。或不潔白。乳內生核。眼珠朝上。頭向上仰。雙手握緊。兩腿朝上。拳起手面之肌常形抽搐。其治法宜用針砭。乳流出其血。後用新錢串索燃火灸乳之四週。圍約一銅錢大左右同。

服藥 小紅丸方

黑丑三錢。胆星三錢。巴豆三錢(去油)共研細末。煉蜜為丸。

萬有醫庫

## ■ 臍風之簡治法

尤學周

原因 乃一種微生物佔居於不潔之鐵器上。若用染有此菌之鐵器如剪刀等以斷臍帶。或包裹臍帶之布及棉花等。之不潔。以致染此菌而患是症。

症狀 初發時啼哭不安。不肯吸乳。繼之牙關緊閉。四肢痙攣。唇變青色。雙手緊握。腹部脹硬或熱度增高。此症大發現於生產後數日。二旬以後。則不發生。

療法 清臍為細末。蜜調塗於口。或用麝香蠟尾。銀線徑。粉辰砂為散。蓋湯調服。

菟豆大。珠砂為衣。每服四丸。服後抽搐流涎。用布拭去。此布宜棄去。(用脫脂棉亦可)過三四點鐘。可服下。方川連四分。鉤藤七分。車前五分。檳榔三分。天竺黃四分。木通四分。菟蠚三條。全蝎一個。洗燈心十節。面過紅者加真芽羊

一分。水五分。煎二分服。數劑至病復原。面色轉白為度。

臍風一病。患者多為難治之症。惟有自呼負。觀其死而已。

即幸而得愈。亦極少數。誠可惜也。但今患是病。用上方功效頗大。已治好之人亦甚多。凡我醫界中人無妨一試。因上法簡而易。功效又大也。

## 白濁染入小兒眼中

劉仁達

婦人之患白濁性白帶者。分娩時其濁液往往染入嬰兒眼中。或於初浴時之浴巾。浴水染入以致成爲膿漏眼。此病之發都在於生後二三日間。先結膜發紅。眼臉浮腫。洩出黃白色之濃液。而瞼緣黏合不能開啓。繼之膿滲愈增。角膜潰瘍。遂致喪明。治法於初發見之時。即宜就醫診治。否則宜以五十倍硼酸水洗眼。洗後更滴入五十倍硝酸銀水一滴。俟結膜微變白色。復以二百倍食鹽水洗之。洗眼可用脫脂棉或軟性毛筆。(須不脫毛。清潔而未染墨者)。蘸藥水洗之。如是每日二次或三次。此時之患兒宜臥於空氣清潔無塵埃烟煤之處。並須遮閉光線。苟患一眼(大率先一眼而後兩眼並患)。時臥時宜側臥。病眼向下。以免膿液流入他眼。他眼尤須以脫脂棉包之。每日檢視二三次。適有病狀發現者。立治之。

此病既發。每有迅不及治之勢。故最好宜預防之。預防之法。對於小兒初生。以硝酸銀滴入眼內。(硝酸銀最好宜新化)。惟滴後眼瞼不免稍稍紅腫。然不久自消可勿顧念。

## 夜驚

佩萸

夜間睡着突然醒的兒童。(患夜間驚嚇者)應該用一種了解的態度來處理。大多數的情形是爲了胃或腸等消化器官作梗的緣故。假使兒童的養育方法和食事方面不加以相當的檢查和積極改善。難得良好結果的。

爲了這個緣故。兒童在午後四五時吃過點心後。不應再給。他們吃多量的食物。睡眠的時間在六時半和七時。一個標準的健康的兒童不需要吃夜飯的。許多做母親的以爲牛乳和餅乾或者一薄片的糕餅麵包。奶油和糖等。對於漫長夜睡着不飲不食的兒童。多少有些利益。多少有些幫助的。其實這種見解是錯誤的。食物過多。反足以損害消化而得一種消化不良症。吃過下午的點心再吃夜飯。對於兒童未免過多。決不能消化這許多東西。當然胃的反叛和夜間驚嚇是一種平常結果了。

還有一種夜間驚嚇的普通原因是喉腫。一個孩子因喉腫而患夜間驚嚇的原因。是空氣通道被阻。以致他不能得到營養神經或神經系所需的氣養量。於是神經中心受了創傷和毒素一種刺激的情形便產生了。

有時候夜間驚嚇是疾病的徵兆。即如麻疹猩紅熱。甚至風濕病等類。爲了這個緣故。雖則患夜間驚嚇的兒童。應該教他安靜和平。但是相當限度的重大處理却也不可少。

一個神經衰弱的兒童患夜間驚嚇的時候。天天給他一頓魚肝油與麥芽有驚人的功效。足以幫助神經組織和神經中心。增強有規律的食時食量。有規律的睡眠時間。多吸新鮮空氣。減少過度興奮刺激。都是一個神經衰弱而患夜間驚嚇的兒童的養育要素。而食品中應該包含多量牛乳。鷄蛋和魚。

## 口 小兒夜啼之研究

陳景岐

小兒諸病最爲難治。蓋以小兒初生既不能以言語表示心意。一切寒熱餓飽諸般痛苦不適全賴哺育之人善爲體貼。苟稍有疏忽。太過不及均足致病。即牙牙學語及已能言語時亦斷不足以表示深切之原因。寒溫不辨藥物亂投。其害烏可勝言。爲父母者誰不愛其子女。但缺乏醫學常識。子女一病急則求仙拜佛。誤入迷信之途。緩則漫不經心。視爲細微之事。應付既不得當。則病輕者重。重者危矣。烏可不加注意乎。小兒夜啼一症。人每多輕視之。茲就管窺所及。將其原因及診治粗述於左。以告世之爲父母者。如有進而教之者。所深冀焉。

## (二) 小兒夜啼之原因

萬有醫庫

無錫沈金策氏之著幼科釋謎一書。其論小兒啼哭之原因。嘗曰。一淚爲肝液。哭乃肺聲。風襲肺臟。內外風并。惟風燭熱。乘於心經。火熱逞風。刑燬肺金。木相擊。悲哭聲驚。或日或夜。陰陽互爭。亦因母怒。乳哺熱生。移肝熱屬肝火莫平。乃多驚哭。其用弗甯。亦因母慾。孕時過溼。溼火炎熾。致令毒停。既生之後。有觸哭應。亦因母冷。孕時寒凝。邪氣入胞。兒與之迎。生後邪鬱。完腹膨脹。正氣相搏。腰張啼傾。亦因父氣腎弱。虧精。兒稟之產。腎陰不榮。虛火炎上。忽作啼鳴。丹溪論此。必致歸冥。然則啼哭病因匪輕。或熱或寒。或噦或摶。或胸腹痛。或觸神靈。務觀其勢。各究其情。勿云常事。任彼涕淋。一觀此韻文。其概言啼哭諸因。雖多反覆。其辭然可分之爲二。一曰遠因。二曰近因。遠因則本乎先天。關於父母。近因則關於風火。因二曰近因。遠因則本乎先天。關於父母。近因則關於風火。寒熱驚恐食傷等而已。近觀日本醫學博士岩井真金之論。小兒夜驚啼哭。與此足以互相引證。故特述之。其言曰。夜驚。症(夜哭)屬於神經系統之病症。小兒自二歲至八歲之間。患此症尤多。患此症者於睡眠時別無變異。如喜睡眠之體。戰慄哭泣。母側此種恐怖狀態暫發之後。而又重行酣睡。推其發作之際。必於睡眠中見貓犬等之追逐。發生此種可驚可恐之夢。故有驚惶哭泣之現狀。迨至翌朝。詰以此事往

往全然不知。此種情形甚至常夜有發作至二三次者。惟患此症之小兒。每有夜間身體發熱。而於日中則每覺毫無其事也。此症之原因究發於身體之何部乎。大致因扁桃腺及鼻咽頭之膨脹。慢性鼻加答兒等。而鼻呼吸有障礙之際。患者尤多。又有因患胃腸病之便祕症及蛔蟲症等。而為發作之原因者。或以身體故障。或以小兒感受煩惱。及遇非常恐怖之事。如火災盜患等。於精神上大受打擊。亦時有此事發生。患此病者。大致為神經質之小兒。及其父為大酒家。或為有神經質家族中之小兒居多數也。觀岩井真金之言。其始所論者。無非為小兒夜啼之現象。而其後所推究者。則為小兒啼哭之原因。議論精當。不無可采。

## (二) 治療小兒夜啼之概要

巢元方曰。小兒有腰啼者。在胎時其母傷於風冷。邪氣入胞。傷於臟腑。故兒生之後。邪猶在兒腹內。邪動與心氣搏。則腹痛。故兒腰張蹙氣而啼也。宜鈎藤膏。

張渙曰。嬰兒在胎之時。其母將養一切不如法。及取涼飲冷食。過度冷氣入兒腸胃。使胎氣不強。致生下羸弱多病。俯仰多啼。名曰腰啼。宜養臟湯。

錢乙曰。小兒驚啼者。謂睡夢中忽然啼而驚覺。邪熱乘心也。

安神丸。寒夜啼者。脾臟寒冷。當夜陰盛之時。相感。故痛而啼也。錢氏當歸丸。熱夜啼者。腹熱痛。夜啼面赤。唇焦便秘。用人參湯下三黃丸。

王履吉曰。小兒夜啼有四證。一曰寒。二曰熱。三曰口瘡重舌。四曰客忤。寒則腹痛而啼。面青白。口有冷氣。足腹俱冷。曲腰而啼。宜六神散。益黃散。熱則心躁而啼。面赤。小便亦口中熱。腹緩。或有汗。仰身而啼。或上半夜。仰身有汗。而啼。面赤。身熱者。必痰熱也。到曉方息。宜導赤散。加黃芩。口瘡重舌。則吮乳不得。口到乳上。即啼。身額皆微熱。急取燈照之。依口瘡重舌。爲治客忤者。或見非常之物。與未識之人。或經神廟佛寺。與鬼神氣相忤而啼。有曰啼驚夜。必黃昏前後尤甚者。錢氏安神丸。

龐安常曰。小兒夜啼。作心經有熱。有虛治之。燈心散。黃連飲。蠟花散。月內夜啼驚搐者。乃胎中受驚所致。鎮驚散。有痰者。抱龍丸。

李梃曰。初生兒月內多啼者。凡胎熱。胎毒。胎驚。皆從而散。且無奇疾。

岩井真金之治療法。若為身體故障。扁桃腺膨脹。及慢性鼻竇炎。則宜施手術治療。若為胃腸病便祕。蛔蟲等。則宜對症治療。此種小兒。若為身體故障。而患此病。其發端在乎受

喜怒哀樂各種刺激之煩惱。最好不使觀電影。又或於小兒睡眠之前不可作恐怖之神話及讀故事。讀本感動其精神。此種小兒如以此患夜驚。則不可使獨寢。宜使人伴之。此外如蓋被過多。或頭枕過堅。亦易發作。又有於睡眠前多飲茶湯及咖啡等飲料。因蓄積小便而起。此外應注意者。食物宜有規定。大便宜求通暢。其他治療法。或於寢前沐浴。或以溫湯擦身體。亦能奏效。藥則宜用臭素劑。

### (結論)

觀上列諸家之言。各究其因而施治。可謂無微不至。在人善擇之耳。而沈金齋氏對於李梃之說。尤特為重視。以為初生小兒之啼哭。只宜輕手扶抱。任其自哭自止。切不可強按住。或令吮乳止之。若無他病。亦不可服藥。諸家方法。為有他病者備用。非謂夜啼必服藥也。其對初生小兒之夜啼。如此說法。不為無見。但較大者。當因證而施治矣。在岩井真金所言之治療法。雖各新穎。然一則曰宣。施手術治療。再則曰宜勢症治療。尚屬一種概論。僅能明其理。非可據以爲法。而其理論。則與王履吉之言。較為相似也。

## □ 小兒啼哭

高善道

小兒初生即能啼哭。啼哭為本能之一種。所以表示其認識自己之存在。亦即為不快之發表。此種啼哭。不但不可止之。抑且不得不有其自然之表現耳。惟若有原因而啼哭。則可弭止之目的。

小兒啼哭。其聲銳而剛。手足掉動。屈曲或收縮者。為痛癢不舒之表示。聲高而強。身體挺直。手足怒張者。為騷動煩惱之表示。聲煩而弱。兼有悲音。為疾病之表示。聲響不歇。而手指入口作咀嚼狀。為餓餓之表示。聲高而急。雙足伸縮不定者。

為欲排洩大小便之表示。且響聲亦有殊別。宏亮者。佳。低而不含悲者。為不詳之兆。此皆應知之普通常識。又有小兒啼哭不止。百般曲順。亦歸無效。此乃神經質之小兒。祇有任其自然而已。如施以朴責。或假鬼神畜類以恐嚇之。仍非策之善者。或因恐嚇過甚。反因此釀成疾。務力戒焉。

## □ 小兒發熱

尤學周

小兒疾病。最多者。為發熱與泄瀉。常人以發熱屬諸外感。泄瀉為內病。泄瀉為腸胃發生變化。固為內症。而發熱一端。原因甚多。證狀亦不同。不能概以外感目之。而徒借助於疏表。發汗以祛除之也。

發熱為疾病之一種現象。以熱之程度而言。有壯熱。微熱之分。以熱之來勢而言。有陡然發熱。熱度漸增之別。以熱之時間而言。有留戀不退。寒熱往來。朝輕暮重之異。此不過舉其顯著者而言。欲條分縷析。詳細剖別。則不勝其煩瑣。非片言可盡。

小兒體質脆弱。然好動而不好靜。多動則發生勞。過於勞疲。體熱必升。其熱每於午後或夜內發見。平旦則又恢復原狀。活潑如故。此種發熱。凡育兒者習見之。每多不以為意。不知一宿而熱退。其身體尙屬康健。若渡羸之小兒。或有他種病邪潛伏於內者。其熱每不易退。蓋病邪乘機發動。往往誘起其他病證。故小兒好動。固不可絕對禁止。然亦不可十分放任。終以有節制而適得其當為宜。

熱度之高來勢之驟者。厥為麻疹。痘症。猩紅熱。三種傳染病。此三者。又以小兒為最易感染。感染後之數日。即發高熱。往往發生瘧疾。轉入險途。及既發見疹點。邪向外達。苟無特別關係。病勢即見輕鬆。當其發熱之時。甚難診斷。雖個中能手。亦難確定之。惟此種染病。多發現於春秋二季。尤以二三月與九十月為最盛。小兒難免無傳染之虞。此時縱不能確定。亦當為進一步防範。癰痘。痘疹。猩紅熱。三者之中。以痘疹之熱度為最高。猩紅熱次之。然在平順痘疹之發熱程度與猩

紅熱亦無大差異。惟猩紅熱之發熱時期較痘疹為短。癰痘發熱初頗高。第二日稍低。將透點時。熱復升高。此乃其特異之點也。小兒往往發輕微之熱。朝輕夜重。其原因又不能十分確定。(大約為一種腸胃病)。臨診時屢見不鮮。此種原因不明。之升降熱。投以青蒿。白薇。佩蘭。藿香。陳皮等品。即能霍然而解。

## ■ 小兒發熱略說及其治法

張仲仙

小兒病不外乎內停乳滯。外感風寒暑濕。或由驚恐而得病。因不同病狀各異。而發熱則一也。淺率者不察病因。輒宗寒。能勝熱之治法。致夭亡者甚多。大可悲矣。今將發熱原因。及病狀治法。分述於後。以供臨床一助云爾。

傷風發熱。風襲皮毛。腠理閉塞。故發熱。此熱乃人身之氣解矣。初起症必兼見呵欠噴嚏。鼻塞流清水。春秋宜荆防薄荷。杏羌獨活。夏日杏蘇散。冬季無汗用麻黃湯。有汗用桂枝湯。兼咳嗽加前桔牛蒡子。腹脹加建曲。焦楂泄瀉加葛根。或五

芩散。赤痢則加紅花梔榔。白痢加肉桂梔榔。如表邪已盡症見熱象。方可從熱治。

感寒發熱。寒搏皮毛。腠理閉塞。熱不得出。故發熱。初起症見頭痛身疼。虎口紋紅。舌色白。春夏秋宜杏蘇散。加荆芥防風。冬日有汗宜桂枝湯。無汗宜麻黃湯。兼咳嗽加前桔牛蒡子。

薄橘紅。腹痛加肉桂吳黃。脹則加建橘焦。查川樸。兼瀉兼痢。川連黃芩山梔連翹花粉石燕等品。

傷暑發熱。暑邪粘膩阻塞竅道。熱不得出。故發熱。治法則用芳香化濁。蓋芳香善竄。暑爲香薰。則散初起。見頭昏嘔吐。

苔白滑。可用香茹飲。加砂仁半夏茅朮。腹痛加枳殼陳皮。脹則加大腹皮建曲焦。查泄瀉則用五苓散。兼痢則用敗毒散。

化滯則用柴胡湯。如三日以後。煩躁不安。苔黃燥。或尖絳中乾。自汗口渴。面紅目赤。可用白虎湯大劑瀉其熱。熱減則寃。

道開而病自除矣。蓋風寒暑濕。固皆阻塞竅道而發熱。但久不解。則津液乾涸。不能輸送於皮毛。故亦亢熱不安。此非瀉

之不可。如大便數日未解。腹滿硬拒。接氣粗心煩。承氣湯可。用也。

濕在天爲雲。在地爲水。在人身爲濕。濕氣薰蒸。毛髮壅塞。故發熱。症見頭昏神倦喜睡。苔厚白。則宜芳香。萬有醫庫。

燥之如三仁湯。或藿香正氣散。苦淡白。則宜淡滲利之。如四苓散。加葛薢防已木通車前子之類。若濕盡熱勝。當從熱治。停滯發熱。滯停腸胃。氣化不靈。故發熱。症見腹脹或痛。或吐。均用保和湯。加枳殼川樸鷄內金。如兼泄瀉。必白色。仍用前藥。即內經通因通用法也。

驚恐發熱。暴受驚嚇。毛竅大開。風寒外襲。故發熱。症見不安。如喪魂魄。或終日昏睡。治法宜一面祛風寒。一面定心志。如得病在飽飯後。則甚險。宜加導滯藥。此症較上數條爲重。因傳變極速。易於化風故也。

此外如痘疹發熱。疳證發熱。外證發熱。跌撲發熱。病後虛熱等。因篇幅所限。均未論及。容有暇時。再詳論之。再按本篇專爲庸醫臺用涼藥而作所述各條。不過大略。欲知其詳。則有小兒專書。在學者悉心研索可也。

## 口 小兒嘔吐

### (一)

尤學周

小兒之胃。容量甚少。不宜多食。據云。疾病從口入。小兒疾病。大半由於飲食不慎所致。嘔吐爲胃疾之一。與飲食之關係甚大。故撫育小兒者。切勿誤認多食爲可喜。不食而強之食。

貴在食必守時且有節制。

哺乳之兒嘔吐尤易。如食後即吐其味不變多由過食所致。乳兒不知餓飽貪食無度。乳母之乳汁充足者久衡乳頭不知停止致胃不能容。哇然作吐此乃乳母之疏忽。在強健活潑之小兒一時尚不致發生影響。如身體孱弱者食之過量消化不及屯積於胃必誘起種種疾患。乳兒之胃未成變形受外面之沖激易於作吐。如食後受寒緊小衣服之壓迫或抱法不妥皆能使乳汁翻出故食後宜慎於調護最好令其安臥如較大之小兒則不一定為受外面沖激所致尤當注意其消化方面。

因消化方面所誘起之疾患大都有嘔吐現象。嘔吐之外兼有頭痛眩暉。胃部疼痛腹部脹滿心身不快。惟小兒有口不能言或言而不能達其意故藉啼哭以表示其痛苦又以其來勢之遲緩有急性和慢性之別。急性和忽然嘔吐且發大熱。慢性者雖有煩躁不安之象或無熱或有熱有熱亦不甚高大約每於乳後六時至八時即行嘔吐大便之中皆含有未消化之食物如見此證一面當節制飲食甚者不進飲食使胃有休息之機得以漸次恢復其消化力一面用消導之劑以利大便去其胃腸中不潔之物則嘔吐可除諸証亦退。中毒亦能嘔吐幼年時代易於中毒如藥物之內用或外用

之際因藥物內所含之特異質而發中毒症狀者有之或因用量過多而發生者有之在乳兒時期因乳母之服藥由乳汁之介紹移傳於兒體而間接發生者有之稍長因食物不慎攝取未熟水稟及腐敗之品因而中毒所見尤多中毒嘔吐原胃部機能之反射發生抵抗作用思將毒物驅出之徵象此時宜酌用吐劑扶助其抵抗作用使禍根悉數湧盡或用瀉劑從下部逐出之或用解毒之劑以和解其毒性。咳嗽之劇者震動胃部胃內食物不能安留往往發生嘔吐此宜先除其作咳之因以平除或減少其咳勢則胃部不受震動嘔吐自止。

(二)

陳景岐

小兒嘔吐有由於過飽或由於不消化或由於帶餽過緊或由於搖動劇烈而起凡過飽或不消化而嘔吐者可減少其食量或乳量而兩次飲食距離之間亦須延長飲食後而不消化之嘔吐宜減少脂肪多食粥與清水如大便中有凝乳狀質發現更當多用或並飲大麥水如發熱作痛飲牛乳之小兒停止一二日勿飲飲以薏苡粥及沸水。

由於帶鉗過緊。或動搖劇烈者。即檢查而解放之。或禁忌之。  
小兒患嘔吐。除照上法斟量處置外。宜呼吸新鮮空氣。吐後  
鬆解衣服而橫臥片時。嘔吐過於劇烈時。可就醫診視。藥物  
不可妄用。

哺乳之小兒。以不消化而嘔吐時。乳婦勿食固形食物及肉  
類。

## □ 小兒吐乳症

兌 楊

凡小兒吐乳。手足指熱者屬實。手足指冷者屬虛。此其驗也。  
更須望其神色。如有狼狽之狀。即是因病作吐。倘小兒乳多  
而滿溢者。無關病吐。不必治也。若形色憔悴。或食乳即吐。或  
係虛寒。宜用參薑湯。(一)最妙。

倘小兒自受驚恐。或乳母恚怒。致兒吐乳青色者。宜用五味  
異功散。(二)

若母食厚味。煎炒飲酒之故。而乳熱令兒吐者。宜用東垣清  
胃飲(三)主之。

若母食生冷。停滯而乳冷令兒吐者。其母宜服人參養胃湯。

(四)小兒用理中湯極效。皆吐乳之神劑也。

參姜五片。

二 五味異功散——炙防黨。焦朮。雲苓。炙草。陳皮。姜棗。煎。  
三 東垣清胃飲——生地三錢。升麻五分。當歸二錢。丹皮  
錢半。川連一錢。煎服。  
四 人參養胃湯——黨參四錢。砂仁一錢。法夏二錢。薑香  
八分。厚朴錢半。姜汁炒。茯苓二錢。橘紅一錢。炙草一錢。生  
姜三片。烏梅一個。煎服。

## □ 小兒霍亂吐瀉

黃允楣

凡小兒吐瀉。與大人治法雖同。然大人能言。病源小兒全憑  
審察。此其所以不能不另詳也。總之小兒吐瀉虛寒十居八  
九。實熱者十僅二三。如面色青白。精神怠倦。肢體清涼。或吐  
或泄。或吐瀉兼作。脈或浮大無力者。必因寒邪傷胃。或乳母  
誤食生冷。致令小兒受病。宜用溫胃飲。(炙防黨三四錢。焦  
朮二三錢。陳皮。炙草各一錢。乾姜二三錢。白扁豆三錢。當歸  
二錢。泄者不用食遠服)。或用養中煎。(防黨三錢。乾姜二  
錢。淮山藥一錢。炙草一錢。白扁豆炒二錢。茯苓二錢。煎服  
甚者用參附理中湯省妙。)  
如多痰涎。吐瀉或兼喘促者。理陰煎為主。(熟地一兩。當歸  
三錢。炙草一錢。肉桂一錢)。若謂嘔吐不能用熟地。是近世

俗醫不通之語也。如偶有所觸，雖吐而不甚者，即用安胃飲（陳皮、杏仁、炒麥芽各二錢，木通錢半，澤瀉、黃芩各一錢，石斛二錢，食遠服）亦可。

如傷食及誤食不宜之物，以致嘔吐者，宜用和胃飲（厚朴錢半，陳皮二錢，白扁豆四錢，藿梗三錢，炙草八分，桔梗一錢，車前子一錢，炒枳壳八分，干姜一錢），或用小和中飲（陳皮錢半，山楂一二錢，茯苓錢半，厚朴錢半，甘草五分，炒扁豆二錢，生姜三片）均可。

如停滯嘔吐而兼吐痰者，宜用加味六安煎（生黨參五錢，杏仁二錢，陳皮二錢，雲苓三錢，白芥子八分，炙草一錢，半夏二錢，姜棗煎），主之。或用杏肺二陳湯（山藥二錢，猪苓澤瀉、陳皮、乾姜各半錢，雲苓二錢，法夏二錢，炙草八分，煨姜三片，煎服）。

若其雖因食滯吐瀉，而所吐瀉之物多不運化，悉由脾虛而所重在脾，不重飲食，不宜妄用消伐，宜用扶脾養元法（炙紋黨五錢，米炒白芍二錢，炮薑一錢，砂仁錢半，炒谷芽四錢，土炒當歸三錢，雲苓三錢，炒扁豆四錢，酒炒桂枝八分，陳倉米一撮），或用理陰煎均妙。

## 口 小兒泄瀉之最大原因 柏良

### (一) 泄瀉與傷食

泄瀉一症，小兒最多。其原因雖非一端，以余臨診之所得，食飲不節為占最多數。蓋小兒發育未充，腸胃柔弱，食物不易消化，偶有不慎，則消化上發生障礙，即成泄瀉。為養母者，不可不謹慎飲食，細心喂養也。然世之育兒者，皆忘『疾病從口入』，『若要小兒安，常帶三分饑與寒』之戒律，惟恐小兒飢餓，任意與之飲食。小兒啼哭之時，每以食物誘之，止哭以後，致養成貪食之習慣，消化不良，遂為積聚轉而成為泄瀉。日久月深，脾氣不振，身體衰羸，即變慢驚，不可救藥。

### (二) 傷食之調治

泄瀉之由，飲食過多所致者，所泄之物，薄薄而又稠黏，色深黃或綠，有腐臭之味。腹脹，按之作痛。乳兒則吐乳，其便或作青綠色。一見此種證象，為傷食無疑。一面節制其飲食，或竟不與食。一面用消導之品，助其運化，去其宿積。如麥芽、穀芽、枳壳、陳皮、查炭、鬱金、神麪、雞內金、車前子、通草之類，可以選用。如因循失治，或治不得法，浸至成為慢驚，證情既大，變治療亦較困難，往往發生意外之事。

## (二) 泄瀉與慢驚

慢驚之因泄瀉而起者。其初雖由於傷食。決不可再以治傷食之法施用。當以健脾扶元為主。人參或黨參白朮扁豆雲苓。炙甘草為必要之品。甚則可加附子。肉桂。此時千鈞一髮。用藥大有出入。如脾陽大衰。泄瀉未已。脈細弱。肢冷厥逆。可投以大量健脾扶元之品。又有脾陽雖傷。宿食未安。脈已細弱。利下之物。尚有穢味。亦當用治本之法。以扶元為主。稍參消導之品。待其肢緩脈起。再舍末而從本。隨機應變。惟在臨事時權衡之。

## □ 小兒吐瀉與乳脚氣之關係

尤學周

小兒泄瀉。由於受寒或不消化所致。泄瀉而兼嘔吐。大多為消化器病。蓋小兒無七情之紛擾。所患病症。非感受外寒。即內傷飲食。此常人所習知者。關於小兒之吐瀉問題。當有專論。茲所言者。乃吐瀉症中之一例外問題。小兒吐瀉最為普遍。緣小兒食慾無節。不加限制。往往造成不消化之證候。發為吐瀉。故通常治小兒吐瀉方法。大多注重於消導方面。惟以余個人之經驗。小兒因脚氣而成吐瀉。

者。所見亦甚多。此症多發於生後一月至六月之小兒。由患脚氣之乳媽傳染而來。

小兒哺乳。原以生母之乳為最合。惟有錢階級之婦女。但求個人之舒適。不願自討苦吃。哺養乳兒。故多以是職委諸乳傭。此種乳傭。其乳汁之成分是否佳良。是否合於乳兒之營養。不可不加以注意。然一般雇傭乳媽者。因急於應用。不暇細審。以致影響於小兒身體之康健者。比比然也。即乳媽之乳汁佳良。已合於乳兒之營養矣。然此輩乳傭。大都來自內地。不服水土。猝然發生疾病者。有之。漚上鄰接海濱。地土卑濕。最易發生脚氣之症。初雇乳傭。謹慎之家。亦有令其就醫。生診斷。有無傳染疾病。以定去取。事雖周密。然初至漚上者。有否脚氣。不能立定。亦有因來漚未久。診斷時。尚未傳染。稍久而始發生者。則又防不勝防矣。

本病之發生。先見嘔吐。有一日僅嘔吐一二回者。亦有一二回以上者。同時發生泄瀉。顏色漸轉蒼白。煩躁不悅。睡眠不安。易啼哭。脈數而此時如不加詳細考察。認為普通吐瀉。治療。或不合於脚氣症之治法。則證情逐漸加重。脈數呼吸增加。口唇呈青藍色。哭聲不揚。聲音嘶啞。或完全無聲。以致不救。

漚上育兒之家。因乳媽脚氣而致及小兒性命者。不可勝計。

此因家長注意不周。醫家診察不精。一誤再誤所致。大凡小兒嘔吐之證狀。爲呼吸增加聲音嘶啞。上眼臉下垂不起。(一)此種現象多認爲力虧(大誤)。大誤(大誤)。尿量減少。啼哭時口唇發青藍等。然此數證並不完全發現。其特有之點爲呼吸及脈搏之增加。臨診時最宜注意。

## 小兒腹痛腹脹

黃兌楣

凡小兒腹脹腹痛。多因食積或寒涼傷脾而然。經曰病痛者陰也。又曰寒氣多也。有寒故痛也。東垣曰寒脹多熱脹少。皆主於脾胃。故凡小兒肚腹或痛或脹。雖曰積滯多所致。然脾氣不虛則運化以時。何故作脹。是脹必由於虛也。若胃氣無傷。則腹中和緩。必無留滯作痛。是痛由於寒也。故治痛治脹者。必當以健脾暖胃爲主。若無火證。不得妄用寒冷。若無堅實。拒按等證。不得妄用攻藥。慎之慎之。

一小兒肚腹膨脹。或時常作痛。惟芍藥枳實丸(一)加減主之。或以丸作煎藥亦可。又或用大健脾飲(二)啓脾飲(三)均可擇用。

一小兒偶因傷脾。氣促困倦。外見腹脹。而內不脹者。此脾氣虛也。宜用五味異功散(四)或五君子煎(五)加味法主之。

一小兒肚腹作脹。或畏寒。或手足冷。或兼嘔吐泄者。此脾胃陽氣不足。虛寒作脹也。宜用溫胃飲(六)或養中煎主之。(子大)

七) 僥面白神疲。而又兼泄清水者。則即以經驗回陽飲。(八) 多服。

一小兒腹脹。或兼喘促泄瀉。而又多痰者。此脾胃陽虛不可

(十) 加減法。或用大和中飲均宜。屢試屢效。

一小兒腹痛有滯。而吐泄者。此脾胃氣虛。宜用六君子湯或

用小和中飲均效。

一小兒偶因停滯而腹一時大痛而脹者。宜用經驗排氣飲

豆(十一)或百順丸(十二)攻下之中病即止。愈後須大補

脾胃。即以八珍湯或壽脾煎(十三)多服更妙。

以上皆大略述其總綱。小兒柔嫩之質。氣血未充。不宜過於消耗。雖偶爾停滯。暫用推瀉。不可常恃。凡小兒疳證。慢驚童子勞者。皆由攻伐太甚。致令病入膏肓。能隨時以補腎扶脾。

雖病亦輕。即出癰痘。不獨稀少。亦更無險症矣。

一 芍藥枳實丸——焦白朮二兩。赤芍二兩(酒炒)。枳實一兩(麵炒)。陳皮一兩。爲末。以薄荷煎湯。熬老米爲丸。如桐子大。

二 大健脾飲——真防黨三錢(米炒)炒穀芽二錢。炒香  
麥芽錢半。炒淮藥三錢。白蔻仁八分。雲苓二錢。陳皮錢半。枳  
殼八分。炒查肉二錢。法夏錢半。炮姜八分。炙草一錢。炒白朮  
二錢。

三 啓脾飲——真閩黨四錢(米炒)陳皮一錢。青皮八分。  
厚朴(姜汁炒)一錢。炒於朮二錢。棗芽。神曲各八分。砂仁一  
錢。炒乾姜八分。炙草一錢。

四 五味異功散——防黨。白朮(炒)。雲苓。炙草。陳皮。生姜  
紅棗。

五 君子煎——前方加半夏。

六 溫胃飲——炙防黨五錢。焦朮四錢。陳皮一錢。炒乾姜  
三錢。白扁豆(炒去壳)三錢。當歸二錢(泄者不用)。炙草一  
錢。食遠服。

七 養中煎——炙防黨三錢。炒乾姜一錢。淮藥二錢。炙草  
一錢。炒扁豆三錢。茯苓二錢。

八 經驗回陽飲——熟地一二兩均可。生淮藥五七錢。熟  
附片三五錢。炮姜三錢。炙草錢半。小丁香七八分均可用。(研  
末用肉桂沖服)。上肉桂二三錢(沖服)。茯神五錢。白芍  
錢半(酒炒)。橘紅錢半。淨水煎服。

九 理陰煎——熟地黃三五七錢或一二兩。甘草(炙)一

二三錢或一二兩當歸二三錢或五七錢。乾姜(炒黃)一二  
錢。

十 經驗排氣飲——製香附二錢。陳皮。川朴。枳壳。澤瀉各  
錢半。木香八分。炮姜五分。烏藥霍梗。桔梗各一錢。

十一 赤金豆——巴霜錢半。生附子二錢(炒焦)。皂角一  
錢(微炒)。輕粉一錢。丁香三錢。天竹黃三錢。木香三錢。硃砂  
二錢爲衣。

十二 百順丸——綿紋川大黃一斤。牙皂一兩六錢。(炒  
微黃)爲末。煉蜜爲丸。如菉豆大。大人每服用二三錢。小兒  
或四五分。

十三 燒脾煎——於朮三四錢(陳壁炒)。炙草一錢。淮  
藥五七錢。當歸二錢(油泄者土炒)。炒棗仁錢半。遠志三五  
分。炮姜三分。蓮肉四十枚(去心)。人參(遼東參一錢高  
麗參二三錢。炙紋黨七八錢)。隨時煎服。

### ■ 小兒腹痛簡便外治法

張仲僕

小兒腹痛不外乎寒與食二者凝結而已。但藥味太苦。小兒  
厭服。其最妙之法外治爲佳。外治之法。小鹽一碗。炒極熱用  
舊布二層包好。熨臍上。(須用舊衣隔之否則防肚皮燙疼  
)。使熱氣內攻。則寒可散而食自消。腹痛頓減。所謂熱則流  
通是也。如鹽冷再炒再熨之以全身汗出。便解痛止爲度。考

小鹽功用。本有通便秘止腹痛之能力。余於小兒腹痛。多用此法。靈驗異常。此專治腹痛無他症之法。如兼身熱咳嗽。或蟲積。另則宜服。方用此無效也。

## ■ 小兒腸痛與疝氣

景岐

### (一) 腸痛

腸痛。小兒生後數月。每有患之。發時腹部現緊張之狀。且覺脹硬。啼號不安。兩腳屈而上縮。其故多由於飼乳過多。不消化而起。

治法可時飲以少許之熱水。滴入一二滴之薄荷精。並以熱布溫熱其四肢。復用熱絨布覆其背。輕輕拍之。但此時之食物。宜多食滋養而富水分者。如飼牛乳。宜稀釋之。如食人乳。乳婦宜食大麥粥。玉蜀黍粥。菜蔬。雞卵等。亦須多食水分者。

### (二) 痢氣

小兒患是疾。每多厲聲號哭。兩足上縮。有還納性與不還納性之別。還納性者。可還納於腹腔內。也不還納性者。不能還納於腹腔內。也能還納者。病尚輕。不能還納者。則重。罹是疾者。宜即就可靠醫生治之。輕者尚可治以疝氣帶。否則非用手術不可。

治疝氣愈早愈妙。如至不能還納者。殊不易治。疝氣以陰囊脹大為最多。而陰囊水腫病。亦陰囊脹大。辨別診斷。殊屬不易。故宜就專門醫生治療。蓋疝氣誤認為陰囊水腫。每致非常危險也。用疝氣帶。宜請醫生診察後而受其指示。如漫然妄用。反致危害。切宜慎之。

## ■ 小兒消積開胃健脾散文 郁

生白朮二錢。金蟬肚十四個。海螵蛸一錢。(泡研)益智仁一錢半(研)山楂肉一錢半。炒穀芽二錢。南荳三錢。(炒打鬱金七分。甘草七分。雲苓三錢。烏梅三個。共為極細末。每次用四五分。開白粥水服。)

揀淨上藥為要。照方連服兩料。自然開胃健脾神速也。

## ■ 小兒傷風

尤學周

傷風之症。依普通之所指。大約可分為三種不同之現象。其一僅見咳嗽。並無其他現象者。名曰傷風咳嗽。其二不發咳嗽。而鼻流清涕。或則鼻塞不通。多濃涕。時時作嚏。名曰傷風鼻塞。其三頭部脹疼。肌膚灼熱。而形寒畏風。名曰傷風發熱。此三者。非病證之輕重。乃病根之不同耳。

風寒觸於皮膚。刺激未稍神經。以致毛竅閉。溫度不能外散。有增無減。於是體溫失節。故頭疼發熱。惡寒。風寒觸於鼻腔。鼻道粘膜發炎。分泌加盛。則鼻塞壅塞。流下清涕。同時因發炎而刺激嗅覺神經。神經興奮。則作噴嚏。風寒偶然觸於喉頭氣管等處。因發炎而分泌加盛。故咳嗽而多痰。傷風發熱。投以發散之劑。如荆芥。前胡。蘇葉。桑葉。薄荷。葛根等。汗出即愈。如審係鼻腔喉頭氣管等處。因傷風而致咳嗽或鼻塞。宜酌用半夏。象貝。陳皮。桔梗。牛蒡子。杏仁。姜黃。蟬衣等品。小兒傷風。與大人無異。惟小兒體質脆弱。抵抗力不足。不加注意。往往併發他證。如咳嗽不止。每易變成肺炎。或百日咳。及肺癆等證。春秋二季。爲寒暑轉變之時。忽而寒氣凌人。棉衣猶覺單薄。忽而暖氣飛騰。單衣尚覺煩悶。衣服失調。最易傷風。而斯時又爲痧子盛行之期。痧邪乘機傳染。爲害非淺。顯示

## ■ 小兒咳嗽

尤學周

其困惑。同時藉以促起本身之注意。否則咳嗽既爲一種抵抗作用。局部自有消滅病邪之能力。不必服藥調理。此種見解實屬誤會。近來日寇之如此倡勸。何莫非執政諸公發生此種誤會所致。不知病邪有輕重。抵抗力有強弱。安可委諸局部解決之。任其各個擊破。囂張蔓延。深入重地而不加措意耶。

咳嗽初起。大多認爲感冒風寒所致。感冒確能發生咳嗽。惟感冒咳嗽。於咳嗽諸症中。較爲輕淺者。若非感冒而誤認感冒。豈不延誤。且有許多病症。本不即發。因感冒之故。觸動病機。咳嗽遂生。謂非感冒。確由感冒而起。謂爲感冒。實較感冒爲凶險。此種疑似。而易於混淆之處。最易誤會成變。小兒最易發生之咳嗽。除感冒而外。爲百日咳。痧疹。肺脹。此三者皆有咳嗽現象。辨證不明。藥石誤投。危害立至。且證情變化多端。往往一波未平。一波又起。而咳嗽始終如一。或愈甚。延爲不治之症。

痧疹多發於春秋二季。尤以二月九月爲最盛。此時氣候寒燠靡常。最易發生感冒。而痧疹發動。大多由感冒引起。二症同有咳嗽現象。初起甚難識別。惟痧疹除咳嗽而外。兼見多涕。目呈水樣發熱等現象。略有不同。然感冒咳嗽。鼻涕亦多。其重者。亦兼見發熱咳嗽之甚者。兩目亦往往呈水樣。診斷時。

不可不審慎辨之。

以重感冒而誤認痧疹。固不免大驚小怪。以痧疹而誤認重感冒。亦必誤事。此種誤會之事。不一而足。譬如一小兒患咳嗽之證。經詳細之診察。確爲感冒。然一二日後。內伏之痧邪。乘機發動。熱勢陡起。咳亦加甚。在此種現象之下。病家雖知証情已加增。往往尙以爲感冒之重者。而不知已轉變他症矣。

百日咳亦多由感冒誘起。此證驟然而作，驟然而止。咳嗽時連續不已，必至筋絛而亦氣喘連連。故一名頓咳，喉聲與蛤蟆之鳴聲相似。故又名蛤蟆咳。其咳嗽特異，尚易於認識。百日咳之命名，狀其纏綿難愈，非謂咳嗽滿百日，即能自愈。此症以來勢驟暴易於傷肺，且往往生變，宜及早治之。

肺傷一名肺炎，大多續發於痧疹及百日咳之後。初起亦不易辨別。惟本症痰濁甚多，往往壅聚肺絡，阻塞呼吸之道，成爲喘急之狀。

小兒肺癰矯癆，一患咳嗽，宜速治療。祛其病源，咳能自安。不可徒寧其咳，以失祛痰之作用。亦不可誤解其理，任其咳嗆不止，以致遷延誤事，釀成他變。

○小兒天哮之原因及證治

原因 小兒天哮。方書名頓嗽。是一種痰火症也。秋燥本易傷肺。肺氣憤鬱。鬱久化火。灼液爲痰。燥津爲沫。痰沫火燥互相爲患。於是天哮之病生焉。考肺部之組織本極嬌柔。爲清虛之藏。纖介難容。其官能司清肅之權。以下降爲順。若被痰火所竊踞。喧賓奪主。肺不能行其應盡之職。庶必氣逆上壅。不平則鳴矣。小兒藏府脆弱。六氣（風寒暑濕燥火）之邪。最易襲入。時届深秋。燥金司令。同氣相應。嬌柔之肺藏獨當其衝。亦一種流行性感冒病也。

種狀 內經咳嗽論云。聚於胃。關於肺。使人多涕唾。而面浮腫。氣逆也。張載人曰。肺爲諸嗽之門戶。每爲六氣所乘。火燥之嗽。必作陣陣抱頭面赤者。天哮之見證。與肺炎相似。每嗽時作陣。低頭劇嗆。上氣面赤。涕淚交流。甚則嘔吐。面浮腫。亦病矣。嗽者。肺氣鬱而思伸也。火性炎上。故嗽時必喉頭先塞。或有痰。或無痰。若嗽久不已。氣分之邪不解。勢必波及血分。瘀血鼻紅。每相因而起。大凡咳嗽見血。是肺胃之絡被咳震傷。在理。乃病進之象。亦爲初期肺癆之見證。然而小兒天哮一經見血。切不可驚慌。因肺胃久蘊之鬱火。正欲尋隙而達。一見痰血鼻紅。鬱火得伸。而外解矣。正爲病退欲愈之兆。嘗傷寒論太陽篇。蓋乃解之文。尤在徑註曰。衄則營中之熱

亦除而病乃解。天哮之見血而愈亦猶是耳。此乃余臨證經驗所得非絕向壁虛構者也。

治法。方書云痰即有形之火。火即無形之痰。痰火凌肺。肺氣失宣。天哮之原因既明。則治法不外乎辛溫宣肺。甘涼清肺。苦寒瀉肺。淡滲利肺。若肺陰傷者尤當滋燥以養陰。大便秘者更當潤腸以通幽。初起用瀉白散。（桑白皮蜜炙地骨皮。甘草用生米仁。）半貝丸（製半夏川貝或象貝）。清肺炎而瀉痰火。若上氣面浮不能平臥者用葉氏瀉肺法。（苦葶藶炒杏仁甘草用生）或仲景麻杏甘膏湯。（麻黃蜜炙杏仁甘草用生石膏不可煅）甘寒之中佐入辛溫苦以清肺燥而宣肺壅兼嘔吐者加旋復花代赭石以降逆。枇杷竹茹以和氣帶痰血者喻西昌之清燥救肺湯。（人參用西洋參代之。甘草生者良。枇杷葉。蕓麥冬。生石膏。阿膠蛤粉炒杏仁。胡麻仁。經霜桑葉）的是對症良方。或加橘絡以和絡。或炒三子（白芥子。炒蘇子。炒葶苈子炒）以搜痰要在臨用時之權宜耳。又有用一味絲瓜網煎汁頻飲代茶亦頗著成效也。讀報諸君之子女倘有天哮者曷一嘗試之。

## 口百口咳

石梅林

原因。本病爲接觸傳染病。流行於冬春二季。或流行於癩

疹流行之後。自二歲至七歲之小兒患者爲多。

病狀。潛伏期約在三四天至一星期之後。突然發熱三十九度至四十度。繼以咳嗽。吸氣長。呼氣短。其吸氣時爲笛聲。

一晝夜大抵二十次。多則五十次。咳嗽時顏面蒼白。吐黃色痰。粘極爲困苦。異常可憐。因長期之咳嗽。昔人云之爲百日咳。

治療。室內宜溫暖。不使冷風入戶。小兒欲食物時。取易於消化之滋養品。一方面請醫配藥調治。

## 口治小兒感證虛證

修源

近世兒科見有感證。不能明辨六氣中所傷何氣。定不出各種病名。遂強一驚字混入。藉口漫稱爲驚風。杜撰許多驚名。欺騙病家。病家反酷信之。以爲小兒防範難周。焉有無驚之理。適中亂推亂拿。亂燒亂挑。不學無術。妄稱專家之流毒。自宋迄今。幾成爲驚風世界。前明方中行。喻嘉言。前清程鳳輝。陳飛霞諸前哲。力闢驚風。而世俗不悟其非。不知其謬者。吾國病家之黑暗也。往往因不識六淫感證。釀變症厥瘧癆。因之夭傷者。目擊甚多。良可慨焉。若夫虛證小兒稚陰未長。固

以血虛陰虛爲最多。故吳鞠通以存陰退熱爲第一妙法。謂調小兒之味宜甘多酸少。如錢仲陽之六味丸是也。然小兒稚陽未充氣虛陽虛者亦間有之。故錢仲陽以五味異功散七味白朮散補氣虛。閻孝忠以附子理中丸半硫丸補陽虛。後賢如薛立齋以四味河車丸氣血雙補。萬密齋以補腎地黃丸陰陽並補。此皆治各種虛證之名家也。雖然小兒臟腑薄藩籬疎易於傳變一遇感證則爲虛中實證矣。小兒神氣怯胆汁稀易於感觸一受客忤則爲實中虛證矣。故虛中實實中虛尤爲治感證虛證者之難乎其難所最宜注意者嬰兒柔弱之臟腑消化乳食尚且不遠何能再加猛烈峻重之藥性豈有反增藥病耶故宜於按摩熏蒸針灸薄貼等外治法必要平時習練始能於臨證之際克奏鉅功穩而速効即不得已而必須用藥當以輕清靈潤爲首要如外感風寒之邪解肌疏表每味幾分可矣。藥味亦不宜多如藥多而重則藥反過病病必不能愈也。

去年秋在同善局助診小兒病瀉者多。病次之其症由於暑濕挾食滯者十有七八治以芳香醒脾逐穢內清暑邪佐以化積之品一二劑即愈。其若日久脾虛則佐以健脾之品治是症用是藥無不應手而愈。方則每多相同其消食切忌溫燥以致胃液乳枯不能敷布於上而爲腹硬咳嗽變成滑滲。

之症如芳香則宜藿香菖蒲佩蘭葉佛手柑等。清暑則宜解荷葉西瓜翠六一散黑山梔青蒿條芩川連等苦味堅腸且止痢運氣則宜廣皮木香檳榔腹皮等消食則宜神麪穀芽山楂蘿蔔梗五穀蟲雞內金之類健脾則宜東洋參茯苓炒麥冬炒扁豆甘草粳米之類養胃陰則宜胡黃連榧子使君子棗兒檳榔之類然必佐甘藥以誘之使虫喜甘而求食也。以上諸藥看似平淡無奇然治小兒諸病或疳積腹硬青筋突起或疰夏不食體日羸瘦或肝強多啼等症皆可變化治之每多取效而藥亦不出以上數味而已。

## ■ 小兒的仇敵

農隱

綜觀各地方人口調查冊表死亡率最高的要算小孩了。小孩生活力原來很弱好像植物的嫩芽支不住狂風暴雨全賴保育的十分注意日日體察他們身體及精神上有否失常若見有病象急宜隨時治療庶免臨時手忙腳亂毫無補救不然失於檢點常有小疾化爲大病或竟一病而亡若是親子恩愛的天性上果然悲苦萬分而實際於社會國家中喪失一員國民不亦深爲可惜麼。

小孩口不能言即能言亦不知所云不幸而呈病象經驗不富的醫生很難知其病原的所在況且初爲父母的自然更

不必說了。考尋常小孩的病，由食物而起的很多。俗諺有『病從口入』。又『小孩要帶有三分飢寒』。這等話都是聰明有經驗的人所創造。蓋以爲父母愛惜子女，總要過度一些。雖不使小孩十分飽暖，也已經得到中庸的程度了。健康的小孩與病害外貌上當有幾分可以推測。有時依着小孩的食量及排出的尿量，有幾分的考據。然其體溫不可不講究的。

檢查小孩體溫，須備置一檢溫表（俗稱寒暑表）。這表係玻璃所製形如桿，中貯水銀，一端稍大，一端刻有度數。平常多含於口中試驗體溫。若在小孩不能使他含入口中，爲防咬碎，只可挾入他的腋下或脣旁與皮面直接相觸。經五分鐘後，檢其度數，即可知其體溫若何。尋常以攝氏三十七度爲平溫。然因人而稍有微異，三十八度五分爲小熱，三十九度五分爲中熱，四十度五分爲大熱。若再高則有生命的危險。通列小熱雖不足驚異，但連日不退，須要注意的。

藥劑中的水藥，凡小孩都怕飲用。他們既不欲飲，必須用强硬手段灌入。中大半皆從孩口兩角流出，而入胃不多。因此有擗塞孩鼻而使速嘔，不免稍覺殘酷。但在無法中而遇必要時，似亦不得不。然有一種所謂散藥的，蘸在清潔的指上點入孩口中，再給以調水的乳。自當入胃較多。水藥中

亦有附以糖等調味品的，亦無非要他肯飲，不致拒絕。信任醫師指示，爲病家最宜注重。小孩有病，既以孩命託於醫生，自然不必師心自用。爲父母但亦要有常識及平日所見所聞的經驗。雖然，而於慎選醫生一層，倒是最當重要。俗云『一着錯滿盤輸』。而於延醫上的選擇及考慮，不可不知。熟知醫生的技能及性質，斷不能以耳爲目，貿然輕聽他人而敗事。

又小孩的病，可從他們的泣聲而知。意氣不良的小孩，在平時雖不少狂啼猛叫。爲父母的應當早已熟察其性格。如果孩性平日意氣和緩，身有痛苦，必有十分真情表現於外。次爲熟眠時的呼吸聲。如微有笛聲、貓鳴聲等。知其氣管上次言中所能記其大概。今就小孩最易常患的數種病，略說其一二的豫防法於下。

### 小孩病與豫防法

病的徵象。千狀百態。尋常所說的症狀如何如何。不過爲外面的表示。往往有病狀相似而其本原全不相同。究非寥寥數言中所能記其大概。今就小孩最易常患的數種病，略說其一二的豫防法於下。

嬰孩的膜性眼炎。此病大概在小孩生後二三日而起。眼

中有膜狀物流出。急請醫生治療。以免後日不治而為盲目。如母體有淋病及白帶等。常有這等禍患。故分娩前母體的必先有相當的治療。萬一仍留餘毒。或在臨產時預用五十倍淡鈣酸水。將污物洗淨。以防延害。

**皮膚病** 共有種種。小孩皮膚很弱。受傷後易起糜爛。若任牠過去。每難措手。宜早用適當的治法。此等病概因濕尿布。久搭於嫩皮而釀成。次為濕疹。宜豫先清潔。小孩頭部。因此疹。概先從頭部起。漸次延及面部。不易醫治。濕疹滿頭滿面的小孩。晝夜吵鬧。深覺可憐。急應請醫治療為宜。

消化不良。呈吐乳或糞便緩慢而帶青色徵象。或不能安眠。顏色蒼白。時時啼泣。手縮腳彎。頗有腹痛症狀。食慾又見減退。大概因飲母乳太多。或喂孩的牛乳。哺育瓶不清潔與

嘴用腐敗的牛乳。以及多給不消化的食物所致。消化不良。各病多由此誘起。宜先時預防為要。

**鴉口瘡** 由口腔不潔而起。凡小孩舌頭運動不靈。唾液分泌很少。自然有乳溜集而受細菌作用。滿口呈白色。就成此病。預防法可用十倍的重碳酸鈣。蘸於毛筆而洗拭之。或以二十五倍的硼酸水代用亦可以。牛乳哺育小孩的易罹此病。不可不知。總由積穢而起的。

鼻加答兒

即鼻孔內粘膜盛出粘液。有鼻塞呼吸不通的

患害。宜先時預防。鼻孔不便吸取冷熱不調的空氣。若已見朕兆。可用熱水浸手巾在鼻外溫罨。使鼻內血液流通。至粘膜退腫即愈。

**痙攣** 就是驚風。或稱腦膜發炎。當小孩漸漸成長。神經發育時。身體衰弱的常患之。其症狀驟然厥去。手足抽搐。眼上翻。面色青白。呼吸急促。這樣稱為急驚。再進一層。則神志更覺昏迷。稱為慢驚。大抵不能救治。我國向來稱說。驚風由小孩受了風寒及驚嚇而起。此雖不知其原因。在腦膜。然知其因精神衝動而發現此病。亦非全無理想。平日所宜注重的。首先在不給難消化食物。次為風寒。而於便閉不通時之宜通洩。驚恐不安時之宜安慰。皆屬預防的方法。

**耳漏** 即耳內漏出濃黃的液汁。小孩亦常患之。宜早治療。不然變為慢性。竟有終生不能脫去此患。不可不先為留意。睡眠中驚睡夢中驚。小孩在夜中驚喊。皆日中受了驚恐。刺載腦神經而起。或因腸胃中受蛔虫的寄生及消化器不良。亦易患此。當受醫生的指示治療。他如睡眠中咬齒。諺語等。都屬與此相似的病狀。

**蛔虫** 小孩腸胃中。往往有蛔虫寄生的患害。受害較深的。孩鼻下呈赤色。漸漸加甚。而發熱及腹痛。預防的方法可取孩糞少許。用顯微鏡檢查。有否蛔虫的卵子。有則給以打虫。

藥如「山道甯」等藥為宜。

跛足 小孩跛足每在腰部及足關節有病。決不可等閒視之。宜早請醫生治療。不然則終生成爲殘廢了。

貧血 為營養上受了障礙而顯的表徵。或由親體虛弱或

斷乳時調養不合法。這等小孩面色蒼白。齒齦嘴唇等無血

色體力很弱。宜請醫生早日治療。

腺病 質由先天虛弱或乳養不足。缺少營養之故。這等小

孩皮少色澤毛髮柔軟。上脣肥厚頸間的淋巴腺腫脹。後來

肺結核及關節病不免依次發現。亦宜早日治療。

佝僂病 頭大骨骼柔軟不能直立。宜給以適當的滋養品

及運動操練使身體漸健。當受醫生指示善為調理。

### 小兒的傳染病

傳染病種類很多。今只就小孩所常患病略說於後。等傳染病約可分三類。一從空氣中傳染的。如痘瘡。白喉。猩紅熱。百日咳。流行性感冒。流行性耳下腺炎。水痘。肺結核等。二從飲食傳染的。如赤痢。霍亂。傷寒等。三從接觸傳染的。如皮膚病。眼病等。白喉為可恐的病。傳染很快。當此病流行時。小孩宜少出門為是。如覺略有異狀。宜檢查他的咽喉。果有白點急宜延

醫診治。決不可使別個小孩接近他。他的室內所用的器物等亦須消毒。此病先似感冒而咳嗽聲嘎喉痛漸漸加重。不可輕視忽略。現時有所謂「白喉血清」的藥液依打針法注入病體可以保其生命。

猩紅熱 此亦是可怕的傳染病。小孩患此。決不可猶豫輕忽。宜早日施治。病象初似感冒而發大熱。口內及咽喉很腫。即連身體上脫下的皮屑亦有傳染的能力。

百日咳 小孩常易患此。初似感冒而咳嗽漸漸加劇。連咳不已。咳時呼吸不調。面紅吐食。不咳時一如平常。必綿延多

日纔愈。無病的小孩與病孩接近。因神經上的感觸而似有

傳染之力者。

痘及水痘 都是皮面發疹的病。通常要發熱的。痘有輕重二種。因人的體質及流行的性質而異。輕性的痘有故意使無病的孩傳染的。水痘亦如此。因此等傳染病一次患過以後就有免疫性的。

流行性感冒 此病有發熱。頭痛。腰痛等。俗稱傷風。輕則越一星期而愈。重則綿延一二個月不等。極易感染。小孩與老者不可接近。患此病的人。

流行性耳下腺炎 俗名痄腮。初起時似感冒。數日後耳下

兩旁腫脹。因於咀嚼及吞嚥。在春冬間多流行的。宜早就醫診治爲是。

凡腺病質的小兒。有瘰疬的又易患此。此病很難治療。早宜醫爲是。如能轉居於海岸近旁。治療較易爲力。傷寒霍亂及赤痢。此等病毒流行時。身體衣服住室等。固宜清潔。即飲食非熟煮。決不可入口。漱口洗茶碗時亦勿用生水。此等病雖很可恐怖。先事預防。必不易傳染。

疥癬。由疥癬蟲寄生而起的皮膚病。平時不好清潔而與患者接觸的人。多患此。他如頭部的鱗癬。例行疹。大水泡疹等。都是與疥癬同。由皮膚接觸而發現的。宜先時清潔及十分避忌爲宜。

沙眼。爲容易傳染的眼病。亦因不潔而起。患者多從手巾等物傳染而得。患者眼臉內面發生沙粒狀而覺乾痛。不容易治愈。宜速醫治。

瘡瘍。別名天花。爲小孩容易的傳染病。患者百人中約有五十人不幸而死亡的。調理不善。則成麻臉。甚或爲痘瘡眼。

俗稱天花回毒。幸而種痘的方法。他國早已發明。但不及現在種牛痘的爲穩妥。尙有知識未廣的人民。仍信用舊法。應當早日覺悟的。

牛痘種後約有一年間的有効期。有謂須要連種六年。或一

年一次。二年一次。纔有功效。

種牛痘的經過。無甚大避忌。唯種痘苗處的局部。不使受水濕及擦傷。襯衣以清潔柔和爲佳。飲食物亦須取其易於消化的。若痘胞因搔搔傷而腫。恐將腐爛。早請醫診察。免得拖延爲累。奏功甚遲。不可不注意。

## 保幼簡方

楊垣

見夜啼方 小兒夜啼。大都因襁褓太過受熱所致。一用犀黃飛珠砂各五厘。塗舌上立止。一用雞屎塗臍中。男用雌女用雄。

甘潤 青黛一味研服。甚效。

走馬疳方 用石首魚中白骨。菜油沸透。調敷患處。即愈。

孩兒勞方 陳酒童便各一鍾。先煎。再入人乳。白蜜各一鍾。共煎成膏。病重者多煎服幾次即愈。

姚心源

## 兒科須知

小兒之病。不若大人之複雜。似宜從簡單入手。

小兒初生在未啼時。最好去其口中玉衡。

若要小兒安。須帶三分飢與寒。

小兒偶有微熱。恐是骨蒸。或係出牙。

小兒夜啼。熱驚或癇。須當辨別。

小兒有識。切勿以老虎畏嚇。失其信任習慣。

小兒洗浴。最要當心。臍中着水。

小兒未滿七朝。偶有寒熱。或且口噤。必係臍風。

小兒初生。切勿急於授乳。

小兒初生。以舊屎多爲上善。

小兒最好安臥。勿常抱走。養成依賴。並妨生理長成。

小兒不得眠。須用口琴催之。切勿搖之以身。

小兒初生之後。常以青布刷口。血出不妨。否則易出板牙。

小兒之目。最要當心。

小兒多哭不煩。

小兒鼻尖手足溫和。均係無病之象。

小兒切勿當風。亦勿靠近火爐。

第一方 治小兒先天不足。病後失調。

生地 麥冬 玉竹 糯稻根 太子參

白燈心 麥芽 辰砂

第三方 小兒表熱無汗。

焦神橘 滑石 灸桑葉

第四方 小兒腹痛。

焦只壳 蒸菔子 赤芍 生米仁

第五方 治小兒胸滿喘逆。

薑蘿(或紫苑)白芥子 杏仁 石膏

第六方 治小兒洩利下重。

葛根 防風 前胡 蒸菔子

第七方 治小兒咳嗽哮喘。

白前 前胡 蘇子 杏貝粉

第八方 治小兒下洩出痧子。

荆芥 生牛蒡 炒銀花 焦連翹

第九方 治小兒痰喘肺脹。

姜竹瀝 麻子仁 橘紅 紅牙大載

第十方 治小兒大便秘結。驚悸。

麻油調保赤散

第十一方 治小兒肺閉。肝厥。

保金丸(痰多用同春丹) 石菖蒲

第十二方 治小兒既吐又痢。

玉樞丹(半吞下半納臍中)

第十三方 治腦膜炎。

葛根 黃連 凤尾艸 蟬休

第十四方 治小兒嘔不得通。

蘭苦花 細辛 麻黃 牙皂 細末取嚏  
第十五方 治小兒痘疾。

紅白扁豆花 紅白糖 白頭翁 秦皮  
第十六方 治小兒瘡疾。

檳榔 煙大棗 姜 冰糖  
第十七方 治小兒疳積勞病。

牛膝炭 蒸菔子 梧桐子 烏梅  
第十八方 治小兒骨蒸熱。

薑黃辦 綠萼梅  
第十九方 小兒暑熱咳嗽。

竹葉 蘭草  
第二十方 小兒肺悶煩熱。

連翹 荷梗 白燈薪  
以上二十方悉本家傳標以出之。惟世之博雅君子垂教焉。

## ■ 小兒發斑

尤學周

斑與疹。在習慣上並不加以分別。凡皮膚表面發生有顏色之病態統稱爲疹。余爲醒目計。以密集或稀疏之紅點。(如麻疹猩紅熱) 及圓整成顆粒(如天痘水痘)者屬之於

前茲更述小兒發斑。  
小兒月內皮膚之局部腫脹發赤界限分明游走極速蔓延各處名赤游風失治能致命可用針刺其邊緣使出血後用陳木瓜以好醋磨塗。

風疹塊爲小兒所常見者。其證爲皮膚上發生大如蠶豆而扁平之斑或連合成塊泛作赤色隱現甚速癢癢難忍時或發熱大抵由魚蝦中毒及腸胃病刺激而起俗名皮虛者非也可用通導之劑暢行其大便自能隱去。

以上二種易於辨認亦易於治療惟熱病發斑證情重大與此迥不相侔蓋熱病發斑爲傷寒之一種現象雖不限於小兒然小兒往往患之此症較普通之傷寒其來勢稍凶猛或稱爲發疹傷寒古籍稱之謂疫毒所發之斑爲頰圓形多在胸腹交界處蔓延於軀幹四肢而及於頭面發斑之前有高熱甚至神昏譁語與天痘之證象略同較輕者胸悶嘔惡足冷耳聾脈象沈伏或急數此時宜加葛根薄荷牛蒡荆芥等辛散藥於清涼劑中助其外達發斑後熱漸輕至七八日始能退散如熱仍熾者可用清熱解毒之品如石膏知母黃連黃芩山梔甘草等如紅斑已退餘熱未清可師仲景竹葉石膏湯意用西洋參麥冬石膏竹葉山藥甘草等投之庶無後

患。

## 小兒面黃

尤學周

面黃肌瘦乃十足之病態。國人雖屬黃種。應有黃色之特徵。然在康健之人。無論小兒與成人。此黃色之特徵。亦不甚顯著。惟小兒於初生之時。其面部泛金黃。然一月以後。則亦逐漸轉色矣。

面黃有二種不同之徵象。其一小兒無血色。泛黃種固有之。黃色素俗所謂蒼白者。是此種現象。大都屬於先天不足。或營養不良。致血液不充。呈衰弱之象。此種小兒身體之抵抗力甚為薄弱。苟非從事調養。最易招致疾病。如患濕瘡者。大多為面色蒼白。身體不健之小兒。蓋濕瘡為病菌侵入腺內所致。面黃無彩之小兒。最易傳染。又易發生溺白之症。按溺白為腎臟疾患。衰弱之小兒。往往見之。除此而外。又有一種最容易發生之疾病。即泄瀉。是面黃不澤之小兒。其消化之力甚為薄弱。飲食不當。或稍過其量。則消化上大感困難。而泄瀉作矣。故其治法。以補脾為第一要義。小兒之有腸寄生蟲者。亦多面黃不澤。蓋其營養部分為寄生蟲所剝奪。以去其二肌膚並不十分瘦弱。而膚色金黃。此為黃疸。初生小兒。因胆汁分泌異常。輸送胆汁之胆毛細管尚為胎生期之。

黏稠胆汁所充塞。故胆汁遂入毛細管而發黃疸。此屬於生理的。如四星期後黃色不消。則成胎黃。乃病象矣。大概黃疸一症。多因胆管充塞之故。

面黃之屬於第一種者。最為普遍。而其間又有因病而黃。即病態之表徵。與由黃而病。即衰弱而生病之不同。因病而黃。先去其病。病去則血色自充。黃色可以調和。因黃而病者。一面去病。一面又當補益其不足。雙方兼顧。方能有效。是在臨診時之擇善矣。

## 小兒之尿急症

盛心如

斯證在醫書名之曰癃閉。初起之時。大都疎忽而不甚注意。因小兒之興致猶佳。不過小便如泄。或黃赤如茶。斯即尿急之先驅證狀。急宜用通利之品。以預防其危急。若漫不經心。漸至腹部急漲。小溲短少。或一日數十度。溺而不多。緩溺而又欲如溺。甚至欲便不便。尿管刺痛。生殖器紅腫。而點滴不通。迨至足腫氣喘。目突口張。作呃。作吐。面赤頭汗。則入於危險時期矣。

病因 斯證之起。多數緣於受熱。而脾胃之積熱。為其總。或由乳母之熱乳。或由多食糕餅肥甘等品。積而化熱。遂

致水道不利。結於膀胱。其餘如肺熱。肝熱。膀胱炎。腎臟炎。皆足以成爲癃閉。總之爲水分聚於膀胱。無從排泄。或由腎臟之分泌失職故也。

治療初起小便如涓涓。或黃赤短少。宜投以六一散。鮮蘆根。車前子等煎湯代茶。倘至小便點滴短少。用將軍乾研末。開水吞服。尿管刺痛欲便。不便可急用通關滋腎丸。約四五錢。包煎飲之。西藥中有烏陀羅冰藥片。服食簡單。亦可取驗。若至危急時期。則心臟衰弱。必須用強心利水法。以上諸法多難取效。宜用犀角末三分。另吞。鮮生地五錢。鮮竹葉三錢。細木通一錢。硃赤四錢。甘草梢五分。喘甚加炙麻黃五分。嘔吐加姜竹茹二錢。一二劑後。即可見效。對於兒童之調護。總以預先謹慎為妥。莫至臨時慌張。飽受虛驚也。

## 遺尿

石桂林

原因本症自五歲至十四五歲。體質薄弱之男小兒為多。尿道狹小。或由於蛔蟲膀胱結石。膀胱括約筋等異常狀態而起。病狀無意識小便。或夢中小便。約在睡眠後一點鐘。或暗色。拂曉時。

療法

一 睡睡前飲沸水有效力。

二 畫間脊腰注冷水或冷坐浴。冷水灌腸。

三 食滋養強壯之食物。

四 左側臥或右側臥。

五 醫生診察配服適當藥品。緩緩調理。

六 患本病者之父母切莫叱責患本病者。

## 嬰兒大便檢驗法

許如屏

嬰兒初生三三日之內。其便濃厚而黑。迨後逐漸轉成黃色。質軟而無黏液。若便色黑綠。多因消化不良。洩量過多。過少。約係腸病之徵。便內含有凝塊。即為食物難消化之現象。為父母者。果能留意考察其凝塊及糞之色狀。即可推知何種食物消化不良之結果。茲略述其要點如下。

- 一 凝塊大小不等。色白而軟。為脂肪不消化之徵。
- 二 糜量甚多。其凝塊堅硬。色棕黃而大。剖面呈白色。嗅之。覺臭者。為蛋白不消化之徵。但塊外所包者仍為脂肪。
- 三 糜色黃綠而味酸者。為糖脂不消化之徵。
- 四 糜色淡白。氣味甚重。大便常秘。且體重減輕。身軀漸瘦者。為脂多而炭化水素不足之故也。

## ■ 小兒之羊癇風

石蘿華

羊癇風大多爲遺傳病。故於幼時即已發作。當其發作之時。目定口呆四肢抽搐。人事不省。與急驚之症至難判斷。初次發時。抽搐極輕。有一月發三四次者。亦有一年發一二次者。不知者往往誤爲急驚。然無急驚之危險。久之即自平復。羊癇風全爲腦之變化遺傳之由來。其親本患是病。遂遺傳於子女。或其親本有腦病而子女受其遺傳。變爲羊癇風之疾。當其初起及早施治。易於就痊。若延至成人時。病根已深。即不易治。

羊癇風之重者。雖無全愈之望。然盡力調治。或可望輕減。幾分。惟年齡愈大。其腦部已受其害。即治愈亦現痴鈍之象。終必成一廢人而後已。

## ■ 小兒癲癇實驗談

盛心如

癲癇俗名羊頭風。猪癲風者。是乃小兒突發性之一種惡疾。最難治療。不僅限於小兒。大人亦有患者。分而言之。大人曰癲。小兒曰癇。倘在小兒時期不能治療使愈。則成年以後。發作更爲危險。且因環境關係。生活狀況。情感刺激。皆足以使精神變調。或流爲癡呆。或爲瘋狂。成爲社會中之廢人。不

觀夫衣冠端正之人。行走於街路上。忽然昏仆不醒。適或碰傷於有關於性命之處。如頭部或肺部腎部等受傷過。每致一蹶而長逝。生命危險。不知朝夕。余嘗遇小兒與成人患者。此症者。治療雖過幸獲全愈。爰將證狀原因及治療概要略述於下。

證狀 凡小兒頭部畸形。如額陷頂凸。或頭首左右不等。尖小聾。曲天柱骨倒。腦部發育不全。皆有發生斯症之可能性。即不發癲癇。總有精神喪失。神經癡呆等現象。斯乃診斷之先着。不可不知也。遇此等小兒。或有熱有痰。不欲哺乳。睡眠不安。時常驚跳。或身寒皮冷。不哭不呼。弄舌搖頭。一切視味覺。皮膚感覺。精神狀態。異於尋常。雖其經過時間有或短或長。皆爲斯證。將發之前。驅證。及其突發。頗多忽發痙攣。猝然顛仆。當其顛仆之時。總有似乎馬牛猪羊雞犬之叫聲。後遂精神喪失。口角流涎。面部眼球。四肢筋肉。俱起抽搦。數分鐘後。即入於昏睡狀態。更歷數分或刻許。或二三小時。方得蘇醒。輕重不一。但醒後即如常人。其發作之經過與次數。亦至不一定。或一日數發。或數日一發。或數歲一發。或每發而減輕。或每發而增劇。至發作時之其他副症。亦無一定。面部或青或白或紅或黑。或腹滿便閉。或腹軟便泄。或小便自遺。目球或直或斜。或嘴口唇形色俱有變態。宜於隨

時審察。且其發作之時與氣候亦大有關係。有因於疾風驟寒而發者。有因天時之燠熱煩悶發而者。此乃病機之先着。治療用藥方面頗有關係。總之凡遇不論任何惡性疑難之症候。對於病者平日之飲食起居等都有注意之必要也。

病因不出內因與外因二途。內因之說以祖先或父母之遺傳為最有力。如曾患精神病。梅毒。嗜酒犯罪。或自殺等。皆足以間接直接而患斯病。如內經所謂人生而有病癩疾者。病名曰何安所得之曰。病名為胎病。此得之在母腹中時。其母有所大驚氣上而不下。精氣并居。故令子發為癩疾。由此以觀。故不特受胎時之遺傳。而在胎生期間。母體之榮養狀態及生活環境。有無感動外傷過勞疾病等。皆有關係。及至分娩時間。有無難產等情。或用鉗子取出。致小兒腦部受傷。則因發育之障礙而患此病。斯皆先天之素因也。若在嬰孩時間。大多數因將養失宜。飲食失節。或因意外之驚嚇。或患傳病等。以致營養不良。神經異常。痰聚胸膈。上逆犯脣。此乃後天外因之一般也。故內經闡其病理云。癩癩者。痰邪逆上也。痰邪逆上。則頭中氣亂。頭中氣亂。則脈閉閉塞。孔竅不通。故耳不聞聲。目不識人。而昏眩倒地也。此種病理解剖。何等透澈。誰謂國醫學說之陳腐。若去玉而取砾。淘沙而遺金。又安得謂彼善於此。總之不論何種學理。必先下深切之研究。

方能入其堂奧。而短長有所去取。徒存出主入奴之見。安能有所改革。發現新的理解。仍屬步人之後塵。非所以迎頭趕上去也。

治療。古來治療斯症之方法。不下百數。求其實際。總屬影響模糊。因其未能澈底。了解病理與病原故也。其扼要治法。鎮墮濁痰四字。足以了之。用鎮墮法。則氣不上逆。濁濁而去。而根拔矣。惟須辨寒熱二端而分治。大抵發作之時。面色蒼白。屬於寒性。面色紅赤者。屬於熱性。余治一金山小孩。年約五歲。從二歲起。在大風將起之先。或出外遇風。其病必發。甚者一日發三五次。處方用川烏白附。南星半夏。龍骨牡蠣。磁石。白礬。礞金。全蠍。硃茯苓。白藥桂枝附子控涎丹。無價散。(即保赤萬應散)。出入加減。前後服藥二十餘劑。約二月左右全愈。永不復發。此乃根據青州白丸子。白金丸。桂甘龍牡湯。十全湯化裁。乃症之屬於寒性者也。又治一三十餘歲之男子。每晨五時必發。頗以為苦。診其脈搏。弦數洪大。此則屬於熱性者。處方用寒水石。元精石。川連。胆星菖蒲。玉金天麻。白藥石。羔黃芩。硃茯苓。青礞石。厚壁子。紫白石英等。未及十劑。皆以斯二法為綱領。靡不應手。單方如青果熬膏。及經霜茶葉和白礬作丸。對於熱性症亦可取效。惟須久服耳。

## 口 小兒斷乳後之化變 尤學周

小兒哺乳。最好以一年爲期。蓋一年之後。門牙已出。消化力較強。是時正可與以食物。啓其食慾。藉以鍛鍊其消化之機能。且一年以後。母乳質中所含之滋養分亦已減少。小兒食之必呈虛弱現象。體質脆弱。抵抗力不足。易於感冒。及發生其他疾患。而母體方面。亦因給養太多。足以影響於身體之康健。故一年以外即可斷乳。

小兒哺乳成習。於斷乳期內。每有不歡現象。斷乳之後。又往往發生其他變化。如面黃肌瘦。精神不振。身體日衰。大便滯泄。有時秘結。失其常態。俗名奶疳。由於營養不良所致。又有僱用乳媼者。無乳或乳汁稀少。時每不肯陳述實情。而用他種不易消化之物。以充其量。結果小兒亦漸消瘦。與此同原因。

蓋斷乳之後。換以食物。其一因口味之變換。失却其消化上之習慣。無形中感受不快。而遏制其消化之機能。其二因各種食物。所需之消化力不同。消化上往往發生困難。無力與之周旋。呈消化不良之徵象。此皆由乳母之失策。斷乳不得其法所致。

如小兒之身體不健。或常有吐瀉之患者。不可即時斷乳。夏

時消化力薄弱。又非其時。斷乳宜漸不宜驟。將於斷乳前之二三月。哺乳次數逐漸減少。而以其他適當之物代之。使其口味上。消化上。緩緩改變其習慣。信能行此三者。斷乳之後。可免發生變化。

不幸而已。起變化。發生消化不良徵象。宜與以富於養料。而又易於消化之食品。藥物方面。以黨參。白朮。扁豆。山藥。神薑。穀芽。麥芽。炙內金。茯苓。苡仁。砂仁等。參酌用之。

## 口 水 痘 張夢仙

張夢仙

病源 脾經蘊熱。達於肌膚之故。

狀態 如水珠之狀。根盤紅而散。

病狀 初見點之時。不發熱。已出兩三日。而後發熱。並無他項咳嗽。噴嚏等類。

治法 不可用表解之劑。宜用涼解肌熱法。用細生地。鮮

石斛。鮮生地。銀花。連翹。丹皮。赤芍。甘草。黃芩。元參。石膏。知母。

大貝母。黃柏。花粉。竹葉。燈草。出入用之。

注意 此症不宜表散。及鹹鹽食及鹹物等。皆在禁忌。因服

表藥及鹹物等品。致水痘變爲紅紫。而黑醫爲痘疔。入於裏膜。至不可救治。鄙人親目所覩。實屬不少。非得涼血之品。不得清其血。血熱一清。痘即紅潤漸漸收斂無事。

## 小兒瘡腮特效藥

張修甲

涇腮俗名猪牙瘡。生於耳下兩腮。腫脹刺痛。或發熱惡寒。或牽引頭痛。潭人以青靛花調醋塗抹。或有用生南星磨醋時。時抹之。內服葛根牛蒡板蘭根銀翹煎湯溫服。效驗如神。經余歷見頗多。誠治痄腮之特效藥也。  
(按)生南星及青靛皆有消散之效。葛根板蘭根等又有清熱之能。痄腮一症多由熱毒內蘊而起。此法內清外散。故有特效。

## 天泡瘡

吳啓藩

小兒天泡瘡雖無大害。亦頗不快。足致虛羸。患者速將豆筍壳灰菜油調敷。無不立愈。或將蓮蓬灰井水調塗亦效。蓋天泡瘡由溼熱釀成。豆筍蓮蓬均有清熱解毒之效。故治之。

## 小兒肥瘡療法

高清苦

小兒溫度較高。血球倍增。血盛熱鬱。易患瘡毒。而瘡毒之中。以肥瘡為最難治。累月經年。纏綿不愈。求之我國古今醫書。絕少特效良方。研究數年。苦不得當。今春徐氏適患是症。乃

用中西療法。以試之。不一月而病霍然。可見中西醫學實有溝通之必要。爰亟錄之。以公同好。

徐梅香淳安人。年八歲。今春頭部忽患肥瘡。前至額角。後至髮際旁。及耳後津水淋漓。蔓成一片。兩耳流膿臭不可聞。姑以雙養水洗之。熱氣蒸騰。如餃中炊飯之狀。此蘊蓄熱毒。乘春時上升之氣而發。但毒勢猛烈。恐非尋常洗敷之藥所能制止。乃注射加哥地拉藥水以殺其勢。內服柴胡錢半。川芎一錢。歸尾錢半。赤芍錢半。川連一錢。黃芩錢半。連翹錢半。木通一錢。防風一錢。薄荷一錢。生草一錢。等味清熱解毒散風之藥。以疏其毒。隨以醫宗金鑑書中之肥油膏(方列下番木鱉六錢。全歸五錢。藜蘆五錢。黃柏四錢。苦參四錢。狼毒四錢。苦杏仁四錢。竹節白附子三錢。鯉魚胆二枚。無則以豬胆汁代用。香油十兩。熬枯去渣。加黃蠟一兩。溶化布瀘放置罐內。以手指裹布蘸擦之)。日夕塗洗。雙方並進。未兩星期而瘡愈過半。變更湯方。用生首烏二錢。全歸錢半。赤芍錢半。刺蒺藜錢半。川連一錢。連翹錢半。木通一錢。防風一錢。牛蒡錢半。生草一錢。服十餘劑。肥瘡已全愈矣。再以此法治療方姓十二歲之小兒。亦不一月而愈。語云世無難治之病。特醫者不悉心求之。且吾於治徐女病後亦云然。

## ■ 小兒外症

小兒若起腋疽。腋癰。或便毒不能服藥者。可用下方。壁錢糊七個。生鹿角五錢。枯凡五錢。銀珠五錢。小秦四個。炙乾蠶蘭白的七個。血餘灰二錢。共爲細末。以布包之。如人指粗長一寸多。用麻繩之。晚置於小兒手心。使小兒握之。若不能握。用帶拴住。男左女右。夜間汗出。緩緩自消。

## ■ 小兒四大要症

癆 痘 痘 痘

### 一 癆症

癆之發源有二。有由於傷寒。症汗下失宜者。有由於疫氣傳染者。當審其發於衛分。營分。發於衛分者。衛主氣色。白爲白瘡。如膚粟。發於營分者。爲疹。爲斑。形如豆。甚則成片。紅色者。輕紫。赤則重。黑色者危。此古人以色辨熱之深淺。驗症之輕重也。

小兒經絡未暢。一經感觸外邪。伏熱泛出。多有手足抽搐現象。慎勿認爲驚風誤投祛風逐寒藥。重分之藥。如抱龍丸。七珍丹之類。傷耗津液。損傷元氣。宜先吹以通關散。紅靈丹。

### 二 溫症

小兒溫症。由邪熱內伏。從風寒而化。初起必先嗽。頭疼。涕。鼻塞。身重。脈浮緩。此風邪傷衛。勿誤認爲傷寒。投以辛溫表散之劑。宜用桑菊飲。增減服之。如氣粗似喘。加兜鈴知母。舌絳苔黃。邪初入營。加元參犀角。若邪熱逼迫變症。多端用銀翹散。加減於清解之中。佐以芳香宣發逐穢之品。如鬱金。藿香之類。均可酌加。熱漸入裏。則宜加生地。麥冬。以保津液。

隨其感之輕重。察其在營在衛。投以辛涼解毒透表之品。邪初入衛。必欬嗽咽乾。用桑葉五分。川貝母三分。天花粉一錢。薄荷葉五分。澤蘭葉六分。杏仁三分。葛根二分。蘆根一錢。錢薄荷葉五分。澤蘭葉六分。杏仁三分。葛根二分。蘆根一錢。熱入營分。神昏舌赤。疹癰未出。用歸尾五分。生地一錢。赤芍六分。澤蘭五分。丹皮五分。茜草二分。木香二分。便塘不用苦草。改爲丹參。

項腫喉痛。加馬勃元參如三焦伏熱偏體赤斑加羚羊角石菖蒲並查照前述治痧方法療之。發疹後伏熱未清內熱身痛者服玉竹沙參地骨皮石斛麥冬之類是也。

## ■肺脹與痧子

尤學周

肺脹一名肺炎。脹者言其外候。炎者言其內候。本症因風寒挾邪入於氣管或腸部以致內膜發炎。其證狀為咳嗽呼吸困難或則體溫增高。其甚者因呼吸困難而發爲喘促之狀。胸脅擴張故有肺脹與肺炎之稱。本症之患者以小兒爲最多。肺脹之原因甚多而於痧子期最易釀成。當痧子初見之時口腔喉頭氣管等黏膜頗多發炎故發爲咳嗽等證。如痧子順利見點以後邪向上達炎證逐漸消退外候亦漸次轉輕如於痧子初期將護不慎以致不能發見疹點或一現而即隱伏則邪無外達之機炎證不能消退勢必咳嗽加甚漸至呼吸不利氣急鼻煽欲哭無淚甚則因肺之呼吸而縮小體內養氣缺乏口唇及指甲呈青藍色四肢厥冷兩脈頻數陷於不治。

春秋兩季爲痧子流行之時。舊歷二三月之交流行尤廣。痧子之順利者原可不必服藥。爲父母者缺乏此種常識。防護不周往往發生變化轉爲危篤之症。在痧子流行之期變症

最多而肺脹一症尤爲首屈一指。本症治法以順氣平喘化痰治咳爲最要。如炙麻黃。葛根。白芥子。炙蘇子。杏仁半夏。陳皮。瓜蔞皮等可以量症之輕重而施用之。甚者用消腫膏塗擦胸部病勢亦可減輕。

## ■小兒咳嗽痧疹外敷驗方

凡嬰兒外感身熱。肺氣不利。咳嗽不出。或發痧子未能宣達。內服疏肺之方尤宜。下用列外敷藥餅則奏功必速。已驗者未另用飛羅麵一撮。自母頭髮團一個(如無不用亦可)。葱白三根。燈心七根。雞蛋清半個。米酒半杯。同上末藥四味共搗爛如泥作餅敷胸部外以青布蓋之。敷一晝夜除去。

## ■小兒痧後服涼藥之誤

呂鞠屏

痧疹本係肺胃伏熱。初起戒宜輕宣。不宜服胡荽(即香菜)。西河柳(即櫻樹枝)。麻黃辛熱之品。如須宣發止新箭尖。煎湯飲之爲妥。退後亦不盡有熱毒。須審其病象。然後對症發藥。方可無虞。近時醫家病家均泥於痧疹後有熱毒須服地栗蘆根。枇杷葉。白茅根等味。以爲熱毒可解。孰知服後熱不退。小兒反悶不出聲。甚至昏迷不醒。時作噴涕之狀。至夜

熱甚涼藥愈多則熱愈重此曷故蓋內有溼痰遇溫則化遇涼則凝譬如痰一孟蕩以涼水則痰不去沃以熱湯則痰浮起專以地栗蘆根解毒毒不清反現出昏迷呻吟之狀病家不明此理延醫治之醫家泥於古法復以涼藥加之不致死矣待。

按遇以上各症急用姜汁和化痰之藥如萊菔子茯苓法半夏陳皮等以溫化之用焦山楂皂角子等類以緩下之黏滯

下行則熱退然非一二劑不爲功萊菔子可用萊菔汁不可用蓋有生冷之性痰又滯而不化矣。

近世醫家喜用竹茹（即竹二青）如告以涼性則反問余吃竹筍否可哂亦可嘆也按竹茹竹筍皮竹瀝功用不同如通骨天精草枸杞子獨非一乎何以各有所用也近時醫家無論何病必兼以竹茹一味幾與甘草同例若遇胸悶必大用特用詢以何意則以竹茹能開鬱對夫鬱甚多內經曾分晰之余見溼痰溼溫用竹茹者不知殺人幾許有時用溫化法挽回者有時病深竟不能挽回詢以何人所開之方甚有大名鼎鼎者此味亦不能不審用也。

姜汁炒之服後勢必胸悶氣閉甚有不能出聲者鬱久熱入氣分則出自瘡瘍如出透瀉可救如出不透必須用芳香之品如鮮藿香葉鮮佩蘭鮮絲瓜絡銀花通草以透之如再不

透必死無疑此不死於病而死於醫也（青竹茹誤用殺人甚多余有矯證不便登出）按竹茹性涼三家本草言有通經絡之功痰未化引入經甚至手足抽搐誤認爲驚或針戮或服牛黃犀角羚羊等藥百不活一涼藥之誤人如是如是吾於醫會中曾力言而同道者不惟不返省

## 口小兒痘疹

沈奎伯

近日小兒感觸時疫發生痘疹往往半出不出或已出而又內陷其症率多不治良用惻然頃得一簡便驗方試已神效。用亟披疋願闢懷保赤者廣爲宣傳全活嬰孩功德莫大焉。生黃豆一碗水泡透搗爛入鍋內煎濃汁如豆腐漿一樣再青竹根一段約半尺長煎滾水沖入豆糊內時時以湯勺調與兒服有起死回生之功黃豆係人家常有之物青竹根亦容易覓取方之簡便無過於此余已用之數十次皆效應驗如神幸勿視為通常驗方可也。

## 口小兒水痘與天花

尤學周

天痘俗稱天花乃最猛烈之傳染病水痘雖亦爲傳染病之一較爲輕淺非若天痘之危險百出也水痘多發生於十歲以下之小兒天痘則不論嬰孩成人凡未佈種牛痘者或僅

孩宜與病者隔離。以免傳染之虞。

## 天花與種痘

龐敦敏

種一二次者皆有發生之可能。天痘成爲顆粒。其形如豆。故名曰痘。水痘亦成顆粒而如豆。故亦以痘名之。二痘雖各有別。然平常之人無醫學常識者。又烏乎知之。若以水痘而誤認天痘。則小題大做。不特庸人自擾。或將弄假成真。引起他變。若以天痘而誤認水痘。則粗魯僥幸。其害尤不堪設想。

天痘初起。惡寒發熱。腰背痠疼。頭痛嘔吐。甚則發生瘡厥。無論何種病症。其初起未有如是之劇烈者。熱度驟升。二三日後。熱度降低。額部胸前發現紅疹。面部胸部及四肢亦漸次有紅斑發現。經二三日成爲小膿泡。身熱復起。膿泡漸大。如豆。其後熱度漸降。痘疹則顆顆結痂。水痘初起亦發熱惡寒。然熱度不若天痘之高翌日身發紅疹。不久變爲水泡。如豌豆大。二三日後即解熱。以上爲二症經過情形不同之點。而其顆粒狀之痘疹亦各不同。天痘根脚紅潤不散。顆粒雖光亮。而內液渾厚。微泛黃色。水痘如小珠之狀。根盤紅而散詳爲審視。即可辨別。

天痘變化甚多。其治當隨機應變。水痘既順且穩。苟不夾雜他症。亦不必服藥。即服藥不可表散。宜用清涼解肌法。生地、赤芍、黃芩、連翹丹皮、知母、銀花、花粉元參、竹葉貝母等。出入用之。魚腥麵食及鹹物並宜禁食。防其發生變化也。同居小

我們不幸而生在這齷齪世界。常常有許多病魔來侵犯我們。今天很健康的一個人明天也許就病了。病的種類是很很多。我現在要講一種很可怕的病症。叫作天花。或叫痘瘡。天花這個病症。是從古以來就有的。有人說的發源地是印度。慢慢的傳到中國。他究竟怎樣的起源。怎樣的傳播。我們現時暫且不去考究他。我要把天花的病狀來說一說。明朝有一個小兒科的醫生。叫作朱應我很精於治痘。著的一部摘星樓治痘全書上。把痘症（就是天花）當作小兒之人鬼關可見。這病是很可怕。很危險的。

照現今有實驗有證明的新醫學說起來。這天花的確是一種傳染病。不但是病人身上掉下來的痂皮。有傳染力。就是病人身旁的器具衣服。也有傳染力。我們用顯微鏡檢查。雖然看不見什麼。但是我們確實知道。有一種很小的東西。是這個病的根源。不過現在的顯微鏡還不好。我們的技術還不精。沒有法子看見他罷了。古時候的醫生。以痘爲胎毒。實在靠不住。那些鄉下老婆子說。是有位痘神娘娘作怪。自然更不可信了。

天花的病毒就是我剛纔所說的很小很小用顯微鏡也看不見的那件東西飛到那人的呼吸器裏面或是皮膚破碎的地方那人就要出天花却並不是今天染毒今天就出的

少則十天遲則半個月之後先發熱頭痛腰痠氣急身上發出紅斑來在這時候那是往往要當作出疹子過了一二天那紅斑退了先從臉上起漸漸的到下身或多或少發出一種小紅點這小紅點慢慢的大起來變成一個水痘和一粒豌豆一般大這水痘有稀薄的漿水這漿水慢慢的濃厚變成膿那水痘的中央凹下去周圍發紅從此那痘內的膿漸漸的乾了周圍的紅也漸漸的退了那地方結成痂皮等那痂皮脫落之後便是人人討厭的麻子這還算是好的呢出天花的能夠變成麻子仍舊活在世界上的一百個當中不過六七十個還有那幾十個早到鬼門關去了所以從古以來因為這個病送掉性命的不知幾千幾萬哩

一般的人大多以爲出天花是小孩的病大人不會出天花的其實不然三四十歲的人不必說就是六十多歲的人出天花我也看見過那天花如此的利害如此的可怕我們有什麼好方法可以避去他呢有有有種痘種痘的法子我們中國早就有過的醫宗金鑑上有種痘門黃

辰集驗良方上說

嬰兒痘症個個不免或過歲或二三歲以至數十歲必要出痘但係天行時氣而出若本年時氣好出痘保全者多若本年時氣不好出痘保全者少嘗見一鄉之中因痘而瘡比戶皆然甚是可傷今福建廣東江西地方向有種痘之法每當天時溫和之氣遇人家嬰兒痘之稀少者取其痘殼四五粒研細末用綿包裹男左女右塞嬰兒鼻內二三日後自然身熱出痘所出之痘輕者不過四五粒重者不過一二十粒痘稀毒亦稀萬安萬穩

這個法子在中國恐怕已經行了幾百年了叫作吹苗或叫鼻苗俗稱大花是那一位老前輩想出來的却無從考據他必定因爲痘是免不了的與其等那危險的天然痘子來傳染不如選擇輕症的天花特爲叫他傳染可以輕一點他的立意不可以說不好但是往往有因爲種花反而發很重的痘症把性命送掉的要說是萬安萬穩實在不見得所以反對排斥的人很多如今行了牛痘這鼻苗更沒有人相信了什麼叫牛痘呢因爲這痘的種從牛來的爲什麼人要種牛痘呢因爲牛也有痘症他發的時候很輕很輕僅不過乳傍有幾個青藍小泡西歷一千七百六十八年大約中國雍正年間英國有一個醫生名叫琴納他很熱心研究怎樣可

以免出天花的法子。把自己的兒子當作試驗品。替他們種在這看是怎樣的變化結果。後來他偶然看見一個擠牛乳的女人。叫奈爾美司。手臂上長了二顆粒是由牛身上傳染來的。却和天花的形狀一樣。他就把那女人痘疤中的漿種在

一個男孩子叫希伯士的身上。希伯士也出同樣的痘。後來又特爲把天花的毒。就是出天花人身上的漿。種在希伯士的身上。連種了二次。一點也沒有什麼。奈納先生熱心研究這件事。前後三十年。他的試驗自然也不止一次。於是他在發表他的報告說是要免天花。只要種牛痘。這個當兒一般的人多以爲人怎麼可以種起牛的痘來呢。真真荒謬絕倫。所以大家多不信他。反對他。甚至於拿這個來攻擊他。對於新事業抱異見。也是人情之常。然而真理到底戰勝了。過了幾年。大家知道奈納先生的話不差。反對的贊成了。攻擊的投降了。他的法子慢慢的傳到全世界。我們今日安安穩穩可以不怕天花侵犯。受的是拿自己兒女當試驗品的奈納先生的恩賜。普天下都該謝謝他。牛的痘種在人身上。人就可以免出天花。然而牛不見得常常出痘。我們要種痘而牛偏偏不出痘。沒有地方找出這種牛痘種來。豈不是就不能種。就仍舊免不了出天花。所以當初只好由人傳人。譬如剛纔說的那女人奈爾美司。從牛身上傳染二顆痘。把奈爾美

司身上的種在希伯士身上。從希伯士身上取下來。再種在別人身。也一樣。只在種的地方出痘。種一顆。出一顆。種二顆。出二顆。決不會有什麼危險也。一樣可以免天花。幾十年以前多是用這個法子。

我們中國第一個行種牛痘的是廣東人邱浩川。廣東同外國通商最早。所以邱先生從外國人那裏學來這個法子。後來各省都有種的。當時種痘大多在春天。第一人種了之後。過六七天。要到那種痘先生那裏去讓種痘先生刺破痘庖。取出漿來。種在別人身上。叫作還漿。如此遞傳下去。到將要沒有人種痘的時候。種痘先生隨便取一個人的漿。塗在一塊玻璃板上。保存起來。明年再用。這樣的法子。牛痘的苗永遠不會絕滅。但是弊端非常之多。

第一。好好的一顆痘。特爲去刺破他。大家不願意的。於是有錢的。多出些錢。捐免還漿。種痘先生只好揀那窮苦的人。給他些錢。專取這人的漿。替人家種。名謂漿童。種的人多做漿童的。少於是一個人的漿。要供好些人種。甚而至於漿也沒有了。那種痘先生還在那裏刺那漿童的血來替別人種。豈能不慘酷。

第二。那小孩子往往有生下來就有梅毒。也有正染了丹毒。的。倘然那漿童正染這兩種病。把他那漿種在別人身上。別

人也就傳染這種病。豈不危險。

第三種痘必在春天。一定要等那種痘先生開種。倘人家夏天生了小孩子。到了秋天天花流行起來。就不能種痘。只好聽天由命。等那天花傳染。豈不冤枉。因為有以上這三個弊端。所以有幾個大醫家。想出一種好法子。把痘先種在小牛的身上。從小牛的身上整片的刮下來。研碎了。封裝在細玻璃管中。種的時候。只要折斷玻璃管的兩端。把漿吹出來。就可以種。這就是近來市上藥房裏的牛痘。那製造法各處稍有不同。現在不去細說。他總之可以去以上所說的那三個弊端。所以外國政府現在嚴禁用人漿了。我今奉勸世人。生了小孩子。一定要替他種痘。一定要用靠得住的。有信用的。裝在玻璃管裏的漿。(俗稱冷漿)不要用人漿。(俗稱熱漿)須要請靠得住的醫生種。小孩生後滿三個月就可以種。不必一定要等到春天。再有一句話。種了一次牛痘。並不是保一世不會出天花。就是出天花的人。經過多年。也有出第二次天花的。所以頂好每過三五年種一次。種的時候。額數不必多。二三顆夠了。不要嫌麻煩。五年種一次。一百年也不過二十次。比出一次天花省事得多呢。

點方新編上說。痘為小兒一大病。當天行時。人人尙思遠避。

今無故取嬰孩而與之以病。可乎。曰非也。人家小兒出痘。如遇險症。延醫服藥。舉家日夜守視。多少酸辛。問卜求神。多少驚恐。其輕者。亦須多方調護。今牛痘則止種四顆或六顆。小兒嬉笑飲食。一切如常。旬日之外。告厥成功。無災無害。不惟小兒省却疾苦。即育子者亦省却憂勞。誠善也。可見牛痘從前人就很相信。我們還用疑惑麼。

## ■ 瘡病研究

王鴻孚

### 發驚之因治

書曰。驚生於心。痰生於脾。風生於肝。熱生於肺。此一定之理。也。熱盛生風。風盛生痰。痰盛生驚。此賊邪逆竄必至之勢。療驚必先豁痰。豁痰必先祛風。祛風必先解熱。而解熱又以何者為先乎。肺主皮毛。皮毛為賊邪入內之門戶。彼風寒暑濕燥火六淫之來。皮毛受之。即入犯乎肺。而肺本出熱地也。燥閉塞。則熱無所洩矣。若解熱必先祛邪。往往只說解熱。並未說到祛邪。若不祛邪。如何退熱。真不解悟。

### 驚癇死症辨

先君初明有曰。兒體不近肥。瘦不甚。盛不省人事。張目視人。

者。其在精感二穴。對拿緊了不知痛。竟無擣聲模樣。惟咬牙搖頭。此乃肺絕也。肺金形似鐘磬之類。空則聲亮。碎則聲無。治之無益。夏禹鑄曰。驚之爲症。症屬有餘不足之分。語云。舉醫有餘不醫不足。既曰有餘。何亦有死。我知之也。此乃肺氣先弱。肺主皮毛。淫邪一犯。肺實受之。是已弱又加弱也。由肝犯肺。由肺犯脾。理應犯腎。奈腎則虛位。却無實地。亦且水鄉風則可動。而樹與燥火俱不得入。其勢又難中阻。只得又順傳入肺。嗟嗟。肺氣幾何。而能堪此重困耶。到此地位。須得返魂樹。西域內更生香。庶乎可活。

### 說明慢驚之由來

人動曰慢驚。余獨曰慢症。蓋此症多成於大病之後。或庸醫只見病愈。遂不防去路。初或悞汗下吐。久瀉久而脾胃虛寒。故成慢症。慢字緩字。人稱急慢驚風。然與此症相差遠也。試問急慢驚風。豈能一起而來。急者初病。不知人事。慢症病久失調。致成脾寒。皆稱慢驚。這驚字與理相不合。除驚字更症字。是確實之當也。所以余稱慢症。凡成此症者。皆由父母怠慢之故。或有汗出不止者。聽之。或有吐瀉不止者。聽之。以致汗久亡陽。吐久亡胃。瀉久絕脾。成難起之病。故曰慢症。何驚之。失調。以慢症而去驚。皆庸醫見兒眼翻手掣。握拳形狀似驚。故

以驚名之。倘遇不察。不足竟將有餘治之。或推或拿或祛罪透表。則下井而復落石也。內經云。慢症者。是脾虛屬不足之病。眼皮上下屬脾胃。若脾胃敗。故眼皮不能緊合而睡。則露線縫。脾失元氣。故兩目無神。脾敗涎枯。無統故凝滯咽喉。而有如牽踞之聲。手足乃脾所司。脾胃敗。則四肢厥冷。虛慢必生寒寒。則大便瀉青。而小便清利。便知爲慢脾之症。若療驚則無驚可療。祛風則無風可祛。除痰則無痰可除。解熱則無熱可解。惟脾間枯痰虛熱往來。耳陰虧陽敗是也。治法宜以固真湯。加天麻勾藤。或六君子湯。加泡姜。理中湯。加附子。衝開寒痰。或可挽回。否則另無妙策。

凡兒一到慢症。十僅能醫六七。蓋症至此。肺心脾三臟俱虛。胃氣大腸兩腑均敗。虛而不絕。雖久能生。如胃氣將盡。萬不可活。即強藥之。亦活泛一二日。究非真活也。然非假活。將不足。已見明定。全仗藥力之妙。以適當。余見之甚衆。均生躊躇。於脾胃絕也。生死兩端。盡在脾胃探消息。便瞭然在目也。

### 卓溪叟之九憾

一憾。見挑筋割肉。五臟之病。豈盡在筋。挑斷筋絡。不知當那藥味。六淫之賊。豈盡在血。血出。又不知退那一經邪。這一種挑筋的。死後定在阿鼻地獄。如對於此情由說出理來。便不

恨也。

一憾見病兒似寒熱表裏虛實茫然不知竟將死病作活醫投藥無效活症作死病竟然一藥偶中活也即居功自誇死症能生對此說出理來予便不恨。

一憾見兒燒熱不知燒從何感並自何生亂推亂拿致見大啼大哭出汗解症偶然撞着便自稱神既自稱神緣何有効不効對予說出理來予便不恨。

一憾活症屢藥不効明醫一藥成功不曰自己不知症實且曰他有時運這種情由對予說出理來予便不恨。

一憾不知症候藥與病反不說自己用藥不當且曰兒母疎失對此之理說出緣因予便不恨。

一憾以丸散爲欺人之具其實不值一文動曰此丸此散不論中病與否解包投服藥到不愈反索藥價甚昂既屬珍貴何故投之不瘳對予說出理來予便不恨。

一憾動用牛黃竹瀝貝母爲除痰要藥痰有寒熱熱痰見此如滾湯澆雪寒痰見之竟是雪上加霜不論寒熱概投兒服對此說出理來予便不恨。

一憾必用柴胡退熱燒病有表裏之殊柴胡當治解表之味脾虛腎虛氣血兩虛諸種燒熱亦用柴胡對予說出理來予便不恨。

一憾湯頭有內減外加之說加減原在湯頭內看臟腑之有虛有實的酌藥味宜多宜寡或清病之來路塞病之去路外加一二味此是變通妙手如曰內可減外可加則四君子湯加兩味便六君子湯十全大補湯減兩味便是八珍湯對予說出理來予便不恨。

夏禹鑄曰恨人即是恨己業醫者將此九恨以作醒人劈頭之一棒也。

### 闢諸驚之名之謬

凡小兒發驚而延村婦或有庸夫多以鉄針於兒手搃筋破肉噏異哉怪也此要心之村婦無資格之庸夫不知驚之爲驚而誤認爲筋骨之筋也蓋驚者驚嚇也由兒先有內傷食來外感肺竅痰迷心無所主一着驚嚇即發也不把豁痰以療驚祛風以止掣專以鐵針向筋肉而挑斷以免筋抽不犯止兒之啼惟塞其口耶况驚屬心筋屬肝若挑筋以治驚明紀上有云女墮牙痛灸岳母的腳後跟是也推前人所稱蛇絲馬蹄鷗魚鳥鴉等驚名之意無非爲後之癡人立其名色告以病表便易識耳因見舌吐出如蛇舌遂以蛇絲驚名兒手方擰踢如馬蹄遂以馬蹄驚名兒口動如魚喫水遂以鷗魚驚名兒身黑似烏鴉遂以烏鴉驚名如執此以治驚則當

用雄黃以治蛇絲。絳馬繩以治馬蹄。香傳以治鯽魚。穿楊箭

以治烏鵲。方爲中病之藥。然筋亦有時而抽者。蓋筋屬於肝。血行於筋氣以血行肝。肝有賊邪。則氣血與賊邪交戰而不行。以致筋受風邪而抽掣耳。故豁痰以療驚。祛風以止掣。乃莫破之理。此乃醫驚之指南。凡我同志。萬不可以蛇絲諸詭名之爲正論。以殺嬰兒如反掌。慎之慎之。同登彼岸功德無限。

## 急慢驚風之分別

王鞠坪

急驚實熱。慢驚虛寒。急驚驟發。慢驚漸成。急驚生於壯實之體。慢驚因於不足之軀。急驚之熱如火燒。必面赤口渴喜冷飲。聲壯氣粗。大便或閉結或洞泄。小便短赤而熱。甚至四肢厥冷。面色轉青。熱極似寒之象也。治宜瀉火爲急。（莫妙於夏禹鑄之幼科鐵鏡）慢驚之寒。是真陽告竭。譬如隆冬冰合。未易凝。非用附桂薑椒。斷難挽救。况虛陽上浮。亦必發熱。其熱夜盛朝淡。溫和而烙手。面色桃紅。或白或青。口鼻中無莽莽之熱氣。舌必澀潤苦必淡白。或微紅口不作渴。即飲亦不多。喜熱不喜冷。是謂虛熱。甚至有唇裂出血。寒極似火者。治宜引火歸原。大劑扶正。庶乎有濟。（莫妙於莊在田之福幼編）若誤認實熱爲虛熱。而投以溫補。誤認虛熱爲實熱。

而投以寒涼。皆必死之道。害人不淺矣。

## 急驚治驗

石公

病者 張幼年四歲。住黃倉橋。於十一月十一日診。

症象 神昏迷睡。四肢口鼻冰冷。頭有微汗。二便閉結。苔中板白。脈伏。指紋青晦。漸及命關。

原因 晨起猶嬉戲無恙。至十一點鐘。忽惡寒戰慄。旋嘔吐。痰兩口。即兩手抽搐。遍體汗出。神識遂昏。推拿無效。

診斷 此風寒由太陽直入厥陰。鼓盜上胃。機竅被阻。症極危篤。

療法 先以勾勾湯下回春丹。熄風定驚。繼以桂枝白芍和

衛。撤邪。菖胆竺黃。醒蒙宣竅。旋覆轉連氣機。茯苓淡滲利水。二陳化痰。裏枳攻積。標本兼治。

處方 小兒萬病回春丹三粒。

（右藥研細用勾勾三錢。姜湯調灌）

東白芍（川桂枝四分同炒）錢半。陳胆星六分。九節菖蒲六分。天竺黃一錢。旋覆花錢半。雲茯苓三錢。製半夏錢半。薄荷紅錢半。江枳實錢半。全瓜蒌三錢。

效果 一劑全愈。是兒於今春患腦膜炎症。已形危險。經余投大劑滋陰鎮降之品五帖。而安。爰附誌於此。

## ■治小兒慢驚

墨霞天

小兒久瀉傷脾。漸成慢驚。庸醫不察。以抱龍丸回春丹等治之。必死無疑。此症以溫補爲急務。速用北沙參(土炒)三錢。炒白朮三錢。雲茯苓三錢。炙甘草五分。熟附片七分。淡吳萸四分。炮姜炭六分。炒六曲三錢。廣木香八分。銀柴胡七分。小川連五分。車前子一錢。煎服。屢驗。

## ■小兒驚風及治法

徐惠之

驚風之名多矣。前人每斥爲不經然。相沿已久。愚夫愚婦均知之。似不妨用其名稱。最烈者。莫如急慢驚風。通常以抽搐數眼者爲急驚。吐瀉久而成瘓者爲慢驚。急驚用藥宜涼。慢驚用藥宜溫。前論之詳矣。茲不贅述。但此外更有極惡劣者。四種一啞嘴。二弄舌。三舌唇發黑。四手足涼熱不同。既見這種驚風之象。復見此四種惡候者。其病之險惡。異乎尋常。雖未見抽搐。然斷定是凶多吉少之症。此外更有種一不發熱。不惡寒。僅目光直視。啼哭低緩。或亦能照常笑哭。惟神志氣息總不靈敏。活潑。此類症候。最不易體察。亦不易治療。而機警之乳母。常在懷中。自能覺着。經驗較富之醫生。觀其形狀。亦能領會。患此病之孩。年在二三歲者爲最多。且多肥胖之。

兒面色血脈與常兒無異。每令醫生心中迷惑不定。致用兩可之藥。聊爲嘗試。求一對於此等症候到眼。

即有把握之治法者。截止今日爲止。無論何地。實所鮮見。蓋小兒不能言語。家中人所述病情。每多模糊。其象脈又全無憑據。不特三部九候之不能清晰。即喜笑啼哭。脈亦爲之變動。故無論急驚慢驚。惟有察其面色。聽其聲音。問其二便。按其胸腹。再察其舌苔口氣。互相參考。其表裏寒熱虛實。方能了然心中。對症用藥。自不患其無効也。若病始發而輕者。須用芳香之劑。先制其木。木定則何患成驚風。然已現惡候者。(啞嘴弄舌唇舌發黑。手足涼熱不同)。當以熄風平肝法。先救其急。如抱龍丸之類。繼以青蘆其餘。庶爲標本皆治。此雖極爲簡易。盡人知之。但治病不難于用藥。而難于診斷。觀今世之治病者。每每拘泥成法。得其實。確病情。而輕于用藥。致傷于驚風者。比比皆是。吾情忝司民命。可不審慎歟。

## ■小兒急驚與刺血之關係

尤學周

日前潭子海某姓之女生。甫二月。據云發驚風。邀余往診。既至。小兒微有抽搐。身熱並不甚。脣腹部雖青筋顯然。並非膚風。察其舌短而脹。大根後尤脹。多淡不乳。余決其風熱內鬱。

所致。即立一疏風清熱之方。並囑其另用針刺出其舌中之血。對於臍風一說。余亦未加否認。然用藥則並非臍風之藥也。又有一董姓之子。住提籃橋。小兒瘧。搔來余處診察。熱度亦不甚高。左頤發腫。齒齦而痛。其病由於牙疾所致。無疑。方定後。燭其須。將病牙拔去。或用針刺牙齦。瀉去其血。病狀即可減輕。然此二小兒之家長。對於余言刺血一事。不甚注意。且有懷疑之狀。一診之後。未有消息。苟未實行刺血。大約凶多吉少。茲為徵信。病家計。特將其理由解釋於下。

欲知刺血何以能和緩急驚。先須知血與急驚之關係。

(說明)急驚之由高熱而發生。無不與血液有關。血液之本

身。足以增高熱度。而又復易於傳熱。故發熱之人。診其脈搏。可知微熱。則脈搏稍稍增數。熱愈甚。脈搏愈數。此蓋血中之熱。刺激心臟。致心之跳動。增加。故脈之搏動。亦因以增加。熱入於腦。突呈變化。痙攣以起。

刺血之所以和緩急驚。其理由。即在減輕熱度。如吾人於大出血後。體溫突然降低。身體冰冷。此即一證。又如熱甚不解。往往鼻中見血。俗名「紅汗」。鼻血之後。體溫亦可降低。此又一證。又如夏日行於烈日中。中暑昏倒。俗名發痧。挑痧者。以針刺。指尖出血。往往而愈。亦一證也。

或曰。此二兒發驚熱。不甚何必用刺血瀉熱之法。則應之曰。

刺血之作用。除瀉熱而外。又可洩毒。熱之發生。有由於病毒。刺激發熱。中樞之神經而致者。如各種傳染病之發熱。是二兒病在局部。發熱。中樞神經。尚未受過度之刺激。故未發生大熱。然其病根。皆在頭部。隣近於腦。其變易而且速。故不必待呈高熱狀態。而始發驚。且刺血之方法。亦有二種不同。之解釋。高熱時。在無論何處。刺出其血。其熱固一時緩和。而原因未除。熱必復增。若直發其病根所在。則病毒亦隨血洩出。熱亦不復加甚。即不熱甚者。洩毒之後。其勢已挫。發生之影響亦有限矣。如流行之腦膜炎。脊髓炎。必刺脊抽髓者。即洩其毒。分其勢。與余向二兒家長所述之刺血理由同正。

## ■ 小兒寒瘞

**病源** 小兒體小液少。凡風寒外襲。太陽經。致脊髓腹炎。而發神經痙攣者。名曰剛疊。一曰太陽疊。或風寒猝中厥陰。經致肝風上翔。即疊而兼瘛瘲者。名曰陰疊。一曰厥陰。

**症候** 剛疊。初惡風寒。發熱無汗。身僵硬。母懷頭痛項急。脊強腰折。角弓反張。眼目斜視。牙關緊急。此張仲景所謂太陽病。發熱無汗。反惡寒。上氣衝胸。口噤不得誤。小便反少。欲作剛疊者是也。陰疊。手足厥冷。筋脈拘急。頭頂強直。眼目上翻。口

噤牙緊。甚或癰癧。此方中行所謂犀丸上升。宗筋下注。少腹裏急陰中拘掣。膝脛拘急者。乃小兒之厥陰症也。然無論剛隸陰症。亦有身熱無汗。四肢痙攣。心神煩躁。睡臥不寧。手足牽引。時時瘲癰。此陳飛霞所謂先由風寒濕閉其腠理。不能開通內出之氣。壅而爲熱。其病尚在肌肉筋節之間。猶未入於臟腑也。

診斷。剛痉脈多弦緊。甚或沉遲。指紋色多浮紅。舌多白滑。

甚或白膩。陰換脈多沉弦。甚則沉細。指紋色多青黯。舌多淡灰。甚或淡紫。若風寒已從火化。脈多弦數。紋多青紫。舌多紅多紫。惟脈見沉細或伏堅。指紋竄出命關色青黑而直上者。症多不治。

療法。首當養血爲正。邪甚者兼治其邪。古方倉公當歸湯（當歸。獨活。防風。蜜麻黃。明附片。北細辛。）主之。時方天保采薇湯（羌活。當歸。前胡。活。獨生葛根。橘紅酒炒白芍。清火草。寬筋草。）加減。邪微者調其營衛。古方括萎桂枝湯（括萎根。生白芍。鮮生姜。川桂枝。炙甘草。小京棗。）主之。時方桂枝加芍防湯（川桂枝。全當。歸川芎。生白芍。清火草。防風。生姜。小京棗。）選用。此皆治剛痉之正法也。若治陰症。古方當歸四逆湯（全當。歸。生白芍。溴木通。桂枝。尖。炙。附。北細辛。小京棗。）主之。時方海藏附子散（川附片。清火黃耆。防風。

清火則青化。桂生於朮川獨活。大紅棗加減。若由風寒濕外閉內壅。鬱而化熱。法當辛涼清散爲君。佐以解肌舒筋。古方羚羊角散（碎羚角。北防風。生石膏。桂枝尖。茯神。水清火丹）。加減。桑菊飲。惟風寒欬嗽致梗者。名曰壓欬。當用杏蘇散（杏仁半夏。前胡。生姜。蘇梗。橘紅。桔梗。紅棗。散風寒以平。腦筋。

## 口 小兒抽搐

朱振聲

問 小兒二歲。起先吐瀉。繼變先大笑。後抽搐。忽起忽止。一月十六日。驚風大作（不笑）。手足抽搐。口吐白沫。眼珠向上。抽一時。後喉中痰生。呼吸不便。連抽十一時。止後即能飲食。十二月十七復發。初起目定口呆。繼抽八小時。弱後體溫不定。脾胃甚弱。手足時有跳動。二個月始全愈。三月廿二日又發。抽四時許。四月十二日。抽六時半。十五時。各抽三小時。十八二十各抽五小時。七個月間。大發九次。小抽不可勝計。有時左半身抽。有時右半身抽。頭抽重時。手足輕。手足重時。頭輕。頭抽眼皮口唇舌均跳動。手掌略向後反。足伸長。抽搐均不大。現在眼珠甚好。脾胃亦佳。每日能服牛乳五瓶。及各種滋補品。大便每日一二回。小便屁墮均多。惟醒時手足尚有小抽。睡則頗好。因注射過多。知覺尚未恢復。上月口部

抽過長久。唇舌亦未復原。須用茶匙哺乳。西醫稱爲腦神經病（胆小）。每次發作均入院注射麻痺劑及強心劑。並灌腸通便與服藥。因西藥乃一時鎮壓不能除根。故屢愈屢發。先後注射一百七十餘針。神經已被麻醉。知覺全失。目下停止注射。已漸見佳。以前曾服全蠍與燕荷葉粉及各種驚風藥均無效驗。照貴報第三十五期用全蠍殼麝香雞蛋等貼劑亦無效。因此間無中醫。故仍服西藥。（鎮靜與消化劑）并在牛乳米湯內分別和葡萄汁。牛肉汁。魚肝油。鷄蛋黃。菠菜粉。頻薑汁等滋補物品。以求身體強壯。希冀不發。（胡芥舟）答。細按證情並非驚風。實爲癆症。俗名羊癇風。故全蠍殼等。服之無效。此等藥與西醫注射藥通用之。皆有流弊。切勿多用。可向藥肆購「白金丸」。每服八分。每日早晚服二次。鈎藤橘紅二味羹湯送下。

## 口 小兒癆積

尤學周

疳之一症。據古籍所載。甚爲複雜。有指結核病者。如肺疳。腦疳。舌疳。無掌疳。丁奚疳等。有指瘡濕者。如牙疳。鼻疳。下疳等。有指腸胃病者。如哺疳。心疳。脾疳。哺露疳等。故小兒病「癆痘驚疳」四大要症中。以疳症最爲複雜。成謂疳即爲癆。成

人病此則名癆。小兒病此即名疳。而習俗則又以疳積二字相連。則明指疳爲腸胃病矣。然攷古人治疳方。則什九爲殺蟲之劑。苟欲一一加以研究。而爲之分析。亦非難事。惟不在本文之內容後續述。茲先言「疳積」。

疳積者。即五疳中之脾疳一症。疳雖有種種不同之名稱。其病少見。惟脾疳較多。故疳積之名。較其他爲著。此症爲一種特異之消化障礙。其症狀。腹部甚爲膨滿。多如鼓脹。青筋暴露。胸部四肢。則瘦削特甚。皮膚乾燥。呈灰白黃色。大便不消化。有惡臭。時泄瀉。然胃口則異常。佳良好食。植物性食品。且好味鹹之物。有時食癖異常。如炭屑泥土之類。最喜食之。本症之發生。以斷乳後爲多。蓋斷乳之後。另易食物。口味爲之一變。失却其消化上之習慣。無形中感受不快。而遏制其消化之機能。又以各種食物。所需之消化力不同。消化上發生困難。無力與之周旋。呈消化不良之徵象。此說已見前拙作「小兒斷乳後之變化」篇內。

疳積治法。一面宜投以營養適宜之物品。一面以消導之劑服之。古人治疳諸方。如金蟾消疳丸。（胡黃連。黃連。鶴鱉肉。豆蔻。苦棟根。白皮。雷丸。生蘆薈。蕪荑）肥兒丸。（肉豆蔻。使君子。麥芽。黃連。神曲。檳榔。木香）九味蘆薈丸。（蘆薈。胡黃連。木香。白蘆薈。青皮。白雷丸。鶴鱉。麝香）聖惠木香丸。（木

香麝。香。胡黃連。熊膽頭。蘆薈。青黛。雄黃。使君子。各方所用藥品。雖有出入。要不外消導殺蟲之義而已。

(二) 佚名

小兒疳積。由於糖果餅餌雜食。食之過多而起。胃腸消化之機能無力。消導宿食停積腸胃。所食食物不特不能收取。其營養成份。且以宿滯阻於腸胃。使新陳代謝之機能停止。必先面色萎黃。且腸胃宿滯停滯過久。蛔蟲遂大肆活動。所有食品之營養料。全供培養蛔蟲生活之所需。於是蛔蟲日形繁殖。肥大。而其人之形體肌肉。則日形消瘦。且以腸中不清。胃火大旺。食慾反增。時思進雜食。貪而無厭。久則腹部隆然膨脹。剝至四肢肌肉日益瘦削。成為疳積之症。此時體內虛火之重。為任何病症所未有。焦灼肺部。最易咳嗽潮熱。虛象紛呈。蓋小兒患癆病者。大抵皆由此症而起。往往不及二三月。腹部石硬。入於損途。挽救為難矣。故在此症將起之先焉。能略加忽視。

欲治此症。全在初起。面色黃滯。喜食雜食之際。亟宜戒食雜食。并延醫診治。力求腹中寄生虫之消殺。若簡治疳積殺蟲之品。以『使君子』為最有效。向藥肆購一兩。炒焦。每日食七八粒。最有殺蟲消疳之效。西醫之中之殺虫劑亦常用此物。如

小兒欲預防疳積。祇須每日食使君子五粒。可使腸中蟲清肅。清誠簡而有效之物也。

(三) 李健頤

小兒疳症。多由飲食不節。腸胃虛弱。消化力不足。夫消化不足。則腸胃多有積聚不消之物。日久遂成發酵性。乃生蛔蟲。而疳疾成矣。西醫即用單篤甯殺之。余觀單篤寧性最烈。有礙胃氣。惟有用蓮子淮山藥。芡實。茯苓。使君肉。鶴虱。炒麥芽。鷄內金。粳米等味。共為散。飯熟和冰糖。用開水冲服。此有殺蟲補脾兼助消化之功效。而無礙胃。且小兒亦可以當小點。真治疳之炒方。嬰兒之補品。勝過單篤寧萬萬倍矣。請試用之。

■ 小兒疳勞

陳存仁

(一) 何謂『疳』

小兒四大要症。為痧痘痘癩。註者曰。『疳者乾也。由津液乾涸而致。或曰。小兒疳疾。即成人之癩病。然疳之範圍甚廣。』如眼疳。牙疳。鼻疳。蛔疳。下疳。等。並非由津液乾涸所致。亦非癩症。應有之現象。大約『疳』之定義。為『濕化蟲生。触創為恙』。所謂疳勞者。乃指疳積之疳而言。其證多見頭

皮光急。毛髮焦稀。頭繩鼻乾。口噠唇。兩眼昏爛。揉鼻擣眉。脊髓體黃。關牙咬甲。焦渴自汗。尿濁瀉酸。腹脹腸鳴。癥結潮熱。酷嗜瓜果酸炭米泥土等物。諸證以上根據醫學辭典而言。其中所謂自汗潮熱等象。有偏於癆症之傾向矣。

### (二) 痘與癆不同之點

痘之證狀。已如上述。其間雖混有癆症之現象。然痘自痘。癆自癆。二症截然不同。痘癆並提。實出於昔人觀察上之錯誤。或者痘與癆之一部分現象。有相同之點。遂指鹿爲馬耳。昔人造字。皆有含義。痘字從甘。甘爲脾味。脾主濕。故上節解痘爲『濕化蟲生。飽創爲恙』之義。癆字從勞。意謂由勞而得。此雖不免曲說。然亦不能謂爲全無理。由此不同者一也。治痘積之方。無慮數十。其中主要之點。多爲殺蟲劑。癆症雖有癆蟲之說。然以培補爲主。此不同者二也。且癆療現象。可見癆之與痘。確非一症也。

### (三) 痘何以誤認爲癆

痘與癆既爲二症。何以並爲一談。此中亦有理。在蓋癆菌侵入。腹膜往往滲出許多漿液。留着腹部。患者之腹壁緊張。腹

部周圍。徐徐增加。有絕無疼痛者。有微覺刺痛者。腹部即膨脹愈甚。而胸部則愈形狹窄。身體羸瘦。方色蒼白。青筋綻露。此與痘有一部分相同之點。故亦以痘名之。而不知其爲癆症也。

### (四) 痘有成癆之可能乎

痘積之症。多由脾胃虛弱。不能健運。或寄生蟲類所致。如能及早治療。去其病根。培其脾胃。增其消化之力。則自能漸次恢復其康健。若因循其治。或治不得法。則身體日弱。病邪即乘機侵入。而習俗又好以個人咀嚼之物。餵其小兒。不幸而食患癆者。之食物。微菌即有侵入腹部之機會矣。

## 小兒調護

蔡光謨

### ■ 育嬰法

### 初生第一日

哺乳留意。一。嬰孩尚無哺乳之可能。以前切忌喂水。

哺乳以後。一。第一日或先幾日。不好強哺以水。在第一日之下半天。每次於哺乳以後。哺一茶匙或兩茶匙水。以後。量

可以逐漸增加。

糖—嬰孩所飲之水切不可加糖。

第一次哺乳，在生後四小時，每次五分至十分鐘。此後每次相隔四小時。

### 正當哺乳法

哺乳時間—除第一、二、三、次每次約十分鐘以外。每次十五分鐘到二十分鐘。嬰孩在第一次十分鐘內之哺乳可得所需食物之四分之三。前五分鐘內可得三分之二十分鐘以後，所需極少。十分鐘後，若嬰孩似已充足，則毋須更延長哺乳時間。

扣留乳頭—在哺乳時之前十分鐘內，將乳頭由小孩口中取去兩三次，放出嬰孩口中之氣，不然當舉抱嬰孩，輕拍其背。若母親與嬰孩均係躺在牀上，可略將嬰孩之頭與肩扶起，俾氣可以完全驅盡。

使醒—哺乳時當留意，使嬰孩全醒。

倘哺乳時，嬰孩忽熟睡，就須候至下次喂食之時。

哺乳相隔時間—(四小時)—從第一日至第一年終，均須四小時。除非別有事故(如疾病)發生，得更改此條規則。大抵四小時之休息，於嬰孩之強健裨益多多。

使醒嬰孩喂食—當喂食之時已到，即須將嬰孩弄醒。

長久休息之益處—避免病痛與不適意。亦母親與嬰孩安樂之根源。人乳在嬰孩胃中約二小時始能消化殆盡。牛乳則須三小時。由此可見休息時間之重要。

短少之休息—一切實證明四小時之休息，於嬰孩似屬過久之時，可以稍為更改，稍短之休息，然如順遂，仍當接續四小時之休息例。

每日喂食之次數—除第一日外，直至第五星期或第六星期止，每日喂食六次。由第六星期至十月，每日五次。在第十

一月及十二月內，每日四次。

一個或兩個乳房—最好每次用一個乳房喂。蓋乳之分泌量，每羣每次將乳房吸空。

乳過多之時—如嬰孩每次不將乳房吸盡，則乳之分泌量將減少。

乳不足之時—可哺以兩乳房。第二次喂食時，即用上次先用之乳，減短哺乳相隔時間，亦可幫助增加乳之分泌。并注意嬰孩將兩乳吸盡，否則須用法擠出或按摩，或抽乳器種種方法。

哺乳時，嬰孩之位置—嬰孩之頭必睡於母親手腕上。同時即用彼方之乳房哺之。該手即扶抱其背。嬰孩之頭須較乳。

房略低如乳來得急。即抬起孩兒之頭。此乳房之乳頭即朝上矣。

喂水——當乳房之乳充足時。將餘乳擠出。盛於瓶內。每日在哺乳時喂兩次或三次。如已照每日喂食之次數。飲水足敷。若嬰孩拒絕飲水。亦無甚妨礙。

### 嬰兒之安甯

喂食間之安適——如嬰孩僅在哺乳時間以前。稍有不安之狀況。

睡眠——嬰孩終日睡眠為時極多。即於哺乳後亦必安眠。

小便——每小時中常作一二二次小便。

大便——每日常通一至三次。如其量適合。則每日僅通一次。已足。普通大便皆如膠質。色黃金帶酸味。

膳食——初生二十四小時中之大便。係黏質。色微綠而黑。分量——此為重要者。人乳所哺之嬰孩。初五個月。每週平均須增加分量六至八兩。其後七個月。每週增四至六兩已足。

此係平均計算。並不必要。每週定達此數。初生時之分量以平均計算。在五六個月加二倍。一年之末加三倍。

秤孩次數與時間——每週一次。在同日。哺乳前。赤體秤之。並記其重量於表。而以嬰孩普通現象。同時報告醫生。此為保

護嬰孩安甯最良之法。  
影響重量情形。卜大便之次數。小便之總計。過分之啼哭。溫度之變化。及其他種種。

### 嬰孩不安甯之表示

重量——不加重或減少。

睡眠——哺乳後不願就寢。或時醒夜中亦不安眠。

啼哭——喂食時。或試停止哺乳。或試哺之。復試之多次。如嬰孩有煩

惱之狀。延長哺乳與不安靜——多超過二十分鐘。或於哺乳間。有不

愉快——試停止哺乳。或試哺之。復試之多次。如嬰孩有煩

惱之狀。延長哺乳與不安靜——多超過二十分鐘。或於哺乳間。有不

愉快——試停止哺乳。或試哺之。復試之多次。如嬰孩有煩

惱之狀。延長哺乳與不安靜——多超過二十分鐘。或於哺乳間。有不

### 哺乳之困難

小乳頭——在哺乳前。須輕輕將母親之乳頭拽出。嬰孩方能

得到乳。

大乳頭一設過大。應留意勿使嬰孩將乳頭全衝入口。

乳瘡一發炎減退後。經醫生許可。方能以患乳哺嬰孩。乳上繫以堅固之帶或壓乳使出。但其他方法無效時。可用抽乳器抽之。

乳母傷風。嬰孩仍可繼續吸乳。但須以手巾間隔母親及嬰孩之面部。

乳母經期。嬰孩不致受影響。亦無斷乳之必要。

### 母親方面應改良之處

飲食一應矯正。食過膩或乳汁穀類水量不足之食物。

某種食物。母親食之。必影響於乳。能使嬰孩之皮膚呈異象者。如癬癩。發疹。在呼吸方面者。如呼吸不順。氣喘。喉管炎。在胃腑方面者。如腹痛。瀉痢。有幾種食物能起不愉快之反抗力。如雞卵。牛乳。肉。蔬菜。穀類。

衛生一矯正兩膳間不飲水。與每日不散步於新鮮空氣中之惡習。

憂鬱與睡眠一哺乳中時常憂鬱。及安息不足。最有害於乳母及嬰孩。

腸一大便祕結時。可用水。鮮菜。燕麥粉。運動。灌腸藥等。

### 嬰孩方面

如嬰孩吸乳太急。可以常常移開嬰孩。

如哺乳過久。一切記以十五分鐘至二十分鐘為度。

哺乳相隔時間一長。則可免不消化之患。

哺乳相隔時間一短。嬰孩一次僅能吸少量之時最佳。

過大之乳頭一乳頭擠在上齶足以致嘔。

哺乳太多。十二四小時內於每次哺乳之前後秤之。以定其量。汁乳太少。同上。

增加人體乳汁法一。如在第四第五日乳液不足時。可先使嬰孩就胸吸乳。每次以十分至十五分鐘為常。例如是再盡量擠乳入一接受器內。而盛於瓶中。以哺嬰孩。此法於每日規定時間哺乳時行之。直至能出多量之乳液時。則擠法可以廢除。

擠乳一此乃用手為之。在乳頭相距一寸或二寸上之部位用食指與姆指擠乳房。勢向下。用強力驟壓。連行數次。初次失敗不必即行停止。當時為之方能奏效。

### 口通俗育兒譚

秦文安

為什麼巨富的人家往往後嗣艱難。即使生了兒子。百般養

謹。偏偏容易夭折。或是身體羸弱。倒不若貧家的小兒。隨隨便便的長成得容易。其中當然是有一個原因的。崇拜因果的人。以爲有錢的人家。大半是輕出重入。刻薄小民。所以天降之罰。使其絕嗣。這種論調。只能供給念佛娶妻吃素太太們的信仰。決不是醫學上所能承認的。吾嘗考察巨富的人。他所以能成巨富的。不外節衣縮食。看一文錢。好像連城璧。不肯隨便用掉。終日持籌握算。千方百計。多一文好一文。尤其是日夜的提心吊胆。恐怕盜匪們來光顧他。天天過那憂愁恐懼的日子。真所謂心勞形悴。我記得傅青主女科上面說。『婦人懷抱素惡。不能生子。人以爲天心厭之也。惟知是肝氣鬱結乎。夫婦人之有子也。必然心脈流利而滑。脾脈舒徐而和。腎脈旺大而鼓指。始稱喜脈。未有三部脈鬱而能生子者也。』這不是七情和環境造成他不孕的集點麼。把牠廣義的講起來。男子何常不是這樣呢。以致兩鬢如霜。猶虛膝下。于是千方百計。廣置妾媵。或是入廟拈香。求神許願。一旦產了麟兒。便笑逐顏開。一關其手面。送喜蛋。呀。宴湯餅呀。希望人家恭維他。枯樹生稊。丁財兩旺哩。主人翁呢。天天抱了小兒。朝也心肝。晚也寶貝。叮囑僕人們。千萬當心。別吹了風寒。受了驚嚇。好像從前的小姐一樣。不越閨房一步。開口一哭。便百般的安慰他。給糖果他。終是使他笑口常開。未

到隆冬。已經絲綿呀。輕裘呀。多穿起來了。種種的待遇。可算至矣盡矣了。那裏知道天不做美。偏偏容易傷風受驚。尤其容易輕病轉重。由重而天反不若鄉村的苦孩子來得容易。生長講到鄉間人的生活。所謂鑿井而飲。耕田而食。黎明起來幹那耕田的工作。運動他的筋骨。飽受新鮮的空氣。晚上困倦了。倒在床上。便入睡鄉。或是工作完了。買一瓶酒。添一碗菜。償他勞苦的代價。旁人看他很辛苦。可是他精神上無憂無慮。自得其樂。內經所謂「志閒而少欲。心安而不懼。形勞而不倦」。形精俱足。自然身體康強。後嗣也容易了。鄉村的小兒。怎比得富家的受用。每天不過吃碗麥飯。穿的不過是粗布。早上父母工作去了。賸他一個人在冷風內哭著。烈日內曬著。有誰去當心他呢。不知日久成了習慣。就是生理上增加了自然的抵抗力。寒一點。熱一點。都不怕了。

滻諺說得好。財多身偏弱。窮極病魔消。真是一點不差呢。舊如一棵花草。很留心地保護牠。培養牠。天氣冷了。搬進花房裏。太熱了。移放陰涼的所在。養成嬌嫩的枝條。一經狂風烈日。就枯死了。反不若野草。開花烈日曬著。寒風吹著。還是永久的存著。富人家兒子也是嬌養慣了。天然的抵抗力。仍歸于天然的淘汰。無怪其難于長成。講到小兒的哭。在生理學上。認爲是造物給他的一種發育機能。溺愛不明的富人。

恐怕他哭壞了。百般的阻止。拿糖果去引誘他。不知小兒脾胃薄弱。多吃了東西。最易釀成種種危險的脾胃病。所以秦西各國對於小兒飲食的多少。及次數。是有一定的標準的。不是驅他不哭就算了。像吾國的富人的愛護小兒。就是間接的驅入死路。豈不可憐。有的人說。大概富而好施的人容易有子。這不是天的報施麼。誰知富而好施的人。得到一種良心上的安慰。他行種種善事。精神上不其然而然發出無限的快感。大學曰。「心廣體胖」。格言聯璧曰。「作善不求獲報。自然夢穩心安」。不像鄙吝的人。防不勝防。憂不勝憂。度那圈圓式的日子。于是從七情上。應響到生理上。使他後嗣艱難。唉。富人們。你要早抱麟兒。不必求神問卜。只要多行善事。使心理上先得到安慰。消除一切憂愁恐懼的念頭。傅青主曰。「鬱結之氣開鬱結。非喜氣之盈腹。自然孕麌有望矣」。

## 我的育兒經驗

郭堅忍女士

我共生六兒六女。我十八歲三月嫁人。當年懷孕。次年五月分娩一女。我家人依老法。凡兒生兩日。必喂甘草大黃黃連。名三黃湯。天天必喂。至百天為止。說是清胎毒。稀痘的。那知大女生甫八個月。即患癲喘。時鼻孔掀張。狀極危險。醫說。

驚風。用石菖蒲湯無效。乃用家藏北京同仁堂小兒定驚一穎金末和蜜喂下。方愈。至成人出嫁。二十年中必發痰喘。出嫁後。雖生子女。終以體弱多病。二十八歲患紅斑死。

二女生於二月。亦喂三黃湯。彼時我舅解組歸田。舟經洪澤湖。適逢旱天。湖中無水。舟停湖心。二女發熱。出痧疹。家人皆說少吃三黃湯所致。抵常州。即居家不回紹興。常州人育兒夏令必多飲金銀花露。二女天天飲此。至今有胃痛病。嫁後多年竟無生育。

三女生於六月。因天熱多喂三黃湯。金銀花露。週歲患慢瘧。幾死。幸得錢祝恩醫士治愈。而至今多胃痛病。

兒子生於七月。祖父母喜得孫子。友朋進言。令先吃犀黃湯。後吃乳三黃湯。亦不停。大兒至今有胃痛病。兩腿足時生濕瘡。

二兒生於九月。我居樓上。家人說此兒初生。應受土地氣方。好養。用大磚一方。將初生兒臥約一鐘許。兒凜極大啼。至晝盡方沐浴。裹。天正驟冷。次日我不聞兒啼。抱起啓視。兒目緊閉。以指探口。緊不能入。身雖溫軟。心知已病。延醫來視。說口生蟬蠅子。用刀割出無數頭。紅蠟燭之油。兒果啼哭。又喂犀黃。更加西瓜霜。此兒由此多病。至十歲。即患癲喘。廢學。今雖四方游幕。終以喘疾時發。言語不能。飲食不進。或三五

日甚或一月居停多憂其才而畏其疾。不委重任。

三兒生於六月。犀黃三黃湯照用。今三兒亦患喘症。雖任小學校校長。亦以喘發不便辭職。

四兒生於十月。犀黃照喂。三黃湯隔日一喂。四兒身較三兒強壯。無痰喘症。但患胃痛耳。

四女生於六月。我產後血量患病。不能顧及嬰兒。僕婦僅喂

三黃湯。因犀黃價貴。未備斷乳。後女已過歲。好啼哭。家人多說缺乳虧弱。時用生梨梨汁代飲。未一月女患痢疾。錢祝

恩醫士用香附引治愈。今亦患胃病。

當孕五兒時。我舅去世。我獨居揚州。友人荐陳履之先生教

三兒兩女讀書。我因兒女均多病。時舉以問人。知陳君好讀

內經。因問致病之由。如何可使兒身強壯。陳君詢兒生時及

現狀我一一細述。陳君謂嬰兒初生全憑嫩陽。若用峻寒藥

品自然患喘。物冷則凝。熱則散。此理易明。水道不行。肺氣不

舒。則哮喘作。若用甘草少生姜。多煎湯喂之。決無此患。

五兒生於冬十一月。依陳君法。果至今日已二十無痰喘症。

體育極壯。肄業中學。今已畢業矣。六兒生於五月。不食三黃

湯。亦用甘草姜湯。今亦健壯。且較諸兄活潑聰穎。亦入中學

肄業矣。六兒生於五月。不食三黃湯。亦用甘草姜湯。今亦健

壯。且較諸兄活潑聰穎。亦入中學肄業矣。

五女生於冬十一月。未三日即死。

六女生於正月。如五六兩兒之壯。現在揚州女子公學高小科肄業。

統計我生六兒六女。今存六兒四女。僅僅兩兒一女無胃病。此由誤食三黃湯犀黃之害。特今以我生兒女經過現狀。實於家庭姊妹法極易行。慎勿輕忽。如我今日之追悔焉。

## ■ 育兒須知

佩萸

有了家庭。不能沒有兒童。有了兒童。就難免不生疾病。欲使兒童避免疾病。第一要使兒童有強健的身體。強大的抵抗力。才能保持永久的健康。不過兒童發育未足。到底難得到強大的抵抗力。因此。夜弱。失眠。傷風。生齒發熱。夢中驚醒等。都是兒童常遭的困厄。

但是我們很清楚的知道。在兒童的健康上。多多的注意。便可以避免疾病的機會。多做母親的人。如其能夠像醫生一般。規定時間的去檢驗。伊們的兒童。那麼一定可以得到良好的結果。最顯著的效果。就是從同伴那裏傳染而來的疾病。普通不會十分謹慎。十分留心的。現在因檢驗而發見。是可以避免了。

從前我們相信兒童行什麼就要拿什麼。而且認為生病是

不可避免的。現在我們却已知道預防傳染。不但要使他們造成一種天然的抵抗能力。而且要預先避免一種疾病的變擊。即如預防喉癌、猩紅熱、天花等都有良好的血清或種痘等方法來防禦。但是我們不要以為傳染病是可怕的。其他的疾病不妨忽視。這却不然。不論何種疾病都是可怕的。

都有危險性。至於要造成強健的身體強大的抵抗力。靠了左列的幾種方法。

(一)食的時間要正確規定。食物的分量要適當平均。如脂肪質蛋白質澱粉質(炭水化物)流質和各種維他命等。就是礦酸鹽和有綠色素物如蔬菜等。也要搭配些。因為這種食物是身體長成的需要品。(二)養成排泄發達筋肉保養氣力和強健體格的有定時的習慣。(三)每日在新鮮的空氣和日光中住數小時。兒童所穿的衣服。以保持手足和頭髮乾淨為宜。(四)在空氣良好而流通的居室中有充分的睡眠。疾病的時候要定期的檢查。這種檢查包含驗血。詳細的考察。確定沒有血癌。驗小便和大便。探尋容易自生中毒的腹之呼吸。

不論兒童生何種疾病。最早的病兆都是差不多的。這種徵候不外是呼吸器官出毛病。例如打噴嚏。鼻中有分泌物。如鼻涕等。呼吸困難。喉頭腫痛或者有更利害的徵候。例如胸

部的喘氣和咳嗽等。發熱或者也起於這種徵候的。但是有一件事可以放心的。就是從喉頭通到耳朵的管。假使也連累及了。起了一種不規則的發高熱。因此不安靜擾亂睡覺。那麼對於兒童的耳朵却用不着直接去注意。因為年幼不致生痛。

胃腸的徵候。或者也會在任何疾病的開始時發現的。而且很是混亂。因為這種病很容易忽視。而一時又認不清到底是哪一種什麼病。現象很多不易確定。有的是胃納不佳。吃不下東西。有的是嘔吐。有的是下痢。有的是利害的便祕。任何一種現象都足以釀成胃腸病。

有許多做母親的人不明白兒童有病應該安睡的道理。以為病的兒童精神已是很苦。應該教他開開心。不妨弄弄玩具。爬爬地板。甚至他要做什麼就讓他去做。殊不知兒童受疾病的攻擊時。要使他安睡的緣故。大概有三項可說。第一。保存他的活動力和復元的能力。使增加自然而然的恢復心力的機會。第二。阻止因調和室中不同空氣之故而使身體的受寒。以及免除病的兒童的熱病。運動之疲勞。第三。避免疲勞。因為疲勞本身是有害於健康的。

裸。鮮艷的睡衣。玲瓏的小桌。玻璃的瓶子等。等引誘兒童的歡喜。肯安靜地在床過生活。架子放盆鮮花並備些好看而可口的食品。一方面使兒童見了歡喜。一方面使他肯吃以上的話。不過是一種參考。並非說兒童生了病不必請醫生。不過在未請醫生之前。有種幫助。並使兒童保存元氣而能恢復得快些。

## 育兒一得

邵羨岐

兒童猶花木也。兒童之在幼稚時期。猶花木之初苗萌芽也。其在粗俗之種。或略施灌溉而已。足惟其爲新奇珍異之品。則培養之功尤宜殷勤。而已至週歲時之兒童。衣不可過暖。防其鬱熱而傷陰。食不可過飽。防其滯積而傷胃。也此即俗所云。若要小兒安長。帶三分飢與寒者。是吃乳不可使口鼻悶伏。胸膛覺不可。將衣被緊裹頭面。慮其肺氣之呼吸不能流暢也。遇有疾病。言語懶怯。切不可頻頻呼喚。而煩擾其心神。二三歲小兒。食肉宜擇精而忌肥。精肉可養長骨。肥肉易於醞釀痰涎。四五歲小兒。糖果可偶食。不宜常食。以其甜而粘膩。最能呆胃而傷齒也。水果可常食。不宜多吃。常吃可以助消化。多食則寒冷太過。而胃陽受創。滿六歲之小兒。更宜加以正當之教訓。涵育其身心。居恒宜常親愛。誘掖能恢復得快些。

其敬讓之觀念。使之心氣喜悅而和平。不可妄惹之。恫嚇之。放任之。強抑之。致其肝氣鬱而膽氣怯。心氣逆而脾氣惰也。羨岐幼承父訓。壯侍父診。歷經萬千小兒。洞悉兒童致病之淵源。深願於平常時作各家族長年之顧問。保衛于未病。將病之先。則調養易而見功。神苟俟其病至。病深而求醫。則治療亦難而鮮効。經云。制治于未亂。邦于未危。遵斯道也。庶可長保兒童之健康也已。

## 兒童衛生常識談

王彭璋

吾人身體之康健。莫不由善于衛生得來。是故衛生一事。人所需之。即兒童亦然。蓋兒童時代。爲栽植根本。培養萌芽之期。一生幸福。均係于此。苟有不慎。遺來日之少壯者弱時。無窮之害。是以兒童衛生。爲研究衛生學最不可少之要道也。豈可忽之耶。余僅就管見。以歷來研究之兒童衛生貢獻一二。

(一) 宜時令兒童外去吸呼新鮮空氣。  
 去空曠平坦。碧草如茵之地。空氣均屬新鮮。吾人應使兒童吃。於清晨時。偕伴外出。作戶外運動。藉以呼吸焉。其一切不適當之有害運動。爲父母者。宜時時督察而禁止之。他如撲

裸之孩。或三月以上之嬰。可使之臥於四輪籠車中。縱橫推移。以助其運動。車中裝飾佈置。以氣候爲轉移。推行之地。以陽光充足空氣新鮮之途爲最佳。使小嬰身體活動。作自然之呼吸。俾其內部自適發育強固矣。

## (二) 禁止閒人接吻摩撫

小兒天真爛漫。慈笑迎人。見之者莫不喜形於色。相率抱而撫摩之。甚或吻之。以示其愛者。此人之恒情。無一反對者也。殊不知此種鍾愛。足以遺害小兒。蓋人之手與唇也。時或污濁不潔。且有染肺癆。梅毒等傳染病者。往往爲人所不能知。若許之有接近吻唇等情。將有無限危險。故父母爲小兒健康安全計。決不容任何人吻之親之。以免小兒無辜受害也。

## (三) 注意兒童種牛痘

兒童種牛痘。因欲預防天然痘之傳染耳。故小兒生後五周。即可爲之種痘。但小兒身有皮膚病。及身體不適時。則不宜種痘。痘時期。以春秋二季爲最佳。若天花流行時。痘蔓傳此時。雖爲冬爲夏。或旬月未滿之嬰孩。亦宜速爲之種痘。以防傳染。然種痘之前。父母或奶娘。將必爲之更換衣服。衣服之袖口宜大。且須柔軟。便于察看。看兒手指爪。亦宜剪之。以防抓

破痘瘡。果如是。則危險不生。兒童自安全矣。

## (四) 注意啼哭

小兒之啼哭。因受外界之冷氣與光線之刺激。遂有啼聲。亦藉此呼吸耳。故啼哭一事。實爲生理自然之作用。以其能擴張肺部運動。呼吸增速。血行發育身體者也。此種天然啼哭。一切不可強止。但造或啼哭之原因有四。(一) 冷熱饑渴。嚼此乃饑狀。速增其飲料。如係因尿布潮濕致下部不舒。當更換潔淨。他若習慣性哭。乃父母之溺愛所致。久哭不斷。必達到希望。不止爲父母者。不宜曲從其意。更不宜抱弄。恐驕其性耳。不如使之安臥。任以啼哭。俄爾亦可止聲。否則養成

傲強之性。實有害於將來也。

## □ 糾正兒童不衛生之習慣

佩夷

(一) 噛拇指

含着吃着的時候。便要這樣的說。「看這個小寶貝啊。喰他可愛的拇指滋味怪好的吧。寶寶真乖啊。」伊只知道看看有趣。喊着乖巧。却做夢也不會想到這種噏拇指的習慣足以傷害伊嬰孩的健康啊。

噏拇指使牙床（即上下顎）繼續不斷地工作。這種恒久不絕的運動。足以使嬰孩長成一副「長」面孔。很不雅相。而且繼續不絕地摩擦拇指的柔軟的皮膚。足以使新生的牙齒受了推動而成前傾或歪斜。甚至突出等惡相。有這種習慣的嬰孩時常把上嘴唇推到鼻孔上去。以致妨礙嬰孩的呼吸。還有一樣最大的危險。就是小小的拇指却帶進了許多的細菌到嘴裏去。

假使你的嬰孩已經有了擒拇指習慣。趕快阻止他。矯正他嬰孩的嘴。繼續不絕地工作或運動。是不需要的。在嬰孩出牙齒的時候。他拿着咬或擒的東西。樣樣要審慎地檢查過。絕對清潔的纔可給他。否則為害不淺。總之養育你的嬰孩寵愛和衛生。要同時兼顧的。一味的溺愛。任他擒拇指咬東西。那不是愛他。却是害他。

就大多數的情形而論。小孩子討糖果或蜜餞來吃。是很

普通而合乎正則的。但是假使這種喜歡吃糖的慾望是被他物所引起的。或是任性爭多的。那麼就不能說合乎正則。且要進入不自然之境。至於嗜糖而成癖。那是有害身體。有礙健康了。

有許多孩童因為不自然地養育和進食。以致害成這種違則而異常的嗜糖癖。所謂不自然地養育和進食。就是說他們日常所吃的菜餚種類不甚平均。不甚健全。無益於衛生。有害於身體。常吃十分自然的食物而長成的孩童能夠養成一種對於食物常是很合正則地滿意。而對於蜜餞糖果。不致有大而且野的嗜好。若是一個孩童的食品是錯誤地支配而去刺戟食慾的。那麼他便要養成一種樣樣東西都

要的錯誤要求。一切困難由此而生。

卷成這種違則而異常的嗜糖癖還有一個緣故。那就是在孩童的食品中缺少了充分的生蔬菜生水菓。每一個小孩子應該從小就吃這種生東西。差不多要是吃了這些東西而長大起來的。每天一種相當分量的生蔬菜生水菓。應視爲必不可少。「一日不可無此君」的一句話。不妨借來作我們支配食品的座右銘。葱。薑。番茄。甜菜根。胡瓜。水芹菜等。對於嗜糖癖都能產生一種欲解除力。都能幫助長成一個強壯健全而血液清潔的孩童。

我知道有一個小孩子。他的嗜糖癖。是蘋果來治好的。醫生關照他的母親說。家裏要常備而多備生蘋果。無論何時。這個孩子要討糖來吃。就給他一隻生蘋果。教他嚼來吃。不久。嗜糖癖解除了。小孩子的健康也就恢復。體重加多。智慧增進。從前。他是一個身體很軟弱。智慧漸退花。愚笨。純遲。一類的孩子。蘋果清了他的血液。矯正了他的違則。異常之嗜糖癖。使他的長育入於正軌。成爲一個健全的人。

## ■ 小兒斷臍法

王瑞符

臍爲有生之命蒂。開繫至重。豈可聽命無知之穩婆而截斷之耶。顧今之穩婆。截斷兒臍。留梗頗短。復於湯餅會日。投洗兒錢時。剪梗令平。而蓋暖臍膏藥於上。勿促了事。其害深矣。何也。臍短。則風寒易侵。剪平。則水漿易入。一經水漿侵入。臍陰冷之地。則易僵枯。老輩以兒落地有胎毒。必進三黃湯。或如含淚。數月不瘳。竟有成爲臍漏者。致臍短而風寒襲入。不發爲盤腸氣痛。哭泣不眠。即發爲撮口臍風。不能吮乳。便爲驚厥。因而盡命者多矣。醫之識者。於臍風則辛散。內風於盤腸。則辛溫內藏。或加以肉桂。胡椒二味。置於臍中。封以膏藥。若臍中流水急。以赤石脂。硫黃末。填置其中。護以新棉。緊扎勿使風透。均能獲愈。設以小兒爲純陽。不敢投辛溫之劑。或誤認爲胎毒。未有不盡命者。如痛定思痛。求斷其原則。莫如

兒離腹時。翦臍留長其帶。盤曲緊扎。封以牛屎灰。蓋以新棉。勿使風透。水侵爲善。竊其自落兒之先天強者。一星期可墮。先天弱者。亦不過三星期。未有不落者。舍是猶有至善之法。臍帶不用翦刀。用麻油紙燃燒令斷。然後盤曲灰封。如前法。因可終身無腹痛之苦。且可延其高大之壽。爲父母者。幸勿忽之。

## ■ 小兒落地進三黃及犀黃之錯誤

呂鞠屏

小兒係稚陽之體。譬諸花木。置之溫暖之地。則易發生。置之陰冷之地。則易僵枯。老輩以兒落地有胎毒。必進三黃湯。或犀黃。以爲可解胎毒。孰知胃病。即從此而起。譬如大人落水。救起時。則灌以薑湯。得溫暖之性。則寒可解。小兒在胞胎內。溫暖已極。及落地。業覺冷不可支。手足無措。故啼哭。斯時急宜略爲揩抹。用溫暖之物。包之。喂以薑湯。以溫其寒。乃不喂薑湯。反喂以苦寒之三黃。寒與寒搏。則吐乳。吐久。則脾陽不生。即成慢脾驚矣。福幼編用桂附炮薑。辛溫之品。云百中可救其五。此理甚明顯也。至以小兒胎糞不下。亦不可用大黃攻之。俟其新乳入肚。則黑糞自下。此新稚陳穀之理。古書無驚風之說。小兒發熱。傷寒居多。急驚是溫暖太過。如大人

發癥氣。故痧藥能治。俗云若要小兒安。常帶三分飢與寒。是在爲父母者。善爲調護耳。

余少不知醫。初生之女即患慢脾。後吾友吾岳示余以福幼編之方。始悟此理。自後余之子女均戒用三黃。而口胃甚強。食亦不擇精粗。此明效也。如慮小兒有胎毒。不妨以銀花甘草常喂之。最爲安當。漁俗兒初生。無論貧富必買犀黃喂之。須知誤事不淺也。

再蘇松習慣。小兒如發熱。必用雙鈎藤以療之。不解何意。按鈎藤有風治風。無風引風。此言內風也。並非風寒之風。吾見服此者。每多角弓反張。即用燐風法亦無效。若竹茹猶可溫通以挽救之。然此二味。宜從以用之。殺人不少矣。余另有稿證。非虛語也。言諱語。藐其如不信。何作俑者。其無後乎。

## ■ 嬰兒雍髮不合衛生

沈仲圭

嘗考人身被毛髮之處有六。而各異其名稱。亦各有其作用。非徒事美觀也。一曰髮。所以護腦也。二曰眉。三曰睫。均所以防護眼球也。四曰鼻毛。所以防飛虫塵埃之侵入。五曰陰毛。六曰腋毛。皆防摩揩而傷肌膚也。故護之以毛。此人體六毛功用之略。而全身之毛不與焉。

夫髮既爲護腦之物。則宜存留之也。甚明。若剃之務淨。如牛

山之濯濯。不特有損儀表。亦非衛生之道。用是吾人於髮雖有種種式樣。而略有些須以資護腦。則一也。

成人之腦。尚知蓄髮以護之。則對於腦髓未充。腦蓋骨未長。合之嬰兒。自應加意愛護。方無悖於攝生。今乃不然。生甫彌月。遽行薙去。幾以柔夷之頭。如漆之髮。爲世俗之犧牲品。寧非大謬不經之事耶。

越醫裘吉生。余之忘年友也。客被女孫彌月。雖亦治延宴客。未能免俗。而薙髮之舉。毅然革除。迄今時隔期月。女孫之髮並不甚長。且呈螺旋狀。美麗可愛。吾願世之爲父母者。僉以義君爲法。以節金錢而重衛生也。

## ■ 小兒臥具之衛生

陳景麟

小兒之被褥。宜柔軟輕韌。一律白色。大小厚薄須適當。亦須備單夾。總三種。宜常晒於日中。並宜時常洗滌。如有便污沾汗。尤宜立刻洗淨。

小兒之枕。宜低。(適於小兒之年齡)。宜軟。過高不免壓咽頭骨。而礙呼吸過硬。(中實稻草。蠶沙皆不宜)。則妨礙頭骨與頸骨。至於曝曬洗滌。與被褥同。

小兒之寢衣。每晨換後。宜置於空氣流通處。尿布之類。宜淡色。或白色。而易吸收水分者。多備數方。晚間就寢。先溫之。而

填於股臂之處。倘非寒時可不溫。但必須清潔。天寒時。小兒被窩中。宜置湯婆數個(隨溫度增減)。器外宜套以如器大小之布套(絨布最佳)。或以布包之。亦可。病牀尤宜。注意清潔。如患皮膚病者。必須另用消毒白布。攤於被褥上。以免沾汙。患熱性病之被褥。不可過熱。

小兒臥具。不宜放置於潮濕黑暗。或當風之處。

## ■ 小兒沐浴

陳景岐

皮膚能排洩血中廢料與毒質。苟不沐浴。則由體內排出之不潔物。必凝滯而釀成諸害。故入浴宜勤。以保小兒之康健。小兒生後。即宜日日沐浴。惟臍帶未落以前。臍部勿可入水。若產於醫院者。當有看護為之洗濯。若在家庭。則沐浴一事。不可不講求也。兒初生。身體上恒有胎脂。可用橄欖油塗而擦之。如家庭未備此油。用菜油擦而洗之亦可。

每次洗浴。必須洗頭面洗時。注意污水流入眼內。洗畢。揩燥。然後將兒放入盆內。洗其全身。洗後。用軟絨毛巾揩擦。令乾。再用撲粉。移之使燥。凡腋下。股間。頸項。脰縫。指趾等處。均須注意。

沐浴之前。須先預備小兒更換之衣服。尿布。大毛巾。小毛巾。肥皂(最好用硼酸肥皂)。撲粉。驗水溫度表。盛水器。盛布

盆。浴盆等。均備妥。然後傾水入盆。而洗之。為小兒沐浴者。須穿白色潔淨身裙。以免穢物沾及小兒身體。水之溫度。初生數星期內。須有法倫表一百度。五六星期後。可減至九十八度。六月後。可減至九十五度。二歲後。可減至八十五度。或九十度。

寒天之浴兒房。須備火爐。門窗嚴閉。衣服用熱水煖暖之而穿。

沐浴之時間。不可過久。以五分鐘為度。至八分鐘。不可過十分鐘。

沐浴之時間。於晨為最佳。乳後半小時以內。及臨寢之先。俱不可洗。

## ■ 嬰孩的沐浴及其他

綠娜譯

充足的新鮮空氣和多量的陽光。應當讓它跑進嬰孩的房間裏來。在太陽或是光線射到的地方。要把嬰孩的眼睛遮護好。就是孔隙裏來的風。也要加以警戒。溫暖窒息的空氣不僅會損傷他的元氣。且有增加傷風的危險。

嬰孩應當單獨睡覺。不是睡在搖籃裏。最好睡在有欄杆的小牀上。

蒼蠅。蚊子。蟑螂。臭蟲。貓狗。鼠。都是疾病的搬運者。

要保護嬰孩離開他們。

不要和嬰孩接觸得太多。即使要抱他，最好要抵住他的頭部和背部。

再沒有比仔細記錄嬰孩的重量。那麼使我們知道他的健康狀態了。有規則地每星期把嬰孩磅一次。嬰孩每星期應當增加四盎斯至八盎斯的體重。

嬰孩洗澡的房間應當溫暖一些。溫度不要在華氏七十五度以下。

在最初的幾星期。浴水的溫度該在華氏百度。漸減至華氏九十八度。六個月之後華氏九十七度。自此減低到華氏九十度。一個洗澡用的溫度表是少不了要用的。

嬰孩每天至少應當沐浴一次。在熱天得有兩次或者三次。用蓄水海綿代他洗浴。在替他洗浴之前要周到地把自己的手洗乾淨。

嬰孩應該有他自己的浴盆。赤裸把頭部和面部的修飾完好之後。再替嬰孩完全穿好衣服。

皮膚的摺曲部分頸項間緊握着的拳頭等處必須加以特別注意。

爽身粉不是用來收乾的。先要把嬰孩全身擦乾。然後再撲爽身粉。不要撲得過分。以避免結塊。

耳朵裏塗一些稀薄的硼酸膏。

嬰孩的衣服應該寬鬆些。而且要用不是緊密的織料。以便皮膚與新鮮空氣接觸。

嬰孩的穿應照着天氣的寒暖而增減。

衣服潮濕了便該立刻更換。同時不要忘記把皮膚揩乾。以及撲些爽身粉。

## 口 乳與嬰兒

程其恒

哺乳無定時。爲普通習慣。有時飽量則太飽。有時不及則飢餓。消化器失去調節。嬰兒衰弱及不眠等病因之發生。故哺乳不論所哺爲人乳或代乳品。宜有相當規定時間。產後一二日內乳汁稀少。嬰兒每日吮四五回。三日後乳汁潮湧。即應有時間規定。通常產後六週。每隔一小時哺乳一次。每日自早晨六時開始至晚十時爲止。共哺八次爲最相宜。晚間十時以後至翌晨五時之間。不宜授乳。嬰兒經此規定訓練。現市上出售之代乳品種類甚雜。宜仔細選擇。否則影響嬰兒營業上不小。牛奶亦不適用於代奶品。因其味過淡。其汁過濃。不合嬰兒口味。且當暑天。細菌容易滋生。頗爲危險。

故在育嬰實驗上人造代奶品遂應而生。近來市上流行之勤吐精惠民奶粉其主要成分仍爲牛奶。但一經調製遂爲極佳之滋養品。然較人乳終稍遜色。大概嬰兒最好至四五月後。胃力稍強。哺以代乳品爲相宜。而尤其應注意。乳頭之清潔。隨時察看有無雜物在內。倘有存留。即用洗瓶刷除去。可免嬰兒口痛及發生腸胃病等症。

至于斷乳之步驟。通常過一週歲又五六月。可以完全斷乳。斷乳最良之支配。可分爲二時期。第一時期。斷人奶。第二時期。斷代奶品。大概母乳漸漸減少時。可用代奶品以調節。之一方面。人奶量減。一方面。代乳量增。此爲最良之斷乳步驟。又斷乳不可於夏季行之。而嬰孩身體不適時。亦不宜斷乳。

## ■ 哺乳問題

楊素珍

哺乳之適當時。間。哺乳無定時。爲普通習慣。有時過量。則太飽。有時不及。則飢餓。稍化器失去期。節。嬰兒衰弱。及不眠。等病因之發生。故哺乳不論。所哺爲人乳或代乳品。宜有相當規定時間。產後一二日內。乳汁稀少。嬰兒每日吮四五回。三日後。乳汁漸湧。即應有時間規定。通常產後六週。每隔一小時。哺乳一次。每日自早晨六時開始。至晚十時爲止。共哺乳八次。爲最相宜。晚間十時以後。至翌晨五時之間。不宜授乳。嬰

兒經此規定訓練後。每以晝夜。脣神筋消化器均得充分的休養。

代乳品之使用。牛乳之不適用於代乳品。其因甚多。其味過淡。其汁過濃。不合嬰兒口味。且當暑天細菌容易滋生。頗爲危險。故在育嬰實驗上。人造代乳品遂應運而生。近來市上流行之勤吐精惠民奶粉。其主要成分仍爲牛奶。但一經調製。遂爲極佳之滋養品。然較人乳終稍遜色。大概嬰兒最好至四五月後。胃力稍強。哺以代乳品爲相宜。預備代乳品。應置下列各物。小鉛鍋。玻璃杯。小匙瓢。小煤油爐。乳瓶。乳頭。洗瓶刷。蘇打水及硼酸溶液。將上列各物置於一處。用白布或紗罩蓋。然後依照代乳品。仿單所指定。和以適量之水。如熱至一定溫度。如嬰兒病時。水分加多。以不妨消化爲度。又代乳品預備一次。而有餘剩。不可溫熱之以待第二回之用。哺乳瓶外。刻度數分量者爲佳。用畢。即宜洗淨。乳頭之清潔。不可忽略。每晨將乳頭置硼酸液中。沸煮數分鐘。每次用後。必須拭乾。更當注意之一點。乳頭應隨時察看。有無雜物在內。倘有存留。即用洗瓶刷除去。可免嬰兒口痛及排泄物稀薄等症也。

斷乳之步驟。通常過一週歲又五六月。可以完全斷乳。斷乳最良之支配。可分爲二時期。第一時期。斷人乳。第二時期。斷

代乳品。大概乳母覺乳汁漸漸減少時。可用代乳品以調節之。一方面人乳量減。一方面代乳量增。此為最良之斷乳步驟。每見人家一旦乳傭停職。他去乳源遂絕。代乳品非嬰兒素嗜。號哭不食。疾病隨之。所以嬰兒於產後四五月最好。每日間以代乳品哺之。使能吮乳瓶。並慣於代乳品。以為斷乳之標準。又斷乳不可於夏季行之。嬰兒身體不適時。亦不可斷乳。

## ■ 小兒哺乳應注意之幾點

鍾廷杏

一、築養物之最適當者為乳汁。其中最優者首推母乳。若母乳缺乏。或因授乳障礙。或有發生結核梅毒。以及急性染傳病。產褥熱與其他授乳。而陷于築養障礙等時。則顧用乳媼。而有特別情形不能顧用乳媼者。則用牛乳。

二、乳媼之選擇。(一)須健康而無梅毒。結核。皮膚病。矽眼。腳氣。傳染病者。(二)須在二十歲至三十歲。及經產婦。或分娩後四五個月者為佳。(三)乳汁分泌須佳良者。而乳汁分泌佳良與否。可檢查乳媼自己的兒子築養狀態。或乳房之觸診。亦可判定。

三、授乳法則。生後二十四小時可勿給乳。因此時產婦可

使其恢復分娩之疲勞。若小兒啼哭。可給與少量之淡糖水。用乳媼者不在此例。

四、哺乳時間。因乳汁分泌佳良與否。及吸啜力之強弱而定。大約十分鐘至廿分鐘。若乳汁豐富者。則二三分鐘足矣。

五、授乳回數。我國人對於授乳回數多不講究。往往小兒啼哭即授乳。致養成種種之惡習。而引起小兒之消化障礙。於一定時間授乳。不但小兒收良好之築養。則乳母亦減少許多之麻煩。而授乳回數。大約一日夜間五回至六回。其哺乳時間隔日間為三小時。夜間為六小時。若夜間不授乳。尤為宜。若服牛乳者。則每四小時一回。夜半不授乳。一日共五回。

## ■ 小兒斷乳

陳中肯

哺乳兒已經長成。莫如早期斷乳。如已屆離乳期而仍哺以母乳。不與以其他營養物。則該兒全身皮色漸呈蒼白。體較黃瘦。體重之增加。亦漸次減低。皮膚緊張度次第弛緩。是時始覺兒體之不適。惟究由何因而致此。多未之知也。如在斯時。能漸漸與以其他食物。則上述諸症狀即完全消失。

母乳固為乳兒營養品中之最佳者。然亦當應時期而用之。其在離乳哺之兒，則對于其他營養物之加入於身體發育上極關緊要。離乳期間按照各國情形各有不同。外國之小兒，則滿七個月乃至十個月間即行離乳。然有時對於乳兒之健康狀態發育程度及離乳時之季節等種種關係不能不略有差異。若離乳時在六、七、八、九、十月時，則以該時最易犯腸胃病。故離乳期似不得不稍為延長。然吾國人則以週歲為度，自無不可。間有因過度溺愛，任其吸啜至數年者，則每致面白而無血色，體肥少精力，實非愛之適以害之也。切宜戒之。

離乳之際，不可驟然離母乳而即予以與大人同樣食物。宜先注意乳兒狀態。最先一日中給與牛乳或米湯一回與母乳混食。經過數日後，乃檢查其便及全身營養狀態。如無其他變化時，則牛乳或米湯之量與回數次第增加。生後一週歲以上之小兒，則予以粥半熟卵黃。其後漸給以米飯。如在一歲半以上，則給以少許脂肪或魚肉亦無不可。

人工營兒較天然營養兒離乳尤宜早期為要。

## 授乳與斷乳

陳聞達

在小兒科範圍內最困難的一個問題，就是初產婦自己不

能授乳。其不能授乳的最大原因，就是因了嬰兒吮乳時，頭疼痛，遂停止而致自己不能授乳。以後遂起很大的困難。產婦自己授乳，不但是能夠使產後子宮容易復元，並且要兒在生後一年內所得到的利益並幸福，較任何為大。欲防止這一項的不幸，須在懷孕期內第七個月以後，用火酒常常揩擦乳頭，使皮膚堅韌，將來不致因吮吸而破裂。其次要兒於斷乳時，往往起沉重之胃腸病。這是因了

一、斷乳期不知避免夏季。

二、預先不作斷乳之預備。

夏季天氣炎熱，食物容易腐敗，非有特殊原因，萬不可改變嬰兒之食物。所以在夏季斷乳，當然是不好。嬰兒到六個月以後，出了門牙，就可以將米糕、餅干、粥、羹湯等容易消化的食物，每天漸漸喂一二次，使消化能力除了乳汁以外，對於其他食物，亦有習慣。到一歲時，斷乳就不困難了。

除了夏令衝突及其他特別原因，斷乳的時期，以一歲至多至一歲半為最好。哺乳時期太久，也是一件不好的事情。

## 小兒斷乳及營養法

蔣保唐

偶於親友中談及小兒斷乳問題，彼輩輒蹙額相告。

曰。小兒斷乳後一二年之間。常或百病滋生。尤以肚瀉寒熱不時襲臨。致爲父母者精神上遭受無限之痛苦。云云。關於上列談話十九如是。幾乎衆口一辭。推其原因。實緣斷乳未得其法。致貽病根耳。查我國斷乳墨守成法。往住說斷遂斷。未能循序而進。影響所及。誠匪淺也。爰就小兒斷乳及營養方法。撮述一二。聊供採納。

### (一) 斷乳

斷乳之開始。約在七至九個月之間。遲至一年爲止。方爲適宜。斷乳期若適在盛夏。最好延在秋季。若能待乳兒身體之健全。更爲妥當。斷乳應逐步而行。由開始斷乳以至終止。須三週以上。

### (二) 斷乳實施法

斷乳之初。應先行混合營養法。逐漸給與副食物。以少纖維而含有豐富鐵量者。如菠菜等菜類爲宜。例如在未斷乳之前。每日須飲母乳五次。則在斷乳時。即可廢除母乳一次。改用 $\frac{1}{3}$ 之牛乳或粥湯以代之。(或牛乳二份粥湯一份或三與一之比。稀釋後用之)。乳兒之健康狀態及糞便。應宜注意。倘無何等變化。則人工營養一日舉行二次。蓋更無異。

常狀態。則一日施三次。如此二三週後。母乳即可完全廢絕。此後祇須給與牛乳粥湯菜類等已足。但離乳期間。乳兒之糞便性狀體重之增減。與否。體溫之有無變化等。等均須隨時注意。

斷乳期間。一日中應給與之牛乳。不得超過一立脫兒即一公升。有時同乳兒胃腸薄弱。對於人工營養之牛乳。有因過敏作用而起特異之消化不良症(如吐瀉發熱等)。該項過敏性。謂之牛乳特異質。此時之營養品。應改以粥湯爲主。

在此時期。加以菜類等爲副食物。如菠菜。馬鈴薯。胡蘿蔔。捲心菜。碗豆青。碗豆。但須新鮮。而纖維質少者。爲要用時。應先煮熟(稍加開水)後搗碎。如漿狀。初食時。約一茶匙爲限。漸次增加其量。並應注意其糞便。例如乳兒因食菜類後。則其大便帶菜類之色。食菠菜後。帶綠色。食胡蘿蔔後。帶赤色。此外副食物。則爲魚肉汁。雞肉汁。麵百合粉。卵黃等。果實汁。爲蘋果。橘子。雷樣梨等。壓搾後。取其汁。加少量之水。亦可使飲。或加小量之一千倍之糖精水。附有甘味。最爲適宜。此外。如餅干。麵包及豆類之混合煎餅。亦可稍與食之。並無妨礙。

### (三) 斷乳後之營養法

離乳後之幼兒。雖能使食各種各樣食品。但仍以牛乳爲主。

牛乳對於小兒之營養品。最為適當。但斷乳後。應限制其一日之量。不得超過一立脫兒。(1000 cc.) 哺乳後之營養法。在第二年之幼兒。其營養法。應與乳兒同樣注意。一日五次之食餌。主要營養品為牛乳。此外纖維少之蔬菜。肉羹。汁。粥。湯。薄粥等。亦不可缺少。有時可給與餅干。蛋糕等。應注意食物時間之正確。為不可疏忽者。第三年之小兒。一日三至四回。食餌物。方可略似大人同様之食品。不消化物。富纖維之蔬菜。脂肪多之肉類等。應避之。牛乳與鷄卵。時須給與。以補其必須量之不足。飲後可酌食水果。如香蕉。梨。橘等。須視季節而異。但不宜過量。有酸味或不熟之果品。則宜避忌。

普通之小兒。如酒類。咖啡。紅茶。醋。芥子。胡椒等。等之刺激性或辛辣之嗜好品。均不得令其嘗試。

國家之強弱。本乎國民。國民之健康。基乎幼年。而其最要者尤以在生產後。即哺乳期。時營養法之不良。實為吾國惡習之一。富貴之家庭。則嬰兒均雇用乳母。此于生理上實甚合法。且由此而讓種種危害之侵襲。茲將嬰兒之營養法略述其概要。

## ■ 嬰兒之營養法

彬子

- 一、嬰兒初生後。必哺以母乳。舊習有開乳飲三黃湯等。理不謬。乃使嬰兒腹中所有嚥下之胎糞胞水等物瀉出。其實則多此一番手續。因生母之初乳中。含有充分脂肪質而夜間于十時後至晨六時為間歇。以養成其安臥之習慣。及利瀉。故免去各種舊習。直接哺以母乳。乃天然之作用也。
- 二、嬰兒哺乳之時間。須有一定。無論為每日五次或六次。準時之飲食。一則可確知其消化。二則無碍生母之作用。
- 三、哺嬰兒時。以生母之乳為最佳。因乳中含有各種脂肪質及抗毒質。如其母嘗患天花者。或多次種痘。或嘗患他種傳染病者。則乳中亦含有一種抗毒質至嬰兒體中。因之可少發見或較輕。此等症候並一切體質性情。哺乳者大有關係。故切不可雇用無識之村婦。使嬰兒習成下流之品性。若以特別原因不得不雇乳母時。則必選擇其品性優良。行為和善且無疾病者始可。
- 四、若生母患徵毒者。則嬰兒必須自哺。因一則可治療生母於乳中亦分泌抗毒素。施于嬰兒體中。再則若雇乳母。則易將先天性梅毒。嬰兒之梅毒傳至該無疾之乳母。故切忌之。
- 五、患肺癆病之生母。則不可自己哺乳。必須以乳媼代之。恐其傳染肺癆。並最好遠離父母。或可得一健全之嬰兒。

- 六。嬰兒之哺乳。以母乳爲第一次。則爲乳母。再次則爲牛  
羊乳。次爲 Lactogen Nireubeg Food 等。  
七。嬰兒哺乳之時期。各說不一。執中之論。多以十個月爲  
限。惟哺乳至六月時。須雜以菜食。漸次肉食而戒乳。  
八。選擇乳母。亦爲嬰兒管養之要事。

## 牛乳與小兒之胃腸病 方行奇

無論何種食物。總以十分清潔爲要。不可絲毫忽略。小兒疾病。多由飲食不良所致。而一般洋化之家庭中。好以牛乳飲小兒。不知牛乳一物。最不清潔。如尋常出賣之牛乳。若取一滴用顯微鏡觀之。則內有無數之微生物。小兒食之。即發生腸胃之病。至於喂食。亦宜有度。苟不留意於此。則小兒之胃腸病。必爲所傷。喂之太急。則有腹痛之患。不可不三注意之。

沈仲理

## 小兒與脾胃

古稱小兒純陽之體。謂其未曾破身之意耳。實非盛陽之謂。小兒稚陽未充。稚陰未長者也。育後七八月。生乳牙。待至七八歲。換食牙。腎氣稍長。蓋由於陽生陰長之理。雖云純陽。非盛陽之謂。然初生之兒。稟屬陽以護陰。始得賴以生存。此乃人始發生之生氣。是亦純陽之正解也。而陽氣生長之來源。

則出自後天脾胃。內經云。脾胃者倉廩之官。五味出焉。脾主運化。胃司受納。通主水穀。五味入胃。由脾布散。胃氣行於脈中。精血變生肌肉。包裹骨骼。始得完全。人生先天之基。雖有不固。而後天元盛者。卒能保其生活也。不觀乎生下小兒。患骨痿病者。苟得延命。而膚肉糜爛不全者。總難得生。此一明證。但是說尚非緊要。其尤要者。爲小兒既生長之後。骨肉已全。又難免生理之變。飲食之飢飽。六淫之侵襲。而一生盛衰之基。全在幼年時期矣。倘能保其康健者。全在飲食之調節。藥餌之救濟。以保護其脾胃耳。至調節及救濟責任。又全仗父母看護。遇到一啼一哭。在在防其疾病。苟偶爾有病。必期望其速痊。聖人云。父母愛子之心。無所不至也。惟其愛子之心。過切。往往偏於溺愛之中。自襁褓至於成人。更不能保持其無病。倘病愈之後。一或失調。勢必體之強者。因之而虛體之心。過切。往往偏於溺愛之中。自襁褓至於成人。更不能保持其無病。倘病愈之後。一或失調。勢必體之強者。因之而虛體之虛者。因之更弱。故小兒之病。輒見便泄。一症爲多。蓋因後天脾胃受盡戕害。以致消納失常。得食難化。便泄更甚。凡遇喜食而不應食之品。啼哭索之。在父母以過分溺愛之心。不顧受害。而與之。則剋伐脾胃。日甚一日。雖受害情形一時未必流露於外。而內宮已亂。受傷非細。及至發張於外。其病已不可救藥矣。故父母看護小兒之病。已覺難事。而當心小兒便泄。難上加難。醫家雖用藥得宜。並諄諄叮囑飲食謹慎。一

轉瞬間已盡忘之矣。甚至小兒因泄日久。身體虛廢。誤以品投治。適足以養成童勞之症。慎之慎之。

## ■ 小兒筋骨之衛生

張仁航

小兒之骨多動物質。少鍛物質。柔軟而易彎曲。故對於其自能動作。至於成童無論行坐立。一切不良之姿勢。皆須注意而矯正之。(如坐必正立必直之類)

小兒臥枕太高。往往使脊骨曲駛。未能起立或行走。而強扶立。腳骨亦每不直。學校課堂之桌椅太高。不適於幼兒之身材。足不履地。或坐而俯伏。皆足致脊柱彎曲及腿骨彎曲等疾。有父母師長之責者。不可不細細注意之。昔日之爲父母師長者。小兒達入學之年齡。即令其讀不易讀之書。寫不易寫之字。勿計小兒心身之困苦。殊不知小兒當七八歲時。理解與細微筋。均未十分發達。強使爲之。不但毫無裨益。抑且損害其身體。現在不明生理與教育之父師。猶有行之者。嗟彼小子。遭此奇瘡。甯不可憐。

## ■ 小兒皮膚之衛生

陳先方

小兒之皮膚。於生後三日。剝脫上皮而代以真皮。自是皮膚有抵抗之力。夫皮膚之功能繁衆。如發汗以散體溫。而調

節體溫。及退止體溫之放散。並排洩水與乳酸而攝取養氣。與分泌皮脂以為潤澤。並爲其他器官之防禦等觀。此則關係於吾人之身體。至重且要。而衛生之道。固不可忽之。

論皮膚之衛生。要惟沐浴與鍛練二者。沐浴後另述鍛練。如游泳冷水浴等是也。特行體操。泳游冷水浴等之鍛練。必須合於正當之方法。與身體否。則轉足爲害。無知之倫。每戒兒童勿操體操。蓋見不合格之體操。貽害兒童。遂蔑視合格之體操而禁止之。此又因噎而廢食者也。

衣服不多著。亦能增進皮膚之堅固。而益抵抗力。兒童之時。即宜少著。以養成習慣。世俗不明此理。惟恐因風致疾。格外多著。詎不知衣服愈多著。皮膚愈脆弱。衣服過多。熱而發汗。後受寒。而成感冒。即其例也。

## ■ 小兒衣服與睡眠

黃淳安

俗云。若要小兒安。常帶三分飢與寒。此說雖是要知小兒腸胃。脛薄。飢飽寒暑。皆不能耐。全賴調養得宜。若帶飢。則多啼哭。帶寒。則多感。冒。誠不宜也。蓋要得小兒安。須常調飢與寒。大約調養之法。只要先飢與食。不可過飽。先寒與衣。不可太暖。小兒始生。飢廣未實。宜單衣。不宜暖衣。宜舊絮。不宜新絮。童衣不宜裘。凡養兒寒。則加衣。熱。則除綿。過寒。則氣滯而

血凝。過熱則汗出而腠理泄。小兒之衣服宜應其身體之溫度而增減之。過薄則易罹感冒。過厚則皮膚弱。衣服宜清潔。忌潮濕。系微菌隱伏於內。

小兒初生宜多睡。勿強與乳。自然長而少病。安眠為小兒必要之事。故當小兒睡眠時。周圍宜靜寂。勿使驚覺。致擾亂其神經作用。若屢於小兒睡眠及半而驚起之。必致損其身體之健康。初生兒於哺乳之外。大抵為睡眠時間。睡眠初醒時。宜勿哺乳。

## ■ 小兒行坐之注意

歧

小兒達相當之年齡。能坐。能匍匐。能行。育保者。祇須作適當之注意。勿必強為扶持。如已能行走。而強為攜之。轉養成其依賴性。扶持小兒。宜入兩手於小兒之左右腋下。而挽之。最佳在平地之扶持。即不然為害尚鮮。如升階級。則必如此方為穩妥。但無論何時。單持小兒之腕。或手。或持之過高。或過急者。皆不免有脫臼。或脊柱彎曲之虞。屏弱兒至二歲以上。尚不能停立。或停立久長。宜設法誘之。如先教以憑物。而停立。次教以緣物。而行。行走如是數月之久。大率有效。惟初時停立。或彳亍之時。則宜自十分至二刻鐘。不可過久。

小兒初生宜多睡。勿強與乳。自然長而少病。安眠為小兒必要之事。故當小兒睡眠時。周圍宜靜寂。勿使驚覺。致擾亂其神經作用。若屢於小兒睡眠及半而驚起之。必致損其身體之健康。初生兒於哺乳之外。大抵為睡眠時間。睡眠初醒時。宜勿哺乳。

小兒至一歲半後。已能步行。天氣晴和。地面乾燥之際。不妨引之室外。隨意走。但亦不可過久。凡有風。或陽光。或空氣。不潔。或地面潮濕者。皆不宜坐。小兒自往坐者。亦須戒止。

## ■ 育兒格言

黃登樞

養兒子。吃熟莫吃冷。吃熱莫吃硬。吃少莫吃多。(幼科良方)  
同小兒睡。切忌乳母鼻風吹兒額門成風疾。(同前)

兒號(即兒歌)(諺語)

若要小兒安。常帶三分饑與寒。(同前)

嬰兒常病。傷於飽也。(文論)

童子不衣裘裳(禮記)

小兒陽氣偏隆。最多火病。藉呼號以之。不為無益。(斐兆期)  
以肥甘授兒女。而不思傷其身。(呂新吾)

瓜桃生冷。宜少食。免致秋來成瘡痏。(衛生歌)  
每於兒童時代。養成細嚼緩嚥之習慣。(仲圭)

## 急 救

## ■ 實驗急救方

臭虫（即床第間善咬人之臭虫）其味極臭。據西學家言。含有阿摩尼亞質。善解百虫毒。又云可治蛇毒。以余所驗。可治蜂蠍咬及各毒虫之咬傷。無論何傷。以臭虫血塗之。無不立愈。

壁虎

一名守宮。俗名賜虎形如田中之馬蛇。善治瘰疬潰瘍。前經餘姚明善堂刊傳。又經黃楚九刊載於丹方集。異余

依法試用極驗。

附用法。收壁虎活捉。剝去皮。揩去頭尾足。剔去腸雜。切碎。如丸藥生吞。每日食一二條。十日後極重者無不愈。惟現捉現食。如過宿過半日。則有毒。因此物飢則自食其尾故也。切記切記。

蘋苺炭。（北地之蘋。即南方之苦麻。生於水中。其皮製出

可製繩或製衣。收其根莖。焙透成炭。研末。香油調塗。瘻癰

之潰爛。收口甚速。

猾皮。焙炭存性。以香油調塗。燻各瘡。久不收口者。無論

上部下部。收口甚速。鼠皮炭次之。飛鳥皮連毛焙炭。雞皮連

毛焙炭。均不收口。聖藥單用即可。勿須加藥。因此數物皆有

收縮性也。

人指甲。（須用重指甲）焙黃研末。加冰片少許。吹治咽喉

移善效。無論何種痛瘡。是否潰爛。均效。

沙裏狗。（即沙灘內小虫。形如蜘蛛。大腹黑色。腹內有黃汁者。焙研末。加冰片少許。吹治白口瘡。極效。亦產）削去外皮。俟取汁出。擦拭鵝掌瘻。各種硬皮癬。白屑

癩等病。拭數次即愈。

## 治癩狗毒

癩犬之毒。甚於蛇蠍。但經一撲。雖未沾身沾衣。亦皆有毒。

咬傷痕且易收口。蘊毒於中。內攻爲患。是方屢試屢驗。萬無一失。妙在可試驗。其有無受毒。但須俟咬後五日服藥方見。

若咬後即服藥。毒尚未入內。雖服藥亦不見也。惟藥係以毒攻毒。性近攻耗。病後須有培補。方不碍體。百日內忌食蟹餽鴨韭菜。以及甘甜之味。並忌聞鑼鼓喧鬧之聲。切要切要。

試驗方。木通三錢。車前三錢。淡竹三錢。滑石三錢。樟腦七

分。山楂一錢。斑貓大七頭。（去翅足。同粳米炒至米黃存性。用）

服試驗方。倘有腹痛。大小便急而不通。知內無受毒。須預浸。急服下列解毒方二劑。其毒自從大小便而解。

解毒方。木通三錢。車前三錢。淡竹三錢。斑貓七頭。（製法

同前)樟腦五分。山楂一錢。白紹半粒。大黃二錢。朴硝一錢。麥芽一錢。真射香一分。滑石三錢。若日久。腹內毒蟲業已成形。不服藥。將坐而待斃。服後。列之藥或尚有生機。須將後方煎。好俟病人煩擾舞動定後。相後毒蟲在內。以口承杯。時服之。冀藥為蟲受。或可挽回於萬一焉。馬前子一粒。入言二分。蠶蜞菊一錢。馬鞭草一錢。(接)此方大毒。當慎之。

### 口癲狗咬傷療法

樂善居士

癲狗噬人。自古無善治法。世所傳出虎符及加味人參敗毒散。為最妙。然毒輕者或有效。毒重者不足恃也。此外單方不可勝計。而禁忌者甚多。如百日内不可聞金聲。一年内不得食肉之類。守之甚難。皆法之未盡善者也。歲己丑。象邑多癲犬。遭此害者十死八九。諸方無效。適有耕牛亦遭此患。斃剖其腹。獲血塊大如斗。色紫黑。攬之蠕蠕欲動。一方驚傳異事。有張君者。曉醫術。聞之悟。白仲景云。瘀血在裏。其人發狂。又云。其人如狂者。血證歸也。下血狂乃愈。犯此症者。大都如癲如狂。得非瘀血為之乎。不然。牛腹中何以有此怪物耶。吾今得其要矣。於是用仲景下瘀血湯治之。不論毒之輕重。症之發與未發。莫不應手而愈。轉以告人。百不一失。乃知此方實

此症之要治也。夫癲狗之患。自古而有。或謂腹中生小犬。能駁胎以死。非藥所能挽回。此因若輩無治法。始作此謠言。以欺人耳。張君既洞悉其病原。又濟之以此方。天其憫斯人之無辜。而假手於張君以治之。爰將此方廣為傳佈。俾天下咸免此患。錄方藥於後。

生軍三錢。桃仁(七粒去皮尖)。地龍蟲(七隻炒去足)。右三味研末。加白蜜三錢。用酒一盞。煎至七分。連渣服之。如不能飲酒者。用水對和亦可。小人減半。孕婦忌。

一、空心服此藥。後別設叢橘一隻。以驗大小便。大便必有

惡物。如魚腸。豬肝之類。小便如蘇木汁。數次後。藥力盡。大小便如常。再服則無物不下。不拘帖數。總要大小便無絲毫舉物為度。不可中止。留餘毒於腹中。以致復發。切切牢記。

二、此症既發。切不可吃班毛等藥。蓋此時腹中惡塊已積。大如斗。不化其瘀血。而反以毒攻毒。必至悶亂而死。戒之戒之。

三、患發之期。大都四十九日為多。近則二三十日。遠則六七十日。百餘日不等。毒有輕重故也。

四、此症最毒。不必肌膚皮肉。即衣服鞋襪。一被咬過。雖毫無損傷。其毒亦能傳染。余曾遭此患。不過棉鞋後跟。次日服藥。下有惡物。無數三劑方淨。可知其毒之烈也。倘因言淺而

怨之其後患可勝言哉。

五、破咬者。倘不明其狗之癩與非癩。不妨服藥以驗之。若是癩狗必下毒物。若是好狗則大便略通而已。藥性和平。決無妨礙。

六、仁人貴弱患於無形。倘有家狗被癩狗所咬。即此藥灌之。既可救一物之命。且能免數十人之患。其德莫大矣。

七、此藥較仙方爲靈。便服者但忌房事數日而已。如鑼聲等事一概不忌。

八、倘疑此方有礙孕婦。是未知立方之意。夫桃仁春生。得半陽之氣。地龍蟲糲。食得中和之性。酒以養陽。蜜以和陰。大黃能推陳致新。得蜜與酒化苦寒爲馴良。共成去瘀生新之功。則邪去正安。於孕婦更爲有益。況被癩狗咬者。命垂頃刻。豈可拘泥有誤耶。經云。有故無殞。願志者深思之。

諺云。千方易得。一效難求。又云。丹方一味。氣死名醫。此方由自身經驗者傳來。靈效絲毫不爽。茲特刊布藥品雖簡單。幸勿輕而忽之。尚望善士仁人廣爲傳播。俾救急難。功德無量。

## ■ 消燐承氣湯

洋火柴爲中華廿二省普通應用特品。硝硫雖有暴烈性質。尙易用藥消解。惟燐毒係陰電所結。最難消滅。現今愚夫笨

婦心有憤懣。每藉此物爲尋短見基礎。然入口歸胃達腸。無形質。有毒性。染綴腸胃內膜。嘔吐不能出瀉利不能下。其爲

煙焰毒火焚燒暗斃者。每年不知凡幾。言念及此。能不悽然。

今覓得妙方。用自然銀二兩。寒水石六錢。滑石塊一兩。綠豆衣五錢。野黑豆七錢。錦紋軍四錢。小枳實三錢。粉甘草一錢。五分。玄明粉三錢。名消燐承氣湯。清水濃煎頓服。輕者一二劑。重者三四劑。自能將火毒化消淨盡。全愈。此方靈驗異常。萬勿秘藏。刻出宣布。普渡羣迷。功德無量。

## ■ 綠豆湯能解紅頭洋火毒

近世生活程度。日見增高。社會情形。日趨複雜。無知之人。每圖自盡之下策。吞服紅頭洋火。宜急煎綠豆湯灌服。多灌即可立愈。

(按)紅頭洋火。內含燐毒。綠豆善於解毒。煎湯灌服。必有效也。但其性和緩輕者。果能立愈。重者宜先用桐油探吐之後。再與此湯。則無不效矣。

## ■ 解砒毒之驗方

萊郡劉某遇僧授海上方。多効。其解砒毒。尤爲神驗。戚某屢求不與。衡之。乃置酒延劉。及畢。局其戶。謂曰。爾已中砒毒矣。

速與我方爲爾療。劉不信。頃覺腹中潰動。乃曰。何惡作劇如是。可疾取白礬三錢來。咸如言取至。調水飲之立解。因惡其名也。榜其方於通衢。

解河豚毒

誤食河豚之肝及子必迷悶而現假死之狀態據日本人多賀方城之研究凡食河豚而死者少則三日至五日多則一星期至多四十九日其人即自然醒覺蓋由河豚能劇烈活動淋巴液以排除淋巴管中之病毒實為治淋巴系統諸病之特效藥惟其藥性過峻活動太烈以致循環呼吸神經各系統暫時休止故現假死之狀態非真死也但欲減少其假死時間可先用麻油頻灌之使其作吐再用橄欖煎濃汁灌之自能漸漸甦醒焉

中暑猝倒

夏日酷暑行路者每覺炎熱逼人頭昏目眩彼跋涉長途或勞役之人每有猝倒不能行動者此名中暑急招兩人扶之於樹下或牆旁風涼而無日光之處爲之解衣袒胸以取涼。尋掘地下泥土(不可用表面一層)用大蒜一二瓣稍打用冷水調勻俟澄清去滓灌之即解。

■ 疗瘡急救法

富豪某。辱生一疔。越日走黃頭面腫如榜姥。目閉口張。喘急欲死。雖集諸醫於堂。迄無善策。會有糞夫到其家傾糞。聞其故而自薦。諸醫嗤之以鼻。該糞夫言如不愈。願已命償之家。人以諸醫之策。聽之。糞夫急取糞塗之氣。極臭。諸醫益揶揄之。約一炊許。黃水淋漓不絕。腫漸消。中有孫醫。以將氣脫。恫嚇之。家人微露輕意。諸醫踰限辭回。是夜人醒腫消。富豪惡臭。欲揭之。家人勸止。之間係何醫之藥。答以糞夫。富豪怒甚。誓死不塗。又聘前醫。遂不起。大人察其神。遣人求之。贈以百文。方用蛔蟲一二條。赤糖一文。共搗成漿。專治一切惡疔。及疔走黃。先大人每薦該糞夫以治療。罔弗愈者。覓蛔蟲。唯彼得預藏而待之。越二年。予臂突生一疔。寒熱交作。先大人急喚該糞夫取蛔蟲。糞夫答以用罄。教先大人捉蠅虎二十隻。和臭飯粒搗塗之。一時許腫消。寒熱亦退。尋愈。先大人問尚有其他秘方乎。答以唯此而已。

油空腹服之可殺疔勢其效甚驗。

油類有活動腸部血液通便之效。服後排泄暢達毒氣下行。不致上攻矣。

### ■土牛膝根可治急性喉症

喉中猝然壅脹。痛不可忍。急取土牛膝根。搗汁一大杯一口。咽下以舒喉氣。一面延醫診治。

### ■土牛膝根可治急性喉症

土牛膝根。即臭花娘草根。有化痰清熱利膈之效。

### ■脚氣衝心治法

脚氣衝心。用礬石二錢。以漿水兩大碗。煎三五沸。洗脚頗良。

(按)南瓜夏秋成熟。農民恒種之。用以代糧及飼畜之用。諸

蓋礬石能却水。又能護心。所以爲妙也。

### ■急治突然齒長秘方

忽然齒長。名曰齧溢。用白朮煎濃湯漱口數次即瘥。

### ■急治眉毛忽長奇病方

眉上忽生一毛。長尺餘。觸着大痛。名曰血瘤。管斷之即血流不止而死。用陳艾壹團放於瓦上。燒煙薰之。即能縮短。病除。至來年初夏再薰。永不復發。

### ■急救心痛危症奇效方

黃瓜一條。剖對開去肉去子。填入明礬末合住。用線縛懸挂陰乾。待瓜皮上起白霜。刮下研細。瓷器封固。凡遇急症心痛欲死者。但有微氣。將瓜霜點眼四角。立能見效。

### ■火燙驗方

皮膚肌肉被火燙傷。輕則痛苦。重則腐爛。可用一味爛南瓜敷之即愈。

(按)南瓜夏秋成熟。農民恒種之。用以代糧及飼畜之用。諸患茲將經驗神效方數則錄之如下。也。如無爛者。以好者搗爛敷之亦可。價頗賤。及其已爛。則屬廢物。願慈善家留心。預爲收藏。以備不時之需。亦廢物利用。惠而不費之善舉也。

### (二)

時屆夏令。凡人赤身露體。或着單衣。故難免有火灼水浸之患。茲將經驗神效方數則錄之如下。用麻油少許。井水一碗。以銀針攪勻。至不見麻油形象為止。然後擦患處。

又方用雞蛋三枚去青留黃。將單黃放銅勺內下用火燒上。用鏟炒須臾即有油出以油搽患處神效。

(二二)

余逸農

我認為報上發表驗方的原則是要叫缺乏醫藥常識的人們照着這簡單的方子去自動的療治疾病。絕無流弊而能收到效驗。根據這一點我雖有許多搜集的單方或由於抄襲或由於傳說因為沒有試驗過不肯胡亂地發表。最近治一被火傷的人發現一個靈方特地把他寫出來。敵鐵一店員因點汽油燈致手掌被火油和火酒燒得皮焦肉爛疼痛非常。什麼石灰乳老鼠油臭蟲油黑狗油等多已用過一無效驗。余乃改用麥炭粉敷之。一日痛止。又二日創傷全好了。方用麥炭粉真脂麻油調和成膏敷創上。痛不止。更加敷至痛止為度。聽其自落。

(四)

葉伯舉先生傳地榆研末撒敷湯火傷最善。近日舍弟之幼子爲滾水傷腿足甚劇。初用西醫藥頗痛苦。旋用地榆研末撒之則痛止十餘日而肌膚生長完善矣。按此方鴻緒證治全生中亦載之。凡湯火傷最忌冷水宜速浸油中或浸小便。

中洋油亦極佳。地榆末則或用麻油菜油調敷或乾撒或水調均可。

口火燙水燙奇效方 佚名

雞蛋白三個和火油三匙打勻。以錫箔入內蘸之。靠錫方面貼燙傷處乾則更換。即飲上白濃糖湯一碗能免毒氣攻心。自可漸愈。無論皮破起泡均可蘸貼。立見奇効。如燙處過多。照法增加成分。痛甚再蘸火油擦之屢試屢驗。並須忌口。會偏癲後神識昏迷奄奄一息急用此方亦可救活。

口蜈蚣咬傷立時止痛

蜈蚣有兩鋒。鋒利異常。一被咬傷。其毒流走最為迅速。雖不即有潰爛之害。然一時疼痛不止。余有法較為便常靈驗。可用本人手指甲。清水磨塗患處。其痛立止。

口治蜂蠍及刺毛蠍

蜂有數種有毒則名胡蜂。無毒者則名鐵嘴蜂及刺毛蠍。雖無大患。其腫疼最難忍。用葛蒲藤葉擦患處。其痛立止。

## 解刺毛蟲刺痛法

刺毛蟲栖於桃桑柳等葉上。誤觸之爲其所刺。疼痛難忍。可。以安母尼亞水蘸抹患處。止痛消毒。如鄉間無此藥時。用雄黃磨濃汁擦之亦效。

## 救自刎斷喉秘法

佚名

自刎者。乃迅速之變。須救在早。遲則額冷氣絕。初刎時。氣未絕。身未冷。急用絲線縫合刀口。繫上桃花散。多繫爲要。即以棉紙四五層。蓋刀口藥上。以舊布周圍繞五六轉。繫之。將自刎者仰臥高枕。枕在腦後。使項鬱而不直。刀口不開。冬夏避風。待口鼻中有氣。逼出。以姜五片。人參一錢五分。用米一合。煎稀粥。隨便食之。接補元氣。三日後。急解去前藥。仍須繫上桃花散。纏札二日。後再用濃葱湯。軟絹蘸洗傷處。泡乾用玉紅膏。搽塗傷口。長四寸。闊二寸之布。將玉紅膏塗布。如膏藥之狀。黏連好。肉庶不脫落。外用絹條圍繞三轉。自能生肌長肉。收功如大便結燥。不可用利藥爲要。按此方雙喉皆斷者百日。單喉斷者四十日必收功。

桃花散方 石灰半升。大黃一兩五錢。切片。將二味同炒至石灰變紅色爲度。去大黃篩極細末。

玉紅膏 甘草五分。生地四兩。全當歸二兩。象皮三兩。沒藥一兩。乳香二兩。合歡皮二兩。右藥用麻油一觔半。煎枯去渣。冉入黃占四兩。白占二兩。血竭五錢。煎至滴水不化。成膏備用。

## 急救縊死

(全上)

凡男婦縊死。雖僵。若胸口溫者。可救。老年之人在六小時內可救。但切不可割斷繩索。緩緩將縊人抱起。解散。將縊人安平坦之處。仰面朝天。頭要扶正。先將大小便口之處用棉花塞緊。如男可用棉花。將小便包緊。不令泄氣。然後將手足慢慢屈伸。用一人坐於頭前。兩腳踏其肩。揪住頭髮。再用兩人將細竹管入耳內。不住吹氣。不可住手。揉其胸。再用一人口對口輕輕呼吸。令喉順通。其氣少頃。即從鼻中而出。然後將大小便軟物抽出。甦醒後。將官桂湯及稀粥湯頻進。令順咽。喉切不可用茶水灌。照法醫救。百無一失。

## 又方

如前法放下。急用活雞冠血滴喉鼻中。男左女右立。男用公雞。女用母雞。

## 急救溺死屢驗秘方

凡救溺死急開其口。橫銜一箸使水得出。屈兩足使有力者。肩上背對背倒駝而行。令吐出水。仍取燥土或灶中乾灰。須稻草灰更佳。鋪地。將溺者臥於上。再以乾灰蓋上。露口眼。使水收入土中。灰中令活人口對口接氣。漸能甦醒。此法雖身僵氣絕亦能救活。但口開腹不飽者。雖救亦不可復活。

又法開口橫箸。以細竹管吹其兩耳。以生半夏末吹入鼻中。以皂角末置竹管上吹入鼻門。用鑊覆地。以溺者之膀胱對鑊。膀胱臥。令用人將兩足提高。待水從口中流出。用姜汁灌之。令人接氣即活。

凡冬月溺死者更快。但胸前微有濕者可救。或見微笑。急掩其口。不掩則不救。爲要。凡溺死凍死者。切忌火烘。致逼寒入門。皆不救。

## 急救凍死秘方

凡救凍死者。急以活人暖衣裹好。再以米炒熱。絹包。熨其心胸。冷則更換。俟其稍有回生之色。以淡姜湯灌之。即活。或再不甦。用雄黃焰硝各等分。爲末。點兩眼角立甦。如見微笑。急掩其口鼻。否則不救。若誤將熱湯灌之必死。若遠近火即死。

## 實用驗方

白光岐

貧苦的民衆不幸生了疾病。因爲家境困難。無錢延醫服藥。每年喪失的生命不知凡幾。唉。可憐。可憐。

我因着以上的原因。所以忙裏偷些工夫出來。搜集些實用驗方。編成這篇小藥箱。是以「驗」「賤」「便」三字爲宗旨。「驗」是小藥箱裏的方子。是以「驗」「賤」「便」三字爲宗旨。「驗」是我試過而確有成效的。「賤」是價值很便宜的。「便」是隨處都取得到的。

我的經驗很小。能力薄弱。倘蒙各界同志匡我不逮。則我非常的感激。

我做了這篇東西後。倘能小補於民衆。那是我小小的願望。

### (一) 痘名

感冒

病狀 頭痛鼻塞發熱無汗

藥品 生姜 黃糖

治法 煎湯乘熱飲。飲後覆被取汗。發熱有汗忌服。

又藥品 糯米三合。生姜五斤。葱白七莖。

治法 羔粥服。服後取汗。

(1) 病名 僵寒風溼

病狀 寒麻痺不仁。發汗不出。

藥品 桃葉。

治法 鋪席下令病者臥席上覆被取汗。

(2) 痘名 痘症

病狀 陡覺胸脘痞悶或腹痛。

藥品 嫩車前草。

治法 揉軟塞鼻孔。男左女右。

又藥品 絲瓜葉。

治法 捣汁飲。

(3) 痘名 中暑

病狀 夏季病猝然昏倒。不省人事。

藥品 街心土。

治法 捣碎井水搗數百遍飲用。三叉路口經多人踐踏之泥土爲最佳。

又藥品 扁豆葉。

治法 捣汁飲。

(4) 痘名 痘症

病狀 夏季病猝然昏倒。不省人事。

藥品 中暑。

治法 捣碎井水搗數百遍飲用。三叉路口經多人踐踏之泥土爲最佳。

又藥品 扁豆葉。

治法 捣汁飲。

(5) 痘名 痘症

病狀 夏季病遍身出丹。囁扁豆而不知腥味者。

藥品 生扁豆。

治法 捣汁飲。

(6) 痘名 霍亂

病狀 忽然上吐下瀉。揮霍撩亂。或有脈伏躁瘧等見

治法 滲汁飲。

藥品 白礬。

治法 生熟水各半過服。

藥品 白礬。

治法 煎湯去滓飲。

藥品 木瓜。

治法 煎湯飲。

藥品 霍亂氣脇繩筋也。

治法 煎湯飲。

藥品 木瓜。

治法 煎湯飲。

藥品 井底泥。

治法 蓋布包裹。覆肚上。

藥品 熱極而發狂。

治法 陽毒發狂。

藥品 麥奴參上有黑微者。俗名鬼麥。

治法 煎湯服。

萬醫庫

四四八

又藥品

芭蕉根。

治法 捣汁飲

一〇病名

痰喘

病狀 即痰飲氣喘。感寒則發。

藥品 蝙壳

治法 炒研淡鹽水調服。

一一病名

病狀 嘎嗽。喉癢咳嗽乃餘寒襲入肺俞之故。

藥品 細茶葉砂糖

治法 拌炒白湯過服。

一二病名

病狀 久咳。即老咳嗽。

藥品 胡桃肉

治法 煎湯服。

一三病名

病狀 天未明時細細咀嚼咽下。

藥品 百草露。

治法 煎熱骨蒸。日晡而作。

一四病名

病狀 療療。

藥品 治法

點膏肓穴。在背上第四節骨左右三寸。

又藥品 黑荳炒紅棗去皮核泛丸。

治法 鹽湯過。

一五病名

病狀 虛勞。

藥品 治法

每日早晨飲一杯勿間斷。

病狀 痘原不一。病狀複雜即勞病。

藥品 豆腐漿。

治法 每日早晨飲一杯勿間斷。

一六病名

病狀 游中夾血絲也。

藥品 柳花。

治法 焙乾研末米湯調服。

一七病名

病狀 吐血。

藥品 準口吐紅益益益。

一八病名

病狀 便。

藥品 乘熱飲之如懸心。噙南棗二三枚。

一九病名

病狀 心熱吐血。

藥品 榴花。

治法 煎湯服。

病狀 南方烟瘴之氣中人即病。

藥品 大蒜生熟各七片。

治法 嘴之。

二〇病名 中風口噤。

病狀 中風而口不能言也。

藥品 皂莢。白芥子。

治法 研末吹鼻中得嚏則生。

二一病名 中風口眼歪斜。

病狀 中風而口眼歪斜也。

藥品 活鮮魚。

治法 捣爛左歪敷右右歪敷左。

二二病名 黃髓血。

病狀 口眼歪斜治愈後用此方洗之則不致再歪。

藥品 治法

病狀 中風痰壅脣間。

藥品 鮮蝦肉。

治法 以姜葱薑食以鵝翎引吐。

二三病名 腦充血。

病狀 西病名即中醫之暴厥症。

藥品 鐵銹水。

萬有醫庫

治法 磨煎十餘沸愈濃愈妙當茶飲。

二四病名 中惡。

病狀 猛然昏倒即客忤症。

藥品 鷄冠血。

治法 涂面吹鼻即醒。

二五病名 風濕。

病狀 狀若風癱。

藥品 松毛。

治法 捣爛燒酒沖服。

二六病名 陰陽易。

病狀 男女病後性交而得目花少腹疼。

藥品 褐襦布。

治法 男用女袴女用男袴燒灰酒服。

二七病名 勞復。

病狀 與陰陽易症相似間有吐舌數寸者。

藥品 雄鼠屎(兩頭尖者是)

治法 煎飲。

二八病名 自汗。

病狀 津津汗出也。

藥品 蕎芭蕉葉。

治法 燒灰和粉撲之。

又藥品

治法

治法

二十九病名

病狀

藥品

治法

藥品

治法

又藥品

治法

藥品

治法

病狀

羊癩風

每日用一尺燒灰開水過下。

三十二病名

病狀 卒然倒仆地上不省人事口吐白沫。  
藥品 菜汁 放口中即醒。

病狀 夜睡不甯也。

藥品 小黃米。

病狀 不寐。

藥品 炒爲粉砂糖拌服。

病狀 同。

藥品 蒟仁。

病狀 滋渴。

藥品 豌豆。

病狀 上消。

藥品 淡養食。

病狀 渴而多飲消穀善飢是。

藥品 頭瘡鷄子。

病狀 上消。

藥品 燒酒冲服。

病狀 河內多飲。

藥品 河內多飲。

藥品 蘿蔔汁

治法 飲之。

三八病名 下消

病狀 口渴小便如膏。

藥品 萍花根。

治法 煎飲。

三九病名 痘疾

藥品 脚魚 砂糖 生姜

治法 羹服不加鹽醬酒等。

四〇病名 瘡母

病狀 瘡久而腹中生塊也。

藥品 毛脚芹菜。

治法 摧爛敷患處。油紙包半日。

四一病名 百合病

病狀 行住坐臥。若有神靈也。

藥品 百合。

治法 煎服。

四二病名 黃疸吐血

病狀 黃色遍身。吐紅頻頻。

藥品 田螺十個。

萬有醫庫

治法 露一宿五更取清汁飲。

四三病名 黃疸變黑

病狀 皮膚黃色變黑色也。

藥品 王瓜根汁。

治法 平旦溫服。

四四病名 黃疸腫脹

病狀 因黃病而轉大腹膨脹也。

藥品 壺蘆子。

治法 燒灰存性。溫酒過下。

四五病名 酒疸

病狀 因嗜酒而成疸也。

藥品 金針花即萱草。

治法 摧汁服。

四六病名 笑不休

病狀 吃鹽。

藥品 炒沸湯冲服。

四七病名 養雜

病狀 心中飢。甚得食則飽。少頃復飢。

藥品 猪護心油。

治法 蒸糯米食。

四五

四八病名 鬼疰  
病狀 即祟症。脈時大時小。或疾或徐。

藥品 青蒿草。  
治法 煎湯服。

### ■仙芝堂驗方

盧逸軒

膽死腹中。細研末服之便落。

口瘡。五穀蟲研末服之。

五臟神方。萊菔子四兩用巴豆十六粒同炒。搗之紅牙皂一兩。沉香五錢枳殼四兩大黃一兩酒炒琥珀一兩爲末。

雞鳴時溫酒下。或隨病輕重加減。

小兒疳疾。子葉石決明。谷精草。夜明珠。砂黑白丑。炒白朮。煅石燕陳青皮。黨參各等分。胡黃連減半。炒研細末每以一分入

鵪蛋清。微服。

乳岩潰破。煅甘石二錢。蜜陀僧二錢。煅龍骨二錢。早螺殼灰一錢。片黃四分。冰片一分。人指甲灰五分。研至無聲。外以熟地知母。烏梅。搗爛貼之。

小兒疳疾奇方。公雞肝一個。(竹刀剖不下水)石決明三錢。硃砂五分。爲末。粘雞肝上。竹箬裹好。米泔水煮熟。分兩次清早開水下。

### ■槐醫室驗方

王象涵

余家世業醫所傳秘方多種。試之良效。因不敢自秘。願分同好。茲將擇尤驗者。以授之於長壽。

蝴蝶拔毒散。此散治一切無名大毒。并火毒。瘟毒。敷之神效。

寒水石研極細末。淨皮硝研細末。川大黃研細末等分。蝦蟆子(即蝴蝶)初夏時取蝴蝶於鉢內。泥封其口而埋之於土。

秋令俱成爲水。右用蝴蝶水一大碗。入前藥末各二兩。陰乾研勻。收磁罐內。每用時以水調透。患處。

膈症奇方。用壁虎五條。松羅茶四錢。先以壁虎水煎去壁虎。入茶浸透。炒乾入瓶收貯。每日將此泡茶服。即愈。

紅絲疔。用池中紅蒂浮萍草。不拘多少。洗淨打爛。連汁敷患處。頃刻即愈。但紅絲已過脅者難治。

疔瘻捷驗良方。人指甲瓦上。炙膿研末。再將夜壺倒出後。有白垢流出。以孟盛之。調指甲末敷患處即愈。

胎毒神方。駁過多次。用刀豆外面大壳。煅存性。入冰片研細敷上。即愈。

疔瘻內服神方。白菊花四兩。甘草四兩。水煎服。酒沖一大碗。真神方也。

止血散。腫毒開刀針受傷血出不止。

用多年木桶尿缸燒存性研末敷患處止血如神。

天南星火煅存性爲細末醋調塗二三次即愈。

治羊鬚瘡用紅棗煅存性香油調敷。

又方用羊毛燒灰存性香油調敷。

蜘蛛瘡方用山甲五錢同鴿糞炒黃色爲末塗之即奏神效。

蠍瘡瘡方用山甲三錢研末麻油調擦即愈屢試屢驗。

鼻內生疳蝕爛方青龍擦患處每日十次每夜五次三四日乃愈。

久痢方用臭椿皮五錢酒煎立服立愈。

赤白濁秘方兼治夢遺遺精生大黃三分生雞子一個將

雞子敲破一孔入大黃末在內紙糊裹熟空心吃之四五朝

即愈神奇秘方。

遺精良方五倍子醋打爲餅貼臍上即不遺。

吐血奇驗方劉寄奴一兩雞子十枚用水七碗煮五枝香

爲住每日食雞子一枚連汁服下勿作十日吃完不再發。

坐板瘡老綠瓜子燒灰敷之其效如神。

治角風方生在陰毛中宜急治不然損命男女並用用白

果不拘多少打爛擦患處即愈。

金鎗藥此方傳自軍中松香一兩用水煮過數次多多更妙桑枝皮一錢燒灰存性爲末傷處擦上神效。

禁口痢疾蘿蔔用布擦淨污泥不可水洗打碎取汁一大茶杯煮半熱將白蜜小半杯冲入撓齒灌下即愈有起死回生之效。

爛喉急症神方白礬研末吹入喉中即愈。  
黃水瘡神方蠶豆壳燒灰菜油調敷即愈。

## ■蕉園簡便單方

王則樵

鼻血如泉湧以亂髮燒灰研末用竹管吹入鼻中即止。

(則樵按)經言春善病衄衄註衄鼻血也春木生火上動於血鼻爲肺竅金被火刑故發衄治法宜用清降陶節菴曰若衄成流者不須服藥少刻自解然亦有不自解者必採用此方髮乃血餘同氣相求故用之以引血歸經也。

肝熱目痛龍胆草一味用瓦器熬成膏點入眼內瞽目俱能點退翳翳不可以平淡而忽之也。

(則樵按)目爲肝竅內通五臟未易輕治惟龍胆能瀉肝膽之火又是從外點治故較爲安善。

耳聾芥菜子搗碎以人乳調和棉裹塞耳數易之即開。

(則樵按)芥菜子辛溫散氣人乳補虛潤燥故佳。

遍身癩癩。似瘡非瘡。似疥非疥。以茵陳煎濃漿洗之。即愈。  
(則樵按)此係風邪濕熱所傷。茵陳苦能燥濕。寒能勝熱。爲

發汗利水之聖藥。故佳。

噎膈。年久陳皮用數十年之陳壁土拌炒去土取陳皮研

未免酒服一二錢數愈服即愈。痰膈氣膈均效。

陰濕祛風。烏翳明日。治風淚風痺等症。

(則樵按)人身以氣爲主。氣順溼除。則百病散。陳皮宣通五

臟。統治百病。皆取其理氣燥濕之功效。無論痰膈氣膈均效。

腰痛。大紫蘇一錢。研碎煎濃取水。煮糯米飯。椒鹽炒食。痛

自除。

(則樵按)腰痛多由風寒乘虛而入。紫蘇味辛入氣分。色紫

入血分。香溫散邪。糯米甘溫補脾肺。縮小便。收自汗。胡椒快

腹。消痰食鹽味鹹入腎。爲引經藥。故痛自除也。

## ■簡易靈丹

白光岐

(一) 次離丸  
治骨蒸勞瘵。日晡潮熱。

黑豆。(炒)紅棗。(去核)  
研末泛丸。鹽湯過下。

## (二) 文武膏

李健頤

## ■驗方五則

(一) 治血淋驗方。用大黃三錢。川連一錢。冰片五厘。研末。薑汁泛丸。米飲過服。

(二) 打傷瘀血攻心方。打傷瘀血攻心。人事不知者。急宜。  
(二) 治小兒鹽哮喘。遇冷則發。經年不愈。用蘿蔔子淘淨蒸熟。晒乾爲末。薑汁泛丸。米飲過服。

## (四) 青龍白虎湯

治時行喉痛。喉痧。白喉。喉痺。猩紅熱等症。爲一切咽喉病之要藥。

青果。即橄欖三枚。白蘿蔔。一個。煎湯服。

## (五) 清金湯

同鷄蛋白二枚。調食即愈。

治目力不強。視物模糊。爲明目之要方。並治頸項瘰疬。  
桑葉。即桑子瀝汁。入蜜煉成膏。每日以湯點眼。並沖服。

用麝香。熊胆。硃砂。血竭。山羊血。川連。三七。地龍各五分。煎湯調酒服最效。

(三) 治經閉驗方 馬鞭草冰糖等分。煎酒服即行。

(四) 洗目痛方 白菊花一錢。荆芥一錢。胆礬八分。皮硝八分。防風一錢。薄荷一錢。共煎湯用消毒藥棉洗之。

(五) 烫瘡藥方 蛇床子四分。生石膏四分。生大黃四分。枯凡四分。五倍子四分。松香四分。銅青四分。黃柏末四分。硫磺二分。共研細末。調茶油塗於患處。

## 戒煙良方

本方千萬不可加一味藥加則不靈印光法師述 叛依弟

子王慧格錄

鴉片流毒受其害者不知凡幾矣。有志同胞每欲戒除而苦無良方。近來市上所售戒煙丸藥多參以嗟嘆毒質雖可抵禦受害尤甚。今此神方簡便易辦有利無弊務望有志戒吸鴉片諸君從速照服。百發百中。萬勿輕忽。甘草八兩。川貝母四兩。杜仲四兩。右藥三味。用清水六斤。熬至一半。將藥用布去渣。加入好紅糖一斤成膏。每次服三錢。溫水沖下。(服法)初三天。每藥膏一兩。加入煙一錢。第四五天。一兩藥加煙八分。第七八九天。一兩藥加烟六分。第十一天十二

## 花柳病二驗方

### (一) 下疳

亂頭髮一團。鹽水洗去油。再洗乾瓦上煅枯。棗核七個。火燶紅存性。共研未。勻分。先將熟米泔水洗患處。後用藥敷之。即效。忌生水洗。

### (二) 五淋白濁方

蚯蚓焙乾研末。缺馬邊。何首烏。蒲公英。銀花。木荊花。煎水對甜酒冲。蚯蚓末吃完立效。

## 斷鴉片癮良方

逐次或逐日於吸煙畢。接吞生雞子二三枚。每吸皆然。不可間斷。一週日後停吸亦不發癢。殊無所苦。有志脫離黑籍者。請試服之。按雞子量數可依煙癢量數。比例增減。例如每吸煙一錢以內者。可服一枚。每二三錢可依次數增也。此方亦無其他溫燥便秘之害。穩健適宜。傳方者極端誇示其效。

## 口簡易實驗方十則

丁子良

自失。

治瘡疾方 白木槿花三四朵。瓦上焙乾存性和白糖開水冲。屢驗不爽。

吹喉方 砂硼一分。梅片五厘。雄黃一分。共爲極細末。不時吹之。效等反掌之易。

治喉閉方 好雄黃一錢。胆礬一錢。芒硝一錢。共研極細末吹喉。奇效莫匹。

治喉蛾方 燈草燒灰爲末。吹入鼻中即愈。

治九種心痛方 炒五靈脂炒元胡。乳香沒藥各一錢。木香四分。高良薑一錢。共爲末。每服二錢。空心好酒送下。頗奏奇功。

敷疔瘡方 蓼子草嫩頭搗爛敷瘡上。以外棉布裹好。即愈。(即時毒火毒敷之亦效)

按前方經鄙人試驗屢效。特錄登報。還祈海內諸先進。教而正之。爲禱。至女子白帶小兒急慢驚癇。齒痛。小兒耳瘡初晝夜被蜈蚣咬傷。向鄙索藥治之。因戲令芋梗汁擦之。果然應手而愈。特錄登於此。以供閱者之研究。

治蜈蚣咬傷方 將芋頭梗切斷。以自然汁塗擦。立能消腫止疼。按鄙人今秋出診。道經芋田。見一癩蜈蚣(俗呼蠍寶)被蜈蚣將腹咬破。血流不止。而蟆痛退於芋梗盡力磨擦。始將蜈蚣趕走。仍以傷處向芋梗上礙擦。幸將芋皮擦破。其汁出。癩蜈蚣之傷處而立見腫消。血止。全愈而去矣。不三日。有鄉童夜被蜈蚣咬傷。向鄙索藥治之。因戲令芋梗汁擦之。果然應手而愈。特錄登於此。以供閱者之研究。

治小兒口瘡方 青黛一兩。黃柏五錢。共爲極細末。名「綠槐散」。搽患處。吐涎即愈。

治鼻生瘡肉方 瓜蒂燒灰。存性爲末。朝夕吹入鼻中。其瘡

## 口藥學小識

張階平

火瘡治法 以石灰浸水。愈久愈佳。澄清取水。入油攪勻。以

鷄子清調和之塗患處立見功效。

食狗肉致瀉療法 食狗肉而致瀉證見發熱腹痛法

以北杏爲君以枳實厚朴山楂等爲佐蓋消滯解毒而開胸膈也。

發鷄盲治法 日則見物夜則不見物則爲發鷄盲此爲內

障之一生食鰻魚胆數個有效蓋目屬肝此臟氣療法也。

撞紅療治法 男女交媾值經水來陰傷于陽名曰撞紅近

世方書治法不一此方祇用蘇木二兩煎水飲之有效。

便結療治法 大便秘結實熱者大黃朴硝最猛虛熱則秦

羌火麻仁郁李仁之類若身體虛弱者則燉芝麻以糖和之

而食其不爲芝麻糊者恐滯故也此外復有潤下滑腸之品

如馬蹄粉杏仁糊（佐以麻仁郁李仁同搗尤妙）均能見

效。

肚痛治法 雖常肚痛不兼他症者可用白芍甘草以安中。

蓋白芍行而甘草補也赤芍亦止肚痛惟因滯而痛者乃宜

之。

白食班痕治療法 身體各部連有白食班痕等症時於觀

瞧固有妨礙抑且勢將蔓延治不容緩也法以白附子雄黃

川槿皮雌黃石黃硫黃各等分共爲細末以生薑汁開之用

新筆擦患處甚爲有效。

解酒氣法 酒後用芫荽煎湯漱口洗面則絕無酒氣亦解酒之一法也。

防酒醉法 法以人參入口嚼之或以細砂含之則可免醉矣。

骨硬治法 可食山楂或烏梅硼砂等但咽其汁便能使化軟而下矣。

治黃食陰虧 法用生蛻肉煎水飲之數次有效。

蛇頭纏指及無名腫毒 治法用獨活一兩酒斤半煮之取其氣以蒸患處久之有效。

治痢簡方 番薯切塊蒸熟加入好蜜糖三匙羹食之止痢。

兼止肚痛水瀉亦可服蓋番薯去濕清熱兼補中氣蜜糖解

毒緩急潤腸止瀉故也。

乳癰治法 法用生蒲公英搗爛和酒煮之飲酒取渣塗患

處有效如神（見驗方新編）

以上各方乃得之於戚友而曾著有效驗者故特搜而集之。

以爲一種藥物小識而已各方忘其原本未能加以註釋不敢掠美特誌數言。

## 雜組

### 口職業與疾病之關係 尤學周

吾人爲生活計不得不求一相當之職業。其身體孱弱或有某種疾病。對於職業宜有選擇。不可貿然從事。蓋某種職業可以引起某種疾病。足以不利於其身。近世人口日多。謀生爲難。有一位置不問其適當。不問其是否任勝。即貿然應徵。往往所用非所學。工作之間勢必多費其心力。於其身體上其疾。病所生之關係。又必更進一步。下列數項表明身體上有某種缺點。即不適於某種職業。以備選擇職業者之參攷。

近視 精細機械工。鐘錶匠。修理照相師。理髮匠。交通職員。刺繡女工。

色盲 玻璃工。眼鏡工。金銀工。象牙工。染色工。鞣皮工。印刷工。彩色石印工。園工。理髮匠。海員。照相師。畫師。美容師。裁縫。

美術工。幼稚園保姆。

發音不利 教師。商人。歌劇者。電話接線生。

瘡癩 漢奸。藥器工。冶工。紗廠工。鐘錶匠。泥水匠。機器重力工。

電話接線生。速記。

肺病 鐸匠。翻砂匠。鑄型匠。電氣工。拋銅匠。器具工。綿紗工。

機械工。以及勞力者。多塵埃之工作。在高溫或低溫中處理酸類。煤氣。蒸汽等。工作。製造捲烟及食物嗜好品之工作等。

心臟病 國丁。鍛匠。翻砂匠。鑄型匠。金屬印刷工。鋸治工。鞣。

皮工。木工。石工。廚司。務人。力車夫。汽車夫。飛行家。

皮膚病。電池工。漆匠。旋盤工。糖裏工。化學工。印刷工。釀酒工。家具工。金屬工。染匠。泥水匠。烟突掃除工。琢磨匠。雕刻匠。照相師。藥劑師。理髮匠。店員。廚司。務。

手汗者。礮工。金屬細工。器具工。機器工。眼鏡工。旋盤工。鐘錶匠。鍍金工。

腳部疾患 機器工。排字工。牙科技士。農業。其他須直立工作及長途步行職業。

癱瘓 昇降樓梯處理機器。或尖銳之物。處理酸類及火燄等職業。

## 返老還童術之試驗

美國雪茂著  
季仰周譯

近百年醫界中最大之發明。莫若返老還童術。所謂返老還童術者。及藉藥力之助。以阻止身體之衰弱。而回復三十年前少壯時體力與腦力之強健。法京巴黎之名醫曰吳樂諾夫。奧大利名醫曰斯丹南凱。均於十二年前。同時各以新發明之返老還童術。遍告寰球。自此以後。各國人士之來請施此奇術者。不下數萬人。七十老翁。施術後。可證明。腦力體力。壯健。若四五十歲者。亦有多人。此種奇異之醫術。現由吳樂諾夫。斯丹南凱兩醫士。及曾與之共同研究此術之醫士。嚴

守秘密。不肯貿然示人。因此獲利甚厚也。

人莫不知人體之內滿布各種神經及腺或司視或司聽或

司心或司腎各有專職。一若引擎或鐘表內部之機械然各

種神經之中心點爲脊骨其功用猶鍾表之總發條一有損

壞即當修理神經及腺或因疾病而變弱或因年高而致衰

或因操勞過度虧虛或因先天不足而羸弱凡此皆可用吳

斯兩氏發明之奇術療治之以新腺代替舊腺而使人體變成少壯或因先天不足生而神經衰弱者亦可用血清滋補

使人健旺。

吳斯兩醫士幾於同時以此奇術問世兩人之手術各異功效則同所謂異途同歸者是也吳氏之法係割取一種猴腺

接人體即可使之返老還童意法京巴黎有一著名學院竟

在斐洲購置極廣大之場地專爲繁殖一種猿猴以備割取

其腺用以替代人腺就此一端觀之已可見此新發明之奇

術足以開動一時矣吳樂諾夫大醫士曾於今年開會討論

此新發明之奇術赴會聽講者有千人均博學之醫士演說

時佐以影片片中映示一七十七歲之老人在二年前受術

後能搖船工作康健如四五十歲到會聽講之醫士對於該

影片所示之事實莫不表示驚異據英京發行之『帝國新聞』週刊報告美國人因接種猴腺而得返老還童者現已

有數萬人其中大都爲醫士律師著名政治家及擁資百萬之富翁云。

## 麻瘋病之常識

麻瘋爲最慘酷之疾世界各國莫不有之茲將此症之一般

常識分述於後想爲讀者所樂聞也。

(一)名稱 麻瘋爲慢性之傳染病我國古時所稱之廣瘡風頰大風天刑惡疾等皆爲本病之別名及至近世始稱大

麻瘋或曰癩瘋。

(二)病原 麻瘋發生之原因係由一種微細桿菌之繁殖。此種桿菌常寄生於人體之皮膚及神經中於一八七四年爲那威海森博士所發見故名爲海森桿菌或簡稱麻瘋桿菌。

(三)症象 初起時之症象爲皮膚上發現紅色或白色之斑點四周緣有較深紅邊斑點上之知覺不如他部之靈敏或竟麻木且不出汗此種斑點最初多發現於四肢漸次蔓延全身又有一種最普通之記號則爲皮膚上之筋脈變厚一受接觸隱然覺痛及至病勢沉重則手指足趾爛落關節踝強不能屈曲肌膚萎縮斑點潰瘍面部虛腫眉毛脫落狀若睡獅令人憎惡。

(四)傳染。癩瘋傳染之途徑。現時雖未十分明瞭。但常人與患此症者長時期及密切之接觸。最易傳染。如與癩瘋病人同居一室。共用器具。同臥共食等。均有傳染之虞。普通所稱一見癩瘋人。或一觸癩瘋人之身體。即能傳染者。係過甚之詞。不足致信也。

(五)醫治。醫治癩瘋。現時已有對症之藥劑。但醫治須早。且須受長時期之治療。方能見效。依吾人之經驗而論。初起最輕之病案。必須經數月或半年以上之切實醫治。徵象始能消滅。至於所用之藥劑。首推大楓子油及此油之各種製劑。普通用法。有注射及口服二種。口服之手續。固屬簡單。但功效不如注射之顯著也。

(六)預防。增進身體之抵抗力。為預防癩瘋之根本辦法。諸如營養充足。適當運動。工作勿過勞。皮膚之清潔等。均宜特別注意。倘發現上述之症象時。即應請可靠之醫師診斷。其他如(一)避免與患者長期及密切之接觸。(二)癩瘋患者。氣分室獨居。器用衣服等物。不可與常人混雜。倘貧病不能實行上述之法則時。惟有引導之入癩瘋院。以資隔離。(三)患者在未經醫生證明完全痊愈前。絕對不可結婚。(四)患者之鼻腔分泌物。及皮膚之潰爛膿血等。含有桿菌。均宜消毀。(五)患者子女。必須於新生時。即行與其患此症

之父或母分離。(六)癩瘋症流行區域。僱用乳母及僕役時。如覺可疑。當請專門醫師檢驗。是否患有此症。

## □女人常有的幾樣病

大概時令上的病。女人和男人相同的。不過女人多個經期的關係。所以治女人的病。第一要注意她的經期。倘然一個女人有了時症。替她看病的時候。第一先要自己想一想。時期可在月底。第二就要問病人經期來的時期。向來是在月初的月中的月底的。不論病的輕重。逢着經期總要見重一點。難退一點。是要和病家病人鄭重聲明的。不但用藥內防其邪入血室。就可以事的最好。記好。問經期的一句話。至於女人常有的普通病。也有以下幾種。

經期或前或後。不可執定趨前是熱。落後是寒。要詳細考察她的身體強弱。難過的現象。以及氣色的外露。倘然身體強而氣色如沒有病的人一樣。惟經期趨前而多經來的時前腰痠肚裏痛者。觀察細問之後。她實並無氣悶者。此乃肝部木火過旺。疎泄經水的時候。效用急躁的原因。當用和平甘緩的藥味調息肝用之急。就可以慢慢地走入軌道上去了。身體虛弱而氣色淡白不鮮潤者。方可論其血虧。觀察細問之後。確實知其有氣悶者。方可說她病有鬱悶的關係。

帶下有白青黃黑赤五樣顏色的分別。帶下病的原因很多。論其綱要。總是帶脈虛弱不能完全約束的效用所致。帶下的病。尼姑寡婦已經出嫁的女人為多。白帶當補脾胃的元氣。加些疏肝的藥。完帶湯可用。青帶可以解泄肝經之火。加減逍遙散可用。黃帶可補任脈而清腎經之火。旺易黃湯可減逍遙散。

用黑帶火症居多。是難得有的。可用利火湯。赤帶宜清肝火而補脾。可用清肝止淋湯。

血崩一症。有虛實的分明。實症乃是火旺。或大怒之後。宜用苦泄。像黃芩黃連地榆生地白芍茜草等炭。虛症多在勞倦之後。可用固本止崩湯。

老年女人赤帶血崩。總是帶脈虛虧。或素有停積的瘀血化熱損傷。營分所致。用安老湯加減。喻嘉言先生謂老婦崩帶名脫榮。宜大補氣血。

癥瘕（即肚裏的塊）堅硬者。有一定處所者。為癥。忽聚忽散。沒有定處者。為瘕。治法總宜理氣和營。陽夏石癆。這兩種病。像懷胎的模樣。陽覃乃寒氣內積。或一瓣水氣趁女人洗下部的時候流入精竅。後來隨即受男性之交合衝動。那種水寒之氣就夾着流入之精虫。發生一種逐漸膨脹的氣球形狀。如懷胎一樣。到底時常作痛。女性的乳頭不黑。乳房不大。可以辨別。宜用二陳湯加破血散氣的。

藥這種疾病很多。一切不可誤認為懷胎。一般歡喜乾淨的少婦。時常用水洗下部的。最容易有這種病。因為洗下部的時候。水過熱則不便。冷則易受寒。身體弱的人更容易成病。經期的時候。更要留心。石癆不過比較腸覃堅硬一點。偏於血分故也。

癰瘍。這個女人常要悲哭。象有鬼附着她的模樣。宜用甘露大羹湯。

陰吹。陰門中好象吹風的樣子。可用豬膏髮煎。有婦人喉嚨中。好象有一塊東西塞住的樣子。此名灸鬱。可用半夏厚朴湯。

陰蝕。陰門中作痒發生流注水的瘡。可用狼牙湯。或用苦參黃柏桃葉等煎湯薰洗。

陰門中寒冷。可用蛇床子散。且有種奇怪的病。大便從陰門中解出。名為交腸。乃是氣血混亂的緣故。當在理氣和營的藥方中。加入破監帽一具同煎。再用明凡一兩敲作細塊。放在豆腐衣中吞下即可痊愈。有一種病。肚臍眼中出注水的。乃是濕熱因腎虛而溢出所致。可用腎氣丸。此種病。肥胖女人有之。至於陰門中挺出一物。名為陰挺。北方有之。乃濕熱。

我這一段。本來論女人常有的病。連及女人不常有的病。仍

恐一般人因為不常有而不留心。一天遇到這種病。或者不免十分奇怪。沒有方法。教人誤治。或有性命之危險。故一併說明在女人病一欄內。

### ■舊病復發

朱振聲

問 內子前曾患心痞病。惟不時發。昨日覺心中似餓非餓。似饑非饑。口中淡淡無味。喉間乾囉少津。胸中悶悶。故至大世界遊覽。藉以解悶。及觀長人舊病復發。一時面色蒼白。額出冷汗。手足及兩耳寒冷似冰。後爲解衣稍停。蘇仍可下樓乘車回家。然已受驚不淺。請擬一方。以治此病。定當感恩銘諸肺腑。(張明初)

答 據來函所述情形。顯係肝病無疑。但時隔數日。而敍述欠詳。殊難擬方。藥倘病情如無變更。可用樟檬皮(係向水果店家購其新鮮者)泡汁服。再當就醫診斷。俾從根本解決。

### ■夜内心饑

朱振聲

問 家兄夜來睡後。至夜半醒來。忽而腹中大饑。似餓非餓。似飽非飽。而每次亦不多食。此病已將二月有餘。不知如何。醫理(嚴漢儒)

答 心中饑。胃有鬱火。亦胃病之一種。可每晚睡時服「戊己丸」二錢。如大便不通。以通便爲最要。

### ■心理療病

健頤

有林姓者。性痴而心多疑。一日因與其友出游。戲謔云。你妻昨夜有人奸宿。被吾瞥見。林某心疑爲真。返歐其妻。妻懼竟縊而死。其友聞之。惴惴心慄。夜不成寐。每交睫之頃。輒見林妻立於床前。呼罵萬端。勢將用武。因之心神散亂。如狂如癲。諸醫束手。禱禳無靈。林之外祖母素不茹葷。虔誦太陽經。即囑林甥。日誦百篇。可除病魔。林如其教。日夜虔誦。後果不見鬼魅。病亦霍然。又有翁姓者。因家徒四壁。矻矻勞神。寤寐不安。以致兩目眚眇。藥石無効。自乃擎拳持誦觀音救苦經竟。然雜念盡除。半月後目疾恢復如前。

(按)一者是由疑心亂想。幻見鬼形。以成心理病。一者是因煩勞不眠。心火熾甚。所以兩目眚眇。其能誦佛經。而病遂除。心思不化。則魅魍仍復纏綿不離。蓋佛經勸善化導。救災挽難之說。使誦者深印腦中。即如催眠術之暗示也。

### ■月經來時之房事問題

陳應期

——有賦爲證——

經來同房。謂之撞紅。邇來討論此症者。紛紛其說。莫衷一是。

愚識陋略。僅醫學皮毛。不敢以口舌爭。今姑勿論。其症之有無。聊將愚所經歷之證狀。及用藥略言之。十年前。愚曾醫患是症者九人。僅愈其四。當其來診時。自說撞紅。夜半交歡。天明叫痛。漸至少腹結硬。陽縮囊收。膀胱胞脹。大小便俱不通。立予十劑湯。約二時許。大便傾瀉。小便通流。俱帶有血水。接服枳實。梔豉湯。加大黃。以通其瘀血。并服燒梧散。後服五苓散。加木通。牽牛。地龍。數劑而愈。其五人。越宿求醫。遂至不可救藥。非醫者之有二心。特求治者。有遲速耳。當茲長日。無聊不端。固陋涉以詼諧。謬擬撞紅一賦。以「孟子守身爲大」爲韻。詭語笑大方。自知不免。而文章遊戲。藉博一粲云爾。

慾本人情色原天性。縱則傷身亂能致病。溫柔鄉裏。埋將無限英雄。愛慾海中。溺盡幾多賢聖。即使溫香暖玉。無限風流。縱教倒鳳顛鸞。豈容浪盜。  
孟子曰：「鳥道霞飛。桃源浪起。知而故犯。泯不畏死。精陽空後癡。逆上以倒行。竅孔開時。毒乘虛而入。裏逮爾痛連膀胱。疾自斯人直教病入膏肓。識成豎子。」  
是則自貽伊戚。誰任其咎。祇因急色。倉皇而直抵紅溝。自作多情。冒昧而選擇毒。較非時交。感陽收難。以拘牽蘊毒深藏。

腎壞。何能割剖。惟期三戒。第求無慾無私。遷重九經。儘可有爲。有「守」。

假令前車可鑒。後轍弗循。不問阮郎之路。毋尋漁父之津。任他秋水輕盈。烏能動念。睹彼桃花隱約。暗自提神。養性澄思。忍遇輕狂之態。寧心息慾。保存明哲之身。

爾乃紅塵未破。紅杏得時。紅鸞照命。紅葉題詩。趁當洪水橫流。那管載胥及溺。際此洪濤狂蕩。誰知樂極生悲。看他紅運方通。如癡如醉。不愧英雄本色。敢作敢爲。

幸而醫術之巧妙。能療藥物之神奇。有賴病雖非淺。瘀先累及膀胱。毒尙未深。脈不傷乎。督帶法定。逐瘀破血。保厥平安。醫兼扶正驅邪。自然康泰。故爾延年益壽。呼萬歲以祝千秋。應知贊化調元。並三才而參兩「大」。

□ 香汗與臭汗

蘭茜

汗是夏天的特產品。由於辛苦用力的工作而發生的。也有過度的娛樂也有。

有閒階級以及有產階級者。其出汗的機會較少。他們或她們在電風扇的活動之下。在冷氣管的圍繞之間。飲着冰凍的各色各樣的冰淇淋和汽水。以解除其熱感。他們是不大會出什麼汗的。就是有也。不過是應應景兒。在鼻尖上綴着。

幾點不但並不發臭而且據說還是香噴噴的尤以少奶奶太太們爲甚因爲伊們身上通透着最好的泊來美身粉

暗地裏發出一種香氣設若更出了點汗於是身上所有的粉與汗溶化起來便生出一種化學作用的迷人香味這香味却從來不會見厭於紳士們及一切高尚的男子們的然而轉過來說有一種令你聞了要作三日嘔的臭汗使你不敢領教而又常得領教到的那便是苦力們終日在炎陽之下蒸發着的穿着大土布衣服的小工們和黃包車夫們既沒有片刻暇晷洗什麼浴所以整天的出幾次大汗也祇好讓他濕了又乾乾了又濕這樣循環往復日積月累這就要精鍊出一種酸性的異乎尋常的惡味來無怪乎在路上扭捏着的摩登小姐們常用一方小手帕遮掩着伊的玉鼻還要鎖着伊的經過點染的柳眉現出鄙夷的態度來了我們享受遠不如富人們的適意但也不如苦力的過於勞我們常是出汗當自己感味到時並不覺其臭反以爲香但這是偏心的主觀的判定其實我們這批所謂臭男子者流那裏有什麼香味呢。

汗是夏天的特產品出在小姐們身上是香的出在苦力們的身上却變得臭了然而「汗」不知此却偏要出在苦力們身上唉天曉得了。

## 睡眠之不平等

金剛

睡眠是天賦與人類的一種特權人人可以享受更非任何人所可侵奪人到了疲倦的時候誰都想要想入睡以休養心力體力故睡眠於人類好像最大衆化的一回事但某一種人有某一種人的睡眠這睡眠又隨着各人的地位而不同像富人席豐履厚一切都藉錢的神通可以無憂無慮能高枕無憂而入黑甜之鄉雖至日上三竿還是做他的甜蜜好夢吃飯睡覺安度一生至少有些和猪一般的象徵窮人於睡眠就不能做富人那樣安適日間在不做不得食的場合下須要工作十四小時的工作過去雖尚有十二小時的時間可以睡眠但因爲過度的勞動體力疲乏已極精神恍惚決難逕入鄉更以家無隔夕之糧妻兒嗷嗷待哺以致舊恨新怨一齊勾起牛衣對泣半夜彷徨至慘至痛之悲劇一幕一幕的在深宵中映現着及至臘臘入睡而已金雞報曉在心力體力休息未足的睡眠中起來於是光熹微中奔赴他的工作於此可知大衆化之睡眠也隨着處境而不均安樂的睡眠祇限於有錢人可享受窮人的睡眠已被麵包所剝奪這也是天賦與人的睡眠特權時意料之所不及人至窮極無聊時也有消極性的睡眠寓聽天由命於冥冥

然閑覺之中。但睡鄉中終究找不出一些生路。而剝削睡眠。也同樣的沒有生路。忽現中國的全民。正多半患了流行性的失眠症呢。食既不飽。寢又不安。遂形成了整個社會的不安。誰有扶植民生。纔能醫治全民的失眠。這失眠的病源是。由於國民經濟之日趨衰落。窮得寐寐不安所致。現富人多睡像猪。貧民少睡將死。此不平不均之睡眠。更須以有效的方法來調劑。使睡眠均等。庶民氣可以一振。民族可以復興。但此睡眠均等之主張。未識能邀一般人之同情否。

## □從睡病說到睡獅睡豕

據說美國聖路易地方。月前患睡病致死的人有十四人。同時還有未死的患者一百四十九人。這是多麼好消息。真的在這種一切都不合理的世界。做人是多麼缺乏趣味。貧賤的人。不消說是非常痛苦。就是富貴的人。也另有一種痛苦。老弱的人固然要受許多天然的限制。就是壯年的人。也要受種種的限制。男子固然什九都成女子的奴隸。女子也十九成為兒女的奴隸。天氣熱。人們覺得煩悶。天氣涼。人們又覺得寒冷。吃得太飽。肚皮是脹得難過。沒有飯吃。肚皮又要造反。幾乎可說沒有一種人合於生存的。假如真有一種睡病。能在頃刻之間傳遍了世界。使全世界各色各種的

人都在夢中不知不覺的溘然長逝。豈不是老天超度人類最好的辦法。

雖然這種睡病。在美國從前所未有的好病症。但美國的李克醫士已斷定他沒有成為瘟疫的可能。其結果。美國人能在睡夢中死去的自然是極少數。只有在中國。那就不能我們翫懲。老天早已把睡死的幸福賜給我們了。

的確中國人是有齊天的洪福。他在雅片戰爭前後的百年間。都在睡中做東方的睡獅。這不是得了睡病是什麼。

不過從前的中國人。雖是被歐美人呼作睡獅。現在的中國人。已被日本人呼作睡豕。不又降了一格麼。害了這樣。每年降落一格的病。一方既不會醒。另一方又不會活。腹臍中又會看見那些不害睡病的帝國主義者。拿着屠刀把我們當作豬癥來宰割。這也未見得有什麼好處吧。

呵。日本人心目中的睡豕。上海西捕口裏之猪囉。請你還醒了百年的睡病。來做東方的醒獅吧。人爲屠戶。我爲睡豕。這是多麼不幸多麼可憐。你難道還能忍耐下去麼。

## □脊縫出玉蟲

背脊裂開一條。有蟲抓出。其狀如蟲。此係督脈空虛。風邪乘隙而入。浸淫生蟲。內服活水止風丹。外用熟地一兩。山萸肉

一兩杜仲五錢。白朮二錢。防己一錢。稀荳草三錢。清水煎服。以愈爲度。外用皂麻子三粒。打研爲膏。加紅棗肉三枚。搗成丸。如彈子大。置炭火中。隔衣薰蒸。口齶盡出。則看縫自合。

謂爲借屍還魂。或謂爲神經失常所致。但王二土產山東話向未見說過。斯爲怪異。特錄投本刊。俾資研究。

## 借屍還魂

鹽探

## 醫案

朱振聲錄

### 丁甘仁先生治驗案

一個鹽邑草堰鄉的捉魚人王二  
變了山濟東南府的軍人趙德標

#### 咳嗽門

(一)外寒引動內飲之咳嗽

錢右

欬而上氣惡寒脈浮緊。此爲中有伏飲。身感新涼。當發其汗。宣小青龍湯加減。淡干姜、細辛、仙半夏、射干、前胡。

桔梗 炙甘草

(記)此方原有五味子無射干。服之無效。後照加減法。二劑即愈。

登雲橋沈右

(二)風水咳嗽。咳嗽吐白痰。肢節痠。此爲風水。宜小青龍湯生麻黃、干姜

後經人再三問之。他說：『咱山東濟南人。叫趙德標。在二十  
五路營兵。日前在營裏吃飯。覺得一昏糊。問不知怎樣到了  
此處。』言時俱爲北方人口吻。

旋覆花 防風

(三)虛咳。

小西門趙左

歎無淚。胸背牽痛。左尺不應。右尺極強。陰分虛損。防成勞瘵。  
此事發生後。遠近傳聞。俱往觀其異。伊亦與人週旋。說者均

當予養陰清肺。

山百合 夏枯花 綠萼梅 甜齊尼 麥冬 金石斛

淨蟬衣

馬勃

蘿蔔皮

象貝母

茯苓

北沙參

(四) 支飲咳嗽。支飲內痛時咳嗽。甚則嘔吐白痰。脈遲滑。當溫下。

九畝地朱左

細辛 干姜 製甘遂 大戟 姜夏 白芥子 紅棗

(五) 痰飲咳嗽。

西門陳左

痰飲咳嗽。脈變弦。十棗湯主之。

小南門陳左小

製甘遂 炙芫花 大戟 大棗 進十棗湯。咳嗽大差。今當和之。

鹿角膠先煎 熟地 薤絲子 五味子 杜仲 澤瀉

川桂枝 生白朮 雲苓 炙甘艸

雲苓 麥冬 淮山藥 炒穀芽

(記) 丁師治咳嗽一證。最爲心得。每用輒效。蓋其胸中學識。

高人一等。觀此類醫案。豈用光杏仁象貝母者所能望其項

背耶。

(六) 肺癰。新上海縣蔡左。

小南門陳左小

欬吐綠痰。氣腥。均已全愈。刻吐白沫。脈尚滑數。仍宜清肅庚金。

小南門陳左小

花粉 麥冬 北沙參 杏仁 豬苓 川貝 知母 結梗 蘆根

小南門陳左小

生黃芪 全當歸 生潞黨 大熟地 大生地 丹參

小南門陳左小

## 虛損門

小南門王左

(一) 脾虛。脈細欲臥。頭空耳鳴。腰痛骨痠。楚少陰精髓衰也。當補之。

小南門王左

脈細欲臥。頭空耳鳴。腰痛骨痠。楚少陰精髓衰也。當補之。

小南門王左

(二) 脾虛。脈虛肢倦。面黃形瘦。泄瀉少納。脾虛也。當補之。

小南門王左

生潞黨 白生朮 淮山藥 雲苓 炒蕎豆 炒穀芽 茢仁米 炙脾 干姜 萬根

小南門王左

瀉止納增。但肢無力。足痿軟。當培中下。

小南門王左

肥玉竹 懷山藥 熟地 莡肉 川杜仲 炒穀芽

小南門王左

(記) 前方服二劑。此方服六劑。已復原矣。

小南門王左

(三) 血虛。新上海縣徐右。

小南門王左

會經崩漏咯血。血未復原。血不養筋。則四肢痠痛。項強牙痛。

小南門王左

血不化精。頭空偏痛。耳鳴時掣。血虛肝燥。肝火刑金。而欬嗽無痰。血不至海。衝任虛乏。而月事不止。診脈右寸弦。滑。爲木

小南門王左

火刑金之徵。左尺牢。寸關細甚。爲血虛的據。不是血虛。焉有許多變訛。葉氏所謂虛則百病叢生。良有以也。

小南門王左

生白芍 大砂仁 青皮 生白朮 川斷肉 川芎

川杜仲 製乳香 製沒藥

(四)陽虛

脈遲細而微。脅痛背寒。手足冷。吐黑血。短氣。此爲內有瘀血。

元陽大衰。宜壯陽化瘀。

生附片 炙潞黨 紫桂心 薑艸炭 藏紅花 桃仁

牛膝炭 十灰丸

吐黑血已止。惟陽氣未回。手足厥冷。新血未復。夜不成寐。今當壯陽和血。

生附塊、炙潞黨、生白朮、炮姜、全當歸、遠志

廣木香、棗仁、龍眼肉

夜已得睡。脅痛亦止。但背寒短氣。手足厥冷。六脈若無頭眩。欲厥急當回陽。

牛附塊、鹿角、紫桂心、參三七、生潞黨、全當歸

生白朮、干姜、炙草、硃茯神

大進溫經回陽。厥逆已回。頭眩亦止。但背尚惡寒。口喘不引。飲氣短。神疲脈亦未起。此屬太陽水津未佈。宜桂枝加附子湯。

川桂枝 生附子 生白朮 生潞黨 煙葛根 澤瀉  
炙草 紅棗 生姜 葱管

服前藥脉已復。背已溫。口亦不渴。惟氣尙短。四肢無力。當予健脾。

炙潞黨 淡干姜 生白朮 炒扁豆 懷山藥 雲茯苓  
炙甘草 全當歸 炒穀芽 川斷肉

(記)此病始於跌傷。傷則血瘀而吐黑血。驚則氣怯而陽虛。且其人素肥。血本不旺。陽本不盛。以致變病百出。治之稍緩。命必傾矣。

### 調經門

(一)寒凝經停

經停四月。腹痛脈滯。宜溫通。

製香附 艾炭炭 延胡索

荆三棱 蓬莪朢 桃仁

五靈脂 全當歸

桂心

道前街張右

(二)肝鬱經停

脈弦惡寒。時寒時熱。腹痛。經停將及三月。此爲平日多鬱。

鬱則木不暢。達血不調。和宜逍遙散加減。

柴胡 白芍 潤黨 茯苓 苍白朮

月季花 薄荷 丹皮 川芎

(三)瘀血

地骨皮 玫瑰花  
小南門炮寶女

經停七月。前服大黃鹽蟲丸合桃仁承氣湯不應。小解時少腹痛痠痛。脈滑而實。當下之。

水蛭

鹽蟲

桃仁

生黨參

生黃芪

下後氣血大虧。脈虛當和之。

黨參 黃芪 當歸 川芎 熟地 陳皮

柴胡

月事兩匝不至。少腹痛。按之尤甚。面色黧黑。脈沈實。此必內有瘀血。當下之。

抵當丸五錢 分三服開水送下

(記)服後大便下黑白穢物甚多。後與調和氣血之劑。經已行矣。

(四) 淚紫血塊

血室不利。經少瀉血。色紫成塊。腹時痛。當與通達氣機。

木防己 烏藥 柴胡 小青皮 白芍 澤瀉

吳萸 木香 桃仁 海金沙

(記)此方二劑知四劑愈。其妙用大可玩味。

(五)崩漏

脈滑崩漏不止。脾陽不攝血也。當大補氣血。

牛膝 參 大熟地 陳皮 生黃芪

(六) 血虛經少

月事或前或後。血少而淡。脈虛細。此爲血虛當補之。鐵屑四兩。紅棗二兩。右二味以水一大罐煎至半罐去滓入後藥。

生地一兩

熟地一兩

全當歸三錢

川芎一錢

生白芍一錢

阿膠五錢

陳皮二錢

(記)此方令服三劑。功效大著。

(七)倒經

經停四月有餘。五月曾有稍至。昨忽吐血盈盆。今猶未止。法當先止其衝氣。

生川軍 牛膝炭 杜紅花 茜草炭 製半夏 鮮生地

鮮茅根

(八) 下血

初會泄瀉經月。瀉止便後帶血。此爲脾氣虛寒。脾不統血也。

仲景名曰遠血治宜黃土湯。

生白朮 生地 熟附片 阿膠珠 生甘草 伏龍肝

(記)是方一服即效。後與調理脾胃而愈。

(九) 姜頭痛

虹橋李右

經停三月。左寸見動脈右三部弦滑特甚。當是瓦線之徵。定叶虺蛇之吉。因血虛肝燥頭痛目眩。腹時痛。當補血安胎。

大熟地 全當歸 川芎 大砂仁 純青皮 柴胡

葛有醫庫

新開河顧右  
火車站沈右

白芍紅棗

(十)大汗不止

藥王廟陳左

忽然大汗不止淋漓如雨。此爲衛陽失守。急宜固表以免亡。

生綿芪 五味子 生龍骨 生牡蠣 生附片 生白芍

生白朮 防風 麻黃節

外用煅龍骨末一兩 煅牡蠣末一兩 生黃芪末一兩

粳米粉二兩 共和勻用粉撲于周身。

(記)服後汗止後用黃芪一兩白朮一兩合作三次煎服愈矣。

## 朱少坡先生治驗案

朱振聲錄

楊君

三月十二日

溫毒由募原而入胃腑。丹沙密佈。起泡流血。口舌腫爛。神昏喜喎。脈數無倫。勢將燎原。急宜養血存陰。解毒通腑。

鮮生地四兩 鮑沙參二兩 大青葉三錢 虬角片一錢

先煎 生川軍六錢涼水絞汁 銀花四錢 鮑首烏二兩

元明粉四錢半 連翹四錢 全瓜蔞五錢打 廣蠻金錢半

玉泉散四兩煎湯代水

四月初六日

顧寶寶

喜食湯飲於飯後。積滯不化。腹大堅。痛脹不揚。法當攻積散加減。

上安桂三分研後入 帶皮枳榔三錢 冬瓜皮四錢 桂內金三錢 山楂炭三錢 炒白朮錢半 枳實錢半 柴

干蟾三錢 砂仁末四分 蘆薈七分

童俊翁

正月初七日

氣陽素虧。痰濕暴中陽絡。陡然神識昏蒙。言蹇舌強。手足偏右不用。流涎從左而出。溺多而清。邪勢漸迫少陰。緩則復中心絡其危立至。蓋靈明清曠之區。幾被痰濁所充塞。今接脈左經帶弦。右遲微滑。舌苔白厚。賦病起四朝。屢以西法針治。今姑以藥劑溫開。以冀解陽絡之圍。免復中之虞焉。

白附子錢半 淡干姜一錢 姜半夏四錢 北細辛五分

陳南星錢半 綠毛紅錢半 生蒼朮三錢 煙木香一錢

次 入 廣蠻金錢半 皂角刺八分 遠志肉一錢

鮮菖蒲錢半 蕤合香九二粒先開水化服

張世兄

二月初五日

風寒引動伏飲。表熱不揚。頭疼胸痞。泛嘔頻頻。口膩便洩。六

脈沉鬱。舌厚垢。始以疏化兼芳香法。

炒荆芥一錢五 白蔻仁五分(次入) 赤豬苓各三錢

蘇葉(次入)一錢五 炒薏仁四錢 醒頭艸一錢五 川

土中。肝不條達。血難應。汛而來也。

朴花一錢 白杏人去皮尖研三錢 橘紅一錢 姜半夏二錢 廣鬱金錢半

沈夫人 血熱妄行。經行先期。先崩後漏。淋漓不已。經綿將及匝月。納減肢麻。脈細帶數。治以清營洩熱。

紫丹參二錢 生白芍一錢五分 料豆衣一錢五分 功勞葉二錢 炒歸身一錢五分 川鬱金一錢 蒲黃炭七分 炒湖丹皮一錢五分 橘絡一錢 月季花一錢 茜根炭一錢五分

二月初六日

肝胃不和。於滯交阻。膀胱閃痛。泛嘔吐沫。經行逾期。脈象細

蠟丸

九月十七日

曾夫人 擦治以辛溫。

左金丸(綢包)一錢 綠萼梅一錢半 橘絡一錢 淡干姜五分 炒川棟子三錢 姜半夏三錢 酒炒元胡索錢半 廣鬱金一錢半 月季花一錢 炙九香虫一錢 八月札八分

川朴花一錢 炒陳皮一錢 赤苓四錢 生薏仁四錢

炒枳實一錢半 宋半夏三錢 泽瀉一錢半 佩蘭一錢半 炒蒼朮一錢半 鹽水煅石決明六錢

馬世兄

九月十七日

無端暴喘。脈遲舌絳無苔。水液上泛。肺部幾成澤國。時醫因其舌絳而誤投石膏。於是頭汗如雨。欬聲如劈竹矣。急宜溫開以冀萬一。

白附子一錢 北細辛三分 遠志肉(甘草三分炒)八分水炙麻黃(滑根)四分 天將壳(綢包)七分 白芥子一錢 川桂枝五分 紫苑八分 帶皮芩四錢 橘紅絡各

(接)九香蟲產於貴州赤水河中。鹹溫壯元陽。治膈脛滯氣。脾胃不足。

錢夫人 癸水兩月一行。色黯腹痛。脫落口燥。脈細濡。此屬木鬱陷於

九月十三日  
一錢 姜半夏三錢 廣玉金錢半 加煨生姜三片

癸水兩月一行。色黯腹痛。脫落口燥。脈細濡。此屬木鬱陷於

表期到書借

▲▲  
編者本刊  
**中醫朱振聲診例**  
▼▼

科 目

內外婦幼各科

時 間

門診上午九時至下午四時出診四時以後

診 金


門診一元出診四元

診 所

上海三馬路雲南路老會樂里第一弄第一家

通函論症  
寄下原班還件

外埠通函論症第一次納費二元覆診減半先患  
後覆惟來函須詳述現在病狀及經過情形掛號



中華民國廿四年四月出版

萬有醫庫續集

每部分上下二冊

定價大洋二元

版權所有  
翻印必究

編著者 中醫朱振聲

幸 上海三馬路  
雲 福書局  
南 路轉角

發行者

印刷者 興羣印刷所

