







原件短缺

有紅絲至心生於唇口之內者多有紅絲入
喉急用針挑出惡血以泄其毒可保無虞其
在偏僻之處藥難導達者惟灸法有回生之
功若投峻厲之劑是促其危矣小兒肌肉脆
嫩且不能言痛否灸法須將蒜切薄片著肉
一面略剝少空灼艾燃蒜先置大人臂上試
其冷熱得宜然後移著瘡上又別灼蒜如前
法試之以待相易勿令間歇

毗陵金文治子將週歲唇上患疔余用活命
飲母子並服更欲隔蒜灸彼不從見腫勢益
盛勉灸數壯余誠以多灸爲佳又爲人所阻
而止頭面益腫乃復灸五十餘壯腫勢漸消
時與乳母服活命飲瘡出黃水翌日潰而得
生

一小兒三歲手患紫疔二顆寒熱作痛用仙
方活命飲半盃而愈數日後手臂俱腫乃用
隔蒜灸服前藥而愈

一小兒足患之嘔吐腹脹二日不食欲用護
心散診氣口脈大審其大便所出皆酸穢余
曰此飲食停滯耳非瘡毒內攻也若用護心
等劑則誤矣急投保和丸二服及隔蒜灸而
愈其時同患是症用護心敗毒之劑者俱致
不救

一小兒面上患之寒熱發搐此熱極而肝火

動也用荆防敗毒散及隔蒜灸搐止熱退更服異功散加升麻柴胡桔梗而愈

一小兒患於胃外敷寒涼內服敗毒更欲嘔不食面色痿黃右關脈浮數按之微細此脾胃復傷所致也急用隔蒜灸服異功散倍加白朮半夏翌日又服活命飲而愈

一小兒患前症服敗毒之藥作嘔不食余謂胃氣復傷不信另服護心散嘔甚神思沉困

手足並冷脈微細如無急用五味異功散加

乾薑二服嘔止食進去薑又四服而愈夫護

心散皆寒涼之藥乃宋人爲服丹砂蓄熱發

疽者而設醫有傷卽當溫補多因此藥停

於胃隔惟覺陰冷作嘔沉困者世人皆謂毒

氣攻心而遂槩用之其鮮有不敗事者矣

一小兒手背患此敷服皆寒涼之劑腹脹痰

喘瀉糞穢臭余謂脾胃復傷而飲食停滯也

不信仍服治瘡之藥而歿

一小兒臂患之色赤腫起恪用化毒丹鐵箱

散腫處頓平肉色白陷再日色黯痰喘氣促

余謂瘡毒反入於內也辭不治果歿

飛龍奪命丹治瘡毒發背腦疽等症

真蟾酥乾者酒化輕粉 枯白礬

寒水石 銅碌 乳香

沒藥 麝香 朱砂各六錢

蝸牛四十箇另研如無亦可

右各為末入蟾酥蝸牛或加酒少許糊丸

菘豆大每服一二丸温酒或葱湯下重者

外用隔蒜灸法

荆防敗毒散即人參敗毒散加荆芥防風方見

流注

仙方活命飲方見熱毒瘡瘍

保和丸方見發熱不止

五味異功散

方見敗毒之藥

時毒

二頭面赤腫

小兒時毒因感四時不正之氣致鼻面耳項或咽喉赤腫寒熱頭痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞狀如傷寒五七日間亦能殺人脉浮數者邪在表脉沉濇者邪在裡在表用葛根牛蒡子湯在裏用梔子仁湯表裡俱病者犀角升麻湯甚則宜砭及用通氣散宣泄其毒旬

日自消若不消而欲作膿者用托裏消毒散欲收斂者用托裡散若咽腫不能言頭腫不能食者必死

一 小兒患此三日二便調和用葛根牛蒡子湯漫腫悉退惟頰間赤腫欲作膿用活命飲二服外用代針膏而膿出再用托裏消毒散而愈

一 小兒腫赤焮痛此欲作膿也用托裏消毒

散二劑膿成針之腫痛頓減又二劑漸愈却以柴胡梔子散加白芷升麻與母服之愈一小兒腫焮作痛藥不能下咽先用通氣散連作噫却用犀角升麻湯乳食稍進腫痛漸消仍服數劑而膿血漸少毋服加味道遙散而愈

一小兒患之咽喉作痛二便自調用葛根牛蒡子湯三劑甘桔湯四劑腫痛漸愈診乳母

左關脈弦數用加味道遙散母子並服而消一小兒患之赤腫作喝外敷內服皆寒涼之藥余欲洗去敷藥急用發散表邪開通腠理之劑不信仍用前藥遂至不救通氣散治時毒焮痛咽喉不利取嚏以泄其毒

玄胡索

猪牙皂角

川芎

各一錢

藜蘆

五分

半躑躅花

三分

右為細末用紙撚蘸少許絛鼻內取嚏為

効

甘桔湯治肺經壅熱胃隔不利咽喉腫痛痰

涎壅盛

方見時毒

犀角升麻湯治風熱口唇頰車迎牙腫痛

犀角

錢二

升麻

防風

羌活

川芎

白芷

各五錢

黃芩

甘草

各一錢

白附子

四分

右每服三五錢

梔子仁湯治時毒腫痛大便秘結

鬱金

枳殼

炒

升麻

山梔仁

牛蒡子

研碎

大黃

炒各等分

右為細末每服二三錢密水調服

葛根牛蒡子湯治時毒腫痛消毒解熱

葛根

管仲

甘草

江西豆豉

牛蒡子

半生半炒研碎各等分

右每服三五錢水煎

柴胡梔子散

方見脇癰

托裏消毒散

代針膏

托裡散

仙方活命飲

四方並見熱毒瘡瘍

加味逍遙散

方見發熱不止

流注

三

小兒流注乃氣流而注血滯而凝元氣不足之症也或因閃跌墮傷或因肝火氣逆或因六淫內侵或因脾虛食積或因稟賦所致結於四肢節髀患於胃腹腰髻或結塊或漫腫或作痛悉用葱熨之法須固元氣為主閃跌者和血定痛丸肝火者九味蘆薈丸食積者四味肥兒丸藥能對症未成自消已成自潰若膿成不潰者元氣虛也先補而針之庶使

毒氣不致內攻氣血不致脫陷若膿出而反
痛者氣血虧也用八珍湯作嘔少食者胃氣
虛也用四君子湯欲嘔不食或腹作脹者脾
氣虛也用六君子湯口噤搐搦者氣血虛極
而變症也十全大補湯內熱晡熱陰血虛也
四物參芪白朮表熱惡寒陽氣虛也十全大
補湯熱來復去或晝見夜伏晝伏夜發者虛
熱也當大補元氣若色赤腫起而膿稠者尚
可治不赤硬而膿清或脈洪大寒熱發渴及
不受補者皆不可治

楊鴻臚子年十二左脇下患此服流氣飲十
宣散之類元氣益虛年餘不斂左尺脈數而
無力左關脈弦而短此肝經之症因稟腎水
不足不能滋養肝木血燥火熾而然耳用六
味地黃丸以滋腎水九味蘆薈丸以清肝火
而愈

一合嬰提要卷三
十一
一小兒九歲患此久不收斂或咳嗽或寒熱
皆服清氣化痰之藥前症益甚至夜作喘口
開徹夜不寐手足並冷藥餌到口即嘔余謂
悉因脾氣虛甚所致先以人參白朮各五錢
炮薑五分以米湯煎之時灌數匙次日能服
一盃次日又服一劑諸症漸愈至十餘劑後
朝用補中益氣湯夕用異功散而愈

李通府子十六歲腰患之三年不愈色黯下
陷余曰此腎經症也宜用六味丸滋化源以
生腎水更用如聖餅外散寒邪以接陽氣不
信別用雜藥元氣益虛七惡蜂起始信余言
仍用前藥而愈

陳州守子閃右臂腕腫痛用流氣等藥發熱
惡寒飲食少思口舌乾燥腫痛愈熾形氣益
疲余以助胃壯氣爲主佐以外治之法而愈
黃地官子腿患之腫痛發熱以濕毒治之虛

症悉至余謂此元氣虛弱外邪乘之也用十全大補湯如聖餅而愈

一小兒臂肘腫硬用流氣飲肉色不變飲食少思余曰此肝脾虛症也用六君桔梗薄桂茯苓半夏及如聖餅而消

一小兒腿腕間患此已半載腫硬色白形氣俱虛余先用五味異功散加當歸三十餘劑却佐以八珍湯二十餘劑更用葱熨法腫勢

漸消中間一塊仍腫此欲作膿也當補其血氣遂用托裡散為主異功散為佐仍用葱熨法月許針出稠膿仍用前二藥及豆豉餅三月餘而愈

一小兒腿患之腫硬色白惡寒懶食此脾胃陽氣虛而不能成膿也非敷貼敗毒所能療遂用托裡散及葱熨法月餘患處脹痛發熱膿成針之膿出而安仍用托裡散肢體漸健

因飲食內傷泄瀉忽口襟目閉自汗手冷此脾胃虛寒之惡症也以異功散內用人參一兩乾薑一錢半灌之盡劑而甦又以托裡散內用人參五錢數劑始能動履却用托裡散大補湯恣慰法豆豉餅半載而愈

一小兒十五歲早喪天真日晡發熱遍身作痛或四肢酸軟唾痰頭暈服祛濕化痰之藥腿之內外肉色腫硬而不變因服攻毒之藥

瘡症蜂起按褚氏云男子精未滿而御女以通其精五臟有不滿之處異日有難狀之疾正合此論遂用補中益氣湯及地黃丸半年而愈此等症候誤認爲實熱而用敗毒之藥者必致不救

賈閣老子年十六患此二載矣脈洪大而數膿清熱渴食少體倦夜間盜汗午前畏寒余曰此真氣不足邪氣有餘之症治之無功矣

保嬰攝要卷三
三
彼懇求治午前勉用四君芩歸炙草午後四
君麥門五味逾月諸症漸減有用滲利之劑
保其必全者彼信服之形體骨立未幾而歿
一小兒右腿腕壅腫形體怯弱余欲以補氣
血為主佐以行散之劑彼不信反內服流氣
飲外敷寒涼藥加發熱惡寒形體愈瘠始求
治於余余曰惡寒發熱脉至洪大乃氣血虛
敗之惡症也不可治矣後潰而不斂瀝盡氣

血而下

掌教顧東帆子十餘歲秋間腰腿隱隱牽痛
面色青中兼黑余曰青是肝虛黑是腎虛當
急調補脾腎否則春間必患流注矣不信另
用行氣破血之藥至夏腰臀間漫腫五寸許
復來請治脉數而滑按之如無此元氣虛極
而膿內潰不能起也辭不治後果歿
健脾滲濕飲治瘡瘍初起焮腫作痛或濕毒

下注或環跳穴痛

人參

白朮

蒼朮

防已

酒拌

黃柏

炒

川芎

陳皮

當歸

茯苓

各五分

木瓜

不犯鐵器

柴胡稍

甘草

各三分

右薑水煎服如三五劑不退加桂少許酒

煎亦可小便澀加牛膝身痛加羌活

和血定痛丸

一名黑九子

治流注膝風或閃跌瘰

血收節腫痛服之自消若潰而發熱與補

藥兼服自效

百草霜

兩五

赤小豆

兩八

川烏

炮一兩五錢

白蘇

兩八

白芨

南星

炮各二兩

芍藥

當歸

牛膝

各五兩

骨碎補

兩四

右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸白

湯下

神効葱熨法治流注結核或骨癰鶴膝等症
先用隔蒜灸若餘腫尚存用此熨之以助
氣行血散其壅滯功效甚速又治跌撲損
傷止痛散血消腫之良法也其法用葱細
切搗爛炒熱熨患處冷則易之如鶴膝
風兼服大防風湯而愈

隔蒜灸法治流注及癰疽鶴膝風等症每日
灸二三十壯痛者灸至不痛不痛者灸至

痛其毒隨火而散蓋火以暢達拔引鬱毒
此從治之法有回生之功其法用大蒜去
皮切三文錢厚安患處用艾壯於蒜上灸
之三壯換蒜復灸未成即消已成者亦殺
其毒如瘡大用蒜杵爛攤患處將艾鋪上
燒之蒜敗再易如不痛或作膿或不起發
及瘡屬陰症者尤當多灸凡瘡不痛不作
膿不發起者皆氣血虛也多主不治惟患

在頭面者不宜多灸論中嬰兒灸法見疔瘡

如聖餅治流注及一切瘡瘍不能消散或潰而不斂

乳香

沒藥

木香

血竭

當歸

各等分

麝香

減半

右為末用酒糊和餅二箇乘熱慰之毒瘡加蟾酥

六味丸一名地黃丸此壯水之劑也夫人之生以腎為主凡病皆由腎虛而致其流注癰瘰屬肝腎二經發熱作渴小便淋秘痰氣壅盛嗽血吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰膝痠軟五臟虛損尤宜用之乃水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也方見發熱不止

當歸補血湯治流注及潰瘍肌熱面赤煩渴
脉洪大而虛重按全無此血虛症也誤服
白虎湯必死 方見發熱不止

益氣養榮湯治流注氣血虛弱不消散或四
肢頸項患腫不問堅軟赤白或痛或不痛
日晡發熱或潰而不斂 方見鶴膝風

十全大補湯治諸瘡血氣虛弱不能消散潰
腐收斂或寒熱汗出口眼歪斜肌瘦少食

或日晡發熱自汗盜汗或朝寒暮熱瘡口
不斂等症 方見便癰

天蛇毒

四

手指頭生瘡俗名天蛇毒然五指各有經絡
拇指屬手太陰肺經食指屬手陽明大腸經
中指屬手厥陰心包絡經無名指屬手少陽
三焦經小指屬手少陰心經亦有患於足者
足趺屬肝膽胃三經大脂屬肝脾二經次指

屬膽經小指屬膀胱經各當隨經而治其致
患之由或因胃中積熱所發或因乳母膏粱
厚味所致或因濕熱下流或因風毒外中大
率多由所稟足三陰之經虛故邪得以入之
也其初患腫痛者先用仙方活命飲次用托
裡消毒散元氣下陷重墜作痛久而不潰者
用補中益氣湯若服敗毒散及敷寒涼之劑
則瘡口變黑或努肉突出或指皆黑大抵手

足爲氣血難到之處手屬於胃足屬於脾不
可損其真氣丹溪以醫居僻位尚言氣血罕
到况肢末乎故寒涼克伐之藥所宜深戒者
也

一小兒十四歲手大指患之色赤腫痛用奪
命丹二粒活命飲一劑將愈因飲酒沐浴而
瘡復作發熱咳嗽余謂此毒原屬肺經今肺
爲濕熱所攻瘡毒乘勢妄行故復作耳先用

瀉白散二劑而痰嗽除又用托裡消毒散而瘡愈

一小兒食指患之迸出血水瘡口凸腫上連手背久而不愈余曰此元氣虛弱風邪襲於患處血氣不能運及而然用托裡散及慈慰之法諸症悉退又用荳豉餅異功散加升麻柴胡而愈

一小兒患之作痛發熱內外背用寒涼之藥手背出膿三月不愈面色痿黃此脾氣復傷也先用異功散加升麻柴胡桔梗漸愈又佐以托裡散豆豉餅而痊

一小兒十三歲素食膏粱足大指患之腫連脚面喜飲冷水右關脉洪大此脾氣復傷而積熱下注也先用清胃散四劑次用活命飲二劑腫痛漸消又用托裡消毒散數劑膿潰而愈

一小兒足大指漫腫上連趺陽色赤腫甚右
關脉數而有力此胃經濕熱下注也用活命
飲一劑大指本節後始發瘡頭痛亦稍止再
劑而漫腫悉退又用消毒散出膿托裡散收
斂而愈

一小兒足次指患之色赤腫痛上連於腿外
塗寒涼之藥反致麻木重搯方知此氣血難
到之所又因寒涼遏絕而然急以活命飲加

白芷五錢煎服外以薑葱湯洗去敷藥用隔
蒜灸法半晌知痛其腫頓退再用托裡散加
人參三錢數劑膿潰而愈

一小兒足大指患之內服外敷皆寒藥也腹
痛惡心手指並冷此脾胃之氣復傷而作非
瘡毒也先用異功散加柴胡升麻白芷及仙
活命飲各一劑諸症頓退又用托裡消毒散
膿潰而愈

一 小兒足大指患之變膿窠之狀良久乾硬
痛甚小便頻數此稟父腎經虛熱所致用六
味地黃丸而愈

一 小兒足中指患之耳中腫痛小便頻數此
稟父肝腎虛熱爲患用六味地黃丸爲主佐
以柴胡梔子散而愈

一 小兒不時生瘡脂在手足之表年餘不愈
審其乳母善怒用加味道遙散母一服而愈

一 小兒足大指患之腫痛連脚用活命飲及
隔蒜灸其痛不止着肉艾灸數壯方止用活
命飲及托裡消毒散而愈

一 女子十五歲足拇指痒痛敷敗毒之藥勢
益甚而色黯余謂脾經鬱結所致彼人略不
經意後朝寒暮熱飲食頓減患處微腫足脛
漸細而歿

錢氏瀉白散 方見臂癰

奪命丹

方見疥瘡

消毒散

方見胎毒發丹

葱慰法

托裏散

二方見流注

仙方活命飲

托裡消毒散

二方見熱毒瘡瘍

東垣清胃散

方見腹癰

五味異攻散

方見敗毒之藥

補中益氣湯

方見肌肉不生

天泡瘡

五

天泡瘡狀如水泡屬肺胃二經風熱若發熱

焮痛邪在表也用人參敗毒散發熱咳嗽邪

在肺也用加味瀉白散熱渴便秘邪在內也

用加味清涼飲此肌膚之症當去毒水以金

黃散或黃栢蚯蚓敷之當歸膏亦善既安不

必服藥若因攻伐過度元氣虛而變生別症

者當參各門治之

一小兒患此焮赤惡寒發熱大小便赤澁此邪在表裡之間遂外敷金黃散內服大連翹飲子諸症少愈更加味解毒散而痊

一小兒患之焮痛發熱大小便如常此邪在表也挑去毒水敷金黃散用荆防敗毒散治其表柴芍參苓散安其裏而愈

一小兒患此服敗毒之劑喘嗽唇白此脾肺之氣復傷也先用補中益氣湯一劑諸症悉退後加桔梗白芷二劑而愈

一小兒患此服敗毒散傳寒涼藥嘔吐泄瀉猶索敗毒散余佯諾之却以五味異功散加柴胡升麻而吐瀉愈又用柴芍參苓散而痊

一小兒患此服敗毒之藥腹痛泄瀉余意脾氣復傷宜用五味異功散不信仍服敗毒之

藥後果不食作嘔流涎泄瀉後重余先用補中益氣湯次用五味異功散而愈

一小兒患此服敗毒散作渴飲湯余與七味

白朮散治之不信自服敗毒之藥前症益甚

更加嘔吐不食來請治余曰嘔吐不食手足

全冷痰喘氣促唇色皎白始見虛寒即當溫

補反服攻伐元氣之藥虛而又虛今脾肺敗

症已見莫能為矣辭之果不治

柴芍參苓散治肝膽經分患天泡等瘡或熱毒癰瘰之類

柴胡

芍藥

人參

白朮

茯苓

陳皮

當歸

牡丹皮

山梔炒

甘草

各三分

右每服二錢水煎服

加味解毒散治天泡瘡發熱作痛即加味消

毒散加金銀花漏蘆

玄參

連翹

升麻

芍藥

當歸

羌活

生地黃

牛蒡子

炒各三錢

黃苓

甘草各二錢

金銀花

漏蘆各五錢

右每服一二錢水煎服或用蜜丸

金黃散治天泡瘡消毒止痛

滑石

甘草

右各另為末和勻傳患處如泡挑去水傳

之加黃栢尤好

補中益氣湯

方見肌肉不生

五味異功散

方見敗毒之藥

加味瀉白散

即瀉白散加山梔杏仁

楊梅瘡

六

楊梅瘡乃天行時毒亦有傳染而患之或稟賦所得者受症在肝故多起於下部治失其

宜多致蝕傷眼目腐敗腎莖拳攣肢節初起之時上體多者先用荊防敗毒散下體多者先用龍膽瀉肝湯大便秘者用大連翹飲後用換肌消毒散若蝕傷眼目兼用九味蘆薈丸六味地黃丸肢節拳攣兼用蠲痺解毒湯若因脾胃虧損而不能愈者先用異功散後用換肌消毒散若用輕粉之藥多致敗症也

一小兒周歲傳染此瘡誤薰銀硃之藥昏憤不乳遍身無皮用录荳黃柏遍摻蓆上令兒睡卧更用金銀花生甘草爲末白湯調服漸愈若瘡乾燥吏用當歸膏誤用輕粉者亦以前藥解之

一小兒患此年餘不愈形體消瘦日晡尤甚朝用八珍湯夕用換肌散并太乙膏三月餘而愈

一小兒原有肝疳後染前症膿水淋漓腹脹

嘔吐小腹重墜余欲用補中益氣湯升補中
氣不信仍服消毒之劑更喘嗽流涎余謂脾
氣虛而肺氣弱也朝用補中益氣湯夕用五
味異功散元氣漸復乃佐以換肌消毒散尋
愈
一小兒因母曾患此症生下即有用換肌散
毋服五十餘劑子用當歸膏調金黃散隨患
處傳之尋愈

一小兒十四歲患此用薰法肢體面目悉皆
浮腫數日間遍身皮膚皆潰如無皮狀膿水
淋漓先用金銀花甘草煎湯與之恣飲又爲
末摻遍身及鋪枕蓆令兒卧之半月許皮膚
稍愈却佐以換肌散而愈又一小兒二歲用
薰法吐痰喘躁不及治而死

換肌消毒散

一名革
薛散

治楊梅瘡不拘初忌日

又並効

土茯苓

即草薺

當歸

白芷

甘草

皂角刺

薏苡仁

白蘚皮

木瓜

不犯鐵器

右水煎食前并空心服

又方 治大人之劑如用前方未應或見長

大宜用此方

土茯苓

五錢

當歸

白芷

皂角刺

炒

薏苡仁

各一錢

白蘚皮

木瓜

不犯鐵器

木通

金銀花

各七分

甘草

連翹

防風

各五分

茯苓

一錢

黃芪

炒二錢

芍藥

炒一錢

川芎

八分

生地黃

八分

右作二三劑水煎出切者作一劑煎分兩

三次服

蠲痺解毒湯

薑黃

羌活

白蘚皮

赤芍藥

當歸各四分

白朮五分

茯苓

白芷

皂角子炒各三分

右水煎服

九味蘆薈丸 方見喉痺

當歸膏 方見湯火瘡

太乙膏 方見跌撲外傷

金黃散 方見泡瘡

赤白遊風 七

赤白遊風屬風熱血熱蓋血得熱而遊走耳

白屬氣分赤屬血分或因腠理不密風熱相

搏拂鬱而成或因乳母食膏粱厚味所致若

風熱者用小柴胡湯加防風連翹血熱者用

四物湯加柴胡山梔牡丹皮風熱相搏者用

人參敗毒散內熱外寒者用加味羌活散胃

氣虛弱者用補中益氣湯加羌活防風或消

風散血虛者用加味道遙散如未應用逍遙

散六味丸若嬰兒患此當審其受症之因而調治其母

一小兒患此其色或赤或白或痛或痒詢之因母食膏粱厚味所致余用東垣清胃散治其母牛黃散治其兒而愈

一小兒患此因母鬱怒所致母用加味小柴胡湯及加味道遙散兒熱止又以加味歸脾湯而愈

一小兒患此嗜膏粱甜味齒齦浮腫漸至蝕爛先用清胃散後以四味以兒丸間服而愈

一小兒患此色赤作痒脉浮數此肺胃二經風熱也用人參消風散而愈又因停食復發色赤作痛先用保和丸後用異功散而消

一小兒患此作痒搔破膿水淋漓寒熱往來此肝經血燥而生風先用加味道遙散肝症頓退倦怠少食用異功散三黃散而愈

一女子十五歲患此色赤作痒寒熱脇痛面青或赤此肝火動而血熱也先用加味道遙散加膽草四劑諸症頓退但體倦少食惡寒欲嘔此脾爲肝木所侮而肺氣虛也用五味異功散及加味道遙散而愈

一女子患此寒熱作嘔先用加味小柴胡湯二劑而安再用人參消風散而愈後因怒發熱經行如崩遍身赤色四肢抽搐難以診脈

視其面色如赭此肝心二經木火相搏而血妄行耳先用柴胡梔子散再加味道遙散諸症頓退又用八珍湯而痊

一小兒因母感寒腹痛飲燒酒兒遍身皆赤遊走不定昏憤發熱令乳母時飲冷米醋一二杯亦以二三滴塗兒口內週日而痊
歸脾湯治小兒因乳母憂思腸脾血虛發熱患前症久不愈食少體倦或便血下血怔忡

不寧驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗等症
方赤遊風

人參消風散治赤白遊風或風熱隱疹搔痒
或寒熱作痛

人參

錢三

荆芥穗

甘草

炙

陳皮

錢各五

白殭蠶

茯苓

防風

芎藭

藿香

蟬蛻

錢各三

厚朴

錢三
薑製

羌活

錢二

右每服一二錢水煎

加味逍遙散 方見發熱不止

三黃散 方見黃水瘡

柴胡梔子散 方見脇癰

小柴胡湯 方見腋癰

加味小柴胡湯 方見熱毒瘰癧

牛黃解毒散 方見頭面瘡

發癩

八

潔古云癩疹之病焮腫於外者屬少陽相火也謂之癩小紅屬隱於皮膚之中者屬少陰君火也謂之疹癩疹金出則小兒難禁然首尾俱不可下大抵安裏之藥多發表之藥少小便秘則微踈之身溫者順身涼者逆大忌外敷寒涼內用踈導無此二者可保無虞

一 小兒患癩發熱體倦少食此脾肺氣虛外邪相搏也先用消風散二劑隨用補中益氣湯加茯苓芍藥而愈

一 小兒患癩作痛熱渴服發表之劑益甚形氣倦怠脈浮而數此真氣復損而然耳遂用人參安胃散補中益氣湯而愈

一 小兒患癩發熱用犀角消毒散一劑吐瀉頓作余曰此邪氣上下俱出矣勿藥自愈未幾果安

一 小兒素面白患疹作痒鼻塞流涕咳嗽不

止用敗毒散膿水淋漓惡寒喘急朝寒暮熱
余謂脾肺之氣復傷耳用補中益氣湯稍愈
佐以五味異功散而愈

一小兒患疹寒熱搔痒先用消風散治其兒
次用加味道遙散治其母兩月而愈

一小兒患癩作渴發熱咳嗽此邪在表宜汗
之先用葛根橘皮湯一劑次用玄參橘皮湯
而安癸丑歲患此症者余先用葛根橘皮湯

仍用玄參橘皮而全愈

一小兒患疹先用抱龍丸解之彼之父母另

用以他藥下之其疹稠密余曰凡瘡疹始出
未有他症但須用平和之藥以解之如三日
不出或出而不快宜微發之更又不出當再
發之出而不多脉和平者無他症也若瘡疹
本稀少者不可更發若瘡疹起發而能飲食
者以大黃丸下一二次若初起就用下行之

齊則裡虛而瘡疹不能盡發出而稠密難治
至三日其瘡疹黑陷所喜特不寒戰余遂用
百祥丸及牛李膏各一服其瘡疹復紅活而
愈

一男兒因戲鞦韆絕繩而墜遂患急驚發搐
或用以表散之藥不愈余曰此乃急驚當先
退其熱遂用以大黃丸王露散及惺惺丸又
加以牛黃龍麝解之至三日肌膚尚熱余曰

方補

再二日不愈必發癩瘡也已而果然用服必
勝散七日而愈此乃初因誤散其表則內熱
不止而癩疹必自生也若幼小之兒猶宜謹
慎

百祥丸治痘瘡及癩疹黑陷嗽吐青綠水

紅牙大戟

陰乾漿水煑軟去
骨復入原汁中煑

右焙乾為末水丸粟米大每服十丸赤脂
麻湯下服後須急以四君子加丁香陳皮

木香厚朴炮薑以溫補土脾若身熱飲水
黑陷復起十中可救一二

牛李膏治痘瘡癰疹黑陷

牛李子

右杵汁石器內熬膏每服皂子大煎杏膠湯化下

玉露散治傷熱吐瀉黃色後藥為末每服五分白滾湯調下

石膏煨 寒水石各五分 甘草二錢五分

人參安胃散治癰疹及服峻劑以致虧損脾

胃虛熱泄瀉嘔吐飲食少思等症喉痺

犀角消毒散治癰疹丹毒發熱痛痒及瘡疹

等症

牛蒡子

甘草

荆芥

防風各五分

犀角鎊二分

金銀花三分

右水煎熟入犀角傾出服

補中益氣湯方見肌肉不止

五味異功散方見敗毒之藥

加味道遙散

方見發熱不止

黃水粘瘡

九

小兒黃水粘瘡屬肝脾二經風熱積熱所致邪在表而痒痛者輕則犀角消毒散重則連翹防風湯邪在內而大便秘者輕則九味解毒散重則大連翹飲若頭目不清憎寒壯熱作渴便秘者表裏俱有邪也加味清涼飲若誤服剋伐之藥而致發熱惡寒者肺氣傷也

用四君桔梗柴胡發熱嘔吐胃氣傷也用異功散發熱作瀉脾氣虛也用六君子湯並加柴胡升麻餘當隨症裁之

一小兒患此膿水淋漓寒熱作痛服抱龍丸敗毒散更加氣喘等症蓋氣喘發搐乃肝火乘脾咬牙流涎乃脾氣虛寒遂朝用補中益氣湯夕用五味異功散外敷立效散而愈
一小兒患此發熱驚悸倦怠面黃懶食流涎

服清涼之藥更加吐瀉睡而露睛余謂心脾
虛熱用六君乾薑一劑頓愈又用異功散立
効散而愈

一小兒患此或痒或痛膿水瀝淋服表散之
劑更惡寒發熱嘔吐不食手足並冷此病氣
實而元氣虛也先用異功散加桔梗藿香而
嘔吐止又用異功散而寒熱除用人參消風
散而瘡愈

一小兒所患同前服荆防敗毒散加喘嗽腹
脹四肢發搐此脾肺氣虛而肝木乘之用異
功散加柴胡升麻桔梗一劑諸症頓退又服
異功散二劑而愈

一小兒患此服抱龍丸之類汗出喘嗽此肺
氣虛而爲外邪所乘也用異功散加桔梗二
劑又傷風發熱咳嗽其瘡復甚用惺惺散一
服外邪頓退又用異功散而痊

毛通府子患此卯關脉青兩目時劓刑體困
倦此土虛木旺當用和肝補脾湯反服敗毒
散前症益甚更加吐瀉不食遍身發泡余用
前湯刺泡出水用菘苳甘草末頻鋪簾上任
兒睡卧後用神効當歸膏而愈

沈尚寶子患此咳嗽惡寒用大連翹飲腹脹
少食此表症瀉裏致元氣復損非其治也用
補中益氣湯而愈

一小兒患此作痒發熱膿水淋漓面青惡寒
此肝火血熱用味道遙散稍愈又用和肝補
脾湯而痊

一女十四歲遍身疙瘡搔破膿水淋漓發熱
煩躁日晡益甚此血氣虛而有熱也用加味
逍遙散而愈

大連翹飲治風毒熱毒發熱作痛二便不利
表裏俱實 方見臂癰

柴胡 梔子散治肝膽風熱生瘡作痛發熱或

瘡破而膿水淋漓或發寒熱晡熱即柴胡

梔子散 方見脇癰

犀角消毒散治熱毒積毒發于肌表而頭面

生瘡或痛或痒者 方見發癩

九味解毒散治熱毒胎毒而發瘡瘍之類未

潰作痛者

黃連 分三

金銀花

連翹

漏蘆 分各五

山梔 分四

白芷 分六

當歸 分八

防風 分三

甘草 分三

右水煎服

黃連消毒散治腦疽背疽腫焮疼痛或麻木

者

黃連 製不

羌活 分各一

黃芩

黃柏 分各五

生地黃

知母 製

獨活

防風

當歸尾

連翹各四分

藁本

防已

桔梗各五分

黃芪

蘇木

陳皮

澤瀉各二分

人參

甘草各三分

右水煎服

人參消風散治小兒瘡瘍膿水淋漓誤服表散之劑更兼惡寒發熱嘔吐不時不思飲食或痺或痛手足並冷元氣甚虛頭目拘

急肢體煩疼肌肉顫動耳若蟬鳴鼻塞多

疔皮膚頑麻瘙痒癩疹日澁昏困方見赤白遊風

連翹防風湯治小兒肝脾風熱時毒頭面生

瘡

連翹研碎

防風

黃連

陳皮

芍藥

當歸

獨活

白蒺藜炒去刺

荆芥

茯苓

黃芩

甘草

平葶子

炒研等分

右每服二錢水煎服

惺惺散治風寒瘡疹痰嗽發熱

桔梗

細辛

人參

白朮

甘草

瓜蒌根

白茯苓

右為末每服二錢入薄荷五葉水煎服

和肝補脾湯治風熱瘡疹脾土不及肝木太

過

人參

陳皮

川芎

各五分

白朮

茯苓

芍藥

各七分

柴胡

甘草

各三分

山梔

炒四分

右作二劑水煎服

益脾清肝散治肝脾風熱瘡寒熱體痛脾胃

虛弱

人參

白朮

茯苓

甘草

川芎

當歸

黃芪

各三分

柴胡

牡丹皮

各二分

右水煎服

三黃散治風熱疔熱生瘡水浸淫膿流處便

濕爛

松香

五倍子

黃連

黃丹

海螵蛸

各一錢

輕粉

雄黃

各炒許

平瀉清沈元房補

右各為細末用猪脂油調塗瘡上如瘡瘍有膿水者更須以細末乾摻瘡上先拭洗膿水而敷之

荆防敗毒散治瘡瘍焮痛或發寒熱或頭目拘急脹痛邪在表者及膿水淋漓或痒或痛者

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳殼

茯苓

川芎

甘草

荆芥

防風各等分

右水煎服

立効散治眉瘡耳瘡及一切瘡瘍瘡疥

定粉

松香

黃栢

黃連各五錢

枯礬二錢

為末清燭油調搽

一頭面瘡十

頭額瘡發者皆屬心經耳瘡少陽經發兩鬢

者皆屬膽經發於頰前鼻孔及人中左右者皆屬大腸經發於鼻之挾孔下唇口反承漿頤後頰車耳前髮際額顛者皆屬胃經發於目內眦上額尖至後腦項者皆屬膀胱經既察其經即當分治若稟腎火者用六味地黃丸胎毒者犀角消毒丸食積疳者四味肥兒丸乳母膏梁者東垣清胃散至於諸腑受病必兼諸臟故患於額間屬心經發熱飲冷者

爲實熱用導赤散發熱飲湯者屬虛熱用養
心湯左腮屬肝經或頸項勁強者爲實熱用
柴胡清肝散或咬牙頓悶者虛熱用六味地
黃丸右腮屬肺經喘嗽飲冷者爲實熱瀉白
散發熱咳嗽者爲火刑金用人參平肺散鼻
間屬胃經發熱飲冷大便黃硬者爲實熱用
瀉黃散發熱飲湯大便青白者爲虛熱用異
攻散患於頰及耳輪者屬膀胱經腎無實症
惟用地黃丸若瘡已潰久而不愈則當審其
臟氣之相勝病邪之傳變而以調補脾胃爲
主若因乳母遺熱爲患者當先治其母則兒
病自愈也

一小兒鬢竇一瘡腫赤作痛余謂屬手足少
陽經風熱用柴胡梔子散不應診其母左寸
關脉弦洪而數即以前藥令母服之兒遂愈
一小兒十三歲右頰患腫作痛飲冷脉沉實

重按則數此積熱在臟也當踈通其內不信
乃泛服雜藥兼敷寒涼腫硬下頸內潰復來
請治脉已無力矣先用托裡散二劑針
二劑而膿始出惡寒少頃煩躁發熱作渴痰
喘此潰後變症因氣血虛故也先用當歸補
血湯二劑諸症頓止又用異功散加山梔胃
氣亦健末用托裡消毒散瘡斂而愈

一小兒右腮赤腫余謂胃經有熱先用瀉
散二服又用清胃散而愈後復患之敷石灰
等藥致傷其血瘡不能潰余先用活命飲次
用托裡消毒散而愈

一小兒耳後結數核作痛左腮青赤此肝疔
積熱所致用四味肥兒丸柴胡清肝散及五
味異功散加胡升麻而消

一小兒耳赤腫痛寒熱往來此肝經熱毒也
用加味小柴胡湯寒熱悉退又用柴胡清肝

散而赤腫頓消

一小兒頰間赤色作渴目睛白多面常生瘡
睡而露睛先君謂稟父陰虛用地黃丸補中
益氣湯而愈後出痘亦無虞設不預爲調補
腎氣則出痘之危其可保耶

一小兒四歲太陽連眉不時作痒或生小瘡
此屬膽經風熱也先用地黃丸次用柴胡梔
子散後專服地黃丸而愈

一小兒面常生瘡左頰赤腫或睡中發搐審
其母素有鬱怒用加味道遙散加味歸脾湯
母子俱服而愈

一小兒面自時或變赤生小瘡兩足發熱先
君以爲稟賦足三陰虛熱不信專服清涼之
藥後出痘果黑陷而歿

一小兒久患前症耳下結核余曰此肝脾疰
毒也久而不愈則先用五味異功散加柴胡

一 梔子散清其肝火後用四味肥兒丸治其疳而愈

一 小兒患前症耳後結核大便酸臭飲食減少余謂此脾疳所致先用五味異功散為主異功散爲佐而愈

一 小兒患前症頭皮光急發熱作渴小便頻數余謂此腎肝之疳也用地黃丸爲主朝用補中益氣湯夕用五味異功散而愈

平湖清沈元房補

一 小兒患左腮腫赤竟以鉄箍散週圍塗之遂致腫甚變成為瘡出膿月餘不愈腫赤不消頸項勁強余謂此乃肝經實熱所致也用柴胡清肝散數劑而腫赤漸消外以當歸膏而愈

一 小兒患前症咬牙頓悶此乃肝經虛熱之所致也外以當歸膏敷塗患處服以六味丸料漸瘥

一小兒患右腮腫痛初畧微細紅色後遂日漸紅赤腫亦日增更又發熱喜飲涼冷喘急咳嗽余謂此乃肺經之實熱所致也用瀉白散而愈

一女子年十一歲忽患右腮腫痛漸而日甚成瘡腫赤不減先用仙方活命飲四劑潰膿但發熱咳嗽不減此肺火刑金用人參平肺散數劑而愈

一小兒年十二歲常患鼻間及鼻孔中生瘡常發常愈亦不以為意忽又於鼻孔中頓發一瘡月餘不愈漸生於外遂覺疼痛身軀疲倦更加發熱飲食不思日加其痛晝夜咳嗽欲飲涼冷大便實結糞色黃硬余謂此乃胃經之火實熱所致也遂用瀉黃散數劑而漸痊

一小兒患前症發熱飲湯大便不實去糞之

色或青或白此乃胃經之虛熱也用異功散而瘥

一小兒患髮際生瘡被風入瘡口腫痛極甚眼為蔽合身體發熱服寒涼之藥致飲食頓減患處不潰余用托裡養血之劑數服而飲食稍進腫亦漸消而瘡亦膿潰後因勞每日晡發熱此陰虛而內熱也以四物湯軟柴胡地骨皮又用養血之藥而瘡愈

一小兒先患眉煉延及遍身如癩久而不愈手足並熱面色常赤此稟母胃火所致子服瀉黃散母服竹葉石膏湯加味逍遙散子又用牛黃散拔毒散母子並愈

一小兒頭患瘡如癩或作痒結痂或膿水淋漓二年矣作渴飲冷發熱面赤此稟心與小腸表裡俱有熱也先用導赤散二服却用活命飲拔毒散漸愈子又服牛黃散母服逍遙

散而愈後因母食膏粱復發用清胃散母子服之子又服活命飲而愈

一小兒面生瘡作渴飲湯服敗毒之藥致吐瀉不食手足並冷余謂脾胃氣虛復傷而變症虛寒也先用益黃散而諸症退用異功散而瘡症愈

錢氏瀉黃散治瘡瘍作渴飲冷卧不露睛手足並熱屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴

飲湯卧而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用五味異功散若誤服攻毒之劑吐瀉不食手足指冷脾腎虛寒也宜用益黃散若病後津涸不足口乾作渴胃氣虛也宜用七味白朮散

藿香葉

甘草

各七錢五分

山梔仁兩一

石膏

煨五錢

防風

兩一

右用蜜酒微炒為末每服一二錢水煎

益黃散治瘡瘍屬脾胃虛寒吐瀉不止手足
並冷者

陳皮兩一

丁香錢二

訶子炮去皮

青皮去白

甘草炙各半兩

右為末每服一錢水煎

養心湯治心氣不足虛熱上攻而患瘡瘍者

黃芪炒

白茯苓

半夏麩

當歸

川芎

辣桂

栝子仁

酸棗仁炒

五味子杵

人參各三錢

甘草炒四錢

右每服一二錢薑棗水煎為末服亦可

牛黃解毒散治胎毒頭面生癩或延及遍身
痒痛不安浸淫不愈及眉煉瘡

生甘草兩一

牛黃五錢膏累之
子必用之

金銀花兩一

右各為末每服二三分乳汁調服或用甘

草煎膏為丸如芡實大每服一九白湯化

下外傳清金散亦可

拔毒散治症同前及疥癩瘡癬

黃芩

黃連

白礬

三味俱生用

雄黃 各五錢

銅碌 二錢痒甚加之 松香

右各另為末乾摻患處或用油調搽疥瘡

宜加枯礬三錢

梔子清肝散

即柴胡梔子散

治二焦及足少陽經風

熱耳內作痒生瘡出水或脇肋乳間作痛

往來寒熱 方見脇癰

仙方活命飲治一切瘡毒腫痛或作痒寒熱

或紅絲走徹惡心嘔吐等症 方見熱毒瘡瘍

治疔瘡等症用金銀花杵爛絞汁杯許入熱

酒半杯徐徐服之用藤葉亦效無鮮者用

枯者煮飲亦可

導赤散 方見疳癰

六味丸 即地黄丸加五味子四兩

竹葉石膏湯 二方見作渴不止

清胃散 方見腹癰

人參平肺散 方見肺癰

當歸補血湯 方見發熱不止

五味異功散 方見敗毒之藥

托裡消毒散

托裡散 二方見熱毒瘡瘍

加味歸脾湯

柴胡梔子散 即梔子清肝散

小柴胡湯 三方見脇癰

人參消風散 方見赤白遊風

瀉白散 方見臂癰

大楓膏 方見瘡疥

加味道遙散 方見發熱不止

補中益氣湯 方見肌肉不生

四味肥兒丸

方見貼骨癰

眉煉

附癩頭瘡

眉煉者謂小兒兩眉間生瘡如疥癬當求其因而藥之蓋眉屬膽經若原稟肝膽經熱或乳母肝膽經有熱者用柴胡梔子散或乳母食厚味醇酒者用加味清胃散或乳母有鬱怒者用加味逍遙散俱與乳母服子亦飲少許仍參前症主之

一小兒患前症用柴胡清肝散母子服之而愈後因母不戒膏粱厚味復發延及遍體膿水淋漓先用清胃散次用柴胡梔子散與母服子用清金散牛黃解毒丸而愈

一小兒嗜膏粱甘味患之漸及肢體兩眉為甚膿水淋漓寒熱往來內用清胃散加味小柴胡湯外傳立効散而愈後眉間復發兩目連劄小便白濁將成肝疳用四味肥兒丸

味蘆薈丸而愈

一小兒因乳母不戒七情厚味患此延及遍身久而不愈母先用清胃散次用加味逍遙散子用牛黃散解毒丸立効散而愈後兒食厚味眉間作痒搔破成瘡或痒或痛兩目連劄用四味肥兒丸佐以加味清胃散而愈

一小兒眉間作痒破而成瘡延及遍身兩脇爲甚用四味肥兒丸立効散母服柴胡梔子

散加味道遙散而愈

一小兒患此服化毒丹乳食不納手足俱冷此藥傷胃氣用五味異功散與母服兒亦時服三五滴母又服加味道遙散加龍膽草漏蘆兒症漸愈

一小兒患此先延兩脇後及遍身此肝火乘脾也診乳母亦有肝火先用加味道遙散加炒黃連數劑却去黃連又二十餘劑而痊

一小兒患之乳母惱怒其瘡益甚眉稜抽動
 不經意延及遍身乳母甚怒兒面色赤驚悸
 咬牙兼之發搐此心肝二經風熱所致也用
 加味小柴胡湯加味逍遙散而愈
 青金散治小兒疥癬眉煉或延及遍身瘙痒
 或膿水淋漓經年不愈

松香

二兩

真蛤粉

五錢

青黛

二錢五分

右為末用燭油調搽或乾摻之或加輕粉

枯礬各三錢以治前症及胎毒疥癩尤效

立効散

方見黃水痘

加味逍遙散

方見發熱不止

牛黃解毒丸

方見前

四味肥兒丸

方見貼骨癰

九味蘆薈丸

方見喉痺

加味清胃散

清胃散

二方見腹癰

小柴胡湯

方見脇癰

加味小柴胡湯

方見熱毒瘰癧

導赤散

方見臂癰

活命飲

方見熱毒瘡瘍

牛黃解毒散

拔毒散

二方見頭面瘡

保嬰撮要卷十二

終





