

本草綱目十

卷十七上

卷十七下

草之六
毒



本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

菌茹 本經

大戟 本經

澤漆 本經

甘遂 本經

續隨子 開寶

葇蓉 本經
即天仙子

雲實 本經

蓖麻 唐本
博落迴附

常山蜀漆 本經
吐莖出

上紅山附

藜蘆 本經
○山慈石
根馬腸根附

參朮

木藜蘆 拾遺

附子 本經

天雄 本經

側子 別錄

漏藍子 綱目

烏頭 本經

白附子 別錄

虎掌天南星 本經

由跋 本經

蒟蒻 開寶 菩薩草附

半夏 本經

蚤休 本經

鬼白 本經

射干 本經

虜尾 本經

玉簪 綱目

鳳仙 綱目

坐墊草 圖經 坤 不虛附

曼陀羅花 綱目

羊躑躅 本經 山躑躅 羊不吃草附

芫花 本經

堇花 本經

醉魚草 綱目

莽草 本經

茵蘘 本經

石龍芮 本經 胡椒菜

毛茛 拾遺 每畝附

牛扁 本經 麻建草附

葶麻 圖經

格注草 唐木

海芋 綱目

透山根附

鉤吻 本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

卷之二目錄

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 水經下品

釋名黃良 本經將軍之 火參 吳普 膚如 吳普 景且大

之號當取其駿快也泉口推陳致新如

戡定 禍亂以致太平所以有將軍之號

集解 別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月

生黃亦其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五

月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今

本草綱目草部第十七卷上

羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而

厚根紅者亦侶宿羊蹄大者乃如盤長二尺其姓

滋潤而易蛀曬火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截

著石上煨之一日微燥以繩穿眼乾今出岩州涼

州西羌蜀地者皆佳由并以北者薄細氣力不及

蜀中者陶言蜀地不及隴西誠矣藏器曰凡用當

分別之若取和及深洗能攻病者可用蜀中作牛

舌片緊硬者若取湯瀉駿快推陳去熱者當取河

西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以

蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正

月內生青菜侶菴麻大者如扇根如芋大者如盤

長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃

花亦有青紅侶蕎麥花者莖青紫色形如竹一八

月采根去黑皮切作黃片以乾獨大黃乃作緊片

如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出

者曰上大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州

方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤

藥市以大者為梳紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪即古涇原
隴西地與別錄相合

正誤 須曰隴州出一種羊蹄大黃治疥癩甚効初
生苗葉累年長大即葉倍商陸而狹尖四月

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥

而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五

月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為上

大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故

謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃

也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊

蹄也俱
見水條

根修治 雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉
片蒸之徒已至未晒乾又酒灑水蒸之徒

未至亥如此凡七次晒乾却酒淡蜜水再蒸一伏

時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用藏器且凡用有

蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以

火石搗乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒晉曰神農雷公若有毒扁鵲苦無毒李當之大寒元素

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒梟曰大黃苦峻下走用之于下必生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如物在高巖必射以取之也若用生者則遺至高之邪熱是以愈後或曰赤或喉痺或頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃芩為之使無所畏懼且忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟本平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結別通女子經候利水腫利大小腸貼

執腫毒小兒寒執時疾煩熱蝕膿通宜一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘧射瀉諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿統下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝貫熱燥結潮熱諸

痘諸火痞時

發明之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓驚悸

怒心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血

用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

本草綱目草部

卷十七上

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
其熱也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦
之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足木
之陽元甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之王肝者心之母血
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而聞悟後
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘
在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致爲
痞滿又云濁氣在上則生膈脹是矣病發於陽而
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分
野仲景人陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之
邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸
湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋
傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強
頌曰本草稱大黃推陳致新其効最神故百方下
積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用
也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是
快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元
帝嘗有心腹疾諸醫咸謂宜用大黃無瘥理帝從
坦曰脈洪而實此乃宿妨非用大黃無瘥理帝從
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其側

中便謂此方神奇其差誤則
不言用藥之失可不戒哉

附方

三十四新

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之
大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一

升熱服取利張仲景金匱玉函

吐血刺痛

黃一

兩為散每服一錢

以生地黃汁一合水

傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服

簡要濟衆方

傷寒痞滿

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為

痞也大黃黃連瀉心湯主之
大黃二兩黃連一兩

以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

熱病譫狂五兩到

分作二次溫服

仲景傷寒論

熱病譫狂五兩到

炒微赤為散用臘雪水五升煎如

傷寒發黃上方同

膏每服半匙冷水下

聖惠方

傷寒發黃上方同

氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一

腰

升人芒消兩緩服須臾常利下

傷寒類要

脚風氣令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

脚風氣令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯經

方治風熱積壅化痰涎治痞閉消食化氣導血用

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為未煉蜜丸如梧

子大每服十九白湯下並不損人如要微利加一

二十丸○衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸

又名全真丸金宣宗服痰為百病百病惟水瀉胎

之有驗賜名保安丸

前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以煇消二兩同入

砂罐內濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二十九小病五六十九丸緩病七八十

丸急病一百二十九溫水吞下即動勿候藥逐

上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈男女諸病無極丸治婦人

疾數萬也養生主論

帶下崩漏不一腸風下血五淋產後積血癥瘕腹

痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速

本草綱目卷十七上

本

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
 用童尿一盞食鹽二錢浸一日切細一分用醇酒
 一盞浸一日切細再以巴豆仁三十五粒同炒豆
 黃去豆不用一分用紅花四兩泡赤一盞浸一日
 切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去
 歸切晒為末煉蜜九梧子大每服五十九空溫
 酒下取下惡物為驗未下再服此心腹諸疾三物
 武當高上孫碧雲方也醫林集要心腹諸疾備急
 丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
 兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三九凡中
 客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死
 者以暖水或酒服之或灌之未知喪服三九腹中
 鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
 瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
 圖經腹中痞塊煎九梧子大每服三十九生薑湯
 本草下吐利為度腹脇積塊風化石灰末半斤瓦器炒
 外臺秘要極熱稍冷入大黃末一兩

炒熟入佳心末半兩罌炒下米醋磨成膏難昏非
之○又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同搗

膏和貼之或加阿膠一久患積聚二便不利上檢

兩九妙丹溪心法一久患積聚心腹脹滿善食

大黃白芍各二兩為末水九梛子大每脾疝積

湯下四十九日三以知為度千金方脾疝積

不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋

丙文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研用

船上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十

歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生

冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之小兒

後再服若不思口不如勿服聖濟總錄小兒

無辜閃癖癩癰或頭乾黃聾或在癩疔瘡諸狀多

朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和

置瓦罍中於大鍋內浮湯上炭火慢煮候至成膏

可丸乃貯器中三歲兒一服七九梛子大日再服

以下出青赤膿為度若不下或下少稍稍加丸若

本草綱目卷之七十一

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可
用之此藥相下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳
母亦禁之一加木香

一兩半崔知悌方小兒諸熱大黃煨熟黃芩各
麻子大每服五丸至十九錢氏小兒方骨蒸積熱黃連

加黃連各三黃丸錢氏小兒方骨蒸積熱黃連
大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓

空腹分為二服如人行五里再服廣利方赤
白濁淋好大黃為末每服六分以雞子一個破頂

簡便相火秘結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服
方三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩密湯服劉諸痢初起大黃煨熟當歸各二三
河間保命集

取利或加楮熱痢裏急大黃一兩浸酒半日忽喘
柳集簡方

悶不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕
而復蘇各湯寒併熱霍亂大黃人參各半兩

水二盞煎一盞熱服
可安 危氏得効方
食已即吐 胸中有火也大黃

水一升煮半升溫服
仲景金匱玉函方
婦人血癖 作痛大黃一兩酒

取利
千金翼
產後血塊 大黃末一兩頭醋半升煮膏丸

久當下
千金方
乾血氣痛 錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末

時酒化一丸服大便利一二行紅漏自下
乃調經仙藥也或加香附
董氏集驗方
婦人嫁

痛 小戶腫痛也大黃一兩酒一
升煮一沸頓服 千金方
男子偏墜 作痛大

醋塗之乾則
易 梅師方
濕熱眩暈 不可當者酒炒大黃為末

也 丹
小兒腦熱 常安閉目大黃一分水三合浸

上乾即再土
姚和衆至寶方
暴赤自痛 四物湯加大黃酒煎

本草綱目草部卷十七上
七 芥子園

火牙痛

口含冰水一口以紙燃蘸大黃末風熱牙

痛

紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇

效好大黃脛內燒存性為末早晚揩牙漱去都

下一家專貨此藥兩宮常以數千

風蟲牙痛

齧常

賸之其門如古也

漸至崩落口臭極效大黃米泔浸軟生地黃各旋

引入風

口瘡糜爛

大黃枯礬等分為末

擦之吐涎

鼻中生

瘡

生大黃杏仁搗勻猪脂和塗○又方生大黃黃

仙茅毒發

舌脹出口方

傷損瘀血

三因方雞鳴散

石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍並以此藥

推陳致大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研

酒一盃

和劑方

跌壓瘀血在

研每服四錢温酒打撲傷痕瘀血滋注或作潮熱

服取下惡物愈一夜黑者紫二夜紫者杖瘡腫痛大黃末醋調塗之渣尿亦可調

白也瀕湖集簡方醫方金瘡煩痛大便秘不利大黃黃芩等分爲末

摘玄千金凍瘡破爛大黃末水調塗湯火傷灼莊浪大

方蜜調塗之不惟止痛又且滅癥此乃灸瘡飛蝶因

金山寺神人所傳方洪邁夷堅志灸訖火痂便退瘡內鮮肉片飛如蝶形而去痛不

可忍是火毒也大黃末消各半兩爲末水服取利

即愈張蠟螻咬瘡大黃末塗火丹赤腫通身者

臭醫說水頻利之腫毒初起大黃五倍子黃蘗等分爲末

便方癰腫炊熱作痛大黃末醋調塗之燥即易不過

乳癰腫毒

全黃散用川大黃粉草各一兩為末好酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍

先以溫酒服一大匙明日

取下惡物 婦人經驗方

大風癩瘡

大黃煨一兩皂莢刺一兩

為末每服方寸七空心溫酒下取出惡毒物如魚腦狀未下再服即取下如亂髮之蟲取盡乃服雄

黃花蛇藥各通天再造散 十便良方

葶氣味酸寒無毒主治置薦下辟風蟲

相感志

商陸

本經下品

釋名蓬莩

音逐湯

當陸

開寶

章柳

圖經

白昌

開寶

馬尾

廣雅

呼

本經時珍曰此物能逐蕩水氣故曰蓬莩訛為商陸又訛為當陸北音訛為章柳或云枝枝相

值葉葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

集解

別錄曰商陸生咸陽川谷如人形者有神

甚有毒深昇日所在育之葉大如斗舌而厚脆赤

花者根赤白花者根白二月八月采根日乾頌曰

俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四

尺青葉如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開刺紫

花作柔根如蘿蔔而長八九月采之爾雅謂之蔓

葛廣雅謂之馬尾易經謂之蔓陸數曰一種赤曰

苗葉絕相類不可服之有傷筋骨消腎之毒惟花

白年多者仙人采之作脯可下酒也時珍曰商陸

昔人亦種之為蔬取白根及紫色者擘破作畦乾

之亦可種子根苗莖並可洗蒸食或用灰十煮過

亦良服丹砂乳石人食之尤利具赤與黃色者有

毒不可食按周憲王救荒本草云章柳幹粗似

筵冠花幹微有線傍

色微紫赤極易生碩

根修治

流蘇曰取花白者根錫刀刮去皮薄切以東

本草綱目卷之七上

商陸一重如此蒸之從午至亥取出
去豆葉暴乾判用無豆葉以豆代之

氣味辛平有毒別錄曰酸(釋)曰甘有大毒忌犬肉
大明曰白者苦冷得大蒜良赤者

有毒能伏礪砂砒石雌黃煖錫蔡曰赤者且可貼
腫服之傷人痢血不三殺人令人見鬼仲景

且商陸以木眼殺人(泉)且商陸有毒陽中之
陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神玉治

水腫疔痕瘰癧除癰腫殺鬼精物本經療胸中邪氣

水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十種水

病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良甄權通大小腸瀉

蠱毒墮胎協腫毒禱惡瘡大明

發明弘景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜饑
魚煮作湯服道家乃散用之及煎藥服皆能

去尸蟲見鬼神其實子亦入神藥花名葛花尤良
頌曰古方術家多用之亦可單服五月五日采根
竹簍盛堪屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服
云神仙所祕法也時珍曰商陸苦寒沉也罕也陰
也其性下行專於行水與大戟甘遂蓋異性而同
功胃氣虛弱者不可用方宗治腫滿小便不利者
以赤根搗爛人射香三分貼于臍心以帛束之得
小便利卽腫消又治濕水以指畫肉上隨散不成
交者用白商陸香附子炒乾出大毒以酒浸一夜
日乾爲末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮
汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾霧謨曰古讚
云其味酸辛其形類人療水腫其效如神斯言
盡之矣

附方舊九新六濕氣脚軟樟柳根切小豆大煮熟更以

瘥爲度最效外臺水氣腫滿皮切如豆大一盞以水

本草綱目卷之十七上

本草綱目卷十七

二升煮一升更以粒米一大盞同煮成粥每日空

心服之取微利不得雜食○下金髓用白商陸六

兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取効

○梅師方用白商陸升羊肉六兩本一斗煮取

六升去滓和葱腹中暴燉有物如石痛刺啼呼不

鼓作腫食之腹中暴燉治百日死多取商陸根

搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆瘰癧如石

冷即易晝夜勿息孫真人千金方瘰癧如石

下墜硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如

沉以商陸汁絞杏泥火煎如錫每服藥許空腹熱

酒服以利下惡物產後腹大散用樟柳根三兩大

為度聖惠方載一兩半甘遂炒一兩為末每服二三錢熱湯調

下大便宜和為度此乃至水聖藥也潔古保命集

五尸注痛腹痛脹急不得喘息上攻心胸旁攻兩

脇痛或螺塊涌起用商陸根熬以囊盛

真互製之取小兒痘毒小兒將痘發熱失表忽作

劫肘后方小兒痘毒腹痛及膨脹皆氣乾霍亂

百毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根下
慈白鳩傳臍上斑止痘出方免無虞 慎玄方

耳卒熱腫生商陸削尖納入喉卒攻痛商陸切根

熨之冷即易立瘰癧喉痺攻痛生商陸根搗作餅

三四壯良圖經本草一切毒腫章陸根和鹽少許搗傳日

外臺秘要一切毒腫再易之孫真人千金方

石癰如石堅硬不作膿者生章陸根搗擦之燥即

方瘡傷水毒章陸根搗炙布裏熨之

芎花主治人心昏塞多忘喜卧取花陰乾百日搗
末日暮水服方寸匕乃卧思念所欲事即於眠中

醒悟也蘇頌

本草綱目卷之十一
上 水子園

狼毒 本經下品

釋名 時珍曰觀其名知其毒矣

集解 別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根陰乾陳而沉水者良弘景曰岩昌亦出

之乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根但

置水中沉者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳恭且今出秦州成州秦亭原在二川

之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說謬矣志曰狼

毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為力劣秦亭在隴西奉高是太

山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏

采者輕虛得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃橘皮半夏厚實吳茱萸為六陳也保昇曰根

似玄參惟虛浮者為劣也頌曰今陝西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦晉地今人往往以草蘭茹為之誤矣見蘭茹下也

根氣味辛平有大毒大明曰苦辛有毒之才且大豆為之使宜醋炒惡麥句薑

畏占斯靈陀僧也至迨欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

惡瘡鼠癩疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸本經除胸下

積僻別錄治痰飲癥瘕亦殺鼠明合野葛納耳中治

聾抱朴子

附方舊四新六心腹連痛作脹用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸梧子大一目服一

九二日二丸三日三丸止又從一丸起至三丸止以塞為度肘后方九種心痛蟲

本草綱目草部卷十七上

二蛙三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治

連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證

九痛丸用狼毒炙香吳茱萸黃湯泡巴豆去心炒取

霜乾薑炮人參各一兩附子泡去皮三兩為末煉

蜜丸梧子大每空服溫腹中冷痛水穀陰結心下

酒下一丸抑劑局方停痰兩脇痞滿

按之鳴轉逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆

花三兩搗末蜜丸梧子大每服三九食前白湯下

三服。陰疝欲死丸縮入腹急痛欲死狼毒四

肘后方兩防風二兩附子三兩燒以

蜜丸梧子大每服三九日兩脇氣結冷痛方

夜三度白湯下肘后方一錢用錫一皂子大

切蟲病川狼毒杵末每服一錢用錫一皂子大

下蟲也。乾濕蟲疥狼毒不拘多少搗爛以猪油

集効方。乾濕蟲疥馬油調搽患處方睡勿以破

蒙頭恐藥氣傷面此維揚積年疥癩狼毒一兩

氏所傳方。蘭氏經驗方。積年疥癩一半生研

半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化為末同以清油浸藥高一寸三日待藥沉油清遇夜一見燈火蘸油塗瘡上積年仍以口鼻於藥盞上吸氣取効 永類方

乾癬 生癬極之黃水出每逢陰雨即惡疾風瘡 疥用狼毒末塗之 聖惠方

秦芫等分為末每服方寸七 温酒下日一二服 千金方

防葵 本經上品

釋名 房苑錄 梨蓋 本經 利茹 吳普又名爵離方蓋農

根香味似防風故名防葵

集解 別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采根暴乾普曰莖葉如葵上黑黃

二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根 蔡曰此物亦稀有襄陽望楚

山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘇頌所

說詳明可據

正誤弘景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而狼

毒陳久者亦不能沉矣敷曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異効又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生蚌用之惟輕為妙恭曰狼毒與防葵都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊為謬誤

根修治數日須揀去蚶末用甘草湯浸一宿

器中炒至

汁盡用

氣味辛寒無毒烏喙曰甘苦晉曰神農辛寒桐君

毒種曰有小毒治瘡腫脫勝脫熱結溺不下欬逆濕

瘡癩癩癩狂走久服堅骨髓益氣輕身木經療五

臟虛氣小腹支滿臍脹口乾除腎邪強志中火者

不可服令人恍惚見鬼錄久服主邪氣驚狂蘇恭

瘰癧氣塊癆脫宿水血氣瘤大如鴛者悉能消散

治鬼瘧白邪鬼魅精怪通氣甄權

本草綱目草部卷十七上

發明時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君
雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火

者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多
服令人迷惑恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽

者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者
乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別

錄所列若乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒
之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇瘕瘰

瘕大方中多用防
葵皆是狼毒也

附方舊一腫滿洪大防葵研末温酒服一刀圭至
新二服身潤及小不仁為効

○肘癩狂邪疾上方局傷寒動氣傷寒汗下後臍左
有動氣防葵散用

防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩
水一盞半煎八分温服 雲岐子保命集

狼牙本經
下品

釋名牙子本經狼齒別錄狼子別錄犬牙英抱牙英支蘭

李當之云景曰其牙似

獸之齒牙故有諸名

巢解別錄曰狼牙生淮南川谷及宛句八月采根

赤六七月華八月實黑正月八月采根保昇曰所

在有之苗似蛇莩而厚大深條色根黑若獸之牙

三月八月采根日乾頌曰今江東汴東州郡多有

之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善

根氣味苦寒有毒別錄曰酸晉曰神農黃帝苦有

毒之才曰蕪蕪為主治邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔

之使惡地榆棗肌主治邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔

去白蟲本經治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡魏殺腹臟一

切蟲止赤白痢煎服太

本草綱目草部卷十七上 左 木子園

附方 舊六 金瘡出血 狼牙草莖葉熟搗 小便溺血

新四 金瘡出血 貼之 附后方 金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分爲

未每服三錢米泔空心調服亦治酒病 衛生易

簡寸白諸蟲 狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不

外臺 六月以前采狼牙葉以後用根生 秘要 蟲瘡癢 咬咀以木葉裏之塘火炮熟於瘡

上熨之冷即止 楊炎南行方 小兒陰瘡 狼牙草濃煮汁 婦人陰

癢 煎水熱洗 婦人陰蝕 瘡爛者狼牙

兩水四升煮取半升以筋纏綿浸湯 耳出汗 狼

之 研水綿裏日塞 毒蛇傷 蝮毒莖狼子根或葉搗爛

氏射工中人 有瘡狼牙冬取根夏取葉搗汁

飲四五合并傳之

千金方

蘭茹下品

藥名 蘭茹 結 白者名草蘭茹時珍曰蘭茹本作蘆

藥其根葉引之貌掘据當作拮据 詩云子手拮据手口共作之狀也

集解 別錄曰蘭茹生代郡川谷五月采根陰乾黑頭者良昔曰草高四五尺葉圓黃四四相當

四月華五月實黑根黃有汁赤黃色三月采葉四月五月采根弘景曰今第一出高麗色黃初斷時

汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道各草蘭茹色白皆燒鐵煉頭令黑以當漆非真也頌曰今河陽

淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月

開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之又有一種草蘭茹色白古方兩用之故姚

僧坦治癰疽生惡肉有白蘭茹散等之膏肉盡使停止但傳諸膏藥若不生肉又傳黃芪散惡肉仍

本草綱目卷之十一

卷之十一

不盡者可以漆頭赤皮蘭茹為散半錢和自蘭茹散三錢和傅之觀此則赤白皆可用也時珍曰范子計然云蘆茹出武都黃色者善草蘭茹出建康白色今亦處處有之生山原中春初生苗高二三尺根長大如蘿蔔蔓菁壯或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微闊不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒葉似商陸大黃輩根無漿汁

根氣味辛寒有小毒
別錄曰酸晉曰神農辛岐伯酸藏有毒李當之大其之才

味甘草為之
使惡門冬 主治蝕熱肉敗瘡死肌殺疥癬并膿

惡血除大風
經本 去熱痺破癥瘕除

息肉別錄

發明 宗奭已治馬疥尤善服食方用至少時珍曰
素問治婦人血枯痛用烏鰂骨蘆茹二物九

服方見烏鰂魚下王永言蘆茹取其散惡血又齊
書云郡王子隆年二十身體過充徐嗣伯合蘆茹

九服之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌爾蓋洗
必効方治甲疽生于脚趾邊腫爛用蘆茹三兩黃

芪二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合
日三塗之即消又聖惠方治頭風旋眩鳴頭丸中

亦用之

附方 舊二緩疽腫痛 蘆茹一兩為散溫水傷寒咽
新二 服二錢七 聖惠方

痛 葶攻作腫其蘆茹瓜甲大納口噉汁中焦熱痞
嘔之當微覺為佳 張文仲備急方

善忘不禁商茹三分目草炙二兩消石為末每
服一錢雞鳴時溫酒下以知為度 聖惠方 疥

本草綱目卷十七

瘡癢 調傳之 輕粉香油 能醫事

大戟 本經 下品

釋名 卽鉅 爾雅 卽鉅 卽大戟也 郭璞注 卽大戟也 時珍曰 其根辛苦 戟人 咽 喉 故名 今 俚 人 呼 為 下 馬 仙

仙言利人甚速也 郭璞注 爾雅云 蒿 卽鉅 卽大戟也

集解 卽苗似甘遂而高大 葉有白汁 花黃 根似細 苦參皮 黃肉 黃白 五月采 苗 二月 八月采 根 用 須 曰 近道多有之 春生 紅芽 漸長 叢高一尺 以 來 葉 似 初 生 楊 柳 小 團 三 月 四 月 開 黃 紫 花 團 圓 似 杏 花 又 似 蕪 荑 根 似 細 苦 參 秋 冬 采 根 陰 乾 淮 甸 出 者 莖 圓 高 三 四 尺 葉 黃 莖 至 心 亦 如 百 合 苗 江 南 生 者 葉 似 芍 藥 時 珍 曰 大 戟 生 平 澤 甚 多 直 莖 高 二 三 尺 中 空 折 之 有 白 漿 葉 長 狹 如 柳 葉 而 不 團 其 梢 葉 蜜 賸 而 上 杭 州 紫 大 戟 為 土 江 南 十 大 戟

其梢葉蜜賸而上 杭州紫大戟為土 江南十大戟

曉利能... 凡... 勿... 用... 氣... 不...

根修治... 凡... 勿... 用... 氣... 不...

凡... 采... 得... 以... 紫... 水... 煎... 乾... 用... 研... 葉... 麻... 而...

有毒恐不可用也

氣味苦寒有小毒... 凡... 甘... 大... 寒... 穰... 甘... 辛... 有... 大...

肺損真氣時珍曰得棗即不損脾之才曰反甘草... 用菖蒲解之黍曰畏菖蒲蘆葦鼠屎大明曰赤小...

惡薯蕷... 主治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風

皮膚疼痛吐逆... 經... 頸... 腋... 癱... 腫... 頭... 痛... 發... 汗... 利... 大... 小... 便...

別瀉毒藥... 泄... 天... 行... 黃... 病... 溫... 瘧... 破... 癥... 結... 明... 下... 惡... 血... 癖...

本草綱目卷之七上

塊腹內雷鳴通月水墮胎孕甄治隱癆風及風毒

脚腫並煮水日熱淋取愈蘇

發明成無已且大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也也好古且大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝

者苦燥除之也時珍且痰涎之為物隨氣升降無處不到入于心則迷竅而成癩癩忘言忘見入于

肺則寒竅而成欬唾稠粘喘急背冷入于肝則留

伏蓄聚而成胸膈痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻

痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯

而為痰為飲為涎為涕為癖大戟能泄臟腑之小

濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外

之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為

真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證用百

神膏下之以瀉腎非瀉腎也為其臟則臟自不實

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而能吐青綠水夫青綠者少陽風木之色也仲景亦云心下痞滿引脇下痛僂嘔短氣者十棗湯主之其中亦有天戟夫乾嘔脇痛非引膽之病乎則百祥之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補况瀉青瀉黃皆瀉其子同一瀉也何獨腎只瀉腑乎潔古老人治變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是瀉子之意蓋毒勝火熾則水益溷風挾火勢則土受虧故津血內竭不能化膿而成青黑乾陷之證瀉其風火之毒所以救腎扶脾也或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾者非也腎之真水不可瀉瀉其陷伏之邪

毒爾

附方

新百祥膏

治嗽而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發寒者宜下之

不黑者慎勿下紅芽大戟不拘多少陰乾漿水煮極軟去骨日乾復納原汁盡焙為末水丸粟米大

每服一二十九研赤脂麻湯下○潔古活法機要

棗變百祥丸治斑痧變黑大便閉結川大戟一兩

棗三枚水一盃同煮暴乾去大戟以控涎丹治痰

聚肉焙丸服從少至多以利為度

在胸膈上下變為諸病或頸項胸背腰脇手足勝

脚隱痛不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺

似乎癱瘓不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治

頭痛不可舉或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心

竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟白
甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打麩糊丸梧
子大每服七九或二十九以津液嚥水腫喘急
下若取利則服五六十九三因方水腫喘急便
瀉及水蠱大戟炒二兩乾薑炮半兩為散每水病
服三錢薑湯下大小便利為度聖濟總錄水病
腫滿水二升煮取七合頓服利下水二三升勿怪

至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作此方出張尚客李絳兵部手集小氣腫

脹大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半

取大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半

戟燒存性研末每水腫腹大棗一斗六鍋內以水

空過酒服一錢七水腫腹大棗一斗六鍋內以水

浸過川大戟根苗莖之瓦盆合定煮熟取棗無時

食之棗盡決愈○又大戟散用大戟白牽牛木香

等分為末每服一錢以猪腰子一對批開慘末在

內濕紙煨熟空心食之左則塌右則塌右張

藥古活牙齒搖痛良大戟咬於痛處中風發熱苦參

澤漆

下品

洗之寒乃止千金方

釋名漆莖木貓兒眼睛草綱綠葉綠花草綱五鳳

本草綱目草部卷十七上芥子園

草景曰是大戟苗生時摘葉有白

集解別錄曰澤漆大戟苗也生太山川澤三月三

花也川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩菜五月采

之頌曰今冀州開州明州及近道皆有之時珍且

別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗曰華子又言是大

戟花其苗可食然大戟苗洩人不可為菜今攷士

宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草

一名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多

有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉
如苜蓿葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼莖
頭比五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠
色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉
綠花草插莖有白汁粘人其根白色有硬骨或以
此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結
草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟苗也今
方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本文相合自

漢人集別錄誤以為大戟苗
故諸家藥之爾用者宜審

莖葉氣味苦微寒無毒

別錄曰辛大明且冷有小毒之才曰小豆為之使惡

薯蕷主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰

氣不足

本經

利大小腸明目輕身

別錄

主蠱毒

蘇恭

止瘡

疾消痰退熱

大明

發明

時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖言白汁遂誤以為大戟然大戟根苗皆有毒洩

人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而刊丈夫陰氣盛不相侔也

附方

舊二肺欬上氣

脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗

五升去滓人半夏半升紫參白前生薑各五兩廿草黃芩人參且心各三兩煎取五升每服五合日

主外子

三服 張仲景 心下伏瘕 大如盂 不得食者 澤漆 金匱要畧方 四兩 大黃 葶藶 三兩

搗篩 蜜丸 梧子 大每服 二 十腫水氣 澤漆 十斤 夏 九日 三服 葛洪 肘后方 月取 漱莖 葉

人水 一斗 研汁 約二斗 於銀鍋 內慢火 熬如 稀 陽 人瓶 內收 每日 空心 溫酒 調下 一匙 以愈 為度

聖惠 水氣壘病 生鮮 貓眼 睛草 晒乾 為末 棗肉 丸 方 彈子 大每服 二 丸 白湯 化下 口二

服覺 腹中 暖小 便利 腳氣 赤腫 行步 脚痛 貓兒 眼 為度 乾坤 秘製 睛草 鷺鷥 葉 蜂 窠

等分 每服 一兩 水五 盞煎 三 牙齒 疼痛 貓兒 眼 睛 碗薰 洗之 衛生 易簡 方 草 一 搗 研

爛湯 泡取 汁含 漱吐 男婦 瘰癧 貓兒 眼 睛 草 一 搗 研 洩 衛生 易簡 方 網 井 水 二 桶 五 月

五日 半時 鍋內 熬至 一桶 去滓 渣清 再熬 至一 碗 瓶收 每以 椒葱 槐枝 煎湯 洗瘡 淨乃 搽此 膏數 次

會 便民 癩瘡 有蟲 貓兒 眼 睛 草 晒 乾 為 末 香 油 圖 算 方 衛生 易簡 方

衛生 易簡 方

甘遂 本經下品

釋名甘藹 別錄 陵藹 吳譜 陵澤 別錄 甘澤 吳譜 重澤 別錄 苦澤

吳白澤 吳譜 玉田 別錄 鬼 吳譜 時珍曰諸

集解 別錄曰 甘遂生中山川谷二月采根陰乾晉

山江東北末用京口音大不相似赤皮者勝曰皮

者都下亦有名草甘遂殊惡蓋膏偽者也恭曰甘

遂苗似澤漆其根皮赤肉白作連珠實重者良草

甘遂乃是蚤休療體今別苗亦不同俗名重臺葉

似鬼魚龍麻根皮白色大明曰西京者上汴滄吳

者次之形似和皮甘草節頌曰今陝西江東亦有

之苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指頭

本草綱目草部卷十七 根修治 敷曰 凡采得去望於槐砧上細到月生甘

黑汁乃漉出用東流水淘六七次令水清為度漉
出于十器中熬脫用之時珍曰今人多以麩煨熟

可以法
其毒

氣味苦寒有毒別錄曰甘大寒晉曰神農柯君苦
有毒岐伯雷公甘有毒元素曰純

陽也之才曰瓜蒂為主治大腹癰腹滿面目浮
之使惡遠志反甘草

腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道本經下五水散

膀胱多熱皮中痞熱氣腫滿別錄能瀉十二種水疾

去痰水甄權瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰

迷癩癩噎膈痞塞時珍

發明宗奭曰此藥專于行水攻決為用元素且味
苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處

乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大
稍物湯用之但有毒不可輕用時珍曰腎主水
則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治痰
之木也不可過服但中病則止可也張仲景治心
下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間
保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹
遠臍令漏內服甘草水其腫便去又王珍百一選
方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末
水調傅腫處即濃煎甘草汁服其腫即散二物相
反而感德如此清流韓詠病脚疾用此一服病去
七八再服而愈也

附方 舊三新 水腫腹滿 甘遂炒二錢二分 黑牽牛

之 普 濟方 膜外水氣 甘遂末大窠麩各半 兩水煎時呷

身面洪腫 甘遂二錢 生研為末 以豬腎一枚分

本草綱目草部卷十七上 魚 芥子

本草綱目卷之十一

日一服至四五服當覺腹鳴腎水流注

小便利是其功也肘后方腎水流注

脚上方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒

喝下當利黃水為驗御藥院方海正水腹

急大小不利欲死甘草五錢半生半炒胭脂子

水煮令浮淡食之大小便利後用平胃小兒疳水

散加熟附子每以二錢煎服普濟方小兒疳水

珠子甘遂炒青橘皮等分為末三歲用一錢以麥

芽傷下以利為度忌酸鹹三五日名水寶散

總微水蠱喘脹甘遂大戟各一兩慢火炙研每服

論一字水半盞煎三五沸服不過十

服聖水腫喘急大小便不通十棗丸用甘遂大

棗子大每服四十丸侵晨熱湯下利去妊娠腫滿

黃水為度否則次午再服三因方

氣急少腹滿大小便不利已服猪苓散不瘥者用

太山赤皮甘遂二兩鴉篩白蜜和丸梧子大每服

五十九得微下仍服猪苓散不下再服之猪苓散見猪苓下小品方心下留飲七

豚伏其人欲自利反快甘遂半夏湯用甘遂大者三枚半夏十二個以水一升煮半升去滓入芍藥

五枚甘草一節水二升煮半升去滓以蜜半升脚氣升向煎入合頓服取利張仲景金匱玉函

腫痛腎臟風氣攻注下部瘡痒甘遂半兩水隨子仁四個為末猪腰子一個去皮膜切片用藥

便伸兩足大便行後吃白粥二三日為妙本草

力二便不通甘遂末以生麴糊調傅臍中及丹田

太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻小便利轉甘遂分作四服日一服取利聖惠方

錢猪苓湯調下立疝氣偏腫甘遂尚香等分為末通筆峰雜興方酒服二錢鶴門事

親婦人血結渴此為水與血俱結在血室大黃二

尚甘遂阿膠各一兩水一升半煮
半升頭服其血當下張仲景方
燭氣哽噎

五錢南木香一錢為末壯者一錢
弱者五分水酒調下怪病奇方
痞證發熱

疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水
時服忌油膩

魚肉普濟方消渴引飲
甘遂麩炒半兩黃連一兩為末
蒸餅丸錄豆大每薄荷湯下二

丸忌日草楊氏家藏方癩癩心風
及婦人風血邪用甘遂
二錢為末以猪心取三管血和藥
入猪心內縛定

紙裏煨熟取末入辰砂末一錢
分作四丸每服一
丸將心煎湯調下大便下惡

物為効不不再服濟生方馬脚風病
小兒風熱
不安謂之馬脚風甘遂麩包煮一
錢半辰砂水飛

二錢半輕粉一角為末每服一字
漿水少許滴油
一水點抄藥直上沉下去漿

瀉之各無價故全切心鑑麻木疼痛
萬靈膏用
甘遂二兩

蓖麻了仁四兩樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯摘玄方耳卒聾閉寸綿裏

餅貼之內飲甘草湯摘玄方

插入兩耳內口中嚼少甘草

耳卒自然通也永類方

續隨子宋開寶

釋名千金子開寶千兩金日華菩薩豆日華拒冬開寶聯步

頌曰葉中出葉數數相續而生

故名冬月始長故又名拒冬

集解志曰續隨子生蜀郡處處亦有之苗如大戟頌曰今南中多有北土產少苗如大戟初生

一莖莖端生葉葉中復出葉花亦類大戟自葉中

抽幹而生實青有殼人家園亭中多種以為飾秋

種冬長春秀秋實時珍曰

莖中亦有白汁可結水銀

修治時珍曰凡用去殼取色白者以紙包壓去油取霜用

氣味辛温有毒主治婦人血結月閉痰血癥瘕疾

癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡

滯物開寶積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎

酒服不過三顆當下惡物獨宜一切宿滯治肺氣

水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止

又塗疥癬瘡大

發明頌曰續隨下水最速然有毒損人不可過多

療亦相似其功皆長于利水惟在用之得法亦皆要藥也

附方舊二小便不通臍腹脹痛不可忍諸藥不効

一兩銖丹半兩同少蜜搗作團瓶盛埋陰處臘月

至春末取出研蜜丸梧子大每服二三十丸木通

湯下化破尤妙病愈聖濟錄水氣腫脹聯步一兩去殼研

亦可旋合聖濟錄七服每治一人用一服丈夫生餅子酒下婦人荆

芥湯五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補

之頻喫益善忌鹽醋百日乃不陽水腫脹續隨

復作聯步即續隨子也斗門方去油二兩大黃一兩為末酒水九綠豆大

每白湯下五十九以去陳莖摘立方涎積癥

塊續隨子三十枚賦粉二錢青黛炒一錢研勻糯

米飯丸芡子大每服一九打破以大棗一枚煮

熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後聖濟錄蛇咬腫悶欲死

取下積聚惡物為効聖濟錄臺六分續隨子仁七粒搗篩為散酒服方寸七

兼睡和少許塗咬處立効崔元亮海上方黑

子疣贅續隨子熟時塗之

白落普濟方

普濟方

本草綱目卷之...

葉及莖中白汁主治剝人面皮去黥黥開寶傳白癩

瘰癧大搗葉傅蠍螫立止時珍

良砮音浪蕩
本經下品

釋名天仙子圖橫唐本行唐時珍曰莨菪一作蘭
其子服之令人狂

狼放岩
故名

集解別錄曰莨菪子生海濱川谷及雍州五月采
子弘景曰今處處有之子形頗以五味核而

極小保昇且所在皆有之葉似菘藍莖葉皆有細
毛花白色子殼作蠶狀結實扁細若粟米大青黃

色六月七月采子曰乾頤且處處有之苗莖高二
三尺葉似地黃王不留行紅藍等而欄如三指四

月開花紫色莖葉有白毛五月結實有殼作罌子
狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒數日

凡使勿用蒼黃子其形相似只是微赤服之無効
時人多以雜時珍曰張仲景金匱要畧言菜中
有水葦帶而光有毒誤食令人狂

亂狀如中風或吐血以甘草汁解之
子修治數日修事黃芩子十兩以頭醋一盞煮乾

為度却用黃牛乳汁浸一宿至明日乳汁
黑卽是真者
晒乾搗篩用

氣味苦寒無毒別錄曰其權曰苦辛微熱有大毒
藏器曰性温不寒天明且温有毒

服之熱發以綠豆汁甘草升麻犀角並解之數日
有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生暈火頰曰本
經言性寒後人多云大熱而史記淳子意傳云滿
川王美人懷子不乳飲以浪藥一撮以酒飲旋乳
且不乳豈熱藥所治又古方主卒
顛狂亦多單用黃芩豈果性寒耶**主治齒痛出蟲**

肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益

本草綱目草部卷十七上

力通神見鬼多食令人狂走

本經療癩狂風癩顛倒

拘攣

別錄

安心定志聰明耳目除邪逐風變白疔疔

癖取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便浸

令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂

藏器

炒焦研末治下部脫肛止冷痢疔疔牙痛咬之蟲

出

燒熏蟲牙及洗陰汗

大明

發明

弘景且入療顛狂方用然不可過劑久服白

無嫌通神健行足為大益而仙經不見用權

曰以石灰清煮一伏時掬出去身暴乾以附子乾
薑陳橘皮桂心厚朴為丸服去一切冷氣積年氣
痢甚溫暖也不可生服傷人見鬼拾錄狂亂時珍
曰良若之功未見如所說而其毒有甚焉煮一二

日而芽方生其為物可知矣葇苔雲實防葵赤商
陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋
此類皆有毒能使痰迷心竅破其神明以亂其視
聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以葇苔酒醉而坑
之又嘉靖四十二年二月陝西遊僧武如香挾妖
術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全
家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其
奸汚復將魔法吹入柱耳中柱發狂或見鬼家皆
是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執
柱囚之十餘日柱吐痰二碗許問其故乃知所殺
者皆其父母兄嫂妻子姊妹也柱與如香皆論死
世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是葇苔之流
爾方其痰迷之時視人皆
鬼矣解之之法可不知乎

附方

舊二新

卒發顛狂

葇苔三升為木以酒一升

絞去滓煎令可丸

如小豆三九日三服當見面急頭中如有蟲行額
及手足有赤豆處如此並是瘥候也未知再服取

盡神良 陳風痺厥痛 天仙子三錢炒大草烏頭
延之小品方 風痺厥痛 甘草半兩五靈脂一兩為

末糊丸梧子大以螺青為衣每服十九男 久嗽不
子菖蒲酒下女子芫花湯下 聖濟錄

止有濃血黃芩子五錢淘去浮者煮令芽出炒研
真酥一雞子大大棗七枚同煎令酥盡取棗日

食三枚○又方黃芩子三撮吞之日五六 年久叩
度光祿李承服之神驗 孟詵必効方

嗽至三十年者芫芩子木香薰黃等分為末以羊
脂塗青紙上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之

崔行功水腫蠱脹 方見獸部 積冷疝癖 不思飲食
纂要方 水腫蠱脹 屬羊下

芩子三分水淘去浮者大棗四十九個水三升煮
乾只取棗去皮核每空心食一個米飲下覺熱即

止 聖水瀉日久 青州乾棗十個去核人黃芩子
填滿札定燒存性每聚米飲服

一錢 澹錄 聖水瀉日久 填滿札定燒存性每聚米飲服
聖惠方 冷疝痢下 棗許導下部因痢出更納新者

聖惠方 冷疝痢下 棗許導下部因痢出更納新者

不過三度瘥。
孟詵必効丸。
赤白下痢。
腹痛腸滑後重。大黃煨。

為未每服一錢米。
久痢不止。
變種種痢兼脫肛。荳蔻。

飲下。
普濟方。
淘去浮者煮冷芽出晒乾炒黃黑色。青洲棗。一升。

去皮核。酸醋二升同煮。搗膏。九。梧子。大。每服二十。

丸食前米飲。
聖惠方。腸風下血。
乾搗篩生薑半斤。取汁銀。

鍋中更以無灰酒二升。搜之上。火煎如稠。餉即旋。

投酒度用。酒可及五升。即止。慢火煎。令可丸。大如。

梧子。每且酒飲。通下三九。增至五七。九止。若丸時。

粘手。則以兔絲粉。襯隔之。火候忌緊。藥焦則失力。
也。初服微熱。勿怪。疾甚者。服過三日。當。
下利疾去。利亦止。絕有效。箇中方。脫肛不收。
荳蔻子。炒研。傳。風牙蟲牙。入小口瓶內。燒烟。竹。
之。聖惠方。筒引烟入。蠱孔內。熏之。即死。永不發。普濟方。用。
荳蔻子。入瓶內。以熱湯淋下口。含。辨口。令氣熏之。

冷更作齋三合乃止有涎津可去甚効。備牙齒

宣落風痛黃若子數納孔中以蠟封之亦効風毒咽腫燕水不下

腫水服黃若子末兩錢乳癰堅硬新黃若子半匙

不得嚼破外臺秘要石癰堅硬不作濃者黃若子為末醋

外臺秘要和傳瘡頭根即拔出千金方打撲折傷羊脂

方惡瘡似癩十年不愈者黃若子打撲折傷羊脂

若子未傳之燒研傳之惡犬咬傷黃若子七枚吞之

根氣味苦辛有毒主治邪瘡疥癬殺蟲時珍

附方新瘡疾不止黃若根燒灰水服一合惡癬有

蟲黃若根搗爛蜜和止開肉刺黃若根搗汁塗之

蟲黃若根搗爛蜜和止開肉刺黃若根搗汁塗之

云脚生肉刺視繫若根謂繫于裙帶上也

狂犬咬人 荑若根和塩搗傳口三上 外臺秘

要 惡刺傷人 荑若根水煮汁浸之冷 千金方 箭頭不出 萬

神應丹端午前一日不語尋見荑若科根本枝葉花實全好者道云先生你却在這裏道罷用柴灰

自東南起圍子以木楔子掘取根下周迴土次日日未出時依前不語用鑽頭取出洗淨勿令雞犬

婦人見于淨室中以石白搗如泥丸彈于大黃丹為衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先

以象牙未貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中綿兜肚繫了當便出也 張子和儒門事親方

雲實 本經上品

釋名 員實 別錄 雲英 別錄 天豆 吳普 馬豆 圖 羊石子 圖 苗

名草 雲母 唐 臭草 圖 粘刺 綱目 時珍 員亦音雲

本草綱目 卷十七上

羊石當作羊矢
其子肖之故也

集解

別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾晉曰
莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩相值六

月花八月九月實十月采弘景曰處處有之子細

如葶藶子而小黑其實亦類葶藶苦燒之致鬼未見

其法徼恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆

故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如苜

蓿枝間微刺俗謂苗爲草雲母陶云似葶藶者非

也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其

莢如豆其實青黃色大若麻子五月六月采實頌

曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石

子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時卽

枯落也時珍曰此草山原甚多俗名枯刺赤莖中

空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿

枝莢長三寸許狀如肥皂莢內有子五六粒正如

鵲豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚

殼白仁咬之極堅重有腥氣

實修治

穀旦凡采得粗搗相對揀淨
顆橡實蒸一日揀出暴乾

氣味辛温無毒

別錄曰苦晉曰神農辛
小温黃帝賦雷公苦

主治泄痢

腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱本經消渴

別治瘡多用蘇頌主下膿膿血時珍

附方新蠱下不止雲實女萎各一兩桂半兩川烏
頭二兩為末蜜丸梧子大每服

五丸水下日三
服肘后方

花主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本殺精物下水燒之致鬼別錄

發明時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂
豈有久服輕身之理此古書之訛也

根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之時珍

蓖麻唐本草

釋名 頰曰葉似大麻子形宛如牛脾故各時珍曰蓖亦作蠅蠅牛虱也其子有麻點故名蓖麻

集解 子如牛脾今胡中來者莖赤高丈餘子大如皂莢核用之亦良保昇曰今在處有之夏生苗葉似葦草而大厚莖赤有節如甘蔗高丈餘秋生細

花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根口乾用時珍曰其莖有赤有

白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗纍纍黃色每枝結實數十顆上有刺攢

族如蠟毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛脾兩

去斑殼中有仁嬌白如積隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子修治

數曰凡使勿用黑天赤利子綠在地蔓上
是類兩頭尖有毒其莖麻子節節有黃黑

斑凡使以鹽湯煮半日去皮取子研用時珍曰取
蓖麻油法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有

沫撇起待沫盡乃止去水以沫
煎作點燈不汙滴水不散為度

氣味甘辛平有小毒

時珍曰凡服蓖麻者一生不
得食炒豆犯之必脹死其油

能伏丹
砂粉霜

主治水瘕以水研二十枚服之吐惡沫加

至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體

瘡痒浮腫尸疰惡氣榨取油塗之

唐本研傳瘡癢疥

癩塗手足心催生

大明治癩癧取子炒熟去皮每卧

時嚼服二三枚漸加至十數枚有效宗主偏風不

遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺齁喘
脚氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺大肉女人胎衣不下
子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔

毒時

發明

震亨曰蓖麻屬陰其性善收能追膿取毒亦
外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣

剝骨膠血者用之時珍曰蓖麻仁甘辛有毒熱氣
味頗近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開
通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口目喎斜頭
風七竅諸疔不止于出有形之物而已蓋鴉鴉油
能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多
用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂
射香鯨鯉甲等藥煎作摩膏日摩數次一月餘漸
復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手

臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈一人
病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗煖太陽穴一
夜痛山一婦產後子腸不收搗仁貼其丹出一夜
而上此藥外用累奏奇功但內服不可輕率爾或
言搗膏以筋點于驚馬六畜舌根下即不
能食或點臍內即下血死其毒可知矣

附方 舊九新半身不遂 失音不語 取蓖麻子油一
斗銅鍋盛油着酒

中一日煮之令熟細口月喘斜 蓖麻子仁搗膏左
細服之 外臺秘要 貼右右貼左即正

○婦人良方用蓖麻子仁七七粒研作餅在燭安
在左手心左燭安在右手心却以銅盃盛熱水坐

藥上冷即換五六次即正也○一方用蓖麻子
仁七七粒巴豆十九粒射香五分作餅如上用風

氣頭痛 不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨右在
貼太陽穴解髮出氣甚驗○德生堂方用

蓖麻油紙剪花貼太陽亦效○又方蓖麻仁半兩
棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕即

芥子

止八種頭風

蓖麻子剛子各四十九粒去殼雀腦

掛風處陰乾用時先將好茶調成膏子塗蓋內

後將灰火燒前藥烟起以蓋覆之待烟盡以百沸

葱湯點蓋內茶葉服之後以綿鼻塞不通蓖麻子

被裹頭卧汗出過風袖珍方

粒大棗去皮一枚搗勻綿裹塞之一天柱骨倒兒

日一易三十日聞香臭也聖濟錄

疝疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散

貼之木蠶子六筒去殼蓖麻子六十粒去殼研勻

先包頭擦頂上令熱以津五種風癩近用蓖麻子

調藥貼之鄭氏小兒方

仁二兩黃連一兩石膏水一盞文武火煮之乾即

添水三日兩夜取出黃連只用蓖麻風乾勿令見

日以竹刀每個切作四段每服二十段食後荆芥

湯下日二服終身忌食豆犯之必腹脹死衛生

寶舌上出血蓖麻子油紙擦燒烟熏舌脹塞口

仁以一粒去殼切油塗紙上作煖燒烟熏之未退
再專以念為度有人舌硬出口外一村人用此法

而愈經急喉痺塞牙關緊急不通用此即破以
驗良方經急喉痺塞牙關緊急不通用此即破以

烟熏及即退或只取油杜在方用苧麻
作燃尤妙各聖烟筒

一錢同研新汲水服之連進二三服効○三因方
用苧麻仁荆芥穗等分為末蜜丸綿包嚼嚥之

千水氣脹滿苧麻子仁研水解得三合清旦一頓
服盡日中當下青黃水也或云壯人

止可服五粒外臺秘要脚氣作痛苧麻子七粒去殼研爛同
蘇合香丸貼足心痛即止

也外臺秘要小便不通苧麻仁三粒研細入紙揉內
擣外臺秘要小便不通苧麻仁三粒研細入紙揉內
擣

喘咳嗽見効終身不可食炒豆衛生易簡方衛生易簡方
衛生易簡方衛生易簡方

生下胞崔元亮海上集驗方取苧麻子七粒去殼
研膏塗脚心若胎及衣下便速洗夫不備

生下胞崔元亮海上集驗方取苧麻子七粒去殼
研膏塗脚心若胎及衣下便速洗夫不備

腸出卽以此膏塗頂則腸自入也○肘后方

云差難取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立

下子宮脫下蓖麻子仁楮檉等分爲末安紙上托入仍以蓖麻子仁十四枚研膏塗頂

心卽入盤腸生產塗頂方催生下胎不拘生胎死胎蓖麻二個

巴豆二個射香一分研貼臍中并足心○一切毒

又下生胎一月一粒溫酒吞下集簡方

腫痛不可忍蓖麻子仁搗癩風鼻塌手指攣曲節

腫傳卽止也肘后方問肩不可忍

漸至漸落用蓖麻子一兩去皮黃連一兩剉豆大

以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後

取蓖麻子一枚劈破而東以浸藥水吞之漸加至

四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜

猪肉試之如不發是効也若發動小兒丹痛連麻

再服直候不發乃止杜任方

個去皮研入麩一匙水調癩癭結核蓖麻子炒去

塗之甚効修真秘旨皮每睡時服

二三枚取効一生不可
喫炒豆 阮氏經驗方 癩癧惡瘡 及軟癩用白膠

化去滓以蓖麻子六十四個去殼研膏溶膠投之
攪勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得

所以絳帛量瘡大小攤貼一膏 肺風面瘡 起白屑
可治三五癩也 儒門事親

赤瘡用蓖麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒在
松三錢肥皂一個搗為丸洗面用之良 吳夔扶

壽面上雀斑 蓖麻子仁密陀僧硫黃各一錢為末
方 用羊髓和勻夜夜傅之 滴立方

髮黃不黑 蓖麻子仁香油煎焦去滓 耳卒聾閉 蓖
子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入乳小兒乳

汁和左作餅每以綿裹一枚塞之覺耳中熱為度
一日一易二十湯火灼傷 蓖麻子仁蛤粉等分研

日瘡 子金方 湯火灼傷 膏湯傷以油調火灼以
水調塗之 刺入肉 蓖麻子去殼一個先以帛

齒今錄驗 刺入肉 視傷處傅之類看若見刺
芥子

出如接去恐藥緊弩出好肉或加竹木骨更菹麻

白榜肉同研尤好衛生易簡方

一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根嚙燕自

然不見。又方菹麻油紅麴等分研細沙糖九皂

子大綿裹含雞魚骨哽菹麻子仁研爛入百藥煎

燕痰出大良芭麻子五十粒去殼以井花研膏

牛九惡犬咬傷先以鹽水洗吹痛處乃貼此膏

即不袖珍方

葉氣味有毒主治脚氣風腫不仁蒸搗暴之日二

三易即消又油塗炙熱熨顛上止鼻衄大驗蘇恭治

痰喘欬嗽時珍

附方新齧喘痰嗽傳門事親方用九尖菹麻葉三

錢入飛過白礬二錢以猪肉四

薄批搽藥在肉何某製之文武火煨細嚼以
白湯送下名九仙散○普濟方論效不問
年深日近用經霜芭麻葉經霜桑葉米殼炒
各一兩為末蜜丸梧子大每服一丸白湯化下日

服名
無憂丸

附錄博落迴

拾遺藏器曰有大毒主惡瘡櫻根癩
贅瘰肉白殿風蠱毒精魅溪毒瘡癩

和百丈青雞桑灰等分為末傳之蠱毒精魅當別
有法生江南山谷莖葉如芭麻莖中空吹之作聲
如博落迴折之有黃汁藥
人立死不可輕用入口

常山

本經

蜀漆

同上

釋名恒山

吳

互草

本經

雞屎草

華

鳴屎草

日華時珍

恒山亦常

也恒山乃北岳名在今定州常山乃郡名亦今真
定豈此藥始產于此得名歟蜀漆乃常山苗功用

本草綱目卷之七上 吳 芥子園

相同今

何為

集解別錄曰常山生益州川谷及漢中二月八月

常山苗也五月采葉陰乾弘景曰常山出宜都

建平湘實黃者呼為雞骨常山用之最勝蜀漆是

常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名

故是同處爾彼人采得繫結作丸得時燥者佳棗

曰常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉

似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結

實青圓三子為房其草暴燥色青白堪用若陰乾

便黑爛醫藥矣深昇曰今出金州房州梁州中江

縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六月采葉

名蜀漆也李含光曰蜀漆是常山莖八月九月采

之類曰今沐西淮浙湖南州郡亦有之並如土說

而海州出者葉似扇葉八月有花紅白色子紫色

似山棟子而小今天台山出一種藥名土常山苗

葉極甘人用為飲甘味如蜜又當養香草性涼益

人非此
常山也

修治

數曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以甘草細剉同水拌濕蒸之臨時去甘草取蠟

以酒浸一宿漉出日乾熬搗用時珍曰近時有酒浸蒸熟或瓦炒熟者亦不甚吐人又有醋制者吐人

常山氣味苦寒有毒

別錄曰辛微寒晉曰神農岐伯苦桐君字有毒李當之士

寒權曰苦有小毒炳曰得甘草吐瘧之才至治傷日畏玉札天明日忌葱菜及菘菜伏砒石

寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆
本經療鬼蠱

往來水脹洒洒惡寒鼠瘦
別錄治諸瘧吐痰涎治頑

下腐瘦

甄權

蜀漆氣味辛平有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒元素曰辛純陽病曰枯梗為

之使乏才且括樓為之使惡貫衆

主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅

痞積聚邪氣蠱毒鬼疰

本經療胸中邪結氣吐去之

別錄治鬼瘧多時溫瘧寒熱下肥氣

權破血洗去腥

與苦酸同用導膽邪

元素

發明

發曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切忌服之頌曰常山蜀漆為治瘧之最要不可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能

傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩作一服殊時雷公老人久病切忌之戒時珍曰常

山蜀漆有劫炭截瘧之功須在發散表邪及提出陽分之後用之得宜神効立見用失其法真氣必

傷夫瘧有六經傳五臟瘧痰濕食積皆鬼邪諸

瘧須分陰陽虛實不可一槩論也常山薑漆生川
則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致
吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅鯨鯉則
入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得
龍骨附子則入腎得草果檳榔則入脾蓋無痰不
作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已揚士瀉直指
方云常山治瘧人皆薄之瘧家多蓄炭涎黃水或
停諸心下或結癖脇間乃生寒熱法當吐痰逐水
常山豈容不用水在土焦則常山能吐之水在胞
下則常山能破其癖而下其水但須行血藥品佐
助之必收十全之功其有純熱發瘧或蘊熱內實
之證按以常山大便點滴而下似泄不泄者須
朴大黃為佐泄利數行然後護愈也又待制李
云嶺南瘴氣寒熱所感邪氣多在營衛皮肉之
欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可但
性吐人惟以七寶散冷服之即不吐且驗也

附方

舊三新

截瘧諸湯

外臺祕要常用常山三兩
水三升浸一宿煎取一

本草綱目卷之七上
卷之七上
水子

欲發前頓服取... 肘后方用常山一兩秫米

百粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發... 盡○養生王論王隱者驅瘴湯云子用此四

奇功不能盡述切勿加減萬一無吐者常山... 晒乾知母貝母草果各一錢半火一鍾

半煎半熟五更熱服渣以酒浸發煎服截瘴... 肘后方用常山一兩酒一升漬二三日分作三

平日一服少頃再服臨發又服或加甘草煮服... ○宋俠經心錄醇醪湯治間日瘧云太醫云乃

廣州方也甚驗恒山一錢二分大黃一錢半我... 草一錢二分六一盞半煎成半常山五更濕

再以水一盞煎成半日嚼末強... 學正傳治久瘧不止常山一錢半檳榔

五分烏梅一個酒一盞浸一宿五更飲之... 止永不再截瘴諸丸于金方恒山丸治數年不

發如神截瘴諸丸者兩劑瘧一月以內者一... 瘧恒山三兩研末雞子白和丸梧子大丸者

然腥氣則取晒乾收之每服二十丸... 下

更一服天明一服發前一服或吐或否即止○肘
 後丹砂九恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和作
 百下丸梧子大先發時三九少頃再服三九臨時
 服三九酒下無不斷者○曾世榮活幼心書黃丹
 丸治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦
 焙一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服三五十九
 涼酒下隔一夜一服平旦一服午後方食○葛洪
 肘后方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末為
 丸梧子大先發時服十九次服七九後服五六丸
 以瘥為度○和劑局方瞻仰丸治一切瘧常山四
 兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大
 每臥時冷酒服五十九五更再服忌鷄羊熱物○
 又勝金丸治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山八
 兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上
 法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小雞
 骨恒山雞心檳榔各一兩生研鱖鱉甲煨焦一兩
 半為末糯米粉糊丸藜豆大黃丹厥陰肝瘧寒多熱
 為衣每服三五十九如上法服厥陰肝瘧少喘息

本草綱目卷之二十七

如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄

如神恒山一兩醋浸一夜瓦器煮乾每用二錢水

一盞煎半盞五更冷服 **太陰肺瘧** 痰聚胸中病至令

熱間善驚如有所見恒山三錢甘草半錢林米三

十五粒水二鍾煎一鍾發日早分三次服 **少陰腎瘧** 淒淒然寒手足寒腰脊痛大便難日

方 錢竹葉一錢半葱白三根水一升 **牝瘧獨寒** 不熱

半煎一升發前分三服 千金方 **牝瘧獨寒** 者蜀

漆散用蜀漆雲母煨三日夜龍骨各二錢為末每

服半錢臨發日且一服發前一服酢漿水調下温

瘧又加蜀漆一錢 ○ **牝瘧獨熱** 不冷者蜀漆一錢
張仲景金匱要畧 半甘草一錢麻黃
二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入
藥再煎至一鍾未發前温服得吐則止 王燾外
臺祕 **温瘧熱多** 恒山一錢小麥三錢淡竹葉三
要 錢水煎五更服甚良 藥性論 三

十年癩

肘后方治三十年老癩及積年久癩常山黃連各一兩酒三升漬一宿以瓦釜煮取

一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當利

無不瘥者○張文仲備急方用恒山一兩半龍骨

五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸

梧子大未發時五九將發時五九白湯下支太醫

云此方神驗

無不斷者

瘡癩寒熱劉長春經驗方常山一寸

夜五更望東服之蓋臥酒醒即愈○談楚翁試驗

方用常山檳榔甘草各二錢黑豆一百粒水煎服

之乃彭司寇所傳○葛稚川肘后方用常山黃連

香豉各一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹

飲服四九欲發時

三九至午後乃食

妊娠瘡疾一錢烏梅炒五分甘

草四分水一盞酒一盞浸一夜

平日溫服姚僧坦集驗方

本
草
綱
目
卷
十
七
上
百
日
兒
瘡
人
歌
曰
瘡
是
邪
風
寒
熱
攻
直
須
術
治
免
成
空
常
山
刻
作
人
形
狀
釘
在
孩
兒
生
氣
宮
如
金
生
人
金
生
在
已
即
釘

已上木生人釘亥上火生人
小兒驚忤暴驚卒死
中惡用蜀

煎服當吐痰而愈各千金湯
阮氏胸中痰飲山

甘草各一兩水五升煮取一升去滓入蜜
千金方

附錄杜莖山圖經頌曰葉味苦寒主溫瘴寒熱作

絞汁服吐出惡涎甚効生宜用莖高四五尺葉
土

紅山頌曰葉甘微寒無毒主骨節疼痛勞熱瘴瘧

而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細
藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭土人取根

米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一
錢水一盞生薑一片附煎服亦治勞瘵甚効時珍

曰杜莖山即土恒山土紅山
又杜莖山之類故並附之

藜蘆 木經 下品

種名山葱 別錄 葱苒 同 葱茨 音 葱葵 音 豐蘆 音 葱葱

綱目 鹿葱 時珍曰 黑色曰藜 其蘆有黑皮裹之故名 根際但葱俗名葱管 藜蘆是矣 北人謂之

葱葱南人謂之鹿葱

集解 別錄曰 藜蘆生太山山谷 三月采根陰乾 普

下極但葱而多毛用之止剔取根微炙之 侯昇曰

所在山谷皆有葉似薔金 秦芫 蕤荷等根若龍膽

莖下多毛 夏生冬凋 八月采根 頌曰 今陝西山南

東西州郡皆有之 遠州均州 解州者尤佳 三月生 苜蓿似初出 摸心又似車前 莖似葱 白青紫色 高五六寸 上有黑皮 裹莖似撥皮 有花肉紅色 根似馬腸 根長四五寸許 黃白色 二月三月采根 陰乾 此有二種 一種水藜蘆 莖葉大 同只是生在近水

本草綱目卷之十一 上 木子

溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白

藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均

州土俗亦呼為鹿葱范子計然云出河東黃白者善

根修治雷曰凡采得去頭用糯米泔汁煮之從巳至未晒乾用

氣味辛寒有毒別錄曰苦微寒晉曰神農雷公辛

毒扁鵲苦有毒之才曰黃連為之使反細辛芍藥

入參沙參紫參丹參苦參惡大黃時珍曰畏葱白

服之吐不止飲慈湯即止

主治蠱毒欬逆洩痢腸辟頭瘍疥癩惡瘡殺諸蟲
毒去死肌本經療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛
瘡不入湯用別錄主上氣去積年膿血泄痢權吐上

膈風涎暗風癩病小兒顛躄痰疾 未泊馬疥

宗

發明 頷曰黎蘆服錢七一字則惡吐人又用通頂

噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不

一常山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐濕痰藜藿

子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和篇門事

親云一婦病風癩目六七十年得驚風後每一年

一作至五七年五七作三十歲至四十歲則口作

或甚至一日十餘作遂昏痴健忘求死而已值歲
大饑采百草食于野中見草若葱狀采歸蒸熟飽
食至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止約
一二月汗出如洗甚昏困三日後遂輕徒病去食
進百脉皆和以所食葱訪人乃葱苗也即本草
藜蘆是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐法耳我
朝荆和王妃劉氏年七十病中風不省人事牙

本草綱目卷之十七上 林子園

關緊閉群醫束手先考太醫史日月池翁診視藥

不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯

藜蘆湯
藜蘆十分鬱全一分爲三

附方
諸風痰飲
每以一字溫藥水一

服探吐
中風不省
牙關緊者藜蘆一兩

經驗方
炒微褐色爲末每服半錢小兒減半溫水調

灌以吐風涎爲効未吐再服
簡要濟衆
中風

不語
喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一方天白

斗四面火逼黃色研爲末生麩丸小
藜蘆一莖日乾研末入麝香少許吹鼻

方通頂散藜蘆半兩黃連三分
痰多
不食欲吐不吐藜蘆末半錢

溫薑水調下探吐
保命

炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小兒丸
每空心服一九未發時一九臨發時又服一九勿

用飲食 **黃疸腫疾** 黎蘆灰中炮為末水服半
劑後 錢七小吐不過數服効 **胸中**

結聚 如駭駭不去者巴豆半兩去皮心沙擣如泥
黎蘆炙研一兩蜜和擣丸麻子大每吞一二

九〇 **身面黑痣** 黎蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器
肘后 重湯煮成黑膏以針微刺破點之

不過三次 **鼻中息肉** 黎蘆三分雄黃一分為末蜜
効 聖惠 和點之每日三上自消勿點

兩畔〇 **牙齒蟲痛** 黎蘆末內人孔中勿
聖濟方 吞汁神効 千金真 **白禿蟲瘡**

黎蘆末猪脂調 **頭生蟻虱** 黎蘆末搽
塗之 肘後方 之 直指 **頭風白屑** 痒甚

黎蘆末沐頭搽之緊包二 **反花惡瘡** 惡肉反出如
日夜遇風効 本事方 米黎蘆末猪

脂和傳日三五 **疥癬蟲瘡** 黎蘆末生
上 聖濟錄 油和塗 **羊疽瘡痒** 黎蘆

二分附子八分爲末傳之
由自出也 陶隱居方
誤吞水蛭 黎蘆炒爲末
水服一錢必

吐出 德
生堂方

附錄山慈石 別錄有名未用曰苦平無毒主女子
帶下生山之陽正月生葉如黎蘆莖

有衣一 參果根 又曰苦有毒主鼠癩生百餘根根
名爰此 有衣果莖三月三日采根一名百

連一名烏蓼一名 馬腸根 宋圖經頌曰苦辛寒有
鼠莖一名鹿蒲 毒主蠱除風葉療瘡疥

生秦州葉似桑三月
采葉五月六月采根

水黎蘆 拾遺

齊名黃黎蘆 綱目鹿哪

集解 藏器曰陶弘景注漏蘆云一名鹿驪山南人
用菡北人用根按鹿哪乃水黎蘆非漏蘆也

乃樹生如葵萸樹高二尺有毒時珍曰鹿野但人呼為黃黎蘆小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文四月開細黃花五月結小長子如小豆大

氣味苦辛溫有毒主治疥癬殺蟲器

附子木經下品

釋名其母名曰烏頭時珍曰初種為烏頭象烏之頭也附烏頭而生者為附子

如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也別有草烏頭自附子故俗呼此為黑附子川烏頭以別之諸家不分烏頭有川草兩種皆混雜註解今悉正之

集解別錄曰附子生健為山谷及廣漠冬月采為附子春月采為烏頭弘景曰烏頭與附子同根附子八月采八角者曰烏頭四月采者時珍初

生有腦頭如烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐其蒂

本草綱目卷十七

狀如牛角者各烏喙取汁煎為射兩天雄伊附子
細而長乃至三四寸側子即附子邊角之大者並
是同根而本經附子出犍為天雄出少室烏頭出
明陵分生三處當各有所宜也今則無別矣恭曰
天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八
月采造餘處雖有造得者力弱都不相但江南來
者全不堪用大明曰天雄大而長少角刺而實附
子大而短有角平穩而實烏喙側天雄烏頭次于
附子側子小丁烏頭連聚生者各為虎掌並是天
雄一裔子母之類氣力乃有蘇等即宿根與嫩者
兩數曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏
喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底隔黑
如烏鐵天雄身全矮無尖周匝四而有响子孕十
一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者
木籠子是喙附烏雄側中毗患者不入藥用保昇
曰正者為烏頭兩岐者為烏喙細長三四寸者為
天雄根旁如芽散生者為附子旁連生者為側子
五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍齒及艾

宗奭曰五者皆一物但依大小長短以象而各之
爾頌曰五者今並山蜀土都是一種所產其種出
于龍州冬至前先將陸田耕五七遍以猪糞糞之
然後布種逐月耘耨至次年八月後方成其苗高
三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作種其實
細小如桑椹狀黑色本只種附子一物至成熟後
乃有四物以長二三寸者為天雄割削附子旁尖
角為側子附子之絕小者亦名側子元種者為烏
頭其餘大小者皆為附子以八角者為上綿州彰
明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與
本草不同謹按本草冬采為附子春采為烏頭博
物志言附子烏頭天雄一物也春秋冬夏采之各
異而廣志云奚毒附子也一歲為側子二年為烏
喙三年為附子四年為烏頭五年為天雄今一年
種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故
爾繁盛乎時珍曰烏頭有兩種出彰明者即附子
之母今人謂之川烏頭是也春未生子故曰春采
為烏頭冬則生子已成故曰冬采為附子其天雄

鳥喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及
獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃
本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其
汁煎為射菡陶弘景不知烏頭有二以附子之鳥
頭註射菡之鳥頭遂致諸家疑貳而雷斅之說九
不近理宋人楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀
之可不辯而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣
八惟彰明出附子彰明領縣二十惟赤水廉水昌
明會昌四鄉產附子而赤水為多每歲以上田熟
耕作壟取種於龍安龍州齊歸木門青地小坪諸
處十一月播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉
類地麻而厚其花紫莢黃莢長莖而圓七月采者
謂之早水拳縮而小蓋未長成也九月采者乃佳
其品凡七木同而未異其初種之小者為烏頭附
鳥頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為兩
子附而長者為天雄附而尖者為天錐附而上出
者為側子附而散生者為漏藍子皆脉絡連貫如
子附母而附子以貴故專附名也凡種一而了六

七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子
持生則特大附子之形以蹲坐正節角少者爲上
有節多巖乳者次之形不正而傷缺風皺者爲下
本草言附子八角者爲良其角爲側子之說甚謬
矣附子之色以花白者爲上鐵色者次之青綠者
爲下天雄烏頭天錐皆以豐實盈握者爲勝漏藍
側子則圍人以乞役夫不足數也謹按此記所載
漏藍卽雷斝所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其
鬲子卽烏喙也天錐卽天雄之類

醫方亦無此名功用當相同爾

修治

保昇且附子烏頭天雄側子烏喙采得以生
熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易

使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不及前法須
日五物收時一處造醱其法先於六月內造大小

麴麴未采前半月用大麥煮成粥以麴造醋候熟
去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根

鬚於新甕內淹七日攪一遍擲出以踈筒攪之
令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾爲

度若猛日則斲而皮不附肉時珍曰按附子記元
此後最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而
根不充或已釀而腐或已曝而變若有神物陰爲
之者故園人常禱於神目爲藥妖其釀法用蒲醱
安密室中淹覆彌月乃發出根乾方出曬時其大
有如拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得土
人云但得半兩以上者皆良蜀人餉者少惟秦陝
閩浙人宜之然秦人纏市其下者閩浙絕得其中
者其上品則皆貴人得之矣○弘景曰凡用附子
烏頭天雄皆熟灰微炮令析勿過焦惟薑附湯生
用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正
制其毒故也斲曰凡使烏頭宜文武火中炮令斲
折等破用若用附子須底平有九角如錢色一個
重一兩者卽是氣全勿用雜木火只以柳木灰火
中炮令斲折以刀刮去上孕子并去底火孽破於
屋下午地土坳一土坑安之一宿取出焙乾用若
陰制者生去皮尖底薄切以東流水并黑豆浸五
日夜漉出日中曝用震亨曰凡烏附大雉須用童

子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之方入
少許尤好或以小使浸二七日揀去壞者以竹刀
每個切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日酒
乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用
者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過
炮令發拆去皮臍乘熱切片再炒令內外俱黃去
火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水薑汁童
尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大熱晉曰神農辛波
伯雷公甘有毒李當之苦大溫

有大毒元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽
中之陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥好古
曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若
乾薑止而不行趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補
仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生
附配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脈四逆
湯是也戴元禮曰附子無乾薑不熱得甘草則性
緩得桂則補命門李焘曰附子得生薑則能發散

本草綱目卷之十一

十一

十一

以熱攻熱又導虛熱下行以除冷病之才曰地膽
爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃耆時珍
日畏緣豆烏韭童便犀角忌
豉汁得蜀椒食塩下達命門主治風寒欬逆邪氣

寒濕踈躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血痕

金瘡本經腰脊風寒脚氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉

筋下痢赤白温中強陰堅肌骨又墮胎爲百藥長

錄判温暖脾胃除脾濕腎寒補下焦之陽虛元除臟

腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒虬動治經閉補

虛散毒本督脉爲病脊強而厥好治三陰傷寒陰

毒寒疝中寒中風痰厥氣厥桑癩癩疔小兒疳積

風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴瀉脫陽久

痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂

久漏冷瘡合悉涕塞耳治聾時珍

烏頭即附子主治諸風風痺血痺半身不遂除寒冷

濕養臟腑去心下堅痞感寒腹痛元素除寒濕行經

散風邪破諸積冷毒李昉補命門不足肝風虛好古助

陽退陰功同附子而稍緩時珍

發明宗奭曰補虛寒須用附子風家即多用天雄

之時珍巨按王氏究原方云附子性重帶溫脾逐

寒川烏頭性輕疎溫脚去風若是寒痰即用附子

本草綱目卷下 附子 上

風疾即用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥
 及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也又此用烏
 附藥虛宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽
 上浮治之以寒則陰氣益甚而病熾治之以熱則
 格而不納熱藥冷飲下咽之後冷體既消熱性
 便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之
 妙也昔張仲景治寒疝內結用蜜煎烏頭近効方
 治喉痺用蜜炙附子含之燒汁朱丹溪治疝氣用
 烏頭卮子並熱因寒用也李東垣治馮翰林姪會
 盛格傷傷寒面赤目赤煩渴引飲脈來七八至但
 按之則散用薑附湯加入參投半斤服之得汗而
 愈此則神聖之妙也冥殺曰附子乃陰證要藥凡
 傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脈沉者
 必用之以厥冷腹痛脈沉細甚則唇青囊縮者急
 須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰
 證傷寒往往疑信不敢用附子直待陰極陽竭而
 用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣頓衰必
 須急用人參健脈以益其原佐以附子溫經散寒

捨此不用將何以救之劉完素曰俗方治麻痺多
用烏附其氣暴能衝開道路故氣愈麻及藥氣盡
而正氣行則麻病愈矣張元素曰附子以白朮爲
佐乃除寒濕之聖藥濕藥宜少加之引經又益火
之原以消陰翳則便溺有節烏附是也虞搏曰附
子稟雄壯之質有斬閉奪將之氣能引補氣藥行
十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以
滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表
之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕震
亨曰氣虛熱甚者宜少用附子以行參耆肥人多
濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用爲少陰嚮
導後世因以附子爲補藥誤矣附子走而不守取
其健悍走下之性以行地黃之滯可致遠爾烏頭
天雄皆氣壯形偉可爲下部藥之佐無人表其害
人之禍相習用爲治風之藥及補藥殺人多矣王
履曰仲景八味丸兼陰火不足者設錢仲陽六味
地黃丸爲陰虛者設附子乃補陽之藥非爲行滯
也好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可僭用服

附子以補火必妨酒水○時珍曰烏附毒藥非危病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人經服

錢七即發燥不堪而昔人補劑用為常藥豈古今運氣不同耶荆府都昌王體瘦而冷無他病日

以附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數歲蕪州衛張百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張

杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熟附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至

九十他人服一粒即為害若此數人皆其臟腑稟賦之偏服之有益無害不可以常理概論也又瑣

碎錄言滑臺風上極寒民啖附子如啖芋栗此則地氣使然爾

附方

舊二十六
新八十七

少陰傷寒

初得二三日脈微細但欲寐小便色白者麻黃

附子甘草湯微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻黃去沫納二

味煮取三升分作三服取少陰發熱少陰病始得

微汗張仲景傷寒論少陰發熱反發熱脈沉

者麻黃附子細辛湯發其汗麻黃去前二兩附子

炮去皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫乃

納二味同煮三升少陰下利少陰病下利清穀裏

分三服同上少陰下利少陰病下利清穀裏

微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔

或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯用大附子

一個去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三兩水三

升煮一升分溫再服其脈即出者愈面赤加葱九

莖腹痛加芍藥二兩嘔如生薑二兩咽痛加陰病

枯梗一兩利止脈不出加人參二兩同上陰病

惡寒傷寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘草

附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮

去皮一枚水五升煮取一升五合分服同上傷寒發躁

一升五合分服同上傷寒發躁傷寒下後又發

不得眠夜不安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無

大熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚

去皮破作八片水三升煮陰盛格陽傷寒陰盛格

取一升頓服傷寒論陰盛格陽傷寒陰盛格

本草綱目草部卷十七上

本草綱目草部卷十七上

熱而不飲水脉沉手足厥逆者是此證也霹靂散

用大附子一枚燒存性為末蜜水調服通散寒氣

然後熱氣上行而汗熱病吐下及下利身冷脉微

出乃愈孫兆口訣熱病吐下發躁不止者附子

炮一枚去皮臍分作八片人鹽一錢水陰毒傷寒

一升煎半升温服立効經驗良方

孫兆口訣云房後受寒少腹痛疼頭疼腰重手足

厥逆脉息沉細或作厥逆並宜退陰散用川烏頭

乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一盞蓋一

徹煎取半盞温酒得汗解○本事方五女散治陰

毒心腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日

切晒紙裹收之遇有患者取為末一錢入鹽八分

水一盞煎八分服壓下陰毒如猪血相似再進一

服○濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹

痛身冷一切冷氣大附子三枚炮裂去皮臍為末

每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如

火煖為度○續傳信方治陰毒傷寒煩燥迷悶急

者用半兩重附子一箇生破作四片生薑一大塊

作三片 米一撮 以水一升煎六合 溫服 煖卧 令汗出 或不出 候心定 則以水解散之 類解之 不得

與冷水如渴更煎 **中風痰厥** 昏不知人口眼喎斜 并體虛之人患此疾 洋服屢用多効

寒多者 五生飲用 生川烏頭生附子 並去皮臍各半兩 生南星一兩 生木香一錢 五分 每服三錢 生薑十片 水二盞

煎一盞 溫服 齋 **中風氣厥** 痰壅昏不知人 六脉沉去皮生木香半兩 每服四錢 薑九片 **中風偏廢** 活

水二盞 煎七分 溫服之 濟生方 **中風偏廢** 活湯用生附子一箇 去皮濟羌活烏藥各一兩 每服四錢 生薑三片 水一盞 煎七分 服 王氏簡易方

半身不遂 遂令癖症 用附子一兩 以無灰酒一升 浸一七日 隔日飲一合 延年秘錄

風病難緩 手足躄曳 口眼喎斜 語音蹇澀 步履不 五靈脂各五兩 為末 入龍腦射香五分 滴水為丸 如彈子大 每服一丸 先以生薑汁研化 暖酒調服

本草綱目 卷十七 上 至 芥子園

一日二服至五七丸便覺手擡移
得步十九可以梳頭也
梅師方
風寒濕痺
麻水

或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一盃
入末四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹

服之或人薏苡末二錢左傳云風淫末病謂四末
也脾主四肢風淫客則侵脾而四肢病也此湯

極有力子每授人良體虛有風
外受寒濕身如在
空中生附子生天

南星各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服予
曾病此醫傳張子發授此方二服愈
本事方

眼喎斜
生烏頭青礬各等分爲末每用一字嚙入
鼻內取涕吐涎立効無比名通開散
篋

中秘
寶方
口卒噤瘖
吹入喉中瘖
卒性停尸並用附子末
千金翼
產後中風

身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩對塊黑大
豆半升同炒半黑以酒三升傾鍋內急攪以絹濾

取酒微溫服一小盞取汗若口不開拗開灌之未
効加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥爲度
小品

効加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥爲度
小品

諸風血風

烏荆主治諸風縱緩言語蹇澇偏身麻痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩脾

風臟毒下血不止者服之尤効有痛風攣搖頰頰

不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去皮臍一兩

荆芥穗二兩為末醋麩糊丸梧子大婦人血風虛

溫酒或熟水每服二十九和劑方

月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮腫頑麻用

烏頭一斤清油四兩鹽四兩縮內同熬令裂如桑

椹色為度去皮臍五靈脂四兩為末搗勻蒸餅丸

如梧子大空心溫酒鹽湯下二十九亦治丈夫風

疾 枌 諸風癩疾 生川烏頭去皮二錢半五靈脂

師方 半兩為末猪心血九梧子大每

薑湯化 小兒慢驚 搗搗涎壅喉逆川烏頭生去皮

服一九 臍一兩全蠟十個去尾分作三

服水 一盞薑七片煎 小兒項軟 乃肝腎虛風邪驚

服 楊氏嬰孩寶鑑 小兒項軟 人用兩字去皮臍

天南星各一錢為末薑汁調服貼 小兒顛陷 縮烏

天枳骨內服瀉青丸 全幼心鑑 小兒顛陷 頭附

子並生去皮癩二錢雄黃八分爲末
葱根搗和作餅貼陷處
全切心
麻痺疼痛

九治手足麻痺或癩換疼痛腰膝痺痛或打撲傷
損閃筋痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩
威靈仙五兩洗焙爲末酒糊丸梧子大每服七丸

至千九搗湯下忌茶此藥常服其効如神
普濟

方
風痺肢痛
營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同
炒至汗出爲度去豆焙乾全蠍半錢

焙爲末醞醋熬稠丸綠豆大每
溫酒下七丸日一服
聖惠方
腰脚冷痺
疼痛有

頭三箇生去皮臍爲散醋調塗
帛上貼之須臾痛止
聖惠方
大風諸痺
痰涎張

子半兩者二枚炮折酒漬之春冬五日夏
秋三日每服一合以瘥爲度
聖惠方
脚氣腿

腫久不瘥者黑附子一箇生去皮臍爲散生薑汁
調如膏塗之藥乾再塗腫消爲度
簡要濟衆

十脂疼痛
蘇木不仁生附子去皮臍木香各等分
生薑五片水煎溫服
下氏簡易方

搜風順氣

烏附丸用川烏頭二十個香附子半斤
薑汁淹一宿炒焙為末酒糊丸梧子大

每温酒下十九肌體肥壯有

風疾者宜常服之

澹寮方

頭風頭痛

外臺秘要
用臘月烏

頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日

温服○孫兆口訣用附子炮石膏煨等分為末入

腦射少許每服半錢茶酒任下○修真秘旨用附

子一枚生去皮臍綠豆一合同入銚子內煮荳熟

為度去附子食綠豆立瘥每

箇可煮五次後為末服之

風毒頭痛

聖惠方治
風毒攻注

頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑

一兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調附末

一錢温服○又方治二三十年頭風不愈者用大

川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二

錢細茶三錢薄荷七葉塩梅一箇水一盞煎七分

臨臥温服○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭

一錢白芷四錢為末茶服一字

仍以末噴鼻有人用之得効

風寒頭痛十便良
方治風

寒客于頭中清涕項筋急硬胸中寒痰嘔吐清水
 用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎藭生
 薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五
 錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩○三因
 方必効散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有
 神効用大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙
 再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末
 每服一錢鹽茶清調下忌熱物少時
頭風摩散
 沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附
 子一箇炮食鹽等分為末以方寸匕摩額上令藥
 力行或以油調稀亦可
年久頭痛 川烏頭天南星
 一日三上 張仲景方
調塗太陽
頭風斧劈 難忍川烏頭末燒烟熏碗
 穴 經驗 內溫茶炮服之 集簡方
痰
厥頭痛 如破厥氣上衝痰塞胸膈炮附子三分釜
 墨四錢冷水調服方寸七當吐即愈忌猪
肉冷
腎厥頭痛 指南方用大附子一個炮熟去皮
 水 生薑半兩水一升半煎分三服○

經驗良方菑根丸治元陽虛頭痛如破眼睛如維
刺大川烏頭去皮微炮全蠍以糯米炒過去米等

分爲末薑根汁九綠豆大每薄荷茶下十五丸一日一服氣虛頭痛氣虛上壅

不可忍者大附子一枚去皮臍研末葱汁麩糊丸
綠豆大每服十九丸茶清下○僧繼洪澹寮方蠍附

九云氣虛頭痛惟此方最合造化之妙附子助陽
扶虛鍾乳補陽鎮墜全蠍取其鑽透葱涎取其通

氣湯使用椒以達下益以引用使虛氣下歸對證
用之無不作効大附子一枚剗心入全蠍去毒三

枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麩少許水
和作劑包附煨熟去皮研末葱涎和丸梧子大每

椒鹽温下腎氣上攻頭項不能轉移椒附丸用大
五十九丸熟附子一枚爲末每用二錢

以椒二十粒用白麩填滿椒口水一盞半薑七片
煎七分去椒入鹽空心點服椒氣下達以引進氣

歸經也鼻淵腦泄泥倉涌泉穴普濟耳鳴不止

本方

無書夜者烏頭燒作灰菖蒲等分

綿裹塞之日再用取効楊氏產

附子醋浸削尖插之或更於

上灸二七壯木草拾遺

灌耳中喉痺腫塞

肘后附子去皮炮令拆以蜜塗上灸

即膿出未成者即久患口瘡

消出木草拾遺生附子為末醋麪調

再換之風蟲牙痛普濟方用附子一兩燒灰枯礬

川附子生研麪糊丸小豆大每綿包一丸

咬之○刪繁方用炮附子末納孔中乃止

腫疼痛不得開淚出不止削附子赤皮末如蠶

砂大着背中以定為度張文仲備急方

切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益

子盛以童子小便浸七日逐日添令溢出揀去壞

者不用餘以竹刀切作四片新及水淘七次乃

浸

浸

之日日換水日足取焙為木酒煮麩糊丸綠豆大
每服十九空心鹽湯下少粥飯壓之經驗方

升降諸氣暖則宣流熟附子一大箇分作二服水
二盞煎一盞入沉香汁溫服 和劑局

方中寒昏困薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍
腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒之病生

附子一兩去皮臍乾薑炮一兩每服三
錢水二鍾煎一鍾溫服 和劑局方 **心腹冷痛**

冷熱氣不和山厄子川烏頭等分生研為末酒糊
丸梧子大每服十五丸生薑湯下小腸氣痛加炒

苗香葱酒下二十 **心痛疝氣**濕熱因寒鬱而發用
丸 王氏博濟方 厄子降濕熱烏頭破

寒鬱烏頭為厄子所引其性急速不留胃中也川
烏頭山厄子各一錢為末順流水入薑汁一匙調

下丹 **寒厥心痛**及小腸膀胱痛不可止者神砂
溪纂要 一粒丹用熟附子去皮鬱金橘

紅各一兩為末醋麩糊丸如酸棗大朱砂為衣
每服一九男子酒下女人醋湯下 宣明方 **寒**

本草綱目卷之七

疝腹痛 遶臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎五枚去臍水三升煮取

一升去滓納蜜二升煎令水氣盡強人服七合弱人服五合不瘥明日更服 張仲景金匱玉函方

寒疝身痛 腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭桂枝湯五之烏頭一味以蜜二斤

煎減半入桂枝湯五合解之得一升初服二合不知再服又不知加至五合其知者如醉狀得吐為

中病也 **寒疝引脇** 脇心腹皆痛諸藥不効者大金匱玉函 烏頭五枚去角四破以白蜜

一斤煎令透取焙為末別以熟蜜和九梧子大每服二十九冷鹽湯下永除 崔氏方 **寒疝**

滑泄 腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑

七片煎七分温 **小腸諸疝** 倉卒散治寒疝腹痛小腸氣膀胱氣脾腎諸痛

服 濟生方 攣急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山嵐子炒焦四兩每用二錢水一盞酒半盞煎七分入

蓋一捻温服。宣明方治陰疝小腹腫痛加蒺藜子等分。虛者加桂枝等分薑糊為丸酒服五十

九虛寒腰痛

鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩薑花三分為末棗肉和九梧

子大每服三十九空。心温酒下。夷堅志云時康

祖大夫病心胃一漏數竅流汗已二十年又苦腰

痛行則僂俛形神憔悴醫不能治通判韓子温為

檢聖惠方得此方令服旬餘腰痛減久服遂瘥心

漏亦瘥精力倍常步履輕捷**元臟傷冷**附子炮去

此方本治腰而効乃如此皮臍為末以水二盞入藥二錢

一盞空心服去積冷暖下元肥腸益氣酒食無碍

○梅師方二虎九補元臟進飲食壯筋骨用烏頭

附子合四兩釀醋浸三宿切作片子攤一小坑炭

火燒赤以醋二升同藥傾人坑內用盆合之一宿

取出去砂土入青鹽四兩同炒赤黃色為末醋打

麩糊丸如梧子大空心冷**胃冷有痰**脾弱嘔吐生

酒下干五丸婦人亦宜附子半夏各

齊子園

二錢薑十片水二盞煎七分空心溫服久冷反胃

一方並炮熟加水香五分奇効良方

經驗方用大附子一箇生薑一兩剉細同煮研如

麵糊每米飲化服一錢衛生家寶方用薑汁打

糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十九斗

門方用長犬附子一箇坐干磚土四面着火漸逼

以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半

碗乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或

以猪腰子切片炙熟蘸食方便集用大附子一

箇切下頭子剉二竅安丁香四十九個在內仍合

定線紫入砂銚內以薑汁浸過文火熬乾為末脾

每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷用

寒瘧疾濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧

寒多熱少或但寒不熱宜七束湯子之用

附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服

水一碗生薑七片棗七枚煎七分露一宿發日空

心溫服未久再進一服王璆百一選方云寒痰宜

附子風痰宜烏頭若用烏頭則寒多者火炮七次

熱多者湯炮七次去皮焙乾如上法用烏頭性熱炮多則熱散也○又果附湯用熟附子去皮草果

仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日早溫服○肘後方臨發時以醋和附子塗于背上

寒熱瘧疾

附子一枚重五錢者麩煨人參丹砂各一錢為末煉蜜丸梧子大每服二十九

未發前連進三服中病則吐或身體麻木未中病來日再服 龐安常傷寒論瘧瘧寒熱

冷瘧寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引飲或自利煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四破每以

片水一盞生薑十片煎七分溫服李侍制云此方極妙章傑云嶺南以嘔瘧為危急不過一二日而

死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得非以熱攻熱而發散寒邪乎真起死回生之藥也

嶺南 衛生方 小便虛閉 兩尺脈沉微用利小水藥不効者乃虛寒也附子一個炮去皮

臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服四錢水腫疾喘滿一盞半燈心七莖煎服即愈 晉濟方

大人小兒男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沉香一錢磨水同煎食前冷飲附子雖三五十枚亦無害小兒每服三錢水煎

脾虛濕腫 大附子五枚去皮四服 朱氏集驗方 破以赤小豆半升藏附子于中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十九蘿蔔湯下 朱氏集驗方

陰水腫滿

烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸九小豆

大每服三五丸取小便利為佳忌油膩酒麩魚肉

○又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦

去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服 **大腸冷秘** 附

三子九煎流氣飲送下 普濟方

一枚炮去皮取中心如棗大為末 **老人虛泄** 不

二錢蜜水空心服之 聖濟總錄

子一兩赤石脂一兩為末醋糊丸梧
子大米飲下五十九 楊氏家藏方 冷氣洞泄

烏頭一兩水香半兩為末醋湖丸
子大每陳皮湯下二十九 本事方 臟寒脾泄及

人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩煨熟大附子
去皮臍一兩五錢為末粥丸梧子大每服八十九

連肉煎湯下○十便良方治脾胃虛冷大腸滑泄
米穀不化乏力用大附子十兩連皮同大棗二斤

於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每個
切作三片再同煮半日削去皮切焙為末別以棗

肉和丸梧子大每空 小兒吐泄 注下小兒少白龍
心米飲服三四十九 丸用熟附子五錢

白石脂煨龍骨煨各二錢半為末醋糊丸
黍米大每米飲量兒大小服 全切心鑑 霍亂

吐泄 不止附子重七錢者炮去皮臍為末每服四
錢水二盞鹽半錢煎一盞溫服立止 孫兆

秘寶 水泄久痢 川烏頭二枚一生用一以黑豆半
方 合同煮熟研丸綠豆大每服五九

本草綱目卷之九 泄瀉 上

黃連湯下
普濟方久痢赤白
獨聖丸用川烏頭一個灰火

研末酒化臘丸如大麻子大每服三九赤痢黃連
甘草黑豆煎湯放冷吞下白痢甘草黑豆煎湯冷

吞如瀉及肚痛以水吞下並空
心腹之忌熱物
經驗良方
久痢休息
熟附子

末雞子白二枚搗和九梧子大傾入沸湯
煮數沸漉出作兩服米飲下
聖濟總錄下痢欬

逆
此不止服此兩服而愈方見前陰毒傷寒下
服沉陰寒者退陰散主之陳自明云一人病下

血虛寒
日久腸冷者熟附子去皮拓白礬一而為
末每服三錢米飲下
又方熟附子一枚

去皮生薑三錢半水煎服或
加黑豆一百粒
並聖惠方陽虛吐血
生地黃一

酒少許以熟附子一兩半去皮臍切片入汁內而
器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和

搗九梧子大每空心米飲下三十九丸昔葛祭判妻
苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢効
余居世

選奇 溲數白濁 熟附子為末每服二錢薑三片 虛水一盞煎六分溫服 普濟方 虛

火背熱 虛火上行背內熱如火炙者附 經水不調 子未津調塗漏泉穴 摘玄方

血臍冷痛此方平易捷徑熟附子去皮 斷產下胎 當歸等分每服三錢水煎服 普濟方

生附子為末淳酒和塗右 折腕損傷 卓氏膏用大 足心胎下去之 小品方 附子四枚生

切以猪脂一斤三年苦醋同漬三宿取 癰疽腫毒 脂煎三上三下日摩傅之 深師方

川烏頭少黃蘗炒各一兩為末唾調 癰疽久漏瘡 塗之 乾則以米泔潤之 同上

冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大 疔厚三分安瘡口上以艾炙之隔數日一灸灸至

五七次仍服內托藥自然肌肉長滿 癰疽弩肉如 研末作餅子亦可 薛己外科心法

不斂諸藥不治此法極妙附子削如棋子大以唾 粘貼上用艾火炙之附子焦復唾濕再灸令熱氣

本草綱目卷之...

徹內即瘥

千金方

癰疽肉突

烏頭五枚濃醋三升漬三日

驗

丁瘡腫痛

醋和附子末塗之

千金翼

久生疥癬

川烏頭

水煎洗甚

驗

聖惠

手足凍裂

附子去皮為末以水麪調

談楚翁試驗方

足

釘怪疾

兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨生碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝

腎冷熱相吞用炮川烏頭末傅之內服非子湯効

夏氏奇疾方

烏頭附子尖主治為末茶服半錢吐風痰癩癩

時珍

發明

時珍曰烏附用尖亦取其銳氣直達病所爾無他義也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢

厥逆用附子尖一箇硫黃棗大一箇蠟稍七箇為末薑汁麪糊丸黃米大每服十九米飲下亦治久

瀉泄羸凡用烏附不可執為性執審其手足冷者

輕則用湯甚則用九重者用膏候手足暖陽氣回

輕則用湯甚則用九重者用膏候手足暖陽氣回

卽爲佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非其慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒

附方

舊一
新七

風厥癩癩

凡中風痰厥癩癩驚風痰涎上壅牙關緊急上視接搦並

宜碧霞丹至之烏頭尖附子尖蠟梅各七十箇石綠研九度飛過十兩爲末麩糊丸芟子大每用一

九薄荷汁半盞化下更服溫酒半台須臾吐由痰涎爲妙小兒驚癩加白僵蠶等分

臍風撮口

生川烏尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙射香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以

薄荷湯灌

木舌腫脹

川烏尖巴豆研細醋調塗刷

難忍

爲了尖天雄尖全蠍各七箇生研爲末點之

奔豚疝氣

作痛或陰

囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七箇巴豆七枚去皮油爲末糕糊丸梧子大朱砂麝香爲衣每服二丸

空心冷酒或冷鹽湯下三兩日一服不可多澹察方

割甲成瘡

連年不愈川烏頭尖

六... 子... 割... 子... 割... 子...

本草綱目卷之十一

黃蘗等分爲末洗了貼之

老幼口瘡

烏頭尖

一箇

以愈爲度
古今錄驗
研末薑汁和塗足心男左女右不過二三次即愈

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄本經下品

釋名曰幕本經時珍曰天雄乃種附子而生出或

而尖者謂之天錐象形也

集解別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘景曰今採用八月中旬天雄似附子細而長

乃至三四寸許此與烏頭附子三種本出建平故謂之三建今宜都假山者最好謂為西羌錢塘間

者謂為東建氣力小弱不相似故曰西水滸勝東白也其用灰殺之時有水強者不佳秦曰天雄附

子烏頭並以蜀道隴州出者佳餘處縱有劣弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

本草綱目草部第十七卷下

頭苗名董音新爾雅云芫董草是也今訛董為建遂以建平譯之矣承曰天雄諸說悉簡但始種而不生附子側子經年獨長大者是也蜀人種之尤忌生此以為不利如養蠶而成白殭之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成長者即如種芋形狀不一之類一種是他處草鳥頭之類自生成者故別錄註鳥喙云長三寸已上者為天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半

有象眼者乃佳餘見附子下

修治

敦曰宜炮絨去皮尖底用或陰制如附子法亦得天明曰凡丸散炮去皮用飲藥即和皮

生使甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日掘土坑用炭半秤煨赤去火以醋二升沃之候乾

菜熟入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

氣味辛溫有大毒

剝錄曰甘大溫權曰大熱宜乾薑制之○乏才曰遠志為之使

惡腐婢
思歧汁

室治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣

金瘡強筋骨輕身健行本經療頭面風去來疼痛心

腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志

令人武勇力作不倦別錄禹錫曰按淮南子云天雄雄雞志氣益任云取天雄

一枚納雄雞腸中治風痰冷痺軟脚毒風能止氣

喘促急殺禽蟲毒權治一切風一切氣助陽道暖

水臍補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四

肢不遂下胸膈水破癥癰結排膿止痛續骨消

瘀血背脊僵僵霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉

痺狀

發明

宗奭且補虛寒須用附子風家多用天雄亦

其敷散也

元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震

亨曰

天雄烏頭氣壯形偉可為下部之佐蔣珍曰

烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以

益上也若是上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪

不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者

其氣下行其臍乃向上生苗之處寇宗奭言其不

肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為

上兩淮朱震亨以為下部之佐者得之而未發出

此義雷教炮炙論序云咳逆數數酒

服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也

耐方

新三建湯治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷

大小便滑數小便白濁六脈沉微

除固冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄並
炮裂去皮臍等分吹咀每服四錢水二盞薑汁五
片煎八分温服男子失精天雄三兩炮白木八兩桂
服肘后方酒服半錢張大風惡癩三月四月采天雄烏頭
仲景金匱要畧磨去皮不落者一夜取出晒乾又浸
漬細粒黑豆摩去皮如初吞三枚漸加至六七枚禁房室猪魚
雞蒜犯之即死

側子 別錄下品

釋名 莢子 時珍曰生子附子之側
故名許慎說文作莢子

集解 弘景曰此附子邊角之大者削取之昔時不
用比來醫家以療脚氣多驗豈曰側子附子

昔是烏頭下旁出者以小者為側子大者為附子
今以附子角為側子理必不然若當陽以下江左

本草綱目草部卷十七下 三 芥子園

山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州
以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用
此來都下皆用細附子有効未嘗取角也保昇曰
今附子邊果有角如大棗核及檳榔以來者形狀
自是一類且不小乃烏頭旁出附子旁出側
子甚明時珍曰側子乃附子旁出連小者爾故吳
普陶弘景背指為附子角之大者其又小于側子
者即漏籃子矣故楊氏附子託言側子漏籃園人
皆不重之
以乞役夫

修治同附子

氣味辛大熱有大毒

晉曰神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同

主治

癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎別錄療

脚氣冷風濕痺大風筋骨攣急甄權冷酒調服治遍

身風癰神妙雷

發明機曰烏頭乃原生之腦得母之氣守而不移

輕揚宜其發散四肢克達皮毛為治風之藥天雄

長而尖其氣親土宜其補上焦之陽虛木鼈子則

餘氣所結其形催殘宜其不入湯服令人喪目也

時珍曰唐元希聲侍郎治癰瘋風有側子湯見外

臺秘要藥

多不錄

漏藍子綱目

釋名木鼈子炮炙虎掌日華時珍曰此乃附子之

名南星之最小者各虎掌此物類之故亦同名大
明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五
十對烏頭五十對漏
藍二十斤不知何用

大宜嗣日宜下
卷下
四
卷子圖

氣味苦辛有毒教日服之主治惡痢冷漏瘡惡瘡

癘風時珍

發明時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏蓋子輩加減用之如不當

用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也又按類編云一人兩足生瘡臭漬難近夜宿

五夫人祠下夢神授方用漏蓋子一枚生研為末入膩粉少許并水調哩依法治之果愈蓋此物不

堪服餌止宜入瘡科也

附方新一切惡痢雜下及休息痢百歲危用漏蓋子一箇大者阿膠木香黃連罌

粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下羅天益衛生寶鑑

烏頭本經下品

校正併入拾遺獨白草

釋名烏喙本經即草烏頭綱目土附子日華奚毒本經耿

子吳普莽公吳普又金鴉綱目苗茗菝音及音董音獨

白草拾遺鴛鴦菊綱目汁煎客射罔音曰烏頭形如鳥

喙即鳥之喙者名曰鳥喙喙即鳥之口也聚且鳥

頭兩岐名烏喙則天雄附子之兩岐者復何以名

之壽珍且此即鳥頭之野生于他處者俗為之草

鳥頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子

所謂土附子者是也烏喙即偶生兩岐者今俗呼

為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之

偶生兩岐者亦謂之鳥喙功亦同于天雄非此鳥

頭也蘇恭不知此義故反疑之草烏頭取汁晒為

勞藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遠東塞外

秋收鳥頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

此鳥頭非川鳥頭也菊譜云鴛鴦菊即鳥頭苗也

集解 別錄曰鳥頭鳥喙生朗陵山谷正月二月采陰乾長三寸以上者為天雄晉曰正月始生

葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似弘景曰今採用四月亦以八月采搗莖汁日煎為射罔獵

人以博箭射禽獸十步即倒中人亦死宜遠解之朗陵屬汝南郡大明曰士附子生去皮搗臚汁澄

清旋添晒乾取膏名為射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川鳥頭相同但此係野生

又無釀造之法其根外黑內白皴而枯燥為異爾然毒則甚焉良成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭

置乾地反濕濕地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草鳥之類而毒更甚也又言建寧郡鳥勾山

有牧靡草鳥鵲誤食鳥喙中毒必急食此草以解之牧靡不知何藥也

修治 時珍曰草鳥頭或生用或炮用或以鳥大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味辛温有大毒別錄曰甘大熱大毒晉曰

毒權曰苦辛大熱有大毒大明曰味苦辛熱有毒

之才曰莠草遠志為之使反半夏拍樓貝母白欬

白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌

或汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒

風洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其

汁煎之名射罔殺禽獸本消胸上痰冷食不下心

腹冷痰膈間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹痛疔瘡癰氣塊

齒痛益陽事強志甄治頭風喉痺癰腫疔毒時

烏喙一名兩頭尖氣味辛微温有大毒晉曰神農

書曰桐君

本草綱目卷之...

黃帝有毒權曰苦辛
大熱○畏惡同烏頭 主治風濕丈夫腎濕陰寒瘡

寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄 男子腎氣衰弱陰汗瘰癧歲月不消甄 主大風

頑痺時珍

射罔氣味苦有大毒之才曰温天明且人中射罔
毒以甘草藍汁小豆葉浮萍

冷水薺菀皆
可一味禦之 主治尸疰癥堅及頭中風痺別錄 瘡瘡

瘡根結核癩癧毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有執膿及黃水塗之若無

膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人瘡

發明時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非昔川為

目非風頭急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽

事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜

風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏

頭附子補右腎命門之功哉吾新郝知府自負知

醫因病風癱服草烏頭木鼈子藥過多甫入腹而

麻痺遂至不救可不慎乎機曰烏喙形如鳥嘴其

氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而在抵病

所煎為射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是

乎楊清叟曰凡風寒濕痺骨肉冷痛及損傷入骨

年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南星等

分少加肉桂為末薑汁熟酒調塗未破者能內消

久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能被惡塊逐寒

熱遇冷即消
遇熱即潰

附方

舊四新

陰毒傷寒

生草烏頭為末以葱頭煎藥納穀道中各提益散

王海藏陰 二便不通 即上方名 中風癱瘓 手足顛

證畧例 寒瀆左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去

皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以瑯

蠶三七箇去頭翅同煮豆熟去蠶取豆焙乾為末

和勻以醋煑糊丸梧子大每服三十丸溫酒下

簡易 癱瘓頭風 骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下

方 尖各三錢硫黃射香丁香各一錢木鼈子五箇為

末以熟蕪艾揉軟合成一處用鈔紙包裹燒熏病

處名雷丸 孫 諸風不遂 宋氏集驗方用生草烏

天仁集効方 生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每服四五丸自

湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂渚小金丹 ○經驗

濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同

以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵

作餅焙乾為末酒糊丸梧子大一切頑風 神應丹

每空心塩湯下十九名至寶丹

用生草

烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁傾盆中砌一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜則露之晒至成膏作成小錠子每一錠分作三服用葱薑自然汁和好酒熱服 乾坤秘訣

切風證 不問頭風痛風黃鴉吊脚風痺生淮烏頭一斤生川烏頭一枚生附子一枚並為末

葱一斤薑一斤搗如泥和作餅子以草鋪盤內加

堵葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃

一曰夜乃晒之春為末以生薑取汁煮麩糊和丸

唐子大初服三十七日二服服後身痺汗出即愈

避風 乾皮 **傷風病** 壽域方用草烏頭為末每以

坤秘韞 石 **傷風病** 一二分溫酒服之出汗○儒

門事親方用草烏尖白芷並生研末每服半錢冷

酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熱粥投

之汗出 **年久麻痺** 或歷節走氣疼痛不仁不拘男

節愈 為末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆

腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出

晒乾為末每服五分冷風濕氣以生薑湯
下麻木不仁以葱白湯下之
活人心統風濕痺

木黑神丸草烏頭運皮生研五靈脂等分為末六
月六日滴水毛障子大四十歲以下分六服病

甚一丸作二丸薄荷湯化
下覺微麻為度
本事方風濕走痛兩頭尖五靈

脂各一兩乳香沒藥當歸三錢為末醋糊丸梧子
大每服十丸至三十丸臨酒下忌油膩濕熱

孕婦勿服
瑞竹堂方腰脚冷痛烏頭三箇去皮臍研末醋

方膝風作痛草烏細辛防風等分為末搽靴襪中
及安護膝內能除風濕健步扶壽

方遠行脚腫草烏細辛防風等分為末搽鞋底內
如草鞋以求微濕搽之用之可行千

里甚妙脚氣掣痛或臍間有核生草烏頭大黃木
經驗釐子作末薑汁煎茶調貼之○

又法草烏一味為末以薑汁濕帶足腫早輕晚重
或酒糟同搗貼之
永類方

一兩以生薑一兩同研交感一宿蒼朮一兩以葱
白一兩同研交感一宿各焙乾為末酒糊丸梧子

大每服五十九酒下除風去濕治痺胃虛弱久積

艾元英如宣方除風去濕冷氣飲食減少用

草烏頭一斤蒼朮一斤以去白陳皮半斤生甘草

四兩黑豆三升水一石同煮乾只揀烏木晒焙為

末酒糊丸梧子大焙乾收之每空心溫酒下二偏

三十九覺寐即漸減之名烏朮丸集簡方

正頭風草烏頭四兩芎藭四兩蒼朮半斤生薑

埋土中春五夏三秋五冬七日取出晒乾揀去葱

薑為末醋麩糊和丸梧子大每服九九臨臥溫酒

下立効戴久患頭風草烏頭尖生用一分赤小

古渝經驗方久患頭風草烏頭尖生用一分赤小

末每服半錢薄荷湯冷服風痰頭痛體虛傷風停

更隨左右喻鼻指南方風痰頭痛聚痰飲上厥

頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生

去皮尖一兩薑香乳香三皂子大為末每服二錢

去皮尖一兩薑香乳香三皂子大為末每服二錢

薄荷薑湯下食後
服 疎言三因湯
女人頭痛 血風謔草烏頭厄子

隨左右調塗太陽及額上
腦洩臭穢 草烏去皮半

勿過眼逢風 濟生方
而蒼木一兩

川芎二兩並生研末
糊丸綠豆大每耳鳴耳癢

服十丸茶下忌一切熱物
聖濟總錄

如流水及風聲不治成瘡
用生烏頭搗得乘濕削

如棗核大塞之口易二次不三日愈
千金方

喉痺口噤 不開欲死
草烏頭皂莢等分為末入射

香少許擦牙并齶鼻內牙關自開也

濟生方用草烏尖石膽等分為末
每用一錢醋煮

皂莢汁調稀掃入腫上流涎數次
其毒即破也

虛壅口瘡 滿口連舌者
草烏一箇南星一箇生薑

一大塊為末睡時以醋調塗
手心足心

或以草烏頭尖茶葉等分為末
事方

疥蝕口鼻 穿透者草

末蜜調塗足心

入射香等分 風蟲牙痛
草烏炒黑一兩細辛一錢

為末貼之 為末搗之吐涎

草烏食鹽同炒黑
寒氣心痛
三十年者射開食菜

子大每酒下二九日三服劉國
寒瘧積瘧
巴豆二

英所秘之方
范汪東陽方
寒瘧積瘧
枚去心

皮射罔去皮加巴豆大大棗去皮一枚搗成丸梧
子大清且先發時各服一丸白湯下
射後方

痺寒厥瘧
先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色黑者
各厥瘧寒多熱少而黃腹痛名脾瘧三

者並宜服此賈志老用之二十年累試有效不蛀
草烏頭削去皮沸湯泡二七度以蓋蓋良久切焙

研稀糊丸梧子人每服三十九丸薑十片棗三枚蒸
三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一

服絕勿飲湯便不發
腹中癥結
害妨飲食羸瘦射

也
蘇東坡良方
周二兩椒三百粒
搗末雞子曰和丸麻子大每服一
水泄寒痢
大草
丸漸至三丸以愈為度
射後方
水泄寒痢
大草
兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸綠豆大每
服七丸并華水下忌生冷魚肉
十便良方
泄

痢注下

三神丸治清濁不分泄瀉注下或赤或白

尖以一面火炮一箇醋煮一箇燒灰爲末醋糊丸

綠豆大每服二十九水瀉流水下未痢甘草湯下

白痢薑湯下忌魚腥結陰下血炒去皮癢切一兩

生冷和劑局方煎入分去滓露一夜五更冷服聖濟錄老人遺

普內痔不出草烏爲末津調點肛門內痔即反出

疥毒初起草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛

蓋之乾則以水潤疥毒惡腫生烏頭切片醋熬成

之唐瑤經驗方疥瘡發背草烏頭去

又方兩頭尖一兩巴豆四箇搗貼疔自拔出普濟方皮爲末用

葱白連鬚搗丸豌豆大以雄黃為衣每服一九

先將葱一握細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四

口用冷水一口止之即卧以被厚蓋

汗出為度亦治頭風乾坤秘韞

背疥瘡便毒等證二鳥膏用草烏頭川烏頭于瓦

上以井華水磨汁塗之如有口即塗四邊乾再上

亦可單用草烏磨醋塗之

永類方大風癰瘡遍身黑色肌體麻木

斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩鹽四兩同入

銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽并藥再炒令

黑烟出為度取一枚擘破心內如米一點白者始

好白多再炒乘熱杵羅為末醋麩糊丸梧子大每

服三十九空心温酒下草烏性毒難制五七遍身

日間以黑豆煮粥食解其毒繼洪澹察方

生瘡陰囊兩脚尤甚者草烏一兩鹽一兩化水浸

一夜炒赤為末猪腰子一具去膜煨熟竹刀

切搗醋糊丸綠豆大每服三一切諸瘡未破者草

十九空心搥湯下澹察方一切諸瘡烏頭為末

本草綱目卷之七下

本草綱目卷之十七

入輕粉少許臘猪油和搽普濟方瘰癧初作未破作寒熱草烏頭

米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻馬汗入

瘡腫痛急療之遲則毒深以生鳥頭末傳

人射罔傅之頻易血中沙風毒射罔傅之蛇蝎螫

白附子別錄下品

釋名見後發

集解別錄曰白附子生蜀郡三月采弘景曰此物久絕無復真者恭曰本出高麗今出涼州以西蜀郡不復有生砂磧下濕地獨莖似鼠尾草細

葉周匝生於穗間根形似天雄荀曰徐表南州異

物記云生東海新羅國及遼東苗與附子相似時珍根正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節

氣味辛甘大溫有小毒

保昇且甘辛溫天明且無毒珣曰小毒入藥炮用氣

日統陽引藥勢上行

主治心痛血痺面上百病行藥勢

別中

風失音一切冷風氣面疔癩疵

明大諸風冷氣足弱

無力疥癬風瘡陰下濕癢頭面痕入面脂用

李補

肝風虛

好風痰震

發明

時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也按楚國先賢傳云

孔休傷頰有癩王莽賜玉屑白附子香與之消癥

附方

新十

中風口喎

半身不遂牽正散用白附子白薑蠶全蝎並等分生研為

末每服二錢熱酒調下楊氏家藏方

小兒暑風

暑毒入心痰塞心孔昏迷搯搦此乃

危急之證非此九生料瞑眩之劑不能代之三生

九用白附子天南星半夏並去皮等分生研猪膽

汁和九黍米大量兒大小以薄荷湯下風痰眩暈

令兒側臥嘔出痰水即甦全切心鑑

頭痛氣鬱胸膈不利白附子炮去皮臍半斤石膏

煨紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦一錢為末粟米

飯丸小豆大每服三十丸食偏正頭風白附子白

後茶酒任下御藥院方

角去皮等分為末食後茶清痰厥頭痛白附子天

服仰臥少頃普濟本事方

等分生研為末生薑自然汁浸蒸餅丸綠赤白汗

豆大每服四十九食後薑湯下濟生方

狂白附子硫黃等分為末薑汁調面上疔黯子為

末臥時漿水洗面以白蜜和塗紙耳出膿水白附

上貼之久久自落衛生易簡方

羌活一兩為末猪羊腎各一箇每箇入末半

錢溫紙包煨熟五更食溫酒下

聖濟錄

喉痺

腫痛

白附子末枯礬等分研末塗
舌上有涎吐出

聖惠方
偏墜疝氣

白附子一

箇為末津調填臍上以艾炙三

小兒吐逆

不定虛風喘急

壯或五壯即愈
白附子藿香等分為末每米

慢痺驚風

白附子半

飲下半錢
保幼大全方

半兩黑附子一錢並炮去皮為末每服二錢生薑

五片水煎服亦治大人風虛止吐化痰宜和開真

州李博士用治吳內翰女孫甚効康州陳侍即前

風虛極昏吳內翰令服三四服即愈
楊氏家藏

虎掌

本經下品天南星寶

宋開

釋名虎膏

綱目鬼茺
日華恭曰其根四畔有圓牙
看如虎掌故有此名頌曰天

南星即本草虎掌也小者名由暖古方多用虎掌

不言天南星南星近出唐人中風痰毒方中用之

乃後人探用別立此名爾時珍曰虎掌因葉形似
之非根也南星因根圓白形如老人星狀故名南

本草綱目卷之六下
卷之六下
三
虎掌

星即虎掌也蘇恭說甚明白宋
開寶不當重出南星條今併入

集解

采陰乾弘景曰近道亦有形似半夏但大而

四邊有子如虎掌今用多破作三四片方藥不甚
用也恭曰此是由跋宿根其補一莖莖頭一葉枝

丫扶莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔
有圓牙看如虎掌由跋是新根大如半夏二三倍

四畔無子牙陶說似半夏乃由跋也保昇曰莖頭
有八九葉花生莖間藏器曰天南星生安東山谷

葉如荷獨莖用根頌曰虎掌今河北州郡有之初
生根如豆大漸長大似半夏而扁年久者根圓及

寸大者如雞卵周圍生圓牙三四枚或五六枚三
四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布

尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直出如鼠
尾中生一葉如匙裹莖作房旁開一孔直出尖中

有花微青褐色結實如麻子大熟則白色自落布
地一子生一窠九月苗殘取根合薑州入菜園中

種之呼爲天南星又曰天南星處處平澤有之二月生苗以荷梗其莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作槓似石榴子紅色二月八月采根似芋而圓扁與蒟蒻相類人多誤采了不可辨但蒟蒻莖斑花紫南星根小柔膩肌細炮之易裂爲可辨爾南星卽本經虎掌也大者四邊皆有牙子采時割去之江州一種草葉大如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生三四葉爲一本冬青不結花實治心疼寒熱積氣亦與虎掌同名故附見之時珍曰大者爲虎掌南星小者爲由跋乃一種也今俗又言大者爲鬼曰小者爲南星殊爲謬誤

修治

頌曰九月采虎掌根去皮臍入器中湯浸五七日口換三四遍洗去涎暴乾用或再火炮

裂用時珍曰凡天南星須用一兩以上者佳治風痰有生用者須以溫湯洗淨仍以白礬湯或入皂角汁浸三日夜日換水暴乾用若熟用者須於黃土地掘一小坑深五六寸以炭火燒赤以好酒

沃之安南星於內瓦盆覆定灰泥因濟一夜取出
用急用即以溫紙包於塘灰火中炮裂也一法治
風熱痰以酒浸一宿桑柴火蒸之當酒酒人甕內
令氣猛一伏時取出竹刀切開求不麻舌為熟未
熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃
泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁攪
湯和南星末作小餅子安藍內櫛葉包蓋待上黃
衣乃取晒收之造胆星法以南星生研末臘月取
黃拈牛胆汁和劑納入胆中
繫懸風處乾之年久者獨佳

氣味苦溫有大毒

別錄曰微寒晉曰虎掌神農雷
公若有毒岐伯桐君辛有毒大

明曰辛烈平杲曰苦辛有毒陰中之陽可升可降
乃肺經之本藥震亨曰欲其下行以黃藥引之之
才曰蜀漆為之使惡莽草大明曰畏附子乾薑生
薑時珍曰得防風則不麻得牛胆則不燥得火炮
則不毒生能伏
雄黃丹砂煖消
主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷

筋痿拘緩利水道

本經

除陰下濕風眩

別錄

主疝瘕腸

痛傷寒時疾強陰

甄權

天南星主中風麻痺除痰下

氣利胸膈攻堅積消癰腫散血墮胎

開寶

金瘡折傷

瘀血擣傅之

藏器

蛇蟲咬疥癬惡瘡

大明

去上焦痰及

眩暈

元素

主驚傷風口噤身強

李杲

補肝風虛冷痰功

同半夏

好古

治破癩口眼喎斜喉痺口舌瘡癰結核

解顛

時珍

發明

時珍曰虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻故能治風散血氣温而燥故能勝

濕除涎性繁而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜楊士瀛直指方云諸風口噤宜用南星更以人參

本草綱目直下

石菖蒲 佐之

附方 舊十新 **中風口噤** 目瞶無門下藥者開關散
用天南星為末入白龍腦

等分五月五日午時合之每用中指點末指齒三
二十通搯大牙左右其口自開又名破棺散 經

驗 **方** 諸風口噤 天南星炮到大人三錢小兒三字生
薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄猪

膽汁少許溫服 **小兒口噤** 牙關不開天南星一枚
仁齋直指方 煨熟紙裹斜包剪一小

乳透氣于口中牙關自開也。一 **小兒驚風** 陰涎
方用生南星同薑汁擦之自開 散用

天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦
上遍煨炭火炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一

分每服半錢荆芥湯調下每日 **吐瀉慢驚** 天王散
空一服午時一服 經驗方 治小兒

吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚天南星一箇
重八九錢者去臍黃土坑深三寸炭火五斤煨赤

入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發
裂取到再炒熟為末用五錢天麻煨熟研末一錢

射香一字和勻三歲小兒用半錢以生薑叻
風煎湯調下亦治久嗽惡心錢乙小兒方風痼

痰迷墜痰丸用天南星九蒸九晒為末薑汁麵糊
丸梧子大每服二十丸入參湯下石菖蒲麥

問冬湯亦可衛生寶鑑小兒癩瘡濕紙包煨為末雄豬膽汁
調服二字○治癩利痰天南星煨香一兩硃砂一

全幼心鑑每防風湯化下口眼喎斜天南星生研末自然薑
一丸普濟方汁調之左貼右右貼左

仁存方角弓反張南星半夏等分為末薑汁竹瀝
破

傷中風胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刀傷
及破傷風傷濕發病強直如癩狀者天南

星防風等分為末水調敷瘡出水為妙仍以溫酒
調服一錢已死心尚溫者熱童便調灌二錢因敗

本草綱目卷之七下
卷十七下
七
芥子園

內傷 堅壓者酒和童便連灌三
破傷風癩 生南星
眼即斃亦可煎服 三因方 破傷風癩 未水調

塗瘡 四圍水出 婦人頭風 攻目作痛 天南星一箇
有効 昔濟方 掘地坑燒赤安藥於中

以醋一盞沃之 蓋定勿令透氣 候冷研末 風痰頭
每服一字以酒調下 重者半錢 千金方

痛 不可忍 天南星一兩 荆芥葉一兩 為末 薑汁糊
九 梧子大 每服後 薑湯下 二十九〇 又上清丸

用 天南星 茴香 等分 生研末 鹽醋煮麵 風痰頭運
糊丸 如上法服 並出經効濟世方

目眩吐逆 煩懣 飲食不下 玉壺丸 用生南星生半
夏各一兩 天麻半兩 白麵三兩 為末 水丸 梧子大

每服三十丸 以水先煎 沸入藥 煮五七沸 腦風流
漉出 放溫 以薑湯吞之 惠民和劑局方

涕 邪風入腦 鼻內結硬 遂流 髓涕 大白南星切片
沸湯炮二次 焙乾 每用二錢 棗七箇 甘草五分

同煎服三四服 其硬物自出 腦氣流轉 豎涕自收
以大蒜 薑末 作餅 隔紗貼 顛前髮斗 熨之 或以

香附 藜蘆末 頰吹
鼻中 直指方 小兒風痰 熱毒壅滯 涼心壓驚 抱龍丸用牛膽南星

一兩入金錢薄荷十片川砂一錢半龍腦射香各
一字研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下

全初 壯人風痰 及中風中氣初起星香飲用而
心鑑 星四錢木香一錢水三盞生薑

十四片煎六分溫 痰迷心竅 壽星丸治心膽被驚
服 王碩身簡方 神不守舍或痰迷心

竅恍惚健忘妄言妄見天南星一斤先掘土坑一
尺以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星

在內盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出為末
琥珀一兩硃砂二兩為末生薑汁打麵糊丸梧子

大每服三十九至五十九煎八參石 風痰淫痛 方
菖蒲湯下一日三服 和劑局方

羊躑 痰濕臂痛 石邊者南星制蒼朮等分生 風痰
躑下 蓋三片水煎照之 摘立方

欬嗽 大天南星一故炮製研末每服一錢水一盞
薑三片煎五分溫服每早午晚各一服

本草綱目卷之二十七 下 七 芥子

本草綱目卷之... 治... 子園

千金氣痰欬嗽 玉粉丸南星 半夏 麩陳橘皮各

子大每服四十丸 薑湯下寒痰去 清氣化痰 三仙

橘皮加官桂 東垣藹室秘藏 生南星去皮半夏

中脫氣滯痰涎 煩悶頭目不清 薑汁和作餅 鋪竹

各五錢並湯泡七次為末 自然 晒乾服用二兩入

篩內以楮葉包覆待生黃成 香附末一兩 糊丸 梧子大每服

下 王璆 溫中散 滯消導飲食 大南星炮高良薑

百一選方 和劑方 酒積酒 每服此即解 天南

薑汁糊丸 梧子大每薑 星丸用正端 天

湯下五十九 南星一斤土坑 燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆

泥因濟一夜取出酒和水洗淨 切片焙乾為末 人

殊砂末一兩 薑汁麵糊丸 梧子大每服五十九 薑

湯下 蔡丞相呂丞相嘗用有驗 楊氏家藏丸

吐泄不止

四肢厥逆 虛風不省 八事服此 則陽回

名回陽散 天南星為 小每服三錢 京棗

三枚水二鍾煎八分溫服未省再服。○**腸風瀉血**

又方醋調南星末貼足心。普濟方。諸藥不效天南星石灰炒焦黃色為末酒

糊丸梧子大每酒下二十九。普濟方。吐血不止

天南星一兩判如豆大以爐灰汁浸一宿洗焙研末每服一錢以自然銅磨酒調下。勝金方

初生貼額頭熱鼻塞者天南星炮為末水調貼額上炙手熨之。危氏得効方。小兒

解額額開不合鼻塞不通天南星炮去皮為末淡醋調緋帛上貼額門炙手熨之立効。錢

乙小兒**解額脫臼**不能收上用南星末薑汁調直訣。角兩頓一夜即上。醫說。小

兒口瘡白屑如鷺口不須服藥以生天南星去皮臍研末醋調塗足心男左女右。聞孝忠

集効**走馬疳蝕**透骨穿腮生南星一箇當心剉空方。以蓋子台定出火毒去麵為末入麝香少許拂瘡數日甚効。經驗方。**風蟲牙痛**星

本草綱目卷之七

末塞孔以霜梅會喉風喉痺大南星一箇剉心入
任去涎摘玄方喉風喉痺白僵蠶七枚紙包煨

熟研末薑汁調服一錢甚者灌痰癆結核南星膏

之吐涎愈名如聖散博濟方痰癆結核治人皮

肌頭面上生瘡及結核大者如拳小者如粟或軟
或硬不疼不癢宜用此藥不可輒用針灸生天南

星大者一枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾
者為末醋調先用針刺令氣透乃貼之覺癢則頻

貼取効嚴身面疣子醋調南星末塗

子禮濟生方簡易方

跋木經下品

釋名
集解恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一二倍四
畔未有子牙其宿根如虎掌也藏器曰由跋
生林下莖高一尺似蒟蒻似如雞卵保昇曰音抽
莖莖端有八九葉根圓一節而肉白時珍曰此即

天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用
惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之
側子不如附
子之義也

正誤

弘景曰由跋木出始與今人亦種之狀如烏
翼而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫亦

効蔡曰陶氏所說乃鳶尾根即鳶頭也又言虎掌
似半夏是以鳶尾為由跋以山跋為半夏非惟不
識半夏亦不識鳶尾與山跋也今南人猶以由跋
為半夏時珍曰陳延之小品方亦以東海鳶頭為
由跋則其
訛誤久矣

氣味辛苦温有毒主治毒腫結熱
本經

菟藟
宋開寶

釋名菟頭
開寶
鬼芋
圖經
鬼頭

本草綱目草部卷十七下
九
木子

集解

志曰蕘頭出吳蜀葉似由跋半夏根大定碗

秋有花直出生赤子根如蕘頭毒猛不堪食虎杖

亦有斑杖與此不同類曰江南吳中出白蕘蕘亦

日鬼芋生平澤極多人采以為天南星了不可辨

市中所收往往是此但南星肌細賦而蕘蕘莖斑

花紫南星莖無斑花黃為異爾時珍曰蕘蕘出蜀

中施州亦有之呼為鬼頭聞中人亦種之宜樹陰

下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與

兩星苗相似但多斑點宿根亦自生苗其滴露之

說蓋不然經二年者根大如碗及芋魁其外理白
味亦麻人秋後采根須淨擦或搗或片段以礮灰
汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六遍即成煉
子切片以苦酒五味淹食不以灰汁則不成也切
作細絲沸湯灼過五味調食狀如水母絲馬志言
其苗似半夏楊慎丹鉛錄言蕘醬即此者皆誤也
王禎農書云救荒之法山有粉葛蕘蕘橡栗之利
則此物亦有益于民者也其斑杖即天南星之類

有斑者

根氣味辛寒有毒李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則載人喉出血

主治癰腫風毒糜傅腫上搗碎以灰汁煮成餅五

味調食主消渴開寶

發明機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不思見隣家修蒟蒻求食之美遂多食而瘵愈又

有病肥癰者數人多食之亦皆愈

附錄菩薩草朱圖經頌曰生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如蒟蒻頭冬月采

根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸虫傷搗汁飲并傳之婦人妊娠欬嗽搗篩蜜丸服効

半夏本經下品

本草綱目卷之七下 半夏子園

釋名守田

本經水玉

水經地文

別和姑

本經時珍口禮記月令五月半

夏生蓋當夏之半也故名守田會意水玉因形

集解

別錄曰半夏生槐里川谷五月八日采根暴乾普曰生微丘或生野中二月始生葉三三

相偶白花圓上弘景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久黍且所在

皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異其

苗似是由跋誤以為半夏也頌曰在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似

竹葉而生江南者似芍藥葉根下相重上大下小皮黃肉白五月八月采根以灰裏二日湯洗暴乾

獨圓經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小各羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同

只是咬著微酸不入藥用

修治

弘景曰凡用以湯洗十許過今消盡不爾有

毒戩人咽喉方中有半夏必須用生薑者以

制其毒故也致曰修事半夏四兩用白芥子末二

兩醃醋二兩攪濁將半夏投中洗三遍用之若洗

涎不盡令人氣逆肝氣怒滿時珍曰全治半夏惟

洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯晒乾切片薑

汁拌焙入藥或研為末以薑汁入湯浸澄三日瀝

去涎水晒乾用謂之半夏粉或研末以薑汁和作

餅子日乾用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯

和作餅楮葉包置藍中待生黃衣日乾用謂之半

夏麴白飛霞醫通云痰分之病半夏為主造而為

麴尤佳治濕痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑

汁及皂莢煮汁和之治火痰以薑汁竹瀝或荆瀝

和之治寒痰以薑汁礬湯入白芥子末和之此皆

造麴炒法也

根氣味辛平有毒

別錄曰生微寒熟溫生令人吐
熟令人下湯洗盡滑用元素曰

味辛苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也好古曰

辛厚苦輕陽中陰也入手陽明太陰少陰三經之

才日射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮

龜甲反烏頭權曰柴胡為之使忌羊血海藻節糖

元素曰熱痰佐以黃岑風痰佐以南星寒痰佐以

乾薑痰痞佐以陳皮白朮多用則瀉脾胃諸血證

及口渴者禁用為其燥津液主治傷寒寒熱心下

也孕婦忌之用生薑則無害

堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗本消

心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時
氣嘔逆消癰腫療痿黃悅澤面目墮胎別錄消痰下
肺氣開胃健脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫
除瘤瘦氣甄權治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

大治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胸中痞滿

痰除胸寒和胃氣燥脾濕治痰厥頭痛消腫散結

系治眉稜骨痛震亨補肝風虛好除腹脹目不得瞑

白濁夢遺帶下

時珍

發明

權曰半夏使也虛而有痰氣宜加用之頌曰胃冷嘔噦方藥之最要成無已曰辛者散也

潤也半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行

水氣而潤腎燥好古曰經云腎主五液化為五濕

自入為睡入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為

涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因欬而動脾之濕也

半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也

欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕

潤燥也俗以半夏為肺藥非也止嘔吐為足陽明

除痰為足太陰柴胡為之使故今柴胡湯中用之

本草綱目草部卷十七下 五 芥子園

雖爲止嘔亦助柴胡黃芩至往來寒熱是又爲足
少陽陽明也宗奭曰今人惟知半夏去痰不言益
脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡困困則不能治
水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或致以生薑
一兩半夏大棗各三十枚水一升瓷瓶中慢火燒
爲熟水時呷之便已也趙繼宗曰丹溪言二陳湯
治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內
有半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜
至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病不
可不知機巨俗以半夏性燥有毒多以貝母代之
貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃
經之藥何可代也夫欬嗽吐痰虛勞吐血或痰中
見血諸鬱咽痛喉痺肺癰肺痿癰疽婦人乳難此
皆貝母爲向導半夏乃禁用之藥若涎者脾之液
美味膏梁炙博皆能生脾胃濕熱故涎化爲痰久
則痰火上攻令人昏憤口噤偏廢僂仆蹇澹不語
生死且夕自非半夏南星曷可治乎若以貝母代
之則翹首待斃矣時珍曰脾無留濕不生痰故脾

爲生痰之源肺爲貯痰之器半夏能至痰飲及腹
脹者爲其體滑而味辛性溫也延滑能潤辛溫能
散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂
辛走氣能化液辛以潤之是矣繫古張氏云半夏
南星治其痰而欬嗽白愈丹溪朱氏云二陳湯能
使大便潤而小便長柳攝成氏云半夏辛而散行
水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫丸治老人虛
秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏爲性燥誤
矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方
治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物
亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非
濕熱之邪而用利竅行濕之藥是乃重竭其精液
醫之罪也豈藥之咎哉甲乙經用治夜不眠是果
性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于
陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰
陽既通其臥立至方用流水千里者八升揚之萬
遍取清五升煮之炆以葦薪大沸入秫米一升半
夏五合煮一升半飲汁一盃日三以知爲度病新

發者覆盃則臥汗出
則已久者三飲而已

附方

舊十五新

法制半夏

清痰化飲壯脾順氣用
大半夏湯洗七次焙乾

再洗如此七轉以濃米泔浸一日夜每一兩用白
礬一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫

水化又浸七日以漿水慢火內煮沸焙乾收
之每嚼一二粒薑湯送化下 御藥院方 **紅半**

夏法

消風熱清痰涎降氣利咽大半夏湯浸焙制
如上述法每一兩入龍腦五分硃砂為衣染之

先鋪燈草一重約一指厚排半夏于上再以燈草
蓋一指厚以炒豆焙之候乾取出每嚼一兩粒溫

水送下。化痰鎮心祛風利膈辰砂半夏丸用半
御藥院方夏一斤湯泡七次為末篩過

以水浸三日生絹濾去滓澄清去水晒乾一兩入
辰砂一錢薑汁打糊丸梧子大每薑湯下七十丸

此周府方 補珍化痰利氣三仙九方
見虎掌下 去胸膈

門方用半夏湯泡焙乾為末自然薑汁和作餅濕
紙裹煨香以熟水二盞同煎二錢入鹽五分煎一
盞服之大壓痰赤及酒食傷極驗 經驗用半夏

水焙乾重研每服二錢 中焦痰涎 利咽清頭目進
水二盞薑三片煎服 次四兩柘器一兩為末薑汁打糊或煮棗肉和九

梧子大每薑湯下十五丸寒痰加了香五錢熱痰
加寒水石煨四兩名 老人風痰 大勝熱不識人及

玉液丸 和劑局方 夏炮七次焙消石半兩為末入白麵搗勻隔壅風
水和丸綠豆大每薑湯下五十九 普濟

痰 半夏半斤酸漿浸一宿溫湯洗五十遍去惡氣
日乾為末漿水搜作餅日乾再研為末每五兩

入生龍腦一錢以漿水濃脚和丸雞頭子大紗袋
盛避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下
御藥 搜風化痰 定志安神利頭目辰砂化痰丸用
院方 半夏麴三兩天南星炮一兩辰砂

本草綱目卷下 卷十七下 高 林下園

枯礬各半兩為末薑汁打糊九梧子大每痰厥中

服三十九食後薑湯送下和劑局方防風四

風省風湯用半夏湯泡入兩汁草炙二兩奇効方

風痰頭暈嘔逆目眩面色青黃脈弦者水煮金花

兩天麻半兩雄黃二錢小麥麵三兩為末水和成

餅水煮淨起漉出搗九梧子大每服五十九薑湯

下極効亦治風痰咳嗽二便不通風痰濕痰

風痰頭痛潔古活法機要方風痰濕痰青薑

夏一斤天南星半兩各湯炮晒乾為末薑汁和作

餅焙乾入神麴半兩白米末二兩枳實末二兩薑

汁麴糊九梧子大每服五

十九薑湯下葉氏方風痰喘逆元元欲吐眩

一兩雄黃三錢為末薑汁浸蒸餅九梧子大每

服三十九薑湯下已吐者加檳榔活法機要

痰喘急干薑湯用半夏湯洗七箇甘草炙皂莢炒

各一寸薑二片水一盞煎七分温服

和

和

和

和

劑局 上焦熱 欬嗽制過半夏一兩片黃芩末二

方 淡薑湯食後服此周憲 肺熱痰嗽 制半夏栝樓

王親制方也 袖珍方 月熱痰嗽 仁各一兩為

末薑汁打糊丸 栝子大每服二三十丸 熱痰欬嗽

白湯下或以栝樓煎煮丸 濟生方 熱痰欬嗽

煩熱面赤口燥 心痛脈洪數者 小黃丸用半夏天

南星各一兩薑汁今一兩半為末薑汁浸蒸餅丸栝

子大每服五七丸 十九食後 小兒痰熱 欬驚悸半

薑湯下 潔古法機要 小兒痰熱 欬驚悸半

為末牛膽汁和八膽內懸風處待乾蒸餅 濕痰欬

丸綠豆大每薑湯切下三五丸 摘玄方 濕痰欬

嗽 面黃體重嗜臥不驚兼食不消脈緩者白木丸用

子大每服五七丸 兩白木一兩半為末薄糊丸栝

薑湯下 活法機要 氣痰欬嗽 面氣促酒漸惡

者玉粉丸用半夏 南星各一兩官桂半兩為末

糊丸栝子大每服五十九薑湯下 活法機要 小

本草綱目卷之七下 欬嗽

結胸痛

正在心下以攻之則痛脈浮滑者小陷胸湯

箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二

味煮取二分三分三服仲景傷寒論 **濕痰心痛**

喘急者半夏油炒為末 **傷寒病** 半

大每服二十九薑湯下 **丹溪心法** 急傷寒病夏

四錢生薑七片酒一盞煎 **結痰不出** 語音不清年

服 胡洽居士百病方 **結痰不出** 久者亦宜玉

粉九半夏半兩桂心一字草烏頭半字為末薑汁

浸蒸餅九芡子大每服一丸夜臥含嚥 **活法機**

要 **停痰冷飲** 嘔逆橘皮各一兩每服四錢生薑七片水

二盞煎一盞溫 **停痰留飲** 胸膈滿悶氣短惡心飲

服 和劑局方 **停痰留飲** 食不下或吐痰水茯苓

半夏湯用半夏泡五兩其茯苓三兩每服四錢薑

七片水一鍾半煎七分其心提徑 **和劑局方** **支**

飲作嘔 嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘

不喘似嘔不嘔似噦不噦 **小續命並宜**

小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水嘔逆

升煮一升五合分服張仲景金匱要畧嘔逆

欲死半夏生薑湯主嘔逆方同嘔逆不

得下半夏加茯苓湯半一升生薑半斤茯苓三

兩切以水七升煎一升半分溫服之金匱要畧

目不得眠見發心下悸松等分為末蜜丸小豆大

每服三十丸日傷寒嘔服一錢七梅師方

三金匱要畧嘔逆內有寒痰小半夏一升洗滑焙研小麥麵

嘔逆一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚

日三服稍增至五十枚以旋煮旋吞覺病減再作嘔

忌羊肉錫糖此乃許仁則方也外臺秘要

吐反胃大半夏湯半一升和揚之一百二十遍煮取三

升半溫服一升日再服亦胃寒嘔逆停痰留飲藿

治膈間支飲金匱要畧

芥子畧

半夏湯泡炒黃二兩 藿香葉一兩 丁香半兩 小兒每服四錢水一盞薑七片煎服 和劑局方

吐瀉 脾胃虛寒 齊州 半夏泡七次 陳粟米各一錢 半薑十片水盞 半煎八分溫服 錢七小兒

小兒痰吐 或風壅所致 或欬發熱 飲食即吐 半和包丁香用麵重包已煨熟去麵為末 生薑自然汁

和九麻子大每服一三十九 陳皮湯下 活勿口 議 妊娠嘔吐 半夏一兩 人參乾薑各一兩 為末 薑汁麵糊丸梧子大 每飲服十九 日三

服 仲景 霍亂腹脹 服方寸七 肘後方 小兒腹 金匱要畧

脹 半夏末少許 酒和丸 粟米大 每服二九 薑湯下 不瘥加之 或以火炮研末 薑汁調貼臍亦佳

子母 黃疸喘滿 小 便自利 不可除熱 半夏生薑名 秘錄

有人氣結而死心 下暖以此 伏暑可飲 脾胃不利 少許入口 遂活 張仲景方

消暑丸用

半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤為末薑汁
麵糊九梧子大每服五十九丸熱湯下和劑局方

老人虛秘

冷秘及痙癖冷氣半硫丸半夏炮炒生
硫黃等分為末自然薑汁煮糊丸如梧

子大每空心溫酒下
五十九丸和劑局方

失血喘急

吐血下血崩中帶
下喘急痰嘔中滿

宿痰用半夏搥扁以薑汁和麵包煨黃研末米
糊丸梧子大每服三十九丸白湯下直指方

濁夢遺

半夏一兩洗十次切破以水猪苓二兩同
炒黃出火毒去猪苓入煨過牡礪一兩以

山藥糊丸梧子大每服三十九丸茯苓湯送下腎氣
閉而一身精氣無所管攝安行而遺者宜用此方

蓋半夏有利性猪苓導水使腎氣通也
與下元虛憊者不同許學士本事方**八般頭風**

三次見効半夏末入百草霜少許作紙撚燒烟就
鼻內嚙之口中含水有涎吐去再含衛生寶鑑

少陰咽痛

生瘡不能言語聲不出者苦酒湯王之
半夏七枚打碎雞子一枚頭開一竅去

本草綱目卷之十七下
卷十七下
子

黃綱苦酒令小滿入半夏在內以鐵子坐于炭火上煎三沸去滓置盃中時時蘸之極驗未瘥更作

○仲景論喉痺腫塞生半夏末齶鼻內骨哽在咽半

傷寒論白芷等分為末水服方寸七重舌木舌脹大塞口

當嘔出忌羊肉外臺秘要重舌木舌半夏煎醋

含漱之。又方半夏二十枚水煮過再炮片時小

乘熱以酒一斤浸之密封良久熱嗽冷吐之

兒顛陷乃冷也水調半面上黑氣半夏焙研米醋

不計遍數從早至晚如此三日皂癩風眉落生半

角湯洗下面瑩如玉也摘玄方癩風眉落夏羊

屎燒焦等分為末自然盤腸生產產時子腸先出

薑汁日調塗聖濟錄盤腸生產產後不收者各

盤腸產以半夏末頻齶鼻產後運絕和九大豆大

中川上也婦人良方產後運絕和九大豆大

納鼻中即愈此扁小兒驚風錢為末吹少許入鼻

鵲法也肘後方小兒驚風錢為末吹少許入鼻

各處驚散
真指方
死不寤
半夏末吹鼻中即活商
夫人紫靈魏元君方也

五絕急病
一曰自縊二曰墻壓三曰溺水四曰魘
人鼻中心溫者一日
產乳並以半夏末納大豆一九

可活也
子母秘錄
癰疽發背
及乳癰半夏末雞
子白調塗之

後吹奶腫痛
半夏一箇煨研酒服立愈一方以末
隨左右噴鼻効
劉長春經驗方

打撲瘀痕
水調半夏末塗之一宿
永類鈴方
遠行足跡
方同集

簡金刃不出
入骨脉中者半夏白歛等分爲末酒
服方寸七日三服至二十日自出

李筌大飛蟲入耳
生半夏末麻油調塗
耳門外
本方
蝎萬螫人

半夏末水調塗之立
錢相公篋中方
蝎癭五孔
相通者半夏末水
調塗之日二

惠
咽喉骨哽
半夏白芷等分爲末水服方寸
七富嘔出忌羊肉
外臺秘要

本草綱目直音卷一十七

莖涎宝治煉取塗髮眉墮落者即生雷

蚤休本經下品

釋名 崑休別錄 螯休日華 紫河車圖經 重臺唐本 重樓 金線

唐本 三層草綱目 七葉一枝 花筌草 甘遂唐本 白甘遂時珍

曰 虫蛇之毒得此治之即休故有蚤休螯休諸名 重臺三層因其葉狀也 金線重樓因其花狀也 甘

遂因其根狀也 紫河車因其功用也

集解 別錄曰 蚤休生山陽川谷及宛句黍曰今謂 重樓金線者是也 一名重臺 南人名為甘遂

一莖六七葉似王孫 鬼曰 菝葜 葦葉有二三層根 如肥大菖蒲 細肌 晚白 保昇曰 葉似兔白 牡蒙年

久者二三重根 如紫參皮 黃肉白 五月采 根曰乾 天明日 根如尺二蜈蚣大如肥紫菖蒲 額曰即紫

河車也今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之
葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蕊赤
實色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉
白四月五月采之宗奭曰蚤休無旁枝止一莖挺
生高尺餘顛有四五葉葉有歧似苦杖中心又起
莖亦如是生葉惟根入藥用時珍曰重樓金線處
處有之生于深山陰濕之地一莖獨上莖當葉心
葉綠色似芍藥凡二三層每一層七葉莖頭夏月
開花一莖七瓣有金線蕊長三四寸玉屋山產者
至五七層根如鬼白蒼木狀外紫中白有粘糯二
種外丹家采制三黃砂永入藥洗切焙用俗諺云
七葉一枝花深山是我家瘡疽如遇者一似手拈
也

根氣味苦微寒有毒

天明且冷無毒伏雄黃丹砂蓬砂及塩

主治驚

痛搖頭弄舌熱氣在腹中

本經癩疾癰瘡除蝕下三

蟲去蛇毒錄生食一升利水唐本治胎風手足搐能

吐泄瘰癧大去瘡疾寒熱

發明茶曰摩醋傳瘰腫蛇毒甚有效時珍曰紫河

腫者宜之而道家有服食法不知果有益否也

附方新服食法紫河車根以竹刀刮去皮切作段

漉出凝冷入新布袋中懸風處待乾每服三九五

更初面東念咒井水下連進三服即能休糧若要

飲食先以粟豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸漸

食之咒曰天朗氣清金鷄鳴吾今服藥欲長生吾
今不飢復不渴賴小兒胎風紫河車為末每服半
得神仙草有靈

錢冷水下慢驚發搐帶有陽證者白甘遂末即
衛生易簡方

同于慢火上炒焦黃，研勻，每服一字。
煎射香薄荷湯調下。 穢乙小兒方。 中鼠莽毒線

即愈。 集簡方。 咽喉。 穀賊。 腫痛用重臺赤色者。 用
大黃炒木鼈子仁馬牙

消半兩半夏泡一分為末蜜
九笑子大含之。 聖惠方。

鬼白 本經 稜正 併入圖經

釋名九白 本經 天白 別錄 鬼藥 綱目 解毒 別錄 爵犀 本經 馬目

毒公 本經 害母草 綱目 羞天花 綱目 木律草 綱目 瑤田草 綱目

獨脚蓮 上宿本草 獨荷草 上宿 山荷葉 綱目 旱荷 綱目 八角盤

綱目 唐婆鏡 弘景曰鬼白根如射干白而味甘九白

其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗死故有鏡

本草綱目草部卷十七下 芥子園

盤荷蓮害母諸各蘇東坡詩集云荷田草俗號唐
婆鏡卽本草兎白也歲生一白如黃精根而堅瘦
可以辟穀未祁鄒南方物贊云羞天花蜀地處處
有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞天子改爲羞寒
花卽本草兎白也贊云胃寒而茂莖修葉廣附莖
作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○別有羞天
草與此不同

卽海芋也

集解

別錄曰兎白生九具山谷及宛句二月八月
采根芘景曰兎白生山谷中八月采陰乾似

射干木葦又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘
上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛
力劣今馬目毒公狀如黃精根其白處似馬眼而
柔潤今方家多用兎白而少用毒公不知此那復
乖越如此蔡曰兎曰生深山巖石之陰葉如薜麻
重樓葦生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖
葉則爲一白假令生來二十年則有二十白豈
惟九白耶根肉皮鬚並似射干今俗用多是射干

而江南別送一物非真者今荆州富陽縣破州遠友縣襄州荆山縣山中並貢之亦極難得領且今

江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之並如蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說

鬼曰生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖巨時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花

細紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一莖既枯則生一白及八九年則八九日矣

然一年一曰生而一白腐蓋陳新相易也故俗名害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前

年之舊腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然白形淺薄與鬼白大異鬼白如八九箇

南星側比相疊而色埋正如射干用者當使入求苗采之市中不復有也時珍曰鬼白根如天南星

相疊之狀故市人謂小者為南星大者為鬼白殊為謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名

羞天花即鬼白也歲生一白滿十二歲則可為藥今方家乃以鬼燈檠為鬼白誤矣又鄭樵通志云

鬼白葉如小荷形如馬掌年長一莖莖枯則根為

一白亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似

是今人所謂獨脚蓮者也又名山荷葉獨荷草旱

荷葉八角鏡南方處處深山陰密處有之北方惟

龍門山王屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空

一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫揉其葉作

瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼朮

紫河車丹爐家采根制三黃砂水或云其葉八角

者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者為

河車赤色者為鬼白恐亦不然而庚辛玉册謂蚤

休陽草旱荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公

與鬼白為二物殊不知正是一物而有二種也又

唐獨孤消丹房鏡源云木律車有二種根皆似南

星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作

數層葉似蓖麻面青背紫而有細毛葉下附莖開

一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中空結黃子鳳

吹不動無風自搖可制砂汞按此

即鬼白之二種也其說形狀甚明

根氣味辛溫有毒

別錄曰微溫弘景曰甘溫有毒
權曰苦乏才且畏垣衣

主治殺蟲毒鬼症精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

水經殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目

小膚翳不入湯別錄主尸疰殭殍勞疾傳尸瘦疾甄權

下死胎治邪癘癰疽蛇毒射工毒時珍

發明頌曰古方治五尸鬼症百毒惡氣多用之又
曰今福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末

蜜丸服
治風疾

附方三子死腹中

胞破不生此方累効救人歲萬
數也鬼白不拘多少黃色者去

毛為細末不用篩羅只燃之如粉為度每服一錢
無灰酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字

本草綱目卷之二十七下
三子死腹中

神散 婦 射工中人 寒熱發瘡鬼白葉一把苦酒
人良方 漬搗取汁服一升日二次

千金 黑黃急病 黑黃面黑黃身如土色不妨食脉
方 沉若青脉入口者死宜烙口中黑

豚耳會玉泉章門心俞用生鬼白搗汁一
小盞服 乾者為末水服 三十六黃方

射干 本經 下品

釋名烏扇 烏嬰 烏吹 烏蒲 鳳翼 鬼扇
別錄 別錄 本經 拾遺 別錄

土宿扁竹 仙人掌 紫金牛 野萱花 草薑
綱目 綱目 綱目 綱目 綱目 綱目 綱目 綱目

黃遠 吳普 景旦射干方書多音夜頌旦射干之
形莖梗疎長正如射之長竿之狀得名由此

爾而陶氏以夜音為疑蓋古字音多通呼若漢官
僕射主射事而亦音夜非有別義也時珍曰其葉

叢生橫鋪一面如鳥翅及扇之狀故有鳥扇烏嬰
鳳翼鬼扇仙人掌諸名俗呼扁竹謂其葉扁生而

根如竹也根葉又如蠶蓋故曰草蓋○髮音所甲切扇也

集解別錄巨射干生南陽山谷田野三月三日采根陰乾弘景曰此是烏髮根黃色處臺多種

之人言其葉是鳶尾而後有鳶頭此若相似爾恐非烏髮也又別有射干相似而花白莖長似射人

之執斧者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用

豕曰鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白名鳶頭保昇曰射干高二三尺

花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤所在皆有二月八月采根去皮日乾藏器且射干鳶尾二物相似

人多不分射干即人間所種為花草名鳳翼者葉如鳥翅秋生紅花赤點鳶尾亦人間所種苗低下

於射干狀如鳶尾夏生紫碧花者是也天明日射干根潤形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八

月采頰曰今在處有之人家種之春生苗高一尺葉大類蠶蓋而狹長橫張疎如翅羽狀故名烏髮葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色

本草綱目草部卷十七下

芥子園

辨上有細文秋結實作房中子黑色一說射干多
生山崖之問其莖雖細小亦類木故荀子云西方
有木名曰射干莖長四十生於高山之上是也陶
弘景所說花白者自是射干之類震亨曰根為射
干葉為烏嬰紫花者是紅花者非俄曰按諸注則
射干非一種有花白者花黃者花紫者花紅者丹
溪獨取紫花者必曾試有驗也爾珍曰射干即今
扁竹也今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花
三四月開六出大如萱花結房大如梅指頗似泡
桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫
極硬咬之不破七月始枯陶弘景謂射干為尾是
一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是為尾紅花者是
射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者
是射干白花者亦其類朱震亨謂紫花者是射干
紅花者非各執一說何以憑依謹按張揖廣雅云
為尾射干也易通卦驗云冬至射干生土宿真君
本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如
之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江

南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異若同屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三佛經射干貂獾此是惡獸似青黃狗食人能緣木阮公云射干臨層城者是樹莖有高大者本草射干是草即今人所種者也

根修治
穀曰凡采根先以米泔水浸一宿漉出然後以箠竹葉煮之從午至亥日乾用

氣味苦平有毒
別錄曰微温久服令人虛保鼻且微寒權曰有小毒元素自苦陽中

陰也時珍曰
主治欬逆上氣喉痺咽痛不得消息
寒多服瀉人

散結氣腹中邪逆
本經
療老血在心脾間

欬唾言語氣臭散胸中熱氣
別錄
苦瀉摩塗毒腫
景弘

本草綱目卷之七下
林解

治瘧氣消痰血通女人月閉熨消痰破癥結胸膈

滿腹脹氣喘痞開胃下食鎮肝明目大治肺氣

喉痺為佳宗去胃中癰瘡元利積痰疝毒消結核

震亨時降實火利大腸治瘧母珍

發明震亨日射干屬金有木與火行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰

溫氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前服利三兩行甚効時珍日射干能降火故古方治

喉痺咽痛為要藥孫真人千金方治喉痺有烏翬膏張仲景金匱王函方治欬而上氣喉中作水鷄

聲有射干麻黃湯又治瘧母鼈甲煎丸亦用烏扇燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而

痰結自解癥痕自除矣

附方

新舊二咽喉腫痛射干花根山豆根陰乾為傷
未吹之如神袖珍方

寒咽閉

腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦
去滓每噙棗許取瘥
龐安常傷寒論

痺不通

漿水不入外臺秘要用射干一片含嘔汁
良○醫方大成用扁竹新根搗汁嘔之
腑動即解或醋研汁噙引涎出亦妙
便民方用

紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各五分為末水
調頓服立愈
諸藥不効紫花扁竹根生

名奪命散
二便不通
水邊者佳研汁一盞服即

通○水壘腹大
動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗
汁服一盃水即下
肘後方

疝腫刺
發時腫痛刺用生射干搗汁
與服取利亦可丸服
肘後方
乳癰初腫

扁竹根如僵蠶者同萱草根為
朱密調傅之神効
永類方
中射工毒
生瘡者
烏髮升

麻各二高水三升煎二升温服
以澤傳瘡上
姚僧坦集驗方

鳶尾 本經下品

釋名 鳶園 本經 根名 鳶頭 時珍曰並以形命名鳶園當作鳶鳶

集解 別錄曰鳶鳶生九疑山谷五月采弘景曰方家言是射干苗而主療亦是當別是一種方

用鳶頭當是其根療體相似而本草不題聚曰此草所在有之人家亦種葉似射干而潤短不抽長

莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人咽喉與射干全別射干花紅抽莖長根黃有白保昇

曰草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數箇相連九月十月

采根日乾時珍曰此即射干之苗非別一種也肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色

諸家皆是強分陳延之小品方言東海鳶頭即由跋者亦訛也東海出之故耳

氣味 苦平 有毒 恭曰有小毒 主治 蠱毒邪氣 鬼瘧 諸毒

破癥瘕積聚去水下三蟲水經殺鬼魅療頭眩別錄

附方新一飛尸遊蠱着喉中氣欲絕者鳶尾根削去皮納喉中摩病處令血出

為佳陳藏器本草拾遺鬼魅邪氣四物為頭散東海鳶頭黃牙即金牙莖若子防葵為

末酒服方寸七欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼又增一分立驗不可多服陳延之小品方

玉簪綱目

釋名白鶴仙時珍曰並以花象命名

集解時珍曰玉簪處處人家栽為花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白菘其葉大如掌團而

有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌瑩六七月抽莖莖上有細葉中出花朶十數故長二三寸本小

未大未開時正如玉搔頭簪形大如羊肚蘑菇之狀開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根

本草綱目草部卷十七下芥子園

連生如鬼白射干生薑葷有鬚毛舊莖死則根有
一白新根生則舊根腐亦有紫花者葉微狹皆鬼

白射干
之屬

根氣味甘辛寒有毒主治搗汁服解一切毒下骨

硬塗癰腫時珍

附方新乳癰初起內消花即玉簪花取根搗婦人

斷產白鶴仙根白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半

以酒半盞服之不可着牙摘玄方解斑蝥毒玉簪根搗水

齒能損牙齒也玉簪花根山裏紅果根同搗自

趙真人下魚骨哽然汁以竹筒灌入咽中其骨自
濟急方玉簪根乾者一錢白
下不可着牙齒砥三分白礪七分蓬
雕仙乾坤生意刮骨取牙

砂二分威靈仙三分草烏頭一分半為末以少許點瘰癧處即自落也 余居士選奇方

葉氣味同主治蛇虺螫傷搗汁和酒服以渣傳之

中心留孔洩氣時珍

鳳仙綱目

釋名急性子救荒旱珍珠綱目金鳳花綱目小桃紅救荒夾

竹桃救荒海藕音納染指甲草救荒菊婢時珍巨其花頭

然如鳳狀故以名之女人采其花及葉包染指甲其實狀如小桃老則逆裂故有指甲急性小桃諸

名宋光宗李后諱鳳宮中呼為好女兒花張定丘呼為菊婢韋居呼為羽客

集解時珍且鳳仙人家多種之極易生二月下子五月可再種苗高二三尺莖有紅白二色其

本草綱目卷之七下 花部 草部 鳳仙花

大如指中空而脆葉長如尖似桃柳葉而有鋸齒
極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自
變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍
然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之
即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色
人采其肥莖灼醃以充蒿笋嫩華酒浸一宿亦可
食但此草不生虫蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也

子氣味微苦温有小毒主治產難積塊噎膈下骨

哽透骨通竅時珍

發明時珍且鳳仙子其性急速故能透骨軟堅
瘕人魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也

緣其透骨最能損齒與王簪根同凡服者不可着齒也多用亦戕人咽

附方新產難催生鳳仙子二錢為末水服勿近心
外以蓖麻子隨年數搗塗足心

○集方 噎食不下 鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒丸綠豆大每服八粒温酒下不可

多用即急性子 咽中骨哽 欲死者白鳳仙子研水也 摘玄方 一 大呷以竹筒灌入咽

其物即軟不可經牙或 牙齒欲取 金鳳花子研末為末吹之 普濟方 入砒少許點疼

牙根取之 小兒痞積 急性子水紅花子大黃各一摘玄方 兩俱生研末每味取五錢外

用皮清一兩拌勻將白鴿鴿一箇或白鴨亦可去 毛尿刮腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用線紫

定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鴿 鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日西時疾軟三日

大便下血病去矣忌冷物 百日 孫天仁集効方

花氣味甘滑温無毒至治蛇傷搗酒服即解又治

腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服

大... 卷... 下... 養... 林... 子... 藥...

本草綱目卷十
三錢活血消積

時珍

附方

新風濕臥床
不起用金鳳花栝子仁朴消木瓜煎湯洗浴每日二三次內服

獨活寄生湯
吳曼扶壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒主治雞魚骨硬誤吞銅

鐵杖樸腫痛散血通經軟堅透骨

時珍

附方

新咽喉物硬
金鳳花根嚼爛嚙燕骨自下雞骨尤効即以溫水漱口免搥齒

也亦治誤吞銅鐵

打杖腫痛
鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一

危氏得効方夜血散即愈冬月收取乾者為末

馬患諸病
白鳳仙花

水和塗之葉廷器通變要法
連根葉熬膏遇馬有病抹其眼四角上即汗出而愈

衛生易簡方

坐孽草 宋圖經

巢解 頌曰生江西及滁州六月開紫花結實采其苗入藥甚易得後因人用有效今頗貴重時

珍曰 按一統志云出吉安永豐縣

氣味辛熱有毒 主治風痺壯筋骨兼治打撲傷損

蘇頌

發明 頌曰神醫普救方治風藥中已有用者時珍曰危氏得効方麻藥煮酒方中用之聖濟錄

治隔上虛熱咽喉噎塞小便赤澆神困多睡有坐

拏丸用坐拏草大黃赤芍藥木香升麻麥門冬黃

附錄 押不蘆 時珍曰按周蜜突辛雜志云漠北回

磨酒飲即通身麻痺而死加以刀斧亦不知至三日則以少藥投之即活御藥院中亦儲之貪官汚吏罪甚者則服百日丹皆用此也昔華佗能剗腸滌胃豈不有此等藥耶

曼陀羅花

綱目

釋名風茄兒綱目**山茄子**時珍曰法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家

北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄乃因葉形爾姚伯聲花品

呼為惡客

集解時珍曰曼陀羅生北土人家亦栽之春生夏長獨莖直上高四五尺生不旁引綠莖碧葉

葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中折斷葉外包而朝開夜合結實圓而有丁

拐中有小子八月采花九月采實

花子氣味辛温有毒主治諸風及寒濕脚氣煎湯

洗之又主驚癇及脫肛入麻藥時珍

發明時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采

人或笑或舞引之乃驗也八月采此花七月采火

麻子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏

如醉割瘡炙火宜先服此則不覺苦也

附方新三面上生瘡曼陀羅花晒乾研末少許貼之小兒慢

驚曼陀羅花七朶重一字天麻二錢半全蠍炒十

錢薄荷湯調下大腸脫肛曼陀羅子連殼一對橡

五沸入朴消少許御藥院方洗之儒門事親

羊躑躅 本經下品

釋名黃躑躅 綱目 黃杜鵑 蒙 羊不食草 拾遺 鬧羊花 綱目

驚羊花 綱目 老虎花 綱目 玉枝 別錄 躑躅而死故名鬧當作

惱惱 亂也

集解 別錄 曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山三月采花陰乾弘景曰近道諸山皆有之花黃

似鹿葱不可近眼秦曰花亦不似鹿葱正似旋花色黃者也保昇曰小樹高二尺葉似桃葉花黃似

瓜花三月四月采花日乾頌曰所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄花

山石榴輩正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍

曰韓保昇所說似桃葉者最的其能五出蕊瓣皆黃氣味皆惡蘇頌所謂深紅色者卽山石榴名紅

躑躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躑躅一名
光者誤矣決光決月也按唐李紳文集言駱谷多

山枇杷毒能殺人其花明艷與杜鵑花相似
者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛温有大毒權且惡諸石及麴不入湯使
伏丹砂陶砂唯黃畏卮子

主治賊風在皮膚中淫淫痛温瘧惡毒諸痺本
經邪

氣鬼疰毒別錄

發明頌曰古之大方多用躑躅如胡洽治時行赤
散及治五噉四滿丸之類并治風諸酒方皆

雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花
今醫方持脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑

躑花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其
根入酒飲遂至於斃也和劑局方治中風癱瘓伏

虎丹中亦用
之不多服耳

本草綱目卷之七下
躑躅
茶子園

附方 新風痰注痛

餅甌上蒸四五通以稀葛囊盛

之臨時取焙為末蒸餅九梧子大每服三九溫酒

下腰痛骨痛空心服

手臂痛食後服大良 續傳

信痛風走注

黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞

便能動也

○風濕痺痛 手足身體收攝不遂肢節

醫學集成

○風濕痺痛 疼痛言語蹇澀躑躅花酒

拌蒸一炊久晒乾為末每以牛乳

一合酒二合調服五分 聖惠方 風蟲牙痛 躑躅

草烏頭二錢半為末化臘九豆大

綿包一丸咬之追涎 海上仙方

附錄 山躑躅

時珍曰處處山峒有之高者四五尺

而花繁一枝數萼二月始開花如羊躑躅而帶如
石楠花有紅者紫者五出者于葉者小兒食其花
味酸無毒一名紅躑躅一名山石榴一名映山
紅一名杜鵑花其黃色者即有毒羊躑躅也

不喫草

拾遺藏器曰生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是也味苦辛温無毒主一切

風血補益攻諸病煮之亦浸酒服時珍曰此草似羊躑躅而云無毒蓋別有此也

芫花

本經下品

校正

自本部移入此

釋名

杜芫

別錄

赤芫

吳普

去水

本經

毒魚

別錄

草

吳普

敗華

吳普

根名黃大戟

吳普

蜀桑

別錄時珍曰芫或作杭其義未詳去水言其功毒魚言其性大戟言其似也俗人因其氣惡呼為頭痛花山海經云首山其草多芫

是也

也

集解

別錄曰芫花生淮源用谷三月三日采花陰乾晉曰芫根生邯鄲二月生葉青色加厚則

黑華有紫赤白者三月實落蓋葉乃生三月采花五月采葉八月九月采根陰乾保昇曰近道處處

有之苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑
根正月二月花發紫碧色葉未生時收采日乾葉
生花落卽不堪用也頌曰在處有之宿根舊枝莖
紫長一二尺根大土深三五寸白色似榆枳春生
苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊
而作穗又似藤花而細今絳州出者花黃謂之黃
芫花時珍曰顧野王玉篇云芫木出豫章煎汁藏
果及卵不壞洪邁容齋隨筆云今饒州處處有之
莖幹不純是木小人爭鬪者取葉援擦皮膚輒作
赤腫如被傷以誣人至和鹽擦卵則又染其外若
赭色也

修治

弘景曰用當微熬不可近眼時珍曰芫花留
數年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋

以水浸一宿晒乾用則毒
滅也或以醋炒者次之

氣味

同辛温有小毒別錄曰苦微温晉曰神農黃
帝雷公苦有毒扁鵲岐伯苦

李當之有大毒多服令人洩
乏才曰决明爲之使反甘草
主治欬逆上氣喉鳴

喘咽腫短氣蟲毒鬼瘡疝癰腫殺蟲魚
本經消胸

中痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒

毒肉毒根療疥瘡可用毒魚
別錄治心腹脹滿去水

氣寒痰涕唾如膠通利血脉治惡瘡風痺濕一切

毒風四肢攣急不能行步
甄權療欬嗽瘴瘧明大治水

飲痰癖脇下痛
時珍

發明
時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下

湯主之若表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水
氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小

本草綱目卷十七
芥子園

青蘆治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大小便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莖法也夫飲有五皆由內潑水漿外受濕氣鬱蓄而為留飲流于肺則為支飲令人喘欬寒熱吐沫背寒流于肺則為懸飲令人欬唾痛引缺盆兩脇流于心下則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩暈流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉重注痛或作水氣肺腫芫花大戟甘遂之性逐水洩濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐用之取效甚捷不可過劑洩人真元也陳言三四方以十棗湯藥為未用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證蓋善變通者也楊士瀛直指方云破癖須用芫花行水後便養胃可也好古曰水者肺腎脾三經所至有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四臟下而腰脚外而皮毛中而肌肉內而筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別不可輕論當知病在何經何臟方可用之若

誤授之則害深矣芫花與甘草相反而胡洽居士
方治痰癖飲癖以甘遂大戟芫花大黃甘草同用
蓋欲其大吐以泄濕

因相反而相激也

正誤 慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常
服芫花年百餘歲常如五六十人時珍曰芫

花乃下品毒物豈堪久服此

方外迂怪之言不足信也

附方 舊五新卒得欬嗽 芫花一升水三升煮汁一
升以棗十四枚煮汁乾日

愈 食五枚必 卒嗽有痰 芫花一兩炒水一升煮四沸
去渣白糖入半斤每服棗許

勿食酸鹹物 喘嗽失音 暴傷寒冷喘嗽失音取
芫花連根一虎口切暴

張文仲備急方 喘嗽失音 芫花連根一虎口切暴
乾令病人以薦白裹脊令灰飛揚入其七孔中當

眼淚出口鼻皆凍待芫根盡乃止病即愈 古今
錄乾嘔脇痛 傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇

驗乾嘔脇痛 乾嘔短氣 出不惡寒者表解裏未

六 直 綱 目 卷 十 七 下

芥子園

和也十棗湯之芫花熬甘遂大戟各等分為散
以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人

服一錢贏人半錢平且服之當下利病
除如不除明且更服 仲景傷寒論 水腫支飲

及癖飲用十棗湯加大黃甘草玉物各一兩大棗
十枚同煮如法服一方加芒消一兩 胡洽百病

方 天行煩亂 凝雪湯治天行毒病七八日熱積胸
中煩亂欲死用芫花一斤水三升煮

取一升半漬故布薄胸上不過再三薄
熱則除當溫四肢護厥逆也 千金方 久瘡結癖

在腹脇堅痛者芫花炒二兩硃砂五錢為
末窰丸梧子大每服十丸棗湯下 直指 水蠱脹

滿 芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮
爛搗丸梧子大每服三十丸白湯下 普濟方

酒疸尿黃 發黃心懊痛足脛滿芫花椒目等
分燒末水服半錢日二服 別後 背腿

間痛 一點痛不可忍者芫花根末米醋調傳之如
不住以帛束之婦人產後有此尤宜 袖珍

神珍

諸般氣痛芫花醋煮半兩玄胡索炒一兩半為末每服一錢男子元臟痛葱酒下瘧疾烏

梅湯下婦人血氣痛當歸酒下諸氣痛仁存鬼胎癥瘕

香附湯下小腸氣痛茴香湯下仁存鬼胎癥瘕

經候不通芫花根三兩剉炒黃為末每服一聖惠方催生

錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈聖惠方催生

去胎芫花根剉皮以綿裹點麝香入產後惡物

不下芫花當歸等分炒為攝生妙用方

未調一錢服保命集心痛有蟲芫花一兩醋炒雄黃一錢

為未每服一字温醋牙痛難忍諸藥不効芫花末

湯下乾坤生意牙痛難忍擦之令熱痛定以

温水漱之白禿頭瘡芫花末集効方癰腫初起芫

永類方白禿頭瘡芫花末集効方癰腫初起芫

未和膠塗癰腫已潰芫花根皮搓作搽搽入則不

之千金癰腫已潰生合令膿易竭也集簡方

痔瘡乳核芫根一握洗淨人木白搗爛入少水絞

汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏

本草綱目草部卷十七

芫花子園

內度過以線繫痔當微痛候痔乾落以紙擦蘸膏

納竅內去根當永除根也一方只搗汁浸線一夜

用不得使瘰癧初起氣壯人用芫根搗水一盞服

水經驗瘰癧初起大吐利即平黃州陳大用所

傳頻湖便毒初起芫根搗水服以渣傳之得下

集簡方便毒初起即消黃州熊珍所傳瀕湖

集簡方便毒初起即消黃州熊珍所傳瀕湖

方調別以筆梳其中勿近甘草次日縮小又以甘草

膏梳小暈三次如前仍上此藥自然焦縮危氏

得効一切菌毒因蛇虫毒氣熏蒸所致用芫花生

方一切菌毒研新汲水服一錢以利爲度危

氏得効方

氏得効方

氏得効方

氏得効方

氏得効方

氏得効方

蕘花 音饒 〇木 經下品

釋名 時珍曰蕘者饒也其花繁饒也

也其花繁饒也

渠解

別錄曰蕘花生咸陽川谷及河南中牟六月

采花陰乾弘景曰中牟者時從河上來形似
芫花而極細白色素曰苗似胡荽莖無刺花細黃
色四月五月收與芫花全不相似也保昇曰所在
有之以雍州者為好生岡原上苗高二尺許宗奭
曰今京洛間甚多時珍曰按蘇頌圖經言絳州所
出蕘花黃色謂之黃芫花其圖小株花成簇生恐
即此蕘花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白
也或言無蕘花以桃
花代之取其利耳

氣味苦寒有毒

別錄曰辛
微寒有毒

主治傷寒溫瘧下十二

水破積聚大堅癥瘕蕩滌胸中留癖飲食寒熱邪

氣利水道

本經療痰飲欬嗽

別錄治欬逆上氣喉中腫

滿瘧氣蠱毒疔癖氣塊

甄權

發明宗真曰張仲景傷寒論以蕤花治利者取其

酌不可過使與不及也須有是證乃用之好古曰

仲景小青龍湯云苦微利去麻黃加蕤花如鷄子

大熬令赤色用之蓋利水也時珍曰蕤

花蓋赤芫花之類氣味主治大畧相近

醉魚草
綱目

釋名關魚花綱目魚尾草綱目櫟木

集解時珍曰醉魚草南方處處有之多在墜岸邊

刪有澱稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節

而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫

花一樣結細子魚人采花及葉以毒魚蓋幽園而

死呼為醉魚皂草池沼邊不可種之此花色狀氣

味並如芫花毒魚亦同但花開不同時為異爾按

中山經云熊耳山有草馬其狀如蘇而赤華名曰

學薺可以毒魚
其此草之類與

花葉氣味辛苦温有小毒主治痰飲成胸遇寒便
發取花研末和米粉作粿炙熟食之即効又治誤
食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和
冷冰少許嚥之吐即止骨即化也久瘡成癬者以
花填鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和

海粉搗貼便消時珍

莽草本草下品

稜正自木部移入此

釋名茵草音芒草山海經鼠莽弘景曰莽本作茵字俗訛呼爾時珍曰此

本草綱目卷十七下 莽子園

本草綱目卷之十一
物有毒食之令人迷罔故
各山人以青鼠謂之鼠莽

正誤

別錄曰一名蕪一名春草禹錫曰按爾雅云
蕪春草孫炎注云藥草也俗呼為茵草郭璞

注云一名芒草所見異也時珍曰蕪音尾白薇也
薇蕪字音相近爾別錄曰薇下云一名春草而此

又以爲茵草蓋因孫

炎之誤也今正之

集解

別錄曰莽草生上谷山谷及宛句五月采葉
陰乾弘景曰今東間處處皆有葉青辛烈者

良又用搗以和陳粟米粉細水中魚吞即死浮出
人取食之無妨頌曰今南中州郡及蜀川皆有之

木若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾
說藤生纏木石間既謂之草乃藤生者是也宗奭

曰莽草諸家皆謂之草而本草居木部今世所用
皆木葉如石南葉枝梗乾則認採之其臭如椒

且凡用葉勿用尖及攣生者時珍曰
范子計然云莽草出二輔青色者善

木修治

敦旦凡使取葉細剉以生甘草水蒸二味同盛入生稀絹袋中曬申蒸一日去二件

乾

味辛溫有毒

晉旦神農辛雷公桐君苦有毒晉珍曰莽草制唯黃雉黃而有毒誤

食善人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也

至治風頭

癰腫乳癰疔瘰除結氣疥瘡殺蟲魚木經療喉痺不

通乳難頭風養可用沐勿令人眼綠別治風疝疝氣

腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服至頭瘡白禿

殺蟲與白飲赤小豆為末雞子白調如糊脇毒腫

乾更身上甄權治皮膚麻痺煎濃湯沐風齒牙痛大

本草綱目草部卷之七下 與 芥子園

發以頰自古方治風毒痺厥諸酒皆用茵草今醫
喉痺甚效宗黃曰濃煎湯淋滯皮膚麻痺周禮煎
氏等除蟲物以茵草熏之則死時珍曰古方治小
兒傷寒有莽草湯又瓊碎錄云思村王氏之子生
七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫
黃茱萸大蒜研塗其腹以茵草
蛇床子燒烟熏其下部而愈也

附方 舊四賊風腫痺 風入五臟恍惚宜莽草膏主
新五賊風腫痺 之莽草一斤烏頭附子踰躅

各二兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三
上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手解

瘥若耳鼻疾可以綿裹塞之 小兒風癩 掣癡戴眼
疥癬雜瘡宜摩之 肘后 極者日數

十發又治大人賊風莽草雷丸各一雞子黃大化
猪脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近日及陰日凡

三四次 頭風久痛 莽草煎湯沐之勿 風齩牙痛
外臺秘要 聖惠方

射後方用莽草煎湯熱漱冷吐 ○一加山椒

○加獨活 ○一加郁李仁 ○一加芫花 ○一加

川板細辛各等分煎湯熱漱冷吐 ○聖惠用莽草

半兩皂角三挺去皮子漢椒七粒為末索肉在莽

子大每以一九塞 癰癧結核 茵草一兩為末雞子

孔中吐涎取効 易取効止 癰瘡未潰 方同上得

○聖惠方 乳腫不消 莽草小

為末苦酒和傳 痛為良 浸椒水調莽草末

之 衛生易簡 狗交昏悶 傳之 便民圖纂

茵蕒

本經 下品

釋名

芫草 別錄 甲共 別錄 時珍曰 茵芋本作因蕒

集解

別錄曰 茵蕒生太山川谷三月三日采葉陰

乾弘景曰 好者出彭城今近道亦有莖葉狀

銀莽草而細軟連細莖采之方用甚稀惟合療風

酒大明曰 出自海鹽形似石楠樹生葉厚五六七

本節綱目草部卷十七下

月采頌曰今涪州絳州蕪州亦有之春生苗
高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四
月開細白花五月結實三
月四月七月采莖葉日乾

莖葉氣味苦温有毒別錄曰微温有毒主治五臟

邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風

濕痺痛木經療久風濕走四肢脚弱別錄治男子女人

軟脚毒風拘急攣痛甄權一切冷風筋骨怯弱羸顛

入藥炙用明大

發明時珍曰于全外臺諸古方治風癩有苗蕪九

膏風濕痺方多用之苗蕪石南莽草皆古
人治風妙品而近世罕知亦醫家疏缺也

附方 舊一 茵蔯酒

治賊風手足枯痺拘攣用茵蔯

新二 附子天雄烏頭秦苑女萎防風

以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥

成每服一合日二服以微痺為度方 茵蔯丸 治風

出胡洽居士百病方 圖經本草 茵蔯丸 氣積

滯成脚氣發則痛者茵蔯葉炒薤苈仁各半兩郁

李仁一兩牽牛子三兩生研未半兩右為末煉蜜

丸如梧子大每服二十九玉更薑棗 產後中風 茵

湯下取利未利再服取快 水事方 煎三上三下膏成每服熱摩干遍 千金方

石龍芮

本經 中品

校正

併入菜 音水草

釋名 地樞

本經

天豆

別錄

石能

別錄

魯果能

別錄

苦董

爾雅 郭

胡椒

救荒

彭根

別錄 弘景曰

楚 又音 卷十七下 芥子園

本草綱目卷之九
葉蒟蒻短小故名聚曰實如桑椹故名地椹禹錫
曰爾雅云露苦蒻也郭璞云卽苦蒻也本草言味
甘而此云苦者古人語倒訛甘草謂之大苦也時
珍曰蒟蒻細兒其椹之子細蒟蒻故名地椹以下皆
子名也水蒻以下皆蒻名也蒻作蔬食味辛而滑
故有椒葵之名唐本草菜部水蒻係重出今依吳
併爲

集解

別錄曰石龍蒟生大山川澤石邊五月五日
采子二月八月采皮陰乾弘景曰今出近道

子形粗似蝶狀子而扁非真好者人言是蒟蒻子
山東山石上所生者其葉蒟蒻短小其子狀如葶
蒻黃色而味小辛此乃是真也聚曰今明者然名
水蒻苗似附子實如桑椹生下濕地五月熟葉子
皆味辛山南者粒大如蒟子關中河北者細如葶
蒻氣力劣於山南者陶以細者爲真未爲通論又
曰蒻菜野生非人所種葉似葶花紫色藏器且爾
雅云芡蒻草王云烏頭苗也蘇恭注天雄亦云不

龍苳葉似葦草故名水葦據此則葦草是烏頭苗
水葦定是石龍苳更非別草也一頌曰今惟出兖州

一叢數莖莖青紫色每莖二葉其葉短小多刻缺
子如葶藶而色黃蘇恭所說乃水葦非石龍苳也

兖州所生者正與本草及陶氏說合為得其真宗
頌曰石龍苳有兩種水中生者葉光而子圓陸地

生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之
天灸而補不足莖冷失精時珍曰蘇恭言水葦即

石龍苳蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍苳一
名水葦其說甚明唐本草菜部所出水葦言其苗

也本經石龍苳言其子也寇宗奭所言陸生者乃
是毛華有大毒不可食水葦即俗稱胡椒菜者處

處有之多生近水下濕地高者尺許其根如薺三
月生苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有

三尖多細缺江淮人三四月采苗淪過晒蒸黑色
為蔬四五月初細黃花結小實大如豆狀如初生

桑椹青綠色槎散則子甚細如葶藶子即石龍苳
也宜半老時采之范子計然云石龍苳出三輔色

善黃者

子根皮氣味苦平無毒昔曰神農苦平岐伯酸扁鵲大寒雷公鹹無毒之才

日大戟為之使畏茶萸蛇蛻皮主治風寒濕痺心腹邪氣利關節

止煩滿久服輕身明目不老本經平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子別錄逐諸風除

心熱燥大

發明時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水莖氣味甘寒無毒時珍曰微辛苦主治搗汁洗馬毒

瘡并服之又搽蛇蝎毒及癰腫唐久食除心下煩

熱至寒熱鼠癩癩癩生瘡結核聚氣下瘀血止霍

亂又生搗汁半升服能殺鬼毒即吐出孟說

發明說曰葶葉止霍亂與香莢同功香莢即香薷也

附方舊二結核氣葶菜日乾為末油煮成膏摩之三五度便瘥孟說食療

蛇咬傷瘡生莖杵汁塗血疝初起胡椒茶葉按萬畢術集簡方

毛茛音良拾遺校正併入毛建草

釋名毛建草拾遺水茛綱目毛茛音天灸術自灸綱目猴

蒜時珍曰莖乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似之故名肘後方謂之水茛又名毛建亦莖字音

訛也俗名毛茛似水莖而有毛也山人截瘡采葉按貼寸口一夜作泡如火燎故呼為天灸自灸

本草綱目卷下 卷下 下 靈 芥子園

集解

藏器曰陶注鈎吻云或見毛萇蘇恭云毛萇

一方云菜中有水萇葉圓而光生水旁有毒蟹多

食之入誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘草汁

解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而

大上有毛花黃色子如蒺藜時珍曰毛建毛萇即

今毛萇也下濕處即多春生苗高者尺餘一枝三

葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細

毛為別四五片開小黃花五出甚光艷結實狀如

欲縱青桑椹如有尖梢與石龍芮子不同人以為

鷲不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沉存中
筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而未圓陸
生者葉毛而未銳此
即葉毛者宜辨之

附錄海薑陰命

藏器曰陶注鈎吻云海薑生海中

赤色狀如石龍芮有大毒又曰陰

芥生海中赤色着木懸其

子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛溫有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰
搗葉傅之不得入瘡令肉爛又患瘡人以一握微
碎縛於臂上男左女右勿令近肉即便成瘡和薑

搗塗腹破冷氣藏器

牛扁本經下品

釋名扁唐本毒唐本

集解別錄曰牛扁生桂陽川谷弘景曰今人不復識此菘曰此藥似菘草石龍芮葷根如秦芫

而細生平澤下地田野人名為牛扁療牛虱甚効
太常名扁特或各扁葷保昇曰今出寧州葉似石
龍芮附子等二月八月採根曰乾頤曰今歸州一
種使特六月有花八月結實採其根苗搗末油調

芥子園

殺蟻虱至瘡大都相似疑卽
扁特也但聲近而字訛耳

氣味苦微寒無毒主治身皮瘡熱氣可作浴湯殺

牛虱小蠱又療牛病

經

附錄虱建草

拾遺藏器曰苦無毒至蟻虱按汁沐頭虱盡死人有誤吞虱成病者搗汁

服一小合亦主諸虫瘡生山足濕地發葉似山丹
微赤高一二尺又有水竹葉生水中葉如竹葉而

短小可生食亦去蟻虱

蕁麻 蕁音燐○

宋圖經

釋名毛蕁

時珍曰蕁字本作蕁社子美有除蕁草詩是也

集解

頌曰蕁麻生江寧府山野中時珍曰川黔諸處甚多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青

或紫背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂螫
蠶以人溺濯之即解有花無實冬不凋投投水

中能
毒魚

氣味辛苦寒有大毒吐利人不止宜治蛇毒搗塗

之蘇頌風癩初起以此點之一夜皆失時珍

格注草唐木

集解采自出齊魯山澤開葉似蕨根紫色若紫草
根一株有二十許二月八月采根五月六月

采苗日
乾用

氣味辛苦温有大毒主治蠱症諸毒疼痛唐本

海芋綱目

本草綱目卷之... 卷之... 卷之...

釋名觀音蓮

綱目差天草

綱目天荷

綱目隔河似芋下

集解

時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有鈴夏秋間抽莖

開花如一瓣蓮花碧色花中有藥長作穗如觀音像在圓光之狀故俗呼為觀音蓮方士號為隔河

仙云可變金其根似芋魁大者如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚辛玉冊云蓋天草陰草也生江

廣深谷湖邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨粉霜硃砂小者名野芋

宋祁海芋贊云木幹芋葉擁腫盤戾農經弗載可以治癩

氣味辛有大毒主治瘧瘴毒腫風癩伏蝨砂時珍

附錄透山根

時珍曰按岫嶠神書云透山根生蜀中山山谷草類藤蕪可以點鐵成金昔

有人采藥誤研此草刀忽黃軟成金也又庚辛玉冊云透山根出武都取汁點鐵立成黃金有大毒

人誤食之化為紫水又有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅摸鐵成金亦有大毒入口殺人須臾為紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都有水銀一篋過峽篋漏急取渡旁叢草塞之久而開視盡成黃金矣宋初有軍士在澤州澤中割馬草歸鎌皆成金以草燃釜亦成黃金又臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹陷一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中夜宿旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一盃與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視之其人血肉俱化為水獨骸骨在牀爾視其釜則通體成金矣觀何氏所載卽是透山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻

本經下品

釋名野葛

水經

毒根

吳普

胡蔓草

圖經

斷腸草

綱目

黃藤

綱目

綱目

火把花

弘景曰言其人口則鉤人喉吻也或言吻

草雖名野葛非葛根之野者也或作治葛王充論

衡云治地各也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓

草亦曰斷腸草入人畜腹內即結腸土半日則黑

爛又名爛腸草滇人謂之火把花因其花紅而性

熱如火也岳

州謂之黃藤

一名除辛生南越山及寒石山或益州葉如葛赤

莖大如箭而方根黃色正月采之秦曰野葛生桂

州以南村墟間巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗

為鉤吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮
白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良
正與白朮蘇和類不深別者頗亦惑之新者折之
無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今
折枸杞根亦然本草言折之青烟起者各因活為

良亦不達之言也人誤食其葉者致死而羊食其
苗大肥物有相伏如此埽物志云鉤吻蔓生葉似
鳧葵是也時珍曰稀含南方草木狀云野葛蔓生
葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒
人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州
容州之間叢生花扁如卮子而稍大不成朵色黃
白其葉稍黑又按嶺南衛生方云胡蔓草葉如茶
其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生也時
珍又訪之南人云鉤吻卽胡蔓草今人謂之斷腸
草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老
稍緩五六月開花似檉柳花數十朵作穗生嶺南
者花黃生滇南者花紅呼爲火把花此數說皆與
吳普蘇恭說相合陶弘景

等別生分辨並正于下

正誤

弘景曰五符經亦言鉤吻是野葛藪事而言
似是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有

毒飛鳥不得集今人用合膏服之無嫌鉤吻別是
一物葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生極類

黃精故人采冬感之遂致死生之反或云鉤吻是
毛茛參錯不同未詳云何發曰凡使黃精勿用鉤
吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇黃精葉似竹
葉又曰凡使鉤吻勿用地精莖苗相同鉤吻治人
身上惡毒瘡其地精殺人也茶曰鉤吻蔓生葉如
柿陶言飛鳥不集者妄也黃精直生葉似柳及龍
膽草殊非比類毛茛乃有毛石龍芮與鉤吻向于
頤曰江南人說黃精莖苗稍類鉤吻但鉤吻葉頭
極大而根細與蘇恭所說不同恐南北之產異也
禹錫曰陶說鉤吻似黃精者當是蘇說似柿葉者
別是一物也又言苗名鉤吻根名野葛者亦非通
論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一曰已明草
木狀又名胡蔓草顯是藤生吳普蘇恭所說正合
木交陶氏以藤生為野葛又指小草為鉤吻復疑
是毛茛乃祖雷敷之說諸家遂無定見不辨其蔓
生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小
草但不得指為鉤吻爾昔天姥對黃帝言黃精益
壽鉤吻殺人乃是以二草善惡比對而言陶氏不

審疑是相似遂有此

說也餘見黃精下

氣味辛温大有毒

晉且神農辛雷公有毒殺人

有大毒此獨變文曰大有毒可見其毒之異常也之才且半夏為之使惡苗空玉治金瘡

乳瘻中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒本經破瘻

積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺烏獸搗汁

入膏中不入湯飲別錄玉喉痺咽塞聲音變吳普

發明藏器曰鉤吻食葉飲冷水即死冷水發其毒也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生苗子

收之名菌藥烈於野葛也薤菜搗汁解野葛毒取汁滴野葛苗即萎死南人先食薤菜後食野葛二

物相伏自然無若魏武帝噉野葛下尺先食此菜也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣

本草綱目卷之四十五 毒草 二下

本草綱目卷之十七終
人負債急每食此草而死以証也真急水吞即死
急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之以此草煮飲
生菌為毒藥害人葛洪肘後方云菜市野葛毒口
不可開者取大竹筒洞節以頭在竹筒脇及筒中
灌冷水入筒中數易水須臾口開不可下藥解之
惟多飲甘草汁人屎汁白鴨或白鷺鷥頭血人
口中或羊血灌之嶺南衛生方云即時取雞卵抱
未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲
即死

本草綱目卷之十七終