

Report No. 86

 ν_{OT}

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF MINES HELIUM ACTIVITY HELIUM RESEARCH CENTER

INTERNAL REPORT

METHOD FOR TREATING PVT DATA FROM A BURNETT

COMPRESSIBILITY APPARATUS

BY

Robert E. Barieau

B. J. Dalton

BRANCH Fundamental Research

PROJECT NO.

4335

DATE

April 1966

.H43 M56 no.86

HD

9660

AMARILLO, TEXAS

, , . .

#927660101

a 1

HD 9660 .H43 M56 N0.86

Report No. <u>86</u>

HELIUM RESEARCH CENTER

INTERNAL REPORT

METHOD FOR TREATING PVT DATA FROM A BURNETT COMPRESSIBILITY APPARATUS

By

Robert E. Barieau and B. J. Dalton

Branch of Fundamental Research

Project 4335

April 1966

BLM Library Denver Federal Center Bldg. 50, OC-521 P.O. Box 25047 Denver, CO 80225

·

τ.

ai

CONTENTS

Abetreet	Page 3
ADSTRACT	
Introduction	3
Theory of the Burnett method	5
Method of obtaining the least squares values of the constants which appear in the fundamental equation for the Burnett method	8
Expressions for calculating variances and covariances of the constants evaluated	47
Evaluation of the variance of the $P_{r(calc)}$'s and	
any other calculated P that reduces F to zero	53
Expression for calculating the variance of the compressibility factor	. 57
References	. 61

19

.



METHOD FOR TREATING PVT DATA FROM A BURNETT COMPRESSIBILITY APPARATUS

by

Robert E. Barieau^{1/} and B. J. Dalton^{2/}

ABSTRACT

This report describes the method employed by the Helium Research Center for treating PVT data from a Burnett compressibility apparatus so that the compressibility is obtained as a function of pressure or molal density. In addition, formulas are given for determining the variances of all calculated quantities and for calculating variances and covariances of all constants evaluated.

INTRODUCTION

In 1936, Burnett $(\underline{3})^{\underline{3}/}$ announced his method for obtaining PVT data on gases which eliminates the necessity of making any mass or volume measurements. The only data observed are the temperature of the isotherm being studied and a series of pressures and expansion numbers.

Work on manuscript completed January 1966.

^{1/} Supervisory research chemist, project leader, Thermodynamics, Helium Research Center, Bureau of Mines, Amarillo, Texas.

^{2/} Research chemist, Helium Research Center, Bureau of Mines, Amarillo, Texas.

^{3/} Underlined numbers in parentheses refer to items in the list of references at the end of this report.

Ł

4

1

·

The Burnett apparatus consists of two thermostated containers, connected through a pressure valve, and a pressure gage. The first container is filled with gas to some high pressure and the initial pressure is determined. Then this same mass of gas is expanded into the second container, which has previously been evacuated, and the two containers are allowed to come to equilibrium. The pressure is then determined, the first container is isolated, and the second container is again evacuated. This process is repeated a number of times so that a series of pressures and expansion numbers are obtained.

This report describes the way such data are treated at the Helium Research Center, Bureau of Mines, so that the compressibility is obtained as a function of the pressure or of the molal density. In addition, formulas are given for determining the variances of all calculated quantities and for calculating the variances and covariances of all constants evaluated.

The method and the relationships outlined in this report for treating PVT data from a Burnett compressibility apparatus have been developed for the compressibility being a function of two parameters, B and C. The extension of this method to the evaluation of more parameters should be obvious.

´ 4

r'

p.

THEORY OF THE BURNETT METHOD

When the first container is filled to pressure P_0 , the following exact equation applies

$$P_{o}V_{1,o} = nRTZ_{o}$$
(1)

where

On expanding the gas into the second container, the following exact equation applies

$$\mathbf{P}_{1}\mathbf{V}_{2,1} = \mathbf{n}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{Z}_{1} \tag{2}$$

where

 P_1 is the equilibrium pressure after the first expansion, $V_{2,1}$ is the volume of the first and second containers under the pressure P_1 , and

 Z_1 is the compressibility factor of the gas at pressure P_1 and is defined by equation (2).

Dividing equation (2) by equation (1), we have

$$\frac{Z_{1}}{Z_{0}} = \frac{P_{1}V_{2,1}}{P_{0}V_{1,0}}$$
(3)

¥

3

¥

k

~

or

$$Z_{1} = \frac{Z_{0}}{P_{0}} \frac{V_{2,1}}{V_{1,0}} P_{1}$$
(4)

6

Let

$$N_{1} = \frac{V_{2,1}}{V_{1,0}}$$
(5)

 N_1 is called the volume ratio of the first expansion. This will be a function of the pressure because of the change in volume of the containers with pressure. If α is the pressure coefficient of the volume of the two containers, and β is the pressure coefficient of the first container, we have

$$V_{1,o} = V_1^o \left(1 + \beta P_o \right)$$
(6)

$$V_{2,1} = V_2^{o} (1 + \alpha P_1)$$
 (7)

where V_1^o is the volume of container 1 under zero pressure, and V_2^o is the volume of the two containers under zero pressure. Substituting equations (6) and (7) into equation (5), we have

$$N_{1} = \frac{V_{2}^{o}(1 + \alpha P_{1})}{V_{1}^{o}(1 + \beta P_{o})}$$

$$(8)$$

We now let

$$N_{P=0} = \frac{V_2^0}{V_1^0}$$
(9)



1

.

84

ę.

No.

di,

where $N_{P=0}$ is then the volume ratio at zero pressure. Substituting equations (8) and (9) into equation (4), we have

$$Z_{1} = \frac{Z_{o}}{P_{o}} N_{P=0} \left(\frac{1 + \alpha P_{1}}{1 + \beta P_{o}} \right) P_{1}$$
(10)

A similar equation holds for the second expansion

$$Z_{2} = \frac{Z_{1}}{P_{1}} N_{P=0} \left(\frac{1 + \alpha P_{2}}{1 + \beta P_{1}} \right) P_{2}$$
(11)

If we multiply equation (10) by equation (11), we find

$$Z_{2} = \frac{Z_{0}}{P_{0}} N_{P=0}^{2} \frac{(1 + \alpha P_{1})(1 + \alpha P_{2})}{(1 + \beta P_{0})(1 + \beta P_{1})} P_{2}$$
(12)

The expression for the rth expansion is

$$Z_{r} = \frac{Z_{r-1}}{P_{r-1}} N_{P=0} \left(\frac{1 + \alpha P_{r}}{1 + \beta P_{r-1}} \right) P_{r}$$
(13)

Multiplying Z_r by Z_{r-1} , Z_{r-2} , ..., Z_1 , we find

$$Z_{r} = \frac{Z_{o}}{P_{o}} N_{P=0}^{r} f_{r} P_{r}$$
(14)

where

$$\mathbf{f}_{r} = \frac{(1 + \alpha \mathbf{P}_{1})(1 + \alpha \mathbf{P}_{2}) \dots (1 + \alpha \mathbf{P}_{r})}{(1 + \beta \mathbf{P}_{0})(1 + \beta \mathbf{P}_{1}) \dots (1 + \beta \mathbf{P}_{r-1})}$$
(15)

11.25

The problem of treating data obtained by the Burnett method is to evaluate the constants that appear in the expression for the compressibility, Z, and to also evaluate, simultaneously, the volume ratio, $N_{P=0}$, that appears in equation (14). We evaluate these constants by the general non-linear least squares technique that we have developed for this particular purpose (1).

METHOD OF OBTAINING THE LEAST SQUARES VALUES OF THE CONSTANTS WHICH APPEAR IN THE FUNDAMENTAL EQUATION FOR THE BURNETT METHOD For the Burnett method, we define

$$F = F(r, P_r, B, C, N_{P=0})$$

= $Z_r - \frac{Z_o}{P_o} N_{P=0}^r f_r P_r = 0$ (16)

In equation (16), Z_r can be an explicit function of either the pressure, P_r , or the molal density, ρ_r , in which case Z_r is to be considered an implicit function of P_r through the equation

$$\rho_{r} = \frac{P_{r}}{RTZ_{r}}$$
(17)

 Z_r and Z_o of equation (16) are functions of the parameters B and C which are to be evaluated but are not functions of $N_{P=0}$. f_r is a function of all of the pressures P_o , P_1 ..., P_r , it being assumed that α and β , which appear in the expression for f_r , have been independently determined and are exactly known.

2

r

al.

In equation (16), we assume that the expansion number, r, is exactly known. We assume random errors only in the observed P_r 's, and that they are normally distributed.

Now because of random errors in the observed P_r 's, when $P_r(obs)$ is substituted in equation (16), F will not reduce exactly to zero. Let F_r be the value of F when the observed values of r and P_r are substituted in equation (16). Thus

$$F_{r} = F(r, P_{r(obs)}, B, C, N_{P=0})$$
 (18)

Now equation (16) can be solved for a calculated P_r so that F reduces to zero. Thus

$$F = F(r, P_{r(calc)}, B, C, N_{P=0}) = 0$$
(19)

To calculate $P_{r(calc)}$, we use the Newton-Raphson method and an iterative technique. We first calculate $\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}}\right)_{r,B,C,N}_{P=0}$ at $P_{r(obs)}$. Then as a first approximation, we take

$$P_{r(obs)} - P_{r(calc)_{1}} = \frac{F_{r}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}}$$
(20)

The solution of equation (20) gives $P_{r(calc)_{1}}$, which is the first approximation of $P_{r(calc)}$. This value is then substituted into equation (16) and, if equation (16) is not exactly satisfied, then $P_{r(calc)_{1}}$ is not the exact answer, so we let $F_{r_{1}}$ be the numerical

₹

.

12

value of F at Pr(calc)

$$F_{r_1} = F(r, P_{r(calc)_1}, B, C, N_{P=0})$$
 (21)

We then evaluate $\left(\frac{\partial F}{\partial P_r}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}$ at $P_{r(calc)_1}$ and, as a second approximation, we take

$$P_{r(calc)_{1}} - P_{r(calc)_{2}} = \frac{F_{r_{1}}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}}$$
(22)

We repeat the iteration until equation (19) is satisfied to within any amount we wish to specify.

We then define

$$Y_{r} = P_{r(obs)} - P_{r(calc)}$$
(23)

Now Y_r , the residual of $P_{r(obs)}$, is the difference between the observed and calculated values. This is not the true random error in our observed P_r because we do not know the true value of $P_{r(obs)}$. However, we can maximize the probability that the Y_r 's are equal to the true random errors, and this is just what the principle of least squares does. The principle of least squares says that we maximize the probability that the Y_r 's represent the true random errors by minimizing the sum of the weighted squares of the residuals. Thus, we should minimize the function

$$R = \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}}(Y_{r})^{2}$$
(24)

Þ

and evaluate $N_{P=0}$, B, and C so that

$$\left(\frac{\partial R}{\partial B}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}} = 2\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} Y_{r} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}} = 0 \quad (25)$$

$$\left(\frac{\partial R}{\partial C}\right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}} = 2\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} Y_{r}\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}} = 0 \quad (26)$$

$$\left(\frac{\partial R}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r(obs)},B,C} = 2\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} Y_{r}\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r(obs)},B,C} = 0 \quad (27)$$

In equation (24), $W_{P_{r(obs)}}$ is the weight to be assigned to the $P_{r(obs)}$ observed P_{r} . If the $P_{r(obs)}$'s all have the same precision index, then they will have the same weight and $W_{P_{r(obs)}} = 1$. If the $P_{r(obs)}$'s do not all have the same precision index, then

$$V_{P_{r(obs)}} = \frac{L^2}{s_{P_{r(obs)}}^2}$$
(28)

where L is a constant and $S_{P_{r(obs)}}^2$ is the variance of $P_{r(obs)}$.

In a particular problem, it may be necessary to assume $W_{P_{r(obs)}} = 1$ in the beginning. However, if this is done the residuals, $Y_{r} = [P_{r(obs)} - P_{r(calc)}]$, should be examined to see if there is any statistical evidence for the residuals squared being a function of $P_{r(obs)}$. Any assumption as to the variance being a function of $P_{r(obs)}$ can always be checked by examining the residuals. In any event, $W_{P_{r(obs)}}$ is not a function of the constants to be evaluated. r

In order to evaluate $N_{P=0}$, B, C, we need to linearize equations (25), (26), and (27) with respect to the undetermined constants. A truncated Taylor's series expansion can be used to do this. The normal equations, written in linearized form, are

$$a_1 \Delta B + b_1 \Delta C + c_1 \Delta N_{P=0} = m_1$$
 (29)

$$a_2 \Delta B + b_2 \Delta C + c_2 \Delta N_{P=0} = m_2$$
 (30)

$$a_{3}\Delta B + b_{3}\Delta C + c_{3}\Delta N_{P=0} = m_{3}$$
 (31)

Equations (29), (30), and (31) result from expanding Y_r ,

$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}}, \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}}, \text{ and } \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r(obs)},B,C}$$

about an approximate solution, Y_r^o , ignoring second and higher order derivatives. The quantities ΔB , ΔC , $\Delta N_{P=0}$ are defined as

$$\Delta B = B - B_{o}$$

$$\Delta C = C - C_{o}$$

$$\Delta N_{P=0} = N_{P=0} - (N_{P=0})_{o}$$
(32)

where B, C, $N_{P=0}$ are the undetermined constants and B_0 , C_0 , $(N_{P=0})_0$ are approximate values for these quantities.

The a's, b's, c's, and m's appearing in the linearized normal equations are

$$a_{1} = \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left[\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B} \right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}}^{o^{2}} + Y_{r}^{o} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial B^{2}} \right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}}^{o} \right]$$
(33)

-49

da

$$\mathbf{a}_{2} = \mathbf{b}_{1} = \begin{vmatrix} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)^{\circ}_{r,P_{r}(obs)}, C, N_{P=0} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)^{\circ}_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} \\ + \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial B \partial C}\right)^{\circ}_{r,P_{r}(obs)}, N_{P=0} \end{aligned} (34)$$

$$a_{3} = c_{1} = \begin{bmatrix} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B} \right)^{\circ}_{r, P_{r(obs)}, C, N_{P=0}} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)^{\circ}_{r, P_{r(obs)}, B, C} \\ + \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} Y_{r}^{\circ} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial B \partial N_{P=0}} \right)^{\circ}_{r, P_{r(obs)}, C} \\ + \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} Y_{r}^{\circ} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial B \partial N_{P=0}} \right)^{\circ}_{r, P_{r(obs)}, C}$$
(35)

$$b_{2} = \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left[\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C} \right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}}^{o^{2}} + Y_{r}^{o} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial C^{2}} \right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}}^{o} \right] (36)$$

$$b_{3} = c_{2} = \begin{pmatrix} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)^{o}_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}}\right)^{o}_{r,P_{r}(obs)}, B, C \\ + \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial C \partial N_{P=0}}\right)^{o}_{r,P_{r}(obs)}, B \end{pmatrix}$$
(37)

$$c_{3} = \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} \left[\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)^{o^{2}}_{r,P_{r}(obs)},B,C + Y_{r}^{o} \left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial N_{P=0}^{2}} \right)^{o}_{r,P_{r}(obs)},B,C \right]$$
(38)



.

$$m_{1} = -\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} Y_{r}^{o} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{o}, C, N_{P=0}$$
(39)

$$m_{2} = -\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} Y_{r}^{o} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{o} B, N_{P=0}$$

$$(40)$$

$$m_{3} = -\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} Y_{r}^{o} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{o}, B, C$$

$$(41)$$

where

$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{o},C,N_{P=0} = \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,P_{r}(calc)}^{o},C,N_{P=0}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}^{o}}$$
(42)

$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}}^{o} = \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,P_{r(calc)},B,N_{P=0}}^{o}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}^{o}}$$
(43)

$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r(obs)},B,C}^{o} = \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r(calc)},B,C}^{o}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}^{o}}$$
(44)











~

$$\begin{bmatrix}
\left(\frac{\partial^{2}F}{\partial B^{2}}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},C,N_{p=0}} \\
\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{p=0}} \\
\frac{2\left(\frac{\partial^{2}F}{\partial B\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,C,N_{p=0}} \\
\left(\frac{\partial F}{\partial B\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,C,N_{p=0}} \\
\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{p=0}} \\
\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},C,N_{p=0}} \\
\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{p=0}} \\
\end{bmatrix}$$
(45)

$$\frac{\left(\frac{\partial^{2}F}{\partial C^{2}}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},B,N_{P=0}}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}} \left(\frac{\frac{\partial F}{\partial C\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,N_{P=0}} \left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},B,N_{P=0}}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}\right]^{2}} \left(\frac{46}{2}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},B,N_{P=0}} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}\right]^{2}} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}\right]^{3}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}\right]^{3}}$$

$$\left(\frac{\partial^2 Y_r}{\partial B^2}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}}^{o}$$

 $\left(\frac{\partial^2 Y_r}{\partial c^2}\right)_{r,P_r(obs)}^{o}$, B, N_{P=0}

-

15



$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial N_{p=0} \partial B}\right)_{r,P_{r}(calc)}^{\circ},C} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ} \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right)_{r,P_{r}(calc)}^{\circ},B,C} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{2}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{2}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{2}} + \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,P_{r}(calc)}^{\circ},C,N_{p=0}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{2}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{2}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{3}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{3}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}\right]^{3}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}} - \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{\circ}}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}$$

(47)



$$\left(\frac{\partial^{2} \mathbf{Y}_{r}}{\partial \mathbf{C} \partial \mathbf{N}_{p=0}} \right)_{r, \mathbf{P}_{r}(calc)}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial^{2} \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C} \partial \mathbf{P}_{r}(calc)} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{N}_{p=0}} \right)_{r, \mathbf{P}_{r}(calc)}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C} \partial \mathbf{P}_{r}(calc)} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C} \partial \mathbf{P}_{r}(calc)} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C}} \right)_{r, \mathbf{P}_{r}(calc)}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C}} \right)_{r, \mathbf{P}_{r}(calc)}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C}} \right)_{r, \mathbf{P}_{r}(calc)}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

$$= - \frac{\left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{C}} \right)_{r, \mathbf{P}_{r}(calc)}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ} \right)_{r, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{N}_{p=0}}^{\circ}$$

(48)


$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial N_{p=0}^{2} r, P_{r(calc)}, B, C}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)^{\circ} r, P_{r(calc)}, B, C}, \left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}, B, C}, N_{p=0}\right)^{\circ} r, P_{r(calc)}, F, C, N_{p=0}\right)^{\circ} r, P_{r(calc)}, B, C, N_{p=0}\right)^{\circ} r, P_{r(calc)}, B, C, N_{p=0}\right)^{\circ} r, P_{r(calc)}, F, C, N_{p=0}$$

18

(49)

 $\frac{\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial B}\right)_{r,P}^{o}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,C,N}^{o}}$ $-\frac{\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial B \partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,C,N_{P=0}}\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},B,N_{P=0}}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}\right]^{2}}$ $\frac{\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)^{\circ}_{r,P_{r(calc)},C,N_{P=0}}\left(\frac{\partial^{2}F}{\partial P_{r(calc)}\partial C}\right)^{\circ}_{r,B,N_{P=0}}}{\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)^{\circ}_{r,B,C,N_{P=0}}\right]^{2}}$ $\frac{\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,P}^{o}\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,P=0}^{o}\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,P_{r(calc)},B,N_{P=0}}^{o}\left(\frac{\partial^{2}F}{\partial P_{r(calc)}^{2}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}^{o}}\left[\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}}^{o}\right]^{3}$

 $\left(\frac{\partial^2 Y_r}{\partial B \partial C}\right)_{r,P_r(obs)}^{o}, N_{P=0}$

(50)



$$Y_{r}^{o} = [P_{r(obs)} - P_{r(calc)}]^{o}$$
(23)

Now in order to evaluate the constants of the linearized normal equations, we need values of first and second derivatives of the function, F,

$$F = F(r, P_{r(calc)}, N_{P=0}, B, C) = 0$$
 (19)

By differentiating equation (19), we find that these derivatives are

$$\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,P_{r},N_{P=0},C} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} - \frac{N_{P=0}^{I}}{P_{o}} f_{r}P_{r}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{P_{o},C}$$
(51)

$$\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,P_{r},N_{p=0},B} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial C}\right)_{P_{r},B} - \frac{N_{p=0}^{r}}{P_{o}} f_{r}P_{r}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B}$$
(52)

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r},B,C} = -\frac{rZ_{o}}{P_{o}}N_{P=0}^{r-1}f_{r}P_{r}$$
(53)

$$\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}}\right)_{r,N_{P=0},B,C} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} - \frac{Z_{o}}{P_{o}}N_{P=0}^{r}f_{r} - \frac{Z_{o}}{P_{o}}N_{P=0}^{r}P_{r}\left(\frac{\partial f_{r}}{\partial P_{r}}\right)$$
(54)

But,

7

$$\left(\frac{\partial f_{r}}{\partial P_{r}}\right) = \frac{f_{r}\alpha}{1 + \alpha P_{r}}$$
(55)

Therefore, substituting equation (55) in equation (54),

$$\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}}\right)_{r,N_{P=0},B,C} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} - \frac{Z_{o}}{P_{o}}N_{P=0}^{r}f_{r}\left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right)$$
(56)

,

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial B^{2}}\right)_{r,P_{r},N_{P=0},C} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B^{2}}\right)_{P_{r},C} - \frac{N_{P=0}^{r}}{P_{o}} f_{r} P_{r} \left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial B^{2}}\right)_{P_{o},C}$$
(57)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C^{2}}\right)_{r,P_{r},N_{P=0},B} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial C^{2}}\right)_{P_{r},B} - \frac{N_{P=0}^{r}}{P_{o}} f_{r} P_{r} \left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial C^{2}}\right)_{P_{o},B}$$
(58)

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial N_{P=0}^2}\right)_{r,P_r,B,C} = \frac{-r(r-1)Z_o}{P_o} N_{P=0}^{r-2} f_r P_r$$
(59)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial P_{r}^{2}}\right)_{r,N_{P=0},B,C} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial P_{r}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{2 Z_{o}}{P_{o}} N_{P=0}^{r} \left(\frac{\partial f_{r}}{\partial P_{r}}\right) - \frac{Z_{o}}{P_{o}} N_{P=0}^{r} P_{r} \left(\frac{\partial^{2} f_{r}}{\partial P_{r}^{2}}\right)$$
(60)

$$\left(\frac{\partial f_{r}}{\partial P_{r}}\right) = \frac{f_{r}^{\alpha}}{1+\alpha P_{r}}$$
(55)

$$\frac{\partial^2 f_r}{\partial P_r^2} = \frac{\alpha}{1+\alpha P_r} \left(\frac{\partial f_r}{\partial P_r}\right) - \frac{f_r \alpha^2}{(1+\alpha P_r)^2}$$

$$\frac{\partial^{2} f_{r}}{\partial P_{r}^{2}} = \frac{f_{r} \alpha^{2}}{(1+\alpha P_{r})^{2}} - \frac{f_{r} \alpha^{2}}{(1+\alpha P_{r})^{2}} = 0$$
(61)

Therefore,

.

1-

.

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial P_{r}^{2}}\right)_{r,N_{P=0},B,C} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial P_{r}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{2Z_{o}}{P_{o}}N_{P=0}^{r} \frac{f_{o}\alpha}{1+\alpha P_{r}}$$
(62)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial B \partial C}\right)_{r, P_{r}, N_{P=0}} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B \partial C}\right)_{P_{r}} - \frac{N_{P=0}^{r}}{P_{o}} f_{r} P_{r} \left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial B \partial C}\right)_{P_{o}}$$
(63)



$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial B \partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r},C} = \frac{-rN_{P=0}^{r-1} f_{r}P_{r}}{P_{o}} \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{P_{o},C}$$
(64)

$$\left(\frac{\partial^{2} \mathbf{F}}{\partial B \partial P_{r}}\right)_{r,N_{P=0},C} = \left(\frac{\partial^{2} \mathbf{Z}_{r}}{\partial B \partial P_{r}}\right)_{C} - \frac{N_{P=0}^{r} \mathbf{f}_{r}}{P_{o}} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right) \left(\frac{\partial \mathbf{Z}_{o}}{\partial B}\right)_{P_{o},C}$$
(65)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r},B} = \frac{-rN_{P=0}^{r-1} f_{r}P_{r}}{P_{o}} \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B}$$
(66)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial P_{r}}\right)_{r,N_{P=0},B} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial C \partial P_{r}}\right)_{B} - \frac{N_{P=0}^{r} f_{r}}{P_{o}} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right) \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B}$$
(67)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial N_{P=0} \partial P_{r}}\right)_{r,B,C} = \frac{-r Z_{O} N_{P=0}^{r-1} f_{r}}{P_{O}} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right)$$
(68)

The derivatives of F, as given by equations (51) - (68), are to be evaluated for $P_r = P_r(calc)$.

Now if Z_r is an explicit function of the pressure, P_r , then equations (51) - (68) can be used directly to calculate the various derivatives of the function, F. However, if Z_r is an explicit function of the molal density, ρ_r , then it is necessary to express the various derivatives of Z appearing in equations (51) - (68) as a function of the density, ρ_r .

We then have

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C} + \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}$$
(69)



Now

$$\rho_{r} = \frac{P_{r}}{RTZ_{r}}$$
(17)

Similarly,

$$\rho_{o} = \frac{P_{o}}{RTZ_{o}}$$
(70)

Differentiating equation (17) with regard to B, keeping ${\rm P}_{\rm r}$ and C fixed, we have

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \frac{-P_{r}}{RTZ_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}$$
(71)

and substituting equation (17) in equation (71)

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \frac{-\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}$$
(72)

Then substituting equation (72) into equation (69), we have

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C} - \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\sigma_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}$$
(73)

or, rearranging the above equation,

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \frac{\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(74)

-

.

Similarly,

$$\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{P_{o},C} = \frac{\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{\rho_{o},C}}{1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}}$$
(75)

Substituting equations (74) and (75) into equation (51), we have

$$\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,P_{r},N_{p=0},C} = \frac{\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}} - \frac{N_{p=0}^{r}f_{r}P_{r}}{P_{o}} \frac{\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{\rho_{o},C}}{1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}}$$
(76)

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial C}\right)_{P_{r},B}$$
 and $\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B}$ are of the same form as equations (74)

and (75) and upon substituting these expressions into equation (52), we get an equation similar to equation (76) of the form

$$\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{P_{r},B} = \frac{\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial C}\right)_{\rho_{r},B}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}} - \frac{N_{P=0}^{r}f_{r}P_{r}}{P_{o}} \frac{\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{\rho_{o},B}}{1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}}$$
(77)

Since $Z^{}_{r}$ and $Z^{}_{O}$ are functions of the parameters B and C but not of $N^{}_{P=O},$ then

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r},B,C} = \frac{-r Z_{o} N_{P=0}^{r-1} f_{r}P_{r}}{P_{o}}$$
(53)

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C}$$
(78)



Differentiating equation (17) with regard to P_r , keeping B and C fixed, we have

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{1}{RTZ_{r}} - \frac{P_{r}}{RTZ_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C}$$
(79)

or, substituting equation (17) into equation (79),

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\rho_{r}}{P_{r}} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C}$$
(80)

Substituting equation (80) into equation (78), we have

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}$$
(81)

or,

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(82)

Substituting equation (82) into equation (56), we have

$$\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}}\right)_{r,N_{P=0},B,C} = \frac{\rho_{r}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{P_{r}\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]} - \frac{Z_{o}}{P_{o}}N_{P=0}^{r}f_{r}\left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right)$$
(83)

$$\left(\frac{\partial Z_r}{\partial B} \right)_{P_r, C} = function(\rho_r, B, C)$$
 (84)



$$d\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \left[\frac{\partial}{\partial \rho_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{B,C} d\rho_{r} + \left[\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{P_{r},C} dB_{r} + \left[\frac{\partial}{\partial C}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{C} dC \qquad (85)$$

$$\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B^{2}}\right)_{P_{r},C} = \left[\frac{\partial}{\partial \rho_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{B,C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} + \left[\frac{\partial}{\partial B}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{P_{r},C} \rho_{r},C \qquad (86)$$

But from equation (74), we have

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C}}$$
(74)

Differentiating equation (74) with regard to B keeping ρ_r and C fixed,

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial B} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} \end{bmatrix}_{P_{r},C} = \begin{bmatrix} \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B^{2}} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C}} - \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C} \begin{bmatrix} \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B \partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \end{bmatrix}^{2} \end{bmatrix}$$
(87)
$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial B} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} \end{bmatrix}_{\rho_{r},C} = \begin{bmatrix} \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \end{bmatrix}^{2} \\ & \frac{\rho_{r},C} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \end{bmatrix} \\ + \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{P_{r},C} \\ & \frac{\rho_{r},C} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$
(88)



$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \right)_{P_{r}, C} \end{bmatrix}_{B, C} = \begin{bmatrix} \frac{\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B \partial \rho_{r}^{*} C} \right)}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C}} \\ - \frac{\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \right)_{B, C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]^{2}}$$
(89)

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} z_{r}}{\partial B \partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{P_{r}, C} \end{bmatrix}_{B, C} = \begin{bmatrix} \frac{\left(\frac{\partial^{2} z_{r}}{\partial B \partial \rho_{r}} \right)_{C} + \frac{\rho_{r}}{z_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]^{2}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{z_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]^{2}} \\ + \frac{\frac{\rho_{r}}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C}^{2} - \frac{\rho_{r}}{z_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial^{2} z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C}^{2} \\ + \frac{1 + \frac{\rho_{r}}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{\rho_{r}}{z_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \\ - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}, C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial P} \right)_{B, C} - \frac{1}{z_{r}^{2}}$$

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = -\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}$$
(72)

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = \frac{\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(74)



Substituting equation (74) into equation (72), we have

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \rho_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} = - \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C}}$$
(91)

 $\begin{aligned} & \text{Multiplying c.} \\ & \left[\frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \right)_{P_{r}}, C^{-}_{B, C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial B} \right)_{P_{r}}, C \right] = \begin{bmatrix} -\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}}, C \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B \partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]^{2} \\ & \left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]^{2} \\ & \left[\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r}}, C \left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \right)_{B, C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right] \\ & \left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B, C} \right]^{3} \end{aligned}$ Multiplying equation (91) by equation (90), we have

Substituting equations (88) and (92) into equation (86), we have

$$= \frac{\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B^{2}}\right)_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}} - \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C}\left[2\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B\partial \rho_{r}}\right)_{C} - \frac{1}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C}\right]}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{2}} + \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C}\left[\frac{1}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}^{2}\right]}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}^{2}\right]}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}^{3}}$$

$$(93)$$

(92)



hand and the second of the second sec

£,



 $\left(\frac{\partial^2 z_o}{\partial^2}\right)_{P_o,C}$

P_, B

$$\begin{bmatrix}
\frac{\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial B^{2}}\right)_{\rho_{o},C}}{1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}} - \frac{\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{\rho_{o},C}\left[2\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial B\partial \rho_{o}}\right)_{C} - \frac{1}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{\rho_{o},C}\right]^{2}}{\left[1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\right]^{2}} + \frac{\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{o}}{Z_{o}^{2}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)^{2}}{\left[1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial$$

Equations (93) and (94) are to be used in equation (57).

The $\left(\frac{\partial^2 z_r}{\partial c^2}\right)_{P_r,B}$ and the $\left(\frac{\partial^2 z_o}{\partial c^2}\right)_{P_o,B}$ are obtained in the same manner

as equations (93) and (94) and are of the form

$$\frac{\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial c^{2}}\right)_{\rho_{r},B}}{\left(1+\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}-\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial c}\right)_{\rho_{r},B}\left[2\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial c \partial \rho_{r}}\right)_{B}-\frac{1}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial c}\right)_{\rho_{r},B}\right]}{\left[1+\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{2}}\right] + \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}+\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}-\frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}^{2}}{\left[1+\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}-\frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}^{2}\right]}{\left[1+\frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}^{3}\right]^{3}}$$
(95)



$$\frac{\left[\frac{\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial c^{2}}\right)_{\rho_{o},B}}{1+\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}} - \frac{\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial c}\right)_{\rho_{o},B}\left[2\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial c \partial \rho_{o}}\right)_{B} - \frac{1}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial c}\right)_{\rho_{o},B}\right]}{\left[1+\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\right]^{2}}\right] + \frac{\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\right]}{\left[1+\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\right]}{\left[1+\frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\right]^{3}}\right]$$
(96)

Equations (95) and (96) are to be substituted in equation (58).

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r},B,C} = \frac{-rZ_{O}N_{P=0}^{r-1}f_{P}P_{o}}{P_{O}}$$
(53)

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial N_{P=0}^2}\right)_{r,P_r,B,C} = \frac{-r(r-1)Z_0 N_{P=0}^{r-2} f_r P}{P_0}$$
(59)

From equation (82), we have

*

 $\left(\frac{\partial^2 z_o}{\partial z_o}\right)$

=

P_o,B

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(82)

and differentiating the above expression with respect to $\Pr_{\rm r}^{},$ keeping B and C fixed,

$$\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial P_{r}^{2}}\right)_{B,C} = \left[\frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C}\right]_{B,C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C}$$
(97)

Differentiating equation (82) with regard to $\rho_{\rm r},$ keeping B and C fixed, we have

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial p_{r}} \right)_{B,C} \end{bmatrix}_{B,C} = \begin{bmatrix} \frac{\frac{1}{P_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{P_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} \left(\frac{\partial P_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} \\ \frac{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{P_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}$$

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\rho_{r}}{P_{r}} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C}$$
(80)
$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(82)

Substituting equation (82) into equation (80), we have

or

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} = \frac{\rho_{r}}{P_{r}} \begin{bmatrix} 1 - \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)}{1 - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)} \\ 1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} \end{bmatrix}$$
(99)

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(100)

30

a second beaution in the second second

-

Multiplying equation (98) by equation (100) and substituting into equation (97), we have

$$\left(\frac{\partial^{2} z_{r}}{\partial P_{r}^{2}}\right)_{B,C} = \begin{bmatrix} -\frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}} + \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{2}} \\ -\frac{\frac{\rho_{r}^{2}}{P_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right] \\ -\frac{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C}\right]^{3}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C}\right]^{3}}$$
(101)

Equation (101) is to be substituted in equation (62).

Differentiating equation (85) with regard to C, keeping ${\rm P}_{\rm r}$ and B fixed, we get

$$\left(\frac{\partial^{2} z_{r}}{\partial B \partial C}\right)_{P_{r}} = \left[\frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{B,C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial C}\right)_{P_{r},B} + \left[\frac{\partial}{\partial C} \left(\frac{\partial z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C}\right]_{\rho_{r},B} (102)$$

From equation (74), we have

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}$$
(74)

Differentiating the above expression with regard to first C, keeping ρ_r and B fixed, and then with regard to ρ_r , keeping B and C fixed,

we get

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial C} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} \Big|_{\rho_{r},B} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B \partial C} \end{pmatrix}_{\rho_{r}}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C}} - \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C} \Big[\frac{\rho_{r}}{\partial B} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r} \partial C} \end{pmatrix}_{B} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial C} \end{pmatrix}_{\rho_{r},B} \Big]$$
(103)



$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{P_{r},C} \end{bmatrix}_{B,C} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r} \partial B} \end{pmatrix}_{C}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r} \partial B} \end{pmatrix}_{C}} - \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial B} \end{pmatrix}_{\rho_{r},C} \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \end{pmatrix}_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \begin{pmatrix} \frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \end{pmatrix}_{B,C} \right]^{2}}$$
(104)

As for equation (91), it can be shown that

4.

and

$$\left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial C}\right)_{P_{r},B} = -\frac{\rho_{r}}{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial C}\right)_{\rho_{r},B}$$
(105)

32

Multiplying equations (104) and (105), we have

$$\frac{\partial}{\partial \rho_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} \Big]_{B,C} \left(\frac{\partial \rho_{r}}{\partial C}\right)_{P_{r},B} = \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{2}} = \frac{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{P_{r},B}}{\frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{P_{r},B} \left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}\right]} \right]$$

$$(106)$$

Adding equations (103) and (106), and then substituting into equation (102), we have





Similarly,

 $\frac{\left(\frac{\partial^{2} Z_{o}}{\partial B \partial C}\right)_{\rho_{o}}}{1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}} \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}}$ $\left(\frac{\partial^{2} z_{o}}{\partial B \partial C}\right)_{P_{o}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \frac{z_{o} (\partial \rho_{o}' B, C)}{\frac{\partial z_{o}}{\partial \rho_{o}} \frac{\partial^{2} z_{o}}{\partial \rho_{o} \partial C}}{\frac{\partial \rho_{o}}{\partial \rho_{o}} \frac{\partial z_{o}}{\partial \rho_{o}} \frac{\partial \rho_{o}}{\partial \rho_{o}} \frac{$ $+ \frac{\frac{\rho_{o}}{z_{o}^{2}} \left(\frac{\partial z_{o}}{\partial B}\right)_{\rho_{o},C} \left(\frac{\partial z_{o}}{\partial C}\right)_{\rho_{o},B} \left[\left(\frac{\partial z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C} + \rho_{o} \left(\frac{\partial^{2} z_{o}}{\partial \rho_{o}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{o}}{z_{o}} \left(\frac{\partial z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}^{2}\right]}{\left[1 + \frac{\rho_{o}}{z_{o}} \left(\frac{\partial z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}\right]^{3}}$

33

- - C

.....

0 0

and the local of the

.

÷

May 12, 1966

Pc -

Memorandum

To:

L. W. Brandt H. P. Wheeler (2) Project Control Office (2) R. E. Barieau (2) P. C. Tully C. L. Klingman D. E. Emerson R. A. Guereca R. E. Wood L. Stroud J. A. Jacobsen T. C. Briggs HRC Library (3) A. J. Carroll B. J. Dalton (2) B. J. Dalton and Robert E. Barieau

From:

Subject: Addendum to Helium Research Center Internal Report No. 86, "Method for Treating PVT Data from a Burnett Compressibility Apparatus," by Robert E. Barieau and B. J. Dalton

Page 35, equation (111) should be

$$\begin{pmatrix} \partial^{2} Z_{r} \\ \overline{\partial P_{r} \partial B} \rangle_{C} = \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r} \partial B} \right)_{C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} \right]^{2}}$$

$$= \frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial B} \right)_{\rho_{r},c} \left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}} \right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} \right]$$

$$= \frac{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} \right]^{3}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}} \right)_{B,C} \right]^{3}}$$

$$(111)$$

mutbod. C.J

B. J. Dalton

REAdroau

r

Robert E. Barieau

$$\left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial P_{r} \partial B}\right)_{C} = \begin{bmatrix} \frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r} \partial B}\right)_{C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{2}} \\ - \frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{\rho_{r},C} \left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right] \\ \frac{1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{3}}$$
(111)

Equations (75) and (111) are to be substituted into equation (65).

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r},B} = \frac{-rN_{P=0}^{r-1} f_{r}P_{r}}{P_{o}} \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B}$$
(66)

$$\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B} = \frac{\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{\rho_{o},B}}{1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}}\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B,C}}$$
(112)

Substituting equation (112) into equation (66), we get

-

4

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial N}\right)_{P=0} r, P_{r}, B = -\frac{r N_{P=0}^{r-1} f_{r} P_{r} \left(\frac{\partial^{2} o}{\partial C}\right)_{\rho_{o}, B}}{P_{o} \left[1 + \frac{\rho_{o}}{Z_{o}} \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial \rho_{o}}\right)_{B, C}\right]}$$
(113)

.
From equation (67), we have

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial P_{r}}\right)_{r,B} = \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial C \partial P_{r}}\right)_{B} - \frac{N_{P=0}^{r} f_{r}}{P_{o}} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right) \left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B}$$
(67)

Now the first term on the right-hand side of the above equation is obtained in the same manner as $\left(\frac{\partial^2 Z_r}{\partial P_r \partial B}\right)_C$ of equation (111) and is of the form

$$\frac{r}{P_{r}} \Big|_{B} = \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r} \partial C}\right)_{B}}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{2}} - \frac{\frac{\rho_{r}}{P_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial C}\right)_{\rho_{r},B} \left[\frac{1}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C} + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial^{2} Z_{r}}{\partial \rho_{r}^{2}}\right)_{B,C} - \frac{\rho_{r}}{Z_{r}^{2}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]}{\left[1 + \frac{\rho_{r}}{Z_{r}} \left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial \rho_{r}}\right)_{B,C}\right]^{3}}$$
(114)

Equations (112) and (113) are to be substituted into equation (67).

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial N_{P=0} \partial P_{r}}\right)_{r,B,C} = \frac{-rZ_{O} N_{P=0}^{r-1} f}{P_{O}} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}}{1 + \alpha P_{r}}\right)$$
(68)

We will now apply these formulas to the special case when the compressibility, Z, can be expressed as

$$Z_r = 1 + BP_r + CP_r^2$$
 (115)

This expression is linear in the constants B and C. However, the equations previously given apply to any functional form for B, C, ..., linear or non-linear.

We have by differentiating equation (114)

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial B}\right)_{P_{r},C} = P_{r}$$
(116)



$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial C}\right)_{P_{r},B} = P_{r}^{2}$$
(117)

$$\left(\frac{\partial Z_{r}}{\partial P_{r}}\right)_{B,C} = B + 2CP_{r}$$
(118)

$$\left(\frac{\partial^2 z_r}{\partial B^2}\right)_{P_r,C} = 0$$
(119)

$$\left(\frac{\partial^2 z_r}{\partial c^2}\right)_{P_r,B} = 0$$
(120)

$$\left(\frac{\partial^2 z_r}{\partial P_r^2}\right)_{B,C} = 2C$$
(121)

$$\left(\frac{\partial^2 Z_r}{\partial B \partial C}\right)_{P_r} = 0$$
(122)

$$\left(\frac{\partial^2 z_r}{\partial B \partial P_r}\right)_{C} = 1$$
(123)

$$\left(\frac{\partial^2 Z_r}{\partial C \partial P_r}\right)_B = 2P_r$$
(124)

Also,

Ŀ

ś.

$$Z_{o} = 1 + BP_{o} + CP_{o}^{2}$$
 (125)

$$\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial B}\right)_{P_{o},C} = P_{o} \qquad (126)$$

so that

~

(-)

)-----

(

$$\left(\frac{\partial Z_{o}}{\partial C}\right)_{P_{o},B} = P_{o}^{2}$$
(127)

$$\left(\frac{\partial^2 z_o}{\partial B^2}\right)_{P_o,C} = 0$$
(128)

$$\left(\frac{\partial^2 Z_o}{\partial c^2}\right)_{P_o,B} = 0$$
(129)

$$\left(\frac{\partial^2 z_o}{\partial B \partial C}\right)_{P_o} = 0 \tag{130}$$

Substituting equations (116) - (130) into equations (51) - (68), we find

£

.

-

$$\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,C,N_{P=0},P_{r(calc)}} = P_{r(calc)}(1 - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r})$$
(131)

$$\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,B,N_{P=0},P_{r(calc)}} = P_{r(calc)} \left[P_{r(calc)} - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}P_{o}\right] (132)$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,B,C,P_{r(calc)}} = -r(Z_{o}/P_{o})f_{r(calc)}N_{P=0}^{r-1}P_{r(calc)}$$
(133)

$$\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,C,N_{P=0}} = B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1 + \alpha P_{r(calc)})}\right] (134)$$

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial B^2}\right)_{r,C,N_{P=0},P_{r(calc)}} = 0$$
(135)



$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial C^2}\right)_{r,B,N_{P=0},P_{r(calc)}} = 0$$
(136)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial N_{P=0}^{2}}\right)_{r,B,C,P_{r(calc)}} = -r(r-1)\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r-2}P_{r(calc)}$$
(137)

-

-

~

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial P_{r(calc)}^{2} r, B, C, N_{P=0}}\right) = 2C - 2\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r}\left(\frac{\alpha}{1 + \alpha P_{r(calc)}}\right) (138)$$

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial B \partial C}\right)_{r,N_{P=0},P_{r(calc)}} = 0$$
(139)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial B \partial N_{P=0}}\right)_{r,C,P_{r(calc)}} = -rf_{r(calc)}N_{P=0}^{r-1}P_{r(calc)}$$
(140)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial B \partial P}\right)_{r(calc)} = 1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{1 + \alpha P_{r(calc)}}\right]$$
(141)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial N_{P=0}}\right)_{r,B,P_{r(calc)}} = -rP_{or(calc)}N_{P=0}^{r-1}P_{r(calc)}$$
(142)

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial C \partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,N_{P=0}} = 2P_{r(calc)} - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}P_{o}\left[1 + \frac{\alpha^{P}r(calc)}{1 + \alpha^{P}r(calc)}\right] (143)$$

$$\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial N_{P=0} \partial P_{r(calc)}}\right)_{r,B,C} = \frac{-rZ_{o}f_{r(calc)}N_{P=0}^{r-1}}{P_{o}}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{1+\alpha P_{r(calc)}}\right] (144)$$

Substituting equations (131) - (144) into equations (42) - (50), we have



$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}}^{o} = \frac{\frac{P_{r(calc)}\left[1 - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\right]}{B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha^{P}r(calc)}{(1+\alpha^{P}r(calc))}\right]}$$
(145)

$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}}^{o} = \frac{P_{r(calc)}\left[P_{r(calc)} - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}P_{o}\right]}{B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right]$$
(146)

$$\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}}\right)^{o}_{r,P_{r(obs)},B,C} = \frac{-r(Z_{o}/P_{o})f_{r(calc)}N_{P=0}^{r-1}P_{r(calc)}}{B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right]$$
(147)

$$\left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial B^{2}}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{o},C,N_{P=0} = \left[\frac{-2P_{r(calc)}\left(1 - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\right)\left[1 - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r}(calc))}\right)\right]}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{0}}{P_{0}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r}(calc))}\right]^{2}\right]}{\left[E + 2P_{r(calc)}^{2}\left(1 - f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\right)^{2}\left[C - \left(\frac{Z_{0}}{P_{0}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\frac{\alpha}{(1+\alpha P_{r}(calc))}\right]}\right]}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{0}}{P_{0}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r}(calc))}\right]^{2}\right]}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{0}}{P_{0}}\right)f_{r(calc)}N_{P=0}^{r}\left[1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r}(calc))}\right]^{2}\right]}$$

(148)



$$\left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial c^{2}} \right)_{r,P_{r}(obs)}^{o}, B, N_{P=0} = \begin{bmatrix} -2P_{r}(calc) \left[P_{r}(calc) - f_{r}(calc) N_{P=0}^{r} P_{o} \right] \left[2P_{r}(calc) - f_{r}(calc) N_{P=0}^{r} P_{o} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2} \\ \left[B + 2CP_{r}(calc) - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r}(calc) N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2} \\ + 2P_{r}^{2}(calc) \left[P_{r}(calc) - f_{r}(calc) N_{P=0}^{r} P_{o} \right]^{2} \left[C - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r}(calc) N_{P=0}^{r} \frac{\alpha}{(1+\alpha P_{r}(calc))} \right] \\ \left[B + 2CP_{r}(calc) - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r}(calc) N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{3} \end{bmatrix}$$
(149)

3*

$$\left(\frac{\partial^{2}Y_{r}}{\partial N_{p=0}^{2}}\right)^{o}_{r,P_{r}(obs)},B,C = \left[-\frac{2\left[r\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r}(calc)N_{p=0}^{r-1}\right]^{2}P_{r}(calc)N_{p=0}^{r}\left(1+\frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc)})\right)\right]}{\left[B+2CP_{r}(calc)N_{p=0}^{r-1}\right]^{2}P_{r}(calc)\left(1+\frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc)})\right)}{\left[B+2CP_{r}(calc)-\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r}(calc)N_{p=0}^{r-1}\right]^{2}P_{r}(calc)N_{p=0}^{r}\left(1+\frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc)})\right)\right]^{2}}$$
(150)
$$\left(\frac{2\left[r\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r}(calc)N_{p=0}^{r-1}\right]^{2}P_{r}(calc)N_{p=0}^{r}\left(1+\frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc)})\right)\right]^{2}}{\left[B+2CP_{r}(calc)N_{p=0}^{r-1}P_{r}(calc)\right]^{2}\left[C-\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right)f_{r}(calc)N_{p=0}^{r}\left(1+\frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1+\alpha P_{r}(calc)})\right)\right]^{3}}\right]$$



-

$$\left(\frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial B \partial C} \right)_{r,P_{r}(obs)}^{o} N_{P=0}^{e} = \frac{-P_{r(calc)} \left(P_{r(calc)} - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \right) \left[1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2}}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2}} \right] }$$

$$\left[\frac{-P_{r(calc)} \left(1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \right) \left[2P_{r(calc)} - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]}{\left[B + 2CP_{r}(calc) - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2}} \right] } \right]$$

$$\left[\frac{P_{r(calc)} \left(1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \right) \left[2P_{r(calc)} - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2}}{\left[B + 2CP_{r}(calc) - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{2}} \right]$$

$$\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{3} \right]$$

$$\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}} \right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r}(calc)}{(1 + \alpha P_{r}(calc))} \right) \right]^{3} \right]$$



$$\frac{-r f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} P_{r(calc)}}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]} + \frac{r\left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} P_{r(calc)} \left[1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}} + \frac{P_{r(calc)} \left(1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r}\right) r \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}} + \frac{2P_{r(calc)}^{2} \left(1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r}\right) r \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) r \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}} + \frac{2P_{r(calc)}^{2} \left(1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r}\right) r \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}}{\left[B + 2CP_{r(calc)} - \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{3}} + \frac{r (r_{calc}) \left(1 - f_{r(calc)} N_{P=0}^{r}\right) r \left(\frac{Z_{o}}{P_{o}}\right) f_{r(calc)} N_{P=0}^{r-1} \left(1 + \frac{\alpha P_{r(calc)}}{(1+\alpha P_{r(calc)})}\right)\right]^{2}}$$

$$\left(\frac{\partial^2 Y_r}{\partial B \partial N_{P=0}}\right)^{o}_{r,P_{r(obs)},C}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} Y_{r}}{\partial c \partial N_{p=0}} \rangle_{r,P_{r}(calc)}^{o} | \frac{1}{P_{r}(calc)} - \frac{1}{P_{o}} \frac{\partial^{2} P_{r}(calc)}{P_{r}(calc)} | \frac{\partial^{2} P_{r}(calc)}{P_{o}} |$$

*

The quantities given by equations (145) - (153) are to be substituted in equations (33) - (41), and then summed over all the observed pressures from P_1 to $P_r = P_n$. The initial pressure, P_o , is omitted from this sum because equation (18) is exactly satisfied for $P = P_o$. There is, therefore, no residual for the initial pressure, P_o .

The solutions to equations (29), (30), and (31) are:

$$D_{O} \Delta B = D_{1} m_{1} + D_{2} m_{2} + D_{3} m_{3}$$
(154)

$$D_{O}\Delta C = D_{4}m_{1} + D_{5}m_{2} + D_{6}m_{3}$$
(155)

$$D_{o} \Delta N_{P=0} = D_{7}m_{1} + D_{8}m_{2} + D_{9}m_{3}$$
 (156)

where

ñ.,

$$D_1 = b_2 c_3 - b_3 c_2 \tag{157}$$

$$D_4 = D_2 = b_3 c_1 - b_1 c_3$$
 (158)

$$D_7 = D_3 = b_1 c_2 - b_2 c_1$$
 (159)

$$D_5 = a_1 c_3 - a_3 c_1 \tag{160}$$

$$D_8 = D_6 = a_2 c_1 - a_1 c_2 \tag{161}$$

$$D_{9} = a_{1}b_{2} - a_{2}b_{1} \tag{162}$$

$$D_{o} = D_{1}a_{1} + D_{2}a_{2} + D_{3}a_{3}$$
(163)

and the second second

10. IN 11.

and the second sec

If the assumed values for the undetermined constants were not too good, then it would be necessary to repeat the calculations using the new B, C, and $N_{P=0}$ as the start of a new iteration. We continue this iterative technique, <u>provided</u> the problem is continuing to converge, until $m_1 = m_2 = m_3 = 0$ to within some predetermined small quantity, the final B, C, and $N_{P=0}$ being the least squares solution for these constants. For a more detailed discussion of methods to use that will lead to convergence of the iteration when the problem starts diverging, we refer the reader to a previous report (<u>1</u>) on this subject.

EXPRESSIONS FOR CALCULATING VARIANCES AND COVARIANCES OF THE CONSTANTS EVALUATED

Once we have determined the best values for B, C, $N_{P=0}$, we proceed to calculate all variances and covariances of these constants. We do this from the definition of these quantities and the law for the propagation of errors (2, 4). This law states that if we have a function or quantity, say Q, that is a function of the independently-observed quantities y_1, y_2, \dots , then the variance of the quantity Q is given as

$$s_{Q}^{2} = \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial Q}{\partial y_{r(obs)}}\right)^{2} s_{y_{r(obs)}}^{2}$$
(164)

where S_Q^2 is the variance of Q and $S_{y_r(obs)}^2$ is the variance of $y_{r(obs)}$, Extracting the square root of the variance, we obtain a value on the same scale as the function Q. This value, S_Q , is called the standard error or the standard deviation of Q.

The value of the constant B, which we have evaluated, is a function of all of the observed r's and of all of the observed P_r 's. Since we have assumed the errors of the r's to be zero, then the expression for the variance of B is of the form

$$s_{B}^{2} = \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial B}{\partial P_{r(obs)}}\right)^{2} s_{P_{r(obs)}}^{2}$$
(165)

and there will be an equation similar to equation (165) for determining the variance of C and the variance of $N_{P=0}$.

In order to evaluate equation (165), we must evaluate $(\partial B/\partial P_{r(obs)})$ for each $P_{r(obs)}$, multiply this quantity by $S_{P_{r(obs)}}$, square the product, and then sum the product over all of the observed P_{r} 's.

In a previous report (1), we have outlined the details for evaluating the variances and covariances of the constants evaluated. For our particular problem, these variances and covariances are determined from the following relations:

$$S_{B}^{2} = \frac{L^{2}}{p_{0}^{2}} \left[\begin{array}{c} p_{1}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , 0, N_{P=0} + \frac{u_{2}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, C \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, C \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , C, N_{P=0} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , C, N_{P=0} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, C \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , C, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, C \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, C \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)}^{2} , B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)} \right)_{r,P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)} \right)_{r,P_{T}(obs)} B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)} \right)_{r,P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)} B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^{n} u_{P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P}} \right)_{r,P_{T}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}} \right)_{r,P_{T}(obs)} B, N_{P=0} \\ + \frac{u_{3}^{2} \sum_{r=1}^$$

S



 $D_{7}^{2} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)^{2}_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}} + D_{8}^{2} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)^{2}_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}} + D_{9}^{2} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial N}\right)^{2}_{r,P_{r(obs)},B,C}$ $s_{N_{P=0}}^{2} = \frac{L^{2}}{D_{o}^{2}} + 2D_{7}D_{8}\sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}}\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial B}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}}\left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial C}\right)_{r,P_{r(obs)},B,N_{P=0}}$ (168) $+ 2D_7 D_9 \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r(obs)}} \left(\frac{\partial Y_r}{\partial B}\right)_{r,P_{r(obs)},C,N_{P=0}} \left(\frac{\partial Y_r}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_{r(obs)},B,C}$ + $2D_8D_9\sum_{r=1}^{n} W_{P_r(obs)}\left(\frac{\partial Y_r}{\partial C}\right)_{r,P_r(obs)}, B, N_{P=0}\left(\frac{\partial Y_r}{\partial N_{P=0}}\right)_{r,P_r(obs)}, B, C$



$$S_{B}^{2} = \frac{1}{p_{0}^{2}} \sum_{r=1}^{n} w_{P_{r}(obs)} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial s}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{2} \left(\frac{\partial Y_{r}}{\partial s}\right)_{r,P_{r}(obs)}^{2}$$

.

$$S_{CN_{P=0}}^{2} = \frac{L^{2}}{p_{o}^{2}} + (b_{4}b_{8} + b_{5}b_{7}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial B})^{2}_{r,P_{r}(obs)}, C, N_{P=0} + b_{5}b_{8} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})^{2}_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} + b_{6}b_{9} \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})^{2}_{r,P_{r}(obs)}, B, C$$

$$S_{CN_{P=0}}^{2} = \frac{L^{2}}{p_{o}^{2}} + (b_{4}b_{8} + b_{5}b_{7}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial B})_{r,P_{r}(obs)}, C, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} + (b_{4}b_{9} + b_{6}b_{7}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial B})_{r,P_{r}(obs)}, C, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{7}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, C, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{9} + b_{6}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, N_{P=0} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial N_{P=0}})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, C + (b_{5}b_{8}) \sum_{r=1}^{n} W_{P_{r}(obs)} (\frac{\partial Y_{r}}{\partial C})_{r,P_{r}(obs)}, B, C +$$



The remaining questions to be answered are: 1. what is the variance of the calculated P's and any other calculated P that reduces F to zero?; and 2. what is the variance of the compressibility factor?

EVALUATION OF THE VARIANCE OF THE Pr(calc)'S AND ANY OTHER CALCULATED P THAT REDUCES F TO ZERO

The variance of a calculated P_r which satisfies equation (19) for a given observed r value is obtained in the following way: $P_r(calc)$ is a function of the observed r's and, through the constants evaluated, is a function of all of the $P_r(obs)$'s. We see from equation (164) that the expression for determining the variance of $P_r(calc)$ involves evaluation of the quantity

$$s_{P_{r(calc)}}^{2} = \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial P_{r(calc)}}{\partial P_{r(obs)}}\right)^{2} s_{P_{r(obs)}}^{2}$$
(172)

In order to evaluate the variance of the calculated P_r 's, we need an expression for $[\partial P_r(calc)/\partial P_r(obs)]$. This quantity can be determined from equation (19)

$$F = F(r, P_{r(calc)}, N_{P=0}, B, C) \equiv 0$$
 (19)

We differentiate equation (19) with regard to $P_{r(obs)}$, holding r constant. This gives us
$$\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}}\right)_{B,C,r,N_{P=0}} \left(\frac{\partial P_{r(calc)}}{\partial P_{r(obs)}}\right) + \left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{C,r,N_{P=0},P_{r(calc)}} \left(\frac{\partial B}{\partial P_{r(obs)}}\right)$$

$$+ \left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{B,r,N_{P=0},P_{r(calc)}} \left(\frac{\partial C}{\partial P_{r(obs)}}\right) + \left(\frac{\partial F}{\partial N_{P=0}}\right)_{B,C,r,P_{r(calc)}} \left(\frac{\partial N_{P=0}}{\partial P_{r(obs)}}\right)$$

$$= 0 \quad (173)$$

Solving equation (173) for $[\partial P_{r(calc)}/\partial P_{r(obs)}]$, we get

.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial B} \\ C,r,N_{P=0},P_{r(calc)} \\ \hline \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial P_{r(obs)}} \end{pmatrix} \\ \hline \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ \hline \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ + \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial C} \\ B,r,N_{P=0},P_{r(calc)} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ \hline \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ + \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial N_{P=0}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ \hline \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ + \frac{\begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial N_{P=0}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ \hline \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial P_{r(calc)}} \end{pmatrix}_{B,C,r,N_{P=0}} \\ \end{pmatrix}$$
 (174)

Multiplying equation (174) by $S_{P_r(obs)}$, squaring the product, and r(obs) then summing over all of the observed P_r 's, we get



$$s_{P_{r}(calc)}^{2} = \frac{s_{B}^{2} \left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,C,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2} + s_{C}^{2} \left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,B,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{s_{N_{p=0}}^{2} \left(\frac{\partial F}{\partial N_{p=0}}\right)_{r,B,C,P_{r}(calc)}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{s_{S_{BC}}^{2} \left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,C,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{2s_{BC}^{2} \left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,C,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{2s_{BN_{p=0}}^{2} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,C,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}\right]_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{2s_{BN_{p=0}}^{2} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_{r,C,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}\right]_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{2s_{CN_{p=0}}^{2} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,B,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}\right]_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{r}(calc)}\right)_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{2s_{CN_{p=0}}^{2} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,B,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}\right]_{r,B,C,N_{p=0}}^{2}} + \frac{2s_{CN_{p=0}}^{2} \left[\left(\frac{\partial F}{\partial C}\right)_{r,B,N_{p=0},P_{r}(calc)}^{2}\right]_{r,B,C$$

.



1.1.1.

from which we can evaluate the values of $s_{P_r(calc)}^2$ corresponding to the observed r's.

Now we ask ourselves the question: how do we calculate the variance of any other calculated P that exactly satisfies equation (19)? In order to answer this question, we must find a value of r, say $r_{\rm P}$, and we must find a value of f, evaluated at $P_{\rm (calc)}$, which exactly satisfy the equation

$$Z_{P_{(calc)}} \equiv (Z_{o}/P_{o}) f_{(calc)} N_{P=0}^{r_{P}} P_{(calc)}$$
(176)

where

$$Z_{P_{(calc)}} = 1 + BP_{(calc)} + CP_{(calc)}^{2}$$
 (177)

We have previously evaluated B, C, and $N_{P=0}$. We now proceed to evaluate f, which will be needed in equation (176). We do this as follows: from equation (15), f_(calc) is of the form

$$f_{(calc)} = \frac{(1 + \alpha P_{1(calc)})(1 + \alpha P_{2(calc)}) \dots (1 + \alpha P_{r(calc)})}{(1 + \beta P_{0})(1 + \beta P_{1(calc)}) \dots (1 + \beta P_{r-1(calc)})}$$
(178)

Our experimental determination of α and β , which appear in equation (15), indicates that α and β differ by less than 0.1 percent. In this section only, we therefore take $\alpha = \beta$. Then equation (178) can be written as

$$f_{(calc)} = \frac{(1 + \alpha P_{r(calc)})}{(1 + \alpha P_{o})}$$
(179)

t

Experimentally, equations (176) and (179) apply only to integral values of r_p . However, in calculating the variance of $Z_{P(calc)}$ and of $P_{(calc)}$, we assume that equations (176) and (179) will apply to <u>any</u> value of the expansion number, r_p .

We are interested in calculating Z at even values of the pressure. We therefore calculate expansion numbers that will satisfy equation (176) for these even values of the pressure.

Now r_{P} , the expansion number corresponding to $P_{(calc)}$ and f evaluated at $P_{(calc)}$, can be determined from the equation

$$r_{\rm P} = \frac{\left[\frac{\ln Z_{\rm P(calc)} - \ln(Z_{\rm O}/P_{\rm O}) - \ln P_{\rm (calc)} - \ln f_{\rm (calc)}}{\ln N_{\rm P=0}} \right]$$
(180)

Equation (180) results from our taking natural logarithms of equation (176) and solving for $r_{\rm P}$. Now that we have determined values of r and f for $P_{\rm (calc)}$, we can proceed to evaluate $S^2_{\rm P_{\rm (calc)}}$, the variance of a calculated P that exactly satisfies equation (176).

To evaluate the variance of $P_{(calc)}$, we employ equation (175) where the terms involving derivatives of F are to be evaluated for $P_{(calc)}$, r_{p} , and $f_{(calc)}$. The expression for these derivatives are given by equations (51), (52), (53), and (56).

EXPRESSION FOR CALCULATING THE VARIANCE OF THE COMPRESSIBILITY FACTOR

The variance of
$$Z_{P(calc)}$$
, where $Z_{P(calc)}$ is given by
 $Z_{P(calc)} = 1 + BP_{(calc)} + CP_{(calc)}^{2}$
(177)

.

and P_(calc) is any calculated P which exactly satisfies equation (176), involves evaluation of the quantity

$$s_{Z_{P(calc)}}^{2} = \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial Z_{P(calc)}}{\partial P_{r(obs)}}\right)^{2} s_{P_{r(obs)}}^{2}$$
(181)

where $S_{Z_{P(calc)}}^{2}$ is the variance of $Z_{P(calc)}$ and $S_{P_{r(obs)}}^{2}$ is the variance of $P_{r(obs)}$.

To evaluate equation (181), we evaluate $\begin{bmatrix} \partial Z & /\partial P_r(obs) \end{bmatrix}^T$ for each $P_r(obs)$, multiply this quantity by S_P , square the r(obs)product, and then sum the product over all of the observed $P_r's$. When we do this, we get

$$S_{Z_{P}(calc)}^{2} = \begin{cases} B^{2} S_{P}^{2} + 4C^{2}P_{(calc)}^{2} S_{P}^{2} + P_{(calc)}^{2} S_{B}^{2} \\ + P_{(calc)}^{4} S_{C}^{2} + 4BCP_{(calc)} S_{P}^{2} + 2BP_{(calc)} S_{B,P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_{C}^{2} + 4BCP_{(calc)} S_{P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_{C,P}^{2} \\ + 4CP_{(calc)}^{2} S_{C,P}^{2} \\ + 4CP_{(calc)}^{3} S_{C,P}^{2} \\ + 4CP_{(calc)}^{3} S_{C,P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_{C,P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_{C,P}^{2} \\ + 4CP_{(calc)}^{3} S_{C,P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_{B,P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_{C,P}^{2} \\ + 4CP_{(calc)}^{3} S_{C,P}^{2} \\ + 2BP_{(calc)}^{2} S_$$

The covariance terms $S_{B,P_{(calc)}}^2$ and $S_{C,P_{(calc)}}^2$, which appear in equation (182), are defined as

$$s_{B,P(calc)}^{2} = \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial P(calc)}{\partial P_{r(obs)}} \right) \left(\frac{\partial B}{\partial P_{r(obs)}} \right) s_{P_{r(obs)}}^{2}$$
(183)

$$s_{C,P_{(calc)}}^{2} = \sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial^{P}(calc)}{\partial^{P}_{r(obs)}} \right) \left(\frac{\partial C}{\partial^{P}_{r(obs)}} \right) s_{P_{r(obs)}}^{2}$$
(184)

and these quantities are to be evaluated from equations (183) and (184), which we proceed to do.

 $[\partial P_{(calc)}/\partial P_{r(obs)}]$ can be determined from equation (174) where the terms involving derivatives of F are to be evaluated for $P_{(calc)}$, r_{P} , and $f_{(calc)}$. Multiplying equation (174) by $(\partial B/\partial P_{r(obs)})S^{2}_{P_{r(obs)}}$ and summing the product over all of the ob $r_{(obs)}$ served P_{r} 's, we get

$$\sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial P_{(calc)}}{\partial P_{r(obs)}}\right) \left(\frac{\partial B}{\partial P_{r(obs)}}\right) s_{P_{r(obs)}}^{2} = s_{B,P_{(calc)}}^{2} = -\frac{s_{B,P_{(calc)}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{(calc)}}\right)_{r_{p},B,C,N_{p=0}}} = -\frac{s_{B,P_{(calc)}}^{2}}{\left(\frac{\partial$$



Multiplying equation (174) by $(\partial C/\partial P_{r(obs)}) S_{P_{r(obs)}}^{2}$ and then summing the product over all of the observed P_{r} 's, we get

3

$$\sum_{r=1}^{n} \left(\frac{\partial P_{(calc)}}{\partial P_{r(obs)}}\right) \left(\frac{\partial C}{\partial P_{r(obs)}}\right) S_{P_{r(obs)}}^{2} = S_{C,P_{(calc)}}^{2} = -\frac{S_{C,P_{(calc)}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{(calc)}}\right)_{r_{p},B,C,N_{p=0}}} + \frac{S_{C,P_{(calc)}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{(calc)}}\right)_{r_{p},B,C,N_{p=0}}}} + \frac{S_{C,P_{(calc)}}^{2}}{\left(\frac{\partial F}{\partial P_{(calc$$

Therefore, the use of equations (185) and (186) in equation (182) will enable the variance of a calculated Z_p , $S_{Z_p}^2$, to be determined.

In a following paper, the Helium Research Center will apply the equations developed in this report to some PVT data on helium at 0° C obtained by the Burnett method.

60



REFERENCES

¢

- Barieau, Robert E., and B. J. Dalton. Non-Linear Regression and the Principle of Least Squares. The Method of Evaluating the Constants and the Calculation of Variances and Covariances. Bureau of Mines Bulletin (In process).
- Birge, Raymond T. The Calculation of Errors by the Method of Least Squares. Phys. Rev., v. 40, April 15, 1932, pp. 207-227.
- Burnett, E. S. Compressibility Determinations Without Volume Measurements. J. Appl. Mech., v. 3A, December 1936, pp. 136-140.
- Merriman, Mansfield. A Textbook on the Method of Least Squares. John Wiley and Sons, Inc., New York, N. Y., 8th ed., 1911, pp. 75-79.

λ.

- -