

書

世醫得效方卷第三

大方脉雜醫科

諸氣

調中快氣治心腹刺痛利三焦順臟腑

香附子炒去毛拾兩

烏藥去心伍兩

粉草炒黃兩

縮砂去殼貳兩

右為末每服壹錢紫蘇葉三皮鹽少許沸湯調下不拘時候大便氣秘橘皮湯下亦名寬氣湯

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿

喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治

買痺留飲噫醋聞酸腸下支結常覺妨悶及中寒效逆脾
濕洞泄兩脇虛鳴脐下撮痛皆能治之患脚氣入毒氣上
衝心腹堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開胃消痰散壅
思食

香附子炒去毛

沉香肆錢陸分

縮砂去殼

粉草炒

右為末每服壹錢入盞少許沸湯點服凌旦霧露乾心
服食去邪惡氣使無瘴疫

木香 不見火 檳榔 枳殼炒 杏仁去皮尖

青皮去白 半夏炒 皂角去白 郁李仁去皮

木香不見火 檳榔 枳殼炒 杏仁去皮尖

皂角去白 郁李仁去皮

右為末別以皂角肆兩用漿水壹搥搥碎入
盞少許和團如梧桐子大每服伍拾圓食後生薑湯下
歸氣不升降胸膈痞滿心腹刺痛不進飲食

沉香 木香 丁香並不見火 白薑炮

川練子肉炒 肉桂去皮不見火 陳皮去白 當歸

耳草炒 附子壹圓拾貳錢 縮砂

蘇合炒 葫蘆巴炒 白木 舶上茴香

豆蔻各壹兩

右為散每服叁錢水壹盞紫蘇參葉木瓜肆片鹽少許

煎服

調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治

諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食有背走注
刺瀉及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤
注又治暴怒天過怔忡驚積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹
急不寧

陳皮去白 青皮去白 紫蘇去皮梗 甘草鹽

厚朴去粗皮 香附炒去毛 木通去節 大腹皮

丁香 檳榔 肉桂去粗皮 藿香葉

蓬莪木煨切 草果仁 木香不見火 麥門冬去心

人參去芦 白木去芦 乾木瓜 石菖蒲刮去

赤茯苓去黑皮 川白芷各兩 半夏壹兩湯洗

右剉散每服薑水壹盞半生薑參片紅棗貳枚煎

七分去渣熱服如傷寒頭痛繞覺得疾入連根葱白三
寸煎服并降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳米煎婦
人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

氣湯 治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾謂

酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽閼隔遂使氣不升降
上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飢食無
味下弱則腰脚無力大便秘澁裏急後重臍腹冷疼若治
以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生
瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所主藥治
之氣壅耳龍耳熱咽疼亦効

五加皮半兩酒浸半日炒黃 枳殼壹兩湯浸

柴胡

去毛壹兩

骨碎補

剉炒去毛壹兩

地骨皮

剉炒壹兩

桔梗

半兩

栝白皮

剉炒壹兩

訶子

剉炒壹兩

甘草

壹兩

半夏

半兩

訶子

剉炒壹兩

草果

去皮壹兩

淨洗炒黃

訶子

剉炒壹兩

右剉散和勻以椀盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷

收之每服貳錢紫蘇參葉生薑參片水壹盞同煎七分

食後通口服痰欬加半夏麴心脾虛每料加人參茯苓

壹兩上膈熱加北黃芩伍錢下部大段虛加少許炮附

子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸壹兩煎

胸膈噎塞喘促短氣乾噫煩滿欬嗽痰涎口中無味嗜

胸膈噎塞喘促短氣乾噫煩滿欬嗽痰涎口中無味嗜

痼食宿寒留飲停積不消初早支結常覺妨悶專治脚氣

上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

蘇子

淨炒

半夏

洗柴次各貳兩半

甘草

炙

前胡

去芦

厚朴

去麩皮薑汁洗各壹兩

陳皮

去白

川當歸

去芦壹兩半

肉桂

去麩皮壹兩不見火

右剉散每服貳錢至叁錢水壹大盞生薑參片煎至七

分去渣溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食體虛

痰喘加人參壹錢北五味子柒粒鹽梅壹箇杏仁柒粒

去皮尖紅棗貳枚煎虛煩加知母人參每料各壹兩

治男子婦人一切氣不和或因憂烈思慮或因

酒色過傷或臨食憂煩或事不遂意以此不足留滯不散

停於胸膈不能流暢致使心胃痞悶脇肋脹滿噎塞不通
噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦
舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘竝皆療之常服升
降陰陽調順三焦消化滯氣進美飲食此方獨清而疎快
常服大效

紫蘇用鹽兩羌活

半夏湯洗七次

肉桂去皮

青皮去白

陳皮去白

大腹皮

栝白皮炒

木通去皮節芍藥

甘草炙

赤茯苓各壹兩

右劉散每服參錢水壹觔生薑參片棗貳枚燈心拾莖
取七分去渣溫服氣秘每服加枳殼去穰栗殼羅蔔子
皂角子各半錢咳嗽不利加人參壹錢五味子七粒

梗壹錢氣滯腰疼加木瓜貳片枳殼壹錢半水氣面目
浮腫加車前子麥門冬去心甜葶藶子木瓜澤瀉猪苓
去皮每料各壹兩又名小流氣飲

黃
推氣湯治三焦痞塞氣不升降胸腹滿悶大便泄瀉小便赤

檳榔

枳實

陳皮

黃芩

大黃

黑牽牛炒各等分

右為末生薑自然汁煮糊圓如梧子大每服三四十圓
淡薑湯下

神保圓治諸氣刺痛流注骨節及脇下諸藥不能治

木香

胡椒各壹錢全蝎柴枚

巴豆去心

石爲末湯釋蒸餅圓麻子大朱砂爲衣每服伍粒心膈
痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑醋湯
下肺氣甚者白礬蛤粉各叁分黃升壹分同研爲末煎
桑白皮糯米飲調參錢下小喘來白皮糯米飲下腎氣
脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調攪柳末壹錢下氣
噎不香湯下宿食不消茶酒漿飲隨意下諸氣爲膀胱
氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項筋痛諸醫
皆以爲風治之數月不愈乃流入背脊久之又注右脇
下李痛甚苦乃合治之一服而愈後嘗再發又服病除
又方用胡椒壹兩 蝎尾半兩爲末麩糊圓如粟米大每
服五七圓至貳拾圓陳米飲下名塌氣圓又壹方於塌

氣圓中加木香壹味和順臟氣消腹脇堅脹小便不利
并治息積名胡椒圓

消氣散 治氣結不散心胃痞痛逆氣上攻分氣逐風
功不可述

枳殼去穢

木通剉炒

青皮去白

陳皮去白

桑白皮炒

蘿蔔子微炒

白牽牛炒

莪茂煨

茴香炒

荆三稜煨各等分

右爲末生薑汁打麩糊爲圓如梧子大每服貳拾圓煎
橘皮湯下不拘時候

消積散 順氣寬中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅
脹脇下堅硬胃中痞塞喘滿短氣不通嘔吐痰逆飲食不

下大便不調或泄或秘

杏仁湯浸去皮尖

羅蔔子微炒

京三稜生細判另持羅為末以酒

麥蘖炒

礞石壹兩水飛

青皮去白

乾漆炒

右件為末以三稜膏勻搜和圓如梧桐子大每服拾伍

圓至貳拾圓温米飲食后服加阿魏五錢重名句魏圓

三和散治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋臃脹風氣

雍滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難

雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣

上攻胃腹滿悶大便不通

羌活去芦

紫蘇壹兩

宣木瓜切焙沉香壹兩

白朮叁分

檳榔

木香各叁分苦節叁兩

甘草炒叁分陳皮去白

大腹皮叁兩

右判散每服貳錢水壹盞煎至六分分滓温服不計時

候四磨湯亦可兼服方見秘結類

五香連翹湯治壯盛人胃腸痞塞氣不升降百藥不效服

之奏功必矣方見倉庫雜證類

神效氣湯治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣

怒氣山嵐瘴氣積聚堅牽如孟心腹刺痛不能飲食時去

時來發則欲死

川薑黃

甘草

香附子

右為末每服壹大錢入鹽少許百沸湯點空心服立效

賺氣散 治心胃痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通及傷寒兩脇刺痛攻心

荆三稜

蓬莪茂

煨熟各伍兩

白木 叁兩

木香 半兩

枳殼

去白 炒 各兩

右剉散每服貳錢水壹盞生薑三片煎至六分食前溫服用砂糖少許壓下

參附正氣散 治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺痛

嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脈沉耳乾焦黑面黃躄瘦怠惰多困小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病疴瘵倦弱姪娠失調理產後虛損

並宜服之大能補虛正氣調理氣血固腎消痰

人參

木香

白豆蔻 各兩

乾薑

甘草

藿香

茯苓

黃耆

當歸

去尾

丁香

桂心

陳皮

白芷

縮砂仁

青皮

各半兩 去白

白木

附子炮

半夏麩

各柒分

右剉散每服半錢生薑五片棗二箇煎服 此方屢有奇效

辟瘟散 治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之立効

大黃 壹兩 各生用

右為末入生麝香少許煉蜜為圓如梧子大每服叁拾圓空心冷酒下或溫冷湯下日叁服

灸法凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝穴在
足大指本節後貳寸陷中不限壯數從痛至不痛不痛
至痛止心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣心痛吐下食不
消灸太倉穴在心下肆寸胃脘下壹寸
臍下撓痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴
在臍下叁寸及灸膏肓二穴
短氣不語灸大推隨年壯又灸肺腧百壯臍孔中貳七
壯之氣灸華佗椎下隨年壯

○中氣

蘇合香散治氣中雖不見方書所載然暴喜傷陽暴怒傷
陰惡寒不意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎壅子關緊

急若作中風用藥非惟不相當

昔有一婦人因

憂戚中忽然氣厥牙噤涎潮

中風用藥以大通利

藥下之大泄數行一夕而卒可不戒之如遇此證急化蘇
合香圓四五粒灌之便醒然後隨其調理無不痊愈

蘇合香油壹兩入安

薰陸香壹兩研

青木香制

白木去声

丁香

白檀香

朱砂研水飛

沉香

香附子炒去毛

烏犀鎊屑

犀角

安息香別為木用无灰

麝香研

訶黎勒煨

龍腦研

已上文口壹兩

右為末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋
圓如梧子大取井花水溫冷任意下四圓老人小兒可

服壹圓温酒化服亦得並空心服之用蠟帛裹壹圓如
彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近

獨香湯

治中氣閉目不語四肢不收昏沉等證

南木香 不以多少

石為末冬瓜子煎湯調下痰盛加南星為散生姜煎

宋附湯

治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙關緊急痰涎

壅盛如中風狀者

白木

津兩 去片

綿附子

炮去皮臍薄切片 壹兩半仲

甘草

貳兩

右劉散每服叁錢水壹盞薑拾片煎取八分去滓後調
蘇合香圓貳粒併進貳服或氣短頭暈手足厥逆未退
者可進養正丹叁拾粒至百粒奇効不拘時候

中氣湯

治中氣脈弱大段虛怯等證

川烏

生去皮臍

附子

生去皮臍 各半仲

乾薑

貳錢

青皮

去穢 壹兩

益智仁

去殼 壹兩

右劉散每服叁錢薑七片紅棗壹枚煎服或入少木香
不拘時候

中風藥

中風亦當間服此藥中氣者尤得其宜

白木

此

白茯苓

去皮 壹兩

白芷

陳皮

去白

天台烏藥

人參

去芦 各壹兩

甘草

半兩

右劉散每服叁錢水壹大盞煎至七分温服不拘時候

諸症

風寒證

烏頭桂枝湯

治風寒痲腹中痛逆冷手足不仁身

體疼痛灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟拘急不得轉側發作叫呼陰縮悉主之

大烏頭

壹枚實者去皮尖蜜壹大盞煎減半出湯切洗

肉桂 去麝皮

芍藥

各叁錢叁字

甘草

貳分半

右劉散每服滓錢水壹盞半生薑伍片大棗叁箇入煎烏頭蜜半合同煎至七分盞去渣食前服一法用附子壹个不使烏頭為蜜附湯

寒盞

治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺

脾腎氣攻急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石自汗出

山梔子

肆兩又筒燒半燭

附子

壹枚

右劉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎至七分入塩一捻

温服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢食塩少許煎服

生料木香白氣散

治寒疝作痛和氣

丁香

檀香

木香

各壹兩

甘草

肆兩

縮砂

去殼

白豆蔻仁

沉香

各壹兩

藿香

去土肆兩

右劉散每服貳錢水壹盞半生薑叁片紫蘇葉五皮食塩少許煎熱服不拘時候或為末炒茴香塩酒調亦可
七情聚香飲子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛引腰脇連皆不可僂仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香

並不見火

藿香葉

去土

玄胡索

炒去

片子薑黃

洗

川烏炮夫 桔梗去毒 桂心不見火 甘草炙
右劉散每服肆錢水壹觥半生薑七片紅棗壹枚煎至七分去渣溫服不拘時候

熱瀉 **小腸氣飲** 治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗 木通去皮節 梔子去殼 黃芩
連翹 甘草 枳殼去穢 川練子去核各等分
右劉散每服伍錢水壹觥半燈心貳十莖車前草五莖同煎空心溫服

正散 治腎氣實熱脈洪數小腹外腎肛門俱熱大小便不利作癩每服肆錢燈心貳十至枳殼半片去穢煎食前溫服熱盛加淡竹葉貳拾皮方見後錄結類

虛冷 治脾虛膀胱小腸氣作痛不可忍每服五錢生薑三片鹽炒茱萸伍粒茴香一撮葱白伍寸煎空心熱服方見前傷寒陰證類

蠟六散 治男子婦人脾胃虛弱氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇嘔吐小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治瘳

蒼朮淋浸一宿切 甘草炙 延胡索薑肉 官桂去皮
乾薑炮 縮砂去殼 丁皮 檳榔各二兩
蓬朮煨 三稜煨 白茯苓去皮 青皮去白

右劉散每服伍錢水壹盞半連根葱白壹莖煎至七分空心熱服

通 治風疝陰腎腫大刺芥穗不以多少新九上

煨為末每服貳錢酒調下效

木香 治諸疝作痛大效

沉香

巴豆肉 金者各壹兩

青皮 不去皮貳兩 銅青 半兩

硃砂 式各半兩製加前研

右以二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色為度去巴為末入青砂二味研勻蒸餅和圓如梧子大每服七圓至十圓鹽湯吞下空心日進二三服

奪命散 治小腸疝氣

玄胡索不以多少鹽炒過入全蝎半錢為末每服乙錢溫酒調下立效

五寶散 治撮聚疝氣連根為心白一寸燈心十莖鹽炒茴香

一撮川練子叁箇去核煎湯調下大効傷暑濕作痛亦效就吞青木香圓亦可 方見傷暑疝

青木香圓 治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸中

水声嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛 炒末三兩 補骨脂 炒香 葶澄茄

檳榔 炒末三兩 青木香 一兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為圓如梧子大每服五十圓溫熟水吞下

又法 用貳伯粒斑貓七箇去頭足翅為末同於文武火上

慢炒令圓子微香以磁碟蓋銚上頓在冷處少頃去斑貓未取圓子每服伍拾圓茴香酒下

三葉圓治小腸氣痛外腎腫墜

山茱萸去核 吳茱萸去梗 石茱萸去梗 各二兩

川練子乙兩用 赤色去班 破故紙壹兩七

青皮去白 青鹽各三兩 黑牽牛巨刃 茴香炒二兩

右為末醋煮麪糊圓如梧子大每服伍拾圓用桃仁十五箇炒酒送下或茴香酒亦可

失笑散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

川五靈脂 蒲黃隔紙

右劉散每服貳錢酒半盞水半盞煎至七分食前服血痛臨熟入真米醋少許未效加玄胡索各等分

治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜

陰腫小腹有形如卵土下走痛不可忍者

葫蘆巴炒八 茴香六兩 吳茱萸湯洗七次

川練子九兩 大巴戟去心炒 川烏炮去皮尖

右為末酒煮麪糊圓如梧子大每服十五圓空心溫酒送下小兒伍圓山香湯吞下又方加牽牛

治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄

玄胡索炮去 附子炮去皮臍 木香不見火

右劉散每服四錢水壹盞薑七片煎七分不拘時溫服

立効散治疝氣

川芎 川練子 青皮去白 茴香船上者

桃仁 黑牽牛炒各壹兩

右劉散每服貳錢無灰酒壹盞煎至八分溫服

金鈴子 治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

金鈴子肉 五兩

茴香 炒

馬蘭花 炒

海蛤

破故紙

鬼絲子

海帶

木香

丁香 各壹兩

右為末麪糊圓如梧子大每服叁拾圓溫酒益湯任下

去金圓 治疝氣

杜茴香壹斤以老生薑貳斤取自然汁浸茴香一夜約

薑汁尺入茴香內以好鹽益貳兩同炒赤取出焙燥碾

羅為末無灰酒煮糊圓如梧子大每日空心食前服叁

拾圓或在枰圓溫酒米飲任下此藥專實脾胃以其有

鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之累有效尋常治疝

氣藥多是疎導久而未有不為害者此藥用薑汁專一

發散而無疎導之害所以為妙也

三增茴香圓 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏

留不散臍腹脹痛陰核偏大膚囊擁腫重墜滋長有妨行

步瘙痒不止特行黃水浸成瘡瘍或長於肉累治不痊致

令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸醜大皆

由頗服熱藥內攻或因兜取以至如此此藥溫導陽氣漸

退寒邪補虛消疝煖養腎經能使復元應小腸氣寒疝之

疾久新不过三料第一料

茴香

船上者用益半兩同炒焦黃和益研

川練子

去核

沙參

洗剉

木香 洗 各壹兩

右為末水煮米粉稠糊圓如梧子大每服貳拾圓溫酒
鹽湯空心食前日進三服小病此一料可安縱盡可服
第二料

第一料 加下項藥

葶撥壹兩 檳榔半兩

右入前藥共六味重五兩半依前法糊圓湯使圓數服
之若病久未愈便服第三料

第二料 又加下項藥

白茯苓津乃緊小實者去黑皮 黑附子半兩或作壹兩

右通前藥共八味重拾兩並依前法糊圓數服之加至

參拾圓新久大病不過此三料可愈小腸氣頻發及三
十年者寒疝漸至拷揉大者皆可消散神効

消堅圓

牡丹皮去骨 桂心各壹兩 川烏炮去皮尖

桃仁麩炒黃去皮尖

右為末酒糊為圓如梧子大每服三十圓溫酒下

消腫圓

治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖

多年服此藥永去根本

川練子壹斤淨肉 津乃用麩壹合班捕津拾玖个

合巴豆津拾玖粒同炒麩黃色去麩巴豆不用

用津兩用麩壹合巴豆壹兩同炒麩黃色去麩巴豆不用
炒黃色為度去鹽及茴香不用

木香

壹兩 不見火

破故紙

壹兩 炒香為度

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯下甚者日進三兩服空心食前

海藻

治偏墜小腸氣效

海藻

海帶

各壹兩

班猫

去足翅

巴豆

或拾捌个去殼完全者

右班猫巴豆二味一處生絹袋盛用好醋壹碗以瓦鉢盛四味同煮將乾去班猫巴豆不用只將海帶二味細研為末以淡豆豉壹伯粒以煮藥餘醋裹浸蒸研為膏和末藥為圓如梧子大每服用麝香少許朱砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以新瓦瓶

收之每初服柒粒二服拾粒三服拾伍粒若未愈再進三兩服皆用拾伍粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病三五服效此藥貴新合効速若合下稍久多服為佳

敷法

治腎裏偏墜

牡蛎

良薑

右為末津唾調傅大偏處須臾如火熱著痛即安

灸法

治諸氣心腹痛小腸氣外腎疝痛疝氣小腹急痛不可忍足大拇指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右

極妙又治疝氣偏墜

量患人口角兩角為壹折斷如此則叁折成叁角如人

樣以壹角臍心兩角在臍之下兩傍及處是穴左偏灸
右右偏灸左二七壯若灸兩邊亦無害

治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內虛鳴灸風市穴五七壯
灸氣海穴柒壯灸臍左右各去一寸半兩穴各七壯灸
之立效後永不發名外陵穴風市穴在膝上外廉五寸
氣海穴在臍下壹寸半

腰痛

獨活寄生湯

治風傷腎經腰痛如掣久不治流入脚膝為

偏枯冷痺緩弱之患及新產腰脚疼痛除風活血

獨活 二兩半

真桑寄生

无則用川
續斷代

杜仲

切炒
斷絲

北細辛

白芍藥

桂心

芎藭

防風 去芦

甘草

人參

熟地黄 洗

大當歸 名二兩

右剉散每服棗子水貳盞煎空心服或小續命湯加挑
仁煎氣虛不和不食除地黃

治寒傷腎經腰痛不可僥仰每服可加桃仁柒粒
去皮尖煎疼甚或加黑牽牛少許炒研損効方見傷寒
陰證類

治久濕痺濕傷腎經腰重冷痛如帶伍千錢冷

加水洗以蠶物着痛處方少寬不渴小便自利食飲如故
虛弱人加附子或用白朮芍藥官桂附子各等分為末每

服貳錢酒調服方見傷
濕類

治體虛傷冷腰痛加官桂製杜仲各五斤食後服
方見中寒類

治風熱腰痛加續斷天麻薄荷木瓜各等分方見
傷寒類

續斷散 治血滯腰痛亦治閃到

玄胡索

當歸

官桂 各壹分

右為末每服貳錢溫酒調下食前服或加牛膝桃仁川續斷亦効

續斷散 治氣滯腰痛加五加皮煎服 方見風類 或用

續斷散 立效 方見氣類

小續斷散 治鬱怒憂思氣滯腰疼

甘松 炒壹拾兩

甘草

拾五兩

香附子

炒去毛拾伍兩

丁香皮 拾伍兩

蓬莪朮

俱來熟碎貳兩半

縮砂仁 貳兩半

益智仁 炒七及半

右為圓每服五十圓橘子壹錢鹽少許煎湯空心服

用沉香降氣湯打和勻氣散

神麴酒 治閃挫腰痛

神麴壹塊約如拳大燒令通赤好酒貳大盞燂酒便飲令盡仰臥少頃即安或用枳殼散 方見婦人類

或以縮砂烏沉湯木瓜鹽酒調熱服亦効 方見諸氣類

安腎圓 治腎虛腰疼橘皮鹽煎湯吞加草薢尤佳 方見虛類

青娥圓 治腎虛勞力腰疼益精助陽烏髀健脚力神效

破故帛

津兩炒香

杜仲

去麤皮切薑汁拌炒去絲八兩

右為末用胡桃肉伍拾粒大蒜貳拾箇研膏圓如梧子

大每服叁拾伍圓鹽湯服虛極人十補湯吞服 方見虛類

一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入

八味圓加鹿茸當歸木瓜續斷治房勞傷及腰痛鹽湯下
方見虛損類

三至圓治老人虛弱人腎氣虛損腰痛不可屈伸

鹿角二兩

麋角二兩

附子炮去皮脂

桂心不見火

補骨脂炒各二兩杜仲去皮剉炒

鹿茸酒蒸焙青鹽別研半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服柒拾圓空心用胡桃肉細嚼以鹽酒鹽湯任下惡熱藥去附子加肉蓯蓉一兩酒浸微炙乾用

牽牛圓治冷氣流注腰疼不能俯仰

延胡索

破故紙炒各二兩黑牽牛炒二兩

右為末研煨蒜為圓如梧子大每服叁拾圓葱酒鹽湯任下

逐痛圓治腰痛極效亦治關節

附子炮半兩

黑牽牛一兩

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯食前服

驅風湯治打撲腰痛惡血蓄聚痛不可忍

大黃

生薑並切如豆大各半兩

右同炒令焦黃以水一大盞浸一宿五更去渣頓服天明所下如雞肝即惡物也

二效方治坐立或就睡濕地濕入腎經外腎腫腰痛
其用五苓散每服二錢用坯子少許下青木香圓三

十粒數服臍臍微動腫消腰直其痛立止

又方 **通流圓** 治腰臂痛

五靈脂

赤芍藥 各半兩

川烏 一箇

沒藥 四分

麝香 一分

右為末酒糊圓空心温酒送下

道引法 理腰背痛正東坐收手抱心一人於前據躡其兩膝一人後捧其頭徐牽令偃卧頭到地三起三卧便瘥

針灸法

腰背痛針决膝腰句畫中青赤路脉出血便瘥

腰痛不得倏仰者令患人正立以竹往地度至脐斷竹乃度背灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人知灸腎

膻穴亦可

○眩暈

風證 **川芎散** 治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胸戰搖如在舟船之上

川芎 一兩

北細辛 叁分

白茯苓 一兩

白朮 一兩

粉草 半兩

桂枝 三分

右剉散每服律錢水一椀半生薑薑三片煎不拘時服有痰兼服青州白圓子 方見風科通治類

感寒 **三白散** 治陽虛眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聾

人參

附子

北細辛 各三

甘草

乾薑

山茱萸

防風

山藥 各五

右劉散每服津錢生薑五片棗貳枚煎食前服中寒眩
暈欲倒服薑附湯方見中寒類

傷暑消真圓治冒暑眩暈煩悶不甦用香薷散生薑煎吞
下每服七十圓方見中暑類

中濕官木散治冒雨濕眩暈嘔吐涎沫頭重不食經久
不瘥者

川芎

半夏

白朮

各一兩

甘草

半兩

右劉散每服津錢生薑五片木瓜貳片不拘時候溫服
七情痰神湯治喜怒哀憂思悲恐驚所感臟氣不行鬱而生
涎結為飲隨氣上厥伏留陽經心中忪悸四肢緩弱翕然
面熱頭目眩冒加欲搖動

人參

麥門冬

去心

山藥

各二兩

前胡

熟地黄

洗酒拌炒

枳殼

去穢炒

遠志

甘草水煮去心
姜汁拌炒三分

白茯苓

茯苓神

各一兩半

半夏

湯洗
七次

黃耆

炙

一兩

甘草

半兩

右劉散每服津錢流水盪半夏伍片秫米一撮煎食前服

痰證陳湯治痰暈或因冷食所傷

陳皮

半夏

白茯苓

各一兩

甘草

五錢

丁香

胡椒

各三錢

右劉散每服津錢薑三片烏梅一箇同煎不拘時候
體虛者順元散方見痰產類

失血治去血過多頭重目昏眩暈不省舉頭欲倒

大弓窮

大當歸 去尾各二三兩

右劉散每服三錢水壹盞半煎不拘時候

下虛補遺重錫丹 治陰陽不升降熱下冷頭目眩暈病

至危篤或煖藥上僭愈甚者

黑錫丹頭 二兩

川練子

陽起石

木香

沉香

青皮

炒各半兩

肉豆寇

茴香

官桂

去麝皮不見火綿附皮脂

葫蘆巴

破故紙

炒各一兩

烏藥

去木劉一分

磁石

火煨醋淬七次細研水飛

右為末酒糊圓如梧子大每服伍拾圓加至柒拾圓濃

煎入參朮苓薑棗湯空心吞下

○身疼

風濕 又名通氣驅風湯加大川芎方見別類

寒盜 又名烏湯 發汗即效或用敗毒散方見別類

濕證 治濕瀉 五苓散 方見瀉濕瀉署類

血滯 當歸建中湯 方見腹痛類

或用舒筋散於內有延胡索活血除風理氣 方見腰

冷痰 二陳湯 加辣桂生薑烏梅煎 方見虛類

勞倦 秦元醫甲散 治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌躄

羸瘦膏節煩咳頭赤頰赤肢躄枯槁面色萎黃唇焦舌乾

心煩熱痰涎咳腰背引痛乍起乍卧憂鬱不寧神清恍

惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往

來並能治之

荆芥 去灰

具母 去心

白芷 半斤

山藥

天仙藤

前胡 各二斤

羌活

肉桂 各半斤

嫩薑 去根

陳皮 去白

秦艽 去芦

甘草 各一斤

右判散每服貳錢水壹盞薑炙片同煎至八分稍熱服

不拘時酒調亦得常服養氣調血解倦怠

虞預證 干補湯

加半夏秦艽肉桂每服各半錢 方見虛

臂痛

風證 烏頭續命散

治臂脾痛 方見風抖虛證類

五靈脂

荆芥穗

防風

羌活

獨活

甘草節

川山甲

骨碎補

草烏 各五斤

麝香 少許

右為末用溫酒調下臨睡服如渾身損痛加沒藥木香酒調空心服

寒證 和

加川牛膝木瓜葱白 方見傷寒

濕證 治風濕臂痛諸藥不效

白朮 薄切

當歸 淨洗薄切乾

獨活 淨洗

羌活 淨洗切乾

甘草 炙

川芎 各半斤

右判散每服叁大錢水壹盞薑半薑五片慢火煎至一盞

去渣溫服合滓不拘時候

七情 白

治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止此

由榮衛之氣循行失度留滯經絡與止氣相搏其痛發則

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

方用薑末切炒川白芷各

方為末每服二小酒調效

有似癱瘓

真白芥子

木鼈字法各

沒藥

桂心

木香各半刀

左為末入研藥令勻每服壹錢溫酒調下

治同上

紫蘇葉

青皮

苦梗

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃耆

枳殼去穢

防風各半刀

甘草

橘皮各三分木香

連皮大腹子

薑非炒

右判散每服水貳盞薑三片棗壹枚煎至壹盞去滓服

治水飲停蓄注於經絡發為疝痛皆因脾土有虧

平日多飲水漿不能傳化所致

平日多飲水漿不能傳化所致

川芎

半夏湯洗

白茯苓

川獨活

陳皮

枳殼去穢炒

白朮

甘草各一分

右為散每服三牙水一盞半生薑五片同煎去滓食後停少時溫服

症類

凡八忽患會背手脚腰膝隱痛不可忍連筋骨牽

引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注便

用風藥及針灸皆無益又是風毒結聚欲為癰疽亂以藥

貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為此疾或令人

頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜

間喉中如鋸聲多流涎手足脚重腿冷痺氣脈不通誤診
為癰瘰亦非也凡有此疾但以是藥不過數服其疾如失

甘遂 去心

紫天戟 去皮

白芥子

真者各等分

右寫末煮糊圓如梧子大曬乾食後臨睡薑湯或熟水
下五七圓至十圓如疾猛氣實加圓數不妨其效如神
加味控涎圓一方見喘急類

氣滯 治氣類

方見諸氣類

血氣滯 治血氣滯

治血氣滯初因經絡不行臂痛不可忍者

片子薑黃

四刀如不用薑黃者

白木 炒貳丸

羌活

甘草 各一丸

當歸 一丸

海桐皮

去蘆皮二丸

赤芍藥 一丸

右為散每服參錢水壹盞煎至七分空心服

執證

防風通聖散

方見風科執證類

敷貼藥治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

羌花根一味研為末米醋調隨大小傳之立止敷貼不
任須以紙花覆其上用絹帛扎定

針法有隅一穴隨時而愈

脇痛

傷寒

小柴胡湯

加白牡蠣粉研碎枳殼去穢切片各壹錢

煎方見傷寒陽證類

氣滯

治膀胱氣脇下痛

或項筋痛久不愈流入背

脊骨痺並皆治之每服七粒用茴香酒下方見諸氣類

七情 枳殼者 散治 悲哀 煩惱 傷肝 氣至 兩腋 骨疼 筋脉 拘急 腰脚 重滯 兩股 筋急 兩脇 牽痛 四肢 不能 卒漸 不 背脊 痛 變急 犬治 脇痛

防風 去芦

川芎

細辛

枳殼 去穢

桔梗 各四片

甘草 二片

乾薑 一兩半

右劉散每服四錢水一盞半生薑三片煎至七分去渣

空心温服

通治 諸症 散治右脇疼痛脹滿不食

枳殼 去穢

桂心 去皮不見火

甘草 二片

片子薑黃 洗半兩

右為末每服二錢薑棗湯調服酒亦可

川芎散治左脇刺痛不可忍

枳實

川芎

各半兩

粉草 各半

右為末每服貳錢薑棗湯調服酒亦可

枳殼散治脇間痛如有物以挿然又氣疾也

枳殼 去穢炒三兩半

甘草 七片半

右為末每服貳錢濃煎白湯調下不拘時候

腹痛

風證 胃風湯 治腸胃不足風冷棄之水穀不化泄瀉下注

腹中虛滿日夕交痛或下瘀血或如豆羹汁服熱藥效

者此風痛也加入濃磨木香水一合 方見泄瀉類

寒證 脾虛者 五苓散 二片煨葱白二根木瓜二片益

炒茱萸七粒煎服笑者蘇合香丸生薑三片枳殼半片
木香少許煎方並見傷寒陰證類

暑證香薷散加生薑陳大蓼木瓜陳壁土煎方並見傷

濕證香薷散加炒蒼朮煨枳殼煎未效用不投金匱要略

生薑木瓜紅棗車前子煎方見傷寒類及時疫類

熱證四順清原飲治腹痛大便秘小便赤喜飲冷以手按

之轉甚不可近病者或兩手熱痛處亦熱方見積熱類

或用大柴胡湯方見傷寒陽證類

或用小三黃圓方見積熱類

老人大麻仁圓方見秘結類

冷證椒附圓治臍下極冷痛發異常手足亦冷不任冷水

冷食面黃肌瘦按之痛稍止者

綿附乙个拾胡椒乙百粒

右為末姜汁糊為圓如梧子大每服五十圓姜湯或益

湯空心吞下

寒證加茱萸木香煎亦效方見諸病類

氣證虛者嘉木散木香勻氣散木香流氣飲治滿腹脹膨

痛流走不定傷衝兩脇及腰間實者心氣飲青木香丸

熱盛大便秘三和散木香檳榔圓加大黃方並見諸

積證香薷散用生薑烏梅縮砂煎吞厚樸圓治食多噎醋

吞酸口出清水惡心腹中緊痛每服二七粒棗豆大服後

得通仍佐以三棱煎圓及紅圓子平胃散

藥方得全安方見脾胃諸氣痰瘧類

神保圓治寒氣停積逾旬不愈大便虛泄小便赤急痛甚

用**冷粉湯**加縮砂仁二十粒搥碎水或薑生薑十片煎服

五粒未效再服七粒立愈方見諸氣類傷寒陰證類

蟲證治腹中有塊起以手按之不見作聚往來痛

無休止亦治心痛五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫或吐清

水及夢中驚歲面色青黃飲食雖多不作肌膚或寒或熱

沉寒不知病之去處其蟲不療則子母相生无有休

止長一尺則害人

胡粉五錢

鶴虱五錢

白礬五錢

檳榔五錢

苦楝根五錢

右為末麩糊圓如麻子大每服十五圓溫漿入生麻油

一兩點打勻下之溫米飲下亦得不拍時候其虫細小

者化為水大者自下

虛證治勞傷虛羸腹痛吸吸少氣小腹拘急

連腰背時自汗出不思飲食

當歸二兩

桂心一兩半

楊芍藥二兩

黃耆壹兩半

右剉散每服水貳盞半薑三片棗二枚同煎食前溫服

通治大抵宜通塞則為痛九痛甚須通利臟腑乃愈隨冷

熱須用巴豆大黃牽牛此最要法

小理中圓治三腕氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化喫

物類傷胸膈滿悶脇肋疔刺嘔吐噎逆噎醋惡心腹脹腸
鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻煨

京三稜煨 熱碎 乾薑炮

青皮

陳皮洋流 去蒂

肉桂去麤皮 各二兩 牽牛炒香熟

良薑炒各 二斤

阿魏三兩 醋化 去沙石 研 縮砂仁

蓬義木炒乘 熱碎 紅豆各壹斤

右為末用水煮麥糊圓如梧子大每服叁拾粒生薑橘
皮湯下溫湯亦得不拘時此藥無利性不損脾胃氣偏
虛寒者最宜服之與三稜煎圓和同服尤妙方見諸 氣類
腹疼作嘔欲利大便諸藥皆吐惟蘇感圓用薑汁泡湯
吞服最妙蘇合香圓 見中氣類 感應圓 見秘值類
氣滯腹痛神保圓柿蒂灯心湯下二七圓最為捷效方

見諸氣類鐵氣入腹作痛以磁石數斤杵為末鋪葦席
睡其上再以磁石煎湯調小調氣散服效

諸痺

風寒濕合痺附子湯 治合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重

著四肢緩縱腰脚酸疼

生附子壹兩

白芍藥

官桂

甘草

白茯苓

人參半兩

白木三錢

石劉散每服肆錢水二盞生姜七片煎至六分去渣食
前服惡甜者減甘草一半兼治瘦極筋脉氣虛倦怠徧
躄酸疼

烏頭湯 治寒冷濕痺流於經絡挛縮不得轉側

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦光

附子

官桂

白芍藥各七

川獨活壹兩二錢半

右劉散每服三錢水一盞半棗二枝同煎至八分去滓空心食前服

理中易 治寒濕痺加附子天麻四分之一方見霍亂類

黃芩酒 治風濕痺身躄頑麻皮膚瘙癢筋脉挛急言語謇

澁手足不遂時竟不仁

黃耆去芦 防風去芦 官桂不見火 天麻

萹解 白芍藥 當歸去芦 雲母粉

白朮 茵芋葉 木香不見火 仙靈皮

甘草 川續斷各一兩

右劉散以生絹袋盛以酒一斗浸之春五日夏三日秋七日冬十日每服一盞温煖服之不拘時候常令酒氣相續為佳

蒼耳散 治一切風濕痺四肢拘挛

蒼耳子三兩為散水一升半煎去滓分作三服或細末水糊圓如梧桐子大每服五十圓温酒吞下

三氣丸 治久風濕痺正氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣

薏苡二升為末以水作粥空心服

寒證麻痺 **五續散** 方見傷寒類

痰飲後身湯 治支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯泡七次

赤茯苓去皮

橘皮各一兩

枳殼去穢炒

桔梗去芦

甘草炙各半兩

右劉散每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去渣溫服不拘時候

血氣滯

治血氣凝滯手足拘挛瘰癧風痺氣痺等疾

川續斷

杜仲

去皮切

防風

桂心

華陰細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草

各一兩

秦艽

生地黄

川芎

川獨活略半

黃耆

川牛膝略

右劉散每服五錢水一盞薑二片棗一枚煎至一盞去渣熱服不拘時候但腹稍空服

筋痺

治筋痺肢節束痛

羚羊角

薄桂

附子

獨活各一兩

白芍藥

防風

芍藥各一兩

右劉散每服參大錢水一盞半生薑二片同煎至八分取消汁服日可一二服

執證

治熱痺肌肉熱極躄上如鼠走唇口反縱皮

色變兼諸風皆治

升麻去兩

茯神去皮

人參

防風

犀角鎔

羚羊角鎔

羌活各壹兩

官桂半兩

右劉散每服四錢水貳盞生薑二片竹瀝少許同煎至一盞不拘時候溫服

諸疸

風證(又前九) 治因傷風痰熱不解發為風疸身黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生文 式月并壹束為 大黃 煮 黃連 炒

桂接根 水石 煨 苦參 葶藶 各等分

右為末以艾膏和得所丸如梧子大初服六七圓漸加至二十九有熱加苦參渴加桂接根小便澁加葶藶小便便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃並倍加

麻黃 去兩 治傷寒不解發為黃疸其脉緊少汗解之

石用米酒五升煎至二升每服一盞溫服汗愈 春秋夏

五苓散 治伏暑一熱發黃小便不利煩渴茵陳煎

調下一方治疸通用 方見傷風者

茵陳湯 治濕熱瘵黃小便秘澀頭汗而渴

茵陳蒿 乾 切 大黃 半斤 小紅梔子 十枚

右剉散每服三錢水煎服五苓散亦治發黃二藥夾煎濕證 治濕熱瘵 治濕疸得之一身盡疼發熱面色黑黃

七八日後壯熱在重裏者血下如猪肝狀小腹滿者急下之身自盡黃小便不利其脉沉細

礬石 煨 滑石 各等分

右為末每服三錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者效或汗愈

時行瘧子圓 治時行病急黃及瘡癰疫癘

茵陳 梔子

芒消

大黃蒸乙兩

杏仁去皮尖炒 各三分

豆豉式分半湯 浸軟別研

恒山

鱉甲醋炙 各半兩

巴豆去皮壓去 油壳分

右為末錫鉛為圓如梧子大每服三圓飲下吐利為效

未知加一圓竟體氣有異急服之

黃汗酒湯 治身軀洪腫發熱有汗如藥汁其脉沉

黃耆五兩

芍藥

桂心參兩

右剉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去渣

不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈

黃耆湯 治黃汗身腫汗出已輒輕久必身閉

胸中痛腰以下無汗腰腕弛痛如有物在皮中劇者不能

食煩燥小便不利

桂枝夫皮

芍藥各二兩

甘草炙

黃耆五兩

右剉散每服四錢水一盞半姜五片棗三枚煎至七分

去渣溫服仍飲熱粥以助藥力覆取微汗未汗再服

黃疸 治黃疸食已即飢身軀面目瓜甲牙齒及小

便悉黃寒熱或身軀多赤多青皆由酒食過度為風濕所

搏熱氣鬱蒸而成

茵陳

木通

梔子仁略乙

大黃炒

瓜蒌實个

石膏五兩

甘草炙

右剉散每服水一盞半姜五片葱白壳棗煎至八分

去滓温服不拘時候大小便閉加枳實赤茯苓等藥可
小兒夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可
除熱去必吐

半夏

右剉散每服叁錢水或漿米十片煎至七分不以時服

單方治黃疸身眼黃如金色不可使婦人鷄犬見修製

東引挑根

右以水壳大升煎取一斗升適温空腹服後三日其

黃離如薄雨散最後瘥百日方平復身黃後可時

飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食麪猪魚肉

穀治胃暑痧熱氣濁食谷不消大小便不利張

滿不下食跌陽脉緊而數亦治因勞發熱熱鬱發黃

苦參 叁兩

龍膽草 壹兩

梔子 去皮少

人參 三分

右為末以猪膽汁入熱蜜少許攪和圓如梧子大以火
麥煮飲下五十圓日三服不知稍加之

脾疸治胃中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜文

夫吐血婦人熱血崩並皆治

龍腦薄荷 五兩淨葉

真蒲黃 壹兩

麥門冬 去心

阿膠 生五兩

甘草 壹兩

人參 壹兩

川當歸

黃耆 壹兩半

下通 壹兩

生乾地黄 叁兩

柴胡 好者半兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服二十圓上焦食後用煎

水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與之此藥大有奇効不可盡述

紅圓子 治穀疸腹滿眩暈佛鬱怔忡酒疸通用 **陳湯** 加縮砂煎湯下 方見瘵瘵類

酒疸 言其湯 治酒疸因下後久久為黑疸目青面黑心中如啖非羸狀大便正黑小便亦或黑其脉微而數大抵五疸惟酒疸變證最多蓋酒之為物隨入性量不同有盈石而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒滲入百脉為病則不待發黃溢于皮膚為黑為腫流於清氣道中則眼黃鼻腫種種不同故方中訛酒疸外有肉疸黑疸辨酒勞後疸

葛根 壹兩

枳實 去穢

梔子仁

豉 各壹兩

甘草 半兩

右剉散每服四錢水觥半煎至八分去渣溫服不拘時

酒蒸黃連 治酒疸

黃連去鬚淨四兩剉碎以酒洒醃一宿日乾為末粟米糊為圓梧桐子大每服參四拾圓以二陳湯加葛根茵陳黃連煎湯送下

六物飲 治酒疸肚脹

葦菴

荆芥穗

不蛀川練子

連皮棧用

生薑母

軟烏梅

甘草

右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自已滿腹小便

去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露置一宿辨明
飲其汁續用車前子山茵陳竹園蓼煎湯乘熱調五苓
散服自覺黃水從小便出而肚不脹如

人參散 治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常

人參

白芍藥

桔槎根

枳殼去穢炒

茯神

酸棗仁

甘草炙

熟地黃去穢

右判散每服四大錢水壹盞煎至七分食後臨卧温服

辰砂炒香散 治飲酒行房酒熱厥於心經致成黃疸再加

辰砂末少許每服貳錢茵陳貳根煎湯日三服方見

王瓜方 治酒疸熱疸土瓜搗汁取服任意

酒毒不散發黃 久入浸漬流入清氣道中且引

漱內鼻滴出黃水愈

苦藟子去穢

苦葫蘆子各二七個

黃黍米參

安息香貳兩 煎子大

右為末以一字搗入鼻中滴尽黃水三升或過多則以

香穢燒灰麝香末各少許搗入鼻中立止

大勞疸 治文勞疸身黃額黑目睛發熱惡寒小腹

急足下熱其脉沉緊腹或滿者難治

滑石

石膏船各等分

右為末大麥粥飲調下二錢匕日三四服小便利則瘥

熱疸 治疸發熱諸熱通用

柴胡參兩

赤茯苓式兩 桑白皮製

川芎壹兩

甘草 炙 半兩

右劉散每服三錢生薑棗子煎服

虛勞疝 與劉散 治五疝口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁

秦艽 去片 六片

當歸 去片 酒浸 芍藥

白朮

官桂 去皮 不見火

赤茯苓 去皮 熟地黄 酒蒸

橘紅

小草

川芎 各壹兩

半夏 湯洗

甘草 炙 各半兩

右劉散每服肆錢水一盞半薑五片煎至七分去渣溫

服不拘時候

養神湯 治證同上 方見虛損類

父黃 與劉散 治人無故忽發振寒皮膚麤塵出小便赤澀

大便時秘氣無異飲食不妨諸藥湯不除因為父黃

苦參

黃連

瓜蒂

黃蘗 土皮

大黃 蒸 各壹分

葶藶 炒 半兩

右為末每服一大錢米飲調服當吐下隨時消息加減

積黃 與劉散 治理脾胃退黃

針砂 醋煮 通紅

紫金皮 酒浸

香附子 炒

三稜 醋浸 宿者炙

倉朮 米泔浸

陳皮

青皮 去白

厚朴 姜制 炙

縮砂 各壹兩

右醋糊圓每服三十圓酒熟水下川椒湯服亦可立効

○五噎

五噎散 治五種噎食飲不下胃背痛嘔噦不徹攻刺疼痛 淚與涎俱出

人參

茯苓

厚朴

去麁皮 薑汁製 甘草炙

枳殼煨炒 去穢

訶子

炮去核

桂心

白朮

橘皮

白薑

三棱

炮

神麩

炒

交牙

湯

木香

檳榔

蓬莪木

炮各半兩

右劉散每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚煎至十分空心服為未益湯亦得

〔不化〕

治五噎五膈胸中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞食飲

不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食

白朮

茯苓

各半兩

木通

當歸

橘皮

青皮

大腹子

檳榔

芍藥

各壹兩

甘草

欬

兩半

白芷

三兩

紫蘇葉

四兩

枳殼

煨炒去穢三兩

右劉散每服水一盞薑三片棗一枚煎至六分空腹溫服

〔寬中散〕治同上

〔大行散〕治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚致

臟氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如

炙鬱吐噦不下皆七氣所生

半夏

湯泡七次玉兩

白茯苓

四兩

厚朴

姜製炒

紫蘇

一兩

右劉散每服四錢水壹盞薑三片棗一枚煎空腹溫服

○五膈

〔寬中散〕

治因憂恚寒熱動氣成五種膈氣不進飲食

白豆蔻

去皮

縮砂

四兩

香附子

炒去毛

十六兩

丁香 四兩

木香 二兩

青皮 去白 四兩

甘草 炙 五兩

厚朴

去皮 姜汁炙 令熟 一片

陳皮

去白 四兩

右為末每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯點服不以時候諸冷氣用之亦効

五膈散 治五膈胃膈痞悶諸氣結聚脇助脹滿痰逆惡心

不進飲食

枳殼

去穢 麩心

木香

不見火

青皮

去白

大腹子

白朮

半夏麩

剉炒

丁香

不見火

天南星

湯泡 去皮

乾薑

麥牙

草果仁

甘草

炙 半兩

右為末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分溫服

不拘時候

五膈散 治憂悲思慮膈塞不通飲食冷物即發其病苦心

病不得氣息引背痛如刺心下堅大如粉絮緊痛欲吐吐

即差食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆者

麥門冬

去心

甘草

炙

人參 四兩

川椒 炒出汗

遠志

去心炒

細辛

去苗

桂心

各三兩

乾薑

炙 三兩

附子

一斤

可圓彈子大含化日三服夜二服胃中當熱七

甘草人參各一兩一方以吳茱萸代桂治遇寒冷則心

痛咽中有物吐不出噤不入飲食減少並可服不拘時

寬膈散 治氣不升降胸膈結痞

木香

京三稜

青皮

各半兩

半夏

三兩

大腹子 一分

右為末薑汁糊為圓如梧子大食後米湯下二三十圓

瓜蒌薤白圓治胸中痛徹背喘急妨悶

瓜蒌實

別研

枳殼

去穢

半夏

湯炮七次

桔梗

去麩錢炒各

兩

右為末薑汁打糊圓如梧子大每服五十圓食後淡薑

湯送下

世醫得効方卷第三

程